


57


HISTORIA
PLANTAR.

·T·O·I·





4150H



Jacques Dalechamps
1513-1588

(Jac. Dalechamps)
Res 57
HISTORIA
GENERALIS

PLANTARVM,

In libros XVIII. per certas classes artificiose digesta;

Hac, plusquam mille imaginibus plantarum locupletior superioribus, omnes propemodum quæ ab antiquis scriptoribus, Græcis, Latinis, Arabibus, nominantur: necnon eas quæ in Orientis atque Occidentis partibus, ante seculum nostrum incognitis, reperta fuerunt, tibi exhibet.

Habes etiam earundem plantarum peculiaria diuersis nationibus nomina:

habes amplas descriptiones, è quibus singularum genus, formam, ubi crescant & quo tempore vigeant, natium temperamentum, vires denique in medicina proprias cognosces.

Adiecti sunt Indices, non solum Græci & Latini, sed aliarum quoque linguarum, locupletissimi.



LUGDUNI,

APVD GVLIELMV M ROVILLIVM.

M. D. LXXXVII.

1587

Cu Priuilegio Pont. Max. Cæsareæ Maiest. & Christian. Galliarum Regis.





ILLVSTRISSIMO
AC POTENTISSIMO
PRINCIPI CAROLO

EMANVELI DVCI

SABAVDIE.



HANC Plantarum historiam, quæ nunc tandem, si non perfecta, at certè perfecta proxima in publicum est proditura, non abs re Celsitudini tuæ dicendam existimaui. Quum enim ut paternis vestigiis in aliis quibusque præclaris rebus insistis, ita etiam eius exemplo, cognitionis omnium quæ vniuersa natura historia complectitur, desiderio accendaris, hæc autem quæ plantas describit, vel primum (præsertim si, quantam rei medicæ utilitatem affert sectemur) locum inter illa teneat : fieri non potest quin gratissimum tibi sit ingeri istud volumen, quo ditissimus ille & pretiosissimus thesaurus cõtinetur, præserto quum non, ut aliis antea editis eadem de re libris, magna tantum eius portio, id aut totus, aut penè totus eo includatur : adeò ut de isto volumine id quod deullo hætenus, predicari possit, tam multarum stirpium tam accuratam, & exaam descriptionem continere, ut (sicut paulò antè dixi) si non ad perfectionem meruisse, saltem ad illam proximè accessisse dici queat. Quod à me taceretur tamen, nisi ex collatione cum aliis manifestum fore, & quos celsitudo tuæ secus habet medicina & nominatim rei herbariæ peritissimos viros, id ei testatur scirem. Habebunt autem quicunque hoc fruentur libro, etiam quod potentissimo illi & modis omnibus maximo Regi Philippo, socero tuo, gratias agant. Eremitissimis enim terris, nondum ante seculum nostrum cognitis, & quas parum ipse, partim inuictissimus Imperator, Carolus quintus, eius pater, subiugauit, allatæ non pauca stirpes fuerunt, quarum haud magis quàm illarum terrarum notitiam quisquam habuerat : quum tamen ex nonnullis earum, (de stirpis loquor) præsentissima peti remedia videamus. Nec verò planta tantum se alia etiam multa inde prodierunt, antea prorsus incognita, quamuis inter nativæ diuitias, ut magis secretas, ita etiam insigniores, numeranda essent. Huiusmodi autem opulentia natura quis inter omnes Christianos Principes

patre tuo studiosior, quis eius cognitione instructior extitit?

Verum ut ad eam historiae naturae partem, quam tibi nunc offero, revertar, sicut eam alia nulla esse inferiorem patri tuo persuasum erat, ita qui dem tibi persuaseris, minimè dubito: ac profectò, quemadmodum herba quae Getana vocatur, Gentij Illyrici principis nomen immortalitate donavit, ita vel haec plantarum historiam nomen tuum immortale reddituram credibile est. Quis enim à posteris mentio eius fiet, tui, cui dicata est, memoria renovabitur: quinetiam erunt fortassis qui eam hac ipsa dicatione à ceteris omnibus superioribus distinguant: etiamsi alia multa habeant, quibus insigne discrimen praesint inter hanc & illas ponere. Nec verò Adrianus Imperator non & ipse huius libri editorem, sibi nuncupatam, valde hilari vultu excepisset, summòque favore prosequutus fuisset, quantum conicere ex eo licet quod de illo literis Athenaeus prodidit, magna sequens digna liberalitate eum esse remuneratum à quo herba lotus oblata fuerat, quae florem inusitatum, id est pro candido rubrum (qualis rosa est) progenuerat necnon illum qui hanc novitatem versibus celebrarat. Quominus mirari quendam decebit, me Celsitudini tuae dicare librum hunc ausum fuisse: quum vix ea quae de hereditario illius in literas amore, easque nominatim quae illa opum naturae arcana nobis pandunt, per multas regiones sparsa est fama, ad hoc me incitarleberit: simulque ad precandum Deum Optim. Max. (sicut & precor) ut illum diutissimè incolumem seruet, & novis in dies munificentiae benignitatisque donis locupletet. Lugduni, Cal. Iulij: anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo sexto.

Tuae Celsitudini deditissimus,
GVLIELMVS ROVILLIVS.



GULIELMVS ROVILLIVS

LECTORI SALVTEM.



IGESIMVS annus est, benigne Lector, & eo quidem amplius, cum ingressus musæum Iacobi Dalechampij, insignis ætate nostra Medici, grande volumen eum præ manibus habentem reperi, quamplurimis stirpium figuris conspicuum. Raras illas, exquisitas, & nōdum vulgatas contuitus, additis descriptionibus explicatas, & apto, vt argumētum poscebat, ordine dispositas, ingenio geniōque meo inuitatus (semper enim fui, ac etiamnum sum, ita publicæ utilitatis appetens, vt in iis obeundis quibus omnium commoda procurentur, nec labori parcam, nec sumptui) arbitratus sum operis magni tanquam infantiam ac principium id esse: statimque alia atque alia mecum reputaui, sed hoc præcipuè, nihil iucundius esse ac optabilius, quàm naturæ & facultatis plantarū cognitionem: seu voluptatem nobis ipsi proponamus, seu illorum quæ nostris malis subueniunt, præsentem supellectilem. Quid enim magis nos exhilaret, quàm aspectus pulcherrimorum (vt ita dicam) aulæorum, & tapetiorum, quæ natura, omnium architecta & parens, ubiq; strauit in suis latifundiis, vt admiranda forma, & speciosa varietate colorum, radicis, caulis, ramorum, foliorum, floris, fructuum, nostros oculos pasceret, ac reficeret, spectaculo quidem ornatissimo, & instructissimo, quod vel etiam maximè squalidos, rusticos & incultos homines atliciat, & delectet? Necessariam porro esse hanc scientiam ad tuendam vitam, & morborum infestorum nobis curationem, multis disceptandum non est. Satis id docent vel mutæ ac rationis expertes animantes, quæ instinctu naturæ medentur sibi, remediāque profutura discernunt ac deligunt. Hæc igitur cum animo diu ac multum volutassem, constans quædam incessit voluntas tantum opus aggrediendi, nouum ferè illo tempore, cum eius fundamenta Fuchsius, Dodonæus, Tragus, Lonicerus, & aliquot alij iecissent, sed exiguo plantarum numero contracto, & rudiore imaginum forma, nullāque totius operis artificiosa partitione, quæ diuisam materiam in suas differentias & classes distingueret. Cum ergo decreuissem omni cura id quod meditabar perficere, & magnam mearum fortunarum partem in eam rem impēdere, ad promouendum eum conatū, multis opus fore prouidi: ac primū quidem,

industria hominis docti, qui huic negotio præfectus omnia ritè administraret. Propitiâ fortuna, hoc animo versanti mihi occurrit Ioannes Molineus, dum vixit, famosus medicus, Guilielmique Rondeletij, medici præstantissimi, & in examinandis plantis exercitatissimi, alumnus, discipulus, & per annos multos conuictor, homo laboris indefessi, & cuius ob tersam puritatem oratio mirificè omnibus arrideret. In hoc totus probus ac eruditus ille vir incubuit, singulari fide ac sedulitate, plurimum adiutus subsidiario consilio Dalechampiij, qui ultro de singulis eius commentationis partibus ecquid sentiret, exposuit, ac liberaliter commodauit quidquid iam imaginum, & historiarum collegerat. Inesperata hæc opportunitas virgula diuina cùm obtigisset, pensitans mecum, id opus augeri in infinitum posse, aggestis plantis, quas alio solo & cælo quàm nostro genitas nobis iis explorandis dediti homines suppeditarèt, (non enim, ut inquit Poëta, terræ ferre omnes omnia possunt) amicos meos, quos equidem non paucos habeo, rogavi, Aphricanos, Hispanos, Italos, & qui in orbis remotissima loca ferè quotidie nauigant, ut ex regionibus illis quas adeunt, aut in quibus degunt, ignotas adhuc nostris gentibus plantas, ita vulsas ut non discerptæ & laceræ sed quàm maximè fieri posset integræ & illæsæ essent, ad me mitterent. Quod (nisi me plus satis amo) prosperè successit, acceptis illorum beneficio plantis certè quamplurimis, spectatu dignissimis, nec passim obuiis.

Prospecta hæc cùm iam essent, & nihil aliud superesset, quàm, quod aiunt, operi manum admouere, eos qui plantarum simulachra delinearent, ac sculperent, & hic, & ubicunq; habitare rumor erat, peritissimos, gnauissimos, ingeniosissimos, nulla prorsus mercedis habita ratione, quantumcūque modum excederet, aut acciui, aut absentes operam in id nauare iussi, hoc tantum imperans, ut illorum minimè esset fallax imitatio, & quæ repræsentarent, imaginis veritate ac venustate cernentium oculis approbarètur. Iis qui huius rei scientes & gnari sunt, haud difficile æstimare fuerit, in tantum numerum tabularum, quæ pictæ & incisæ sunt, quantam pecuniæ vim profundi oportuerit, & quantum molestiæ patienter deuorari, ut continuaretur is labor, & ad finem perduceretur ingens libri moles: cuius editionē cum incredibili dolore, & graui damno meo, in longum tempus distuli, tribus diuturnis morbis, periculosis, minacibus, vexatus, & quadam velut remora impeditus: è quibus, Deo iuuante, & felici medicorum auxilio, tandem euasi, sed ita lassus & fractus, ut tardius quàm cupiebam, alligare me huic pistrino valuerim.

Interim autem dum inuitus moror, & procrastino, è multis officinis prodierunt eiusdem argumenti libri, eiusdemque apparatus, ab egregiis doctrina viris emissi, vtilitati publicæ addictis oppidò, & alioqui perspicacibus, ac minime pigris: quidam, breues, instar tumultuariæ cuiusdam scriptionis festinati: quidam non exiguum earum numerum habentes. Primum autem inter illos omnes locum primamque laudem Andream Matthiolum obtinere fatendū est: verum ne illius quidē opus me ab eo quod

quod destinaueram, deterruit ac depulit. Id verò fuit, generatim & in vniuersum omnium plantarū quæ innotuerunt memoria nostra, à medicis & herbariis memoratæ ac celebratæ fuerunt, historiā ad posteros transmittere, velut thesaurum omnium quæ ad æuum vsque nostrum traditæ sunt, & quum cæteri omnes indigestos quosdam earū cumulos nobis proposuissent (siquidem nec Matthiolo alium quàm ipse Dioscorides ordinem tenere licebat) eas contrā in certas classes artificiosè distribuere. Quæ res certè multum huius cognitionis cupidos, & candidatos leuabit: quos in tanta multitudine librorum & tam confusa quærere tædet quæ vestigant. Nec verò est quod quisquam requirat plantarum imaginibus prorsus iconicis expressarum descriptiones fusiores & accuratiores nostris quas singulis figuris apposuius. Sunt enim eiusmodi nostræ, vt ex iis cogniturus sit Lector vniuscuiusque genus, formam, vbi crescant, quo tempore vigeant, natiuum temperamentū, quinetiam proprias in medicina vires. Adde quòd in singularū propemodū historia, authorum de illis loci citantur ac expenduntur, quinetiam alij aliorum collatione explicantur: aut, si pugnare inter se videri possint, cōciliantur. Sed & quæ corrupta sunt restituuntur, & variæ lectiones aut cum iudicio excutiuntur, aut obiter saltē indicantur. Non mirū est autē tot hac de re libros antea prodisse, quum emergeret in dies quod auctariū esset: eorum præclara laude scilicet, & existimatione qui de suo symbolā conferebāt. In horum studiorum æmulatione dum eiusdem cōsiliij rationibus plures insistent, sunt qui vel lucri spe capti, vel honoris leuiusculi ambitione ducti, quod ex aliis mutuati sunt, furtimue surriperunt, sibi vendicent. Hoc profectò vitium nunquam non mihi turpe fuit, ac odiosum, vt qui nec inuidus sim, nec gloriosus, ac ne quæstus quidem auiditate ardeam. Gratissima sanè hucusq; vel iam à puero, mihi fuit modesta simplicitas, quæ publicæ vtilitati ac omnium desiderio potius inferuiat, quàm priuatis commodis, neminemque fraudet ac spoliet illa quam virtus eius meretur, gloria. Itaque plagij crimen istud perosus, vel (vt loquar mollius) nimiam versutæ mētis istam calliditatem, nihil alienum mihi arrogauimò, si quæ plantæ figura elaborata iam, præsto fuit, quam ostenderit alius postea, vtramque, meam nempe, & illius, apparere volui, ne quæ inuidia glisceret, nec locus esset conquestioni, ac denique maledictis quisquam ne mecum certaret, ac impotenter veluti digladiaretur: simul etiam, vt intelligerent excellētes illi viri, quorum scriptis fruimur, postquam hoc primum institui, quāta cum vigilantia & sollicitudine in hoc negotio me gessi, prius quàm eò cogitationes suas intēdissent, aut quidquam designassent. Adiicio & his nonnullos, dum iter hac facerent, conspecta magna parte imaginum ad vsum iam absolutarum, & expressarum, animaduersoque illarum ordine, positu, & collocatione, ac quibus Theophrasti, Dioscoridis, Cratenæ, Plinij, Apulei, nomenclaturis earum appellationes conuenirent, de hoc quod maximè cōtrouersum est, velut arbitros pronuntiasse, illis tacitis à quibus didicerūt: bello quidem astu,

ut est temporum nostrorum mos, aut, quod verius est, licentia, & prauitas, quam tamen auersatur purus & sincerus animus, si Plinio credimus, ingenuum esse profiteri per quos profecimus.

Erit autem fortassis, qui miretur, vel etiam reprehendat, quod post ultimum librorum, earum stirpium adnexa sit appendix, quarum in aliis historiae segmentis congruens sedes fuisset. Atqui nec inusitatum hoc est, nec inauditum: sed multorum exemplis hoc excusare licet. Ac sanè optima voluntas & perpetua mea, communicandi cum omnibus quidquid penes me fuerit, declarari non potuit manifestius. Continet enim appendix illa plantarum effigies aliquot, aduectarum è Syria, & Libano monti conterminis locis, quas suppressere & occultare, atque in alteram editionem polliceri potui, ut habendi legendique desiderium lectori vehemens excitaretur: sed non mihi visum est eum sic inescare, vanisque lactare promissis. Irritat famem qui panem frustulatim præbet. Satiùs ergo putaui, assuto hoc veluti panniculo, satisfacere lectori, nec eum suspensum tam inani & longa specula cruciare. Hoc enim qui faciunt, ineptè (ut reor) ac stultè illudunt aliis.

Quinetiam, postquam in lucē hoc opus nostrum prodierit, ita studiis illorum qui cognitionis plantarum sunt cupidi, consulere statui, ut iam nunc omnibus, in hac doctrina prouectis, & alioqui bene erga hominum genus animatis, denuntiem, quæcunq; obstinato labore suo & improbo fuerint consecuti, ea si mihi committere, ut excudantur, velint, id me alacriter suscepturum, & sanctissima fide, promptissimaque diligentia præstiturum: ac ne illa quidem in aliam editionem reseruaturum, sed in secundam appendicem (quæ seorsum vendi possit iis qui iam volumen istud emerint) coniecturum.

Ceterum dissimulare nolo, futurum fortasse ut errata compluscula in his libris deprehendantur: alia quidem haud ita magni faciunda, maioris alia momenti, quæ à comi & minime aspero lectore peto, vel clementer ignosci, vel mitiùs damnari. Homines sumus, ad errandum proni, ac sæpe in his quæ agimus, cæci, vel hebetes: & non ignorant quibus aliquando res fuit cum prælo typographorum, etiam obseruantissimis & cautissimis vix delicta hæc posse vitari. Tales cum simus, quod nostræ conditionis ac sortis est, lenius carpere & fastidire vnusquisque debet. Totis ego viribus & omni ope, operaque sum adnixus, ut admitterentur quàm paucissima, quibus esset danda venia, & selecta, quæ peccata sunt, ut offendi, sic indicaui: si quid me tamen effugit, humanitate atque

benignitate præditum lectorem obtestor, & obsecro, ut

(quod facile ab eo impetratum iri confido) rem tam

nihili prætereant, condonet, nec summo iure,

quod summa iniuria est, omnia

persequatur, & exigat.

Vale.

IN HANC GENERALEM STIRPIVM
HISTORIAM EPIGRAMMA
docti cuiusdam viri.

*Stirpifera historias natura vidit ut orbis,
Telluris stupuit omniparentis opes.
Historia magis attonitus reddetur ab ista:
Nam cumulis cumulos addidit ista novos.
Quanto imperfectis perfecta excellere constat,
Gratia tanto isti debita maior erit.*

A L I V D.

*Quid primum hic, Lector, vel quid mirabere summum?
An quod opum tam sit natura benigna suarum?
An quod terra eius tam promptè iussa capeßat?
Anue imitatricem natura suspicis artem,
Quæ pictrice manu nostros deducit in orbem,
Totum oculos, secreta illis & cuncta reuelat?
Anue obfirmatos potius mirere labores,
Circa opus exhaustos tantum, ferè tempore tanto
Quanto Mars Priami vexavit Pergama Graius?
Immo aliud longè est miratu dignius istis:
Terra salutiferas quòd quum tot germinet herbas,
Tot morbi nequeant ullam reperire salutem.*

Α Λ Λ Ο.

Παντοίοις κόσμησε φυτῶν διαδάλμασι γαίην
Πότνα φύσις, κρείοντι Θεῷ ἐπήρα φέρουσα.
Ἀλλ' ἄγνωτος ἔην τῶν δι' ἔργων διαδαλούντων
Πλείστη μῆρα βροτοῖς, καὶ ματ' ὠφεῖα περ ἔμωης.
Νυν ὃ καὶ ἄγνωτοις ἂ παροίθην ἐκδύθετο γαίης,
Ἡ' ὃ τεοῖς βίβλος φυτὰ πάγκαλα ὀμμασι δαίξει.
Ὅψ' ἐπολεῖς πολύμοχοι ἅπαν λυκάβαντες ἔτδξαν
Τόχος, ἐν ᾧ φύσιος νυν τοσάδε γάρματα δέρκεις.
Ὅς χάριν οὖν φύσιος τοσάτοις γάρμασιν ἔξει,
Θαυμαστῷ ἐχέτω καὶ τῶδε πόνημαί τετόχοις.



INDEX LIBRORVM HISTORIAE
GENERALIS PLANTARVM.



Lib. I.	De arboribus spontè in Syluis nascentibus.	fol. 1
Lib. II.	De fructicibus in Dumetis & Frutetis sponte nascētibus.	119
Lib. III.	De arboribus quæ in Viridariis & Pomariis coluntur.	285
	De segetibus & leguminibus, ac quæ cum iis in Agris na-	
Lib. IIII.	scuntur.	371
Lib. V.	De oleribus & herbis in Hortis nascentibus.	517
Lib. VI.	De plantis Umbelliferis.	688
Lib. VII.	De plantis flore placentibus.	791
Lib. VIII.	De plantis odoratis.	877
Lib. IX.	De plantis in Palustribus prouenientibus.	983
Lib. X.	De plantis in Asperis, Saxosis, Sabulosis & Apricis na-	
	scēntibus.	1097
Lib. XI.	De plantis in Umbrosis, Vdis, Vliginosis & Pinguibus locis	
	prouenientibus.	1208
Lib. XII.	De plantis ad Mare, & in ipso Mari nascentibus.	1359
Lib. XIII.	De plantis aliis innixis scandentibus.	1401
Lib. XIIII.	De Carduis & aliis spinosis aculeatisque plantis.	1435
Lib. XV.	De plantis Bulbosis, Carnosis radicibus, & geniculatis.	1491
Lib. XVI.	De plantis Catharticis.	1626
Lib. XVII.	De plantis Venenatis.	1707
Lib. XVIII.	De plantis Peregrinis.	1749



SVMMA PRIVILEGII

SIXTI PAPAE V.

AD FVTVRAM REI MEMORIAM. Cum, sicut dilectus filius Gulielmus Rouillius bibliopola Lugdunensis nobis exponi fecit, ille ad communem bonarum artium studiosorum, & aliorum comodum quoddam opus suum, *Historia generalis Plantarum in libros octodecim distributa*, nuncupatum maxima sua impensa, multorumque hominum peritorum industria, & longo labore compositum à Magistro sacri Palatii examinatum, & approbatum imprimere, & imprimi facere intendat, dubitétque ne similiter ab aliis illud idem opus postea sine eius licentia imprimatur, quod in maximum ipsius Gulielmi præiudicium tenderet. Nos propterea eius indemnitati consulere volentes, ipsúmque à quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium duntaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, eius supplicationibus inclinati, eidem Gulielmo ne prædictum opus per annos decem ab anno primæ dicti operis impressionis, à quoquam sine eiusdem Gulielmi, vel eius hæredis, seu ius ab eis aliter habentis licentia imprimi, aut ab aliis vendi, seu in eorum apothecis, aut alias venale, præterquam ab illo cui dictus Gulielmus, vel vt supra opus huiusmodi imprimendum commiserit, & licentiam dederit, teneri, aut haberi possit, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus & indulgemus inhibentes omnibus, & singulis Christi fidelibus præsertim bibliopolis, & librorum impressoribus in terris sanctæ Romanæ Ecclesiæ mediatè, vel immediatè subiectis, sub excommunicationis latæ sententiæ, ac etiam trecentorum ducatorum auri de camera pro vna cameræ Apostolicæ, pro alia accusatori, ac pro tertia partibus prædicto Gulielmo, vel hæredi eius irremissibiliter applicandorum, & amissionis librorum pœnis toties ipso facto, & absque alia declaratione incurrendis quoties contrauentum fuerit, ne intra dictum tempus decem annorum, vt supra, dictum opus sine eiusdem Gulielmi, vel hæredis prædicti licentia imprimere aut alias tenere audeant. Mandantes propterea vniuersis venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, Episcopis, eorumque Vicariis in spiritualibus generalibus, & in statu Romanæ ecclesiæ Legatis, Vicelegatis, & Gubernatoribus, vt quoties pro dicti Gulielmi, vel hæredis parte fuerint requisiti, vel eorum aliquis fuerit requisitus, eidem Gulielmo vel hæredi suo prædicto efficacis defensionis præsidio assistentes præmissa ad omnem illius vel hæredis sui requisitionem contra inobedientes & rebelles per censuras Ecclesiasticas, ac alia iuris remedia auctoritate Apostolica exequantur: inuocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis: & insuper quia difficile foret præsentibus ad quælibet loca deferri, Volumus & eadem auctoritate decernimus illarum transumptis vel exemplis in ipso opere impressis, plenam & à data præsentium eandem prorsus fidem vbique in iudicio, & extra adhiberi, quæ præsentibus originali adhiberetur. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris, die septima Maij. M. D. LXXXVI. Pontificatus nostri, Anno secundo.

THO. THOM. GVALTERVTIVS.

Summa Priuilegij Imperatorij.

MAXIMILIANI II. Romanorum Imperatoris semper Augusti publico edicto cautum est Gulielmo Rouillio ciui & typographo Lugdunensi, & sancitum, ne quis cuiuscunque status, gradus, ordinis & conditionis, siue sit chalcographus, vel bibliopola, siue alius quilibet, quacunq; sacri Romani Imperij & ditionis eius fines patent, hanc *Historiam generalem Plantarum, in libros octodecim digestam*, nisi ipsius Gulielmi Rouillij aut hæredum eius permissu, intra decennium eadem, aut alia minori forma excudat, aut excudenda curet, vendat ipse, aut cuiquam diuendenda mandet, aut denique excusa ab aliis intra eiusdem Maximiliani & Imperij fines vendenda importet, seu quouis modo distrahat manifestè vel occultè, vel quouis alio prætextu: alioqui sibi multam decem marcharum auri puri irrogatam sciat, quarum dimidia fisco Imperiali fraudis vindici, residua verò pars ipsi Gulielmo Rouillio, aut eius hæredibus, aut ab illis mandatum habentibus, cedit, præter librorum amissionem, quos per se idem Rouillius, vel per suos, vbicunq; locorum nactus fuerit, adiumento magistratus loci, vel citra, propria auctoritate sibi vindicare, inque suam potestatem redigere poterit. In cuius rei fidem ipsi edicto manu subscripsit, & sigillum apponi iussit Cæsarea Maiestas, vt latius patet in ipso diplomate dato Pragæ decimaquarta die mensis Iunij, anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimoquinto.

Subsign,

MAXIMILIANVS.

Ad mandatum sacræ Cæs. M. proprium.

A. Estenberger.

*Extraict du priuilege du Roy de France
& de Pologne.*

PAr grace & priuilege du Roy est permis à Guillaume Rouille marchand libraire de Lyon, d'imprimer ou faire imprimer, vne fois ou plusieurs ces presents Liures intitulez, *Historia generalis Plantarum, in libros octodecim digesta*: lesquels liures il a recouuré avec grâds frais, mises & despenses, tant sur les pourtraicts & tailles des figures, que pour le recouurement d'icelles: & pource est faicte defense de par ledict Seigneur à tous autres Marchands, Libraires, Imprimeurs & personnes quelconques, de non imprimer, vendre ni distribuer en ses pays, terres & seigneuries lesdicts liures, si ce n'est par le consentement dudit Rouille: & ce iusques au temps & terme de dix ans, à compter du iour & date que sera paracheuee la premiere impression: sur peine d'amende arbitraire, & de confiscation des liures qu'ils auroient imprimé. Et à fin qu'aucun ne puisse pretendre cause d'ignorance du present priuilege, ledict Seigneur veut & entend, que l'extraict d'iceluy estant mis au commencement dudit liure serue pour toute notification. Car tel est son plaisir, nonobstant oppositions & appellations quelconques, comme plus à plain est contenu & declairé par lesdictes lettres de priuilege, sur ce donnees à Lyon le vingt vniésme Ianuier, mil cinq cens septantè cinq, & de son Regne le premier.

Par le Roy, à vostre relation,

Signé, MORE.

Et sceelé du grand seau en sire iaune à simple queuë.



HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER PRIMVS,



*Quo describuntur, atque pictæ ostenduntur, arbores sponte
in Syluis nascentes.*

QVERCUS CAP. I.



RISCI GRÆCI omne genus arboris *ἄρπυς* **Nomina**
appellatione intellexerunt, à verbo *ἄρπυω*, quod est,
erumpo, ac pullulo. Latini glandis nomine, omnem
fructum complexi sunt, vt Iabolenus ait, exemplo
Græci sermonis *τῆς ἄρπυς*, apud quos omnes arborū
species, *ἄρπυς*, appellantur, vt *παρὰ τῆς ἄρπυς* fiat
dictio *ἄρπυς*, quo verbo Caius omnem fructum
significari dixit. Quæ etiā glandis appellatione apud
scriptores intelliguntur, à Græcis *βαλάνη* vocantur.

Græcos, *ἄρπυς* vocabulo omne lignum significare scribit Hermol. vnde Geran-
dryon pro vetere & ambusta quaque arbore accipitur, quasi vetus ramale, vt loqui-
tur Persius. Sed tam latè patentes significationes in angustius sunt adductæ, vt *ἄρπυς*
arborem omnem glandiferam tantum significet, & præsertim quercum. Glādem
verò, vt ait Plinius, quæ propriè intelligitur, ferunt Robur, Quercus, Esculus,
Cerrus, Ilex, Suber. *ἄρπυς* propriè quæ in ambitu lignosum putamen habent.
Verum glandiferas arbores Plin. vna voce comprehendi posse negat Latino ser-
mone, quemadmodum Græco potest *τῆς ἄρπυς*, & antiqua voce Saronos, à quo
Saroniacus sinus, & Saro in Arcadia nemus trans Ladonem fluuium, & sinus Sa-
ronicus, olim querno robore redimitus, vnde nomen, ita Græcia antiqua appel-
lante quercum, quanquam Pausanias à Sarone qui post Altipum regnavit, sinum
eum dici velit. Quibusdam, vt Theodoro Gazæ, Roboris appellatione contineri
posse omnia genera videntur, non sine errore, cum Robur vna species sit dunta-
taxat ex multis, quæ *ἄρπυς* generi subiectæ sunt. Matthiolus etiam Dioscoridem
ἄρπυς nomine vniuersè quidem omnes glandiferas arbores comprehendisse exi-
stimavit, qua in significatione id nomen hîc à nobis vsurpatur. Latine verò Quer-
cus, modò pro genere, modò pro vnica eius specie, sic dicta, quòd id genus arboris
graue sit, ac durum, tum etiam in ingentem euadat amplitudinem. Querquerum
enim quidam graue ac magnum dici volunt. Ac primùm glandiferarum arborum,
maximè Quercuum genera, & historiam tum veteres, tum neoterici variè distin-
xerunt, atque descriperunt. Nam vt Theophr. ait, *τῆς ἄρπυς* genera constituunt
Idæi, Hemerida, Ægilopa, Platyphyllon, Phagum, Haliphlæon, siue Eutyphlæon:

In Coroll.
c. de Quer.
li. i. Diosc.

Lib. 16.
ca. 6.

Plin. lib. 4.
cap. 5.

In cap. de
Querc. lib.
i. Diosc.

Genera.

Li. 3. Hist.
cap. 9.

Ibid. ca. 10. Macedones, Etymodryn, Platyphyllon, Phagon, Asprin, Haliphlēon. Genera Lib. 16. c. 5. glandium multa, inquit Plinius. Distant fructu, situ, sexu, sapore: Et, glandem, quæ propriè intelligitur, ferunt Robur, Quercus, Esculus, Cerrus, Ilex, Ibid. ca. 6. Suber. Hermol. roboris genera diuidit quadripartitò, in Quercum, Robur, Esculum, Cerrum, quæ Græcis illis respondent, Hemeridi, Ægilopi, Haliphlēo, Platyphyllò. Vt sit Quercus hemeris: platyphyllòs esculus: ægilops cerrus. Sed nunquid Haliphlēos, Robur significet, nondum, ait, compertum habeo. Alij aliter ista digesserunt, atque explicauerunt. Qua de re quamuis tanta sit inter doctos homines dissensio, vt de ea decidere difficile sit, tamen ex iudicio & sentētia Iacobi Dalechāpij Medici literatissimi, & in simplicium medicamentorū cognitione exercitatissimi, atque vsu peritissimi, primū de Quercus generibus, deinde de cæteris glandiferis arboribus dilucidè atque enucleatè dicam.

PLATYPHYLLOS Mas.

PLATYPHYLLOS fœmina.

Quercus
genus 1.



Li. 16. c. 6.

Nomina

Forma.

Quinque igitur sunt Quercus genera. Platyphyllòs, Hemeris, Phagus, Ægilops, Haliphlēos, quæ & Cerrus fœmina dicitur, & Farnia Italis. Differunt hæc folio, caudice, materia siue ligno, totaque ferè specie, præterea fructus sapore, magnitudine, figura, colore. Platyphyllòs Idæorum & Macedonum, quā latifoliam, verbū verbo exprimens Plin. interpretatur, Latinorum est Quercus, quæ pro specie sumitur. Gallorū *Chesne*, Italarū *Quercia*, Germanorū *Eichbaum*, Arbor est maximè omniū procera, si Ægilopē excipias, recto caudice, cortice inferna parte rimoso, scabroq; superiore læui cui subest albuurnū, quod cū animalis pingui cōparari potest, plurimis in orbem brachiata ramis, magnā innoxiamq; vinbrā loco inducētibus: folio grādi, Cerri & Haliphlēi folio latiore, carnosio, laterū anfractibus sinuosissimo in arbore vetusta, minus in ea quæ cæsa nouā frondem mittit, sed tū maximè lato, & spisso, summa parte obtuso, cū cadit nigrescēte potius quā flauescēte: glande mediocri, suibus grata, ob eam causam iis saginandis apta, cū à Phagi & Hemeridis glāde discefferis, dulci, non omnino quidem, sed si cū haliphlēi & ægilopis glande

GLANDES

PLATYPHYLLI

perfecta.

GLANDES

PLATYPHYLLI

imperfecta.



glande conferas. Minus enim acerba & amara gustui est, calyce nullis aculeis horrido, sed pustulata tantum scabritia asperato. In summo ramorum cacumine ferè glans nascitur, breuior, extrema parte veluti depressa, ac retusa, aculeo, qui in summo fastigio glandis eminet, breuiore, & minus pungente: sæpè ternæ glandes simul cohererent, aut binæ, rarò vnica prodit: pediculus eas sustinens, crassus & brevis, inde nascitur vbi ramo foliū adhæret. In vnus surculi capite plerunque videas hinc tres cōiunctas glandes, illinc duas, ac in proximo vnā solū, prout succus, earum alimentum, huc illuc sese magis spargit: radice longè latèque euagante: materia ad ædificia, dempta Haliphlēo, pessima, ad cremandum quoque & carbonem faciendum inutiles, sicut & Haliphlēi, ac post illam teredinibus carieique maximè obnoxia, vt scribit Theophr. Et paulo post. Materia Platyphylli improba: & dolata quidem omninò inutilis: rumpitur enim & labat: non dolata verò melior, & ob id ruduntaxat vtuntur. Improba etiam ad cremandum, & carbonem faciendum: nam omninò inutilis est eius carbo: exilit enim, & scintillat,

Li. 3. Hist. c. 9. & 10.

ærariorum tantum officinis compendio, quoniam desinente flatu protinus emoriens parum absumitur. Verum hunc Theophrasti locum aliter quam in excusis Græcis Latinisque codicibus & legimus, & interpretati sumus, quia deprauatum illic esse existimamus. Scribit enim Ægilopis glandem ἐσχάτον καὶ πικρότατον esse, id est, omnium pessimam, & amarissimam: ac paulò post Asprin fructum ferre adeo insuauem, vt eo nullum animal vescatur, demptasue, nec ea quidem, nisi alterius pabuli inopia: ex quibus efficitur eandem planè esse Idæorum Ægilopem, & Macedonum Asprin: sed quæ de Aspri sequuntur maximè repugnant: μοχθηρὰ ὅτι καὶ τὰ ξύλα, &c. Id est, materia autem improba, & dolata quidem, & cætera, quæ suprâ retulimus. Quæ enim Aspris tam improba materia, & ad cremandum, & ad carbonem faciendum tam inutiles esse possit, quæ rectissima, excelsissima, leuissima, & materiæ per longitudinem robustissima sit? eodem Theophrasti auctore. Quare proculdubio legendum, μοχθηρὰ ὅτι τῆς πλατυφύλλης καὶ τὰ ξύλα. Id est, materies Platyphylli improba, sicut iam conuertimus, id quod tum ipsiusmet Theophrasti, tum Plinij autoritate comprobamus. Nam Theophr. hîc ea repetit, quæ superiore capite de Platyphylli materia dixerat. Materia ad ædificia, dempta Haliphlēo, pessima, ad cremandum quoque, & carbonem faciendum inutiles, &c. Plin. verò quæ de Aspri hoc Theophr. loco perperam legebantur, ad Platyphyllon omnia refert. Ab hac proxima latifolia proceritas, sed minus utilis ædificiis, carbone dotata, vitiis obnoxia est: quam obrem solida vtuntur carbonarij, ærariorum tantum officinis compendio, quoniam desinente flatu protinus emoriens, sæpius recoquitur, cæterò plurimis scintillis. Idem è nouellis melior: id quod in Querno nostro carbone quotidie experimur. Nam qui ex trunci, aut crassiorum ramorum taleis fit (Gallis *charbon de quartier* dicitur) in igne crepitat, subsilit, non nisi continuo flatu acceditur, quo cessante, vel si non lignis facile flagrantibus assidue foueatur, conceptus ignis statim extin-

Lib. 3. Hist. cap. 10.

Lib. 3. Hist. cap. 9.

Li. 16. c. 6.

guitur : qui verò ex gracilioribus ramis fit (Galli *charbon de branche* nominant) vel ignem facilè concipit, vel exiguo raròque flatu accensum constantissimè alit, quousque in cinerem redigatur. Sed hîc obiter ex vtriusque authoris supra positis locis delendæ, quæ diu inhæserunt maculæ. Nam in Theophrast. pro Cap. 10. *οἱ ὃ περὶ μακεδονίαν τέτραρα γένη ποίῃσι*, lege *ἑντε γένη ποίῃσι*, vt quinque sint, vt Idæis, ita & Macedonibus Quercuum genera: totidem enim mox enumerat, Etymodryn, Esculum, Platyphyllon, Asprin, Haliphlæon. In Plinio, pro, sed minùs utilis ædificiis, atque carbone dotata vitiis obnoxia, repone, sed minùs utilis ædificiis atque carboni. Dolata vitiis obnoxia est. Sic enim Theophrast. ex quo hæc Plinius conuertit, *σελεκηθέντα μὲν ὅλως ἀχρεῖα*. Verùm ad Platyphylli historiam redeamus. Periti quidam herbarij Platyphyllon quam descripsimus, marem esse aiunt, fœminam verò genus alterum in saxosis & asperis locis ferè nascens, mare humilior, cortice in tenellis furculis rubescente, non vt in illo, albescente: folio minore, breuiore, angustiore, antrorsum magis acuminato, tam densis laciniis sinuoso lateribus, vt eminus crispum videatur, lætiùs & nitidiùs virente, glande pusilla, & strigosa. Talem profectò gignunt aprici lapidosique colles Allobrogum, aspectu nonnihil variam ob loci squallidi ariditatem. Cæterùm & in aliis quercetis fœmina quoque prouenit, folio quàm maris breuiore, antrorsum latiore, & magis obtuso, inferne pallido, cortice ramorum nigriore: glandibus minimis, in ramorum & furculorum vertice prodeuntibus, interdum senis, aut quinis, sæpè ternis, aut quaternis, rarò binis, rarissimè singularibus, quasi digito retusis, aculeo minimo, parùm è calyce prodeuntibus, sed ei firmiter adnexis. Platyphyllorum generi adscribenda etiam Quercus virens perpetuò, qualis in Thurino agro, vbi Sybaris olim fuit, ex vrbe prospiciebatur, nunquam folia dimittens, nec ante mediam æstatem germinans. In Apennino, & Andium Gallicæ gentis agro tales quædam visuntur, vt quod Plinio mirum sit, iam nos mirari desinamus. Id verò admiratione multò dignius, quod scribit

Plinius, probari Latifoliæ glandem, cuius in balano vtrinque ex longitudine extrema lapidescit duritia: meliorem cui in cortice quàm cui in corpore, vtrumque non nisi mari. Nam cum locum Theophrasti exprimere voluisse videatur, ab eius sensu alienissimus est. Neque enim id melioris glandis signum esse vult Theophrastus, neque id de Platyphylllo scribit, sed de Phago & Haliphlæo. Locus Theophrasti est huiusmodi: peculiare Phago & Haliphlæo, quod ambarum in maribus tantum, glandes parte extrema vtrinque lapides gignunt, aliàs in cortice, aliàs in corpore. Ideo detractis lapillis, cavitates perinde atque in animalibus relinquuntur. Platyphyllus in syluis nostris vasta gignitur. Alterum Quercus genus est Hemeris Idæorum, Macedonum Etymodrys, Latinorum Robur, Italorum *Rouere*, Allobrogum quorundam *Roure*. Robur, inquit Festus, in carcere locus is, quo præcipitur maleficorum genus, quod ante robusteis arcis includebatur. Hunc locum etiam robustum carcerem Plautus vocat. Robur apud Lucretium

H E M E R I S

Etymodris.

Lib. 3. Hist.
cap. 2.

Locus.

Quercus
genus 2.

Nomina

cretium legitur, pro Fuste ac ligno, quo fontes tundebantur, fustuario. Placidam interpretatur Gaza, Hemerin, audaciùs, more suo. Plinius Græco nomine, vtitur. Arbor est non læui, sed aspero rimosoque cortice, humilis, non excelsa, non recta, sed contorta, aliisque ramorum crebro cauata: materia firma duraque, sed minus, quàm Phagi: glande post Phagum dulcissima, sed longiore maioreque, imò omnium maxima, è suo calyce breuiore, ac depresso faciliè decidua, tenui, longoque pediculo, affixa, modò vnica, modò gemina dependente, quod illi ex omnibus Querc⁹ generibus peculiare est. Allobroges Rhodano vicini seruatis, Græcæ vocis vestigiis, Chermillat appellant, quasi Quercū Hemeridem: Sabaudi *Drylie*, nomine, ἀπὸ τῆς δρυὸς deriuato. Gignitur in arenoso, lapidoso, steriliq; & tenui solo. Tertium Quercus genus Phagus erit Græci ἀπὸ τῆς φαγῆν φαγὸν appellāt, Latini ab esca Esculum. De hac priusquam aliquid dicam, intelligant, velim, Lectores τὴν φαγὸν Theophrasti, nostram Fagū non esse, etsi id plurimi, atque etiā Plinius dictionū similitudine deceptus crediderint:

Forma.

Locus.

Quercus

genus. 3.

Phagus

Theophr.

diuersa à

phago nostra.

P H A G V S

Esculus mas.



P H A G V S

Esculus fœmina.



Nostram verò Fagum Theophrasti Ochyan esse. Est enim Phagus Theoph. Hemeridis modo breuis, in orbem comosa, non erecta. At Fagus nostra procera est, rectaque attollitur, abiectioni magnitudine non cedens. Præterea Theophrastus Phagum suam, glandem ferre perspicuè docet, cùm scribit in putamine glandium Phagi & Haliphloei, nonnunquam & in carne lapides gigni, quibus detractis cavitates relinquatur, quemadmodū in animalibus, quòd in vera glande licet intelligere, in nostræ Fagi fructu nequaquam, quæ non fert glandes, sed in echinis nucleos longiusculos, triangulos, acuminatos. Adde quod Macedones Phago suæ, glandem rotundam assignant, quæ nostræ Fagi fructui prorsus non conuenit, siue calycem hispidum consideres, siue fructus inuolucrum, siue nucleum triangularem. Ad hæc Theoph. Oxia nomine, vt dixi, Fagū nostram tam graphicè depinxit, vt nullus sit, nisi planè vecors, qui id disiteri

Lib., H. G. cap. 10.

Nemina

possit. Quare Phagus Idæorum ac Macedonū ἀπὸ τοῦ φάγειν, dicta, quod fructus eius sit dulcis, ideoq; palato gratus, ac edulis, ceu castanea, cum cæterarū quercuum fructus suis tantū sapiat. Brevis est arbor, in orbē comosa hemeridis modo, non erecta, minùs tamē quā hemeris cōtorta, caudice crassissimo: folio quā Hemeris, angustiore, & breuiore, obscuriùs virēte, inferne cādicante, glāde dulcissima, terete, longa, quā Etymodryos breuiore, è breui crassoque pediculo subrecta, calici, multum eius cōplectēti, tenacius hārēte, in ramorum furculis, ad exortum singulorum propemodum foliorum vnica, rarò gemina, gracilior quàm in latifolia, & magis acuminata, aculeo suo magis pungente. Reperitur & in hoc genere arbor, quæ glandem fert superiori omnino figura similem, sed crassiorē, altiorē, pleniorē, ob molis suæ pondus, è calyce facile deciduam. Lignatores huius speciei marē esse volūt, alterum fœminā. Hac glande, vel sub prunis cocta, vel in aqua elixa: cū vescuntur rustici, grauitate capitis tentantur, & veluti inebriantur, non aliter quàm qui lolium pani commixtum ederint. Præterea phagus materia est robustissima, & putredini minimè obnoxia, id quod de quercu dixit Plinius. Fortius lignum, inquit, Quercus habet, & incorruptius, cum id de phago peculiariter scripserit Theoph. Si Virgilio credimus, inquit Plin. quantum corpore eminet, tantum radice descēdit. Hanc Esculum Latini vocant, ab esu, Seruio auctore, vel ab esca, Hetrusci Ischia, voce ab Esculo deprauata, Romani etiā nunc rustici Esculo, Hispani arborem quidē Enzinam, glandes verò *Vellotas*, quas ob suauitatem sub cineribus tostas secundis mensis apponunt. Vt non vbique in Italia prouenit, sic nec in Gallia. Frequentem tamen in Apulia esse declarat Horatius his versibus,

Lib. 6. c. 6.

Lib. 3. Hist. cap. 9.

Lib. 16. c. 31.

Nomina

Locus.

*Quale portentum neque militaris**Daunia in latis alit Esculetis, &c.*

In eo Allobrogum tractu quem Rhodanus alluit, ad pagum Amblerieu nominatum, & lapicidinarum, quæ illic sunt, antra, gignitur Esculus, parua quercus ab incolis appellata, nimirum ex collatione cum Etymodry, siue Robore,

C E R R V S.

Quercus
gen. 4.
Nomina
Forma.



Lib. 3. Hist. cap. 10.
Lib. 6. ca. 6.

cuius illic copia est, & Quercus magna dicitur, cum cæteri Allobroges seruatis Latinæ appellationis vestigiis *Roure* nomenclent. Quartum genus Ægilops Idæorū, Aspris Macedonum, Latinorum Cerrus, Italicorum Cerro, Gallis ignota arbor, cui eam ob causam nullum ab eis nomen positum est, ac ne Italiæ quidē magna ex parte nota, vt ait Plinius. In summam altitudinē crescit, in Græciæ ac Hetruriæ syluis, incultis amica, rectissima, leuissima, & materia per longitudinem robustissima, ad sustinenda suspendendaq; ædificia firmissima. Folio est crasso, amplis incisuris laciniato. Sterilis non est, vt quidam putauerunt, sed est glande tristi, horrida, rotunda, ac velut obtusa, amarissima, adeoq; insuauis, vt præter sues, nullum attingat animal, ac ne ex quidem, si aliud pabulum habeant. Ea caput mandentium dolore afficit, auctore Theophr. quod tamen de Haliphloei glande perperam scripsit Plin. Calyx glandis eam fere totam complexus, rigidis, latis, in cinereo candicantibus aculeis echinatus, valla

GLANS CERRI



vallatúsque est, non, vt Plin, ait, ceu Castaneæ : sunt enim hi crassiores & rigidiores multò Glandes cerreas calycibus suis contectas ex Cypro, Chio, aliisque Cerrorū fertilibus locis, negotiatores interdum conuehant, Gallones alij vocant, alij Vallonia. Vfus earum est ad inficiendos atro colore pannos, gallarum vice. Sed ex illis tinctura dilutior, fugacior, viliorq; est. Quintū genus est Haliphlēos Idæorum, & Macedonum, Cerrus fœmina quorundam, Ibidem.

Italorum Farnia, Gallis incognita. Latino nomine caret. quare Plinius Græcum semper vsurpauit, quem imitari debuerat Gaza potius, quam ineptè Salsicorticis nomen finxisse, perinde quasi, ἐκ τῆς ἀλός, καὶ τῆς φλοιῆς compositum sit nomen : quin potius ἐξ ἀλός καὶ τῆς φλοιῆς dicta est hæc quercus species, ob corticis crassitudinem, Plinio teste. Pessima, inquit, & carboni & materiæ Haliphlēos dicta, cui crassissimus cortex, atque caudex, & plerūq; cauus, fungosusque : quæ cum proculdubio ex Theophr. sint expressa, apertè ostendunt locum hunc in Theophr. exemplaribus mancum esse, atque sic corrigendum. Quercus gen. s. Nomina

ἡ δὲ ἀλὶφλοιὸς παχύρετον μὲν ἔχει τὸν φλοιὸν καὶ τὸ τέλεχος, χαλκόνον δὲ καὶ κοῖλον, cum in excusis legatur, ἡ δὲ ἀλὶφλοιὸς παχύ μὲν ἔχει τὸ τέλεχος, χαλκόνον δὲ καὶ κοῖλον. Quare multò magis mihi hæc probanda videtur etymologia, quàm illa quā securus Gaza Salsicorticē dixit, quasi verò falsus sit Haliphlēi cortex. Nasceitur in Hetru- Ibidem.

riæ syluis, præsertim maritimis, inter Cerros, & Phellodryas, materia & ædificiis & carboni pessima, quoniā cū cauo fungosoq; sit caudice, breui putrescit. In causâ est arboris horridæ, subrectis que foliis, eamq; ob causam imbrem excipientis natura, qui guttatim in laxum fungosumq; caudicem stillans, illū vitiât, & putrefacit. Sunt qui & corde hanc solam carere volunt : quin & fulmine sæpissimè icitur, quamuis altitudine non excellat : ideo ligno eius nec ad sacrificia vti apud Æolum quosdam fas habebatur : ad axes similiâque tantum vtile Lib. 3. Hist. cap. 9.

HALIPHLOEOS


Cerrus fœmina.



illud erat. Caudice assurgit procero, & recto, cortice sub cœruleo, ramosa quidē, sed ramis latius non porrectis, nec extentis, vt quercus, imò breuibibus, nec ita in multos furculos diuisis, vt tota arbor aspectu tonsæ ac putatæ similis sit. Folia habet Cerro similia, longiora, angustiora, & multò nigriora, per latera incisuris minus latis sinuosa, interuallo quod iacet inter margines laciniarum minus patente, infernè superneq; subaspera, tactu duriora, hyeme decidua. Glandes profert aliis glandiferis minores, excepta ilice, non longas ac teretes, sed orbiculatas, & aliquantum cōpressas, Cerri maris modo, ex calycibus suis parum exertas, qui spinis longis, flauis, gracilibus, densis hispidi sunt, castanearum instar, non tamen ita rigidis, erectis que, sed nec crassioribus spinarū mucronib⁹ armati, vt in Cerro. Caliculi hi qui bus continentur glandes, bini plerūmque ad singulos exortus, breuissimo pediculo ramis & furculis adherent. Radicibus nititur validis, non recta deorsum actis, sed vndique per trāuersum terrā in obliquū comprehendentibus. Quercus gen. s. Forma.

Cortex ligno propior cū in ramis, tūm in caudice & radice vehemēter astringit: *folia* remissiūs. *Glandium* calyces facultate cortici respondent. *Glandes* vehementiūs astringunt, & amaræ sunt: quare etiam à porcis negliguntur, nisi aliud desit pabulum. *Materia arbori* robusta & dura. *Nascitur* in montibus, loco frequentius pingui, quàm macilento & arenoso, subtus tamen saxoso, locis liberis, & vento perflatis. Copiosissima in Apennino, in planis rara. *Bauhino* *Quercus* alia, quę *Haliphlœos* *Sequanorū* dici possit, nascitur in sylua parua, qua itur *Dola Vesonium*, prope pagum sancti Viti, folio *Hemeridi* simili, virente, non admodum sinuoso, vel crebris incisuris diuiso, glandibus amplis, tribus, quatuorue ferè simul iunctis, quæ sine pediculo furculis hærent, calyce valde hispido, *Haliphlœo* siue *farniæ* simili. *Quercus* genera sic distribuit *Dalechampi* ex ipsarum arborum natura, inspectione, *Theophrasti*q; *Historia* (nam de marinis *Quercubus Lusitanis* fabulatur *Porphyrius* Græca fide, quarū glandibus faginentur thynni, inquit *Scaliger*) distinctiūs quàm cæteri, atque adeo quàm *Plinius* ipse, quem cūm de his multa ab eodem *Theophrasto* mutuatum esse constet, tamen alia negligentius tractasse, alia confudisse, qui hunc cum illo diligenter conferet, facile iudicabit. Posset tamen his addi, vel ad aliquod superiorū generū referri, *Quercus peregrina*, siue *Mauritanica*. Est enim sub *Mauritanix* fluuius qui sese exonerat in *Atlanticum*. In ea terra *Quercus* grandissimam ferunt glandem, oblongam, sapore longè dulciore, atque delicatiorē quàm castanea. Robur, quę *Theophr.* *agriadrys* dicitur, ea *Plinio* esse videtur, quam *Gallicum* nunc vulgus *Chesne* vocat, inquit *Ruellius*, non sine errore, si hæc *Chesne* quercus sit: nam à robore *Plinius* glandis magnitudine discernit, quàm in *Quercu* grandissimam esse ait, in robore paruam. Quamquam *Plinius*, vt diximus, parum diligenter glandiferarum arborum discrimina obseruauit. Multi *Esculum*, Græcorum esse *Platyphyllon* existimāt. In qua est opinione *Bellonius*. In *Thraconitide*, inquit, prouenit *Esculus*, qui à Græcis antiquis vocabatur *Platyphyllus*, nunc *Velaguida*. Fert glandem magnitudine oui columbini, qua possent victitare homines tempore famis: ad gustum enim castaneæ accedit. At *Plinius* *Esculi* & *Platyphylli* tanquam diuersarum arborum eodem loco meminit. Præterea *Esculus*, vt inquit *Horatius*, rigida, nec excelsa est arbor. *Platyphyllus*, dempta ægilope, rectissima est, & excelsissima, atque ædificiis inutilis. His accedit glādis discrimen, quam in *Esculo* dulcissimā esse etymologia indicat, cum ab esu, vt diximus, nominetur. *Platyphylli* glandem non nisi tertium bonitatis locum tenere ex *Theoph.* diximus. Qui *Ægilopa*, id est, *Cerrū*, *Gallorū* extracta priore litera, aut in aspirationem conuersa, herrum aut hedrum esse putant, vehemēter errant. *Anguillara* glandiferarum arborum species omnes quas recēset *Theoph.* *Italix* notas esse ostendens, *Haliphloeon* *Italorum* *Rouere* esse scribit. Quod cum consentiente nominis affinitate omnes *Latinorum* Robur esse affirmēt, falli *Anguillaram* certum est. Robur enim *Plinius* ab *Haliphlœo* perspicuè distinguit. Robori, inquit, glans parua, qua fungosa fit caro. *Haliphlœo* rarò, & eum tulit, amara, quā præter fues nullum attingit animal, ac ne eæ quidem, si aliud pabulum habeant. Pessima & carboni, & materiæ *Haliphlœos*, cui crassissim⁹ cortex atque caudex, & plerūque cauus fungosusque. Nec alia putrescit ex hoc genere, etiam cum viuit. Robur firma duraque materia est. *Quercū* *Plutarchus* inter arbores syluestres, fructu pulcherrimam, atque fertilissimam esse ait: eo enim & feræ & alites pascuntur. Et *M. Cato* inter ea quæ ad bonum agrum spectant, syluam glandariā annumerat. Sed præter glandem plurima alia gignunt *Quercus*, auctore *Theophrasto*. *Gallam* duplicem, alteram candidam & exiguam, alterā nigram: interdum

ita



ita crescentem, vt mali compleat magnitudinem, *πιτώδη*, id est succo resinoso pinguem, quanquam alij *πιτοειδή* legant, id est atro colore picem æmulantem. Verum prior lectio, quam Gaza etiam secutus est, magis arridet, vt galla hæc Theophrasto & *πιτώδης*, & *μέλαινα* sit. Nam pilulæ lana farctæ modo (de qua mox dicetur) hanc in lucernis bene flagrare scribit, quod non nisi pinguis, resinosaque substantiæ beneficio efficeret. Ferunt & quædam veluti mora, sed dura, & fractu contumacia, idq; raro: quiddam etiam initio pudendi virilis effigie cum perficitur durum, Tauri caput imitans, cui fructus inest, nucleo oliuæ similis. Hæc duo postrema haud distincta in vulgaribus Plinij codicibus mendose leguntur. Quare sic emendato. Namque fert & gallæ utrumque genus, & quædam veluti mora, ni distarent arida duritie, & quædam plerumque Tauri caput imitantia, &c. Nascuntur & in Quercubus pilulæ duro putamine contentæ, intus habentes floccos molles, lucernarum luminibus aptos. Etenim probè flagrant, sicuti galla nigra: & sine oleo addit Plinius, id quod Theophrastus non habet. Absurdum sanè videtur, quicquam sine oleo, aut pingui aliquo in lucernis ardere. Item pilulæ quædam cum capillo, inutiles, verno tamen tempore mellei succi. Aliæ præterea interius ad alarum pronos recessus, sine pediculo, intus cauæ, versicolores, eminentibus vmbilicis candicantibus, aliquândo maculosis, interdum nigris: media cocci colore splendent: apertis nigra & putris inanitas est. Qua oratione nos locum Theophrast. ex quo hæc expressimus, & correxisse, & illustrasse arbitramur. Habēt enim nostra exemplaria, *φύει δ' ἐντε εἰώοντος τῶν ῥοπῶν μασχάλιδας ἕτερον σφαιρίον ἄμισχον, καὶ κοιλόμισχον*, &c. Nos verò legimus, *φύει δ' ἐδοθεν τῆς ῥοπῆς μασχάλων, ἕτερον σφαιρίον ἄμισχον, καὶ κοιλόμισχον*. Gaza verò: *φύει δ' ἐν κλάδων μασχάλας*, &c. Sic enim conuertit. Inque ramorum alis pilulā aliam gignit, sine pediculo, *καὶ κοιλόμισχον* concauōque sessilem, non sine repugnantia, quoniam si pilulæ istæ pediculo carent, & vt ait Plinius corpore non pediculo, adhærent, qui concauo pediculo sessiles esse possunt? Deinde: *Τὴς μὲν καὶ ἐπα- νεστηκώτας ὀμφαλὸς, ἐπιλωκὸς, ἢ ἐπεστιγμένους ἔχει μέλανας*. Gaza interpretatur. Nam

3. Morio.
4. Veretrum.

5. Pilula lanata.

6. Pilula capillata.
7. Pillula sessiles.

Li. 16. c. 7.

eminen

- eminentes quosdam umbilicos candicantes, vel passim variantes nigris maculis habent. Nos particulam disiunctiuam addidimus, ἢ ἐπεστυγμένους ἔχει, ἢ μελάνους. Quam coloris umbilicorum varietatem ne Plinius quidem ipse satis expressisse videtur. Candicantes umbilicos, ait, cætera nigra varietate dispersa. Nec illud postremum: ἀνογρόμυθον δὲ ἐστὶ μέλαν, καὶ ἐπὶ ὧσιν. Apertis amara inanitas est, pro, apertis nigra & putris inanitas est, vt conuertimus. Gignunt & Quercus, quanquam rarò, pumiceos lapillos, non autem puniceos, vt in excusis Latinis Theophrasti codicibus legitur: his rariùs è foliis conuolutas pilulas compactas, atque oblongas. Ad hæc in foliorum tergo, non, vt Plinius scribit, in folio rubente, pilulas, non, vt idem ait, nucleos, candicantes, translucidas, aquosas, quamdiu molles sunt, in quibus & culices nascuntur. Maturescentes in modum parua & læuis gallæ durescunt. Ferunt Quercus & Cachryn. Est autem Cachrys globosus foliorum conceptus, inter præcedentem exortum siue articulum, & nouellam germinationem medius. Sunt enim hæc verba Theophr. Εἰς δὲ ὥσπερ κύησις φυλλικῆς μεταξὺ κύωνος τῆς ἐξοχῆς ἐπιφύσεως, ὥσπερ τῆς φυλλικῆς βλαστῆσεως ἐξωδινύιας: ad verbum: Est autem veluti foliorum conceptus, sese proferens, in medio adnascens eminentisq; tuberculi, foliorum germine tanquam parturiente. Gaza tamen legit ἐπιδήσις, & sic interpretatur. Fit veluti foliorum conceptus inter antecedentem obstrusionē, & sequentem exortū medius, vt sit, ἢ ἐξ ἀρχῆς ἐπιδήσις, antecedens obstrusio, vt loquitur, siue prior articulus colligans. ἢ ἐξ ἀρχῆς ἐπιδύσις, præcedens exortus, siue articulus. Significat & Cachrys libanotidis frugiferæ semē acre, quod in mandendo linguam exurit, de quo vide Dioscor. Qua homonymia deceptus Plinius Cachryn Quercuum, & Cachryn libanotidis, res valde diuersas, pro eadem re vsurpat. Ferunt, inquit, robora & Cachryn: ita vocatur pilula, in medicina vrendi vim habens. Verū tamen apud plerosque non Cachrys, sed Canchrys pro libanotidis semine scriptum reperitur. Quod verò eodem Plinij loco continenter legitur, valdè deprauatum est, & mancum, quo Cachryj tribuuntur, quæ de iulo auellanæ nucis Theophrastus, à quo hæc mutuatus est Plinius, apertè scripsit. Ex quo sic locus restitui potest. Gignitur Cachrys & in Abiete, Larice, Picea, Tilia, Nuce, Platano, postquam folia cecidē, hyeme durans. Nuci auellanæ postquam fructus decidit, iulus emergit, nuci pineæ nouellæ similis: is crescit hyeme, aperitur vere callus totus. Cadit cum folia cœperint crescere. E glâdiferis sola quæ vocatur Ægilops, inquit Plin. fert panos arentes, muscoso villosos, non in cortice modò, verū & è ramis dependētes (è cortice, non è furculo ait Theophr.) cubitali magnitudine, odoratos, vt diximus inter vnguenta. Quæ cū ex Theophr. sumpta sint, nos admonent, vt hunc ipsius locum maculis aliquot aspersum purgemus. δὲ καλῶς ἴτινες φάσκον, ὁμοίως τοῖς βράγχιαις, ἢ ἀγίλοις μόνῃ φέρει, πάλιον, καὶ βράγχιον & c. Gaza sic. Quod autem quidā penē appellant brachiis simile Cerrus sola producit, canū, mucosumq; . At non φάσκον, sed σφάγγον lego, auctore Plin. Sphagnos infra eos situs in Cyrenaica prouincia maximè probatur. Alij Bryō vocāt. Secundū locū obtinet Cyprius, tertiū Phœnicus. Fertur & in Ægypto nasci: quin & in Gallia, nec dubitauerim. Sunt enim hoc nomine canī arborum villi, quales in Quercu maximè videmus, sed odore præstātes, & c. Et alibi: Sphagnos, siue Spacos, siue Bryon, & in Gallia, vt indicauimus, nascitur, & c. Sūt qui Splachnō, & Hypnon appellāt, Arabes, *Ufneam*, quanquā Phauorimus φάσκον, δὲ ἐπὶ τῶν δρυῶν γινόμενον, exponit. Pro βράγχιαις repono βρύοις, id est musco ex Plinio, pro πάλιον & βράγχιον, πάλιον καὶ βρυῶδες, id est, canū, & muscosum, siue ρακῶδες, id est, lacero pāno simile. Mox enim muscū hunc villosū longo linteī frusto cōparat. Tam multiferæ sunt & tot res præter glandem pariunt Quercus: sed & boletos, qui è radicibus, & circa radices gignuntur. Ferunt & viscum, & mella, apēsque, vt auctor est Hesiodus: constat

Constatque rores melleos, è cælo cadentes, non aliis magis insidere frondibus. Quin & ex cremata quercu nitrum fieri aiunt, vt Theophrastus scribit, Lib. 16. c. 8. quod Plinius aliter, eumque secutus Gaza, exposuerunt. Cremati quoque roboris, inquiunt, cinerem nitrosum esse certum est. Nascitur etiam in Quercuum caudicibus Polypodium, item Agaricum. Sed horum quædam Quercuum propria sunt, quædam illis cum aliis communia. Ac de galla quidem, visco, fungis, melle, bryo, agarico, polypodio quercinis, idoneis locis dicitur. Per insitionem Quercus bona pira ferre visa est, ait Ruellius. Nascitur quoque in Lib. 1. c. 22. Ciliciæ Quercubus coccum cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, inquit Dioscorides. Quem locum corruptum esse Lib. 4. c. 43 putat Marcellus, & pro τῶς τρυμνῶς, id est, ore, aliter legi potuisse, pertinereque ad tempus quo coccus legendus sit. (Sic Marcellus.) Quidam legunt τῶς τρέμνῶς, quod illius regionis mulieres distortum Cuel, distorquentes legunt. De Dryino qui in Quercuum radicibus viuit, vnde illi nomen, tam malefica bestiola, vt eius qui supergreditur imprudens, cutis à pedibus excorietur, tota crura admodum intumescant, vide Nicandrum in Theriacis, Dioscoridem & Galenum. Li. 6. c. 49. Vermes etiam qui Raucae vocantur, in radice Quercus viuunt. In esculo vermiculi nascentes, priuatim Galbæ nominantur. Quercus diutissime viuit, & Li. de The. longa, crassaque est radice, etiam si scribat Theophrastus, τῶν μακρορρίζων καὶ ad Piso. παχυρρίζων nullam longioris esse vitæ. Plus æquo, & odiose sanè, inquit Scalig. Pli. lib. 17. Cæteri enim auctores in iis numerant arboribus, quarum immensa penè vita est. cap. 18. Iuxta urbem Ilium Quercus in Ili tumulo tunc fata dicuntur, cum cœpit Ilium Rue. lib. 1. vocari. In Ponto circa Heracleam aræ sunt Iouis Stragij cognomine, ibiq; Quercus cap. 76. duæ ab Hercule fata, ait Plinius: Vetusta penes Cephesum prospiciebatur Li. 2. Caus. Quercus, quam Alexandri Quercum vocarunt, quod ibi castra posuisse crede- cap. 16. batur Plutarchus: Nonne & vetustissimæ Quercus Dodonæ, à quibus oracula In Comm. petebat stulta, & superstitiosa antiquitas? Nec solum æternæ propè vitæ sunt ca. eiusd. Quercus, sed & ex earum (quæ paucae sunt) lectissima in natura classe, quæ vtrum- Lib. 16. ca. que beneficium sunt consecutæ, & sibi viuendi, & posteritati, vt & vitam suam 44 robore, & speciem propagent generatione. Quare tanto admirabilior est natura, quod in senecta sunt fecundiores. Sunt Quercus miræ magnitudinis, & amplitudinis in Septentrionali plaga Hercyniæ syluæ, roborum vastitas intacta ævis & congenita mundo, propè immortalis sorte miracula excedit, inquit, Plinius. Sunt in Petrocoriis nemora Quercuum proceritate visenda: non enim Lib. 6. ca. 2. superantur ictu Scorpionis. Est in sylua *Tronsac* nuncupata, prope Bituriges incredibili ferè proceritate, ac crassitudine Quercus, quam admiratus inuictissimus, & doctissimus Gallorum Rex Franciscus, aggere pedamentis munito cingi voluit, vt post venationes sub ea oblectaretur. De Quercu quæ est Basileæ in D. Petri nemore, cuius truncum trini viri diductis manibus vix amplectuntur, vide Cardanum. Lib. 6. De Fuit Quercubus maximus apud antiquos honor. Hinc ciuicæ Varie. c. 23. coronæ, militum virtutis insigne clarissimum, cum antiquitus nulla nisi Deo daretur. Hæ Ioui sacræ erant. Ex his deorum simulachra fiebant. His sacrificabāt. Ab his oracula petebant. In Armoricis, siue in minore Britannia erant porticum vice ante nobilium ædes, in ordinem dispositæ Quercus, quæ annosæ, non solum præclari generis vetustatem, sed & sanctitatem significabant. Quod si quis turpe aliquod facinus perpetrasset, non solum supplicio afficiebatur, sed etiam, quæ summa infamia erat, domesticæ Quercus amputabantur. Plura alia de Quercu adscribi possent, quibus pleni sunt veterum auctorum libri. Sed ad huius operis institutum nihil pertinent. Passim in syluis, aliisque locis nascitur Quercus, arenosis, macilentis, ac siccis gaudet. Hemeris in sterili tenuique solo.

Locus.

Fuch. c. 84.

Dodo. lib.

6. cap. 68.

Tempus. solo, lapidoso, scilicet, arenosoque provenit. Phagus in sabuloso macroque. **Li. 16. ca. 18.** Montes ac valles diligit Robur, inquit, Plin. Quercus verè germinat, sed tardius **Fuch. ibid.** multis aliis arboribus. Eam tamen inter eas numerat Theoph. quæ maturè germi- **Li. 3. Hist.** nant. Nova folia producit mense Maio. Glandes maturæ sunt Augusto. Gallæ pro- **cap. 6.** ueniunt æstate, Septembri decidere incipiunt. Theoph. Quercus seriùs fructificat, **Dodo. ibi.** scilicet circa Vergiliarum occasum. Desiccatur & astringit: excalfacit autem paulo **Ibidem.** infra media, in genere scilicet eorum quæ tepida sunt: folia, cortex, & calyces glandium sicci sunt ad tertium vsque gradum, & adstringentes: eiusdem etiam temperamenti sunt glandes, nisi quod calidiores, & minùs adstringentes. Glans, auctore **Temper.** Auicenna, frigida est, & sicca: frigida quidem in primo gradu, sicca in secundo. **& vires.** Quercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber qui cortici, & ligno intercedit. Quin etiam tunica putamini Glandis subiecta. Decoctum ex iis datur dysentericis, cœliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pello fœminis fluxione vulvæ laborantibus subiicitur. Glandes eosdem effectus exhibent, urinam ciunt, capitis dolorem, & flatus in cibum sumptæ, pariunt, resistunt esitatae venenatorum ictibus. Decoctum earum, & corticis, cum lacte vaccino, potum, prodest contra toxica. Intrita crudæ, inflammationes illitu leniunt: ad duritias quas Cacoëthes vocant, & malefica vlcera cum salsa axungia conueniunt. Hæc Dioscorides, Galenus **Li. 1. c. 121.** verò, Quercus partes omnes, inquit, astringentis facultatis participes sunt: sed plus **Lib. 6. sim.** tamen quæ in trunci cortice membrana subest, tum, quæ sub Glandis ipsius, non calyculo, ut Gerardus interpretes habet, sed putamine est, ea videlicet, quæ fructus carnem conuestit. Quamobrem ad profluuium muliebri, sanguinis expuitiones, ventrisque diuturnos fluxus commodam esse credunt. Maximè verò ea vtuntur decocta: ego quandoque glutinasse me vulnus memini, securi inflicto, cum nulum adesset ad manum medicamentum præter ipsius Quercus folia. Terebam ea in læui saxo, & vulnus, omnemque vicinum locum illinebā. Eandem cum foliis vim habet, & fructus Quercus, eoque medici nonnulli ad incipientes, & crescentes vtuntur phlegmonas. Hippocrates præfocationi vteri folia Quercus adhibet in suffitu. Idem βαλάνυς voce ἀντὶ δρυὸς vsus est, vbi inflammatis βαλάνυς φύλλα, id est, Quercus folia imponenda præscribit. Glandium esum ciere urinam etiam vulgo notum est, quod assiccatas illas in vsum asseruat, si quis urinæ difficultate tentetur, vsurpandas.

Libro de
morb. mul.
Lib. de aff.
Cor. Emb.
118. libr. 1.
Dioscori.
Corn. ibi.

In cap. 121.
Li. 1. Diosc.

MATTHIOLVS. Stillatitia aqua, quæ in balnei calentis aquæ vitreo organo, à tenellis Quercus foliis, primo ipsarum exortu decerptis elicitor, iocinoris inflammationes sistit, renum calculos comminuit, & mulierum alba profluvia cohibet. Datur quoque potanda vtiliter, dysentericis, & sanguinem reiicientibus. Sunt qui in febribus pestilentialibus eam propinant, quòd aduersus venena non parum valeat. Recentia folia ventriculi ardorem tollunt, si super lingua teneantur. Cæterum aqua quæ in marcescentium Quercuum reperitur cavitatibus, scabiem omnem vlcerosam sanat. Ad hæc, eius echinata pilulæ, sicca ac trita vim apprimè adstrictoriam possidet. Quapropter efficacissimo sunt remedio contra omnes alui fluxiones. In summa præstant, vbi suppressere sit opus. His in Historia Germanica addit. Medius arboris cortex, & tunica interior Glandis, si in aceto, & aqua decoquantur, & igni sacro imponantur, calorem extinguunt: folia Quercina, feruidis pustulis adhibita, calorem leniunt, & eas sanant. Mulieres quæ urinæ difficultate torquentur, carbones Quercinos candentes vino aspergant, vaporèmq; per infundibulum in vterum recipiant. In fluore muliebri foliis Quercinis in aqua decoctis locos foueto. Ad idem valent, & Quernæ glandes.

Lib. 3. c. 70.

HIERONYMVS TRAGVS. Aqua è tenera ac recens prorumpente Quercus fronde, aut immaturis glandibus destillata, quasuis alui, & vulvæ fluxiones inhibet

bet efficaciter, neque non Gonorrhœam. Datur & sanguinem excreantibus, & iis qui à venenatis animantibus, aut serpentibus morfi vel icti fuerint. Qui venenum hauserint, vel cantharidas, ita ut sanguinem meiant, quod ipsi aliquando vidimus, glandes in pulverem redactas bibant, ac sentient opem. Quidam glandes aridas aduersus calculum exhibent. Folia Quercus tenera & rubicunda in vino decocta, collutu & gargarissatu, dentium dolorem sedant, qui à frigidis fluxionibus ortus fuit, sed sapè hoc decocto calido os colluendum erit.

D O D O N. Cortex Quercus in pulverem tritus utilis est puerulis aduersus vermes. Calyculi glandium cum cortice Quercus vtiliter miscentur vnguentis, oleis, emplastris, quæ ad sanguinis, aliorumque humorum fluxum inhibendum valent. Democritus apud Apfyrum serpentes emori iniecta fronde Querna dicebat. Radix minutatim contrita, contra Hydri morsum prodest: eiusdem decoctum cum vaccino lacte potum, contra toxica valet, ac serpentium plagis illinitur. Carbunculum (quo morbo olim vno anno duo viri Consulares obierunt, ut scribit Plinius, Iulius Rufus, & Qu. Lecanius, Bassus) Querneus tritus carbo cum melle sanat, adeo in rebus quoque dam-
 natis (ut pulchrè ait Plinius) ac iam nullis, ut in hoc carbone, aliqua sunt re-
 media. Galenus ad ventriculi dolorem, carbonem Quercus in lacte extinguit, & ægroto dat potui. Mures rusticos, si Querneo cinere aditus eorum obtures, attactu frequenti scabies occupat, & perimit. Quercus & Olea tam pertinaci odio dissident, ut altera in alterius scrobe depacta moriatur. Quercus verò & iuxta nucem iuglandem. Glandibus quondam homines victitasse, frumenti usu nondum reperto, plurimis tum Poëtarum, tum Historicorum testimoniis satis constat, quæ hîc adscribere superuacaneum foret. Eum cibum Pelasgus primus Arcadas docuit, quo ita sunt delectati, etiam cum iam cerealibus fructibus reliqui Græci vescerentur, ut à Pythiæ oraculo, Lacedæmonios ne eos bello lacefferent monente, βαλανοφάγοι auctore Plutarcho, sint appellati. Hinc Quercus Ioui sacra erat (quanquam Poëtæ aliam eius rei causam reddiderint) & Iouis arbor dicebatur, quod glandibus mortales primum Iupiter aluerit, inopemque eorum vitam his sustentarit. Vnde adagium, πολλῶν πα-
 νηγύρεων διὸς βαλάνος ἐφαγεν, id est, multorum festorum Iouis, glandes comedit, de sene, & longo plurimarum rerum usu perito. Et illud, ἄλῃς δρυὸς, satis Quercus, de iis qui deterioribus relictis meliora persequuntur, quemadmodum illi qui glandes post inuentas fruges neglexerunt, cum satis diu cibum se petiisse à Quercubus dicerent. Usurpatum à Cicerone. Dignitatis ἄλῃς, tanquam δρυὸς. Dignitati satis consuluisti, nunc saluti consule. Idem significabat mos ille qui Athenis erat, ut in nuptiis puer quispiam vndique spinæ frondibus, & Quernis glandibus opertus coronatusque cunas panibus plenas gestaret, & ingrediens hæc proferret, ἐφυγον χακὸν, ὄρον ἄμεινον. id est, euasim mala, meliora sum nactus, quæ sponso sponsæque bene ominabantur, tanquam meliore fortuna vsuris: mala enim erant spinæ steriles, & glandes quibus victitabant antiqui, panes verò bona. Sed nec post inuentas segetes, glandibus uti omnes desierunt. Nam M. Varro referente A. Gellio in Satyra περὶ ἐδαισμάτων, inter exquisitos multarum gentium fructus glandem Ibericam posuit. Plinius scribit glandes opes fuisse sua quoque tempestate multarum gentium etiam pace gaudentium. Nunc & in inopia frugum, ait, glans arefacta molitur in farinam, spissaturque in panis usum: quin & hodie per Hispanias secundis mensis glans inferitur. Dulcior eadem in cinere tosta. Lusitani, ut scribit Strabo, qui in montibus habitant, duabus anni partibus Querna victitant glande, quam

Li. 6. c. 68.

Li. 26. c. 1.

Li. 36. c. 27.
Lib. de Pa-
rat. facil.Rue. lib. 2.
cap. 45.
Plin. li. 24.
cap. 1.Pausa. in
Arcad.
Gal. lib. 2.
Alim.
Plutarch.Lib. 2. ad
Att.M. Varro.
Lib. 16. c. 5.

Clemens. Li. 2. Alim. cùm deficcauerint molunt, & in panis vsum recondunt. Allobij ex Sarmatis populi, auctore in Stromatis Clemente, glandibus, & arborum baccis vescuntur. In frugum penuria, glandibus Pergamenos suos vfos fuisse, testatur Galenus, variè ipsas ad esum comparantes. Interdum enim in aqua elixabant, & post calidis cineribus contegentes mediocriter assabant: nonnunquam comminuentes, pultarium ex ipsis conficiebant, aliàs aqua sola conspergentes, sed condimentum aliquod immittentes, aliàs mel effundentes aut lacti incoquentes. Eæ autem copiosum corpori suppeditant nutrimentum, & æquè nutriunt ac frumentaceorum eduliorum pleræque, sed tardè permeant, crassique sunt succi, ex quibus efficitur, vt concoctu sint difficiles. Idem omnino Ætius commemorat. Symeon Sethi, Glandes difficilis esse coctionis, tradit, valdè nutrire, tardè descendere, crudosque humores generare. Propterea illarum vsum vitari medici præcipiunt. Galenus inter cætera quæ in capitis dolore non solum ventriculi consensu orto, sed in omnibus capitis affectibus vitanda esse præcipit, etiam à Quercinis glandibus abstinere iubet. Idem etiam Pythagoras præcipiebat, auctore Æliano. Nunc verò Glans animalium tantum est esca, præsertim Suum. Hoc enim pecus diffusum & grauissimum facit, vt Varro scribit. Nam ea multæ in Gallia, & alibi gentes, magnos ac innumeros porcorum greges per sylvas glandarias saginant. Idem Cato post sementem legi præcipit, & in aquam cõici, vt inde Semodius, patrata sementi, verno modius bobus singulis detur. Glandes hyeme bobus Columella exhibet in pabulum, Quercus folia Æstate, & Autumno. Denique multas alias & magnas vtilitates Quercus affert. Vsum corticum coriarij, aliique opifices norunt, quanquam hodie Græci, & qui in Asia sunt, vt scribit Bellon. coria adornant calycibus glandium Esculi, vt in Gallia corticibus Quercus. Ligni verò vsum & vtilitatem, ait Tragus, nemo facile explicabit. Siquidem inter alia omnia, lignum nullum perennius, nullum etiam ad plura, hoc est ædificia, vtenilia, & instrumenta, tam ea quæ in terra, quàm quæ in aquis vsui esse possunt, adhibetur Querno. Hæc Tragus, quæ non de cuiusvis Quercus materia intelligenda sunt, vt ex Theophrasto supra declarauimus, & Plinio, qui Robur ex iis esse tradit quæ tardissimè cariem vetustatè que sentiunt: vere cæsum teredinem sentire: siccissimam loton esse, deinde Robur exalburnatum, cuius nigricat color: Robori tantam duritiam esse, vt terebrari nisi madefactum non possit, & ne sic quidem adactus auelli clauus: quædam in aliis diuturniora vsibus esse quàm alia: Vlmum in perflatu firmam, Robur defossam, & in aquis Quercum obrutam: Robur marina aqua corrumpi, Esculum humoris impatientem: Robur & Oleam incuruari, cederèque ponderi: arida latius quàm viridia ferris cedere, præter Robur, & Buxum, quæ pertinacius resistunt, ferrarumque dentes replent æqualitate inerti: qua de causa altera inclinatione egerunt scobem. Ex maturis glandibus, delibratis, modicè deficcatis, tufisq; oleum exprimitur lucernis aptum.

* *

GALLA

GALLA.

CAP. II.

QUANTUM quæ glandem ferunt, omnes & gallam Plinio auctore, tamen cum hæc Quercubus magis sit peculiaris, adeo ut Dioscor. Gallam Quercus fructum appellet, Quercuum historia explicata, de Galla ordine dicendum videtur. *κηκίς* ea Græcè dicitur, Latine & Italicè *Galla*, Arabicè *Haf*, aut *Hafus*, Germanicè *Galloepffel*, & *Eychoepffel*, Hispanicè *Abogalla*, Gallicè *Noix de Galle*. Una est Omphacitis nominata, parva quidem, articulorum manus modo rugosa (sic enim *κονδυλώδης* Matthiolus interpretatur, ut hac voce Gallæ Omphacitidis figura designetur, magnitudine prius expressa) solida, nullo foramine peruia: altera plana, levis, perforata. Eadem planè genera fecerunt Galenus, Paul. Ætius, nempe Gallam Omphacitidem, & alteram flavam, magnam, laxam, quæ superioribus cum de fructu *ωολυχαρπώϊα* ex Theophrast. differeremus, minimè repugnant. Nam Galla alba, parva, solida, eadem, ut & magna, perforata, nigra. Plinius. Pauciora Gallæ genera nos non facimus, cum esse dicimus solidam, perforatam, item albam, nigram: maiorem, minorem, quæ cum ita esse grauissimorum auctorum testimoniis satis sit probatum, Quercus rem hanc quotannis ostendant. Nam in Italia, præter glandes, duo Gallarum genera ferunt, inquit Matthiolus minores, quæ rugosa sunt cute, fullonibus & coriariis expetitæ, & quæ Græcis Omphacitides dicuntur: maiores, quæ leuiore sunt: tamen Cornarius Gallam Omphacitidem Dioscoridis & Galeni nihil aliud esse contendit, quàm calycem illū cui glandes inhaerent, qui vulgo cuppula glandium nominatur, vnico ad id credendum Pauli Ægin.

Lib.16.c.6

Li.1.c.123.

Nomina

Genera.

GALLA.



Lib.7. sim.

lib.7. lib.1.

Theophr.

Forma.

Li. 24. c.4.

li.1.Diosc.

cap.123.

Li.1.6. cōp.

p. & Emb.

120. lib.1.

Dioscori.

Lib.3.c.42.

Ibidem.

Lib.17.

Genera.

loco inductus, qui est huiusmodi: *ὀμφακίδος κεκαρυμμένης. ἔστι δὲ τὸ κοῖλον ἐξ ὃ ἐκπέφυκεν ἡ τῆς δρυὸς βάλανος, ὡπερ οἱ βυρσῆς χρῶν*). Id est, Omphacitidis vsta. Est autem cauum illud, ex quo glans Quercina enascitur, quo coriarij vtuntur: quo loco non *ὀμφακίδος*, sed *ὀμφακίτιδος* putat legendum, à qua opinione se nunquam decessurum ait, nisi quis corruptum hunc Pauli locum docuerit, aut *ὀμφακίδα* substantiuè, à Paulo pro calyce glandis dici ostendat. At Cornarium reprehendit Matthi. & iure quidem. Nam si Paul. inquit, non putasset *ὀμφακίδος* vocabulum, quod rarum esset, permultis fore obscurum, quemadmodum & Cornario fuisse videtur, ei certè opus non fuisset descriptione illud explicare. Quod præterea Paulus pro Omphacitide Galla glandium calycem non acceperit, hinc intelligere licet, quod alio in loco de Gallis, non de glandibus differens, duo Gallarum genera constituit, alteram Omphacitidem appellans, alteram, flavam, magnam, viribus inferiorem, Diosc. & Galen. auctores secutus, qui non aliter diuisere, nec vsquam Omphacitidem Gallam pro glandis calyce vsurpauere, utpote qui glandes & earum calyces à Gallis planè diuersas esse scirent. Præterea Dioscor. Galen. Paul. nusquam nomine *ὀμφακίτις* pro Galla vsi sunt, nisi ut adiectiuo iuncto cum substantiuo suo *κηκίς*. Quare in Paulo legendum arbitror *ὀμφακίδος*, non *ὀμφακίτι-*

Cornar. &
Andernac.

δλος, vt contendit Cornarius, glandiumq; calycem ὀμφακίδα à Græcis appellari, et si Cornarius, atque Andernacus, qui ὀμφακίδα vuam acerbam interpretatur, Græcæ linguæ peritissimi non ita senserint. Verùm Omphacitis immatura intelligi non potest, inquit Cornarius, quum vtraque suo tempore immatura sit. At cùm Diosc. & Galen. Omphacitim Gallam dicunt, hac voce immaturam non intelligunt, et si multi apud eosdem ita sint interpretati, sed quod τρυφὸν ἰκανῶς ἐστὶ φάρμακον, inquit

Lib. 7. f.

Galen. id est, quod admodum acerbum sit medicamentum, cùm altera Galla minùs acerbæ qualitatis sit particeps, quam à rusticis suis δινόκηκίδα appellari scripsit Galen. id est vinogallam, quod cùm vehementiore astrictione sit opus, vino incoquenda sit austeriusculo. Sunt tamen qui δινόκηκίδα magnam illam Gallam à Galen. appellatam velint, id est asininam Gallam. Quidam vinosam dictam putât, quoniam minus adstringens ad austeri vini lenitatem propius accedit. Galla Omphacitis Gale. sententia, ordine tertio desiccat, secundo refrigerat. Altera desiccat quidem, sed tanto minùs, quanto minùs acerbæ qualitatis est particeps. Galla

Ibidem.

Li. 2. c. 315.

Lib. 6. c. 68.

Auicennæ est frigida in primo gradu, sicca in secundo, Dodonæo frigida & sicca, ad tertium vsque gradum, & valde adstringens.

Li. 1. c. 123.

DIOSCORIDES. Galla Omphacitis eligi debet, quæ efficacior est. Vtriusque vis, vehementer adstringere. Tritæ excrescentia in carne, fluxiones gingiuarum & vuæ, atque oris exulcerationem prohibent. Nucleus dentium cauernis inditus dolorem sedat. Crematæ carbonibus, donec igne flagrent, & vino, aut aceto, aut acida muria extinctæ sanguinem supprimunt. Decoctum in sese efficax est, contra vuluarum prolapsus, & fluxiones. Capillos denigrant aceto, aut aqua maceratæ: dysentericis, celiacisque cum vino, aut aqua tritæ conuenienter illinuntur, aut bibuntur: obsoniis addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa his vtendum ad adstringenda, aut sistenda, aut siccanda quæ opus sunt. Hanc Ruellius versionem vno loco castigat And. Lacuna. Nucleus dentium cauernis inditus, dolorem sedat. Græcè legitur, inquit, ὅ ἡ μέσον αὐτῶν. hoc est, quod in medio ipsarum consistit. Quo loco Dioscorides Gallarum corculum, centrum, ac meditullium significat, non nucleum quo Gallæ omnes sunt destitutæ, quum per omnia vnam eandemque continuam substantiam fortiantur. Sed Ruellius, Plinium auctorem habet, qui de Gallis scribens, Nucleus, inquit, commanducatus dētium dolorem sedat. Et quid mirum nucleum Gallarum à Plinio dici, qui nucleum ferri pro chalybe dixerit.

Lib. 24. c. 4

Li. 34. c. 14.

Lib. 7. sim.

Galla Omphacitis Galeno desiccat, & repellit fluxiones: ad hæc constringit, contrahitque partes laxas, ac languidas, omnibusque fluxionum affectibus strenuè resistit. Altera autem Galla desiccat minùs. Cocta itaque per se, ac deinde trita, cataplasma est non instrenuum sedis phlegmonarum, ac proidentiarum. Porro coquenda est, si modica opus sit adstrictione, in aqua: si vehementiore, in vino, ac si augere insuper adstrictione sit opus, vino vtendum austeriusculo. Denique Gallæ combustæ sanguinem reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem & acrimoniam ex vstione assumunt, sũntque iis quæ ignem expertæ non fuerint, tum subtiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate. Cæterum cùm ad sanguinis suppressionem præparare eas voles, carbonibus impositas, dum vndeque candeant, aceto, aut vino extinguere oportebit.

In lib. 1.
Dioscori.
cap. 123.

Fit ex Omphacitide Galla, inquit Matthiolus, chalcantio, gummi, & vino atramentum scriptorium optimũ hoc modo. Sumito Gallarum crassiusculæ contusarum vncias quinque, chalcantii Romani vncias tres, gummi Arabici vncias duas,

duas, falis drachmam vnam: coniiciantur hæc omnia in fictile vitro circumlitum: superfundito vini albi, potentis, feruentisque libras quinque, & vncias quatuor: occluso vasis ore, quindecim dies insolato, vel post vaporarij fornacem hyeme reponito, miscetorque quotidie rudicula. Illud peculiare sibi maiores Gallæ vindicauere, vt quotannis aut annonæ fertilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem auram prænuntient. Nam si rumpantur integræ, quæ perforatæ non sunt, aut musca, aut araneus, aut vermiculus exit. Si musca euolat, futuri belli, si repat vermiculus, annonæ penuriæ, si currit araneus, pestilentium morborum prælagium est. Neque cuiquam mirum videatur, quod ex omnibus Gallis ista exoriantur animalcula. Etenim ego, inquit Matthiolus, huius rei sæpius periculum feci, nullamque vnquam sum consecutus, prius non perforatam, quæ ex tribus animalibus vnum intra se non contineret: foramine aperto, facile iudicari potest iam animal exiisse. Dicamus igitur licet, Quercum, & fructum, & animal gignere, cuius rei haud ignari veteres illi, non sine causa dixerunt Quercum Ioui summo esse dicatam. Gallam si in Quercu permanferit, putrescere Albertus magnus ait, atque in ea vermem procreari, qui si in Gallæ medio situs sit, futuram hyemem asperiolem prænuntiat, mitem verò si circa margines.

VISCVM.

CAP. III.



ISCVM multis adnascitur arboribus, tamen quia optimum, sed rarum in Quercubus prouenit, iis illud subiungere absurdum non fuerit. ὁ ἰξός, Viscum dicitur Aristoteli, vnde fluxit Latinis Viscum, ἰξία Theophrast. quod nomen ait esse commune, *Hyphear* verò Arcadibus, *Stelis* Euboicis, Arabibus *Debach*, & *Dabach*, & *Hele*, Gallis *Guy*, Italis *Vischio*, Hispanis *Liga mordago*, Germanis *Mistel*, & *Eichenmistel*, & *Vogellem*.

Nomina

Li.1. de Generat. ca.1.
Lib.3. Hist. ca.9. & 16.
& lib. 2. caus.

VISCVM.



Ion Poëta sudorem Quercus vocauit. Ex huius fructu quod fit glutinum, Latine idem cum planta nomen habet, quemadmodum Græcè vtrumque ἰξός nominatur. Præterea ne homonymia nos in errorem inducat, scire licet Chamæleonem album Ixiam aliquibus dici, quod nihil delendum. ἰξός, id est, Viscum circa radices eius inueniatur, vt ait Dioscorides, Plinio verò, Chamæleonis duo genera. Candidior, quem

Lib.3. ca.8.
Li.22. c.18.
Li.6. ca.21.

Genera

Ixia.

Emb.9. li. 3. Diosc.

Genera.

Li.16. c.44
Theophr. Lib.2. cau. cap.23.
Lib.3. Hist. Cap.16.

Ixiam vocant, &c. Ad hæc Ixias à Dioscor. in venenatis radicibus recensetur, quam Ixiam cum Plinius ab Ixo, id est, Visco nominatam videret, inquit Cornarius, vbique pro Ixia venenata radice Viscum reddidit, quod tamen cum homonymiis de Visco arboreo, & de glutino ad aucupia dicatur, vitio non caret, id quod etiam Leonicens observauit. Visci tria genera, Plinio: In Abiete ac Larice Stelin dicit Eubœa nasci, Hyphear Arcadia, Viscum autem in Quercu, Robore, &c. Theophrasto Ilex fert à Septentrione Viscum, à Meridie Hyphear, sed vna omnium natura, diuersæ habitudines, quia oriuntur in diuersis. Multò igitur plura constituenda essent genera, quia in multis aliis arboribus Viscum

nascitur. Adiciunt quidam & hoc discrimen, in iis quæ amittunt folia Viscum decidere, contrà inhærere semper, natum in æterna fronde: ab his enim alimentum perpetuò suppeditari, in illis Viscum quoque sentire alimenti dispendium.

In Comm.
cap. 23. lib.
2. caus.

Ibidem.

Forma.
Cap. 123.

Li. 16. c. 44.

Li. 1. c. 140.
cap. 123.

Locus.

Plin. li. 16.
cap. 44.

Theophr.
lib. 2. caus.

cap. 23.

Ibidem.

Scalig. ibi.

Dod. lib. 6.

cap. 69.

Lib. 3. c. 87.

Li. 2. Obs.

cap. 83.

Tempus.

Tēperam.

Lib. Tem-

peram.

Gal. lib. 6.

simp. lib. 2.

cap. 728.

Dod. lib. 6.

cap. 69.

Vires.

Dios. lib. 3.

cap. 87.

Lib. 6. sim.

In cap. 87.

lib. 3. Dios.

At nos, inquit Scaliger, in nostris malis hyemis sæuitia spoliatis videmus, Viscum ne vnum quidem amittere folium. Ratio est, tenacitas ipsius succi, quæ suo lentore sibi ipsa sufficit, quemadmodum animalibus, quæ sine cibo latent hyeme. Sic etiam ipsis in arboribus perpetuifoliis intelligendum. Prætereà Plinio mas est fertilis, scæmina sterilis. Viscum planta est fruticosa, surculis geniculatis, lentis, transuersis, sese implicantibus: intus porracei coloris, extra subflavi, inquit Fuchsius: (Idem Dioscorides, sed referre id videtur, ad glutinum, quod ex hac planta fit, non ad plantæ ipsius colorem, coloris semper viridis esse Plinius scribit :) grauis odoris: folio penè buxi, minore, longiore, crassiusculo, pingui, ex viridi nigricante. Altitudo eius vix excedit cubitum: sine flore esse scribunt Ruelius & Fuchsius, flores tamen profert exiguos, luteos, ex quibus baccæ parvæ, rotundæ, pallidæ, viscido humore plenæ, quarum singulis inest nigrum semē. Viscum in iis est quæ in terra gigni non possunt, sed in arboribus nascuntur, & cū sedem suam non habeant, in aliena viuunt, auctoribus Plinio, & Theophrasto, quod mirum certè videri debet, citra vllas radices passim in arborū caudicibus totum annum, adeoque brumali tempore, Viscum fronde virere noua, quod non sua seminat arbos, vt canit Maro. In Abiete ac Larice stelin dicit Eubœa nasci, Hyphear Arcadia, Viscum autem in Quercu, Robore, Illice, Pruno syluestri, Terebintho, nec aliis arboribus adnasci plerique. Copiosissimum in Quercu, quod *στυάς* Hyphear vocant. Nascitur & in Castanea, Malo, Pyro, Sorbo, Salice, Tilia, Betula, & aliis. Quin etiam, vt scripsit Dioscorides, inuenitur in quorundam fruticum radicibus. In Palestina Bellonius tradit esse oleas, quæ rubentibus baccis Viscum ferunt, eam ob causam sterilescientes. Floret fine mēsis Maij. Fructus maturus est Autumni initio, siue fine Septembris, totam hyemem durans. Calefacit cum acrimonia, vt Paulus scribit. Ex plurima aërea & aquea, paucissima terrena substantia constat. Nam acrimonia in eo amaritudinem excellit. Auicennæ calidum est, & siccum: in tertio gradu. Folia fructusque calefaciunt & siccant, satisque tenuium sunt partium. Viscum emollit, discutit, extrahit: parotidas, tubercula, cæterasque collectiones ad maturitatem perducit. Cum resina, & cera pari, epinyctidas in splenio sanat: vetera vlcera, abscessusque, quos Cacoëthes vocant, ex thure mollit: lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum & impositum absomit: cum Sandaracha, aut auripigmento illitū vngues extrahit: mistum cum calce, & vini fæce, suam vim intendit, vel, vt alij legunt, ipforum vim intendit.

Viscum Galeno, valenter humores ex alto extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosque diffundit, ac digerit. Est autem ex eorum genere, quæ non protinus admota calefaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut Thapsia.

Visci Querni lignum in tenuissimum puluerem quidam redigunt ait Matthiolum, & comitialibus hauriendum præbent, quo tantum medicamento multos sanatos pro certo affirmant. Atqui operæ pretium est, vt eo vtantur comitiales quotidie, & in quadragesimum vsque diem, caueantque ne lignum ab arbore rescissum terram contingat. Idem collo aut brachio pro amuleto suspensum cum suo cortice, grauidarum conceptum adiuvat: sed noui ego plures morbi & medicamenti prorsus ignaros, qui ligni loco Viscum ipsum in catapotia deuorandum dederint. Viscum quod in Pyro syluestri nascitur, contractione membrorum laborantibus maximo esse auxilio scimus. Contunditur id vnà cum foliis, & ramis, & cum pinguedine capi recenti. Defricantur lichenes

chenes pumice, vt flos Visci cum calce subactus illinatur.

Omnia Visci genera Trago dum viridia adhuc, & recentia sunt, tusa, succo extracto, auribusque indito, discutiunt collectiones earum, & emolliunt eas intra paucos dies, dolorémque leniunt. Superstitio etiamnum hodie Christianorum quorundam mentes vsque adeò occupauit, vt sint qui credant Viscū Quercinum aduersus veneficia, & ludibria Satanæ efficax esse: quam ob causam ex collo puerorum suspendunt. Quidam empirici existimant Viscum quod in Quercu, Corylo, Pyro nascitur, si terram non tetigerit in puluerem redactum, ac è vino potum comitialibus mederi. Itaque ex eo orbiculos precatorios faciunt, quos aduersus eundem morbum valere credunt. Alij argento includunt ad *περιπλά*. Gentilis Fulginas, & Iacobinus de partibus tam præstantes huius vires esse arbitrati sunt, vt lignum sanctæ crucis appellarint, sibi que persuaserint aduersus epilepsiam, apoplexiam, paralysem quàm maximè prodesse, tum intus sumptum, tum collo appensum. Lignum Visci in Aronia Mespilo nati arquatos sanare affirmat Curtius. Viscum confit, vt prodit Plinius, ex acinis qui colliguntur mesium tempore, immaturi. Nam si accessere imbres, amplitudine quidem augentur, Visco verò marcescunt. Siccantur deinde, & aridi tunduntur, ac conditi in aqua putrescunt, duodenis ferè diebus: vnum hoc rerum putrescendo inuenit gratiam: inde in profluente rursus malleo tusi, amissis corticibus, interiore carne lentescunt. Hoc est Viscum, pennis auium ligandis, iuglandis oleo subactum, cum libeat insidias moliri. Viscum scribit Matth. variis modis fieri: verum omnium præstantissimum esse quod è granis in Quercu nascentibus conficitur. Visci, præter id quod inualidum in pyris, malisque nascitur, ingens in Hetruria prouentus. Siquidem ibi non modò in Quercu probatissimum prouenit, sed etiam in Cerro, Illice, Castanea, in nostris præsertim maritimis Senensibus, vbi vastissimæ assurgunt syluæ, quæ non paruo pretio locantur iis qui Viscum conficiunt. Grana quæ legerunt in aqua decoquunt, donec disrumpan-
 tur: deinde contundunt, & tamdiu lauant in aqua, donec furfuracea excrementa eximant. Fit præterea Viscum in Syria ex Myxis, quo vtuntur Insubres in suis aucupiis, quoniam arboreo Visco carent. Ex Venetiis illud defertur, quo primum ex Damasco Syriæ aduehitur, vnde Damascenum vocant: sed id Querno bonitate cedit. Fit quoque Viscum ex Agrifolij, & Viburni radicibus ipsarum corticibus in scrobe inter suarum arborum frondes humido solo sepultis, ibique tamdiu dimissis, quoad computrescant: Tum enim eximuntur, & tamdiu in pila contunduntur, donec lentorem concipiant: post aqua calida lauantur, & manibus commiscentur. Hac etiam ratione quibusdam in locis Viscum fit ex Ibis radicibus. Serapio quoque ex corticibus ramorum arboris Tarabellæ Viscum bonum confici tradit. Viscum Quercinum maximo Hetruscis vsui est. Nam præterquam quod in aucupiis eo vtuntur, etiam vites eodem muniunt, atque illinunt, ne prima germinatione ab erucis, & vermiculis, quibus omnia scatent, gemmæ deuorentur. Visci fructu vescuntur Turdi, præcipuè magni, quos nostri vulgo Turdellas appellant, quorum stercore semine Visci pleno inficiuntur, & feruntur arbores, in quibus pernoctant, & victitant: Ex eo semine nascitur planta, quæ Viscum creat, vnde scitè à Plauto dictum est, Turdus exitium sibi cacat. Eadem est de Visci ortu Plinij sententia. Omnino factum, inquit, nullo modo nascitur, nec nisi per aluum auium redditum, maximè Palumbis, ac Turdi. Hæc est natura, vt nisi maturatum in ventre proueniat, quod, & scribit, & admiratur Theophrastus, præsertim cum Viscum & fructum ferat, & semen è quo generari possit. At id negat Scaliger, & ex arborum vitali excremento, quasi è semine, proportionem quadam, oriri Viscum probat, sicut,

Pli. lib. 25.
cap. 4.
Lib. 3. c. 3.

Gentilis &
Iacob.

Li. 26. c. 23.
Li. 16. c. 44.

Ibidem.

Cap. 167.

Li. 16. c. 44

Lib. 2. cau.
cap. 23.
In comm.
ca. suprad.
& exerci-
tat. 168.

Ibidem.

Li.16.c.44
debel. Ga.Lib.2. cau.
cap. 22.

Li.17.c.14.

Li.13. c.22.

Li.16.c.44.

& Gallam, non è semine deiecto ab auiculis, quasi verò, inquit in palumbis, & Turdi ventriculo nequeat granum concoqui, cùm tamen labruscarum gigarta longè duriora, & grandiora conficiantur, id quod experti sumus, datis Turdo vuis labruscæ, deinde Visci baccis, nullâque horum specie in auis excrementis reperta. Adhæc extremo Autumno comedunt aues acinos Summis ramis etiam surrectis quibusdam Viscum oritur. Quomodo totas hyemes perdurat, neque tantis tempestatibus proluitur? Non enim statim nasci est verisimile. Quare caloris interni fotu informata Visci principia in succo sibi connaturali, ab externo calore adiuta, atque euocata concresecunt, & in plantam adolescunt, quemadmodum cornua ex ossibus animalium educuntur. Non omittenda est hac in re, & Galliarum admiratio. Nihil habent Druidæ (ita suos appellant Magos) Visco, & arbore in qua gignitur (si modò sit robur) sacratius. De quorum vana superstitione, & populi hac imbuti stoliditate, lege plura apud Plinium, & Iulium Cæsarem. Druidæ, inquit Cæsar, certo anni tempore in finibus Carnutum (quæ regio totius Galliæ media habetur) confidebant in loco consecrato. Ea Galliæ pars hodie *la comté de Dreux* nominatur. Arboribus exitio est Viscum, auctoribus Theophrasto & Plinio, qui id etiam nec igni, nec aqua posse corrumpi tradidit. Hyphear ad saginanda pecora vtilius est. Vitia modo purgat primo, deinde pinguefacit quæ suffecere purgationi. Quibus sit aliqua tabes intus, negât durare. Ea medendi ratio adhibetur æstatis quadragenis diebus.

I L E X.

C A P. I I I I.

Nomina
Lib.16.ob.
cap.44.

In lib. 1.
Dioscori.
cap. 121.
Lib.6.ca.3.

Forma.
Forma Ma
theo. lib.1.
Diosc. c.121

Plin. li. 16.
c.6. Matth.
Th. lib. d.
Plin. lib. 16.
cap. 25.



ILEX Græcè *πῖνος* nuncupatur, quia ferra propter duritiem sit secanda, Arabicè *Barbes*, siue *Carmas*, Gallicè *Ieuse*, & *Eoufe*: Bello-nio *Chesne verd*, quo nomine Quercum perpetuò virentem, cuius capite de Quercu meminimus, minimè intelligit, Italicè, *Elice*, Hispanicè *Anzina*, & *Auzinheira*, & *Coscoia*, Germanicè *Stecheychen*, *Eingattung*

I L E X.



Duùm Ilex est generum, alterum folio spinoso, sine aculeis alterum: hoc vbique ferè scatet Hetruria, illo verò Hispania. Meminit vtriusque Columella. Possunt, inquit, & ficulnea folia bubus probè dari, si sit eorum copia. Querneæ tamen frons melior est vel Iligneæ, sed eius generis quæ spinas non habet. Nam altera quoque, vt Iuniperus, respuitur à pecore. Quare non rectè sentiunt, qui Plinij tantùm & Theophr. testimonio freti, Illicem non spinosam legitimam esse negant. Ilex foliis laurinis ac perpetuis constat, parte aduersa candicantibus, scabris, auersa virescentibus, ac læuibus, toto ambitu ferratis, rigidis suis crenis pungentibus in vno genere, in altero minimè, Breui pediculo: glande parua, Querneæ simili, breuiore, graciliore, pertinaciter hærete, quam Homerus Achylon vocauit, eoque nomine à glande Querna distinxit. Viscum atque hyphear fert. Nullo flore exhilaratur. Tota arbor procera est, & Robur magnitudine æquat, vbi solum nacta fuerit idoneum: cortice in rufum nigricante

nigricante, materia densa, spissa, robusta, ex nigro rufa: radice multiplici, profunda ἐπιεχὼς, id est mediocriter, Theodorus admodum conuertit. Theophrastus certè alibi scripsit, omnium syluestrium profundissimas radices Ilicem habere, materiam densam, robustamque admodum, quare, & decorticationem hyeme diutius tolerat, in atrum rubescentem, vnde apud Aristophanem ὡρίωνοι homines, id est Iligni pro durissimis ponuntur: eam tamen frangi ac dissilere sponte sua scripsit Hermolaus, ob idq; Periclem dixisse, Bœotios Ilicibus esse similes, vt est apud Aristotelem, quod ipsi se conficerent intestinis discordiis. Ilicis à Matthiolo pictæ folium oblongius, & angustius, ad id fortassè genus referendum, quod Plinius in Italia nasci tradit, folio non multum ab Olea distante. Quæ in Gallia Narbonensi, & Prouincia notissima est, etiam mulierculis, & pueris, folia habet Suberis primi foliis minora, & magis orbiculata, in adultis arboribus plerumque sine aculeis, præter nouella, & nunc primum enata, quæ aliquantulum incisa, & aculeata sunt: Nam in tenellis arboribus antequam glandem ferre incipiant omnia folia aculeata sunt, teste etiam Clusiodoro. Admirandam Ilicem describit Plinius his verbis. Vicina luco est Ilex, & ipsa nobilis, 35. pedum ambitu caudicis, decem arbores mittens, singulas magnitudinis visendæ, syluamque sola facit. Idem inter vetustissimas etiam arbores Ilicem recenset. Vetustior vrbe inquit, in Vaticano Ilex, in qua titulus æreis literis Hetruscis religione arborem iam tunc dignam fuisse significat. Tiburtes quoque originem multò ante urbem Romam habent. Apud eos extant Ilices tres etiam Tiburto eorum conditore vetustiores, apud quas inauratus traditur. Ciuica corona Iligna primò fuit, postea magis placuit ex Esculo Ioui sacra. Ilex in iis est arboribus quæ montibus propriæ, nasci in planis nequeunt. Inter syluestres perpetuò viret. In prouincia Narbonensi, præsertim agro Monspelienfi frequens nascitur. In Italia notissima est arbor. In Ida monte Cretæ, hodie Psiloriti nuncupato copiosæ proueniunt Ilices, & in monte qui Athos dicitur: item in montibus circa Hierosolyma, & locis circa Amanum montem. Ilex Vere germinat teste Theophrasto. Earum, inquit, quæ ferius fructificant, quas nonnulli anni spatio fructum perficere volunt, vt Iuniperi, & Ilicis, germinationes Vere proueniunt. Fructus, eodem auctore, serò maturescit, vt annotinum nouus occupet, eamque ob causam bifera hæc arbor à nonnullis existimata est. Omnium tardissimè Ilicem fructum suum perficere idem alibi scripsit. Sic enim Gaza legit, πάντων δὲ ὀψιμάτατά, &c. codex autem Basiliensis, πάντων δὲ ὡλείστην, id est, omnium copiosissimè, &c. Eodem loco, Quercus, & Castanea ferius fructus perficiunt, nempe circa Vergiliarum occasum: eodem modo, & Philyrea, & Ilex.

Lib.3. Hist.
cap.7.
Theophr.
Li.4. Hist.
cap.15.

In lib.1.
Diosc.

Li.16.c.44

Plin.li.16.
cap.4.

Locus.

Theophr.
lib.3. Hist.
cap.11.

Pli.lib.16.
cap.18.

Bell.lib.1.
ob.cap.18.
& 44.

Bell.lib.2.
ob.cap.81.
& 107.

Tempus.

Lib.3. Hist.
cap.6.

Cap.16.
Lib.3.ca.6.

Li.1.c.121.

Vires.

Lib.6.sim.

Curt.li.21.
cap.17:

* Drynus ser-
pentis genus,
Dioscor.lib.6.

Lib.de bo-
no.& mal.

fuc.
Emb.109.

li.1.Diosc.
Lib.2.de
Alim.

Iligneæ Glandes viribus Quernas antecellunt, ait Dioscor. Iligneæ radices cortex cum aqua coctus, dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos.

Valentius astringunt Phagus & Ilex, inquit Galenus, seu quis eas species esse Quercus velit, seu toto genere diuersas. Harum folia dum tenera sunt, imposita, non instrenuè siccant, minus autem Quercus, quanto minus etiam adstrictio- nis fortita sunt. Dioscor.de omnium foliis æqualiter pronuntiat, contusa, & trita tumoribus prodesse, & imbecilles membrorum partes roborare. Radix Ilicis tusa, & ictui dryini *imposita plurimum prodest. Galen. alio loco scripsit, Ilicis Glandes quas Græci ἀκύλας vocant, fugiendas esse, quoniam acerbæ, & duræ sunt, eoque insuaues: etiam si quis elixas sumat, concoctu difficiles, & succi crassi. Scribit Corn. Ilicis Glandem Galeno acylon appellari, & Querna Glande ad omnia deteriorem existi

existimari, sicut hanc castaneis, quæ omnium glandium sunt optimæ, quo tamen loco vulgaria exemplaria Græca Latinæque Memecylon habent.

Libr. 2. de
diata.
Li. 1. de vlc.
Ibidem.
Erasim. in
Chiliad.
Pli. lib. 16.
cap. 6.

Acyli, Quercus, Fagique Glandes Hippocrati crudæ, tostæq; aluum sistunt: elixæ minùs. Ad idem ambusta Ilicis radices teneras in vino dulci coquere iubet ad lentum ignem, donec satis crassum fiat medicamentum. Similiter in aqua coqui possunt. Hæc cum ita se habeant, inquit Cornarius, mihi sanè videtur pro uerbium, quod ἀκόλω τὰ χεῖλη, & σύκω βῦσαι, iubet, non legendum esse ἀκόλω apud Suidam, sed ἀκύλω, quum ipse ad salubrem, & fortem rerum vsum id admonere nos dicat. Ego hîc nihil contendo, nec admodum refert. Iligna Glâs Suem angustam, nitidam, strigosam, ponderosam facit, Horatius.

Umbæ, & iligna nutritus glande, rotundas

Curuet aper lances carnem vitantis inertem.

Matt. ibid. Ilignus carbo Hetruscis in pretio est, non modò quòd ignem diutius foueat, sed etiam quod (vt aiunt) vapore caput minimè tentet. Iligna materia vt querna, Lib. 5. Hist. ad multa est utilis. Ilici honos ad axes inquit Theophr. & ad currus vnico iugo cap. 8. tractiles, & ad iuga lyrarum. Secatur in laminas prætenues & Ilex, auctore Plinio, Li. 16. c. 43. colore quoque non ingrata, sed maximè fida iis quæ teruntur, vt rotarum axibus. Proditum terebris vaginas ex Buxo, ac Ilice utilissimas fieri. Hyginus manubria rusticis carpinea aut Iligna fieri iubet. Oribasius ex Heliodoro scribit machinas ex robustiori materia conficiendas esse, scilicet Iligna vel fraxinea.

Lib. de ma
chin.

S V B E R.

C A P. V.

Nomina

Lib. 1. c. 88.

Genera.

In cap. 121.
Li. 1. Diosc.



VBER Græcis φελλὸς dicitur, Gallis *Liege*, à leuitate, vt putat Ruellius, quod innatet aquis, nec obruatur: qua ratione etiam ἵψος dicitur, quòd semper altum petat: Italis *Sugaro*, Germanis *Pantoffelholz*, Hispanicè *Alcornoque*. Suberis duo sunt genera, foliorum figura diuersa: alterum folio prolixiore, acuminatioreque: alterum

*S V B E R folio breuiore,
& latiore.*

*S V B E R folio longiore,
& angustiore.*



breuio

breuiore, rotundiorēque, & ferrato. Suber arbor est folio Ilicis, vel Oleæ, crassiore, longiorēque, vt scribit Theophr. perpetua coma virens: quod tamen negat idem Theophr. nisi codex mendosus sit, cui refragatur Plinius, & iure quidem, numerās inter syluestres arbores, quibus folia non decidūt, Suberem. Apud Theophrastum legendum quidam censent, τὸ δὲ φύλλον ὁμοίον τῆς ἐλαίας, παχὺ, ὡρομήκεστρον, & φυλλοβόλον, ἀλλ' ἀείφυλλον: Folium Oleæ simile, crassum, longius, non deciduum, sed sempiternum. Ilici magnitudine cedit, vt testari possunt, qui Bacano Romam proficiscuntur, quo in itinere, innumeræ Suberum plantæ visuntur. Est enim, Ὀμήκης ἐπιστάτης, καὶ Δικύξης, inquit Theophr. id est mediocriter procera, & auge-sciens, non admodum procera, auctuq; insignis, vt conuertit Gaza. Quin & à Plinio dicitur minima esse arbor. Caudice est crasso: paucos producit ramos: Glans Ilici similis pessima, rara: cortex tantum in fructu, præcrassus, ac renascens, atque etiam in denos pedes vndique explanatus. Materia eius disrumpitur facilè, quemadmodum Piceæ, verum fragmentis maioribus, sicuti scribit Theophr. & est, vt alibi tradit, Ὀέργος καὶ μαλακός, id est tractatu facilis, mollisque, verum ἡραμύς, id est, fragilis, vel fissilis, non rigida, vt Gaza interpretatur. Ex ea quondam simulachra Diis factitata, verum in eius locum successit palma. Suberi detrahitur totus cortex, alioqui deterior fieret arbor, qui triennio post subnascatur, haud ignara natura quod cortice spolianda sit, inquit Matthi. materiam duplici cortice muniente. Cortice in orbem detracto necantur arbores inquit Plin. excepto Subere, quod sic etiā iuuatur. Crassescens enim præstringit, & strangulat. Alterum Suberis genus folio est prolixiore, & acuminatiore, alterum breuiore, rotundiorēque, per ambitum ferrato, acuminatis quibusdam in locis, incisuris. Scribit Theophr. Suberem peculiariter in θυρρηνία nasci, in quibus verbis Victorius mendum esse suspicatur, legique debere θυρρηνία. Copiosa namque hæc arbor est in maritima regione Hetruriæ, quam olim incoluere Thyrrheni, vt & syluæ etiam ingentes Suberis sint prope Populonium, & oppidum quoque inde appellatū Sughereto. Corrupta enim Latina voce Suber, patrio sermone *Sughiero* vocatur. Qui folio est rotundiore, in Romano, qui prolixiore, in Pisano agro prouenit. Spectantur Suberes in ora maritima Liguriæ, vt Plinio fides non sit adhibenda, qui nec in Italia tota nasci, nec in Gallia omnino tradidit. Sunt, & in Hispania humiles, parumque ramosi, inquit Ruell. at forsitan in Pyreneis montibus proceriores. Tardissimè arbor germinat Suber, præsertim ex vinorum cadis, combustum, cinerem reddit siccando valentissimum, qui medicinis ad dysenterias inscriptis admiscetur. In immodico sanguinis ex vtero profluvio Paulus Suberis ex Italico vase combusti cinerem propinat in posca. Mirificè auxiliatur, Suberis ex Italico vase vsti cinis cum aceto, vel posca, in vterum inditus. Suberis cortex tritus ex aqua calida potusque sanguinem ex vtralibet parte fluentem sistit. Eiusdem cinis ex vino calido, sanguinem excreantibus magnoperè laudatur, auctore Plinio, id quod etiam testatur Serenus his versibus.

Sed quacunque fluit vis immoderata cruoris

Subereus cortex calidis potatur in undis,

Ante minutatim studio vincente terendus.

Serenus.

Vfus Suberis, autore Plinio, ancoralibus maximè nauium, piscantiumq; tragulis, & cadorum obturamentis, præterea in hyberno foeminarum calceatu. Quamobrem non infacetè Græci corticis arborē appellāt, (sic enim legendū, non vt in aliis exemplaribus, mulieres cortices arborum &c. dixerūt autem Græci λευκόφλοιον, id est arborē corticis, vel corticosam.) Sunt & qui foeminam Ilicem vocēt, atque vbi non nascatur Ilex, pro ea Subere vtantur, in carpētariis præcipuè fabricis, vt circa Elim, & Lacedemonem. Suber inter eas recēsetur arbores, quæ tardissimè cariē vetustatēque

fentiunt

Lib. 3. Hist. cap. 16.

Li. 16. c. 11.

Matt. in c. 121. lib. 1. Diosc.

Ibidem.

Lib. 16. c. 8.

Forma.

Pli. lib. 16. cap. 8.

Lib. 3. Hist.

cap. 16.

Theophr.

Ibidem.

Theophr.

Ibidem.

Ibidem.

Li. 17. c. 24.

Genera.

Locus.

Lib. 3. Hist.

cap. 16.

Lib. 3. Var.

Lect. c. 17.

Lib. 16. c. 8

Li. 1. c. 89.

Vires.

Plin. li. 16.

cap. 25.

Paul. lib. 7.

Lib. 3. c. 62.

Li. 24. c. 4.

Vfus.

Li. 16. c. 8.

Li. 16. c. 40

Lib. 16. c. 8.

sentiunt. Eiusdem Glande fungosa caro fit. Huius corticis vsus futoribus, veteramentariis, atque piscatoribus notus: his, verriculorum alis, ne fidant aut in profundum trahantur, appendentibus: illis, soleas aduersum frigora munientibus.

SMILAX.

CAP. VI.

Nomina

Li. 16. c. 6.



MILACIS ancipites, & multiplices significationes errorem sæpè crearunt in re herbaria, atque etiam creare possunt, nisi bene distinguantur. Smilaces primum dicuntur lævis & aspera, herbæ repentes: deinde quædam arbores. Ilicis duo genera teste Plinio. Ex iis in Italia folio non multum ab Oleis distant Smilaces à quibusdam dictæ, in prouinciis Aquifoliæ. Præterea, quæ Taxus Latinis, Smilax Græcis nuncupatur.

SMILAX AR-
cadum Glandifera.

Genera.

Li. 3. Hist.
cap. 16.

Forma.

Ibidem.

Nomina

Ibidem.
In li. I. Dio
sc. ca. 121.

Postremò Glandiferæ quædam aliæ arbores hoc nomine appellantur, de quibus nunc agitur. Harum duo obseruauimus esse genera. Vnū Smilacem Arcadum Theophrasto dictum, alterum humilius, vix in arborem excrefens. Smilax Arcadū arbor est Ilici similis, inquit Theophrast. mediocriter procera, cortice cinereo, in summis ramis cano, & lanuginoso: folio lauri, nec serrato, nec, Iligni modo, in ambitu spinoso, superiore parte viridi, inferiore candicante, lanuginéque obducta, quæ mollis tangentibus sentitur: flore Oleæ Roboriæ simili, luteo, in longis paniculis denso, quo Ilex caret: glande admodum parua. Græci vocant Milaci, & Acilaci vocibus corruptis à σμίλακος, & ἀκύλα nominibus. Gallis nullum proprium nomen huius arboris est. Materia est non, vt Ilex, solida, densaque, sed molli, vt tradit Theophrast. qua ratione Matth. eorum improbat sententiā, qui Smilacem Arcadum, Ilicem non spinosam esse autumant. Alterum Smilacis glandiferæ genus humile est, fruticosum, in arborem sese non

Ibidem.

attollens: folio Oleæ, candido, neque infecto, neque spinoso: fructu, floréque superiori simili, à quo folio tantum angustiore discrepat. Rectè ergo Theophr. scribit, Smilacis glandiferæ folium non esse aculeatum, siue spinosum, cum Smilacis asperæ reptatricis, & scanfilis, folium mucrone lateribusque pungat: item rectius esse quàm Ilicis (δύττερον enim, non vt Gaza βαθύτερον, id est profundius, legendum puto) quoniam, neque sinuosum, neque in ambitu incisum: molle, quia vna parte lanuginosum: differentiisque pluribus varium. Smilacis glandiferæ primum genus frequens in agro Monspeliensi prouenit, vbi non rectè ab herbariis Robur appellatur: alterum in collibus Rhodanum respicientibus, totòque eo tractu, qui à

Locus.

Vires.

Lib. 6. cap.
part. cap. 3.

Lib. 6.

Vienna Allobrogū ad Arelatem vsque porrigitur. Astringendi vires Smilax habet auctore Gale. qui enumeratis iis quæ columellæ mediocres phlegmonas modicè reprimunt, subiungit. His validiora sunt Myrti, & baccarum eius decoctum, & Cydoniorum malorum acerborum, item virgultorum tenerorū Ilicis, Arbuti, Smilacis, Phagi. Quo loco hæc Cornarius. Smilacem arborē Taxum Latinis vocari, & Dioscorides & Plinius tradunt, in potuque acceptū venenatum pharmacum esse, & repentinam mortem inducere. Idem Dioscorides prodidit, imò non solū in potu acceptum lethalem esse, sed vmbra etiam illius sub ea sedētibus aut dormientibus

tibus noxiā, vt pleriq; inde moriantur, quod alio loco Diosc. & Plin. tradunt, vt mirum videri queat eius arboris ramulorū decoctū hoc loco à Galeno ad colu- mellam inflamatā probari, maximè cū etiā ipse Gal. scribat *σμίλαξ, ἢ τάξος*, *δένδρον ἐστὶ δηλητηρεῖα δυνάμεως*. Pro τάξος nō rectè, vt equidē arbitror, *κάσλος* legitur, velut etiā apud Paulum. Non esse aut de alia Smilace accipiendum, testimonio est id, quod asperā, & lenē, non Smilacem, sed Milacē appellare solet, velut alibi ostēdi, & quod hoc loco inter Ilicē, Arbutū, ac Phagū recensetur, quibus aspectu similem Taxū Plin. dixit, & Dioscor. tum foliis, tū magnitudine, Abieti similem scripsit. Arbitror itaque Gale. reuera Taxi arboris ex genere Abietino, & Ilicino ramulos hoc loco probare, vt quorū decoctū vehementi adstrictoria vi prædi- tum sit. Non esse aut eam ubiq; letalem, & venenosam ex eo patet, quod Diosc. præcipuè de Italica, & in Narbonēsi Gallia, Hispaniæ cōtermina nascēti tradat, pro qua apud Pliniū in Arcadia, corruptè, vt opinor, habetur. Hęc paucis refellit Matth. Si Cornarius, inquit, Theoph. sibi alioqui familiarē cōsuluisset, qui Smi- lacem quandā (vt Paulo ante ostendimus) arborē Ilici similem facit, rectius, meo quidem iudicio, & paucioribus rem hanc explicasset. At Cornarius, ne cōsulto quidem, opinor, Matth. in Emblematis, Theophr. locū se legisse demōstrat, quo Smilacem Arcadum describit, & hanc Smilacē non esse Taxum ait. Smilacē verò Dioscor. & Plinij agnoscit, quod vel ex eo patet, inquit, quod alibi eodem libro Theophr. de Taxo agit, ipsamq; *μύλον* vocat. Veruntamen ne sic quidē à pristina sententia dimoueri potest. Nam Paulo post superiorē Gal. locum cū posuisset, sic scribit. Quo loco ego non de alia Smilace in cōmentariis Medicis accipien- dū cēsui, & adhuc sentio, quā de ea quæ Taxus appellatur. Nam Smilax altera Theophr. apud Arcadas solū id nomen habet, & peculiaris illorum arbor est.

Libr. 4.
Li. 16. c. 10.
Lib. 8. sim.

In libr. 1.
Diosc. c. 121

Emb. 68. li.
4. Diosco.

Lib. 6. cap.
part. ca. 3.

PHELLODRYS CAP. VII.

PHELLOD. SMILAX
alba angustifol. humilis angustifo.
Folio serrato. Folio non serrato.



QUum de Ilice, & Smilace dixisset Theo. subiūgit: Quod verò Phellodryn Arca- des nūcupāt, natura est inter Ilicem, & Quercū media, atque adeo Ilicem fœminam quidā esse putauerunt. Hęc ille. Si tamē nomen ex Subere & quercu factū spectes, Phellodryn, idest Suberi quercum naturæ Suberis, & Quer- cus participem potius dixeris. Sed Suber Ilici arbori adeo similis est, vt nihil intersit, an ex Ilicis, an ex Suberis & Quercus confusis princi- piis hanc dicas fuisse à Theophr. nominatam. Quinque Phellodryos genera obseruauimus: duo candicantibus foliis: tria, obscure viren- tibus. Vna igitur est foliis altera parte albi- cantibus, angustis, longiusculis, crebris admo- dum & non profundis incisuris crenatis, leui- ter asperis potius, quā spinosis: cortice cine- reo: glāde, cum matura est, ex fusco flauescēte. Hęc videt esse Matth. Phellodrys picta, sed nō descripta. Alteri, folia altera parte cādicantia, latiora sunt, raris laciniis, sinuosa, molliter acu- leata: cortice, maturāq; Glāde, ex atro rufescēte.

Lib. 3. Hist.
cap. 16.
Nomina

Genera.

Forma.

Alia Phellodryis est, cui folia sunt mediocris amplitudinis, nigricātia, siue ob- scuræ viriditatis, non adeo multis, neq; profundis laciniis sinuata, mitius pun- gentia: calyce Glandis læui: Glande ipsa ex fusco flauescēte: cortice cinereo.

*PHELLODRYS Matthioli.**PHELLODR. alba, Latifolia.*

PHELLO. nigra | *PHELLODR.*
mediocrib. folius. | *nigra latiss. folius.*

PHELLODR. Foliis muricatis,
Calyce glandis echinato.



Alia foliis est latissimis, similiter nigricantibus, crassis, frequentioribus incisuris, valde spinosis, glandis calice læui, cui maturæ, & cortici idem qui & superiori color est. Harum omniū Glans strigosa est, & tenuis: calyx non spinosus, sed ut in Quercu tuberculis verrucosus. Hanc & Ilcis glandem olim ἄκυλον vocabant, auctore Theoph. cuius vocis vestigia hodie quoque Græci retinent, vniuersum hoc glandium genus Acylacas nominantes. Postremum Phellodryos genus folia superiore minora habet, pallida, multum laciniata, valde muricata, Aquifolij modo: calicem glandis echinatum: glādē ceteris similem, corticē cinereū.

Locus. Hęc genera in collib⁹ Rhodano vicinis, aut nō procul ab eo disitis proueniūt.

I L E X

ILEX AQUIFOLIA

CAP. VIII.



ILEx aquifolia Plinio, siue Ilex parua aquifolia, hæc arbor nominatur, Phellodrys coccifera quibusdam, Theophr. communi nomine πῖνος, à Diosc. κόκκος βαφικὸν, Gallice, *Labre de la graine d'escarlate*. Ilicis duo genera Plinius tradidit: vnā in Italia nascentē, folio non multum distantē ab oleis, cuius, obiter supra meminimus: alterā in prouinciis, aquifoliam dictam. Est autem Ilex aquifolia, arbor parua, surculosa, cortice ex

ILEX AQUIFOLIA.



rubro candicante, Glande rotunda, calyce aculeis rigente, totāque ferē vt in Cerro, complectente: foliis paruis, & veluti in Agria, siue Aquifolio laciniatis, ac in ambitu sæuissimē pungētibus, breui pediculo adnexis. In ima parte qua petiolo hærent, & ea supina, nonnūquam verò, sed rariùs, in surculorum nodis, granum quoddam innascitur¹, rotundum, paruum foris è cinereo rubens, intus verò sanguineo cruore lucido plenum, vesiculis vlmorum foliis insidentibus simile, tanquam huiusce arbusculæ purgamentum quoddam ac excrementum, à natura in folia protrusum, non autem bacca. Hoc Theophr. κόκκον φοινικῶν vocat, Diosc. etiam κόκκον, Plinius granum, coccum, quisquiliū: quanquam Gelenius cūsculium legat. Est enim, inquit Hispanum vocabulum, non Romanum, & cūsculiatum videtur olim dictum, quod nunc deprauatè scarlatum. Hermolaus verò, quisquiliū Plinio Vermiculum, idest, ipsum cocci granum dici putat. Nam quisquiliæ, vt ait

Festus, sunt, quicquid ex arboribus minutis surculorum, foliorūque decidit, vnde nomen venit: ob id Cecilius quisquiliās volantes venti folia dixit: vnde natum, vt vestis coccina literis per imperitiam interceptis, Squarlata vulgo nominetur hodie, pro quisquiliata. Sed Plinij locum præstat adscribere, vt contaminatum, ideòque obscurum purgemus, ac illustremus si possumus. Omnes has roboris dotes Ilex solo prouocat cocco. Granum hoc, primòque ceu scapus fruticis paruæ aquifoliæ Ilicis, cūsculium vocant. Sic Gelenius. At Hermol. Marc. Ruellius, Granum hoc rubens est, primūque ceu spectes frutices, paruos aquifoliæ Ilicis: Quisquiliū vocant. Quidam, primòque ceu scrupus, vel ceu spurcities: Alij, primòque ceu bacca, &c. absurdè: coccus enim non est Ilicis fructus, vt ostendemus. Sic verò legit Dalechampius: Granum hoc, primòque ceu scapo, &c. vt scapum Plin. intelligat petiolum. Coccus enim ex eo profus loco existit, quo petioli scapus folio cohæret, vt diximus. Turnebus in veteribus libris exaratum inuenisse se scripsit, primòque ceu scaptēs fruticis paruæ aquifoliæ Ilicis: vnde, inquit, temere scapus fabricatus, & edolatus est ab emendatoribus, nos scabies legendum esse affirmamus. Coccum Arabes, *Charmen*, *Kermes*, seu *Quermes*, appellant, Officinæ, Grana tinctorum, Galli, *Vermillon*, & *Graine d'escarlate*, Itali *Grana de tintori*, Germani *Scarlachber*, Hispani, *Grana para tegrir*, & *Grana en grano*. Serapio cum de chermes tractat, eandem eius quam Dioscorides, cocci infectoriij historiam describit: ex quo intelligere licet, idem esse Chermes Arabum, & coccum infectorium Græcorum. Quare, idem ne sit Chermes siue coccus infectorius, & Ilicis nostræ granum infectorium

Nomina

Li. 16. ca. 6.

Lib. 3. Hist.

cap. 16.

Li. 4. ca. 43.

Genera.**Forma.**

Plin. libr.

16. cap. 24.

Lib. 3. Hist.

cap. 16.

Ibidem.

Lib. 16. c. 8.

Festus.

Lib. 16. c. 8.

In li. 1. Dio.

c. de Coc.

Li. 3. ca. 98.

Th. 1. ad li.

4. cap. 16.

Nomina

seplasiariis, & infectoribus notissimum, quo illi ad medicatas cordique amicas alkermes præsertim confectiones hi in laneis vestibus inficiendis vtuntur, dubitant quidam sine ratione. Matthiolus nescire se dicit, an eius arbuscula in

Lib. 4. Dio.
cap. 43.

COCCI INFECTORIJ

Arbuscula.



Lib. 24. c. 4.

Ibidem.

Marcel.
Virgi.

Emb. 39. li.
4. Diosc.

cum fruticibus suis *ὡς φάρμακον*, idest, ceulentes, non ad formam grani, sed hærendi modum referendum esse annotavit Marcel. Virgil. Quantum verò ad vermiculos attinet, scire licet Cocci omnis, ni tempestiuè legatur, aut tēpestiuè collecti, ni feruentissimo soli exponatur, aut in calentem furnum immitatur, aut vino albo irroretur vt fit ab infectoribus qui magnam eius vim emunt succum in vermiculos commutari, ita vt prorsus inanis supersit folliculus, sic euanescente eius humore, sicque in puluerem rubellum redactum seruant. Quade causa vt scoleciō antiqui, idest vermiculosum, ita nostri *Vermillon*, à vernibus nominauerunt. Cornarius incertos nos esse tradit de Cocci tinctorij ortu, etiā si res ipsa nota sit, in maximoque vsu ac pretio habeatur, ad tingendos pannos tum sericos omnis generis, tum alios quoque. At si Ilices aquifolias Coccum ferentes in Gallia prouincia, Hispania, alibi, contemplatus fuisset, proculdubio vt rem ipsam atque eius vsum, ita & ortum cognouisset. Cæterū id quòd ab amico quodam peregrinationis admodum studioso, de grano tinctorio audiuit, adscribit. Nascitur, inquit in Sarmatiae ad Russiam spectante Podolia appellata regione, herba similis plantagini. Ad huius radicem granum vnum adnascitur, vulgo, illic *Ischirbitz* voce ex Chermes, vt puta corrupta, appellatum, quo ad finē Maij, & Iunij principium per quatuor hebdomadas collecto, antequam in vermem alas postea aquirentem abeat, serici, & alij panni inficiuntur eo colore quem nostri *Schalach*, & *Chermesin*, vocant Vbi colligitur hoc granum, quinta pars talenti, quod nos centenarium dicimus, quinque aut sex aureis Rhenanis vānit. Verū inter ex siccandum ac præparandum dum in puluillū redigitur, tantum ipsi decedit, vt ad nos Francfordiam allatum libræ vnus pōdus triginta aut quadraginta plus minus aureis valeat. Et addidit grana singula singulis radicibus adnascencia lentis magnitudinem non excedere. Quæ si vera sunt, inquit Cornarius, sicut vera esse illi affirmanti credidi, veteres illi longe

lōge sua opinione falsi sunt. Imo fallitur ipse Cornarius, vt pote q̄ Charmes siue Coccum, à Cramefino, quod appellant, adhærente radicibus pimpinellæ, aut cuiusdā herbæ in Germania Arnoglossō similis, non distinguat. Veteres autē & si Coccū à frutice siue arbuscula, quam nos paruā Illicem aquifoliā esse arbitramur, produci senserint, non tamen alibi quoque nasci ignorauerunt. Dioscor. enim nasci in Cilicia prodidit è Quercubus, cochleariū exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & Coccum vocitant. Quē locū rectē, vt mihi quidem videtur, Cornarius ipse emendauit, vt quod in Dioscor. exēplis reperitur, γυναικες τῷ τριμαλί ἀναλέγονσι, hoc est mulieres ore colligunt, legat ἐν τῷ θέρει, pro τῷ τριμαλί, vt mulieres æstate Coccū colligere accipiamus. Id quod ante Cornariū Marc. animaduertit, vt ante anotaui⁹. Quidā legūt, τῷ τριμαλί, vt sensus sit, legere mulieres intorquēdo auellentes. Diosc. historiæ cōsentanea tradit Matthi. copiosum in Bohemia Coccū in Quercubus prouenire, eūque quod ab incolis non agnoscat, quotannis deperire, atq; etiam in Polonia, vbi diligenter legitur. Quare si grana infectoria nunc ad radices herbæ cuiusdam reperiuntur, non propterea veteres Cocci sui natales, & originem, nascendique modum nesciuerunt. Monachi qui in Mesues Antidota commentarios ediderunt, in expositione Electarij ex granis tinctoriis, quod vulgo confectio Alchermes dicitur, duo præcipuē constituunt granorum genera, quibus tinctores vtuntur: vnum quod absolute granum tinctorum, Coccus baphica, à Serapione Chermes dicitur: alterum granum non absolute, sed granum Chermes, quo solo vtuntur tinctores ad tingendum sericum, quod à Chermes Chermesinum nominatur. Id reperitur ad radices quarundam herbarum, sed copiosius ad radices Pimpinellæ. Horum itaque sententia chermes à Cocco differt, estque Chermes Chermesinum, quo sericæ vestes hodie inficiuntur. At idem omnino esse Charmes Arabum, & Græcorum Coccum baphicā ex Serapione iam demonstraui. Chermesinum verò nostrum à Chermes Arabum, siue Cocco Græcorum diuersum est, vel tinctorum iudicio, qui Coccum, Granam vocāt, *Graine*, Chermesinū verò quod ex herbæ radicibus colligitur, *Cramoisi*. Sed Monachos atq; alios multos Chermesini, siue vt nos loquimur Cramefini vox fefellit, à Chermes Arabum deducta, quod ei Cramefinum nostrum simile sit, non tamen idem, vt modò diximus. Idem Monachi (sic error errorem parit) in antidoto ex granis tinctoriis, atque aliis quæ sericum tinctum admittunt, sericum Cramefino infectum accipiendum esse arbitrantur, quod, inquit Pharmacopœi medicamenta huiusmodi componentes, à tinctoribus possunt emere. Hoc falsum absurdūque esse notius est, quàm vt refelli oporteat. Sericum enim candidum vel fuluum, crudūque tingendum intelligitur succo ex Coccis baphicis recentissimis pressu excepto, à pharmacopeis, solo, sincerōque, citra alumen, atque alia quæ tinctoris permiscuntur: qui succus liquorue, si grana aliquandiu feruentur, in vermiculos, vt diximus, mutatur, sed tempestiuē exsiccatus, & præparatus, à mercatoribus, vt ostendimus, in puluisculum abit, quo tinctores vtuntur. Nostræ, de Cocco baphica, opinioni suffragatur Bellon. qui scripsit Coccum baphicam colligi ex frutice Illici Glandem ferenti simili, cui folia veluti Aquifolio sunt, aculeata, esseque grana rotunda, parui pisi magnitudine, qua parte furculis adhærent, perforata. Gignitur granum infectorium. inquit Plinius, in Galatia, Africa, Pisidia, Cilicia, pessimum in Sardinia. Coccum Gallatiæ rubens granum, aut circa Emeritam Lusitaniæ in maxima, laude est. Est præterea genus Cocci in Attica ferē, & Asia nascens, celerrimē in vermiculū se mutans, quod ideo Scolecion vocant, improbantq; Optimū inquit Diosc. Coccum gignitur in Gallatia, & Armenia, deinde Asia, & Cilicia.

Dioscor.

Monachi.

Matth. lib.

Matth. lib.
4. Diosc. c.
de Cocco.Lib. i. Obf.
cap. 17.Locus.
Lib. 16 c. 8.
Lib. 9. ca. 41

Lib. 24. c. 4.

Lib. 4. c. 43.

- Ibidem.** Vltimum ex omnibus Hispanicum. In Creta quoq; prouenit, teste Bellon. In via qua ab Hierosolymis Damascū itur, proueniunt arbusculæ ex quibus colliguntur grana tinctoria, quæ incolæ mercatoribus Venetis vendunt. Gramotium nemus haud procul ab Mōpelio, hoc fruticis genere Coccū ferentis abundat. Scimus, & in Prouincia, & circa Narbonē Coccū ex eadē arbuscula colligi, & in Hispania, pensionem alterā tributi pauperibus Hispaniæ donans, inquit Plin. Mensibus Maio, & Iunio colligitur. Ad eum colligendū puellæ, mulierculæq; succinctæ turmatim eunt, mūdum, ornatumq; muliebrē inde sibi cōparātes. **Dioscor.** Vis huic spissandi: vulneribus neruisq; præcisis cōuenienter ex aceto tritū illinitur.
- Lib. 16. c. 8.** **Tempus.** **Lib. 4. c. 43.** **Vires.** **Lib. 7. sim.** **Lib. 24. c. 4.** **In lib. 4.** **Diosc. c. 43.** **Fuch. De cōp. med.** **Lib. 1. de med. sim.** **Lib. 9. c. 41.**
- GALEN.** Granum tinctorium astringentem simulque amaram qualitatem possidet. Vtraque sine morfu desiccat. Proinde ad ingentia vulnera congruit, præsertimque neruorū: sed tunc ipsum quidā cū aceto terūt, alij cū oxymelite.
- PLIN.** Coccum Ilicis vulneribus ex aceto recentibus imponitur. Epiphoris ex aqua, & oculis suffusis instillatur.
- MATTHIOLVS.** Grani tinctorij puluere non infœliciter vtuntur mulieres Italicæ ad prohibendum abortum, ipsum grauidis in ouo forbili propinantes, pauco addito thure, vel mastiche. **FUCH.** Eximiè confert hoc granum mulieribus abortientibus, cum pari thuris pondere in potu sumptum.
- SILVIUS.** Roborat partes suis qualitatibus manifestis, siue etiā, vt quibusdam placet, totius substantiæ familiaritate, quā dicūt habere cum corde præcipuam. Puluisculo, de quo supra diximus, tinctores lanas inficiūt viuīdo illo colore, qui in rosīs micat, imperatoriis paludamētis olim dicato, quo aspectu nihil gratius, & in purpuras Tyrias, dibaphāsque, aut laconicas. Etenim Tyrio primū tinctas, mox & Cocco tingere mos erat, aut contra. Nam & tertio, & quarto, & quinto saturabantur, vnde nomina illa vestium, Monocoros, Dicoros, Tricoros, Tetraoros, Pétacoros in vitis Principū. Anniculo grano languidus succus, vt auctor est Plin. idem à quadrimo euanidus. Ita nec crescenti vires, neque senescenti.

CASTANEA CAP. IX.

Nomina

- N**unc arborem si quis glandiferarum generis non esse contendat, tamen huic esse affinem, cum eius fructus Sardianæ glandes, & Iouis glandes appellentur, diffiteri nullo modo potest. Castanea igitur sui nominis fructus fert, quos à Græcis κάστανα, & κασάνεια primò dictos fuisse scribit Phocion, à Castano Magnesiæ vrbe, vel, vt Stephanus scribit, Apuliæ, non procul à Tarento, vnde aduecti sunt, vt fortè Diodorus nuces Castanaicas inde nominarit. Quid si à castitate, cum Plinius ieiuniis ferè dicatas eas innuat? Dicuntur etiā σαρδιαναι βάλανοι, id est Sardianæ Glādes, quod Sardibus eæ prouenēre primū, non quod in Sardinia optimæ nascantur. Euboidas quoque, & Euboicas à Græcis dici reperio. Verū Ruell. & Tragus sic dictas fuisse nuces regias volunt. Præterea appellātur διὸς βάλανοι, id est Iouis Glandes, cum tamen hæc appellatio nucibus tantum regiis dicata sit à nostris, vnde Iuglandes dictæ. Nuces vocamus, & Castaneas, κασάνεια κάρνα, quanquam propiores Glandiū generi. Tiberius Balani nomē imposuit satiuis, cura multo excellentioribus factis, vocātur & Lopima à cortice crassiore, qui Græcis λέπος dicitur, & Leucena, à quodam montis Idę loco, qui magnā ipsarū vim profert. Nux etiam Heracleotica dicitur Castanea, vt ex Oppio in libro quem fecit de syluestribus arboribus, docuit Macrobius, his verbis. Heracleotica hæc nux, quā quidam Castaneā vocant. Euboica etiam à regione. Theoph. tamen, atque eius interpret Theodo. nucem Heracleoticam pro nuce Auellana vsurpant. Agelochus, vt scripsit Athenæus, ἄμωζα vocat τὴν κασάνεια. In Dioscor. lego μῶζα, quod nomen
- Lib. 15. c. 23.** **Plin. Ibid.** **Fuch. cap. de Cast.** **Hermol.** **Athe. lib. 2.** **Lib. 1. c. 90.** **Li. 3. ca. 66.** **Plin. Ibid.** **Diosc. li. 1. cap. 122.** **Ga. li. 2. ali.** **Gal. lib. de bon. & ma. suc.** **Opp. Auct. Li. 3. Satur. cap. 8.** **Lib. 2.**

CASTANEA.



nomen tanquam spurium opinor ab interpretibus omissum fuisse: nescio an ἀμωζα reponendum. Arbor à nostris, *Chastaignier*, fructus *Chastaigne* nominatur: ab Arabibus *Sadianalach*, *Castal*, & *Stebulot*: ab Italis *Castagne*: à Germanis *Castani*, & *Kesten*: ab Hispanis, *Marrones*. Matthi. genera duo constituit, satiuū, & sylvestre. Ruell. duo apud nos Castanearū genera obseruantur, inquit, quædam altiles, multo maiore corporis tuberculo, quas vulgus vocat *Marrons*: aliæ lōgè minores, & veluti ferē. Antiqui plura fecerunt, nominibus plerūque inditis à locis vnde im portabātur. Plin. Tarētinae faciles, nec operosæ sunt cibo, planæ figura. Rotundior, quæ Balanitis vocatur, purgabilis maximè, & sponte proficiens. Pura & plana est ex iis & Salaria. Tarētina minùs tractabilis: laudatior Corelliana, & ex ea facta, quo dicemus in insitis modo, Meterana, rubenti cortice, quā vulgus præfert triangulis, & populariter nigris, quæ coctiuæ vocantur. Patria laudatissimis Tarentum, & in Cāpania Neapolis. Cæteræ Suū pabulo gignū-

Lib. I. Diosc. cap. 122.

Genera.

Lib. 15. c. 23.

tur, scrupulosa corticis interioris circa nucleos quoque ferruminatione. Castanea arbor ad eandem quā annosæ *Quercus* magnitudinē, proceritatē, crassitudinēque; tēpore accedit. Folia sunt illi magna, serrata, venosa. Sūmis potissimū ramis inter folia proueniūt nuces, intus solide, & vt plurimū planæ, cordis ferè figura, triplici tegminis ambitu septæ, membrana primū rubente, amara, mox lento cortice, siue corio, læui in atrū rubescēte, interius villosa: demū echinatis calicis vallo, quod inchoatū glādibus, intus etiā villosa, ferè albo: mirumque; vilissima esse, quæ natura tanta occultauerit cura. Gale. λοιπὸν πώγωνα appellat. Inde etiā Virgilius Castaneas hirsutas, quanquā Hermolaus aliter accipere videatur, cū scribit. Ex Castaneis Græci Pogonias appellāt, quæ barbulas quasdam habēt, nisi quis lanatas earū intelligat: sunt enim aliquæ pilis hirsutæ. Trini quibusdā partus ex vno calyce, sed nō absque perniciē. Sunt enim minores ac deteriores, vt in animalium plantarūque partu, quo plures fuerint. Fructū præcedunt nucamenta longa, lutea, Iuglandis Iulis simillima. Alij nucamenta hæc floris vice putant propendere. Alij florere credūt. Pullā terrā & resolutā desiderat, auctore Columella, vbi Ruell. puram legit. Sabulonē humidum, vel refractū tofum non respuit: opaco & Septentrionali cliuo lætatur: spissum solum, & rubricosum reformidat, vt Damogeron memoriæ prodidit: sabulosis & sitiētibus gaudet. Diligit & frigidum cæli statū, sed tepidū nō recusat, si humor assenserit. Delectatur cliuis, & opacis regionibus, præsertim in Septentrionē versis. Montes & valles diligit. In plerisque Germaniæ locis copiosissima puenit. In Gallia laudatissimæ Castaneæ, quæ apud Allobroges proueniunt, & in totam prouinciā ob præstantiam dimittuntur. Apud Petrocorios tamen maior prouentus, vt ingentes ibi eius arboris, si alterius cuiusquam syluæ cernātur. Apud illos castanea quadrupedum omnis generis, & cortis auium pabulum est. Ineunte vere germinat, seriūque, vergiliarum scilicet occasu, fructificat. Castaneæ maturæ sunt circa finem Septembris, ac per totam ferè hyemem durant. Astringit & exiccat Castanea, haud secus quā alia glandes. Calida verò & sicca est primo ordine.

Forma.

Plin. lib. 15. ca. 23.

Lib. I. c. pa. Ecl. 17. In lib. si. Diosc. ca. de cast.

Theoph. li. Hist. ca. 6.

Locus.

Lib. 4. c. 33.

Fuch. c. 143. Curt. li. 25. cap. 12.

Tempus.

Theoph. li. 3. Hist. c. 6.

Dodo. li. 6. cap. 55.

Fu. h. ibid. Tempera.

Vires. DIOSCOR. Castaneæ astringunt & ipsæ, eosdēque quos cæteræ glandes effectus præbent, præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercusat. Caro his qui Ephemerum biberunt conuenit.

Lib.13. c.8. PLIN. Castaneæ vehementer sistunt stomachi & ventris fluxiones, sanguinem excreantibus profunt, carnes alunt.

In cap. 122. lib.1. Diosc. MATTHIOLVS. Tritæ, cum sale mellēque subactæ, rabidorum canū moribus vtiliter imponuntur: cum hordeacea polenta acetōque illitæ mammæ duritias discutunt. Venerem excitant, quia flatus gignunt. 'Largius' in cibo sumptæ capitis dolorem efficiunt: inflant: aluum astringunt, ac ægrè concoquuntur. Attamen quæ cineribus obrutæ torrentur, vulnerato prius in latere cortice, crudis & elixis innocentiores redduntur, præsertim si cum pipere & sale, vel saccharo edantur. Interior membrana rubens, qua albicans pulpa circumuestitur, ex vino austero pota duarum drachmarum pondere, sistit valenter immodicos omnes alui fluores, & sanguinis reiectiones. Quinetiam, cum pari pondere ramentorum eboris, albæ fœminarum profluvia cohibet, ex aqua albæ Nymphæe hausta. Iis vino maceratis, & cū farina subactis pessi vice vtuntur ad suppressendos menses.

Ibidem. DODO. Ex farina Castanearum cum melle fit electuarium vtile aduersus tussim & sanguinis sputum.

Li.2. Alim. PL. VALERIANVS. Castaneæ ex omnibus fortissimum quidem cibum corpori præstant, sed qui difficile concoquatur. Coctæ in carbonibus, vel in fictili sicco assatæ, & cum melle ieiunis datæ, tussientibus profunt. Aqua, in qua cum suo cortice decoquuntur, cœliacis, dysentericis, sanguinēque excreantibus bibenda, haud, inutiliter propinatur. Interior membrana quæ corticem fructūque discernit, ad tertias decocta in aqua, & potui data mirè aluū fluentem reprimat, adeo vt Diosco. putet etiam cathartico dato per hanc potionem iri obuiam posse, si plusquam necesse sit purget. Galen. tradit Castaneas omnium Glandium præstantissimas esse, & solas inter fructus agrestes alimentū corpori memorabile præbere. Sed animaduertendum has, quatinus plurimum nutrant, tamen in cibis frequenter comedendas non esse. Nam, vt alibi scripsit, siue in aqua coctæ, siue tostæ, siue etiam frixæ, semper esitātibus noxā inferūt, multoq; magis, si crudæ edantur. Idem alio in libro, inter cibos crassi succi numerat.

De tenui vict. SYMEON SETHI. Copiosum corpori alimētum præbent, tardè transeunt, & difficulter coquuntur. Crassum humorem, capitis dolorem, & flatus efficiūt: ventrem sistunt. Si torreantur, aut siccentur, multum nocuenti deponunt.

De bon. & ma. suc. PLIN. Proxima corpori membrana & in his, & in nucibus, saporem, ni detrahatur, infestat. Torrere has in cibis gratius. Moluntur etiam, & præstāt ieiunio fœminarum quandam imaginem panis. Matthiolus. Mitiores faciliè purgantur, harūque illæ principem locum tenent, quas vulgus *Marrons* appellat, quod cæteris sint maiores, sapidiore, speciosioresq;. In montibus aliarum frugum inopia, incolæ Castaneis hyeme victitant. Namque eas in cratibus primo exiccatas ab utroque cortice repurgāt, moluntq; in farinā, ex qua panē cōficiūt.

Ibidem. M NESITHEVS auctore Athen. Castaneas coctu difficiles esse tradit, & flatus parere. Si tamen à ventriculo victæ coquantur, vefcentes exhilarāt sagina, & ex strigosis crassos reddunt. Diphilus verò, & multū nutrire ait, & boni succi esse, sed difficile concoqui, quod in ventriculo morentur: tostas minùs quidem nutrire, sed faciliè confici, elixas flatuum minus excitare, sed magis nutrire. Maiores Castaneæ, quas à Galli *Marrons* vocari diximus, lautiores diuitū mēsas claudunt: minores pauperū saturant ieiunia: illas cineribus obrutas torrent igni, has in aqua excoquunt ad satiandam plebis auiditatem, vnde populares & coctiuæ

*Li.2. Deip-
nos.*

Athen. ibi.

Ruel. ibid.

coctiux à Plinio dicta, vt supra meminimus. Priusquam cineribus credantur, ferro vulnerari debent, vt plagæ hiatu spiritus igne citatus euadat, alioqui flantes flamma magno cum crepitu profiliunt, assidentium periculo. Flatus itaque his angustis elisus à noxa vindicabit, impetu in sibilum abeunte. Integrarum probatio est, vt in frigidam mittantur. Siquidem quæ sanæ sunt merguntur, supernatat quæcunque vexata est. Seruantur vel in cratibus dispositæ, vel intra sabulonem, ne inuicem tangantur immersæ, vel in vasculis fictilibus nouis conditæ, & loco sicciore defossæ: vel inclusæ virgeis ex Fago receptaculis, & lutatæ, vt spiracula non relinquant: vel hordei paleis immundissimis obrutæ: vel palustri vlua figuratis densioribus sportis reclusæ. Sunt qui filo transfixas cumulatim, & igni detostas asseruant. Indi, auctore Plinio, oleum ex Castaneis, non vinum, vt scripsit Curtius, conficiebant. Materies arboris ædificiis

Lib. 15. c. 7.
Lib. 25. c. 12.

CASTANEA

Equina.



CASTANEA

Humilis.



atque aliis domesticis vtenilibus admodum apta est: siquidem ex ea non modò fiunt trabes, tigna, asseres, & pedamenta, sed & cadi, & eorum cinctus. Verum igniariis inepta. Nouum Castaneæ genus exhibet Matthiolus, cuius neque veterum, neque recentiorum quisquam meminit. Huic Castaneæ Equinæ nomen. Arbor est spectatæ proceritatis, folio Pentaphylli, sed longe humana manu, imò etiam ricini folio grandiore, ex longo tenuique pediculo propendente. Echinos fert in cacumine, magnitudine nostratibus æquales, rufo colore, verum duriore ac crassiore putamine, aculeis raris, sed robustis firmisque, flavescentibus. Singuli singulos includunt partus, Castaneis nostratibus ferè similes, crassiores tamen, rotundioresque saporis optimi: cortice nigricante, præter quam anteriore parte, qua interno Echini putamini hæret, ea enim albicat, macula cordis effigiem præferente, quemadmodum in repentis vesicariæ semine videmus. Totus is cortex robustus est, simplex, nulla illi subiecta tunica, quali Castaneæ nostræ conteguntur. Hoc genus in Oriente nascitur. Hæ Castaneæ anhelosis & tussientibus equis valdè profunt deuorata. Quam ob causam Constantinopolitani Equinas Castaneas nominant. Humilem Castaneam, nemini antea notam non longè à Pilatino monte contemplatus Ioannes du Choul sic depinxit. Matura, nucis auellanae est magnitudine, Echinato calyculo, corio, membranæque tegitur. Sola nunquam suo calyculo includitur. Multæ simul racematim cohærent. Gustu est insuaui.

In li. 1. Dio
sc. ca. 122.
Nomen.

Forma.

Locus.

Li. de Qu.
Histor.

Nomina
Lib. 3. Hist.
cap. 10.

Genera
Theophr.
ibid.

F T s r Fagus hæc nostra propriè glandiferarum generis non sit, tamen cum Castaneæ modo nucleos Echinis contextos habeat, sæpiusque in syluis inter glandiferas arbores reperiatur, haud fuerit absurdum glandiferis eam subiungere. Quæ igitur ὄξυς à Theoph. dicitur, à Latinis Fagus, à Gaza Scissima, quod sit in laminas sectilis, ab Arabibus Chinaos, aut Chiachas, à Gallis Fau, Fouteau, & Hestre, ab Italis Faggio, à Germanis Buchbaum, aut Buchè, ab Hispanis Haia. Fructus vocantur nuces, & nuclei, Latinè Fagi, Gallicè Faine. Fagus altera montana, candida materia, altera cam-

FAGVS PICTA

à Matthiolo.



FAGVS PICTA

à Dodaneo.



Forma.

pestris, nigra. Arbor est abieti proceritate, crassitudineq; ferè æqualis, caudice recto, læui, enodi, in orbè comoso. Flores producit, qui nihil aliud sunt quàm iuli quidam lutei, caduci, betulæ iulis minores, cætera similes: folia crassa, leuia, latiuscula, subrotunda, Populo similia, minora, initio viridia, mox saturatæ viriditatis, celerrimè flauescencia, media superioréque parte plerúmque gignentia paruulam baccam, cacumine aculeatam, primum viridem, deinde rubentem, concavam, in qua vermiculi. Radices hæc Arbor nec multas, nec altas agit. Fructus nuclei sunt trianguli, læui cute, Castanearum modo in atrum, rubescente, echino inclusi, non spinoso, sed leni, blandoque, nec vt in Castanea pungente, cui nihilominus fructus similis est, & dulcedine, & succo. Lignum eius coloratum, robustum, neruosum. Neminem esse arbitror qui non hic sibi ante oculos positam esse videat Latinorum Fagum, quam à Græcorum Phago prorsus diuersam esse ex iis quos legi, qui hætenus de re herbaria commentati sunt, præter Valerium Cordum, & Iacobum Dalechampium, nullus apertè declarauit. Id tantum sub odoratus fuisse videtur Hermolaus, sic scribès. Duo genera siue nomina sunt Phagi, alterius glandè ferëtis, materiæ scabra, quam Græci φηγὸν appellant, vt fructum quoque Hippocrates, alterius quàm Græci oxyan,

Lydi

In li. 1. Dio-
scor. c. 145.

In c. 146. li.
1. Dioscor.

Lydi Myson, in Olympo eorū monte copiosam. Vnde Mysi populi, vt Strabo inquit, & Eustathius. Nostri Scissimam appellant, &c. Quæ omnia indistinctè capite de Fago transcripsit Ruell. Fagum Matthiolus legit in Diosc. glandiferis arboribus adnumerari, tamen si fructus effigiem glādibus prorsus reclamare videat. Bellonius scribit arborem quam vocamus *Foutau* frequentissimam esse in monte, cui nomen Athos, & ab omnibus vocari Oxiam. Et alibi. Magna pars arborum syluestrium quæ in his montibus reperiuntur, sunt *Haiſtres*, quas Græci vocant Ostrias, & *Fouteurs*, quas vocant Oxyas. Quantum verò Fagus hæc à Theoph. phago differat, ostēdimus, cum τὴν φηγὸν Quercus speciem describeremus. Fagus est in mōtibus copiosa, in Galliæ, Germaniæ, Carinthiæ, Stiriæ, Carniolæ syluis frequens. Plinius. Fagus amat plana, loca item aprica, ac humida. Flores foliæque profert sine Aprilis, aut Maio mense. Nuces Septembri maturantur cum Castanea. Folia Fagi refrigerant. Nuclei nonnihil humidi calidique sunt. Folia recentia tusa & imposita calidis tumoribus prosunt, eosque discutiunt. Admouentur etiam pustulis, atque vlceribus. Manducantur in gingiuarum labiorūque vitiis. Tusa illatæque, torpentia membra corroborant. Calculis glandis fagineæ cinis illinitur: item cum melle, alopeciiis. Nucleorum sapor dulcis & substringens, inquit Matth. Glires hoc pabulo maximè delectantur, ac pinguescunt. Quamobrem cū maturuit, innumeri capiūtur glires in Carniolæ, Stiriæ, & Carinthiæ syluis. Incolas mane inspicias faccos gliribus vna nocte captis plenos reportantes. Delectantur Fagi fructu etiam mures, cuius rei gratia è longin, quo natura ducti, gregatim syluas ingrediuntur. Item & sciuris gratissimus est cibus, ac etiam turdis, merulis, aliisque auibus. Quin & obsessos ab hostibus in oppido Chio, ea tantum glande victitasse Cornel. Alexander est auctor, donec se obsidione liberassent. Nucleorum Fagi, inquit Dodon. nullus vsus est: dulces tamē sunt, & edules, ad ea omnia ferè vtilis, ad quæ nuclei Pinei. Aqua quæ in cauis Fagis reperitur, hominum, equorum, boum, ouiumque scabiem, & impetigines, si ea lauentur, sanat, id quod se in pecoribus & hominibus expertum fuisse scribit Tragus. Cortex Fagi, auctore Plinio, in magno vsu agrestium. Vasa, corbēsque, ac patentiora quædam mēsisibus conuehendis, vindemiisque, faciunt, atque prætexta tuguriorū. Nec non in quodā vsu sacrorū religiosus est Fagi cortex. Facilis & in opere Fagus, quanquā fragilis & tenera. Eadē sectilibus laminis in tenuia flexilis, capsisq; ac scriniis sola utilis. Apud antiquos & vasis honos. Manius Curius iurauit se ex præda nihil attigisse, præter guttum Fagineum quo sacrificaret. Vipera teste Ruellio, Faginei ramuli ictu, vel oblatu cohibetur.

Lib.1. c.78.
In cap.121.
lib.1.
Lib.1. Obs.
cap.42.

Ibid. ca.52.

Cap.1.
Locus.

Lib.6. c.18.

Tempus.

Temper.

Dod.lib.6.
cap.76.

Vires.

Trag.lib.3.
cap.73.

Dod. ibid.

Plin.li.24.
cap.5.

In li.1. Dio-
scor.ca.121.

Ibidem.

Ibidem.
Lib.16. c.9.

Plin.lib.16.
cap.43.

Lib.2. c.88.
Plutar.h.1.
Symp.

CEDRVS CAP. XI.



QVAM Matthiolus ingeniosè de resiniferis atboribus tractarit, copiosè etiam Bellon. libro huic rei dicato, ea res tamen detertere me non debet, ne quæ de iis longa obseruatione, & Græcorum Latinorumq; auctorum scriptis comperta mihi sunt, hîc perscribam. Primū earum differentias explicabo. Deinde singularum Historiam naturāque persequar. Resiniferæ omnes, & iis folio similes arbores, aut bacciferæ sunt, siue aciniferæ, aut coniferæ. Bacciferæ, Oxycedrus, Thiya Mafsiliēsis, seu Cedrus Lycia Bellon, Cedr° Lycia Matthioli, Lētiscus, Terebinthus, Taxus, Sabina Cupresso similis, Sabina Tamarici similis. Coniferæ sunt Cedrus Phœnicia, Pinus, Pinaſter, Teda. Picea, Abies, Larix, Cupressus, Thiya, altera, siue Arbor vitæ Bellonij. A Cedrorū historia exordiar, recentioribus non

In li.1. Dio-
scor. de arb.
comf. &
resin.

fatis

HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

CEDRVS PHOE-

nicia nostra.

CEDRVS PHOE-

nicia Matthioli.



fatis rectè, vt ego quidem sentio explicata, quos Plinius perperam intellecta, ob rerum ignorationem Theophrasti oratione, in errorem induxisse videtur.

Genera.

Nomina

Lib. 3. Hist. cap. 12.
Lib. 13. ca. 5.
Theoph. li. 5. Hist. ca. 9.
Ibidem.
Cap. 8.
Lib. II. c. 17.
Lib. I. Hist. c. 15. & li. 6.
Caus. c. 21.
Lib. I. Hist. cap. 16.

Ac primùm Cedrum in sua genera partiar, quibuscum singulorū nomina declarabuntur. Eius duo genera. Phœnicia & Lycia. Phœnicia (sic quam φοινικην Theophr. dixit, Plinius interpretatus est, Gaza ineptè Punicam) à Phœnice quæ Syriæ pars est, dicitur, à qua Syria, etiam Syriaca, quod illic nascatur, & ea, qui Phœnicen & Syriam incolunt, ad nauium fabricam vtantur Pini vice. Cedrelate quoque nuncupatur, quia proceritate τὴν ἐλάτην, id est abietem æquat. Dendrolibanus in Geoponicis. Arabes *Serbin*, Galliæ *Cedre*, Italicè *Cedro*, Hispan. *Cedro*, Græci κέδρος. Cedrus Lycia est, quam Oxycedrū etiam appellant, Theoph. κεδρεία, Gaza Cedrulam. Quodam tamē loco κεδρίας pro κεδρείδος mendosè legitur, quod Gaza cū non animaduertisset, Cedrias conuertit. Cedrides multitudinis numero sunt Dioscoridi, & Galeno, Oxycedri baccæ. Cū igitur hæc duo sint Cedri genera, Dioscorides, vt in sincerioribus & incorruptioribus libris reperitur, κέδρος, inquit, δένδρον ἐστὶ μέγα, ἐξ ᾧ ἡ λεγομένη κεδρία σιμώγει) ἢ διὰ λεγομένη κεδρίς, vel vt alij, ὀξύκεδρος, vel κέδρος μικρά, φύλλα καὶ κάρπον ἔχει ὥσπερ ἄρκευθος, μύρτις μέγεθος, περιφερῆ. Vel, vt ex Codice Catacuz. Constantinop. legit Matthiolus: Κέδρος δένδρον ἐστὶ μέγα, ἐξ ᾧ ἡ λεγομένη κεδρία σιμώγει). κάρπον δ' ἔχει ὥσπερ, κυπάρισσος, μακρότερον μὲν ὄφθαλμῳ πολὺ. λέγει) ὃ καὶ ἄλλη κέδρος μικρά, ἀνανθώδης ὥσπερ ἄρκευθος, φέρουσα κάρπον μέγεθος μύρτις, περιφερῆ. Rectè etiam Galen. Cedrum duplicè esse prodidit. Vnam fruticosam similem Iunipero, alteram arborem magnam. Vtrique Cedro folium Iunipero simile est, sed durius, acutius, spinosius Oxycedro. Præterea vtraque ὑψηλὰ φουεστέρα ἐστὶν ἢ ἄρκευθος, sic enim in Theophr. legendum, id est procerior est quàm Iuniperus. Sed præstat ipsas sigillatim delineare. Cedrus Phœnicia, siue Syria, radicibus multis & crassis nititur, non altè descendens (quod rationi consentaneum est in saxosis & asperis huius arboris natalibus) sed per summam terram vagantibus, caudice recto, maximè procero,

Li. I. Diosc. cap. 89.

Lib. 7. sim.

Lib. 3. Hist. cap. 12.

Forma Cedri Phœn.

procero, alias quasuis arbores supereminēte, ab imo sursum versus gracilescen-
te arbore, vt eminus conspicientibus metæ modo turbinata appareat, quoniam
rami inferiore trunci parte latè circumfusi, & in orbem procul ab arbore expa-
tiantes, quo propiùs ad fastigium acceditur, eo minores breuiorēque sunt.
Cortice est glabro, & quasi arte polito, præsertim superne (nam in annosis &
vetustis rimosus est, & scaber in ima caudicis parte, ad primum vsque ramo-
rum ordinem) tenui, cinereo, cum vnguibus scalpitur, virente, cum pro-
fundiùs vulneratur, rubro. Rami non quidem proni, sed subrecta diuisura
ad cælum tendentes, pœnè statim ab radice, veluti brachia transuersim lateri-
bus inhærent, arborem ad scandendum facilem præbentes, vt si quis in pri-
mos subsilierit, ad verticem vsque facile euadere. Ij licet vndique
stipitem ambiant, sinuoso tamen quodam flexu truncum aspici permittunt,
& sursum maiores repandi oneri quidem pertinaciùs renituntur, at si quis pli-
cet, valido crepitu fragiles vno ictu dissiliunt. Minores autem pectinatim fili-
cis modo in maioribus digeruntur. Folia huic sunt Laricis, nunquam deci-
dentia, breuia, angusta, crebra, summo mucrone rigidiuscula, non tamen
aculeata, ex quouis furculorum tuberculo simul numerosa, vt interdum qua-
dragena, vel quinquagena ex vno nodo prorumpant, ita per furculum dispo-
sita, vt tandem extremum furculi verticem coronantia pictorum penicillum
referant, odorata, subacida, & cum amaroris paxillulo adstringentia. Conos
fert hæc Cedrus recta cælum spectantes, quod huic & Abieti peculiare est, Pi-
neis graciliores, Abiegnis crassiores, maiores, duriores, quinùm vel senū digi-
torum longitudine, subfuluos, obtusos, compactili squamarum strue coagmen-
tatos, ramis sic hærentes, vt non nisi abstracto secum rami frustulo reuellantur.
Porro hi dum hiantes recluduntur, subeunte rore ac pluuia madescunt, & fin-
duntur, tùmque relicto ac nudato pediculo firmo, qui per medium coni tra-
ducitur, circumstantes squamæ defluunt, sed hoc non nisi post biennium: an-
no enim vt maturescant opus est. Hunc pediculum malè Bellon. scribit vocari
hastulam à Plinio, cùm illic assula legatur, non hastula, & Cedri nulla fiat men-
tio, sed Piceæ. Verba Plinij hæc sunt. Aperitur Picea à parte solari, non plaga,
sed vulnere ablati corticis, cum plurimum bipedali hiatu, vt à terra cubito cum
minimùm absit. Nec corpori ipsi parcitur, vt in cæteris, quoniam assula in fru-
ctu est. Semen fert Abieti simile, vinaceo magnitudine par, gustu dulce, quale
Pini est, oleoso quodam succo præstantissimi odoris circumfusum. Ex hac Ce-
dro Phœnicia duplex resina, siue Cedria colligitur, vna liquida Abietis resinæ
similis, quæ manat ex tuberculis in caudicis adhuc tenello, nec dū rugoso cor-
tice multis, quæ adacto cornu, vt in Abiete fit, rustici pertundunt. Alteram du-
rescentem, ac in arbore ipsa coëuntem Cedri sponte sua sudant. Mansa denti-
bus tam pertinaciter adhæret, vt vix auellatur. Naribus admota odore suauis de-
lectat, & tanquam fraga redolet, quod Dioscoridi planè aduersatur, à quo
Βαρῆα τῇ ὀσμῇ, id est grauis odoris Cedria esse dicitur. Sed locum hunc ex vetu-
stissimo Codice manuscripto Matthiolus emendauit, in quo legitur, *Ὀτρος τῇ
ὀσμῇ*, id est vehementis odoris, seu vehementer odorata, cui adstipulatur Verg.

Vrit odoratam nocturna in lumina Cedrum.

Id ante Matthiol. Marcellus animaduertit, validi odoris esse Cedriam inter-
pretatus. Dicitur Cedria Gale. *κεδρεία*, Arabibus *Kitran*, & *Alkitran*, de qua Bel-
lonij opinio à Matthiolo reprehenditur, & merito quidem. Etenim Ce-
driam ex qualibet resiniferarum materia, modò pinguis sit, promiscuè fieri
tradidit: nempe, ex Larice, si materia pinguis sit, Cedriam manare, ex Cupresso,
Betula, Iunipero, easdēque vires, quas veteres veræ Cedriæ, defuncta, scilicet

Plin. lib. 16.
cap. 21.

Lib. 1. de
Conif.
Lib. 16. c. 12.

Lib. 1. c. 89.
Lib. 7. Aen.

Ibidem.
Lib. 7. sim.

Lib. 16. c. 11.

In li. 1. Dio
scor. ca. de
Ced.Lib. 15. ca. 7.
Locus.

Lib. 5. ca. 9.


Li. 16. c. 40.

Forma
Oxyce-
*dri.*Lib. 3. Hist.
cap. 12.
Lib. 13. ca. 5.
Ibidem.

Ibidem.

corpora conseruandi, & viuentia corrumpendi, iis tribuere videtur, & in eam opinionem Plinij verbis adductus, scribentis Picem in Syria Cedrium vocari. Locus est eiusmodi. Pix liquida in Europa è teda coquitur naualibus muniendis, multosque alios ad vsus. Lignum eius concisum furnis vndique igni extra circumdato feruet. Primus sudor aquæ modo fluit canali. Hoc in Syria Cedrium vocatur, cui tanta vis est, vt in Ægypto corpora hominum defunctorum eo perfusa feruentur. Ex quibus id solum intelligi potest Syros liquorem illum qui primus ex Cedri assulis fluxerit, Cedrium vocasse, quia ex Cedro tantum picem coquebant, vt in Europa ex teda. Cedri itaque auctore Hermolao, modò Cedri magnæ Pix, modò Cedri resina vocatur, quæ nihil est, si propriè loquendū sit, quàm cruda Cedri lacryma: Cedrium verò succus Cedri est, è teda eius concisa & accēsa in furnis, qui primus aquæ modo fluxerit in canali. Nam sequens Pix iam est, non Cedrium. Sed confundūt auctores, nunc pro resina, nunc pro sudore tedarum, nunc pro Pice Cedriam & Cedrium vsurpantes, interim pro oleo Cedrino, quod Cedrelæon ex malis Cedri, vt ait Plinius, appellant. Omnibus enim iis quanquam diuersis, eadem natura inest. Cedrus Phœnicia gignitur in editis, niuosis, & gelidis montibus, Amano, Tauro, Libano, vnderamos ex quibus vnum hîc appictum videtis, adferendos curauî, amici cuiusdam oneraria naue ex Tripoli reuertente, non in quauis montium parte, sed riguis & humidis, niuèque ferè semper obrutis eorum crepidinibus, & præcipitiis, in opacis conuallibus, propè torrentium margines. Theoph. In Syriæ montibus Cedri admiranda longitudine spectantur, tantæque crassitudine, vt sint quæ trium hominum vlnas complectentium impleant. Plin. In Ægypto & Syriæ reges inopia Abietis Cedro ad classes feruntur vsi. Maxima ea in Cypro traditur, ad vndeciremem Demetrii succisa. 130. pedum, crassitudinis verò ad trium hominum complexum.

OXYCEDRVS.



Oxycedrus, siue Cedrus Lycia, Cedro Phœnicia minor, Iunipero maior, radices laxas & raras per summam tellurem dispergit, cortice Cupressum emulatur, vt ait Theophrast. non semine, vt malè Plin. Iuniperi modo, eodem Theophrast. auctore, nodosam, distortam, in alas multas diuisam materiam habet, & in ea cor rubrum. A Iunipero tamen differt, quod Iuniperi materies parua sit, inodora, minimè densa, cùm excisa fuerit statim putrescens, Oxycedri verò tam spissa, vt maxima ex parte corde constet, putredini non obnoxia, odore grato. Sic enim locus is Theophrasti ex integrioribus libris est emendandus: ὁζώδη δὲ ἀμφω (Iuniperus, scilicet, & Oxycedrus) καὶ πολυμίσχαλα, καὶ ἐπετραμμένα ἔχοντα τὰ ξύλα. μᾶλλον δὲ ἢ ἄρκυθος ἢ ἔχει ἔχει μήτραν, καὶ πικρὴν, καὶ ὅταν κοπῇ ταχὺ σηπορδύνει. ἢ δὲ κέδρος δ' ὡλεῖται ἐγκάρδιον καὶ ἀπὸ πέρ, &c. Folia huic sunt Iunipero similia, sed duriora, acutiora, spinosiora. Baccas fert Iuniperinis similes, initio virides,

des, deinde flauas, postremo rufescentes. Theoph. *κάρπος δὲ ὁ μὲν τῆς κέδρου ξανθός, μύρτις μέγεθος ἔχων, ὁσώδης, ἡδύς ἐσθλὴ*. id est, Oxycedri fructus flauus est, myrti magnitudine, odoratus, esu suauis, non vt Gaza conuertit, odoratus pulcher, gustatūque suauis. Is est in arbore sua perpetuus, vt antecedentem nouus occupet, vel vt narrant Arcades tres simul fructus habet. Vnum proximè exacti anni, nondum maturum, alterum hunc annum proximè exactum antecedentis, iam maturum & edulem, tertium nouum, iam prodeuntem. Hos fructus siue baccas *κεδείδας* etiam à Diosco. & Galeno dici quid prohibet? Nam maioris Cedri fructus sunt coni, quibus quæ *περὶ τῶν κεδείδων* scripserunt auctores illi competere vix possunt, neque in iis incluso semini, quod *σπέρμα*, opinor, vt & Plinius semen, vel *σπέρμα* appellassent, non fructū, neque baccas. Plin. de vinis factitiis loquēs. E fruticū verò genere inquit, Cedri vtriusque, Cupressi, Lauri, Iuniperi, Terebinthi, Lentisci, Baccas aut lignū musto decoquunt. Quo in loco animaduertendum Plinium oscitanter vinum ex vtraque Cedro dixisse pro Cedrino, & Cedrite, quorum alterum fit ex Oxycedri baccis, alterum è Cedria. Eodem ex loco Dioscorid. scriptura de iisdem vinis factitiis sic emendanda. *γίνεῖ δὲ καὶ ἐκ τῆς καρπῆς τῶν μόνων κέδρων οἶνος*. Quem ille *κάρπον*, Plinius Baccas appellauit, cui consentiunt quæ mox in Diosc. sequuntur. *γίνεῖ δὲ ἐκ τῆς τῶν ἀρκυθίδων καρπῆς ὁμοίως τῶν κεδείτων*. Fit etiā vinum è Baccis Iuniperi, non aliter quàm Cedrites. Quod verò Dioscor. scribit, *κεδείδες ὅ καλεῖται οἱ ἐξ αὐτῆς καρποὶ*, in plerisque exemplaribus Asterisco notatur, qui falsi locum suspectū esse significat, vt omnino legēdum putem, *κεδείδες ὅ καλεῖται τῆς ὀξύκεδρος καρποὶ*. Quod si quis vulgatam lectionem mutare nolit, Cedrum hīc minorem intelligemus, & eius Baccas Cedridas, quemadmodum in Galeno, cū scribit Cedridas fructus esse Cedri, sicut alio in loco perspicuè vsurpat, cū ait, Cedridas nominant Cedri fructum, qui colore & figura fructui Iuniperi est similis. (Subflauus enim est ac rotundus,) dissidet autem ab eo acrimonia. Nec multū abest, quin fructus hic ex genere sit medicamentorum, quæ nullum præbent corpori alimentum, nisi quis aqua ipsum macerarit. Quinetiam vt fructu Iuniperi durior est ac siccior, ita profecto exilior, vt nihil ille habeat aromaticum. Perspicuū autem est, quod & stomachum valde mordet, & capiti dolorem infert, nisi quis ipsum parcissimè sumpserit. Hæc Galen. quæ de Baccis Cedri minoris, siue Oxycedri, non de conis Cedri maioris intelligenda quis non videt? Gaudet Oxycedrus saxoso & frigido solo. Fundi tautē gummi durum, pellucidū, mastiches tam simile, vt hæc ferè sola nota internoscatur, quod mastiche mansa in ore coit, ac spissescit, Oxycedri verò gummi, in tenuissimum puluerem friatur, nec cogitur. Id gummi, vt & Iuniperi, vulgus Vernicē appellat. Præterea ex Oxycedri lignis assulatum concisis, toto Mafsiliensi tractu pastores & rustici picis liquidæ genus, de quo idoneo loco dicetur, nigrum videlicet ac foetidum liquorem oleosum eliciunt, quem sua lingua corrupto Cedri vocabulo *Huille de Cade* nominant, ad scabiem canum & pecorum, ac cimices necandos præstantissimum, sed odoris planè abominandi. Matthiolus tria Cedri genera depinxit, ac declarauit, Cedrū maiorem mōtis Libani, siue Cedrelatē, quam ille breuius, nos fusiùs descripsimus, iisque addidit quæ de ipsa in Plinio & Theophr. scripta passim reperiuntur: Cedri minoris genera duo: Phœniciam folio Iuniperi, sed duro, acuto, spinoso, quæ & Oxycedrus appellatur. Lyciam cui folium est minus, densius, multo minus aculeatum, quæ paruam Iuniperum quodammodo refert, corticēque obducta est rubro, & ramos emittit lentos, vitilium modo. Vtraque, inquit, omni tempore fructum fert, sed Oxycedrus maiorem, ac pulchriorem. Frequentissima, inquit, nascitur in Istria, & in quibusdam Iapidia locis,

Ibidem.

Lib.13. ca.5.

Li.14. c.16.

Lib.5. c.45.

Lib.1. c.89.

Li.2. Alim.

Locus.

Ibidem.

Genera.

Iunipero admodum similis, nec nisi fructu distans, maiore, rubente, dulci. Lycia in quibusdam Moraviæ montibus, cuius folia si digitis terantur, odorem suavisimum spirant, illi ferè similem qui in Pinorum Strobilis percipitur. Baccæ multo quàm Phœniciæ minores ex ramusculorum summitatibus prodeuntes, primò virides, deinde flavescentes, postremò cum maturæ fuerint, rubentes. Odoratae sunt, & gustui subamaræ. Harum primam Cedrum Phœniciam, secundam Cedrum Lyciam siue Oxycedrum esse ex Theophrasto satis mihi videor demonstrasse: tertiam raram sanè & egregiam plantam in Moraviæ montibus nascentem, quidam Thyiam Massiliensium esse putant, negligentius depictam, de qua posthac tractabitur: alij Thyiæ genus à Massiliensi diuersum. Similiter Cedrus Phœnicia Bellonij vera Oxycedrus est, siue Lycia Cedrus: eiusdem Lycia Cedrus Thyæ genus est Baccis rubris insignis. Hos insecutus Dodon. aliam esse Cedrum maiorem scribit, aliam minorem. Maiorem Cedrelaten & Cedrum Coniferam vocari: minoris duo esse genera, vnum, quod folio est aculeato, veluti Iuniperus, alterum, quod folio est minimè aculeato. Hoc Cedrum Lyciam vocat, quam Thyæ genus esse iam dixi: illud Oxycedrum, siue Cedrum Phœniciam, quam ego Cedrum Lyciam veram, siue Oxycedrum esse ostendi. Lonicerus Cedri magnæ, paruaq; seu Oxycedri figuras, vires, vsúmque commiscet, ac confundit. His tenebras offudit Plinius, qui velut aliud agens, imo oscitans admodum, Cedri differentias ex Theophr. exscripsit. Iuniperi similem habent Phœnices, & Cedrum minorem. Duo eius genera Lycia & Phœnicia. Differunt folio. Nam quæ durum, acutum, spinosum habet, Oxycedrus vocatur, ramosa, & nodis infesta. Altera odore præstat. Fructum ferunt myrti magnitudine, dulcem sapore. Item: Maioris Cedri duo genera. Quæ floret fructum non fert: frugifera non floret, & in ea antecedentem fructum occupat nouus. Semen eius Cupresso simile. Quidam Cedrelaten vocant. Et mox. Cedro similis est in Arcadia arbor: in Phrygia Frutex vocatur. Hæc Plinius, qui primùm contra Theophrasti sententiam scripsit, minoris Cedri duo esse genera, maiorisq; totidem, & Phœnicibus Cedrum minorem esse Iuniperi similem. Nam cum ille duo duntaxat quorundam sententia Cedri genera constituisset, τοῖς ἐν τῇ Ἰδῇ, id est Idæ incolis, non Phœnicibus vnicum genus esse ait Iunipero simile, quæ Oxycedrus nominatur: quarum Iuniperi, scilicet & Oxycedri similitudinem, dissimilitudinémque, deinde fusius persequitur, Has quam negligenter Plinius confuderit, expendamus. Ramosa, inquit, Oxycedrus, & nodis infesta. Theophr. ὁζῶδης δὲ ἀμφοῦ, & πολυμάχαλα, καὶ ἐπετραμμένα ἔχοντα τὰ ξύλα: id est, nodosam Iuniperus & Cedrus, in multasque alas diuisam, & contortam materiam habent. Altera odore præstat. Quasi verò altera inodorata sit. Duas enim Cedros minores hîc à Plinio comparari declarant præcedētia. Duo eius genera, &c. At quæ sequuntur, fructum ferunt, &c. Theophr. καὶ ἡ μὲν τῆς κέδρου, ὕλη, subaudi, ὁζῶδης, ἡ δὲ ἑτέρα ὕλη. id est, Cedri materia odorata, Iuniperi verò minimè. Et, maioris Cedri duo genera. Quæ floret fructum non fert: Fructifera non floret. Vnicum maioris Cedri genus esse iam ostendimus, quæ in monte Libano prouenit, florétque vt Picea: baccas autem non producit, sed Conos. Oxycedrus autem siue Cedrus Lycia, siue Cedrus minor non floret, sicuti nec Iuniperus auctore Theophr. sed baccas fert. Quare sunt qui hunc Plin. locum sic legant. Quæ floret baccas non fert, baccifera non floret, id quod verum est. Semen eius, ait Plin. Cupresso simile. Theophr. τὸν δὲ φλοιὸν ὅμοιον δοκεῖν κυπαρίττι, τραχύτερον δὲ. id est, corticem Cyparisso similem videri, sed scabriore.

Sequi

Sequitur in Plinio, Cedro similis est in Arcadia arbor, in Phrygia frutex vocatur, perperam: sic enim Theophrast. *οἱ δὲ μνοφδῆ, χαθάρπερ οἱ ἐν τῇ Ἰδα*: alij vnicum genus esse dicunt, vt Idæ montis incolæ. De Cedrorum & Cedridum viribus hæc Dioscorides. Cedriæ vis inest, vt defuncta corpora conferuet, & viuentia corrumpat, qua ex causa mortuorum vitam aliqui appellauere. Vestimenta quoque & pelles eximia calefaciendi & siccandi dote corrumpit, magni ad ocularia medicamenta vsus. Quippe illita oculis claritatem affert, albugines & cicatrices detergit, instillata autem cum aceto vermes aurium necat: cum Hyssopi decocto infusa sonitus, sibilosque sedat: cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat: idem facit cum ex aceto colluitur. Quod verò sequitur, Peruncto ante coitum genitali abortiuum fieri constat, non rectè conuertit Ruell. non ad Dioscorid. sed ad Plinij sensum potius accommodans. Sic enim scribit. Portentum est quod tradunt, abortiuum fieri in venere ante perfusa virilitate. Ille verò sic. *περὶ χειρὸς θέντα ὃ ἀιδόω πρὸς τὴ σωσσίας ἀτόκιον ἐστὶ*, id est, Cedria ante coitum genitali circumlita conceptionem impedit, & spem partus adimit, id enim significat *ἀτόκιον*, quod Cornar. & And. Lacu. bene annotarunt. Pergit Dioscor. Anginæ ea perunguntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est, lendes pediculosque illitu enecat, cerastæ moribus cum sale imposita subuenit, contra hausta Leporis marini venena in passo sumpta auxiliatur: in elephantia, aut linctu, aut perunctione proficit, pulmonum vlcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat. Vermes & tineas subter indita necat, & partus extrahit. Fit & oleum à Cedria separatum, dum coquitur, velleribus supra halitum eius expansis, vt in pice, eiusdem ad omnia vsus: priuatim viriliter perunctum scabiem quadrupedum, canum, bouumque persanat, inhærentes ricinos enecat, vlcera quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatricem perducit. Cedrides calfactoriam vim habent, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ, menses ciunt ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur: serpentes fugantur peruncto ex adipe ceruino, aut medulla corpore: in antidota adduntur. Hæc à Galeno sunt dilucidius explicata. Vtraque Cedrus ait, calidæ siccæq; temperaturæ est, tertij quodammodo ordinis in vtroque. Cæterum Cedria (vocatur ita Cedri oleum) quartum etiam ordinem videtur attingere, admodum calida simul & tenuium partium. Mollem itaque carnem promptè, ac citra dolorem putrefacit, sicut alia omnia, quæ cum eiusdem sint in calefaciendo ordinis, adiunctam etiam habent substantiæ tenuitatem. At in duris plusculo tempore & vix effectum potest consequi. Porro talia omnia medicamenta vocantur Septica, & Septa, sed inter sese maioris minorisque ratione dissident. Est autem in hoc genere medicamentorum ex primo & infirmissimo ordine Cedria: pleræque enim eorum admodum sunt efficacia. Talia itaque & mortuorum corporum carnes corrumpunt, at Cedria exsiccat, simulque à corruptione tuetur corpora demortua, vtpote humiditates eorum depascens, cæterum solida corpora haud attingens. At in viuentibus calor ipse qui in corporibus est, Cedriæ vires adaugens, causa efficitur, vt teneræ ab ea carnes deurantur. Nec mirum videri debet, si cum tanta polleat potentia, lendes, pediculos, & tineas, & in auribus vermes interficere possit, tum foetum quidem viuentem interimat, mortuum autem eiiciat, sicut sanè etiam semen corrumpit, coitus tempore pudendo circumlita. Proinde conceptui aduersum est medicamentum, si sic vtaris, nulli secundum. Alia quidem multa eiusmodi particulatim efficit. Itaque argumentum est ipsum valenter

Vires.
Ibidem.

Li. 24. ca. 5.

Embl. 84.
lib. 1. in an-
not. in Dio-
scor.

excalfacere, sicut vbi dentium foraminibus instillatur. Siquidem dolores eorum mitigat, & ipsos confringit. Extenuat quoque oculorum cicatrices, & visus hebetudini ab humorum crassitudine ortæ medetur. Porro quod eius est pinguißimum, & ad vnguenti oleosum, suspensis supra eam dum coquitur lanis exceptum, ac collectum, tota Cedria tenuius quidem est, sed minus acre, quanquam non minus excalfaciens. Quare illa crassior & mordacior est, maiore aperiendi facultate prædita. Itaque vulnera irritat, phlegmonasque in illis excitat. Oleosa verò illa Cedria adeo clementibus est viribus, vt plebeij experientia docti, ouibus tondendo illata à forfice vlcera illitu sanent, sicut etiam pice humida. Vtuntur etiam ea ad ouium scabiem, & ad ricinos. Cedrides moderatiores vires obtinent, adeo vt comedi possint. Si tamen liberalius iis vtare, capiti dolorem inferent, ardoremque ac morsum in ventre efficient. Plinius inquit eadem magna ex parte, quædam aliter tradidit. Cedrus magna dat picem, quæ Cedria vocatur, dentium doloribus vtilissimam: frangit enim eos, & extrahit, dolores sedat. Cedri succus ex ea quomodo fieret, diximus, magni ad lumina vsus, ni capitis dolorem inferret. Defuncta corpora incorrupta æuis seruat, viuientia corrumpit, mira differentia, cum vitam auferat spirantibus, defunctis pro vita sit. Vestes quoque corrumpit, & animalia necat. Ob hoc non censeam in anginis hoc remedio vtendum, neque in cruditatibus, quod suaseret aliqui, gustandum. Dentes quoque colluere ex aceto in dolore timuerim, vel grauitati, aut vermibus aurium instillare. Portentum est quod tradunt, abortiuum fieri, in venere ante perfusa virilitate. Phthiriasis perungere eo non dubitauerim, itemque porrigines. Suedent & contra venenum marini leporis bibere in passo. Facilius in Elephantiasi illinatur. Vlcersa fordida, & excrementa in iis, auctores quidam, & oculorum albugines caliginisque inunxere eo, & contra pulmonis vlcersa cyathum eius sorbere iusserunt: item aduersus tineas. Fit ex eo & oleum, quod Pisselæon vocant, vehementioris ad omnia eadem vsus. Cedri scobe serpentes fugari certum est, item baccis tritis cum oleo, si qui perungantur. Cedrides hoc est fructus Cedri tussim sanant, vrinam cient, aluum sistunt, vtilis ruptis, conuulsis, spasticis, stranguriæ, vuluis, admoti: contra lepores marinos, eademque, quæ supra, collectionibus, inflammationibusque. Hippocrates Cedrum Creticam in vino coctam in vteri exulceratione infundere præcipit, & Cedri ramenta suffire. Idem vinum Cedrinum bibendum præscribit, quum vteri velut ad viscera conuersi strangularint. De vino autem Cedrino & Cedrite, vide Dioscor. Cariem vetustatemque non sentit Cedrus, auctore Plinio. Cedri oleo peruncta, materies, inquit, nec tineam, nec cariem sentit. Quare simulacra deorum ex Cedro factitabant. Salomon templum Domini concameravit lignis Cedrinis. Templi Ephesiæ Dianæ, quod tota Asia extruente quadringentis annis peractum est, tectum ex Cedrinis trabibus fuisse conuenit. Memorabile & Vticæ templum Apollinis, vbi Numidicarum Cedrorum trabes durant, ita vt positæ fuerant prima eius vrbs origine, annis mille centum octoginta octo. Numæ etiam libros chartaceos durasse ad annos quingentos triginta quinque, terræ infossos narrat Plinius, quod Cedrati essent. Ab hac materiæ arboris æternitate. Digna Cedro dicuntur, quæ immortalitate digna esse iudicatur, atque eiusmodi, vt posteritati consecrari debeant. Horatius. *Speramus carmina fingi Possè linenda Cedro.* Item Persius. *Et Cedro digna locutus.* Ausonius ad Libellum. *Huius in arbitrio est seu te iuuenescere Cedro, Seu iubeat diris vermibus esse cibum.* Cedrus etiam ad naues fabricandas aptissima, & ad ædium tecta perutilis. Rimam fissuramque non capit, neque etiam clauum tenet.

Lib. 24. c. 5.

De natur.
mulieb.
Lib. 2. de
morb. mul.Lib. 5.
Lib. 16. cap.
40. 39.Lib. 3. Reg.
cap. 6.
Plin. Ibid.

Lib. 13. c. 13.

Theophr.
lib. 5. Histo.
cap. 8.
Plin. lib. 16.
cap. 40.

PINUS ET PICEA CAP. XII.

PINUS à Theophr vt ego equidem cum Matthiolo sentio, *πύκη* dicitur, Picea *πίτυς*. Contrà multi, in quibus est Bellonius, *πέυκη*, Piceam, *πίτυν* Pinum interpretantur, quadam fortasse nominum vicinitate ducti, quam habet *πέυκη* cum Picea, & *πίτυς* cum Pinu. Sententiam nostram multis rationibus confirmare nos possumus. Theophrast. *τῆς πέυκης* nucem *εἰρόβιον* appellat, quæ vox, eorum qui Galenum, aliosque Græcos auctores Latinos fecerunt, testimonio, nucem Pineam significat. Galen. Nux Pineæ boni ac crassi est succi, multumque nutrit, non tamen facile coquitur. Appellant autem nunc Græci ipsam non *κῶνον*, sed *εἰρόβιον*. Alibi. His crassior nec ipse mali succi nucleus pineus, idest *ὁ κῶνος*, quem veteres etiam strobilum dixere: ac rursus: Coni fructus, quem quidam Coccalon nuncupant, & strobilum, esculentus est; sed nutrimentum coctu difficile præbet, quod de Piceæ fructu (*πίτυς* enim nucem etiam *κῶνον* idem Theophr. appellat) intelligi non potest, cum is edulis non sit, eodem Bellonio auctore. Adhæc Theophr. *τῆς πέυκης* duo constituit genera, satium, & sylvestre: at Piceam nullus vnquam opinor, in hortis cultam vidit, Pinum vident omnes. Præterea *τὴν πέυκην* in Idæam, & maritimam, idem diuidit, quæ duo Pinorum genera nobis nota sunt, Picearum verò minimè, quas non nisi in frigidis, niuosis, & excelsis montibus nasci, nunquam in maritimis, compertum omnes habent: postremò picem copiosam *ἐκ τῶν πευκῶν* fieri scripsit Theophr. atque earum proprium esse, vt in tedam abeant: at nobis perspicuum est ex pinorum nostrarum, nom Picearum, assulis, tedæque, picis copiâ maximam in montibus Galliæ nostræ, atque etiam aliis colligi. His adiungimus Scribonij Largi testimonium sic scribentis: resinæ Pityinæ, idest ex Picea arbore. Verum si quis ad conuellendam sententiam nostram locos aliquot Plinij curiosius confectetur, ex quibus hæc nomina aliter ab eo vsurpata esse ostendat, huic respondemus arbores omnes coniferas Plinio non benenotas fuisse, atque has Romano, vt ait de se iudicio discreuisse. Id, vel ex eo probari potest, quod *τὴν πίτυν* quidē Piceam, sed *τὴν πέυκην*, Laricem interpretatus est Theophr. *πύκην μὲν γὰρ ἐπικαυθεῖσάν τῶν ῥιζῶν ἐκ ἀναβλαστάνειν, τὴν πίτυν δὲ φασὶ τινες ἀναβλαστάνειν, ὥσπερ καὶ εἰς λίσσον ἐμπρησθέντος τοῦ πυρρῶν ὄρους*. Plin. sic. Larix vstis radicibus non repululat, Picea repululat, vt in Lesbo accidit, incenso nemore Pyrrhæo. Item alibi, *τὴν ἀγίδα τὴν καλεσμένην θήλεια τῆς πέυκης ἔχει*. Plinius. Larix fœmina habet quam Græci vocant ægida. Alio in loco *πίτυν* pinastrum videtur is conuertisse. Sylvestrium generis folia non decidunt Abieti, Larici, Pinastro. Theophr. *τῶν δὲ ἀγρίων ἀειφυλλὰ ἐλάτη, πέυκη, πίτυς*: sed hac in re fides Plinio adhibenda non est. Larix enim nusquam in Græcia nascens, Atheniensi Theophr. ignota fuit, neque, si nota fuisset, Laricem quæ simplex est, ac vnius generis, in tot differentias distribuisset. Quare satis superque me probasse confido Theophrasti *πύκην* Latinorum Pinum esse, quæ Arabibus *Senabar*, dicitur, Gallis, *Pin*, Italis, & Hispanis *Pino*, Germanis, *Hartzbaum*, *Fichtbaum*, & *Pynholtz*, Anglis, *Pynetre*, Belgis, *Pinap pelboom*, Bœmis *Borouici*. Huius duo sunt genera Theophrasto auctore, Pinus sativa, & sylvestris. Pinus sativa proceræ arbor in caudicis summitate ramos multos producit, qui in ramulos alios rotundos diuiduntur, foliis vestitos densis, capillamenti modo prætenuibus, longis, firmis, aculeatis, ex candido virentibus, perpetuis. Noces edit magnas, solidas, veluti ex squamis duris compactas, altissimè à terra suspensas, ac in his exiles nucleos, oblongos, lacunatis toris, ferruginea tunica obductos. Interior nucleus tenui velatur tunica, flauicoloris, qua digitorum attritu facile spolia-

Nomina

Lib. 3. Hist. cap. 10.

Li. 2. Alim.

Li. de bon. & mal. suc. Li. 7. simpl.

Ibidem. Li. de Cau. ca. de pinu. Ibidem.

Ibidem.

Comp. 202.

Ibidem. Lib. 16. c. 10. Theophr. Lib. 3. Hist. cap. 3. Li. 16. c. 139. Lib. 16. c. 21. Lib. 1. Hist. cap. 15.

Nomina

Lib. 3. Hist. cap. 10.

Genera.

Forma.

PINVS SATIVA.

Nomina

Locus.

Mart. ibid.

Genera.

Pin. sylu.

Forma

& Loci.



tur. Sapor illi dulcis ac iucundus: substantia pinguis, oleosaque. Nuces has Græci κώνες, τροβίλλες, κωνιάλλες & κωνάκια vt dixi, nuncupant, Galli *Pommes de pin*, nucleos vero Pineos, *des pignons*. Materia pini rubescit, grauis est, & intus circa cor liquore quodam madet. Pinus hæc in Gallia nostræ hortis permultis colitur & perbella proceraque spectatur. Copiosa etiam in agro Rauennate reperitur, non longè ab Adriatici maris littore: atque etiam in alijs Italiae locis, præsertim in cænobiorum viridariis. Syluestrem Pinum siue Pinastrum (Pinastrum enim, vt scribit Plinius, nihil aliud est quàm Pinus syluestris) in alia partimur genera. Aliam enim esse fructiferam nouimus, aliam sterilem: Fructifera alia est Idaea, siue montana, alia maritima. Montana satiuæ similis est, nuces edit similes, solidas, ex simili squamarum congerie compactas, resinosas, odoratas. Huiusmodi montanæ Pinus in multis Hispaniæ, & Lusitaniæ montibus crescunt, adeo fructuosæ, vt inde maxima nucum

Pinearum copia per totam Galliam distrahatur. Maritimæ prope fossas Marianas non procul ab Vrbe Monspelio permultæ proueniunt, in spatioso Pineto


PINUS SILVE-

stris fructifera.



PINUS

Maritima.



Lib. 3. Hist. cap. 10. Pinearum nucum copia celeberrimo, supradictis similes, nisi quod nux earum breuior, rotundior, celerius dehiscit, auctore Theophrasto. Montanarum autem

autem amplior, longior, diutius in sese compressa manet. Causa hæc est, quod in arenoso solo maritimis parcius alimentum suppeditatur ideoque minor est, ac strigosior nux. Præterea ob maris afflatum, litus apricum, austri in maritimo tractu crebro flantis occursum nux citius recluditur, non aliter quàm cum ab arbore decerptam igni admouemus vt aperiatur: contrà verò, largius alimentum montanis suggeritur, & montium aër natura frigidior, nuces sese referare non sinit, imò comprimit. Hæc cum vera esse tum ratione tum experientia cōstet, tamen Matthiolus (qui maritimarum Pinorum duo genera exhibet, nucum magnitudine, & exiguitate tantum differentium) quod obseruationi nostræ refragari videatur, scribit, Pinos syluestres in maritimis Senensibus fructum ferre spithamam longum, pyramidis figura, firmum, solidū, nec facile dehiscētem: quæ verò in Ananiis Tridentinisque montibus reliquis, ac in Bœmia, Morauia, Polonia proueniūt, fructum edere paruum, breuem, qui exsiccatus multum dehiscat, & ex arbore decidat, idque euenire prouinciarum & regionum alia atque alia natura, & maritimarum Pinorum diuersis generibus. At non rectè ille quidem cum maritimis fructiferis montanas syluestres & steriles comparat, syluestres enim montanæ, fructiferæ, cum maritimis, exemplo Theophr.

li. I. Diosc.
cap. 74.

Ibidem.

PINVS Marit. altera.



PINVS Sylvestris.



comparandæ potius fuerunt. Reliquæ differentiæ montanarum & maritimarum ex Theoph. hæc sunt Montana rectior, celsior, materiæque crassiore est: maritima folio tenuiore, magis deciduo: cortice læuiore, vtilique ad coria, alterius verò minimè, Maritima ligno est validiore, montana ramosa magis, & crassior, vt dictum est, picemque copiosorem fundit. Pinus sylvestris quam sterilem vocamus, (non ideo quòd nullum edat fructum, Conos enim fert, sed quia nuclei edules non sint, nec cibis vtilis) radice nititur recta, pali modo humi defixa, lignosa, foris nigra, gustu acerba. Caudex eius sæpè distortus subrubro cortice obducitur, ac senescens rimosus, scaber, fungosusque efficitur. Ramorum cortex glaber, præsertim teneriorum, lauri modo liuescit. Rami ipsi fragiles
si flectas

si flectas, cum crepitu rumpuntur. Caudex adultus in ramos diffunditur sinuosos, & perpetua fronde virentes, sic vt Pini fatiux modo summo vertice in comam latissimam arbor expandatur: folia tenuia sunt, rigida, semper gemina, ab vno veluti tubulo exeuntia, in ipso exortu connexa, gustu subacida, & adstringentia. Pro floribus sunt iuli quos hyeme profert. Coni paulatim augescunt ex compactili squamarum aceruo turbinati, ramis firmiter hærentes, pediculo breui, in nouellis recto, in aliis adunco, & tanquam reflexo, tam validè adnexi, vt cum rudi & nouo annotinus permaneat. Huiusmodi sterilibus Pinastris Aruernorum, Vellauniorum, & Allobrogum montes abundant, ex quibus resinam colligunt, & picem optimam conficiunt, vocantque *Pins sauvages*, & *Pinateans*. Pinastrum scribit Plinius mira esse altitudine, quod minimè verum mihi esse videtur, nec ex quo id transcripserit scio. Nam in hoc arborum genere Abies, Piceæque nostrates, & Cedrus Syriaca, altitudine præcellunt, Pinastri verò omnes quotquot vidi, tam steriles quàm fructiferi, aut humiles sunt, aut altitudine mediocri, tametsi Bellonius prodiderit & Diætos Pinaistros in vastitatem diffusos, ad insignem altitudinem surgere, & eos qui in Olympi Phrygij montis, aut aliorum gelidissimorum montium summis culminibus proueniunt, Abietis esse rectitudine. Sed is Pinastrum sterilem, Piceam appellat, ac eam pro Pinu syluestri describit, depingitque, absurdè, & contra Theophr. Plinij que auctoritatem, vt ostendemus. Matthiolus hoc Pini syluestris genus à Bellonio Pinastrum dici coniicit: sed non rectè, inquit. Pinastrer enim Plinio auctore, nihil aliud est quàm Pinus syluestris, mira altitudine, quæ gignitur nò modo in montibus, sed etiam in planis. Bellonio verò contra, Pinastrer Pino humilior est, planaque, & montium supercilia prorsus respuit, nec alibi prouenit quàm in excelsissimis montium iugis. Huic Matth. coniecturæ non assentior. Nam Bellonij pinastrum esse Tedam arborem Plinij demonstrauimus. Quid verò de pinastri Plinij mira altitudine sentiendum sit, iam diximus. Iustior est Matth. reprehensio, quam fugere non potest Bellonius, dum Pinastri vocem ex versione Latina frequenter se legisse scribit apud Theoph. eum tamen Theoph. fuisse incognitum, quod in Græciæ Asiæque montibus non nascatur. Itaque nullum esse ex Græcis auctoribus, qui Pinus syluestris pinastruë meminerit. Quid? nonne Theoph. *πέυκην* aliam cultam, aliam incultam esse prodidit? Nos equidem nihil aliud esse *πέυκην* quàm Pinum probauimus, & *πέυκην ἀγρίαν* Theoph. Pinum syluestrem, siue Pinastrum esse. Neque enim Bellonio vnquam dabo, quod Matthiolus concedit, Theoph. illic de Picea syluestri fuisse locutum, duosque alios Theoph. locos opponam, in quibus *πίτυς ἀγρία* idest Pinus syluestris legitur, vel Bellonij sententia. Fallitur enim ipse Matthiol. in his Theophr. locis, in quibus multi alij errarunt. Nam vox *ἀγρία* interdum arborem eam significat, quæ Plinio Aquifolium, officinis Agrifolium dicitur, interdum aliarum arborum epitheton est, vt cum dicit Theo

Locus.

Li. 16. c. 10.

Lib. de Cō.
cap. de pic.Lib. 3. Hist.
cap. 16.

PINASTRER III.

clusij omnium minimus.

enim ipse Matthiol. in his Theophr. locis, in quibus multi alij errarunt. Nam vox *ἀγρία* interdum arborem eam significat, quæ Plinio Aquifolium, officinis Agrifolium dicitur, interdum aliarum arborum epitheton est, vt cum dicit Theo

Theoph. *ἡ δὲ ἄλλη τὴν μὲν ἡμέραν εἶναι, τὴν δὲ ἀγρίαν*, idest, Pinum aliam satiuam esse, aliam syluestrem. Quare cū montanas arbores sic recenset Theophrastus, *ἰδὲν δὲ τὰ τῶν ὀρεινῶν, ἃ ἐν τοῖς πεδίοις ἔφύονται, περὶ γε μακεδονίαν, ἐλάτη, πεύκη, πίτυς ἀγρία* non sic hæc interpretanda, neque interpungenda. Montibus autem propria sunt illa quæ in planis non proueniunt: Macedonia Abies, Picea, Pinafter, sed Montibus autem propria sunt illa, quæ in planis non proueniunt, Macedonia Abies, Pinus, Picea, Aquifolium. Neque enim Theoph. quo loco Picea historiam tradidit, eam in satiuam & syluestrem diuisit, quemadmodum Pinum eodem loco distribuerat: quāquam non ignorem Pliniū scripsisse Piceam æuo suo iam in domos receptam tonsili facilitate. Adhæc quæ scribit Theophrast. *ἀειφυλλὰ μὲν οὖν τῶν ἀγρίων ἂν καὶ πρότερον ἐλέχθη, ἐλάτη, πεύκη, πίτυς ἀγρία*, non sic rectè interpreteris. Ergo inter syluestria perpetuo folio sunt ea, quæ prius diximus, Abies, Picea, Pinafter, sed, Ergo inter siluestria perpetuò virent ea quæ primo libro diximus, Abies, pinus, picea, Aquifolium. Præter pinos syluestres de quibus diximus, sunt aliæ quoque, steriles, & fructiferæ: Pinus Tubulus à Plinio appellata, ab Italis hodie *Mugo*, sterilis: Teda arbor à Plinio dicta, fructifera, à Bellonio Pinafter, ab Italis hodie *Cembro*, ab Allobrogibus *Auuia*. Tubulus, vel, vt in quibusdā Plinij codicibus legitur, Tibulus in aliis Stubulus, in altissimis

Lib.3. Hist. cap.4.

Lib.3. Hist. cap.10. Li.16. c.10.

Genera alia.


Nomina Lib.16. c.10

Forma. & Locus

PINVS TVBVLVS,
Mugo Italarum.



TEDA ARBOR,
Cembro Italarum.



montibus prouenit, sine caudice, ramis à radice circūquaque per terram sparsis, tubulorum modo, vnde forasse ei nomen hoc impositum, decem, & interdum quindecim cubitos longis, gracilibus, enodibus, olim ad vsus liburnicarum, nunc ad dolia vinaria cingenda, quod sint non solum longi, sed etiam flexiles, & tenaces. Fructus eius est paulo maior quàm Pinastris sterilis vulgaris, sed plurimum resinofus, odoris non ingrati. Teda in editissimis, & frigidissimis montium verticibus gignitur, parte ad Septentrionem spectante, niues ac gelicidia minimè reformidans, vt quibus exhilaretur potius quàm ledatur, ex

Teda. Locus.

ultimo

Forma.

ultimo prorsus montium situ ac supremo omnes alias arbores despiciens, Pino
 vt plurimum humilior, nonnunquam æqualis, similiter ramosa, magis quam
 Pinus, aut quauis alia conifera arbor, in metam fastigiata: cortice proximè
 terram undulatis lineis rugoso, superna caudicis parte, & in ramis, glabro, leui,
 tenui, subalbido, vt in Abiete, non vt in Pino subrubro, ex quo vieto & co-
 rij modo ductili pyxides, corbes, aliæque vtenfilia fiunt. Rami vt in Abiete, Pi-
 cea, Larice non recti, velut brachia ex lateribus panduntur, sed distorti, & valde
 furculosi: virides humore multo turgent, exiccati rugas contrahunt. Folia, vt
 in Pino, longa, mucronata, ex singulis turberculis quina emergunt, in Pino bi-
 na duntaxat. Eadem sic extremis furculis coaceruata eminent, vt penicillum,
 siue crinitam comam referant, in cuius medio fructus nouellus inclusus, sen-
 sim augefcens in conum absoluitur, è nigro purpurascentem, Piceæ cono simi-
 lem, breuiorem, molliorem, resinofum, cuius nuclei parui trianguli, ab satiuæ
 Pinus nucleis sapore diuerfi non sunt, nisi quod syluestrium omnium modo,
 asperitate quadam linguam offendunt, ita fragiles ac teneri, vt non solum ho-
 minum dentibus facile cedant, sed etiam auium rostris pertundantur, quas Al-
 lobroges Piquarellas vocant, Gesnerus Caryocatactas. Quam ob causam has
 Tarentinas nuces à Plinio vocatas fuisse verisimile est, quo loco is nucum Pi-
 nearum genera explicat. Harum, inquit, genus alterum Tarentinæ, digitis fra-
 gili putamine, auiumque furto expositum in ipsa arbore, non quod Plin. vete-
 resque Pini genus aliquod statuerint Tarentinum, vt putant Matthiol. & Bel-
 lon. sed quod nuces hæ Tarento Romam veherentur. Quæ de hoc Pinus gene-
 re diximus omnia, ei planè conuenire quam solam improprie Bellon. Pinastrū
 appellat, facile perspiciet is, qui hæc nostra cum illius capite de Pinastro con-
 tulerit. Matthiolus ab Italis Cembro & Cirmolo vulgo vocari prodidit, & tum
 in agro Tridentino frequentem prouenire, tum in Gavia Phœbeæ vallis, tum
 in Flemsibus, Vulturenæ, ac Rhethorum mōtibus, & in Comitatu Tyrolen-
 si, non longè ab Oeniponte, ex eaque manare resinam albam, & odoratam, vt
 & ab aliis id genus plantis. Huius materia à Germanis ad ædificia expetitur, &
 maximè commendatur, non solum quod pulchra sit, & venarum fluuiis pla-
 ceat, sed etiam quod odoris suauitate excellat. Eandem Tedam arborē Plinij
 esse idcirco diximus, quod cum sex coniferarū genera is autor enumeret, Pinus
 ipsius esse non possit, de satiuæ enim loqui videtur: neque Pinastrer, insignis al-
 titudinis, & in planis nascens: neque Tubulus, quod eius historia repugnet:
 neque picea, neque Larix, vt ex earum historiis intelligi poterit. Quare effici-
 tur vt sextum genus sit Teda proprie dicta, succo inquit Plinius, abundantiore
 quam reliquæ, parciore, liquidiorēque quā in Picea, sic enim legendum, flam-
 mis ac luminis sacrorum etiam grata. Hanc etiam aliquanto post inter arbores
 numerat, quæ montibus gaudent: montes inquit, amant Cedrus, Larix, Teda,
 & cæteræ ex quibus resina gignitur. His locis Matth. Bellon, atque alij Plinium
 falso erroris insimulant, Tedam pro arbore vsurpantem, quæ τὴν δάδα, siue
 τὸ δαδίων, idest pingues Pini, Pinastri, ac reliquarum resiniferarum arborum
 assulas, non arborem significet, quasi verò Teda δμονύμως de vtroque dici non
 possit, aut illam Tedæ significationem Plinius ignorauerit, cum eo ipso loco
 scribat, Laricis morbum esse, vt Teda fiat. Mirum igitur nemini videri debet,
 Tedam modò pro arbore, modò pro pinguibus Pinorum assulis sumi, neque
 illud etiam, flammis ac luminibus sacrorum Tedam arborem gratam fuisse,
 cum ex ea, velut ex aliis id genus, resina fluat, lignumque eius, vt cæterarum,
 pingue, & resinofum in Tedam vertatur, idque propterea Romani domi, & in
 sacris accenderent. Sed quoniam in Tedæ mentionem incidimus, quid ea sit
 diffu

Lib. 15. c. 10.

Lib. 1. Dios.
cap. 74. De
conif. de
Pinastr.*Usus.*

Lib. 16. c. 10.

Cap. 8.

diffusius explicemus. Morbum *ταῖς πείλαις*, idest Pinis, accidere Idæi narrant, inquit Theoph. cum nō solū cor, sed & pars externa caudicis, in Teda abierit, tunc enim veluti strangulari: id autem sponte euenire, ob plenius arboris nutrimentū, coniectari nos posse, quod totū Teda fiat. Est autem hic Pinis proprius morbus, cuius causam idem Theophr. alibi explicat. Pini radix tota, inquit, in Teda vertitur. Causa eadem quæ in animalibus. Quod enim in ea calefit perpetuò, coquiturque, purum hæret, ac coagmentatum densatūque pinguitudinem quandam efficit: quod verò nutrimentum in alias partes subit, sursum fertur ad eas quæ supra terram sunt alendas, non per hæc partes pingues, sed per alios meatus, quandoquidem totis radicibus in Teda mutatis arbores moriuntur, intercluso spiritu, nullōsque iam aditus habente per quos commeari possit, strangulatæ quemadmodum animalibus euenit quæ nimis pinguescunt. Obturantur enim meatus à pinguitudine densata, vt ad extremas vsque partes spiritus penetrare nequeat. Hæc Theophr. Partes radicum Pini pingues. Aruerni Tiè vocant, & Thesè, vocibus à Teda deflexis, & iis concisis atque accensis lucernarum vice vtuntur. Cæterum cum multa Teda ad picem conficiendam sit opus, non defuit ratio, qua Pinus non sua solū sponte, sed etiam arte Teda fieret. Eam sic declarat Theophr. Idæi caudici corticem auferunt à parte ad solem conuersa, duobus tribusue à terra cubitis: eo maximè confluxum Teda, siue pinguem resinofūque succum fieri anno post affirmant. Id cum securi detraxerint, altero post anno denuo *ἐν δασύτραις*, idest succum pinguem fundit, siue Teda fit: ac tertio similiter. Postea ob has incisiones, arbores putrefactæ à ventis deiiciuntur: tum earum cor eximitur: hoc enim maximè in Teda abit, effodiuntur post & radices, quæ etiam, vt diximus, totæ Teda fiunt. Hæc Theoph. Impropiè verò Teda appellamus alia quoque ligna, quæ flāma olei vel picis illitu concepta faculæ modo lucent. Hinc Ceres dea Tedifera à Poëtis vocatur, & Teda pro nuptiis siue pro coniugio ipso accipitur, quod in nuptiis faces prærent. Fuere qui hoc modo Pinorum genera distribuerint, vt aliud esset mite, aliud agreste: & agrestis, aliud mas, aliud fœmina, marem esse maritimam Pinum existimantes, fœminam, Idæam, quibus addunt Macedones tertium genus sterile. Hæc à supradictis diuisionibus verbis tantū discrepare videntur. Marem dixerunt esse breuiorem, rigidiore folio, ligno duro, in opere fabrili sese contorquente: fœminam proceriorem, pinguioribus foliis, mollioribus, magis inflexis, & incuruis, ligno in opere tractabiliore, molliore, nec sese pandante aut distorquente. Legendum Porro in Theophr. *ἀνδρῶν*, quod opponitur *τῷ τρεφόμενῳ*, non vt in publicis codicibus legitur, *ἐν τρεφόμενῳ*. Pinus fœmina Ægida habet Spissum hoc, candidum, pulchrūque, ex arboribus vetustioribus gignitur. Faciunt ex eo tabellas pictorias atque codicillos. Id autem est cor eius, quod minus picis Tedaque gignit. Larix fœmina habet quam Græci vocant Ægida inquit Plinius, mellei coloris. Inuentum est pictorum tabellis, immortale, nullis que fissile crimis, hoc lignum. Proximum medullæ est. Explicatis Pinorum differentiis atque naturis, nunc de Picea dicendum.

A Theophrast. veteribusque Græcis *πίτρυς* Picea dicitur, à Sequanis hodie *Pesse*, Arabicè *Arz*, Italicè *Pezzo*, Germanicè *Thamen bau*, Hispanicè *Pino negro*, Gallicè *Pesse & Soisse*, Anglicè *Piche tre*: ab Allobrogibus *Soisse*, Bellonius Sapini nomine descripsit. Nascitur in editis montium iugis, caudice recto, non minus quàm Abies procero: cortice ex cinereo pallescente, lento, & lori modo flexili, aliquantulum scabro, & dum rugosus fit sic dissiliēte, vt crispus appareat: ramis Abieti similibus, similiter ordinatis, sed in terram inclinatis, surculosis, surculis propendentibus: foliis Abietis, herbaceo virore latioribus, non

Lib. 3. Hist. cap. 10.

Li. 6. caus. cap. 15.

Lib. 9. Hist. cap. 2.

Theophr. Li. 3. ca. 10.

Theophr. li. 3. cap. 10. Lib. 16. c. 39.

Nomina


Locus.

Forma.

P I C E A.

Lib. 3. Hist.
cap. 6.

Lib. 16. c. 25.



sic atris, nec vt in Abiete pectinatim dispositis, sed nullo seruato ordine ramorū furculos vndiq; vestientibus, leuiter mucronatis, propemodū teretibus, mollioribus, cū in Abiete sint latiuscula ac duriuscula. Quidam, inquit Theophr. Pinum & Piceam florere existimāt, quidam minimē, sed Piceam, κύτταρον gignere idest nucamentum, quod grossis proportione respōdet, Plinius Pinum Piceāmq; villo flore exhilarari negat, experiētia tamen refragatur. Nam Piceę florem ob longū ac rubentē quiuis obseruare potest. Cæterum Picea fructum edit copiosissimū oblongum, procul intuentibus conspicuum, extremis ramis adnexū, deorsum nutantem, viri pudendum longitudine crassitudēque imitantem. Diutissimē is in arbore manet, & senescens squamas ex quibus coailuit, recludit, seminis tū maiore parte decidua. In squamarum torulis geminum id delitescit, Pinaestro simile, paulo grandius, atrum. Piceæ materies rara est, laxaque, ad trabes, & ad asseres faciendos idonea, speciosior quā Abie-

gna, & in opere fabrili tractabilior, quia venis est rectioribus, minúsque nodosa. Inter Piceæ corticem, & lignum, gummi modo resina cōcrescit, ac nonnūquam etiam liquida inde manat, quam Allobroges *Binioum* vocant, quasi Benzorinum, & ad recentia cruentaque vulnera summopere commendant. Hanc esse *πίτυν* Theophr. id est Piceam facile quiuis intellexerit ex eius cum Pinu collatione, si ex loco illo Theoph. maculas aliquot deleuerit, mēda quēdā correxerit, meliorēmq; quā Gaza interpretationem adaptauerit. Οἷδὲ περὶ τὴν ἀρκάδιαν, inquit Theop. ὅτε τὴν ἀχαρπον λέγουσιν, ὅτε τὴν ἡμέραν πώκην, ἄλλην δὲ πίτην εἶναι φασί. καὶ ὅτι τὸ τέλεχος ἐμφανέστερον εἶναι τῇ πίτῃ, καὶ ἔχειν τὴν τε λεϊότητά, καὶ τὸ μέγεθος, καὶ ἐν ταῖς ἐργασίαις ὀχρησθαι τὸ ξύλον. Τὸ δὲ τῆς πώκης καὶ παχύτερον, καὶ λεϊότερον, καὶ ὑψηλότερον εἶναι. καὶ τὰ φύλλα τὴν μὲν πώκην ἔχειν πολλὰ, καὶ λιπαρὰ, καὶ διασέα, καὶ κεκλιμένα, τὴν δὲ πίτην καὶ κωνοφόρον τρύτην, ὀλίγα τὲ, καὶ δύχμωδέτερα, καὶ πεφραγμένα μάλλον. ἔτι δὲ τὴν πίτην ἐμφανεστέραν τῇ πώκῃ, καὶ ὅτι τὴν πίτην ἔχειν ὀλίγην τε, καὶ πικρὰν, ὥστε καὶ ἥττον κωνοφόρον, τὴν δὲ πώκην νεύουσαν καὶ πολλήν. φέροι δὲ ἐν μὲν τῇ ἀρκάδιᾳ ἡ πίτις ὀλίγη, περὶ δὲ τὴν ἡλείαν πολλή. ὅπως μὲν ὅλα τὰ γένεα διαμφοισθητῶσι. ἡ δὲ πίτις δοκεῖ τῆς πώκης διαφέρειν, τῷ λιπαρώτερά εἶναι καὶ λεπτοφυλλοτέρα, καὶ ὁ μέγεθος ἐλάττω, καὶ ἥττον ὀρθοφυής. ἔτι δὲ καὶ τὸν κῶνον ἐλάττω φέρειν, καὶ πεφραγμένα μᾶλλον, καὶ τὸ χάρυον πίτιωδέστερον. ἀμφω δὲ τελεχόφυλλα, καὶ πίτις τὰ ξύλα λευκότερα, καὶ ὁμοιότερα τῇ ἐλάτῃ. Διαφορὰν δὲ ἔχει πίτις καὶ ἀμῆν πρὸς τὴν πώκην, &c. Id est, Arcades verò Pinum in satiuā & sterilem minimē partiuntur, sed à Pinu Piceā differre aiunt. Piceæ namque magis conspicuum ac eminentem caudicem esse, lauem, magnū, in opere fabrili vtilem, vt pote qui crassior, lauior, procerior quā Pino sit. Præterea Pini folia multa, pingua, dēsa, inflexa esse, Piceæ verò, quæ & ipsa conos fert, pauciora squallidiora, horridiora. Ad hæc picem in Pinu notioiorem esse quā Picea: paucam enim ac amaram ex Picea stillare, vt & minores conos in eadem gigni, vberiorē autem & odoratam è Pino. In Arcadia sanè Piceæ pauca crescunt, circa Eleam multę. Sic igitur toto genere discrepant. Picea certè hoc differre à Pinu videtur, quod pinguior Pinus sit, humilior, folio tenuiori, minùs recta, item quòd breuiorem

conum

Lib. 3. Hist.
cap. 10.

conū ferat, & horridiorem, ac nucem magis resinofam. Vtri que folium capilla-
tum, sed Piceæ materies candidior Abietique similior. Est & alia inter Pinum
& Piceā differentia, &c. Bellonius cū Abietē à Gallis *Sap.*, vel *Sapin* vocari sciret,
eāque quam hīc depinximus arborē Abieti admodum esse similē, Sapinum
appellare voluit, quæ Picea nominari debuit. Nā Sapinus quidē non solū infe-
riorem Abietis partem significat, sicuti Fusterna superiorē, quod tradit Plinius,
sed etiam arborem, id quod eiusdem Plinij auctoritate confirmatur. Prælum,
inquit, è Sapino, alta potissimum, facito. Alibi genera nucum Pinearū is enu-
merans, Tertium, ait, Sapineæ, è Picea satiuā, nucleorum cute verius quā pu-
tamine, adeo molli, vt simul mandatur. Ex his verbis perspicuum est Plinio
Sapinum arborem, scilicet Piceam satiuā designari, cuius nucem Sapineam
vocat, siue Piceā eo loco, τὴν πεύκην, siue τὴν πίτυν intelligat. Sed quæ nā est Theo-
φrastus φθειροφόρος lib. 1. Cauf. cap. 9. quam Gaza pediculiferam, Scaliger pedicula-
riam interpretatur? an diuersa ab ea quam idem Theophr. in historiis describit?
an eadē? deinde an φθειροφόρος dicta, quod, vt tradit Plinius, totis paniculis mi-
noribus gracilioribusque, minimos ac nigros nucleos pediculis similes gignat?
Pini Piceæque fructus Septembri mēse maturi sunt. Pinus apricis locis gaudet:
opacis aut nullo modo, aut malè provenit. Pinus & Picea generi eidem adscri-
buntur, inquit Dioscorides, sed quandam flagitant specierum distinctionem.
Arbores hæ cognitæ, quarum cortex astringit. Prodest tritus & illitus inter-
trigini, vlceribus summum corpus occupantibus, ambustisque, cum spuma ar-
genti, & manna: vlcera delicatulorum acrimoniam recusantium cerato Myrti-
no exceptus ad cicatricem perducit: tritus cum futorio atramento serpētia co-
hibet: suffitu partus & secundas eiicit: potus aluum sistit, vrinam mouet. Folia
eorum trita & illita inflammationes leniunt, vulnera ab inflammatione vindi-
cant: trita autem, & decocta in aceto feruenti collutione dentium dolores le-
niunt: hepaticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua, aut mulsa pota. Pineæ
nucis cortex & folia potu idem præstant: teda earum particulatim secta, si in
aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit Spa-
tha acoporum, pessorumque compositionibus idonea. Quinetiam earum cre-
matarum fuligo ad librarij atramēti confectionem excipitur: ea ipsa fuligo cir-
cumlitionibus efficacissimè imponitur, quibus palpebras ornant, coloremque
mentiuntur: arrosis oculorum angulis, callosis glabrisque genis, & collacryma-
tionibus opitulatur. Pityides appellantur Pinorum Piceæque fructus, qui in
conis inueniuntur. Vim adstrictoriam habent, & aliquantulum excalfacientem:
tussi & pectoris vitiis auxiliātur, per se, aut ex melle sumpti. Noces Pineæ si re-
purgatæ mandantur, vel cum passo, aut cucumeris semine bibantur, vrinā ciēt:
acrimonias in renibus & vesica hebetant: stomachi rosiones leniunt: data cum
portulacæ succo virium infirmitatem roborant, corruptorū quoque humorum
labem obtundunt. Pineæ noces integræ recenter arboribus decerptæ in passo
franguntur, & decoctæ vetustæ tussi, aut tabitudini conferunt, si quotidie ex eo
liquore terni cyathi bibantur. Hæc Diosc. ex Ruellij versione, in qua diligēter
quedā attendenda & animaduertenda sunt: ac primum, quod dicit Diosc. πῖτυς
γνώμενον δένδρον: ἐστὶ δὲ τὸ αὐτὸ γένος καὶ ἡ λεγομένη πεύκη, εἶδει διαφέρουσα: quidā, διαφέρουσι.
Hæc sic Lacuna vertit. Picea vulgaris arbor, Pinusq; eiusdē generis sunt, specie
tamē differunt: Sed hoc leuiusculū. Prodest cortex tritus & illitus intertrigini.
ἀρμόςζων πρὸς τε παρατέμματα λείος, καὶ πλάσθιμος. Cornari⁹ legit καὶ πατρίδιμος, idest
inspersus. Res ipsa vsus sui ostēdit. Puluis enim inspergitur, non illinitur. Pineæ
nucis cortex & folia potu idē præstant. πῖτις δὲ τὰ αὐτὰ καὶ δὲ τροβίλιν φλοιός, καὶ τὰ
φύλλα ποθέντα. Cornarius hæc de strobilo arbore, non de Nuce Pineā intelligit,

Li. 16 ca. 39.
Lib. 15. c. 10.

Li. 16. c. 10.

Tempus.

Locus.

The. lib. 2.
cauf. cap. 9.
Lib. 1. c. 74.

Vires.

Emb. 71. li. 1

Ibidem.

Li. 16. c. 10.

Libr. 7.

quæ arbor eadem cum Pinastro est: id quod Plin. auctoritate cõfirmat, scribētis arbores quas per oram Italiæ Strobilos vocant, plerōsque arbitrari easdem esse cum Pinastris. Auctorem etiā adhibet Paulum Ægi. qui de coni cortice, & foliis eadem cum prodidisset quæ de Strobili cortice, & foliis Diosc. mox de Strobili conorum fructu seorsum tractat. Præterea cum de fuligine differit, Pinum, Conum, Piceam, vt tres diuersas arbores nominat. Hæc Cornarij opinio faciliè refelli potest. Nam in Plinij vetusti exemplaris membranis pro Strobilis Tubulos legimus, vt sit Tubulus Pinastri genus, de quo inter Pinorum genera differuimus: Conus verò Strobilifque, vt iam ex Galeno probauimus, & demonstrabimus, non pro arbore, sed pro Nuce Pineæ vsurpatur. At enim Strobilum Pinastrum esse concedamus. Cum iam Dioscor. de viribus corticis Pinus siue mitis, siue agrestis vniuersè quidem scripserit, cur frustra hîc eadem repetit? Iam verò cū Pinastri fructus edulis non sit, qui quæso Strobili, idest Pinastri fructus Cornarij sententia vires imbecillas roborare poterit, vel cætera præstare quæ Strobilis Diosc. attribuit? Quare à Galeno, Paul. Diosc. Conum & Strobilum, pro Nuce Pineæ, non pro Pinastro accipi puto. At Pineæ nucis qui cortex quæ folia erunt, cum arborum, herbarumque folia tantum, ac florū esse dicantur? Nuces Pineas videmus squamatim compactilibus nucamentis siue vnguibus totas cõstare, sub quibus nuclei carnosī, molles, esu suaues abduuntur. Has integras & nucleos edules Græci modo ancipiti harum dictionum significato nominant κώνες, κοκχάλας, στροβίλας, modò epitheti accessione distinguunt, quemadmodum Diosc. ὅλας στροβίλας ὑποφάτους dixit, Galenus ὅλας χλωρὰς, id est integras Pineas nuces adhuc virides, recentes, & tenellas, non, vt Ruell. in Diosc. vertit, recēter ab arbore decerptas, & στροβίλας καθαρούς, à nucum suarum putaminibus repurgatas, quales hodie veneūt, στροβίλας κεκαθαυμένους Asclepiades, & Andromachus ap-

Aet. libr. 8.
cap. 46.
Li. 6. med.
gen.

pellant: Galen. στροβιλῶν πυρήνας. Paul. κώνες καρπὸν, vulgus nostrum *des pignons*. Nucum Pinearum cortex extima est pars, ac veluti amictus tegens, & eas vndique ambiens, qui cultello vel deglubi, vel deradi potest: folia, lignosæ squamæ, aliæ aliis incumbentes, nucleorum opercula, & cõceptacula, quarum gradatim procedēte structura coagmentatur Nux Pineæ, & in metam colligitur, sic dicta, quòd foliorum modo, cum maturæ nuces decidunt, sese pandunt, & explicant. Hæc folia atque cortex eadem facultate pollent, qua arboris ipsius folia, cortexque, scilicet adstringente. Quod verò de teda Diosc. prodidit, eadem Galenus.

Lib. 5. med.
part. cap. 9.

Dolentes dentes colluuntur pinguibus tedis in aceto ferue factis: aut Halicacabi corticis, & tedæ in aceto feruefactæ decocto, post longam cocturam: aut tedarum ramenta, malicorium, alumen scissum in aceto ad tertias coquuntur, eoque decocto tepido os colluitur. Idem medicamentum quoddam ad dentium dolorem præscriptum dum coquitur, σπάθη διαδίνη, idest spatha siue rudicula, ex teda parata, mouere iubet. Pityides appellantur Pinorum Piceæque fructus inquit Dioscor. πιτύδες ὃ καλοῦνται ὁ καρπὸς τῶν πιτύων, καὶ τῆς πεύκης. Locus Matthi. suspectus is videtur. Putat enim verba illa τῆς πεύκης alicunde in cõtextum irrepisse, & merito quidem. Quid enim πιτύδες aliud significare possunt, quàm τῶν πιτύων καρπὸν, id est, Picearū fructū, vt στροβίλοι, de quibus mox idem scriptor agit τῶν πευκῶν, idest Pinorum? Quod de Strobilis repurgatis tradit Diosco. παρηγορεῖσιν ὃ καὶ τομάχων διηκτικὸς μετ' ἀνδράχνης χυλῶ λαμβανόμενοι, ἐξερεῖδουσι τὴν ἀλονίαν σάμα-
τος, καὶ τὰς τῶν ὑγρῶν διαφθορὰς ἐξαμβλύνουσι, Plinius his verbis expressisse videtur. Nuclei nucis Pineæ sedant acrimoniam stomachi, rosionesque, & contrarios humores consistentes ibi, & infirmitatem virium roborant, ex quibus perspicitur Plinium nucleos nucis Pineæ Strobilos appellasse, deinde τὰς τῶν ὑγρῶν διαφθορὰς legisse, non διαφθορὰς, vt Diosco. habent vulgata exemplaria: postremò

Li. 23. ca. 8.

ἐξερεῖ-

ἐξερειδυσιν ἀλόνιαν σάμαδος, roborant infirmitatem virium, reddidisse. Cornarius tamen non ἐξερειδυσιν, sed ἐξαυρυσιν legendum arbitratus, eximunt corporis debilitatem, conuertit. De Strobilo hæc Galen. Strobilus viridis totus habet cum humiditate amaritudinem, quampiam & acrimoniam. Proinde purulentis, atque adeo quibuscunque expedit quæ in thorace & pulmone sunt tussi reicere, facilem eam præbet. Porro fructus eius esculentus nutrimentum est coctu difficile, & validum, at medicamen est asperitati gutturis leniendæ congruum, cum videlicet in aqua maceratus, omnem in ea acrimoniam reliquerit. Sic enim quod superest minùs mordax, magisque emplasticum redditur, & ad mediocrem caliditatem trigiditatemque reducitur, ex aquea terreâque mixtum substantia, minimum particeps æreæ. Quæ sequuntur præter illa, scripsit Matthiolus. Aqua è viridibus Pinorum nucibus destillata rugas in facie delet, & mammas admodum extuberantes cohibet, si linteolis in ea madefactis sæpius foueantur. Eadem vuluam angustiores reddit, & à fluxionibus tuetur, sed longè ad hoc efficacior est succus. Nuclei Strobilorum Pinus domesticæ valdè sunt vtilis, nimirum qualitatibus suis temperatis proximi, paululum ad calidum inclinantes. Maurant, leniunt, glutinant, resoluunt, corpus pingue faciunt, & leuiuscula quadam acrimonia mordent, bene nutriunt, ac quamuis crassiusculum corpori præbeant alimentum, non tamen improbantur. Emendant enim humiditates in intestinis putrescentes, ægrè tamen coquuntur, ideòque naturis frigidis dari debēt cum melle, calidis autem cum saccharo. Cæterum tepente aqua macerati acrimoniam exuūt, & oleosam quam habēt pinguedinem. Sanant frequenter deuorati neruorum ac dorsi dolores. Dantur vtiliter ischiadicis, paralyticis, stupidis, & tremore affectis. Pulmones mundant, & eius vlcera, humores lentos & faniem eorum purgantes, quare tussientibus dantur. Venerem excitant aqua tepida priùs macerati, deinde saccharo aut melle excepti, & deuorati. Semen etiā augent. Præstāt quoque ad renū, & vesicæ vlcera, ideòq; vrinæ stillicidiis & ardorib⁹ auxiliatur. Corticis conorū Pini in aceto acerrimo decocti suffitus perquam vtilis est dysentericis.

Embl. 71. li. 1. Diosc.

Lib. 7. Sim.

li. 1. Diosc. cap. 79.

A B I E S

CAP. XIII.

ABIES à Græcis ἐλάτη nominatur, ab Italis *Abete*, à Gallis *Auet*, *Sap*, & *Sapin*, à Germanis *Thannem*, & *Thannenbaum*, *Hispa*. *Abeto*, arbol Angl. *Mastre*, & *Deele*, Abies arbor est excelsa, Pino Piceâque procerior, imo omniū coniferarum, dēpta Cedro, altissima, rectissima, maximè enodis. Cortex huic albi-
cat, & si flectatur, facilè frangitur. Abietis pars quæ à terra est, inquit Plinius, enodis, & fluuiata, decorticatur, atque ita Sapinus vocatur: superior pars nodosa, duriorque, Fusterna. Rami, non vt in Picea terrâ versus flectuntur, sed in cœlū erecti stant, atque ex lateribus vtrinque prodeuntes furculos emittunt crucis figura, sicut & in Picea. In his folia similiter disposita, vtrinque scilicet ex ramorū furculorūque lateribus emergunt, & vt ait Plinius, insecta sunt pectinum modo, latiuscula, breuia, dēsa, leuiter pūgētia, hyeme nō decidua, dilutæ viriditatis. Conos fert palmæ lōgitudine, Piceæ conis adsimiles, in quibus semen est subalbū, sine vlla medulla. Theoph. Abietē quādā marē, quādā fœminā esse tradidit, easque foliis differre. Mari enim acutiora, magisque pungentia, ac magis flexa, quare aspectu crispior tota arbor videtur. Materia etiā differūt, cādidio-
re in fœmina, molliore, operique faciliore, atque toto caudice proceriore. Mari ea magis varia est, latior, durior, medulla plenior, denique aspectu min⁹ pulchra. Præterea Conus maris paucos nucleos habet in priore tātū parte, fœminæ Conus nullos omnino, vt Macedones dixerunt. Abieti folia pinnarū modo quæ

Nomina
Forma.

Lib. 16. c. 39

Lib. 16. c. 24

Lib. 3. Hist. cap. 10.

Genera

ABIES.



Ibidem.

auitū alas cōponūt, in breuiora foliola conti-
nuantur, aliis super alia iacētibus & impositis,
ita compacta, vt minora & breuiora perpetuo
sint posteriora, quæ versūs cacumē spectāt, &
antepositis succedunt, ea figura testudinem
referente, simillimāque Bœotorū fornicibus.
Sic enim vertere, emendare, & παραφραστικῶς
exponere mihi visum est hæc verba Theophr.
ἔχει δ' ὡς περ πτέρυγας τὸ φύλλον, καὶ ἐπ' ἐλάττω, ὥς τε τὴν
ὅλην μορφήν εἶναι θολοειδῆ, καὶ παρομοίαν μάλιστα ταῖς
βοιωτῆαις καμάραις, Gaza κυάθοις legit, publica exē-
plaria κυεαῖς. Dēsa adeo sunt hæc folia, vt nec
niuē, nec imbrē trāsmittāt. Denique arbor est
aspectu decora, magnitudine excelsa, Pinóque
procerior, à qua etiam ligno non parū distat.
Nā Abieti neruosum, molle, leuέq;, Pino teda
pingue, graue, carnosius. Nodi plures Pino, sed
duriores Abieti, imo in Abiete quā in reliquis
ferè omnib⁹ duriores, & si illi molli⁹ lignū sit.
Vt Pinus Aegida, ita Abies albū habet, quod
λαῦσον vocatur, Aegidi proportionē respōdēs,
cuius nominis vestigia etiā hodie supersunt.

Nā Iuræ montis lignatores Abietū Picearūmq; cādidiſsimos truncos nō nodis
interceptos, sed recto venarum procurſu fluuiatos, & ad opera intestina faciles,
nūc *Ouchon*, nūc *Louchon*, vocāt. Abies inter cortices præstātissimū illū liquorem
cōtinet, qui Itolorū vulgo *Lagrime* vocatur, idest, lacryma Abietis. De hac vete-
res, Matth. putat, nihil literarū monimētis consignasse, nisi quis dixerit Galenū
liquidam illam Piceæ resinam, quā Terebinthinæ loco institores vēdebāt, pro
Abiegna lacryma accepisse, tum quod scribat illā gustu odoréque terebinthinæ
esse persimilem, id quod in Abiegna lacryma deprehēditur, tū quod eadem sit
quodāmodo Terebinthina acrior, quibus qualitatibus liquida Piceæ resina ca-
ret. Hæc impulerūt Matth. vt suspicetur his Galeni verbis mēdū aliquod subes-
se, maximè cū is scripserit in Euphorbij medicamēto, inter resinas cæteris odo-
rationes esse Terebinthinā, & Abiegnā, hāncque illa calidiorem, quāuis, inquit
Matth. veteres in arborū resiniferarū historia in multis sibi ipsis nō cōsentiant.
Qui Abiegnā lacrymā clarissimā Larignā esse putant, vehemēter errāt. Illa ete-
nim inter Abietis cortices vomica modo coaceruatur, & secta veluti cute, vt in
abscessibus pure tumidis fieri solet, elicitur, Larigna verò manat ex Laricis cau-
dice ad medullāvsque terebrato, id quod experiētia sibi cognitū ac cōpertū esse
Matth. asseuerat. Abiegna lacryma, siue Abiegna resina liquida in quibusdā Ita-
liæ locis *Olio d'aucto* nominatur, idest oleum Abiegnū, quæ vox Belloniū mouit
vt crederet id resinam esse ἐλαϊώδη, idest oleosam Dioscor. quo loco non resi-
narum genera, id quod prius fecit, sed resinarum coloris differentias explicat.
Officinæ Terebinthinam Venetam vocant, Galli *Terbentine de Venise*. Ex nouel-
lis Abietibus ea colligitur, quarum cortex nulla rima finditur, sed glaber tu-
berculis scatet, cū annosarum cortex in rugas contrahatur, rimosus sit, &
sine vllis tuberculis. Tuberculis pastores armentarij bubuli cornu acutum fa-
stigium sic adigunt, vt inde liquidam illam resinam excipiant, quod cum
per totū diem in plurimis tuberculis moliti sunt, operē præciū se fecisse, putāt, si
cornu vnū quatuor vnciarū capax liquore illo plenū domū retulerint, quia vnū
quod

Lib. 3. cōp.
med.gen.

Ibidem.

Li. de. Cō.
ca. de Resi.
Lib. 1. c. 77.Bello. de
Conif. ca.
de resi.

quodq; tuberculum vnā vel alterā duntaxat guttam contineat, quo fit vt rarior sit is liquor, maiorisque pretij. Ex Abiete veluti ex Pinu, ac Picea resina etiam sicca & candida colligitur, quæ thus ementitur, ac pro eo à vulgo vsurpatur. Abies in montibus nascitur, in planis minimè: opacis locis gaudet. Paulo ante solstitium floret, auctore Theophr. Est autem flos eius κρόκινος, id est cocci colore, vt in excusis libris reperitur. Gaza verò κρόκινος legit, id est crocus. Fructum profert post vergiliarum occasum. Matthiolus id negat, Abietemque omnem flore & fructu carere scribit in Tridentinis montibus, quorum syluæ Abietes multas alunt. Cortex & resina Abietis arida, qualitatibus ac viribus cortici & aridæ Pinus resinæ valdè sunt similes, nisi quod paulo acriores, magis detergent. Abietis liquida resina, calida siccaque ordine tertio, acrimonia quadam sua tergendì vim obtinet, & ad veræ Terebinthinæ qualitates proximè accedit. Vulneribus recentibus, præsertim capitis, maximè confert, quod non solum ea mundet, sed & solidet. Sumpta semiuncia pondere, per aluum biliosos humores vacuat, renes absterget, vlceratos sanat, vrinam cit, calculos eiicit, arthriticos dolores mulcet, coxendicum cruciatus lenit. Nucis magnitudine deuorata cum nuce moschata, & saccharo, stranguriam sanat, pudendorumque vlcerationi maximè succurrit. Abies nauibus aptissima est: triremes enim & longa nauigia ex ea, leuitatis gratia, fiunt. Ædificiis optima quæ vetustissima, modo cariosa non sit. Quin & ad tabulas pictorias, & ad plurima alia utilis est. Pondus sustinent valdè Abies, & Pinus. Renittuntur enim, nec temerè rumpuntur, priusque carie quàm viribus deficiunt.

Diosc. li.1.
cap.93.
Dod. lib.6.
cap.91.

Locus.

Theophr.
lib.3. Histo.
c.4. & li.2.
cau.c.9.

Temper.

Lib.3. Histo.
cap.6.

Ibidem.

Tempe-

ram. &

Vires.

Dod. ibid.
Marthi. &
Dodo. ibi.

Theophr. li.
lib.5. Histo.
cap.8.

Plin. lib.16.

cap.42.

Theophr. li.
5. Histo. ca.7.

L A R I X. CAP. XIIII.

VÆ Larix Latine, & Larex, λάρξ etiam Græcè nuncupatur, Gallicè *Melese*, Italicè & Hispanicè *Larice*, Germanicè *Lerchenbaum*. Arbor est eximia proceritatis, Abiete tamen sæpè humilior, nonnunquā verò æqualis: cortice valde crasso, multis rimis hiulco, intus ru-

Nomina

Forma.

L A R I X.



bente. Circa stipitem rami veluti per gradus collocantur, cum surculis & adnatis plurimis, Salicis modolentis, coloris lutei, odoris non iniucundi. In his folia ex tuberculis factis à sese distantibus emergunt eaque numerosa, densa, comosa, quæ circiter triginta simul iuncta penicilli pictorum summitatem referunt, oblonga, mollia, Pineis angustiora, minimè aculeata, hyeme aduentante decidua, ita vt sola Larix inter omnes arbores resinam fundentes, frigoris sæuitiam non reformidans, nuda hyemem transigat. Quare Plinius non rectè Laricem in his syluestribus arboribus numerauit, quibus folia non decidunt, neque in iis quarum pungunt folia. Sed quomodo Laricem accipiat nos supra declarauimus. Hac in re Plinij incōstantiam animaduertere licet, alio loco folia minimè aculeata, sed villosa, pingua, mollia, Larici tribuentis, nisi vitiosa in vulgatis exemplaribus lectio nos fallat. Picea minùs alta quàm Larix, inquit Plinius: illa crassiori,

Lib.16. c.21.

Cap.12.
Li.16. c.10.

læuioriꝛque cortice, folio villosior, pinguior, & densior, molliorꝛque flexuat Piceæ rariora, siccioraꝛque folia, tenuiora, & magis argentia, totaꝛque horridior est, & perfusa resina. Hanc scripturam vnus dictionis mutatione restituere licet hoc modo. Picea minùs alta quàm Larix: hæc crassiori, læuioriꝛque cortice, folio villosior, &c. vt, hæc. ad Laricem referatur, quam correctionem sensus & contextus necessariò postulant. Nam si verba hæc, folio villosior, &c. de Picea continenter intelligantur, quæ eius folia pingua, densa, molliaꝛque esse possunt, quæ mox dicuntur tenuiora, rariora, siccioraꝛque? Ad hæc si præcedentia omnia de Picea, & non de Larice accipienda essent, cur illis particulam, At, discretiuam, vt aiunt, subiicit, cum dicit, At Piceæ & cætera? Ex his perspicere licet

Lib. 1. c. 91. Laricis corticem læuiorem esse quàm Piceæ, vt existimauit Ruell. sed eius aculeata folia non esse, cum aculeatum & villosum sint aduersa. Villi enim ad tactum molles sunt, minimè autem spinæ, siue aculei. Flores Laricis vere ex ramusculorum summitatibus exoriuntur, multum odorati, contra Plinij sententiam, qui Laricem inter tristes arbores recenset, nec vllò flore exhilarari scripsit. Hi arbores suas valde ornant, quod in purpura ardentem rubescentes, comantibusque foliolis miro naturæ artificio annexi, viatorum oculos non parum remorantur, & recreant. Coni cupressinis admodum similes, paulo longiores

Lib. 16. c. 25. odoris non ingrati, breui petiolo ramis alligati, ipsiꝛque incumbentes, ex tenuissimis squamulis compactilibus ac foliatisꝛque contexuntur: quarum singulæ binos nucleos foliatos, alæ cicadarum similes, semenꝛque exiguum, magnitudine feminis Cupressi includunt, quod mansum, Nucem Pineam odore plane imitantur. Laricis materia durissima est, præsertim quæ rubet, & in caudicis medio, odore acrior: quam ob causam in ædificiis quibuscumque extruendis cæteris omnibus longè præstat. Larix, inquit Plinius, nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis vi consumitur, quàm lapides, cum cætera quæ picem & resinam fundunt, accensa fuligine immodica carbonem repente expuant, cum eruptionis crepitu, eiaculenturꝛque longè. Larix Vitruuio flammam ex igne non recipit, nec ipsa per se potest ardere, nisi, vt saxum in fornace ad calcem coquendam, aliis lignis vratur, nec tamen tum flammam recipit, nec carbonem remittit, sed longo spatio tandem comburitur, quod est minima ignis & aeris è principiis temperatura, humore autem & terrena materia spissè solidata, non habens spatia foraminum, qua possit ignis penetrare, reicitque eius vim, nec patitur ab eo sibi cito noceri, propterꝛque pondus ab aqua non sustinetur, &c.

Li. 16. c. 10. Quæ falsa esse tum ratione, tum experientia constat. Nam cum omnium consensu, præsertim Plinij, ac Vitruuij, Larix resinam liquidam fundat, pinguem scilicet, & quæ, non aliter quàm bitumen, igni admota facilè accendatur, quis credat Laricis lignum pingue, resinofumꝛque ignem respuere, quum lapides ipsi qui sua natura flammis non accenduntur, si bituminosi sint, perinde ac ligna exurantur, editis continuò flammis quoad in cineres vertantur? Cuius rei locupletissimi testes sunt Flandri, Brabanti, & aliæ Aquiloniæ gentes, quæ lignorum penuria, huiuscemodi lapidibus suos fouent ignes. Præterea, si Larix neque ignem admitteret, neque carbonem faceret, malè cum iis ageretur qui in Tridentinis montibus, & in ea præsertim valle Ananiis contermina quam Solis nuncupant, ac in Camonica, & Eliotropia, & in Brixienfi agro in fornacibus ferrum excoquunt. In iis enim maxima Larigni carbonis ardet copia, neque (vt asserunt artifices) vllò alio carbone quàm larigno, rude ferri metallum celerius colliquescit. Lignum etiam Laricis siccum, cum resinofum sit, impetu vehementi flagrat. Quamobrem in Tridentinis montibus Laricina tantum ligna in furnis accendunt, tam iis quibus panis coquitur, quàm iis quibus

Matth. li. 1.
Diof. c. 74.
& Epist. 1.
lib. 4. Epist.

hypocausta calefiunt. Quod autem attinet ad ea quæ narrat Vitruuius de castello quodam circa Alpes, excercitum illic habente Cæsare, ante cuius portam turris erat ex hac materia, alternis trabibus transuersis, uti pyra, inter se alte compositis, quam fasciculorum virgis alligatorum flamma, faciesque ardentes congestæ ac immixtæ lædere non potuere, existimandum est id euenisse, non quod Laricis materia vri non possit, sed quod ventorum, niuium, frigoris vi, omni denique temporis iniuria, qua perpetuò ferè Alpina regio infestatur, temporis etiam diuturnitate durior, exhausto pingui succo veluti lapidea facta, à fasciculis virgarum, facibusque, non faciliè accendi potuerit, maximè cum arboris cuiusvis solida duraque, nec in particulas concisa materia, non statim primo ignis occurso faciliè vincatur, nedum Laricea, quæ soliditate & duritie cæteras omnes antecellit. Hic rursus adnotandum mirum esse Plinium in Laricis historia tantopere à sese dissentire. Cum enim scripserit Laricem nec ardere, nec carbonem facere, paulo post ait, In Macedonia Laricem masculam vrunt, fœminæ radices tantum. Ex Larice, ut scribit idem, liquor erumpit melleo liquore, atque lentore, nunquam durefcens. Et alio in loco, Larix resinam fundit gracilem, ac mellei coloris, virus redolentem, id quod ante ipsum dixerat Vitruuius. Larix habet resinam liquidam, mellis Attici colore: quare etiam medetur phthysicis: ῥητινὴ λαρίκη, vel λάρικς dicitur, à Latinis resina Laricea vel Larigna, in officinis Terebenthina, sed falsò. Prouenit etiam in Larice Agaricum optimum, de quo idoneo loco tractabimus. Vallis est supra Benacum lacum, cui à Laricum copia Vallarice nomen est. Sunt & Larices in ripis Padi, & in Slesia. Initio Martij mensis pullulare folia incipiunt ab iisdem germinibus, à quibus præcedente anno deciderant. Fructus Septembri maturus est. Laricis cortex, folia, fructus, nuclei eodem sunt, quo hæc in Pinu, temperamento, sed non eadem virium efficacia. Resina Larigna calida siccaque est, ut & cæteræ resinæ, sed magis absterget. Vtiliter emplastris, vnguentisque ad vulnera detergenda curandaque accommodatis miscetur. In tussi delincta cum melle thoracem expurgat. Sumpta ventrè lenit, vrinam prouocat, calculos expellit. Tardissimè Larix cariem vetustatemque sentit, ob succi amaritudinem, auctore Vitruuio.

Loco supracitato.

Lib. 16. c. 12.

Lib. 16. c. 10

Lib. 24. c. 6.

Locus.

Tempus.

Tèpera.

Vi-res.

CUPRESSVS CAP. XV.

CUPRESSVS Græcis κυπάρισσος dicitur, vel κυπάρισσος, ἀπὸ κύβητος & ἰσος τὸς ἀκρεμόνας, id est à partu parilium ramorum, Arabibus Suro, & Seru, Officinis Cypressus, Gallis, Anglis & Belgis Cypres, Italis Cypresso, Germanis Cypressen, Hispanis El Cypres. Eius duo sunt genera: Mas, & fœmina, cuius meta in fastigium conuoluitur: mas ramos in latum spargit. Vtraque procera est arbor, recta, crasso caudice, in summitate tantum ramosa: folia Sabinæ bacciferæ, viridiora, longiora, perpetuò virentia: conos Lariceis similes gignit, breuiiores, crassiores, duriores, compactiores, quos Nuces Cupressi vocat, alij pilulas, quidam Galbulos, in quibus semen, minimis granis constans, & quæ vix perspicui possint, non omitendo naturæ miraculo, è semine tam paruo nasci arbores adeo proceras. Hoc semen formicis mirè expetitur, ampliato etiam miraculo, tantuli animalis cibo absumi natalem tantarum arborum. Id Theophr. dicit esse non πικρῶδες, ut publica habent exemplaria, id est Piceæ semini simile, sed πικρῶδες, id est furfuraceum, siue furfurosum: est enim furfuri simillimum. Ligni materies flauescit, dura est, solida, compacta, odorata, maximè cum igni admouetur. Fundit caudex resinam liquidam, Larignæ, & Terebinthinæ similem, sapore acerrimam. Cupressus non nisi in locis calidis sponte prouenit, ut in Creta, Lycia, Rhodo, ac Cyrenensi etiam agro

Nomina

Genera.

Plin. lib. 16. cap. 33.

Forma.

Plin. li. 17. cap. 10.

Li. 1. Caul. cap. 5. Scalig. ibi.

Locus.

Theophr. lib. 4. Hist. cap. 6.

CUPRESSVS.

Plin. li. 16.
cap. 33.

Lib. 4. Hist.
cap. 1.
Tempus.
Li. 16. c. 27.

Temper.
& Vires.
Lib. 1. c. 86.



agro. Sed in Creta quocunque loco terram mouerit quispiā, nisi feratur alia, hæc gignitur, ac protinus emicat: illa verò etiam non appellato solo, ac vltro, maxime in Idæis montibus, & quos Albos vocant, summis eorum iugis, vnde niues nunquam absunt, plurima: quod miremur, alibi non nisi in tepore proueniens, & nutricem magnoperè fastidians. Hæc Plinius ex Theophrasto. Cupressi fructus maturus est mense Septembri, vel ineunte Vere. Plinius triferam esse ait, colligique baccas eius mense Ianuario, Maio, & Septembri. Cupressi folia fructusque ad tertium usque ordinem desiccant sine manifesto calore, & adstringunt. Cupressus Dioscoridi, refrigerat, & adstringit. Folia ex passo, & exiguo Myrrhæ pota vesicæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ ex vino tusæ in dysenteria, alui fluxione, tussi, orthopnoea, aut si reiiciatur sanguis, cōuenientissimè bibuntur. Earum decoctum eosdem præbet effectus. Tusæ cum fico duritias emol-

liunt, nariumque polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros vngues eiiciunt: hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt: Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ culices abigere existimantur. Folia trita & imposita vulnera glutinant, sanguinem reprimunt: trita ex aceto capillum tingunt: illinuntur per se, aut cum polenta, ignibus sacris, vlceribus quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus: ad mota cum cerato stomachum roborant. His addit Galenus Cupressi germina, totiusque stirpis qualitates declarat, quibus omnia efficiuntur quæ Diosc. proposuit. Cupressi folia, inquit, germina, pilulæ recentes & molles magna vulnera glutinant in duris corporibus: ex quo clarum est resiccandi vim habere absque insigni acrimonia, vel caliditate, sicut certè & gustus testatur. Apparet enim in ea levis quædam acrimonia, sed plurima amaritudo, multo etiam plus acerbitalis in tota planta. Tanta verò illa est acrimonia & caliditas, quanta satis sit deducendæ in altum acerbitali, sic ut nullum interim morsum, nullam molestant caliditatem in corporibus efficiat. Proinde altè latentes in flaccidis putrescentibusque affectibus humiditates innoxie tutoque depascitur, & absumit: alia verò quæ excalfaciunt simul, & desiccant, humiditates quidem illas absument, cæterum acrimonia, & caliditate alias attrahunt. Enterocelas Cupressus iuuat, quoniam exiccet, & robur addit corporis partibus præ humiditate laxis, ut pote cum adstrictio in altum subeat, deducente ipsam caliditate quæ adiuncta eum seruat modum, ut deducere quidē valeat, non autem morderere possit. Quidam Cupresso vtuntur ad carbunculos, & herpetas, polentæ miscentes, tanquam absumat citra excalfactionem eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui ad erysipellata vtuntur, admista nimirum polenta cum aqua, aut Oxycrato aquoso. Hæc Galenus. Aetius scobem, aut secamenta, ramentaue, ferra aut securi detracta, vel extrita quæ *πελεκύσματα*, & *πείσματα* vocat, ad corpori bonum colorem inducendum vsurpat. *πελεκύσματα κυπαρίσσου*, inquit, *καὶ πείνς, ἐλαίῳ ἐψησας, ἀλφύρω σῶμα*. Conorum Cupressi decoctum, scribit Matthiolus, ex aceto paratum, dentium dolores

Lib. 7. sim.

Lib. 8. c. 3.

Lib. 1. Dioscor. ca. 86.

dolores mulcere, si eo sæpè os colluatur. Idem præstat & foliorum decoctum. Hoc quoque medicamentum vitiliginem curant. Eorundem & vnguium mulorum cinis oleo myrtino exceptus valet illitus ad capillorum defluuium. Idem coni, ut Marcellus inquit, impari numero minutissimè triti, & ex vino vetere hausti, tussim potentissimè leniunt. Recentes viridèsque herniosos magnopere iuuant, si eorum decoctum ex vino vetere quotidie affecti biberint trium vnciarum pondere. Interim tamen folia Cupressi trita testiculis illinenda sunt, auxilio multis experimentis comprobato. Idem præstant tenera arboris germina commassa, ita ut eorum succus deglutiatur. His adiungit Dodon. fructum Cupressi foliorumue ex oleo decoctum, ventriculum roborare, vomitus reprimere, ventrem astringere, omnesque eius fluxiones, & pudendorum ulcerationibus mederi. Idem fructus cum caricis tusi genitalium tumoribus medentur, & addito fermento bubones dissipant impositi. Reliqua semina foliis Cupressi tuis si misceantur, tradunt à vermiculis non tangi, neque erodi. Ligni eius nulla temporis diuturnitate suauem odorem euanescere aiunt, quare id ad mentas & arculas expetitur, ac in iis numeratur, quæ cariem vetustatemque non sentiunt. Pinum & Cupressum aduersus Cariem tineasque firmissimas esse veteres prodiderunt, quam ob causam simulacra deorum ex ea sculpebant antiqui. Narrat Theuetus se, cum in Ægypto esset, vidisse Damiatæ capsam quandam ex Cupressi ligno fabricatam, in terram loco vliginosa, decem pedibus altius defossam, prorsus incorruptam, atque integerrimam inde extractam, cum illic sepulta fuisset ex quo Sultanus Selimus totam Ægyptum subiugauit, circiter annum Domini 1512.

Lib. 6. c. 36.

Plin. lib. 18. cap. 17.

Plin. lib. 16. cap. 40. 42. Theoph. li. 5. Hist. ca. 5. Theuet. 1. cosmog. li. 12. cap. 19.

THVIA. CAP. XVI.

DE resiniferis arboribus quæ conos producant, diximus, nunc de iis tractandum quæ baccas edunt. A Thuia incipiemus, quam Cedrum Lyciam esse Bellonius existimauit. Ego Thuia & non Cedri genus videri supra monui. Massilienses & Prouinciales apud quos frequens est, *Serbin* vocant, nomine ad Sabinam accedente, quamobrem aliqui Sabinæ genus esse volunt. Lobellius esse putat Cedrum Phœniciam alteram Plin. & Theophr. Oxycedrum verò folio Cupressi, aut Sabinam maiorem Monspelienses. Ex huius ligno virète, ut & Iuniperi, Fraxini, Sabinæ vtriusque, & Oxycedri, picis liquidæ genus foetidissimum conficitur, quod *Huille de Cade* vulgus appellat. Caudex eius est brachij crassitudine, scaber, fuluus, succo pingui madens: folia Cupressi simillima, obtusa, quasi squamulis compactilibus coagmentata, sibi ipsis insidentia, quæ si digitis terantur, odorem gratum spirant. Baccas edit rotundas, ad Iuniperinas accedentes, initio virides, mox ante maturitatem flauescences, postremo rubras, pulchras, gustu subamaro, odoratas. Aliud Thuia genus arborem esse puto, quam idem Bellon. Sabinam alteram, siue Sabinam arborentem vocat, frequentem admodum in montibus Amani & Olympi Phrygiæ cacuminibus: caudicem tortuoso, sæpè crassiore quam ut hominis brachiis

Thuia
genus 1.
Li. de Conif.Nomina
Locus.

Usus.

Forma.

Genus 2.
Ibidem.

Locus.

Forma.

THVIA, Massiliensium.



qui Sabinæ genus esse volunt. Lobellius esse putat Cedrum Phœniciam alteram Plin. & Theophr. Oxycedrum verò folio Cupressi, aut Sabinam maiorem Monspelienses. Ex huius ligno virète, ut & Iuniperi, Fraxini, Sabinæ vtriusque, & Oxycedri, picis liquidæ genus foetidissimum conficitur, quod *Huille de Cade* vulgus appellat. Caudex eius est brachij crassitudine, scaber, fuluus, succo pingui madens: folia Cupressi simillima, obtusa, quasi squamulis compactilibus coagmentata, sibi ipsis insidentia, quæ si digitis terantur, odorem gratum spirant. Baccas edit rotundas, ad Iuniperinas accedentes, initio virides, mox ante maturitatem flauescences, postremo rubras, pulchras, gustu subamaro, odoratas. Aliud Thuia genus arborem esse puto, quam idem Bellon. Sabinam alteram, siue Sabinam arborentem vocat, frequentem admodum in montibus Amani & Olympi Phrygiæ cacuminibus: caudicem tortuoso, sæpè crassiore quam ut hominis brachiis

brachiis capi possit: cortice viti simili, modicè crasso, rufo: materia foris alba, intus veluti gilua, cui nullam aliam similem reperiās. Est enim ei veluti vini dilutus quidam rubor degenerans in subnigrum. Perpetua coma viret: folia Cupresso omnino similia, adeo vt si eminus spectetur, etiam harū rerū peritus homo, à Cupresso vix internoscatur, maximè si baccis suis careat: densiora tamen sunt eius folia, gustatu amara, aroma olentia, & resinofum quidpiam præferentia. Florem non promit, apparente statim seminis rudimēto. Arbor illa baccarum ferax est, quas semper seruat hyeme, deciditibus annotinis cū aliæ maturæ fiunt: nondum maturæ virent, omnino maturæ ex nigro in cæruleum degenerant, rotundæ, Cedridibus vix crassiores. In extremis ramulorum furculis, & non alibi oriuntur, ita vt singuli ramulorum furculi singulas baccas ferant. Amaræ sunt & subodoratæ, turdis & merulis cibus gratissimus. Huius arboris materiam ad testudines faciendas Turcæ expetunt, quod in rimas nunquam findatur. Thuia tertium genus in regiis Callirhoes hortis, & quibusdam

THUIÆ genus tertium.

Arbor vitæ Gallis.

Vfus,
Genus 3.




Genus 4.
Cap. 2.

aliis Lutetiæ viret, nomine Paradiseæ arboris, magna odoris suauitate & vehementia, quam qui Francisco Galliarum Regi dono dedit, Arborem vitæ nominavit, fortasse ob odoris vehementia. Elegans admodū est arbuscula, perpetua fronde virens, caudice recto, ligno duro, nodoso, cortice ex rubro nigricante, ramis multis & expansis, qui in ramulos alios à lateribus succrescentes diuiduntur, in quibus folia oblonga, Cupressi fere, veluti è squamulis coagmentata, quaterna ferè semper simul, ex quorum extremis flores vere exeunt, quemadmodum in Cupresso, pusilli, flavescentes, quorum nonnulli deinde in exiguum fructum Pinei nuclei magnitudine formantur, Coni instar ex sex squamulis tennellis compactum, primo viridem, deinde pallescentem, & cū perfectè maturuerit, nigricantem, quaterna plerūque semina paleacea medio (in quo medulla acris & amariuscula) extuberante continentem. Tota arbor admodum odorata est. Quartum Thuia genus dixi esse Lyciam Cedrum Matthioli,

minore folio, dum arbor tenera est, Iuniperi, paulo breuiore, ac molliore, post tertium aut quartum annum, rotundo, Cupresso simili, & nonnunquam in ramis inferioribus adhuc acuto, & pungente, in summis verò, iam obtuso ac rotundo: quam mutationem nisi diligenter obseruemus, faciliè decepti credemus aliam esse plantam cū adolescit, & cū adulta est. In Spuriis Dioscoridis legitur Iuniperum magnam, quam syluestrem Cupressum aliqui vocant, vulgo cognitam esse, Cupresso similem, nascentem plerūque in asperis & maritimis, eadem facultate præditā quali Cupressus. Ea Dioscoridis verba huic plantæ conuenire quidam arbitrantur. Figura Matthioli ostendere videtur adolescentem, nostra adultam. Quod si quis nostram hanc de Thuia generibus sententiam reprehendat, Matthioli auctoritate & ratione fretus, quod scilicet Thuion siue Thuia forma Cupresso similis ramis, foliis, caudice, fructu, nusquam nisi apud Ammonis delubrum proueniat, & in Cyrenensi regione, auctore

THVIAE Genus quartum.



ctore Theophr. respōdeo Theophrastum duplicis Thuiæ meminisse, huius quam modò dixi quæ in Cyrenensi regione feruida nascitur, & quam Matthiolus Atlanticam Cedrum Plinij esse arbitratur (quanquam Hermolaus Citrum legi oportere scribat, tum omnibus approbantibus, tum ex Codicum antiquorū fide, & Thuion quod apud Homerum est, Citrum interpretetur Macrobius: Citrū autē illud crediderim, cuius in Atlante monte nobiles sylvæ materiam lautis mensarum orbibus suppeditauēre, Romanis expetitarum deliciis:) Alterius Græciæ familiaris, quam montium verticibus & gelidis locis gaudere tradit, & fructum tardissimè perficere, vt & Arcades narrant. Huius Arcadicę Thuiæ ea quatuor genera esse puto, quæ à me modò sunt exposita, sententiam mutaturus cum aliquis alius de iis meliora & probabiliora in medium protulerit. Perdurat Thuiæ materies incorrupta omnino. Radice huius arboris nihil crispus, nec aliunde pretiosiora opera.

Lib. 5. Hist. cap. 5.

Lib. 1. Dio. scor. c. 89. Lib. 13. c. 15. In Castig. Plin.

Lib. 4. Hist. cap. 1.

Theoph. li. 5. Hist. ca. 5.

TEREBINTHVS CAP. XVII.



TEREBINTHVS Græcè τέρμινθος nominatur, Arabicè *Baton, Boton, Botin*, siue *Albotin*, Italicè *Terebintho*, Gallicè *Terebinthe*, Hispanicè *Cornicabra*, Anglicè *Terpentine tree*. Folio est Lētisci, maiore, crassiore, pinguiore, perpetuò virente. Flores edit paruos, racemosos, rufescentes, ex quibus fructus prodeunt rotundi, primum virides, deinde rubescentes, postremò nigri, resinosi, odorati, duriq;. Grana viridia vocat Auicen. Ligni materies pulchra est, nigricans, densa. De hac arbore sic Theophrastus. Terebinthus alia mascula est, alia fœmina: & mascula quidem, sine fructu. Fœminarū altera fructum statim rubentem edit, lentis magnitudine, qui coqui nequit. Altera viridē (χλωρόν, Plinius pallidum vertit) deinde rubentem, & cum vitæ maturescentem, tandem nigrum, fabæ magnitudine, resinofum, odore iucundiores (sic enim Plinius θυωδέσπερον interpretatus est, Gaza θυωδέσπερον legit, id est, sulfurosum.) In Ida & Macedonia brevis hæc arbor est, fruticosa, contorta: in Damasco Syriæ magna, copiosa, pulchraq;. Montem enim quendam aiunt esse Terebinthis refertum, in quo arbor alia nulla gignitur. Materies ei lenta: radices validæ, & profundæ: tota arbor incorrupta, siue, vt loquitur Plinius, fidelis ad vetustatem: flos oleæ similis, rubens, folia

Nomina

Forma.

Lib. 2. c. 310.

Lib. 3. Hist. cap. 15.

Genera.

Lib. 13. c. 6.

Ibidem.



Lib.13.ca.6.

Lib.4.Hist.
cap.5.

Lib.2.c.310.

Locus.

Lib.1.Dio-
scor.ca.76.

Tempus.

Plin.lib.16.

ca.25.&26.

Lib.1.c.76.

Tēpera.

¶ Vi-

res.

Li.8. simp.

Li.8. simp.

Li.1.ca.39.

in vno pediculo multa, Laurinis similia, bina veluti sorbo, in summis ramusculorum partibus imparia, nisi quod minùs angulata quàm sorbo, & ambitu Laurinis similia, pingua cum toto fructu. Fert & illa folliculos quosdam cauos, vt Vlmus, in quibus nascuntur animalcula quædam, ceu culices. Sic enim ex Theophrasto legendum: *Φέρει δὲ τὰ κορυκώδη τινὰ κοῖλα*, non *κορυκώδη*, vt in excusis habetur, neque *κορυκώδη*, vt legit Gaza, qui sic vertit, Fert & ad nucis similitudinem quædam concaua, &c. Hi folliculi cornicula sunt rubentia, caprinis similia. Intus est resinofum quiddam, lentumq;: hinc tamen resina non colligitur, sed ex ligno: neque fructus Resinæ copiam fundit, sed manibus tantum adhæret, & si collectus non lauetur, coherescit, cum verò lauatur, candidus & immaturus supernatat, niger subsidit. Hæc Theophr. qui alio in loco Indicæ Terebinthi meminit, de qua idoneo loco dicitur. Resina liquida omnium præstantissima ex Terebintho manat, odorata, quæ non ita pridem in Italiam deferri cœpit. Eius locum Larigna non solum sibi vendicauerat, sed etiam cognomētum, vt iam dixi: nunc vera Terebinthina Venetias defertur ex Cypro. Antea coctam deferebant, vel quod aduectus esset commodior, vel ad adulterandum aptior. *ῥηλινὴν τερμινθινὴν*, Latine Resina Terebinthina dicitur, ab Auicenna Gluten Albotin. Montes amat Terebinthus. Nascitur in Syria, & Græcia, in multis Hetruriæ locis, præcipuè, in antiquorum ædificiorum ruinis, ac ruderibus, sed frequens admodum in Iapidiæ collibus, prope Pucinum castrum, haud procul ab Adriatico sinu, non longe à Tergesto. Prouenit etiam in Prouincia. Veris initio floret, mensibus reddit semen. Terebinthi folia, semen, & cortex Dioscoridi astringunt, & ad eadem, ad quæ Lentiscus, conueniunt, simili parata modo, sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, vrinā mouet, venerem excitat: contra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia Petræa defertur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Africa, & Cycladibus insulis. Sed præualet candida, perlucida, vitreo colore, & in cæruleum vergēte, Terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecellit. Galen. Terebinthi cortex idē ait, folia, fructus adstrictoriū quiddam obtinent, & secundo ordine excalfaciunt: itaque quod etiam desiccant, perspicuum est: recentes quidem, humidi modicè, sicci verò ordine secundo. Cæterum fructus aridus propinquus est tertio ordini desiccantium. Est enim adeo calidus, vt mandētibus protinus eius caliditas percipiatur. Itaque vrinam prouocat, & lienibus prodest. Inter Resinas, quod idem ait, præfertur Terebinthina, manifestam quidem, non tamen similiter atque Mastiche adstrictionem habens, verum adiunctam amaritudinem quandam, per quam valentius quàm Mastiche digerit. Ob eandem qualitatem inest & abstersio, tanta quidem, vt & psoras sanet. Quinetiam quæ in profundo resident cæteris Resinis magis attrahit, nimirum cum illis maiorem habeat partium tenuitatem. Terebinthina Resina, Matthiolo, auxiliatur laterum doloribus: sanat labiorum facieiq; rimas: scabiem & impetigines delet illita: vlcera purgat: vulnera recētia glutinat: splenem attenuat deuorata: valet ad articulorum dolores, podagram, chiragram, & ischiadicos affectus, si frequenter sumatur vnciæ pōdere, addito Chamæpiteas, aut Saluiæ, aut Stœchados puluere. Terebinthinū oleum ex fructu maturo Terebinthi fit, inquit Diosco. non secus ac Lentiscinum, quod calfacit & adstringit, non refrigerat & adstringit, vt falsò in excusis Codicibus legitur, Mesues ex baccis eius viridibus fieri scripsit, quod vulnera glutinat, spasmo, tetano, duritie neruorum confert. Huius olei nullus est apud nos vsus, neque aliunde ad nos importatur, sed oleo nos ex Terebinthina vtimur conuenientissimè in frigidis neruorum affectibus, atque omnibus aliis ægritudinibus frigidis, & flatuosis.

tuosis. In asthma, & anhelitus difficultate mirificū est, si duæ drachmæ quotidie hauriātur. Est & in empyemate vtile: denique in omni prava thoracis affectione ex pituita, colicis etiam doloribus, & flatuosis summoperè prodest: citraces decorat. Quanquam Terebinthina ferè oleum sit, tamè oleum, tenuissima eius pars, à Chymistis educitur ex ea, pulcherrimum, & copiosum. Resina Græcis *ῥησιν* nuncupatur, Arabibus *Ratim*, siue *Natig*, Italis *Ragia*, Gallis *Resine*, Germanis *Hartz*. Nomina

L E N T I S C V S C A P. X V I I I.



LENTISCUS dicta fortasse quòd lentore quodam folia lentescant, Græcis *ῥῖνος* vocatur, quasi *ῥῖνός*, fisisilis quòd facile & frequenter Nomina finderetur in dentiscalpia: Arabibus *Daru*, Gallis *Lentisque*, Italis *Lētisco*, Hispanis *Mata*, aut *Arueria*, Narbonensibus *Restiucle*, Germanicè *Mastichaum*, Anglicè *Mastietree*. Stolonibus & caudice concolor, & similis Terebintho minori. Stolones, nullo grandiore stipite à radice sublato, Corylorum Forma.

L E N T I S C V S.



sylvestriū modo huc illuc spargit, nisi quòd Lentiscus tum ramusculis, tum foliis densioribus est, magisque ramusculorum summitatibus ad terrā inflectitur. Folia Myrti emula, octona ex singulis pediculis prodeunt, pari vtrinque exortu, suauiter spirantia, pingua, friabilia, obscurè virentia, in ambitu tamen rubentia, sicut & quibusdam venulis. Perpetua fronde Lentiscus viret, cortice subrubro, lento, tenaci, flexibili. Profert Terebinthi modo racemosos fructus, & præter hos, folliculos quosdam corniculorum modo intortos, quibus liquor limpidus inclusus, tandem vertitur in bestiolas iis persimiles quæ ex Ulmi & Terebinthi folliculis euolant. Lentisci fructus, siue baccas, Hippocrat. *ῥηιδας* appellat, quanquam exemplaria Græca falsò *ῥηιδας* habeant. Mirum est quod scribit Matthiolus totā hanc plantam grauiter olere, olfactūque caput grauare, cum contrà Pena suauiter spirare affirmet, insertaq; in os folia sitim arce- Lib. de nat. mulieb. In ca. 75. lib. 1.

re, & fauces humectare. Præterea qui norunt Mastichen, & sciunt Lentisci furculos vt Xylobalsami succedaneum in Officinis vsurpari, Lentiscinisque dentiscalpiis post epulas dentes mundari, illius opinioni refragantur. Ex hac manat omniū præclarissima & optima resina, quæ *ῥησιν* vocatur, Latine Resina Lētiscina, Mastich, vulgo, & in Officinis Mastix. Hæc liquida non est, nec cæterarum resinarum modo coit, sed in tenues particulas concisa manet. Omnium præstantissima in Chio Ægei maris insula prouenit, vt à medicis Græcis Chia simpliciter pro Mastiche accipiat. Inde in vniuersam Europam comportatur. Ex mitibus tantum Lentisci plantis, vulneratis ipsarum truncis fluit, & in terra circumpauita concrefcit. Quidquid Mastiches in hac insula colligitur, rei publicæ debetur. Qui vindemiæ tempore propriis in agris legunt, id totum absque dolo in commune cōferunt. Abscissa manu pœnas dat, qui Lentiscum Mastichen fundentē in proprio vel alieno agro exciderit. Tanta est Mastiches

Locus.

Lib.1. Dio-
scor. ca.75.
Li.2. c.461.

Lib.6. Hist.
cap.4.

Lib.12. c.17.

Matth. ibi.
Matth. ibi.

cura, tantus illi honos apud Chios, nec abs re quidem, cum illis vniuersus ferè orbis tam excellens ac salubre medicamentum acceptum ferat. Fert & Lentiscus Italica Mastichen, sed raram admodum, nec Chia comparādam. Quare im- merito à nonnullis reprehenditur Auicēnas, quòd Mastiches Italicae memine- rit, quippe qui existiment fortasse Mastichen non alibi quàm in Chio nasci, in quo vehementer errant, arguiq; possunt Galeni & Auicennae auctoritate, qui non solum Chiam Mastichen memorant, sed etiam Ægyptiam. Theophrastus ex spinosa planta quam Ixinen nominat, emitti lacrymam narrat, quam Acan- thicen Mastichen vocat, Gaza, spinale: ea spina albus Chamæleo est, ad cuius radicē liquor albus reperitur, glutinosus, quē à Mastiches similitudine sic vo- carunt.) Plinius etiam plura Mastiches genera recenset: Iam ego, inquit, transeo ad Mastichē, quæ & ex humili spina fit in India, itemq; in Arabia: Lamā vocāt. Sed Mastiche quoque nobis gemina est, quoniā & in Asia Græciāq; reperitur herba radice folia emittēs, & carduū similē malo, seminis plenū, è quo lachry- ma erumpit, incisa parte ima, vix vt dignosci possit à Mastiche vera: nec non & tertia in Ponto est, bitumini similior. Laudatissima autem Chia, candida, cu- ius pretium in lib. x. x. (id est. denarij decem) nigræ verò x. i. i. (id est denarij duo.) Chia è Lentisco traditur gigni gummi modo. Adulteratur thure & resina. Sic enim corrigendi ex Dioscoride Codices vulgares qui habent, adulteratur vt thura resina. Vera Mastiche intelligenda est quæ ex sola Lentisco fluit: quæ verò ex quauis alia planta manat, improprie & per similitudinem Mastiche nomi- natur. In Creta etiam Lentiscus resinam fundit, sed flauam, amarā, & Chia lon- ge deteriorem. Lentiscus frequēs in Italia nascitur, præsertim in Hetruria, & in Campania. Huius etiam feracissima vniuersa Narbonēsis ora maritima. Flores racemosos, muscososq; primo vere, Aprili mense, promit, non particulatim, vt putant, ex Arati & Ciceronis versibus.

Iam verò semper viridis semperque grauata

Lentiscus, triplici solita est grandescere fœtu

Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi:

Lib.1. c.76.

Embl. 72.
lib.1. Diosc.

quod Theophrastus merito Scyllæ attribuit, alij verò vocis affinitate decepti, Lentisco. Toti Lentisco vis inest astringēdi, inquit Diosc. Etenim fructus eius, foliū, cortexq; ramorum, & radicis, parē facultatem sortiuntur. Sic Lacu. ex Græ- co aliter quam Ruell. vertit, cui adstipulatur Cornarius: καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς, καὶ τὸ φύλλον, καὶ ὁ φλοιὸς τῶν κλάδων, ἔχουσι τὴν ἰσοδυναμίαν. Lentiscus sua adstringente vi valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluuia, & dysentetias in potu: item cō- tra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem aut sedis procidentia: in totum Acaciæ & Hypocistidis vicem representat. Idem facit succus è tritis foliis. De- coctum fotu caua explet, fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, vrinam pellit, motus dentium collutione stabilit. Virentes surculi acumi- natæ arundinis vice dentibus repurgandis affricantur. Fit ex fructu oleum ad- strictoriam vim habens, quod prodest cū quid adstringi opus est. Lentiscus re- sinam gignit, quæ pota, utilis est sanguinem reiiciētibus, & tussi veteri: stoma- cho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in dentifricia & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum. Pilos in oculis replicat: māducata, oris halitū com- mendat, gingiuas contrahit. Præfertur nitedulæ modo resplendens, & candore Thyrrhenicæ ceræ similis, crassa, retorrída, friabilis, odorata: viridis autem in- ferior est. Hæc Diosco. in quibus quædam aliter quā à Ruellio non sine ratione versa sunt. Quæ enim Ruell. dixit, Semini, folio, ramo, cortici, radicibusque, cognatę insunt vires, And. Lac. aliter ex Græco, vt exposuimus, vertit. Quæ verò Ruellius sic, palpebras oculis incommodas replicat, Lac. hoc modo. Pilos in oculis

oculis replicat, hoc est, confirmat, stabilit, atque cōglutinat cilia: Cornarius verò, Agglutinat quoque palpebrarū pilos, oculis officientes: quæ sic intellige. Pilos in trichiasī oculorum affectu oculū pungentes, extra oculū specillo euerfos calens exteriori palpebræ, illita glutinis vice retinet, ne in oculum denuo resiliant: Nec absurdum fuerit annotare quòd Diosco. dicit, *ἡ δὲ ξυλάχεια χλωρὰ ἀντὶ χαλαμίδων παραλεβόμηναι τοῖς ὀδόντι, σμύχει τέτταρς*, id est, vt reddidit Cornarius, Ligna viridia arundinum vice dentibus adhibentur, & ipsos repurgant, de dentiscalpiis quæ ex Lentisco fiebant, hodieq; fiunt, accipiendū esse, quæ arundinū vice esse possunt, & non de dentifriciis, quæ in puluillum comminuta affricantur, sicut mox de Mastiche dicit. Itaque improprie Diosco. *παραλεβόμηναι* dixit, si affricari, & non velut dentiscalpium adhiberi Lentisci lignum quis accipiat, ad eximenda ea quæ in commansu dentibus inhærent, in quem vsum pennæ formari possunt, quod declarat Martialis.

Foditque tonsis ora laxa Lentiscis.

Et alibi:

Lentiscum melius, sed si tibi frondea cuspis

Defuerit, dentes penna leuare potest.

Lib. 6. in
Aopoph.

Porro quod Diosco. *χαπυρὰν* Mastichen probat, Cornarius valde aridā intelligit, id est *χαλαπυρὰν*. Vtitur etiam hac voce Diosco. paulo post, in Resinæ probatione, quæ esse *χαπυρὰ* non debet. Vfus est & Galenus lib. *ὑγιεινῶν*, quo loco Codex Basilienfis habet *χαπνηρὸν*. Fusch. emendare volens reponit *χαπνητὸν*, & vertit siccū, sicut & antiquus interpres, & rectè ille quidē si *χαπυρὸν* reposuisset. Mastichen Marcellus Empiricus vocat personatam, fortasse ex eo quod, inquit Cornarius, faciei illitionibus admixta, claritatem, ac nitorem inducit, sicut Dioscorides ait, vt sit veluti *προσωπίτης*. vel potius, quod Laruis fingēdis, aut etiā exprimēdæ hominum faciei, cum alba cera mixta in vsum veniat, id quod eius artis peritis notissimum est. Ex aquea essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca composita Lentiscus est, Galeno teste. Desiccatur igitur secundo ordine cōpleto, aut tertio incipiēte, in caliditatis & frigiditatis differentia quodammodo media. Similem omnibus suis partibus adstrictionē obtinet, radicibus, ramis, extremis turionibus, germinibus, ac foliis, fructu, & cortice. Si vero etiā succum ex foliis eius viridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderatè adstringēs. Itaq; bibitur & per se, & cū aliis medicamētis, quæ dysentericos & alios alui affectus sanant. Quin & ad sanguinis expuitiones, sanguinis ex vtero eruptiones, sedis, vuluæq; procidentias idoneus est, vtpote ad Hypocistida nōnihil prope accedens. Mastiche quidem candida, & Chia, quodāmodo ex cōtrariis cōposita est facultatibus, adstringente videlicet, & emolliente. Proinde stomachi, vētris, intestinorum, iecorisq; inflammationibus competit, vtpote secundo ordine ex-calfaciens, & desiccans. Nigra quæ Ægyptia cognominatur, magis desiccatur, & adstringit, quam obrem aptior est ad ea quæ validiorem digestionem per halitum exposcunt. Hac ratione ad furunculos bonum est remedium. Porro oleum vnguentumq; Mastichinum ex Chia conficitur, non admodum sanè ex Ægyptia, simili tamen facultate. Mastiche, quod ait Matth. cohibet sanguinem è naribus fluentem, si cum Thure, sanguine draconis, & leporinis pilis cōbustis excipiatur oui albo, & fronti applicetur, fascia superposita quæ arctè constringat. Manditur cum cera odorata, ad dentium dolores, & ad pituitam è capite detrahendam. Mulcet tollitq; Mastiche frigidos articulorum dolores, si cum Cymino, Pulegio, Saluia, Lauri baccis, Sabina, melle excipiatur, doloreq; affecto loco admoveatur. Valet ad ventriculi dolores, si cū itur dormitum, tres eius grumi deuorentur. Non solū enim hoc medicamento præsens leuatur dolor, sed ne iterum accidat, efficitur. Lentiscinum oleum quomodo ex maturo Lentisci

Ibidem.
Cap. 77.
Lib. 6. prope finem.

Ibidem.

Li. 3. simp.

Li. 7. simp.

Lib. 1. Dioscor. ca. 75.

Lib. I. c. 39. fructu paretur Diosco. docet. Hoc, inquit, scabiem iumentorum canumq; sanat, vtilissimum pēsis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Fit hoc oleū, in Hetruria, Ilua, & Gilio Thyrrheni maris insulis, & in quibusdā Adriatici, sine alterius olei permixtione, hoc modo. Racemosas Lentisci baccas à putaminibus repurgatas sinunt aliquot dies simul flaccescere: deinde in magnum ahenum iniectas affusa aqua, igne tandiu fouent, donec dehiscant, postremo extractas, & faccis inclusas prælo subiiciunt, oleumq; inde expressum seruant. Qui hoc ita parant, ad acuendam oculorum aciem, caliginesq; delēdas vtiliter cibis commisceri affirmant. Clystere infusum dysentericis quam maximè prodest. Gingiuvis inflammatione dolentibus optimum pharmacū est hoc oleum, auctore Galeno, modice calidum, retentum ore. Mastichinum fit è trita Mastiche, contra omnia vuluæ mala efficax: mediocriter calfacit, astringit, emollit. Aduersus prominētes stomachi duritias, coeliacorum, dysentericorumq; cruciatus vtile: faciem emaculat, & colorem nitidū reddit. Mesuæ fit ex Mastiches vnc. tribus, vini vnc. quatuor vel octo, olei rosacei libra vna, in vase duplici coctis omnibus ad vini consumptionem. Hoc cerebrum, neruos, articulos, ventriculum, hepar, cor, roborat: tumores duros mollit, dolores sedat. Omnium verò præstantissimum conficitur vitreis organis è purissima tantum Mastiche. Lentisci baccas Plinius velut oliuas, & corna, in cadis cōdi scripsit, ne quid nō hominis ventri natum esse videatur. Resina hæc *μαστιχη* Græcè vocatur: Latine Mastiche, aut Resina Lentiscina: Arabice *Mastich*, *Mastiche*, siue *Mastoche*: Italicè *Mastiche*. Germanicè, ac Gallicè *Mastic*, Hispanicè *Al Mastiga*.

IVNIPERVS CAP. XIX.

IVNIPERUS, Resinam emittat, siue gummi, siue lacrymam, Thuri, Mastichæue persimilem, atque alicubi montibus occupatis syluastotas efficiat, inter resiniferas syluæ nostræ arbores à nobis connumerabitur. Iuniperum dictam putant, quod iuniores & nouellos fructus pariat antiquis maturiscentibus: solam enim ferè arborum fœtus suos in biennium prorogare aiunt. Ἀπὸ τοῦ Græcè hæc dicitur, & Ἀπὸ τοῦ Arabice *Arornas*, aut *Archenas*, Italicè *Ginepro*, Gallicè *Geneure*, & *Geneurier*, Hispanicè *Enebro*, Germanicè *Vuekholtz*, & *Kremetbaum*, Anglicè *Iuniper tre*, Belgis *Geneuer boom*. Eius genera duo: altera maior, altera minor. Vulgaris nostra minor est, arbusculæ aut fruticis magnitudine, ramis obductis cortice, tenui, & membranoso, qui sponte rumpitur, ac dehiscit: foliis paruis, tenuibus, angustis, duris, pungentibus, imo spinis potius quam foliis: Baccis paruis, rotundis, viridibus initio, per maturitatem nigris, odoratis, vt lignum totum, gustui primū sub dulcibus, deinde amaris, quæ *ὑπερβόλες* Græcè dicuntur, in officinis Grana Iuniperi. Hæc Iunipero plerique colles in Gallia, montiumque iuga pubescunt. Thuscia urbanas alit, quæ in proceram arborem assurgunt, frequen

IVNIPERVS maior.



Nomina
Ruel. lib. I.
cap. 20.

Genera

Forma


Matthiol.
Lib. I. Diosc.
cap. 37.

frequentes in agro Senensi, quarum fructus sylvestribus crassior & dulcior est. Vulgatissima est & in Galliae prouincia hæc Iuniperus maior, ibi Cade vocata, bacca triplo maiore. Est & Iuniperus maximus Illyricus, carulea bacca, ea fortassis, cuius magnitudinem cum Nuce Pontica Dioscorides confert. Iuniperi hæc omnia genera coma perpetua virent, materie fulua, odorata, ex qua

Cor. Emb.
82.li.1.Dio.

IUNIPERUS

minor.



in calidis regionibus manat liquor, thuri colore & odore similis, qui cum colligitur, candidus est, cum senescit, in rufum abit. Iuniperi nostræ fructus ad eam magnitudinē non perueniunt quam Dioscor. expresse, vt alterius fructus Nucis magnitudine, alterius Nucis Ponticæ æqualis reperiatur. Maiorum Senensis agri Iuniperorum fructum nec Matth. quidē tradit ad eam accedere magnitudinē. Quare haud satis scio an frigiditati siccitati- que locorum id adscribendum sit, cū sint qui se vidisse è Græcia allatas testentur magnitudine fabæ, & qui nucem Auellanā ferè æquarēt, vel an Diosco. codices sint hoc loco mendosi. Nam Marcel. & Matthiol. hoc de Iunipero caput multis modis deprauatū esse adnotarunt. Serapio non nucis magnitudinem in Iuniperi baccis agnoscit, sed fabæ, vt fortasse vbi legitur, ὁ ὅ καρπὸς αὐτῶν ὁ μὲν τις καρπὸς μέγεθος εὐρίσκεται, ὁ ὅ καρπὸς ποντικῆς ἴσος, pro καρπὸς voce, quæ Nucem Iuglandem significat κυάμιν legerit, & omnino legere oporteat, quo minoris Iuniperi fructus, fabæ, maioris, nuci Auellanæ magnitudine sit æqualis, Dioscoridis litera sic restituta: ὁ ὅ καρπὸς αὐτῶν, ὁ μὲν τις καρπὸς

Ibidem.

Lib.16.c.39

ποντικῆς μέγεθος εὐρίσκεται, ὁ ὅ κυάμιν ἴσος. Certe Plinius cum scribit, Iunipero eadē virtus quæ Cedro: vasta hæc in Hispania, maximè que eius bacca, de diuersa Iunipero à nostrate loqui videtur, cuius etiam fructus multo sit maior. Tales Iuniperi in Castella noua, Hispaniæ prouincia frequentes supra Segobiam, qua itur Madritium, arborescunt, adeo procera, vt ex earum materia trabes & conignationes incolæ sibi fabricent. Iuniperi lacrymam Vernicem hodie vocant, quam recentiorum insolentia prohibere conata est Arabas, ne patrio vocabulo Sandarax appellarent, propterea quod affinis hæc vox est Græcorum Sandarachæ. Ita suis isti caueant legibus, ne Brizo fuerit Deliis dea vaticiniorum quæ per somnia fierent, quādo βρύζα fuit apud Thracas frugum genus: ne etiam ἐλάτη Diosco. sit floris palmarum inuolucrum, quoniam ἐλάτη omnibus sit Abies arbor. Sed Vernicem ab anni tempestate, & Vernilaginem docti viri etiam appellant, quod in mellificiis vocat Aristoteles Erithacem. Cornarius Verniginem siue Vernicem lacrymam aut gummi Iuniperi esse, falsò à quibusdam asseri scribit, quia factitia res sit Vernix, ex succino & oleo seminis lini, non simplex, aut sponte naturæ producta, id quod confirmat his rationibus. Vernicis gummi appellatio, inquit, ex Germanica voce facta est. Germani enim istic habitantes, vbi Succinum gignitur, & pro ornamento circum colla gestatur, Vernsten, & Bernisten id Succinum vocant, appellatione, vt videtur, ex eo facta, quod ac-

Scalig. lib.
2. de Plan.
Aristot.

Lib.5. Hist.
ani. ca. 22.
Emble. 82.
lib.1. Dios.
In lib.1.
medi. part.
& Emble.
92.li.1.Dio.

censum tedæ modo ac nidore flagret, quod ita fieri etiam Plinius, & Tacitus prodiderunt. In iisdem porro locis idipsum gūmi cum lini semine in id quod Vernicem vocant rem pictoribus familiarem, & quod Bituminis vsum hodie in plerisque locis præbet, apparatus. Quod autem ut nos nunc eo, ita veteres olim Bitumine vterentur, ex Plinio satis perspicitur, qui de Bitumine, ita scripsit. In reliquo vfu aramentis illinitur, firmatque ea contra ignes. Diximus, & tingi solitas ex eo statuas, & illini. Placuit in ferrariis fabrorum officinis tingendo ferro, clauorumque capitibus, ac multis aliis vsum. Ita tum in simplici re, tum in factitia, Vernicis nomen apud superius sæculum ex Germanica voce Vernsten, & Bernsten ob literarum V. & B. in pronunciando vicinitatem factum esse Cornarius existimat. Veruntamen Vernicis nomenclatura, quasi veris ros, quod vere potissimum gignatur, & æstate perficiatur, nulli non hodie nationi cognita est, tum pro simplici Iuniperi lacryma, tum pro illo factitio, ex sincera hac lacryma, & oleo lini conflato, quo illiti colores aliquantum imbuti, sic tinguntur, ut pertinacius hæreant quam deleri facile possint, ne id ex eiusmodi oleo & succino, solum fieri quis existimet. Succinum quidem Arabicæ familiæ auctores Karabe vocant, viribus non dissimile, sed re planè diuersum à Iuniperi lacryma, quam ipsi Sandarax, aut Sandaros appellant. Auicennas de his diuersis capitibus tractauit. Dioscoridis & Galeni sæculo Vernix in vsum non venerat. Plinius inter multa gummi genera Iuniperinum recenset, ad nihil utile, id quod falsum esse frequens eius in medicina vsum ostendit, ut dicemus. Mōtes amat Iuniperus, & in planis nasci recusat. Non floret, nisi si pulvis quidam qui mense Maio ex ipsa excitatur, floris loco, id quod quidam arbitrantur, habendus sit. Huic mox succedit baccarum paruarum exortus, quæ Septembri mense maturescunt. Sed in eadem Iunipero baccæ maturæ, immaturæ, minores, maioræque simul reperiuntur. Iuniperus vtraque acris est Diosco. Ex calfacit, urinam mouet, accensa serpentes fugat. Baccæ modicè calfaciunt, & adstringunt, stomacho vtilis: contra pectoris vitia, tussim, inflationes, tormina, & serpentum ictus efficacissimè bibuntur: urinam cient potæ: ruptis, conuulsis, & vuluæ strangulatui subueniunt. Quæ sequuntur in emendatis codicibus Græcis non leguntur. Folia acrimoniam habent, ideo tam ipsa quam eorum succum ex vino contra viperarum morsus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cū aqua illitus lepras eximit. Capitis verò clausulam multo absurdiorē & ineptiorē Matthiolus iudicat. τὸ ῥίνημα τῆ ξύλης ποθεὶν ἀαιρεῖ, id est ramenta verò ligni deuorata interficiunt quia nec Galen. nec Paul. nec Serapio qui verbum è verbo exscripsit, id vnquam de ligni Iuniperini ramentis literis mandarunt, cum baccæ eius contra serpentum ictus efficacissimè deuorentur, bibaturque ac illinatur foliorum expressus succus ad viperarum morsus. Adde etiam quod facto periculo id falsum esse deprehenditur. Quare hæc Diosco. falsò adscripta esse plerique censent. Scaliger tamen pro falsis non habet, cū scribit Iuniperi decoctum salutare, in quod succi sane traiectione facta est ramenta autore Dioscor. necant deuorata. Ratio haud absimilis ei quæ de Colocinthidis apparatu circumfertur. Multum enim & pinssi, & cribrari tenuissimo incerniculo iubent, ne hæreat atque vlceret, sic Iuniperi scobs ob siccitatem adhærescendo suffocat. Iuniperus Galeno calida & sicca est, vtrinque tertij ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccus, verum in hoc primi fuerit ordinis. Foliorum & baccarum Iuniperi decoctum, inquit Matth. potum valentissimè pellit menses. Earundem contusarum ex vino albo cum Rosis, Cupressi pilulis, & Myrti foliis decoctum calidum in ore retentum ad leuandos dentium dolores est

Li. 35. ca. 15.

Li. 13. ca. 11.

Locus.

Dodo. lib.

6. ca. 82.

Tempus.

Lib. 1. c. 87.

Vires.

Lib. 1. Diosc.
cap. 87.Exerci. 181.
lib. 15.

Ibidem.

res est efficacissimum, præsertim addito aquæ vitæ momento. Lixiuuium ex vino albo & Iuniperino cinere paratum vnciarum quatuor, aut quinque pondere valentissimè pellit vrinam, ita vt Matth. nonnullos hydropicos sese vidisse affirmet hoc tantum auxilio sanatos. Idem scabiem sanat, si eo affecti sese abluant. Paratur balneum admirabili facultate ad podagricos ex ligni Iuniperini confisi libris xii. coctis in aqua, quousque tertia pars superfit. Id decoctum cum ligno in labrum proiiciendum, in quod cum descenderit æger, optimè ante purgato corpore, sedeat vmbilico tenus, & membra languida foueat. Iuniperi laurique singulorum septenis baccis, cum cassiæ lignæ vulgaris semidrachma, & cinnamomi drachma, integris in turturis ventrem iniectis, si is affetur, gallinaceoque adipe perfundatur, & mulieri propediem pariturae, vesperi, alternis diebus edendus præbeatur, illa facillimè pariet. Fructus Iuniperi, rami, virgulta, totum denique lignum ad aerem emendandum incensa suffiuntur, & odoris suauitate grassantia pestilentiae contagia depellunt, sæuientemque eluunt perniciem. Oleum ex Iuniperi ligno Chymistæ per descensorium, vt loquuntur, conficiunt, quod calidum ore retentum dentium dolores mirificè mulcet, si à frigida defluxione oriantur. Fit ex baccis hoc longè præstantius & odoratū. Siccus vernix, idest gummi Iuniperi, auctore Serapione, destillationes suspendit, mensium profluvia sistit, sinus exiccat immissus, haustus verò pituitam, quæ ventriculo & intestinis hæserit: tineas & cætera in ventre animalia necat. Nervorum resolutionibus, quas humores frigidi effecerint, opitulatur. Capitis destillationes suffitu discutit. Idem sumptus sanguinis excreationes suppressit, & hæmorrhoidas fluentes, illitus. Addito tum rosaceo, tum myrtino sedis rimas cœrcet, & hiantibus frigore manuum pedumque scissuris illitu succurrit. Eius igni impositi fumus dentium dolores sedat, si per infundibulum addentem affectum peruenerit. Eiusdem puluis cum oui albo subactus, & fronti temporibusque illitus, sanguinem ex naribus fluentem sistit: vt summatim dicam, calfacit, siccâtque primo ordine. Vernix liquidus qui ex illo syncero, & oleo ex lini semine expresso conficitur, non ad illustrandas tantum picturas, & ad nitorem ferro cõciliandum utilis est, sed & ad ambusta, dolores & tumores hæmorrhoidum conuenientissimum est remedium. Iuniperi materies cariem vetustatemque non sentit. Quare Chymistæ carbonem Iuniperinum accensum & suo cinere obrutum, ignem integro anno fouere asseuerant, id quod Scaliger persuadere sibi nequit.

Plin. lib. 16.
cap. 40.
Exce. 328.
libr. 15.

RESINA ET PIX.

CAP. XX.

RESINIFERIS arboribus tam iis quæ conos, quàm quæ baccas ferunt explicatis, de resina & pice merito mihi dicendum videtur. Earum igitur genera, cocturas, vsus, virésque declarabimus. Resina ῥηψισιν Græcis nominata, Gallis *resine*, & *Poix resiné*, succus pinguis est ex arboribus quibusdam sponte manans. Id indicat Plinius his verbis. Arborum succo manantium, picem resinamque in Oriente alię, alię in Europa ferunt, &c. Resinæ summæ species duæ, liquida, & sicca. Liquidam è Terebintho, Larice, Lentisco, Cupresso fieri tradit Plinius, & alibi ex Terebintho, Lentisco, Cupresso, omissa Larice. Dioscor. è Pinu, Picea, Larice, Cupresso. His addenda illa quam ex Cedro Phœnicia fluere diximus. Quod de liquida Lentisci Resina bis dixit Plinius iis locis quos modò citaui, planè falsum est. Mastiche enim nunquam liquida est, sed semper in ipsa arbore spissatur. Est etiam falsum quod horum locorum altero legitur: Liquidam fundunt omnes, & tantum Resinam, crassiorē verò, & ad pices faciendas Cedrus: at mendum illud sic tolli potest: Liqui

Nomina

Li. 14. c. 20.
Genera

Li. 24. ca. 6.

Li. 14. c. 20.

Lib. 1. c. 77.

Li. 14. c. 20.

Lib. 16. c. 11.
Resinæ eli-
ciendæ mo-
dus.

Lib. 9. Hist.
cap. 2.

In cap. 91. l.
1. Dioscor.

Li. 16. ca. 12.

Ibidem.

Lib. 9. Hist.
cap. 2.

Liquidam fundunt omnes, & tantum Resinam, crassiore verò ad pices faciendas idonea Cedrus: id est, crassiore resinam fundit Cedrus, quæ Cedrus picibus faciendis idonea est. Nam neque ex crassiore Cedri Resina, neque alia quavis picem fieri constat, sed ex teda, siue ex assulis arborum succosis. In Syria certe pix ex Cedro fiebat, ipsomet Plinio auctore. Sicca Resina ex Abiete, Pinu, Picea, & Pineis nucibus manat. Resina elicitur, ut docet Theoph. ex Pino, detracto tantum cortice (non detracta teda, ut scribit Hermolaus secutus Gazam) In hoc enim vulnus humor multus confluit: ex Picea verò, & Abiete non Cortice tantum spoliatis, sed ipso etiam corpore, id est ligno vulnerato. Hinc primum Plinij lapsus perspicitur, eo loco quem mox citabimus, è Picea detracto cortice resinam fluere dicentis, quod de Pino scripsit Theoph. deinde eiusdem deprauata hæc lectio: Nec corpori ipsi parcitur in cæteris, vel, ut in cæteris, sic restituenda, Corpori ipsi parcitur, non ut in cæteris. Sed quoniam totum locum hunc de Resina conficienda ex Theoph. Plinius excerpfit, hunc cum illo conferre Lectori nec iniucundum, nec inutile fore putavi, ut etiam ex hac mutua collatione iudicet, quam malè Plinius archetypum suum imitetur. Hæc igitur Plinius. Aperitur Picea è parte solari, non plaga, sed vulnere ablati corticis, cum plurimum bipedali hiatu, ut à terra cubito cum minimum absit, nec corpori ipsi parcitur, ut in cæteris, quoniam hastula in fructu est. Verum terræ proxima laudatur, altior amaritudinem affert. Postea humor omnis è tota confluit in vlcus: Item in Teda. Theophr. verò sic. Idæi caudicem cum cortice spoliarent, (spoliant autem à solari parte duobus tribusve supraterram cubitis) anno post eo confluxus fit maximè ἐν δαδός, id est pinguis resinofusque. Vide quantum Plinij oratio à Theoph. oratione absit. Rursum Plinius. Cum is manare desiit, simili modo ex alia parte aperitur, ac deinde alia. Postea tota arbor succiditur, & medulla eius vritur. Theophrastus verò: Quod autem confluxit, ubi securi dolauerint, altero post anno denuo ἐν δαδός, id est resinofum succum fundit, siue teda fit, ac iterum tertio post. Tales autem arbores quoniam subtus cæsa fuerunt, putrefactæ à ventis deiiciuntur, quarum cor Idæi eximunt, quod maxime sit δαδωδές, id est pingue ac succosum, ac potissimum radices, quæ ut dixi, maximè omnium sunt ἐν δαδοί, id est succo pingui redundantes, siue in tedam mutata. Sic & in Syria (subiungit Plinius) Terebintho detrahunt cortices, ibi quidem & è ramis, & è radicibus, cum resina dānetur ex his partibus. At Theophrastus. Vulnerant & Terebinthos vtraque parte (ad Resinam eliciendam sub) scilicet cortice, & ramis. Sed quæ in caudicem resina confluit, & largior, & melior est, quàm quæ in ramos. Verum Theophr. quoque ipse locis quibusdam ad hanc rem spectantibus contaminatus est. In eo enim legendum ἢ ὅ ἀναπλήρωσις οὐκ ἐκ τῆς ξύλης καὶ τῆς συμφύσεως, ἀλλὰ τῆς ῥηλίνης ἐστὶ, non τῆς πίτης, ut in excusis legitur: id est: Expletur verò plaga non renascente ligno, neque coalescente, sed Resina. Id primum ex eo perspicuum esse potest, quod ex arboribus pix non manat: deinde ex Plinij testimonio hæc sic interpretantis. Expletur autem plaga Resina, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit. Adhæc legendum. Ἀλλ' ἢ ἐργασία διὰ τοσούτου χρόνου γίνεται τῆς ῥηλίνης, ἢ τῆς πίτης, ἀναγκαῖον ὅ δὲ λονότι καὶ τῷ ξύλῳ γενέσθαι τινὰ πρόσφυσιν, εἴπερ ἐξαίρεμένης τῆς διαδός, καὶ κηκομένης, τῆς πίτης ἢ ἐκροῇ. Quæ quoniam Gaza non intellexisse, atque adeo malè conuertisse videtur, sic mihi videntur transferenda. Fit ergo tanto temporis spatio (trienio scilicet) Resina. Necesse est autem, quoniam (exacto scilicet triennio) teda detrahatur, ex qua vsta, pix fluit, ligno alimenti quidpiam suppeditari. γενέσθαι τινὰ πρόσφυσιν, subaudi τῆς τροφῆς. Alij legunt. Ἀλλ' ἐργασία διὰ τοσούτου χρόνου μὴ γίνεται τῆς πίτης. Id est ex arboribus ad resinæ cōfluxum vulneratis, toto hoc trien-

nio pix non conficitur. Eo enim demum exacto ex illarum teda pix fit. Haftenus de Resinæ generibus, arboribus quæ eam emittunt, eiusque conficiendæ ratione ex Theoph. & Plinio. Sunt qui alia eius genera, statuant, ξυλώδη scilicet idest, lignosam, in Italia tantum nascentem, quam in dropacem ab Oribasio & Paulo admitti annotat Hermolaus, eamque fortassis esse Tyrrhenicam putat, vel Gallicam, Columellæ verò corticatam. At ego non resinam ξυλώδη, sed ἰξωδή, idest viscidam lego. Etenim quæ talis est, dropacibus admixta ob glutinosum lentorem tenacius parti adhæret. Corticatæ verò Resinæ nusquam meminit Columella, sed corticatæ picis Allobrogum, de qua postea dicemus. Præterea Hermolaus in malagmate quod βαίον appellat, ego φαιόν, idest fuscum, resinam ζυγίαν, idest Acernam inueniri scripsit. Sed quis vnquam Acer resinosum esse aut prodidit, aut alicubi vidit? Quare non resinam ζυγίαν, sed Phrygiam legendum puto, ex Ida monte Phrygiæ, inter Resinarum genera celebrem. Galenus etiam Resinæ siccissimæ genus vocat πύλινον φύσημα, veluti piceæ bullam, idest resinę veluti guttas rotundasque bullas ex Picea manantes, & in eius cortice pluuiis, ventis, æstu, frigore duratas, candidas, thuri sic similes, vt ijs olim thus adulteraretur. Δολεται, inquit Diosc. πᾶς λίβανος πύλινος ῥηλίνης μεθοδεύμενος, καὶ κομμ. Ea fortassis Resina est è Picea quam admodum candidam in Asia fieri tradit Plini⁹, & Spagada vocari scribit. Hermolaus Epargon legit, ita enim Græcè cādida significatur, vel Plēcada, quasi à roratu, ἀπὸ τοῦ ρεκάζειν. Quid si Stagoniā vel Stalactin legas, idest guttatim stillantē, vel stillatitiam, quibus nominibus Thuris & Calcanthi genus Diosco. appellat? De eadem resina Plinius alibi loqui videtur. Picea plurimam resinam fundit, interueniente candida gemma, tam simili thuri, vt mista visu discerni non queat, vnde fraus seplasiæ. Addam duo ex Plinio, vnum, Resinæ florem crudum ab eo dici, tenuem Resinę crudæ, & siccæ partem, quæ in ea veluti bullat, & efflorescit: Alterū, permirum id videri quod scribit: Resina omnis dissoluitur oleo: quidam & creta figlinarum hoc fieri arbitrantur. Resinam enim creta liquari aut dissolui posse, verum non est, atque adeo si quis resinæ liquatæ cretam, vel aliquod aliud terræ pinguis genus admisceat, massa fit durissima, & quouis cemēto solidior: quare locum sic corrigendum esse arbitror: Resina omnis dissoluitur oleo, Pudet confiteri maximum iam honorem esse in euellendis virorum corpori pilis. Quidam creta figlinarum hoc fieri arbitrātur, &c. Nam pili adimuntur, vel cū mauelluntur, vel cū detrahuntur. Auelluntur digitis, forficulis medicamentorum tenacium impositu. Quam ob causam Archigenes apud Ætium, priusquam dropax ex pice admoueat, radi membra præcipit, ne cum dropax tollitur, magno cum dolore vellantur pili. Medicamenta huiusmodi sunt, Resina, pix, Creta pinguis Melia Creta etiam pilos velli auctor est Plinius, quanquam Dioscorides ea tantum pilos extenuari scribat. Detrahuntur autem medicamentis septicis & vrentibus, vt Calce, Auri pigmento, lacte Salamandræ, & id genus aliis. Cretam figlinarum ad vellendos pilos tutius adhiberi quàm resinam ob id puto, in facie præsertim, quod vt Resina nec calfaciat, nec humores attrahat, nec varos, papulas, tubercula excitet. Est porro deinceps de resinæ coctura dicendum. Liquida Resina in offas cogitur duras, & solidas, ducentorum fere pondo singulas, in aquæ duplotandiu cocta, quousque odorem amittat, friabilisque & tam arida reddatur, vt digitis iam non cedat, nec eorum vestigium recipiat, vt fit, cum eius lentor nondum prorsus consumptus est. Est autem liquanda & colo defecanda, vt feculentæ sordes secernantur, priusquam in feruentem aquam coniiciatur. Hoc coquendi artificio Resina candidissima euadit, ac fere niuea, etiam si antea vel fulua, vt Colophoniam vera, vel oleosa, aut mellei coloris, vt Larigna,

In libr. I.
Diosc. c. 91.Lib. 12. c. 23.
Ibidem.
Pauli lib. 7.
cap. 18.The. libr. 9.
Histo. ca. 2.
Li. 2. med.
gen. cap. 2.
& lib. 3. c. 2.Lib. 1. c. 70.
Li. 14. c. 20.
Lib. 1. c. 70.
& lib. 5. ca.
de chalc.
Lib. 16. c. 10.

Li. 14. ca. 20

Lib. 1. c. 180.

Lib. 35. c. 6.
Lib. 5. c. 180.Resinę co-
ctum.

Larigna, fuerit. Ex quibus perspicere licet Ruellium Dioscor. de hac re verba recte non expressisse: Donec inquit, friabilis, ac retorrída reddatur, & digitis cedat, cum legendum sit, *καπυρά, καὶ ὡς μὴ τοῖς δακτύλοις ἔχειν*, id est arida vt digitis non cedat: deinde: Resina fit etiam eximij candoris, si omnis eliquata percoletur, &c. Vertendum erat, fit autem (hoc subaudi, coquendi supradicto modo) eximiè candida. Omnem autem Resinam liquare, & colo defecare antea oportet, &c. Sed & Diosco. ipsum mirantur plerique, ac iure quidem, cum declarat modum spissandæ in aqua feruente Resinæ liquidæ, eam *καίειν*, id est vri dixisse, ac non potius *ἐλείπειν*, id est elixari. Spissatur etiam Resina, cocta sine aqua, in cortinis aeneis, subiecto primùm igne lento, deinde vbi coire cæpit, carbonibus liberalius aggestis, & aucto igne, vt quicquid serosi est exhalet. Si liquidam durare, & in offas redigere hac ratione libet, coquenda ea est sine intermissione, diebus ac noctibus tribus, quo ad odoris expers, friabilis, arida, nec sub digitis lentescens, vt antea, fiat. Sin iam siccam in offas ducere placet, vnodie coxisse sufficiet. Sic coctam & duratam Græci *φρυκτὴν* vocant, veluti frixam, Galli *Poix resine*, Piceam resinam, aut picem resinaceam. Haud adsimilis est coquendi modus hodie Chymistis vsitatus, oleum è Terebinthina elicentibus. Phialam ingentem vitream, luto oblitam, & Resina ad dimidium vsque impletam furno imponunt, alterius vacuæ, & quod stillat excepturæ collum in eius fauces inferentes. Deinde ea cautione qua dictum est, ignem accendunt. Fluit primùm liquidus sudor Resinæ, aquam Chymistæ vocant, Pisselæo veterum is respondet: abiicitur is tanquã inutilis, tametsi ad ea valeat, ad quæ Pisselæon commendatur. Sequitur oleosus liquor, qui cum totus exstillauerit, arida, & friabilis in Phialæ fundo Resina superest: Colophoniam hodie nominant, magni, vt & olim, in medicina vsus. Scire tamen licet nominis Colophonix multiplicem significatum fuisse. Sic enim dicta olim fuit Resina frixa auctore Galeno, & Resina cruda, ex Picea, Pinoue sicca, Chie Mastiche persimilis, ex Colophone aduehi solita: Præterea Resina liquida ex iisdem arboribus, ab eodem loco missa, eodem Galeno teste, quæ quod suauissimè oleret, & admodum pauca colligeretur, summo erat in pretio. Cùm à Chymistis eo quo diximus modo vritur Resina, æquum est ex singulis libris effluere aquosi feri vnciam vnā, oleosi liquoris vncias quatuor. Plinius coquendæ Resinæ modum breuiter perstringens, multum hallucinatur: E Picea, inquit Resina feruentibus cocta lapidibus, in alueis validi Roboris, aut si aluei non sint, struis congerie, velut in carbonis vstu: (vsu legit Hermolaus) Neque enim resina coquitur circum accensa lignorum strue, quemadmodum carbo vritur, sed Pix, auctore Theophr. qui in coquenda pice lignorum fieri tradit *παραπλησίαν σώθεισιν τῆς τῶν ἀνθρακεόντων*, similem fieri struem dicit, ac si carbo vreretur. Quod verò consequitur, Resinā eo modo coctam in vinum addi, farinæ modo tusam, nigriore colore, non est sic accipiendum, vt planè nigram esse existimemus (nam cuiusvis resinæ coctæ & tusæ puluisculus ex flauo albescit) sed minus candidam, quam quæ in aqua feruente coquitur. Præterea cùm scribit, Eadem resina si cum aqua leuius (*πρώως* Diosco. id est leni igne) decoquatur, coleturque, rufo colore lentescit, ac stillatitia vocatur. Seponuntur autem (Hermolaus eliguntur) in id ferè vitia Resinæ, corticis que: & aliquot versibus post: Resinæ albæ congium in duobus aqua pluuiæ coquunt, malè conuertit, & declarat resinæ in aqua coquendæ modum, a Dioscor. traditum. Neque enim Resinæ albæ congium coquitur, sed Resinæ congium quam albam efficere volumus, neque cocta in aqua rufescit, sed fit *ἐξὸς ὡς λευκή*, id est eximiè candida. Adhæc deponuntur malim, cum *χωρίζεται* verbo vtatur Diosc. quàm seponuntur. Intelligit enim, id quod etiam antea diximus

Li. 7. med.
gen. ca. 3.

Lib. 2. med.
gen. cap. 2.

Lib. 16. c. 11.

In casti. in
Plinius.
Lib. 9. Hist.
cap. 3.

Lib. 1. c. 94.

li. 1. Diosc.
cap. 91.

mus, si liquetur, & coletur resina priusquam coquatur, vitia, sordes, corticēsque excerni ac detrahi, puramque ac expurgatam deinde coqui. Resina condire multa vulgare est Italiae, prouinciis que finitimis, inquit Plinius, vehementiusque id fieri arbitrantur crudo flore Resinae, excitarique lenitatem. Palladius. Quidam Resinae siccae trite vncias tres dolio immergunt, & permouent, ac vina diuretica sic fieri posse persuadent. Columella inter medicamina musto in defrutario ad tertias decocto adiicienda, Resinae Terebinthinae sesquilibram recenset. Ea conditura feritatem vini compescebant, virusque frangebant, aut vbi pigra vini lenitas torperet, virus addebant, ea tamen moderatione, vt mustis pugnacibus plus inderetur, lenibus parcius. Resinam verò sine curiosa alia preparatione, vt ex arbore collecta fuerat, musto permiscebant, aut florem Resinae sic præparatum. Eum cum assulis multis, tenuibus, breuibus quibus inhe- ret, minutim concisum & cribratum, in aqua feruida coquebant. Sic enim pinguis Resina exprimebatur, rara, nec nisi paucis in locis subalpinae Italiae, ad vini condituram excellens, & medicinae conueniens. Hanc condituram Plinius Crapulam vocat, quod vina, opinor, sic condita capitis dolorem & vertiginem excitarent, præsertim nouitia, nec inueterata, quod ipse declarat his verbis. Nouitium Resinatum nulli conducit. Capitis dolorem & vertiginem facit, ab hoc dicta Crapula est. Quare Columella cum aromata quibus defrutum cōdi- ri solebat, enumerans Crispam pampinaceam nominat, plerique docti viri cra- pulam resinaceam legunt, Hermolaus verò Sertam Campanicam, ob id, opinor quod ea, Palladio teste, ad vini condituram vterentur. Vina resina condita fri- gidis stomachis vtilia existimabantur, noxia verò vomitoribus, sicut & mustū, & sapam, & passum. Galenus Resinas omnes siccare & excalescere scribit. Cæ- terum inter se discrepare, quod plus aut minus habeant in gustu quidem acrimoniae, in facultate verò caliditatis: tum quod alia plus, alia minus sortite sunt partium tenuitatis: præterea quod nonnullæ adstrictionis sunt participes, alia nequaquam, Idem alibi, Resinarum inquit calidissima est Strobilina, & celerri- me siccatur moderatissima Terebinthina, Pitynon Physema siccatur & calefacit, siccando autem à Strobilina non superatur, calefaciendo, plurimum. Inter Pi- tynon Physema & Strobilinam Resinam media calore est Abietina, sicut etiā Colophonia Thus redolēs, calore mediocri prædita. Humidissima est omniū, altera Larignae differentia. Nam hæc duplex est: vna similis Terebinthinae: altera acrior, calidior, magis liquida, odoratu grauior, & gustu amarior. Sed & vasis ficti libus Piceam resinam continentibus, quæ subsidit liquida Resina, consistentia & colore Terebinthinae adamussim similis, odore & gustu diuersa, ingrator qui- dē olfactu est, sicut etiā acrior, & gustu mordacior. Cupressi Resina nō nihil ad- stringit. Putabit, inquit, forsan aliquis, à nobis dissentire Diosc. de resinis sic scri- bentem: Ex omnibus principatus Terebinthinae datur, posteam Lentiscinae, tū ei quæ de Picea manat, & Abiete, vltimū locū Pineae Strobilinaeque obtinet. In his enim Diosc. tāquā de infima Strobilina, optima verò Terebinthina sentire videtur. Verū ego ex his tribus Resinis, Strobilina, Abietina, Terebinthina, prin- cipem certē Strobilinam calore, secundā Abietinā, postremā Terebinthinā esse dixi. Ac de Resina quidē satis ferē dictū est, nunc de Pice differamus. Pix inquit Plinius, nihil aliud est quā combustæ Resinae fluxus. At ex Resina Piceam nō fieri, sed ex teda vsta iam diximus. Quare Hermolaus cum hac definitione Pi- cis notionem parum explicatam esse perspiceret, dixit, Picem esse combustæ in teda sua Resinae fluxum. Vt enim Resina ex arboribus manat, aut liquida, & fluens, aut in ijs concrescens, sic Pix ex teda, idest ex vstis arborum succosis & resinosis assulis ignis vi elicitur. Assulæ verò aut ex arboribus adhuc stantibus

*Resina**usus.*

Li. 14. c. 19.

& 20.

Cap. 14.

octobr.

Li. 12. c. 20.

Li. 14. cap.

20. &

Lib. 16. c. 11.

Li. 23. ca. 1.

Li. 12. c. 20.

Lib. 3. Dio-
scor. ca. 46.

Capit. 14.

octobr.

Plin. Ibid.

Lib. 8. sim.

Vires.

Li. 2. med.

gen. cap. 2.

Ibid. lib. 3.

cap. 2.

lib. 1. c. de

Tereb.

Nomina

Li. 23. cap. 1.

In li. 1. Dio

scor. ca. 92.

defecantur, nimirum iis quas ad Resinam, eliciendam vulnerant, aut ex arboribus cæduntur, quæ nullam amplius fundentes Resinam, vel à ventis euersæ sunt, vel à rusticis ad picem conficiendam deiectæ. Harum arborum præsertim Pinorum radices, eiusmodi succo pingui qui in picem liquitur, maximè abundant: & in his, media truncorum pars, quam Græci *καρδίαν*, & *μήτραν*, idest cor, & matricem vocant. Picem è pinguißimis Pini Piceæque lignis congregari rectè scripsit Dioscorid. malè Plinius, è Piceæ Resina: in Hispania autem, è Piceastris (alijs Pinastris) nihilo magis laudata, quàm aliarum Resina, amara, arida, & grauis odoris. Terebinthum picem fundere apud Syros scribit Theophr. Quidam addunt, inquit, & Piceam, & Cedrum phœniciam (Gaza malè Cedrum & Palmam vertit.) Sed quia id rarò fit, perinde ac id quod fortè euenit accipiendum. Macedones enim ad picem faciendam, ne Pinum quidem vrunt, præterquam marem. Quandam enim marem vocant, aliam fœminam, tertiam sterilem. Fœminæ verò radices tantùm ad id sumunt. Omnium nanque Pinorum succosa, pinguisque est radix. Hæc transtulit sic Plinius. In Macedonia inquit Laricem masculam vrunt: (ad picem conficiendam sub.) fœminæ radices tantùm: quorum velut oblitus alio in loco, ex arbore mascula meliorem non esse picem scripsit. Spissarum inquit, vtilissima medicinæ est pix Brutia, quoniam pinguißima, & resinosißima, vtrasque præbet vtilitates, vtriusque (Piceis Resinæque naturam simul habet, inquit Dioscorides) ob id magis rutila quàm cæteræ. Id enim quod in hoc adiiciunt, ex arbore mascula Piceis faciendæ modum meliorem esse, non arbitror posse intelligi. Pix duobus fit modis. Prior is est. In area cretacea pauca teda pinguem, siue frustra truncorum veteris & pinguis Pini recta collocant, eo prorsus modo quo in carbonariis. Struem hanc fronde Abietum & Picearum contegunt, luto vndique obstruentes, ne flamma perumpat, & emicet: id enim si contingat, pix perit. Aditu in ima struis parte relicto, ignem succendunt, quo cum ardet teda, pix liquecens in canalem aream cingentem fluit, ac inde per alios ductus in scrobes ligneis afferibus vestitas, ne terra ebibat, deriuatur. Ea tandem excepta, dolia, cados, vtres implent. Eodem modo à Macedonibus Picem vri fusius tradidit Theophr. Posterior modus est. Ingentibus vasis terra defossis, laminam ferream multis foraminibus peruiam, vel ambiente canali cinctam adaptant. Super hanc furnum extruunt, teda assulatim cæsa complent, & obturât: ignem accensum extrorsum circundant. Feruescens teda primum aquosum sudorem mittit, deinde crassiolem sudore liquidam picem. Non absimili ratione pastores & opiliones Mafsilienses ex Oxycedro picem conficiunt. Ollam enim primum defodiunt: deinde alteram ori defossæ æqualem assulis Oxycedri replent, virgulis transuersim cratis modo super impositis, ne assulæ decendant. Ollam sic repletam in os conuertunt, defossæque applicant. Luto rimas oblinunt, qua commissæ sunt ollæ, ac tum ignem circum accendunt. Primum sudorem aquæ modo canali fluentem in Syria Cedrium siue Cedria vocabatur, teste Plinio, quia Syri cum Pinis & Piceis carerent, rarissimè Terebinthos, sæpius Cedros ad picem conficiendam vrebant, vt alibi annotauimus, cum Bellonij opinionem improbaremus, qui ex quauis arbore resinifera huiusmodi fluentem liquorem Cedrium vocat. Aquosus is sudor piceis serum est. Eius Piceis vt Resinæ duo sunt genera: Liquida altera, Græcis *ὕψα*, Arabibus *Eerfs*, *Zefs*, aut *Kir*, Italis *Peceliquida*, Germanis Pix omnis *Bech*, sicut Hispanis *Pex negra*, Gallis *Poix fon-*
due. Hæc alium ignem non experta quam cuius calore fluxit, *ωμὴν*, idest cruda à Theophrasto sæpè dicitur, optima splendens, sincera, læuis. Altera Pix sicca dicitur, coctione durata, aut in doliis & seriis in quibus seruatur, diuturnitate spissata

Pix ex quibus collig.
Lib.1. c. 95.
Li.14. c. 20.

Lib.9. Hist.
cap. 2.

Lib.16. c. 12

Lib.24. c. 7.

Lib.1. ca. de
pi. arid.

Lib.9. Hist.
cap. 3.

Li.16. ca. 11.

Genera.

Dioscori.
lib. cap. 95.

spissata Italīs *Pecce secca*, Gallis *Poix seche*. Coquitur duplici cura, aut igne tam valido, & tandiu continuato, ut absumpto prorsus humore per quem tenax est, arida, fragilis, ac rasilis fiat: aut eousque dum ad visci tantum crassitudinem coacta sit. Hanc βοσκηγάδα vocant, fortassis quod in pellibus τῶν βοσκημάτων, id est pecudū conderetur, ac venderetur, aut quod pecudū scabiē sanaret, aut quod illitu greges priuatim signarent: prior altera, ξηρά id est arida, siue sicca dicitur, vtraque Palimpissa, quasi recocta, ac bis factam Pix. Plinius Picem liquidam in cortinas coniectam, aceto spissari tradit. Bellonius igne spissari legendum censet. Ego verò nihil immutandum censeo, commodēque pici, dum coctura spissatur, affundi solitum acetum, ne pix inter coquendum, vreretur, & ut siccior post cocturam esset. Aceto enim siccandi vim inesse cuius perspicuum est. Quam ob causam Plinius fortasse bonæ pici nec adustæ experimentum esse ait, si fragmenta subluceant, ac sub dente lentescant acore iucūdo. Theopompus scripsit referente Plinio in Apolloniatarum agro Picem fossilem non deteriore Macedonica inueniri. Est autem illa Pissasphaltum Dioscoridis, nempe ad spissitudinem pici coactum, Temporis spatio. Cocta pix ad vsus medicinae commoda probatur pura, pinguis, resinosa, odorata, subruffa, qualis Brutia à Brutiis Italiae gente, & Lycia ab Asiae regione dicta, modicè cocta, nec lento resinosoque suo succo prorsus exuta, Resinae Piciſque naturam simul habens. Asia picem Idæam maximè probabat, ab Ida celeberrimo Troadis monte Græcia. Pieriam à Piero Thessaliae monte, qui Macedoniam versus protenditur. Virgilius Naræſiam, non, ut vult Bellonius, Lariciam, à Naresiis Liburniae populis, quorum montes Pinorum sunt feracissimi. Alij Naryciam legunt, à Naryciis Locrorum populis, qui optima Pice abundant. In Plinio eadem de re scriptum extat. Quidam arbitrantur in montosis picem copia præstantiorem ac colore, & dulciorem fieri, odore quoque gratiorem dum Resina sit: decoctam autem minus piciſ reddere, quoniam in serum abeat: tenuioresque esse ipsas arbores, quàm in planis, sed has & illas serenitate steriliores. Fructum quædam proximo anno ab incisu largiuntur, aliæ secundo, quædam tertio, &c. quæ celeriter aures nostras præteruolare sanè non debent, sed diligenter attendenda, atque ex Theophrasto, à quo translata sunt, expendenda. Quod ait in montosis picem copia præstantiorem ac colore, & dulciorem fieri, Theophr. dixit ex Idæa siue montana Pino picem πλεῖον καὶ μελανέραν γίνεσθαι, καὶ γλυκυτέραν, id est copiosiores esse, & nigriores, & dulciorem, ut in Plinio legendum sit, ac colore nigriorem, odore quoque gratiorem, ὠδωδέτεραν legit Plinius, non ut in Theophrasti publicis exemplaribus legimus ὀκρενωδέτεραν, καὶ ὠδωδέτεραν. Gaza utrumque videtur legisse, vertit enim faciliorem & odore gratiorem: Cæterum in emendatis codicibus legimus, εὐλκενετέραν, καὶ ἐνωδέτεραν, sinceriores purioresque, ac odore gratiorem. Plinius habet dum resina sit. Theophrastus ὠμὴν, dum cruda sit, neque enim hîc de resina vlla mentio. Plinius decoctam autem minus piciſ reddere. Theophr. decoctam autem Picem minui, & pauciores fieri, quoniam in serum abeat. Plinius tenuioresque esse ipsas arbores. Theophrast. tenuioresque esse Picem ex Idæa Pino, quàm ex marina. Quo enim ferosior est Pix, eo tenuior, quo feri minus habet, eo crassior. Plinius. Sed has & illas serenitate steriliores. Theophrast. Ex pari Teda Pineæ quantitate Picem copiosiores, & magis serosam fieri, & frequentibus pluuiis quàm diuturnis squalloribus, & ex gelidis ac umbrosis locis, quàm ex tepentibus, & apricis. Plinius. Fructum quædam proximo anno ab incisu largiuntur, aliæ secundo, quædam tertio, &c. Theophr. ἐπιρροὴν ἐνθαδον habet, id est confluxum resinofum, pinguemque, ut iam hoc capite declarauimus. Optima

Coctura.

Lib. 16. c. 11.

Lib. 16. c. 12.

Lib. 1.

Plin. lib. 14. cap. 20.

Li. 2. Geor.

Li. 16. ca. 12.

Lib. 9. Hist. cap. 2.

Lib. 9. Hist.
cap. 2.
Li. 16. ca. 12.
Theophr.
Ibidem.

Lib. 3. c. 20.
Lib. 12. c. 24
Colu. ibid.
cap. 23.

Li. 12. c. 20.

In annot.
in Colum.
In cap. 19. l.
14. Plinius.

Lib. 6. ca. 5.
Ufus.
Colu. libr.
12. cap. 18.

Li. 14. c. 20.
Lib. 14. ca. 1.
Li. 14. c. 19.

Lib. 14. ca. 1.

& purissima Pix, Theophrasto, fit locis Aquilonem spectantibus, & apricis: ex opacis, βλοσυρότερα, aspectu fœdior, Plinio, horridior, impura, sordida, & veluti cœnosa, βορβορώδης, Plinio, virus præferens: hyeme leni, copiosa, bona, candidior: hyeme aspera, pauca, deterior, & decolor, quod postremum addidit Plinius, perinde ac si apud Theophrastum legisset, ὀλίγη, ἄχρη, μοχθηρότερα. Picis naturam, quibus ex arboribus, qua arte fiat exposuimus: item eius genera, cocturam, probitatēque. Nunc de iis quæ picis genera alia à supradictis videri possent, dicemus. Pix Nemeturica olim dicta fuit à Nemeturis Alpinis populis, quorum meminit Plinius, licet eam in Liguria confici scribat Columella. Ea pix liquida erat eodem auctore. Pix corticata qua utebantur Allobroges ad vini condituras, sic est fortasse dicta, quod in oculis ex arborum cortice factis adueheretur, aut quod tam dura esset, ut in multiplices textus, ac loricas, tanquam in cortices ac phyliras diuideretur. Hæc sicca erat, duraque, & quo vetustior, eo melior in usu, quoniam omni lentore amisso facilius in puluerem resoluebatur, atque cribrabatur. Cocta esset nec ne Columella non declarauit. Coctione duratam fuisse verisimile est. Habetur & in vulgatis Columellæ exemplaribus Pix rasis, quæ rasilis mea quidem sententia dicenda est, igne quidem non exsiccata, sed cruda, verum multis annis & vetustate sic durata, ut contusa in puluerem redigeretur, ac radi posset. Eandem esse puto quam Plinius Rabulanam, siue Radulanam, siue Rasulanam vocat, non à radula, ut existimauit Beroaldus, ferreo instrumento quo Pix raderetur ex doliis, ac educeretur. Opinioni tamen Beroaldi subscribere videtur Hermolaus, his verbis: Quidam ex Columella malunt Radulana quàm Rabulana legere, quod auctor is instrumentum in pice educenda Radulam quasi à radendo nominauerit. Sed & rabula quoque à radendo flectitur, ut à fando, pascendo, fabula, pabula. Sunt qui Rheticam legendum censent, laudatam à Constant. Casare. Picis usum duplicem fuisse rei rusticæ scriptores tradiderunt: vnum ad dolia, & serias, cæteraque vasa ante quadragesimum vindemiæ diem picanda, & aliter ea quæ demissa essent humi, aliter ea quæ starent supra terram. Nam in iis quæ demersa essent, pix vetusta lateribus adhærens liquabatur igne in lampade admoto, & radula curua ligneo rutabulo præfixa foras eiiciebatur, post deterisa penicillo vasa, feruentissima pice infusa, scopula rutabulo alligata & circumducta picabantur. At quæ supra terram consisterent, complures dies antequam curarentur, in solem producebantur: deinde cum satis insolata essent, in os conuersa, subiectis tribus paruis lapidibus suspendebantur, atque ita ignis subiiciebatur tandiu incensus donec ad fundum calor adeo vehemens perueniret, ut apposita manus patiens eius non esset, pixque vetusta liquaretur: tum dolio in terram demisso, & in latus deposito, pix feruentissima infusa dolium volutabatur, ut omnes eius partes linerentur. Picem duram & recoctam ad id commendabant, adiecta quinta parte picis Brutia. Pix in Italia, ad vasa, vino condendo, maxime probatur Brutia, inquit Plinius. Picis illitus vino duratricem firmitatem præstat, ait Plinius, ne vinum corrumpatur, & sicubi rimiosum vas sit, ne transfluat. Picis alter usus erat ad condituras. Plinius. Græcia argilla, aut marmore, aut sale, aut mari, lenitatem vino excitat. Italia pars aliqua Rabulana pice. Ratio condiendi musta in primo feruore, qui nouem diebus cum plurimum peragitur, aspersu picis fit, ut odor contingat, & saporis quædam acumina. Is picis odor saporque Romanis olim fuit gratissimus in vinis, quæ ob id Picata appellabant, Galenus οἶνον κωνίαν & πικαστήν. Huiusmodi vina arte, talia erant, vel naturæ sponte, qualia Viennensia, Allobrogum. Plinius. Iam in-

uenta

uenta vitis per se in vino Picem resipiens, Viennensem agrum nobilitans: vulgus ea vina violam olere inquit. Plinius libro 14. capit. secundo. vuam ex qua vina talia exprimuntur Picatam appellat. Picem quidem non solam, sed multa alia medicamina vinis condiendis admiscebant antiqui, veluti nigram Mastichen auctore Plinio, quæ in Ponto Bitumini similis gignitur, & Iridis radicem, Folium, sic enim legendum, non oleum, Nardum Gallicam, vt tradit Columella, Crocum, Palmam, nimirum Elaten Palmæ, Cyperum, Schœnum, Myrrham, atque alia plura cum Pice rasili. Quemadmodum enim cum vinum adeo infirmum esset, vt perennare non posset, aut certe quousque venderetur, durare, periculúmque esset, ne acesceret, fugeret, mucesceret, id Resina, flore Resinæ, crapula resinacea, sapa, defruto, aliisque odoribus condiebant, ita, Pice interdum sola, interdum cum aliis vt modo diximus, mixta, & ea quidem modo liquida, qualis fuit Nemeturica, vel sicca, qualis fuit corticata Allobrogum, Rasilis, Brutia, vina medicabantur, prius tamen pici liquidæ semper aut cinerem lixiuium infundentes, permiscentisque, aut aquam marinam ex alto petitam, vt his & pici odorem auferrent, & spurcitiam eluerent. Alios duos pici apud veteres vsus libet adscribere. Pice illita pilos auellebant, è corporis partibus, quas natura iis vestitas esse voluit, quod *πικρὸν* & *καταπικρὸν* Græci dicunt, à materia qua vterentur in eo fœdo ministerio. Hoc verbo vsus est sæpe Clemens Alexandrinus, molle delicatúmque institutum, ac improborum hominum artificium accusans. Præterea pice torquebant corpora hominum, qua in re verbo *καταπικρὸν* longe alio intellectu quàm in vasis linendis utebantur: valebat enim, cruciatu illo & supplicio afficere. Intellexit hoc Lucretius, cum pœnas mortalium, tormentaque breui exponens, inquit.

Verbera, carnifices, robur, pix, lumina teda:

Nec non Plautus, cum induxit Aristophontem refellentem astutam vocem serui, qui dixerat in eum, Atra bilis agitat hominem: At pol te, si hic sapiat senex, Atra pix agitet apud carnificem, actuo capiti illuceat. Pici facultates ex Dioscoride hæ sunt. Pix liquida contra venena, phtisim, purulentam excreationem, tusses, suspiria, & pectoris humores qui difficilè extusuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum & vuæ inflammationes, anginaeque, vtiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo: illinitur cum trito sale serpentium moribus: adiecta verò pari cera scabros vngues extricat, impetiginésque emendat: vuluæ duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farina hordeacea & pueri impubis vrina decocta strumas rumpit: cohibet vlcera quæ serpunt, cum Pineo cortice, aut sulfure, aut furfuribus illita: cum thuris manna & cerato profundos vlcerum sinus glutinat: rimis sedis, & pedum magno auxilio illinitur: vlcera replet, & cum melle purgat, quin & cum vua passa & melle carbunculos, putridaque vlcera emarginat, ac disrumpit. Eroderentibus medicamentis probè immiscetur. Pix arida calfacit, dura emollit, pus mouet, tubercula, panosque discutit, vlcera replet: vulnerariis medicaminibus commodè permiscetur. Pix sicca Galeno desiccatur, & excalfacit secundo excessu, plus tamen desiccare potest quàm calfacere: humida contrà, plus calfacit, quàm desiccatur, habetque nonnullam partium tenuitatem, qua & asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram melli mixtæ. Abstergendi quandam vimque habet, concoquendi, digerendi, velut & in gustu subamarum quidpiam, & acre. Sic leprosos vngues eximunt ambæ, mixtæ cum cera, lichenasque detergunt: concoquunt item duros & crudos tumores omnes, cataplasmatibus

Li. 14. c. 20.

Li. 12. c. 20.

Viét. lib. 8.
Vari. lect.
cap. 14.

Lib. 3. Pæd.

In captiuis

Vires.

Cap. 31.

Lib. 3. sim.

Lib.1.Dio.
cap.78.

Lib.13.c.1.

indita. Ad ea omnia, humida valentior est, arida verò tametsi ad ea quidem deterior, glutinandis tamen vulneribus magis conuenit. Pix liquida calfacta, inquit Matthiol. vna cum Thure & Mastiche abrafo occipitio adhibita, prolapsam columellam restituit. Plinius cum de vini Resina conditi facultatibus verba fecisset, subiungit: Innocentius pice sola conditum. Hoc genus vini exalfacit, concoquit, purgat: pectori ac ventri vtile, item vuluarum dolori, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationi, ruptis, conuulsis, vomitis, neruorum infirmitati, inflationibus, tussi, anhelationibus, luxatis in succida lana impositum. Ad omnia hæc vtilius id quod sponte naturæ suæ Picem resipit, picatumque appellatur.

TAXUS


CAP XXI.

INTER Resiniferas arbores recensuimus eas etiam quæ folio illis similes sunt, quamuis Resinam nullam succum ve emittant, veluti Taxum, & Sabinam vtramq;. Hic de Taxo, quod Abieti Piceæque tum folio, tum reliqua forma persimilis sit, dicemus, de Sabina magis idoneo loco tractaturi Taxus ὁ μῖλος à Theophrasto dicitur, à Nicandro σμίλος, à Dioscoride & Galen. σμίλαξ, quibusdam teste Dioscoride

Nomina
Lib.3. Hist.
cap.10.
Lib.6.c.12.

TAXUS.

Forma.
In Alexip.
fine.



Locus.
Theophr.
lib.4.histo.
cap.1.
Tempus.
Idem.c.6.
Lib.3.Hist.
cap.10.

Thymalum, sic enim legendum, non tithymalum, à Paulo tamen Thymium non thymalum, à Gallis *If*, ab Italis *Tasso*, à Germanis *Eibembaum*, ab Hispanis *Texo*. Taxus arbor inter Abietes Piceasque prouenit, forma his non valde dissimilis, præsertim Abieti, quam ob causam ἐλατὴν δα vocauit Nicander, quanquam illarum proceritatem non attingat. Caudice est crasso, obducto cortice ferè cinereo, rimoso, squamosoque. Folia sunt Abietinis similia, longiuscula, angusta, ex viridi fusca, perpetuò virentia, in ramulis ex aduerso sita. Baccas fert rubentes Aquifolij modo, dulces, vinosasque. Ligni materies rufescit, plurimis interuenientibus venis, incorruptaque est, quare lignariis fabris maximè expetitur. Nascitur Taxus in Italia, in Ananiæ vallis montibus, saxosis ac præruptis locis, in Gallia Narbonensi, Hispania, Germania. Maximè gaudet vmbrosis. Tardissimè germinat, fructum maturat Septembri mense. Theophra. hæc de Taxo. Taxus vnius generis est, recta, auctu facilis, si-

milis Abieti, sed non tam alta: plures habet alas: folio Abieti similis est, sed pinguiore, & molliore. Quæ in Arcadia nascitur, ligno est nigro, puniceoque: at quæ in Ida, flauo valde, & Cedro simili. Quare qui id vendunt, emptores decipiunt, pro Cedro id vendentes: cortice enim detracto totum cor est. Corticem Cedro tum scabritia, tum colore similè habet: radices paruas, tenues, per summa cespitum vagantes. Rara hæc arbor est in Ida. In Arcadia & Macedonia copiosum fructum fert, rotundum, faba paulo maiorem, rubrum, mollem. Aiunt veterina, si folia comederint, mori, ruminan

minantia nihil pati. Homines quidam fructu vescuntur : est enim suavis atque innoxius, Plinius cum de Picea & Abiete differuisset, subdit. Similis his etiam aspectu est Taxus, minus virens, gracilisque, & tristis, ac dira, nullo succo, ex omnibus sola baccifera. Mas noxio fructu. Letale quippe baccis, in Hispania præcipue, venenum inest. Vasa etiam viatoria ex ea, vinis in Gallia facta, mortifera fuisse cõpertum est. Hæc Sestius Smilacem à Græcis vocari dixit, & esse in Arcadia tam præsentis veneni, ut qui obdormiant sub ea, cibumue capiant, moriantur. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicant venena, quæ nunc Toxica dicimus, quibus tinguntur sagittæ. Repertum innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus æreus defigatur. In quo loco pro Arcadia legendum putat Cornarius Narbonia, velut Diosco. habet. Nam de Hispaniæ & Galliæ Narbonensis, ad Hispaniã spectantis Taxo loquuntur. Plutarchus eo tantum tempore Taxum noxiam esse tradit, quo florere incipit, quod tum succo sit maxime prægnans. Virgilius Taxum, ut apibus noxiam, ab apiario semouet.

Ne propius tectis Taxum fere.

Galenus hæc pauca de Taxo. Smilax siue Taxus arbor est venenosa facultatis, Vbi exemplaria falso habent ἡ κάλως pro ἡ τὰξος. Dioscorides, Auiculæ quæ Italicæ Taxi baccas deuorant, denigrantur, & qui ederint easdem homines, alui profluvio corripiuntur. Narbonæ tam præsentis est veneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, lædantur, & sæpenumero moriantur. Et alibi. Taxus frigus vniuerso corpori, strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ Cicutæ conueniunt. Solum merum Nicander exhibet, idque liberalius hauriendum esse præcipit. Testatur Matthiolus in Tridentinis montibus non veterina solum sed ruminantia etiam animalia deuorata Taxo interire, ipsiusque baccas iisdem in locis perniciosas esse, seque curasse affirmat pastores, ac lignatores, qui saporis dulcedine allekti, cum has edissent, in febres ardentes inciderunt, & alui profluvia, non sine magno vitæ discrimine. Contra Penna eius baccas innoxie puerulos esitare in Anglia affirmat, seque gustasse sub hyemen non ingrato sapore, sed fatuo, vel subamaro, ibique porcos passim eas tanquam glandes comesse. Nulli sanè Angliæ angulo deesse hanc, ubi semper virente, umbrosa, densaque ramorum fronde & latissima, similiter Abieti, pennatis & longis quasi pectinum radiis, ex atro viridibus comosa, in sepulcretis & areis pro templorum foribus pangitur, ad arcendos solis æstus à concione, plebeque, sub tegmine Taxi conuentus agere solita, nullo percepto inde vel tantillo incommodo. Sed hic existit quæstio, inquit Matthiol. an frigidi, an calidi sit Taxus temperamenti? Dioscorides eiusque sectatores frigidi esse temperamenti existimarunt, quod iisdem remediis Taxi veneno, quibus & Cicutæ occurrendum esse ille scripserit. At his opponit Matthiol. amarorem qui cortici ac frondibus inest, comam perpetuo virentem, Pinorum, Abietum, Picearumque modo, quibus fronde similis est, baccarum tum dulcedinem, tum acrimoniam quandam, & quod auiculæ eas depastæ nigrescant, quæ omnia insignem temperamenti caliditatem arguunt. Quare & febribus, & alui profluvio tentantur, qui eas baccas ederint, inflammatis scilicet spiritibus, & sanguine. Quod si quis dixerit accendi febres, fierique alui fluxiones ex humorum putredine, quemadmodum æstate ex frigidorum fructuum esu, nigrum verò colorem in auiculis contrahi posse tam à frigido, quam à calido, quid tandem ad frondium corticisque amarorem, baccarum dulcedinem & acrimoniam, perpetuoque virentem comam respondebit? Nam hæc à calore fieri nemo negauerit. Febres verò & alui profluvia ex calore immodico potius, ut deuoratis Anacardiis accidit, quam ex humorum putredine suboriuntur, & nigror ille pennarum à calido potius quam à frigido auicu-

Lib. 16. c. 10.

Embl. 63.
li. 4. Diosc.
Lib. 4. sym-
pos.

Li. 4. Geor.
Vires.
Lib. 3. sim.
lib. 4. c. 75.

Lib. 6. c. 12.

In c. 12. li.
6. Dioscor.

Ibidem.
Temper.

Ufus. larum pabulo. Frigus enim nigrorem non inducit, nisi sit immodicum, & tantum ut interimat. Quare nigror exustis humoribus gignitur, ut in Æthiopi-
Georg. 2. bus. Ex Taxo arcus & scorpiones fiebant, atque etiam hodie fiunt. Virgil.

Ityreos Taxi torquentur in arcus.

Taxus etiam sectiles laminas glutinandis capsis, scriniis, subselliis, atque aliis huiusmodi præbet.

V L M V S C A P. X X I I.

Nomina

DE glandiferis, coniferis, resiniferisq; Sylvæ nostræ arboribus satis copiose diximus. Superest ut de aliis agamus quæ sylvarum & montium propriæ sunt. Ac primum à nostratibus, notioribusque incipimus, deinde ad externas veniemus. Græcis *ωλεέα* dicitur, quæ Latinis Vlmus, Arabibus *Didar, Dirdar, Luzach*, Gallis *Orme*, Italis *Olmo*, Germanis *Vlmen, Ristnholtz, Lindbast, Iffenholtz*, Hispanis *Vlmo*, Anglis *Elmtre*, Belgis *Olimboom*, Boemis *Gilm*. Vlmi duo genera sunt

Genera.

Lib. 16 c. 17.

Ibidem.

V L M V S.

Lib. 5. ca. 6.

Forma.



Theophr. ibid.

lib. 16. c. 40.

Lib. 3. Hist. cap. 14.

Lib. 16. c. 17.

Lib. 16. c. 26.

Ibidem.

Vlmi duo genera sunt Theophrasto, vnum *ὄρφπλεέα*, Gaza Montiul-
 mum vertit, cum montosam Vlmum Plinio auctore dicere potuisset: Alterum *ωλεέα*, id est Vlmus, Plinio campestris Vlmus, qui quatuor Vlmorum genera numerat. Græci, inquit, duo Vlmi genera novêre, montosam quæ sit amplior, campestris, quæ fruticosa. Italia Atinias vocat excelsissimas, & ex iis siccaneas præfert, quæ non sunt riguæ. Alterum genus Gallicas. Tertium nostrates, densiore folio, & ab eodem furculo numerosiore. Quartum sylvestre. At Columella: Vlmorum inquit duo esse genera cõuenit, Gallicum, & vernaculû. Illud Atinia, hoc nostras dicitur. Quare *ωλεέα*, Vlmus, Plinij Vlmus nostras, siue Italica, Theophrasto campestris, Columellæ Vlmus vernacula, eadem planè arbor esse videtur: itemq; *ὄρφπλεέα*, Vlmus montosa Plinij, siue sylvestris, Vlmus Atinia siue Gallica Columellæ eadê. Vlmus magna proceraq; est arbor, radicibus longè lateq; vagantibus, ramis latiùs passis, folio minimè fissò, leuiter in ambitu serrato, lato, & oblongiore quàm Pyrus, scabro neque læui. Materia dura, flaua, nervosa, deformis, quia tota cor est, cû viret, cæsu facilis, si exaruit, difficilis, quæ ad fores lautiores vtuntur. Rigorem fortissimè seruat, inquit Plin. ob id cardinibus assamentisq; portarum utilissima, quoniam minimè torquetur: permutanda tamen sic, ut cacumen ab inferiore sit cardine, radix superior. Semen fert Vlmus latiusculum, rotundum, tenue. Quare aberrarunt ij quos scribit Theophr. putasse Vlmum sterilem esse, quibus tum experientia, tum Plinij auctoritas repugnat, Vlmos omnes, præter Atinias, ex semine provenire tradentis. Sed ipsi Plinio scribenti Atinias non ferre Samaram, & fructum arborum solas nullum ferre, hoc est ne semen quidem, Tamaricem, Populum, Alnum, Vlmum Atiniâ Columella apertè refragatur, cû dicit, Atiniam Vlmû Tremellius Scrofa non ferre Samaram (quod est semen eius arboris) falsò est opinatus. Nam rariorem sine dubio creat, & idcirco plerisq; sterilis videtur, seminibus inter frondem, quam

quam prima germinatione edit, latentibus. Itaque nemo iam ferit ex Samara, sed ex sobolibus. Est autem Vlmus ea longè latior & procerior quàm nostras, frondemq; iucundiorē bubus præbet. Hæc Columel. Fert & Vlmus gummi ἐν κωρυκοῖς, inquit Theophr. id est in folliculis, non vt Gaza vertit, in petiolis, & animalia quædā culicibus similia. Hi folliculi sunt haud ita parui, subrotundi, crafsi, scroti hominis figura, quibus clauditur humor initio lentus, tandem solis vi in gummi concrefcens. Cachryn etiam edit peculiarem, autumnō multā, minutam, nigram. Vlmus Atinia, siue montosa, arbor est multo procerior, ra-

Nomina

ULMVS ATINIA.



mos tamen tam latè non extendens, folio Vlmi superioris, per ambitum modicè ferrato: ligno simili, candido, Buxi instar spisso, solidissimoq; & quod non facile findi se patiat: vnde ad rotas molares, cochleasque, trochleas, & alia instrumenta quæ pondus magnum sustinent, maximè expetitur. Tragus Orni nomine depinxit. Galli *Charme*, vocant, & *Charpene*. Quamobrem nominum similitudine quidam falsi Carpinum esse putauerūt, cum Aceris genus Carpinus sit, non autem Vlmi. Omnium ferè Vlmi partium magnus est in medicina vsus. Folia, cortex, rami, inquit Dioscor. vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, vulnera glutināt, sed multo magis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur: nam in lori morē flecti potest. Crafsior cortex in vino, aut aqua frigida vnciatim potus pituitas trahit. Fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum, corticis, aut radicis foueantur. Humor in folliculis nascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciēque splendi-

Lib. 3. c. 73.

Vires.

Lib. 1. ca. 95.

Vires.

diolem præstat, is scilicet qui dum siccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia tenera olerum modo cocta ad obsonia vsurpantur. Eadem ferè de his Plinius tradidit. Vlmi foliis, inquit Galen. quandoque recens vulnus glutinauimus, confidentes astringentem pariter & abstergentem inesse illis facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est, & astringens, ideo cum aceto & lepram sanat. Porro viridis etiānum ac recens, si vulneribus vinculi vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem vim obtinent. Nam & decocto earum quidam perfundunt fracturas, quæ topho siue callo inducto opus habent. In his animaduertendum hæc Dioscor. verba, ἢ τὸ ἀφέψημα ὃ τῶν φύλλων, ἢ τῶν φλοιῶν τῶν ῥιζῶν χαλασθέντων, ἢ τῶν ῥιζῶν χαλασθέντων, sic esse vertenda. Et decocto foliorum, aut corticis radicem si fracta ossa foueantur, citius callo obducentur, vt Dioscor. decocto foliorum, aut corticis radicem adscribat, quod Galenus, & eum secuti Paulus, atque Aetius simpliciter de radicem decocto produnt. Eorū sensum in Dioscoride exprimere voluisse videtur Ruellius, aut in Dioscor. legisse, ἢ τῶν φλοιῶν, ἢ τῶν ῥιζῶν, &c. quam tamen particulam ἢ secūdo loco positam in nullis excusis exemplaribus comperi. Humor qui folliculis Vlmi continetur (vt experientia sibi compertum esse Matth. affirmat) medetur puerorum enterocele, si linteola eo madefacta sæpe inguini affecto imponatur, & perizomate seu ventrali constringantur. Eodē liquore vitreo vase concluso, & in terra aut fimo

Li. 24. ca. 8.

Li. 8. simp.

Lib. 1. Dio.

Cor. c. 95.

viginti quinque dies condito, vasis ore diligenter obturato, fundo verò super salis communis stratum collocato, euenit vt fex subsidat, & liquor clarissimus supernatet, qui ad vulnera recentia glutinanda adeo efficax est, vt mirum dictu sit, quàm bellè celeriterq; id efficiat, cū splenis iucūdis, aut penicillis admotus. Corticis radicum decoctum articulorum duritias emollit, & neruorum cōuulsiones resoluit, fatus aut balnei modo adhibitum. Præterea tumores discutit, quos iugè attritus in collo boum excitauit. Interiores Vlmi radices si diu decoquantur, & decocto supernatans pinguitudo colligatur, eaq; illinatur sæpe locus à quo pili defluerint, ij breui renascentur. Eiusdem cortex contusus, & muria vsq; adeo subactus, vt malamagti similis sit, illitus podagricos dolores mulcet. Folia Vlmi quæ ad Orientē spectāt impari numero decerpta, & cum piperis granis cōtrita, & ex vino Cretico pota à ieiunis, auctore Marcello, purulentas tusses mirificè iuuant. Humor ille folliculorum Vlmi videtur in empla-

Lib.2.med.
gen. cap.7.

strum quoddam Melinum, quod Rustico adscribitur, recipi apud Galenum: *ωφέλεας*, inquit, *τὸ ἐν θυλακίαις δραχ. ιε.* quæ non rectè vertit interpres Vlmi in sacculis ex corio reconditæ denariūm pondo. Dicendum enim, Humoris Vlmi qui in folliculis cōtinetur drach. quindecim, vt *τὸ ὑγρὸν*, aut quid simile intelligatur.

Li.3. Histo.
cap.14.

Lib.1.ca.95.
Lib.5. c.60.

Nec enim video quid aliud de Vlmo sibi velit, nec aliud hic est *τὸ θυλάκιον* Galeno, quàm *κωρυκὸς* Theophrast. sic enim in eo legendum, non *κωρυκίς*, & φύλλα Dioscoridis quibus nominibus folliculus, vtriculus, vesicula significatur. Paulus inter remedia quæ Cerusæ veneno aduersantur recenset *κοκκυμήλων κόμμι*, ἢ *ωφέλεας* *τὸ ἐν τοῖς θυλακίαις ὑγρὸν μετὰ χλιαρῶ ὕδατος*, id est Prunorum gummi, aut Vlmi humorem, qui in folliculis ipsius continetur. Quo in loco quamuis Paulus Galenica *τὸ θυλακίον* voce sit vsus, tamen cum totum id caput, vt & alia ex

Lib.6. c.de
cerus.

Dioscoride ad verbum exscripsisse constet, ex eo locus Dioscoridis eadem de re, deprauatus facilè restituetur: ἢ *κοκκυμήλων*, inquit, ἢ *κόμμι* *ωφέλεας*, ἢ *τὸ ἐν τοῖς φύλλοις τὸ χλιαρὸν ὑγρὸν μετὰ χλιαρῶ ὕδατος*. Ruellius, aut Prunis, aut gummi quod Vlmius plorauit, aut humor quem Vlmea folia reddiderunt, &c. Legendum verò ἢ *κοκκυμήλων κόμμι*, ἢ *ωφέλεας* *τὸ ἐν ταῖς φύλλοις ὑγρὸν μετὰ χλιαρῶ ὕδατος*. Sed quid Paulo teste opus est, cum ipse Dioscor. alibi id satis testatum reliquerit? *τὸ ἐν ταῖς φύλλοις (τῆς ωφέλεας) χλιαρὸν τὴν πρώτην ἐκβράσθησιν ὀρίσκόμμιον ὑγρὸν*, id est, Humor qui in folliculis Vlmi prima germinatione reperitur.

Lib.1.ca.95.

FRAXINVS ET ORNVS. CAP. XXIII.

Nomina



Fraxinæ arbor Græcis *μελία* dicitur, Latinis appellatur Fraxinus, Gallis *Fresne*, Italis *Frassino*, Hispanis *Fresno*, & *Frexo*, Germanis *Eschern*, *Escherbaum*, *Steyneschern*, Anglis *Aschetre*, Boemis *Gesen*, Belgis *Eschen*.

Genera.

Lib.3. Histo.
cap.11.


Eius genera duo esse prodidit Theophr. Vnum excelsum, procerū, ligno candido, neruoso, molliore, crispiore, magis enodi. Alterum humilius, minus augescens, scabrius, durius, & magis flauum. Hanc Fraxinum, Ornum esse existimant, Fraxinumq; syluestrem Columellæ, Italis *Orniello* dictam. Macedones auctore Theophr. priorem *βυμελίαν*, id est grandem Fraxinum vocant, non vt Theodorus interpretatus est, Bubulam Fraxinum, perinde quasi *πολυμελίαν* dixissent, βυ particula magnitudinem significante, ab Aeolicis sumpta, β, pro ω, in dictione *πολύ*, & expuncto, λ, elemento βυ pronunciantibus, vt testatum reliquit Plutarchus. Est vt scribit Theophr. quæ in montibus nascitur, bene colorata, læuis, spissa, lenta: quæ in planis, male colorata, rara, scabraq;. Hæc Plinius sic transcripsit. Græci duo Fraxini genera fecere, longam, enodem. Alteram breuem, duriorē, fusciorēque, Laureis foliis. Bumeliam vocant in Macedonia, amplissimam, latissimāque. Alij situ diuisere. Campestem enim esse crispam

Li.de arb.
cap.16.

Ibidem,

In sympof.
Ibidem.

Li.16. ca.13.



crispam, montanam, spissam. Virgilius quoque montanam Ornum facit ; cū scribit: *Cantandorigidas deducere montibus Ornos.*

Eclog. 6.

Vtriq; folia sunt Lauri latifoliae similia, in acutiùs coacta, in ambitu nonnihil ferrata, non pungentia (nam in Theophrasto falsò scriptum esse puto καὶ ἐπαχθυβίζοντα, vel vt Gaza legisse videtur καὶ ἐπιχθυβίζοντα, id est ac subsidentia, pro ἐκ ἐπαχθυβίζοντα.) Quod verò sequitur, aliter & rectiùs videtur legisse Gaza, quàm in Codicibus nostris sit exaratum, hoc modo. τὸν δὲ ὅλον κλάωνον, ὃν δὲ εἰποι-
tis μόνφυλλον, τὸ δὲ αἶμα φυλλοπορεῖν, &c. Id est, Ramum totum vnum folium esse quis dixerit, quoniam ab vno pediculo folia simul iuncta exoriantur, quæ coniugatim velut per genicula in singulis ordine dependent, frequentibus ac crebris coniugationibus, perinde atque in Sorbo. Inde non illepidè Plinius folia pennata dixit. Humilis Fraxini internodia breuia sunt, foliorum coniugationes pauciores (legendum enim ἐστὶ δὲ τῶν μὲν βραχέα τὰ μεγονό-
τια, &c.) Albæ autem siue montanæ longæ coniugationes, & plures, quia latius distinctæ, latioraque interualla, id quod significasse mihi vide-
tur Columella, cū scripsit Ornum paulo latioribus esse foliis, sed fo-
lia singula oblongiora, angustiora, obscurius virentia porracei coloris: τὴν δὲ χροὴν πρασώδη, inquit Theophrastus, Hermolaus verò legit τὴν δὲ χροὴν ποσάδην, id est coloris herbacei: Cortice læui, spisso, tenui, rubescente inte-
gitur: radicibus crebris, crassis, altisque nititur. Idæi fructu floréque carere existimant: fert tamen in siliqua fructum minurum, nucis modo, qualem Amygdalæ, gustu subamarum. Fert & quædam alia, οἷον βρύα, id est veluti muscos, inquit Theophrast. vt Laurus: cæterùm densiores, & magis compa-
ctos, πυκνότερα, non σπυρχνότερα, globosos, non aliter quam Platani pilulas, & eos quidem partim fructui propinquos, partim à fructu longè semotos, & plures quidem (πλεῖστα, non πλεχτα) eo pacto nimirum à fructu multum distantes. Globosos hos muscos ego in Fraxino obseruaui & collegi hyeme iam desinente. Sunt autem hi tuberosi, velut ex resiccato impensius glutinoso musco

Forma.

Lib. 16. c. 13.

Li. de arb. cap. 16.

FRAXINVS CVM

fructu, & Pilulis.



Locus.

Ibidem.

Lib.16.c.18.

Dodo.li.6.
cap.70.Plin.lib.16.
cap.26.
Lib.1.c.92.

Lib.7.

Lib.16.c.13.

Ibidem.

Lib.7.Ep.5.
Lib.1.Dio-
scor. a.92.
Lib.3.Hist.
cap.10.

Lib.6.ca.3.

Ibidem.

Lib.3.Hist.
ca.10.

musco concreti, gustu nonnihil adstringen-
tes, lignoso intus nodo muscosum corpus
sustinente. An' verò in Lauro tale quippiam
gignatur nondū obseruauī. Scio tamē Theo-
phrast.cap.8.lib.3. cū recenset arbores quæ
præter fructum peculiarem alia nonnulla
ferunt, tradere, in Ulmo gigni vnam, &
folliculos: in fico, grossos, & ficus: in Auel-
lana nucem, & Iulum: in Illice, glandem &
coccum: in Lauro fructifera, non omni qui-
dem, sed aliqua eius specie, baccam, &
vnam, (τὸ βότρυον, nisi legendum sit, τὸ βρύον,)
quæ tamen vna in Lauro non fructifera,
quam marem vocant, magis gignitur. In
Lauro Muscum aut Vnam me vidisse equi-
dem non memini. Læuis Fraxinus, vt scribit
Theophr.locis βαθυκυκλῖς, id est valde vmbro-
sis gaudet, Gaza βαθυκυκλῖς videtur legisse,
vertit enim, locis concauis madidisque: sca-
bra, siccis, atque saxosis. Plinius verò: Aquo-
sis montibus gaudet Fraxinus. Descendunt &
in plana Ornus, & Fraxinus. Fraxinus loca
humida amat, vt fluuiorum ripas. Ornus in

montibus prouenit, & vmbrosis syluis. Fraxinus menses reddit semē. De Fra-
xino mentio nulla apud Galenū inter simplicia medicamēta, neq; apud Aetiū.
Fraxini foliorum succus, inquit Dioscor. ipsaq; ex vino pota, & illita, vipera-
rum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ra-
menta scobemque potu perniciem afferre tradunt. Paulus hæc Dioscoridis
verba transcripsit, neque quicquam amplius addidit. Quod Dioscorides de fo-
liorum & succi ipsorum potu atque illitu scripsit, hoc etiam Plinius habet.
Contra serpentes succo expresso ad potum, & imposita vlceribus, folia opife-
ra, ac nihil æquè, reperiuntur. Sed quod idem ait: Folia earum iumentis morti-
fera, cæteris ruminantium innocua, Græci quoque prodidere. Hoc autem non
sine errore ab ipso proditum est, meritoq; à Manardo & Matthiol. reprehendi-
tur, quod μελίαν, quæ Fraxinus est, pro μίλῳ, id est Taxo agnouerit apud Theoph.
cuius hæc sunt verba: φασι δὲ τὴν μίλαν λέγουσαν εἶναι φαγὴν τῶν φύλλων, ἀποθνῖσκουσαν, τὰ δὲ μὴ
εὐχρίνοντα εἶδεν παλαιόν, quæ cum περὶ τῆς μίλῳ Theophrastus scribat, Plinius de
Fraxino intellexit. Quamobrem de suo adiecit: In Italia nec iumentis no-
cent, quod quotidiana experientia id certissimum esse perspiceret. Quin &
Columella inter frondes quibus tota æstate, & deinde autumno satiantur bo-
ues, probat maximè Ulmeam, post Fraxineam, ab hac Populneā. His ipsis foliis
tantam esse vim aduersus serpentes tradidit Plinius, vt ne matutinas quidem
occidentis vmbas, quam sunt longissimæ, serpens arboris eius attingat, adeo
ipsam procul fugit. Experti prodimus, inquit, si fronde ea gyro claudatur ignis
& serpens, in ignem potius quàm in Fraxinum fugere serpentem. Mira natura
benignitas, priusquàm hæc prodeant, florere Fraxinum, nec ante conditas folia
dimittere. At verò non hoc solum quod modò diximus de Taxo à Theophrast.
traditum, ad Fraxinum transtulit Plinius, sed etiam quod paulo ante dicit, Eam
quidem Fraxinū quæ nascitur in Ida, esse in tantū Cedro similē, vt ementes fal-
lat, cortice ablato. Hoc enim Theophr. eodem loco de Taxo sic habet: ἡ δὲ ἐκ τῆς
Ἰδῆς

ἰδης ξανθὸν σφόδρα, καὶ ὅμοιον τῇ κέδρῳ, διὸ καὶ τὰς πωλόντας φασὶ ἐξαπαλᾶν, ὡς κέδρον πωλόντος πᾶν γὰρ εἶναι καρδίαν, ὅταν ὁ φλοιὸς περιαιρεθῇ. Dicer aliquis, Fraxineas mentas quales hodie habent multi, vnde so venarum discursu, Citreas, Cedrinas, & Acernas æmulari, quod vt verum esse fatear, ita pro Plinio facere negauerim, qui non eo iudicio, neque eo sensu de Fraxino id prodidit, sed Theophrast. verba cum Latinè exprimere vellet, quod Theophr. Taxo, id Fraxino perperam illum attribuisse perspicuum est. Plura de Fraxini viribus Plinius quam Dioscorides tradidit. Semen foliis eius inest, quo medentur iocinoris & lateris doloribus in vino: aquam quæ subit cutem extrahunt: corpus obesum leuant onere, sensim ad maciem reducentes, iisdem foliis cum vino tritis, ad virium portionem, ita vt puero quinque folia tribus cyathis diluantur, robustioribus septem folia, quinque cyathis vini. Non omittendum ramenta eius & scobem à quibusdam cauenda dici. Obseruandum autem ramenta scobemque à Plinio hîc dici quæ *τορνύμαλα* Dioscorides vocat, & quæ etiam *περίσματα*, & *πελεκύσματα* à Græcis dicuntur. Galenus in confectionibus hepaticis ab Asclepiade conscriptis, cuiusdam meminit, quæ semen Fraxini recipit. Aetius verò idem medicamentum Asclepiadæ ex Philagrio citat, & Oribasium Fraxini semen non admittere scribit, additque Fraxini semen, seu fructum esse arboris, ex qua Fraxinea ligna quocunque in opere apta ac obedientia cæduntur, hoc est, ἐξ ὧν ἐργάσιμα μελινὰ ξύλα κομίζεσθαι. Semen Fraxini, inquit Matthiol. quod auis linguam vocant officinæ, vtiliter propinatur in lateris dolore, & ad ciendam vrinam: venerem excitat, præsertim si cum Pistaciis, & nucleis Pineis deuoretur, addito Saccharo, vel cum nuce Myristica, vt testantur Isaac, Rhazes, Damascenus, cæteri que Arabes. Nouembris initio decerptum, & in furno siccatum maximè confert calculosis, ex vino vetere potum. Fraxini spumofus liquor qui è viridi ligno igni imposito manat, additis succi Cyclamini, Ccyllæ, Rutæq; æqualibus partibus, omnibus simul parum feruefactis plurimum ad surditatem valet, si in aurem sanam (alij ægram malunt) liquor hic calidus instilletur, cum itur cubitum. Oportet autem in aurem affectam (aliorum sententia sanam) iacere. Cum verò aurē vtrāque surditas occupauerit, in eam quæ minùs (aliis magis) laborat liquor infunditur, & in alteram iacet æger. E viridi Fraxini ligno tessellatim conciso per descensum, vt loquuntur, aqua & oleum eliciuntur, veluti ex ligno Iuniperi. Aqua cum quarta parte aquæ violarum purpurearum faciei illita, ruborem & pustulas cum eo erumpentes sanat. Oleum tradente Manardo, potum, hepaticis spleneticisque maximè conducit. Corticis ramorum ex aqua decoctum splenem absumit, si eo diutius vtantur spleneticis: Folia, cortexque Fraxini moderatè calida sunt auctore Dodon, & tenuium partium. Semen calefacit, & siccatur tertio excessu. Foliorum & corticis decoctum ex vino potum hepar splenemque ab obstructionibus expedit, roboratque, & lateris doloribus medetur. Idem folia præstant in oleo feruefacta, & lateri imposita. Folia, cortex, turionēsque eodem modo sumpti valent ad hydropem, quia vacuant aquas. Ad idem facit semen in vino decoctum Sereno teste.

Fraxineum semen cum Bacchi rore bibendum est.

E ligno Fraxini pocula fiunt, ex quibus si quis assiduè bibat, lienem extenuari aiunt. Fiunt etiam ex eo mensæ, vasa, ac vtenilia multa. Eius enim materies, vt scribit Plinius, est ad plurima utilis, multumque Homeri præconio, & Achillis hasta nobilitata.

Lib. 24. c. 8.

Lib. 8. med. part. cap. 8. Lib. 10.

Lib. 1. Dioscor. c. 21.

Lib. 6. c. 70.

Lib. 16. c. 13.

Genera.
& No-
mina.

Forma.

PRIA sunt Theophr. & Plinio Populi genera. Populus alba quæ Græcis λευκή, Arabibus *Haur*, dicitur, Italis *Popolo bianco*, Gallis *Aubeau*, & *Peuplier*, Germanis *Bellere*, *Poppelbaum*, & *Salbaum*, *Abiolbaum*, Hispanis *Alamo Blanco*. Populus nigra Græcis ἄργεος, Arabibus *Haur romi*, Italis *Popolo nero*, Gallis *Peuplier*, & *Tremble*, Germanis *Aspen*, & *Poppelweiden*, Hispanis *Alamo nigrilho*. Populus Lybica, Theophr. κερκίς, quibusdam Populus Alpina, Gallis *petit Tremble*. Anglis *Asp*, or *Popler tre*, Boemis *Topel*. Populus alba arbor est magna, proceraq̃, crasso caudice, cortice, præsertim ramulorum, albicanre, ac læui: foliis vitigineis, latis, angulatis, aduersa parte virētibus, auersa maximè

POPVLVS ALBA.



POPVLVS NIGRA.



Iliad. 5.

albicantibus, lanuginosis, læuibus, mollibúsque, Bechij modo, quod à similitudine Chamæleucen vocauêre Græci, hanc verò Populum Leucen. Materia est candida, non dura. Antequam folia emittat, Iulos producit longos, coloris punicei, bene diluti. Populū hanc Homerus ἀχερώϊδα ab Acheronte appellat, quòd Hercules deuictō Cerbero Populum arborem ex Achorante secum detulit, frondibusq̃; Populeis coronatus, lætitiā quam ex tot victoriis cœperat, declarauit. Exemplo Herculis omnes in certamine aliquo cum laude & gloria versati, victoriāq̃; consecuti, Populi fronde coronabantur. Populus nigra magna etiam, procera, crassaque est arbor, cortice læui minimè tenui, cineritio: folio Hederaceo, longiusculo, prope pediculum lato, apice in acutū desinente, non, vt in alba, laciniato, sed in ambitu paulum serrato, nigricante: longo, tenuiq̃; pediculo appenso. Huius Iuli racematim compacti multis baccis rotundis constant, in quibus multa concluditur lanugo candida, quæ maturis baccis in pappos auolat. Aprili mense, & Martij fine proueniunt. Materia est alba ad asseres faciendos præcipuè idonea. Germina quæ folia antecedunt (oculos vulgo vocant) valde odorata viscido humore & flauo turgent, ex quibus vnguentum Populeum cognominatum parant Seplasia. Quo tempore Iuli produ

POPVLVS LYBICA



producuntur, ea colligēda sunt. Populus Lybica nigra similis, hac, & alba aliquātulo minor, cortice nigriore, materia imbecilliore, alba tamen, ac tenaci: foliis latis, breuibus, rotundioribus, nigrioribus, durioribusq; Populi nigra foliis, per oras incisfis, longo tenuique pediculo appensis, eamque ob causam continuo sese mouentibus, semperque tremulis, & inter sese crepitantibus, vnde *Tremble* à Gallis nomen inditum. Iulos producit cæteris longiores, & magis nigricantes, coloris scilicet ex cinereo fusci. Gaudent Populi vliginosis locis, fluminum ripis, & scrobium aggeribus. Montes amat Populus, inquit Plinius. Harum omnium sic meminit Theophrastus. Populus alba nigraque vnus sunt formæ, ambæ rectæ, sed nigra excelsior, & læuior. Foliorum figura similis, & simile lignum candore, cum cæditur. Vtramque flore carere existimant. Cercis (Gaza Alpinam, alij Lybicam vertunt) Populo albæ similis est, tum magnitudine, tum ramorum cādore: folio Hederæ, sed parte altera

non anguloso, altera angulum habente, oblongum, in acutum desinētem: colore parte supina pronaque fere simili, ex petiolo longo, tenuique pendente, ideoque non recto, sed inclinato: cortice asperiore scabrioreq; quam Populus alba, sed Pyri sylvestris modo. Idem alibi. Quidam Populum nigram solam sterilem esse putant, vt Arcades, cæteras omnes quæ in montibus proueniunt fructum proferre. At in Creta Populi nigrae multæ sunt fructuosæ. Ex priore Theophrasti loco reprehendendi nos ansam quis arripiat, quod alia folia Populo albæ, alia nigrae tribuerimus, ille verò foliorum vtriusque figuram similem esse dixerit. Sed ex ipso Theophrasto respondemus, aliarum omnium arborum folia sibi ipsa similia esse, Populi autem, & Hederæ, & Ricini dissimilia. Recentia enim Populi vtriusq; & Ricini folia rotunda esse (de quibus intelligit, cum dicit vtraque foliorum figuram similem habere) vetera fieri angulosa. Alibi etiam scripsit Populum albam in nigram mutari, tum foliis, tum tota specie. Plinius de Populo hæc literis mandauit. Populi tria genera, alba, nigra, & quæ Lybica appellatur, minima folio, ac nigerrima, fungisque enascentibus laudatissima. Alba folio bicolor, superne candicans, inferiore parte viridi. Huic nigraq; & Crotoni folia iniuenta circinata rotunditatis, vetustiora in angulos exeunt. Populorum foliis grandissima lanugo. Euolat candida (tradita folio numerosiore candida) vt Iulus. In quibus Plinium errorum aliquot conuincit Matthiol. Primum enim scribit Populi albæ folia supernè candicare, infernè viridia esse, cum contra supernè vireant, infernè candicent: Deinde quod sine discrimine, inquit, Populorum foliis grandissima lanugo, cum hæc in alba tantum efflorescat, in nigra minimè: Postremò quod populum inter eas recenscat, quæ nec fructum, nec semen ferant, cum nigra Populus, vt ostendimus, fructum ferat vuarum specie, intus alba lanugine refertum, atque etiam scribat Dioscorides, semen ex aceto potum comitialibus prodesse. At Plinius ipse alio in loco Populum vuas & semen proferre tradit, illas ad vnguentorum vsum, hoc comitialibus vtile: Ex quibus Plinij verbis natus videtur esse error Ruelli scribentis

Locus.

Li. 16. c. 18.

Lib. 3. Hist.

cap. 14.

Li. 3. Hist.
cap. 5.Lib. 1. Hist.
cap. 16.Li. 2. Caus.
cap. 21.
Lib. 16. c. 23.Lib. 1. Dioscor.
c. 93.

Li. 16. c. 26.

Lib. 1. ca. 93.
Lib. 24. c. 8.

Lib. 1. c. 119.

Lib. 1. Dio-
scor. c. 23. vnguentum Populneum, quod Ægirinon Græcis dicitur, ex vua Populi, quæ Bryon est, confici verno tempore, cum plurimum grauis est, prægnansque resina. Sed caueant Pharmacopœi, inquit Matth. vnguentum quod Populeum vocat, ex vuis Populi conficere, quoniã Nicolaus Myrepficus non vuas, sed germina, vt diximus, quæ vere primo exeunt, huic admiscet, quæ odorata sunt, & veluti cera turgida, cum nullus vuis sit odor. Verum enimvero an antiqui Populi vuas ad odorata vnguenta adhibuerint, dubitat Matth. Nam Plinius quo loco de vnguentorum materia tractat, Populi vuam nihil aliud esse ostendit, quàm ipsius Bryon, id est Muscum, quem Populneum Muscum Diosco. & Galenus vnguentis oleisque inferunt, & inter odorata recensent. Optimũ, inquit, Dioscorides, est Cedrinum, proximum Populneum, &c. Quare Plinius hallucinatus Muscum in Populo nascentẽ nihil ab eiusdem vuis differre existimauit. Ibidem. Eius verba sunt. Eodem & Bryon pertinet, vua Populi albæ. Optima circa Cnidum, aut Cariam, in sitientibus, aut siccis, asperisque: secunda in Lycia Cedro. Hæc Plinius. At Cedrus nullas fert vuas, sed Muscũ odoratũ. Populus vtraque, inquit Matthiol. nascitur frequentissima in agro Mantuano, ac Ferrariensi, non modo in Padi ripis, sed & per agros, & prata, in fossarum aggeribus, Dioscorides vtriusque Populi has esse vires tradit. Potus albæ Populi cortex vnciæ vnus pondere, ischiadicis, ac vrinæ stillicidio prodest. Conceptionem impedire, vel sterilitatem inducere tradunt, si cum mulæ rene bibatur, (sic enim verteda sunt illa verba ἰσχυρὸν τῆς ἐκ τῶν οὐρῶν ἐνδοῦς, &c. non, abortium fieri tradunt, vt vertit Ruellius:) folia quoque cum vino post purgationes pota, idẽ præstare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilulæ quæ primo foliorum partu proueniunt, tritæ & cum melle illitæ oculorum hebetudini medentur. Memoria prodiderunt corticem Populi albæ & nigræ, particulatim cæsum, & fulcis stercoreatis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigræ folia cum aceto magna vtilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam Populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus vtile est. Eadem Plinius habet, quibus addit: virgam Populi in manu tenentibus intertrigo non metuatur. Humor è cauis Populi nigræ effluens verrucas, papulasque, & attrita corporis tollit. Populi ferunt & foliis guttam, ex qua apes Propolim faciunt. Serenus.

Sapius occultus victa coxendice morbus

Perfurit, & gressus diro languore moratur.

Populus alba dabit medicos de cortice potus.

Li. 7. simp. GALENVS. Populus alba mistæ quodammodo temperaturæ est, ex aquea tepida, & terrena extenuata essentia. Quamobrem & abstergentis facultatis est particeps. Populi nigre flores calidi facultate quidem sunt in primo recessu à temperatis, sed in differentia quæ habetur in siccãdo & humectando, paulũ à temperatis & mediis ad siccius deflexerunt, verum & subtiliorum potius quã crassiorum sunt partium. Folia quidem ipsius quodammodo floribus similia sunt, nisi quod ad omnia imbecilliora, minusque efficacia. Sed & Resina eius floribus similem facultatem obtinet, atque etiam calidiorẽ. Porro sem, tumen Resina, tum floribus, & subtiliorum est partium, & magis exiccat, non tamen est admodum calidum. Ibidem. Scribit Matthiol. nigræ Populi prima germina, odorata, glutinosaque ad capillorum nitorem à mulieribus expeti. Contundunt enim ea cum recenti butyro, deinde aliquot diebus insolata à butyro percolant, quo capillos inungunt, abluto prius capite. Lybicæ Populi folia ad ea omnia valent, ad quæ nigræ Populi folia valere diximus, sed longè inefficaciũs. Populus alba idem, inquit, humo tenuis secta ad radicem vsque, & aqua calida, in qua fermentum dissolutum fuerit;

fuerit perfusa, infra quatrimum fungos copiosos edit, esuiq; gratissimos. Vnguentum Populeum, cuius supra meminimus, contra calorem febrilem, & ad somnum conciliandum temporibus, & pulsantibus arteriis illinitur. Ex nigrae Populi semine, oleum αἰγιόνον paratur æstate, cum nulla est circa illud Resina. Sumunt eius grana, modicèque confringunt, & ad pondere expensum inde trientem, olei dulcis sextarium immittunt, & ad dies quadraginta insolant, atq; ita excolatum reponunt. Hoc oleum calfacit, tenuium est partium, mollit cum odore iucundo. Populi materia lenta, ideoq; scutis faciendis apta, inquit Plinius. Populi vitibus placent, nulla illarum umbra, ludentibus foliis.

Act. lib. 1.
Paul. lib. 7.

Li. 16. c. 40.
Lib. 16. c. 37.
Lib. 17. c. 12.

TILIA. CAP. XXV.

TILIA Latinè Tilia, Græcè Φιλύρα dicitur, quod in tenues assulas & Phyliras discerpatur, Gallicè *Tillet, Teillen, Teil*, Italicè *Tilia*, Belgicè *Linden*, Germanicè *Linden*, & *Lindenbaum, Steinlinden*, Hispanicè *Teia*, Anglicè *Linden tree*, Boemicè *Liipa*. Duo eius genera, mas, & foemina. Hæc vulgatio ac notior, procera est crassaque arbor, vastis & multum diffusis ramis, magna umbra terram opacantibus: cortice exteriori parte fusco, læui, nudo, interiore candido, lento, flexilique, ex quo intorquentur funes. Inter corticem hunc & lignum alij tenues sunt interiores cortices, & veluti membranæ, à quibus aliarum quoque arborum cortices interiores Tiliæ vocantur, & Phyliræ, quod Plinius declarat his verbis. Inter corticem & lignum tenues tunicas multiplici membrana, è quibus vincula Tiliæ vocantur, tenuissimæ earum Phyliræ, coronarum lemniscis celebres, antiquorumque honore, qua in significatione ipse usurpat de Ulmo loquens. Corticis interior tilia lepras sanat. Et paulo post. Idem præstant & tiliæ corticis. Materies huius ligni lævis est, enodis, in opere tractabilis, ex qua carbones fiunt conficiendo pulveri machinarum bellicarum utiles. Folia multum virent, latiuscula sunt, toto ambitu modicè serrata, Hederaceis haud absimilia. Flores albicant, odorati,


Nomina

Genera.
Forma.


Li. 16. ca. 14.

Lib. 24. c. 8.

TILIA FOEMINA.



TILIA MAS.



Forma.

Lib. 3. Hist.
cap. 10.

Lib. 16. c. 14.

Lib. 1. Dio-
scor. c. 108.
Ibidem.Lib. 1. c. 138.
Ibidem.

multi simul ex medio folioli candidi, angustiq; dependuli. Fructus pilulæ sunt, siue bacculæ rotundæ, racematim Corymborum Hederae modo coaceruatæ, in quibus semen minutum continetur, rotundum, nigricans, quod ex minutis baccis immaturis ac dehiscentibus excidit. Tilia mas arbor est non minùs pro-cera, crassa, ramosa quā fœmina: cortice lento quidem, sed minùs flexibili, magis scabro, spissiore, fragiliore, cineritio, in ramusculis candidiore, quàm in Tilia fœmina, sed non tam candido, quàm in ramulis Vlmi: materie durior, magis nodosa, magis que fulva, Vlmo valde simili. Foliis est latioribus, scabris, parum in ambitu crenatis, foliis Vlmi, haud absimilibus. Hæc Tilia fructum semper non profert: quare sterilis à quibusdam esse existimatur. Interdum tamen siliquas edit rotundas, compressas, coaceruatas, cum crena, siue fissura in summa parte, quarum singulæ ex singulis petiolis dependent. De Tilia hæc Theophr. prodidit. Tilia altera mas est, altera fœmina. Differunt inter se tum tota forma, tum ligno, & quod altera fructifera est, altera sterilis. Mas enim ligno est flauo, duro, magis nodoso, spissioréque: fœmina candidiore. Cortex mas crassior, & detractus propter duritiam flecti nequit: fœminæ candidior, & flexibilis, ex quo cistæ fiunt, item odoratior. Præterea mas sterilis est, & sine flore: fœmina florem & fructum gignit. Flos calyci similis iuxta folij pediculum, & anni sequentis Cachryn, suo petiolo nixus emergit, viridis, dum in caliculo est, detectus autem, subflauus. Floret cum vrbanis arboribus. Fructus rotundus, oblongus fabæ magnitudine, Hederae corymbis similis: maiusculus quinque angulis constat, velut eminentibus fibris, & in acutum sese contrahentibus, minutior minus diuisus. Grandior exculptus, parua quædam tenuiâque semina emittit, quanta sunt Atriplicis. Folium & cortex suauia dulciâque. Folium figura Hederae folio simile, verum sensim magis rotundatur, & iuxta pediculum id quod velut in gibbum prominet, à folij medio, longiore tractu, in acutum magis cogitur. Per ambitum crispa & ferrata folia sunt. Medullam paucam lignum habet, ac eam quidem quàm in aliis materiæ generibus molliorem: & alioqui lignum ipsum quoque molle est. Plinius horum magnam partem sic expressit. In Tilia mas & fœmina differunt omni modo. Namque & materies mas dura, rufiorq;, ac nodosa, & odoratior: cortex quoque crassior, ac detractus inflexibilis: nec semen fert aut florem vt fœmina, quæ crassior arbore, materie candida præcellensque est. Mirum in hac arbore fructum à nullo animalium attingi: foliorum corticisque succum esse dulcem. Materies teredinem non sentit, proceritate perquam modica, verum utilis. Ex quibus perspicuum est Plinium *φιλύραν* Theophr. Tiliam reddidisse, & dixisse mas corticem odoratiorem esse, cum id de fœminæ cortice dicat Theophr. Quod verò scribit, Mirum in hac arbore, &c. hoc ex eodem Theophr. habet: *ιδιώτατον δὲ τῶν ἐπὶ τῆς φιλύρας, τούτης καὶ τὰ μὲν φύλλα γλυκερά, καὶ πολλὰ τῶν ζώων ἐσθίει, ὃ δὲ καρπὸς ἔδειν βρωτός.* Adhæc quod dixit Tiliam proceritate esse perquam modica, cum contrā excellens & amplam arborem esse inter omnes constet, apertè indicat (vt rectè etiam Matth. annotauit) ipsum nomen vicinitate deceptum, Theophrasti Philyram cum Dioscoridis Philyrea confudisse, quam Philyream arborem ligustri magnitudine esse Dioscor. prodidit. Præterea Plinius vulgari nostræ Tiliæ eas vires adscribit, quibus Philyream præditam esse Dioscorides auctor est. Id quod etiam fecit Ruellius ipsum secutus. Eundem Plinij errorem, etiam secuti Hermolaus, & Marcellus, Philyreā Dioscoridis Tiliam sunt interpretati, eandem arborem esse arbitrati, quæ *φιλύρα*, idest Tilia dicitur. His quibus nomen similitudo imposuit: quod doctissimis viris contigisse mirum, cum Tilia à Philyrea notis omnibus diuersa sit, vt ostēdemus cū de Philyrea tractabimus.

Cæterum

Cæterum Tilia, aquosis montibus gaudet, inquit Plinius, & montes vallésque diligit. Eius cortex foliáque auctore Dodo. temperatæ sunt caliditatis, parum desiccant & astringunt, eiusdémque ferè sunt cum Vlmo temperamenti foliorum in aqua decoctum pustulas, exculceráque maligna in ore puerorum collutione sanat. Folia in aqua tusa commodè pedum tumoribus imponuntur. Cortex Tiliæ in aceto tritus vitiliginibus albis, & aliis huiusmodi cutis vitiis medetur. Tradit Matth. corticem Tiliæ commansum & illitum vulneribus glutinandis efficacem esse: folia verò trita, & aqua cōspersa pedū tumores discutere: humorē medulla castratæ arboris defluētē capiti illitū, capillos reddere, defluētésq; cōtinere: quæ qui diligētius cōsiderarit, Pliniūq; attētius legerit, cōperiet, opinor ea omnia Vlmo ipsum attribuisse, Tiliæ verò ea solūm qui de Philyrea Diosc. prodidit. Cū enim de Vlmi foliis, cortice, folliculorū humore dixisset, de eadē Vlmo sic deinceps scribit. Cauliculi foliorū primi vino decocti tumores sanant, extrahūntque pus fistularū. Idē præstant & Tiliæ corticis. Multi corticē cōmāducatū vulneribus vtilissimū putāt: folia trita aquæ aspersu pedū tumori. Humor quoq; è medulla, vti diximus, castratæ arboris effluens capillos reddit capiti illitus, defluētésque cōtinet. Tū de Tilia incipit dicere. Arbor Tilia leuiter tusa ad eadē ferè utilis est ad quæ Oleaster: folia autē tātū in vsu, & ad infantiū vlcera in ore cōmāducata: decocta vrinā ciēt, menses sistunt illita: sanguinē pota detrahūt. Quod autem quæ Vlmo propria sunt, ad Tiliā sint translata, in causa esse potuit Plinij codicū vulgatus error, in quibus legitur, Idem præstant & Tiliæ cortices, perinde ac si hæc, & quæ consequuntur de Tilia arbore intelligantur, cū de interioribus corticis Vlmi tunicis accipienda sint, vt rectè Hermolaus emēdauit, quod etiam de Tiliæ nomine initio huius capituli annotauimus. Quæ cum ita sint, perspicuū est Pliniū Tiliæ vires explicatē ea tātū descripsisse quæ Diosc. de Phillyrea scripserat his verbis. Phillyræ folia astringunt: ad eadē vtilia ad quæ Oleaster, cū adstrictione opus est, maximè ad oris vlcera cōmanducata, aut si decocto colluantur: pota vrinā ac menses cient. Tilia, inquit Theophr. in opere perfacilis est, ob suam mollitiā, & foris nauium longarū, & arcarū mensurarumque fabricæ expetenda. Habet corticem ad cistas faciendas idoneū: ex eo enim illas fabricantur. Legendū enim, ἐχει ὁ καὶ τὸν φλοιὸν χεῖσι μὴν πρὸς τε τὰς κίστας, ποιεῖσι καὶ ἐξ αὐτῆς, non ἐξ αὐτῆς, vt habent vulgata exēplaria. Sed & hīc alterum membrum deesse videtur ante τὰς κίστας. Sic enim Theod. vertit. Habet etiam corticem funibus cunisque percommodum Dioscorides flores & omnia quæ iucundum odorem spirant ἐν κιβωτοῖς φιλυρίοις, idest in arculis tiliaceis reponi iubet. Mollissima Tilia, inquit Plinius eadem videtur & calidissima: argumētū afferunt quia citissimè ascias retundat. Aptā scutis est Tilia quia lenta, plaga se contrahente protinūs. Ob hanc Tiliæ naturam veterum quidam fasciis tiliacis vsi sunt. Iulius Capitol. de Antonino Pio: Cū senex & longus esset, incuruareturque, Tiliaceis tabulis in pectore fasciabatur. Cinesium Poëtam tam gracilem fuisse aiunt, vt Tiliaceis asseribus corpori circumdatis imbecillitatem suam fulciret: quare Aristophanes illum Poëtam Philyreum vocabat. Tiliæ solæ Columellæ ex omnibus syluestribus apibus sunt nocentes. Tilia Trago omni sua substantia mollis est, & pinguis: folia habet mollia, succum, lentū, dulcem ac glutinosam tunicam, nēpe eam quæ cortici & ligno intercedit. Quidam aquam destillatam aduersus ventris tormina exhibent, non sine ratione: nam intestinis à dysenteria erosis illa conuenit. Alij aduersus morbū comitialē vsurpant. Tilia vsta aceto carbonibus restinctis cum oculis cancrorum tritis sumpta, sanguinis grumos exigit iis qui ex alto delapsi sunt, ita vt sanguinem excreent. Libri medij qui cortici & ligno interiaceret, aqua macerati lentum viscosumque humorem ambustis maximè prodesse experientia compertum est.

Locus.

Lib. 16. c. 18.

Lib. 6. c. 73.

*temperam.**Vires.*

Lib. 1. Diosc.

ca. 180.

Plinius li.

24. ca. 8.

Li. 1. c. 108.

Lib. 5. Hist.

ca. 7. & 8.

Usus.

Li. 1. prooē.

Li. 16. c. 40.

Lib. 9. ca. 4.

Lib. 3. c. 74.

Nomina
Lib. 3. Hist.
cap. 14.

Forma

BETVLA, vel vt alij legunt Betulla, à Theophr. σημύδα nominatur, à Gallis *Boulean*, & *Bes*, à Tridentinis, *Bedollo*, à Germanis *Birchenbaum*, ab Italis *Betula*, & *Bettola*, à Boemis *Briza*. Betula sæpe in altam & crassam arborem assurgit, multumque ramosam: ex ramis virgæ plurimæ dependent, lentæ, in quamvis partem flexiles, in terram inclinatæ. Harum & teneriorum ramusculorum cortex lævis est, succosus, colore fusco, siue Castaneæ. Caudicis cortex candidus,

BETVLA.



Lib. 3. c. 75.

Locus.
Lib. 3. Hist.
cap. 14.

Lib. 16. c. 18.

Usus.

Li. 16. c. 40.

Lib. 1. Diosc.
cap. 93.

Vires.

esse docet quæ lentissimas sunt, & ideo scutis faciendis aptissima, quoniam plaga contrahit se protinus. Mathiolus scribit, Betulam in agro Tridentino frequentissimam esse, materia lenta, tenaci, ex qua circuli ad dolia vinaria cingenda præstantissimi fiunt: Ananienses ex Betulis optimos conficere carbones ad liquanda metalla: ex delibrato ac intorto cortice faces ad nocturna lumina, quæ, quod bituminosa quadam pinguitudine redundant, tedæ modo flagrant, & resinofum quiddam Picis colore sudant: nec fortasse alia de eausa, inquit, Betula dicitur, nisi quod bituminæ scateat. Huius caudex terebro perforatus aquæ copiam emittit, cui vim maximam inesse quidam asserunt ad cõminuendos tam renem quàm vesicæ calculos, si diutius bibatur. Eadem maculas in cute delet, nitoremque conciliat: collutione oris vlcerata sanat. Foliorum succus coagulo admixtus caseos à carie & vermibus vindicat. Betula vt olim Romanorum magistratuum fascibus minax, sic & hodie in Gallia virgeis pedagogorum sceptris pueros terret. Ad Baculos & scopas utimur. Ex ea in Aruernia circuli ad vasa vinaria constringenda factitantur, vt & in Allobrogibus, & Sebusianis.

PLATANVS

PLATANVS CAP. XXVII.



Πλάτανος Græcè, Latine Platanus, ab amplitudine nominatur, Arabicè *Nomina*
 Daulb, Gallicè *Platane*, Italicè *Platano* Germanis incognita. Arbor est ma-
 gna, procera, multis longisque radicibus, patulis diffusa ramis, vnde *Forma.*
 ἀμφιλαφὴ πλάτανον dixerunt Græci: cortice crasso: foliis latissimis, virigineis, ex

PLATANVS.



longo & rubente pediculo pendentibus. Flores edit paruos, pallidos, congestos: baccas rotundas, scabras, lanuginosas, ferè nucis pōtica magnitudine. Platanus auctore Plinio, vmbra gratia tantum ex alieno petita orbe per mare Ionium in Diomedis insulam eius tumuli gratia primū inuecta, inde in Siciliam trāsgressa, atque inter primas donata Italiæ, cui postea tantum honoris increuit, vt mero infuso enutriretur, compertumque id maximè prodesse radicibus, ita vt arbores vina potare docuerimus, alioqui aquas amantes, & irrigationibus gaudentes, vt scripsit Theoph. Præterea celebrata sunt, inquit, primum in ambulatione Academia, Athenis, cubitorum xxxvi. vnus radice ramos antecedente. Nūc est clara in Lycia, gelidi fontis socia amœnitate, itineri apposita, domicilij modo caua, lxxx atque vnus pedum specu, nemoroso vertice, & se vastis protegens ramis, arborum instar, agros longis obtinens vmbri: ac ne quid desit spelunca, imagini, saxeæ intus crepidinis corona muscosos complexa pumices, tam digna mi-

Usus.
 Lib. 12. cap. 1.

Lib. 1. Hist.
 cap. 11. &
 Lib. 3. cap. 1.

raculo, vt Licinius Mutianus ter Cos. & nuper prouinciæ eius legatus prodendum etiam posteris putarit, epulatum intra eam se cum duodeuicesimo comite, large ipsa toros præbenre ironde, ab omni afflatu securum, optantem imbrium per folia crepitus, & latiore quàm marmorū nitore, picturæ varietate laquearium auro, cubuisse in eadem. Aliud exemplum Caij Principis in Veliterno rure mirati vnus tabulata, laxisque ramorum trabibus scamna patula, & in ea epulati, circum sparsa vmbra xv. conuiuarum ac ministerij capace triclinio, quam cœnam appellauit ille nidum. Est Cortynæ in insula Creta iuxta fontem Platanus vna, insignis vtriusque linguæ monumentis, nunquam folia dimittēs, statimque ei Græciæ fabulositas superfuit, Iouem sub ea cum Europa concubuisse, ceu verò non alia eius generis esset in Cypro. Sed ex ea primum in ipsa Creta (vt est natura hominum nouitatis auida) Platani satē regenerauere vitium, quādoquidem commendatio arboris eius non alia maior est, quam solem æstate arcere, hyeme admittere. Idem auctor cum Theophr. inter arbores longissimæ vitæ numerat Platanum Delphicam, & alteram in Caphyis, Arcadiæ luco, Agamennonis manu fatas. Platani vmbra adeo delectatum fuisse Xerxem in Lydia scribit Ælianus, vt diem integrum sub ea cum maximo exercitu consumpserit, floccipendens tam breui voluptate tot copias remorari. Tenerrima Platani folia Dioscoridi in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant: decocto cortice in aceto, dentes in dolore colluuntur: virides pilulæ in vino potē serpentum moribus auxiliantur, exceptæ vero adipe, igne ambusta sanant: at quæ insidet foliis & pilulis lanugo oculos

Lib. 7. c. 44.
 Lib. 4. Hist.
 cap. 14.

Lib. 1. c. 91.
Vires.

Lib. 8. sign.

los & aures offendit. Galenus Platanum, scribit, esse humidioris frigidioris-
que naturæ, sed non procul à temperata: proinde folia viridia trita, & illita non
obscurè phlegmonas nascētes adiuuare, corticem autem & pilulas magis desic-
cantem vim obtinere, vt ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur
dolores, pilulæ verò cum adipe ad ambusta: esse autem qui cortice combusto
medicamentum desiccatorium & absterforium efficiant, quod cum aqua lepras
sanet, per sese autem illitum, vlcera, ob humorem nimium vetera, & sordida.
Vitandum esse puluerem foliis arboris insidentem idem monet, quoniam spi-
ritu attractus, arteriam offendit, valenter desiccans & exasperans, vocemque
lædit, sicut sanè etiam visum, & auditum, si in oculos aut aures inciderit. Pla-
tani aduersantur scorpionibus, inquit Plinius, Pilulæ earum in vino potæ om-
nibus serpentium venenis medentur, item ambustis. Tusæ autem cum aceto
acri, magisque Scyllite, sanguinem omnem sistunt: lentiginem & carcinoma-
ta, melanias quoque veteres addito melle emendant. Folia & cortex illinuntur
collectionibus, & suppurationibus. Cortex autem in aceto decoctus dentium
remedium est: folia eorum tenerrima in vino albo decocta oculorum. Lanugo
foliorum & auribus, & oculis inutilis. Cinis pilularum sanat ambusta igni, vel
frigore. Cortex è vino scorpionum ictus restinguit. Inopia cogit aliquando lu-
minum causa è Platani baccis oleum fieri, aqua & sale maceratis.

ACER.

CAP. XXVIII.

Nomina
Lib. 3. Hist.
cap. 4.
Genera.

Lib. 3. Hist.
cap. 11.

Li. 16. ca. 15.



CER, vel Aceris vt Solinus dicit, Græcè ἡ σφένδαμνος dicitur, Gallicè
Erable, Italicè *Pie d'oca*, & *Platano aquatico*. Theophr. inter campestres
arbores τὴν σφένδαμνον, id est Acerem recenset, quæ in monte pro-
uenit ζυγίαν vocans, Gaza Carpinum interpretatus est: quæ in pla-
nis, γλείνον, Gallicam idem interpres vertit, vt fortasse non γλείνον, sed γαλ-
ταιον legisse videatur. Quanquam, inquit Theophr. alij τὴν σφένδαμνον, & τὴν ζυ-
γίαν specie differre arbitrentur. Idem alibi: τῆς σφενδάμνης alij duo, alij tria consti-
tuunt genera: primum quod communi nomine σφένδαμνον, idest Acer vo-
cant: alterum ζυγίαν, idest Carpinum: tertium Clinotrochon, vt Stagiritæ vo-
cant. Plinius etiam plura eius genera prodidit. Album quod præcipui cando-
ris, vocatur Gallicum, in transpadana Italia, & trans Alpes nascens: alterum
genus crispo macularum discursu, qui cum excellentior fuit, à similitudine
caudæ Pauonum nomen accepit, in Istria Rhetiâque præcipuum. E viliori ge-
nere Crassiuenium vocatur. Græci quoque, inquit, situ discernunt. Campestre
enim candidum esse, nec crispum, quod Glinon vocant: montanum verò cri-
spius duriusque, etiamnum è mascula crispus ad lautiora opera: tertium ge-
nus Zygiam, rubentem, fissili ligno, cortice liuido, & scabro. Hoc alij generis
proprij esse malunt, & Latine Carpinum appellant. Hic tria Aceris genera no-
bis nota proponimus: Acerem montanum, cuius duo genera, vnum candi-
dum, quod Alpini Aruernique à similitudine foliorum Platani Plane appel-
lant: alterum flauum, siue crispum, qui Opulus est montanus: *Erable madré*, &
Erable jaune appellant. Eius enim color nitidior est, venarumque in eo discursus
magis apparent, præsertim si oleo nucū illinatur. Hodie quoque lignatores
Sequani Acerem montanum mare fœminâque distinguunt: colore magis flauo
in mare, pallidiore in fœmina: ligno in mare duriore, venosiore, magisque
crispo, in fœmina laxiore, molliore, solutioreque, ac minus crispo, quodque
mas prius floreat, etiam Plinio teste, fœmina tardius. Secundum Aceris genus
est Acer campestre, siue in planis nascens, veteribus Opulus campestris. Hodie
Insubres seruato vetere vocabulo Opolo vocant, & ea ad maritandas vites vtū-
tur

Li. 16. ca. 16.

tur, quas coniugatas *Hautains* appellant. Nos à ligni, si cum *Aceris montani* ligno conferatur, teneritudine & colore, *Erable mol*, & *Erable madré* nominamus. Tertium genus *Acer Monspeliense* nominauimus, quod in silua Monspeliensi vrbi vicina, eique ligna suppeditante, Valena nuncupata proueniat, *Aceris* *Forma.* vulgaris penè figura. *Acer campestre* siue *Opulus campestris*, vt à notiori faciam exordium, in sepibus planorum locorum, aut colliculorum fruticat, nonnun-

ACER MONTANVM.*ACER MON-
spesulanum.**ACER CAMPESTRE
Carpinus.*

quam humilis, arbuscula, interdum adhibito præsertim cultu, in procerā arborē grandescēs, crassam, ramis multis brachiatā: cortice spisso, parum candicante, corpore candido, rariore quàm *Aceris montani*, longo & vndoso venarū discursu ornato: foliis latis, quæ quinque angulis constant: fructu longo, compresso, tenui, auicularum plumis, aut grandium muscarum alis simili: floret mense Maio, fructum maturat Septembri. *Acer montanum* siue *Gallicum* arbor est speciosa, procera, ramosa que, foliis maioribus, vitigineis, è longis, tenuibus, rubentibusque, petiolis pendulis, floribus muscosis, luteolis, foliacea siliqua Papilionis alas imitante, vno vtrunque semine donata, materia duriore, vnde apud Aristophanem homines σφενδάμνοι, idest *Acerni*, pro durissimis ponuntur. Paulo ante æquinoctium germinat, autore Plinio, messibus reddit semen. *Acer Monspeliense* arbor est mediocriter procera, ramis satis explicatis, cortice quodammodo purpurascēte, folio *Aceri* vulgari simili, in tres tan-

Dodo. li. 6.
cap. 74.*Tempus.*
Li. 16. c. 20.
& 25.

rum

rum cuspides siue angulos diuiso, crasso, venoso, ex longo pediculo pendente, paribus interuallis vtrique sito: fructu gemino, membranulis duabus cohærentibus, alis muscarum similibus. Hoc Aceris genus quidam esse aiunt, quod Plinius in Istria Rhetiâque præcipuum esset tradidit, crispo macularum discursu, quod eius cū excellentior fuit à similitudine caudæ pauonū nomē accepit. Horum opinioni nec assentior, nec repugno. Aceris radix contusa, inquit Plinius, iocinoris doloribus efficacissimè imponitur, quod etiam testatur Serenus his versibus.

Vires.
Lib. 24. c. 8.

*Si latus immeritum morbo tentatur acuto,
Accensum tinges lapidem stridentibus undis,
Hinc bibis: aut Aceris radicem tundis, & una
Cum vino capis, hoc præsens medicamen habetur.*

Li. 8. med.
part. cap. 8.

Galenus in confectionibus Hepaticis ab Asclepiade conscriptis numerat τὴν τῆς σφενδάμνης ῥίζαν κοπτεῖσαν, καὶ λειοθεῖσαν, idest Aceris radicem tusam, & tritam. Exhibet autē ex ea drach. i. cum aquæ dilutæ cyathis tribus, quo loco dubitat Cornarius an σφενδάμνης vox rectè legatur, aut potius σφονδυλῆς vox sit pro ea substituenda, quum ob vicinitatem scripturæ vtriusque vocis facilè committi potuerit, vt altera pro altera supponeretur. Nam de Sphendamnno arbore, idest Acere non temerè reperiās hoc auxilium, quando quidem nullam eius mentionem fecerunt Græci Medici in simplicium medicamentorum tractatu, Dioscorides, Galen. Paul. Ætius. Vnus Plinius de eius radice dixit quæ suprà citauimus. Sphōdylij verò radicem ictericis & hepaticis exhiberi testatur Dioscor. item Galenus, qui ei aerem, & incidendi vim tribuit. Acer eodem Plinio teste, operum elegantia ac subtilitate Cedro est secundum, imo potius Citro, vt rectè emēdaui Hermolaus. Pulcherrimum verò est Bruscum, multoque excellentius etiamnum Molluscum, tuber vtrumque Aceris. Bruscum intortius crispum, Molluscum simplicius sparsum, quod si magnitudinē mensarum caperet, haud dubiè præferretur Citro. Nunc intra pugillares lectorumque Silaceas laminas (id est luteas, & veluti file tinctas, qui color Aceris est) raro vsu spectatur. Quidam legunt, Sicilicia, & laminas, (id est Secamenta, a Siciliendo, quod verbum secare significat.) E brusco fiunt & mensæ nigrescentes. Hæc Plinius. Brusci verò vestigium aliquod nobis superest, sed de alia arbore intelligitur. Nam in Gallia Narbonensi, locis Hispaniæ finitimis, ac montibus Pyreneis, potissimum circa oppidum dictum Limons, haud procul Carcassona, radices Buxi, quarum illic magna copia est, Brouchin appellant. Has potissimum Germani ob maculas varias, ac flexuosos venarum discursus ad opera lautiora expetunt, atque emūt. Item qui oppidum D. Claudij nomine insigne incolunt in monte Iura, ex iisdem radicibus cochlearia pulchra conficiunt.

Li. 3. ca. 90.
Lib. 8. sim.
Li. 16. ca. 15.

Capit. 16.

A L N U S C A P. XXIX.

Nomina



ALNUS Græcè κλήθρα nominatur, Gallicè *Aulne*, Germanicè *Erlenbaum*, & *Elernbaum*, Italicè *Aulno*, & *Ouio*, Boemicè, *Vuolje*: Arbor est magna procerâque, ramis multis, qui fragiles inflecti se minime patiuntur, vt ligna alia aquatica, cortice ex fusco rufescente, ligno satis duro, rubente statim atque cortice spoliatum est, atque etiam vetustum, & aridum. Folio est rotundo, parum rugoso, Corylo haud absimili, crassiore, nervosiore, glutinoso, ac veluti melle asperfo. Id crassissimum esse dicit Plinius. Flores huius sunt iuli longi, Betulæ iulis similes: fructus parvæ oliuæ magnitudine, virides, oblongi, Moris forma similes, ex squamis quamplurimis compacti, minuto in his semine, colore in nigrum fuluo, quod iis maturis, & siccitate hiantibus

Forma.

Li. 16. c. 24.

ALNVS.



flamnationes restingunt. Nudis pedum plantis supposita viatoribus itinere defatigatis magno sunt leuamento. Rore matutino madentia cubiculis ad necandos pulices per æstatem vtiliter insperguntur. Ex cortice Alni ater fit color, quo pilei, & vmbracula coactilia, vulgo *Feutres*, crassiores pâni, aliâque huiusmodi inficiuntur. Quidam eo, & fructu viridi vtuntur, Gallarum vice ad scriptorium atramentum conficiendum, addito gummi, & chalcantho. Materies Alni ad naualia commendatur, & ad palationes, idest fundamenti genus, quod

ALNVS Nigra.



hiantibus decedit. Ex quibus Plinium errasse, sed Theophrasti fide perspicuum est, qui Alnum scripserit neque fructum, neque semen ferre. Alnus aquis gaudet, & in aquosis locis semper prouenit. Germina foliâque mense Aprili profert: fructus Septembri maturescit. Alnus Theophrasto sterilis est, & vnus generis, recta arbor natura, ligno molli, medulla tenera, vt virgæ tenues totæ excauentur: folio Pyri, sed ampliore, neruosioréque: cortice scabro, intus rubente, quo coria tinguntur: radice est per summa terre sparsa, non maiore quàm Laurus. Nascitur in aquosis, nec alibi vsquam. Idem paulo post Nucis Auellanae folio Alni folium simillimum esse ait: & alio in loco minimè sterilem esse existimat, cum scribit, Terebinthus circa tritici messem, aut paulo seriùs, semen reddit: Fraxinus, atque Acer, æstate, Alnus, nux Iuglans, Pyrorumque genus quoddam, Autumno. Cortex Alni & folia refrigerant, siccant, & adstringunt. Recen-

tia folia tumores imposita dissoluunt, & inflammationes restingunt. Nudis pedum plantis supposita viatoribus itinere defatigatis magno sunt leuamento. Rore matutino madentia cubiculis ad necandos pulices per æstatem vtiliter insperguntur. Ex cortice Alni ater fit color, quo pilei, & vmbracula coactilia, vulgo *Feutres*, crassiores pâni, aliâque huiusmodi inficiuntur. Quidam eo, & fructu viridi vtuntur, Gallarum vice ad scriptorium atramentum conficiendum, addito gummi, & chalcantho. Materies Alni ad naualia commendatur, & ad palationes, idest fundamenti genus, quod in aquis, aut vliginosis, aut congestitiis locis fieri videmus. Vitruuius: Itaq; Alnus, quia non nimis habet in corpore humoris, in palustribus locis infra fundamenta ædificiorum palationibus crebrè fixa, recipiēs in se quod minus habet in corpore liquoris, permanet immortalis ad æternitatē, & sustinet immania pondera structuræ, quæ in vulgatis Vitruuij codicibus mēdosa sic legit Budæus. Vmbra pinguis Alno, sed pascens sata, inquit Plinius, & alibi: Licet Alni sepes muniant, contrâque erumpentium amnium impetus, riparum modo in tutelam ruris excubent in aqua sata, cæsæque, densius innumero hærede profint.

ALNVS NIGRA BACCIFERA.
CAP. XXX.

Ecâ foliorum similitudine Alnus nigra recentioribus quibusdam vocatur, Gallis *Aulne noir*, Germanis *Faulbaum*, aliis Alnus baccifera. In arborem vix assurgit, neq; crassescit, sed virgas quâplurimas emittit

Locus.

Tempus.

Lib. 3. Hist. cap. 14.

Capit. 15. cap. 6.

Vires.

Dodo. li. 6. cap. 75. Matth. lib. 1. Diosc. ca. 93. Trag. li. 3. cap. 63.

Lib. 2.

In Annot. in Pand. Li. 17. ca. 12. Lib. 16. c. 37.

Nomina

Forma.

Tempus. longas, rectas, quæ in alias virgulas diuiduntur, cortice tenui nigroque vestitas glaucis maculis asperso, libro subtus flauo. Lignum candicat, medulla media ex rubro nigricante. Huius folia sunt Alni, aut Cerasi, aut Corni, fusca: flosculi albicant, quibus succedunt bacce rotundæ, quætæ Piperis grana, primum virides, deinde rubræ, postremo nigræ cū maturæ fuerint, gustus planè ingrati. Prouenit in siluosis, & vdis, nec nisi ad Septentriones, vt Angliæ, Germaniæ, Northmaniæ.

Locus. Floret Aprili mense: fructus Augusto sunt maturi. Siler Plinij quidā esse volunt, quod in aquosis prouenit, cap. 18. lib. 16. & folio frōti illito capitis dolores sedat: semine in oleo trito phthiriasis coercet: serpētes fugat: quā orbē baculum ex eo rustici gerūt: ca. 10. lib. 24. liber interior flauus desiccatur: in vino maceratus ac potus vomitum ciet, purgātque valentissimè phlegmaticos ventriculi putridosq; humores, & aquas. Idē in vino decoctus dētiū dolorē sedat, si in ore cōtineatur: illitus scabiē deterget. Folia bubus sunt vtile pabulū, quia lactis copiā generant.

SAMBUCVS SYLVESTRIS CAP. XXXI.

Lib. 3. c. 24.
Nomina

SAMBUCVS sylvestris, siue mōtana, in opacis vliginosiq; syluis nascitur. Tragus, & sylvestrem vocat, & Ceruinā, quod non nisi in syluis, & mōtib; proueniat, & quod à Ceruis magnopere expetatur. Ea est fortasse arbor mōtana, quām πυγὼν Theoph. his verbis significat: ἰδία ἡ τὰ τοιαύδε τῶν ὀρεινῶν, ἃ ἐν τοῖς πεδίοις ἐφύεται, ἐλάτη, πικύνη, πῖλος, ἀργία, φιλύρα, ζυγία, πυγὼς, &c. id est, montibus aut propria, q̄ in planis nasci nequeunt, Abies, Pinus, Picea, Aquifolia, Tilia, Carpinus, Pygus quā postremā arborē Gaza in translatione sua omisit. Ea frōde,

Lib. 3. Hist.
cap. 4.

SAMBUCVS Sylvestris.

cortice, ligno, medulla, deniq; colore, odore & sapore vulgare Sambucū omnino refert, floribus dūtaxat, & fructu & p̄ceritate, ab ea distās. Nā Sābucō vulgari semp humilior est. Flores subluteos, forma stellatos, non in vmbellis vt vulgaris, sed racematim ligustri modo, multò etiā celerius, nempe Aprili mense profert, qui in acinos abeunt, Augusto mense rubescētes, minijq; colore tinctos, nec vnquā nigrescētes, racematim è pediculis depēdentes, iniucundi saporis. Sambucū sylvestrē frigidā esse iudicat Tragus, vt pro Mandragora, si illa desit, vsurpari possit. De facultatibus acinorum nihil se obseruasse, fatetur. Illud verò experiētia didicisse affirmat, Ceruū auidissimè hāc Sāmbucū per siluas sectari. Vbi namq; locorum duas huiusmodi stirpes puenisse senserit, eò accurrit, quod mirum est, Sambucus hęc, ac vulgaris eosdem situs occupāt. His ceruus mirificè delectatur, folia vtriusq; non baccas depascēs, ex quo intelligi pōt hāsce baccas frigidioris esse tēperaturæ, atque ideo feris, nedū iumentis & hominibus minūs salubres. Harū esum somnū cōciliare tradit Pena, atque adeo veternū, & nimiū admodū noxiū esse. Iam verò quod maiori dignū est admiratione, obseruarūt Ceruū solū foliis his vesci, non Ceruā, nisi pragnās fuerit, Ceruūque in vtero gestarit: tū enim & folia hęc appetit, & illa degustat, aliās nunquā. Matth. Sābucū hāc Mōtanā vocat, & à vulgari differre scribit fructu, qui in Mōtana nō in vmbellā coaceruatur, nec maturus nigricat, sed racematim coheret, & perpetuò rubet. Adhęc vulgaris procerior est, & leuiore cōstat materie.

SORBUS

Forma.

Vires.
Ibidem.



SORBUS torminalis.



SYLVESTRIS hæc arbor Sorbus est torminalis, sic dicta quòd contra tormina valeat, à Sequanis Tormigne nominatur. Magna nonnunquam spectatur hæc arbor, sed non nisi longissimo tempore, & quia in frutetis sæpius nascentem agricolæ cum fruticibus cédunt, nec crescere sinunt, in iustam magnitudinem non assurgit: quare humilis sæpius reperitur, cortice fusco, qualis ferè est Alni: foliis magnis, longis, multis in vno pediculo, parum hirtis, Sorbo simillimis, in ambitu ferratis: floribus albis, racematim cohærentibus, quibus succedunt bacca rotundæ, primùm virides, deinde rubentes, saporis ingrati. In altissimis Sylvis provenit. Plinius quartum hoc Sorborum genus constituit. Quartum genus inquit, Torminale appellat, remedio tantum probabile assiduum proventu, minimumque pomo, arbore dissimili, foliis penè Platani. Dodon. hæc Fraxinum bubulam & Ornum appellat.

Nomina

Forma.

Locus.

Li. 16. ca. 21.

Li. 6. c. 70.

CRATÆGUS

CAP. XXXIII.

CRATÆGUS

Theophrasti.



HÆC arbor in densis Sylvis nascitur mediocri proceritate. In hortos tamen translata facilè provenit. Caudex cortice vestitur leui, albicante: folia Sambuci aquaticæ similia sunt, minora, pedisanferini figuram quodammodo referentia. Florem mittit ex pallido candidum, racematin cohærentem, Sambuci vulgaris ferè modo, quo dilapso poma nascuntur exigua, incana, Oliuarum magnitudine, gustu astringentia, veluti Mespila, quæ ut illa, lapideum semen non continent, sed nucleos nigros Piri vulgaris modo. Poma hæc autumno mollescent, tunc palato gratiora acerbitate deposita. Tragus Sorbum esse Torminalem existimat. Hypomelides Palladij esse quidam opinantur. Hypomelides, inquit Palladius, poma sunt Sorbo similia, mediocri arbore nascuntur, & flore candidulo. Dulcedo huic fructui cum acuto sapore commixta est. Amat loca tepida, aprica, maritima & sæpè saxosa, statum rigidum reformidat De Hypomelidibus, siue Amamelidibus posthac agemus fu-

Locus.

Forma.

Nomina

Lib. 13. c. 4.

Lib. 3. c. 30.

In cap. 136. lib. 1.

sus. Arborem hanc Cratægum esse Theophrasti non absurdè quis existimaue- rit. In qua opinione est Anguillara, reclamante Matthiolo, qui Sorbum Tor-

Lib. 3. Hist.
cap. 15.

Cap. 12.

Lib. 15. c. 21.

Li. 27. ca. 8.

Libr. 2.

minalem esse putat, eoque nomine depingit. Κράταγος, inquit Theophrast. οὗ ὁ
 κραταίγονα χαλδοί, ἔχει τὸ μὲν φύλλον ὅμοιον μεσπίλῃ, τέτανδον, πλὴν μείζον ἐκείνου, καὶ πλε-
 ϋότερον, καὶ πορρωτέρω, τὸν δὲ χαραγμὸν οὐκ ἔχον, ὥσπερ χαλκείνο (Legendum τὸν δὲ χαραγμὸν
 ἔχον ὥσπερ χαλκείνο, dixerat enim suprà de Anthedonis folio, καὶ τὸ ὅλον χαλαχίσμασι
 περιεχαραγμένον, (idest totum sinuosis fissuris laciniatum) γίνεσθαι ὃ τὸ δένδρον ἔτε-
 μέγα λίαν, οὔτε παχὺ τὸ δὲ ξύλον ποικίλον, ἰχυρὸν, ξανθὸν. ἔχει δὲ φλοιὸν λεῖον, οἷον μεσπίλῃ, μο-
 νόρριζον ὃ εἰς βάθος, ὡς ἐπὶ τοπολῷ. Καρπὸν δὲ ἔχει τρογγύλον, ἡλίκον ὁ κόψιμος (ὁ κότινος legit
 Athenæus) πεπαιδόμενος ὃ ξηρὸς γίνεσθαι (ξανθὸς γίνεσθαι ex Athenæo) καὶ ἐπιμελαίνεται,
 (emenda ὑπομελαίνεται) καὶ τὴν γεῦσιν καὶ τὸν χυλὸν μεσπιλωδὸς: διόπερ οἷον ἀγρία δόξειεν
 εἶναι. Idest, Cratægus, alij Cratægona vocant. Folium habet Mespili (nempe
 Aroniæ Dioscoridis, Anthedonis Theophrasti: eius enim solùm folia descripsit
 Theophrast. non aliarum) rigidum (τέτανδον, quam vocem & de Anthedonis folio
 idem vsurpat) sed maius, latius, longius, eius modo laciniatum. Arbor est non
 admodum procera, nec crassa: lignum varium, solidum, flauum: cortex lævis est
 Mespili modo: magna ex parte vnicam radicem in profundum agit, fructus eius
 est rotundus, magnitudine Cotini, qui maturescens flavescit, & vtrumque ni-
 grescit, succo & gustu Mespili. Quamobrem sylvestris Mespilus esse videri pos-
 sit. Hæc Theophrasti oratio plātam hīc adpictam satis apte exprimit, folio Me-
 spili Aroniæ, ligno intus ex albo flavescente, ac fructu, in quo semina duo aspe-
 ctu, saporeque Pyro similia, lapidosa quadam concretione sub vmbilico con-
 cluduntur: qua in re particeps est naturæ Mespili, cui osseum semen est, & Sor-
 bi, cui Piriæmulum. Matthiolo verò Plinij auctoritas vtrumque fauere videtur
 sic scribentis. Quartum genus Torminale vocant remedio tantum probabile,
 (probatum, laudatum) assiduum prouentu (nam quotānis fert, & copiosè) mini-
 mumque Pomo: arbore dissimili, foliis penè Platani (non planè, hoc enim fal-
 sum esset, cum à Platano multum discrepēt.) Non ferunt ante trimatum ex vlllo
 genere. Cato & Sorba sapa condiri iubet. At Plinius vt sæpè alibi, ita hīc dormi-
 tasse videri possit. Nusquam enim is alibi neque Sorbi sylvestris, quæ proculdu-
 bio Tormalis est, meminit, neque Cratægi, arboris vtriusque crebrò ab aucto-
 ribus memoratæ, præterquam eo loco in quo Theophrasti Cratægum, quæ Cra-
 tægogonum, siue Cratægona vocat, Aquifoliam esse Italorum perperam scri-
 bit. Quare facile fuit Plinium iudicio suo & festinanter hæc æstimatem, in na-
 tura pene similis facultatis, & corporis fructusque figura non multum diuersa,
 pro Cratægo Sorbum torminalem nominasse. Athenæus scriptor quidem ma-
 gnæ auctoritatis, sed in tractandis plantis non admodum exercitatus, sine ratio-
 ne Cratægum esse tradit Cerasum acidam, quam debellato Mithridate Lucul-
 lus è Cerasunte oppido Ponti in Italiam primus aduexit, citata de Cratægo hi-
 storia Theophrasti, quod omnino confutatur vel hoc solo argumento, quod
 maturis Cerasis Mespili sapor nullus est, vt Cratægi fructui.

CORYLUS SILVESTRIS. CAP. XXIIII.

Nomina

Forma.



ΑΡΥΑ ποντική, Latine Nux Pontica sylvestris & Corylus nomina-
 tur, Gallicè *Coûdre*, & *Noisetier*, Germanicè *Haselfranch*. De nuce Pon-
 tica satiuæ eiúsque fructu idoneo loco dicetur. Corylus arbor est,
 sæpius frutex, radice lata, in obliquum acta, nodosa, stipitibus
 multis fruticante, quorum alij proceri sunt, crassi, ramis multis brachiati, corti-
 ce summo tenui, pingui, maculis albis vario, medulla tenui & flaua: alij longi &
 graciles, ex quibus piscatoriæ lineæ fiunt, materie nimirum lenta admodum, & non
 fragili: foliis rugatis, Alni similibus, sed latioribus, altera parte ex viridinigris-
 ribus, altera subalbis, per ambitum ferratis. Nō floret Corylus, sed floris vice iulos
 profert, quibus deciditibus folia emergunt, inter quæ nuces ternæ quaternæve,

quas

CORYLVS Sylvestris.



quas magna ex parte calix viridis integit, in summo fimbriatus, molli prominente barba, subsunt: putamen durum, lignosum, nucleus quæ alba siue pallida tenuiq; tunica obductus, solidus, in quibusdam rotundus, in aliis oblongus. Umbilicus intus in medio vëtre pminet. Scribit Tragus omnia Corylorum genera exiguos ac rubros flores, breuib⁹ croci staminibus similes, antequam folia fundant, ostendere Februuario mense, cum iuli quos nonnulli Coryli flores esse perperam statuunt, colorem luteum aquirunt. De iis floribus sic Theophr. Quidam Quercum, nucem Auellanam, & Castaneam florere existimant: item Pinum & Piceam, alij nullâ earû, sed iulû Nucis, muscû Quercus nucamentû Piceæ, grossis, pportione respondere. Gaudet Corylus argillotis, & vliginosis locis, nemoraq; amat, hyemis patientissima. Mōtes in Gallia Corylis vestiuntur, & nemora scatēt. In planis etiâ nascuntur. Theoph. quâsdâ eius partes anxie cōsectatur. In Corylo, inquit, cum deciderit fructus, nascitur racemosum quiddâ

Li. 3. ca. 67.

Lib. 3. Hist. cap. 6.

Locus.

Lib. 3. Hist. cap. 7.

vermis prægrandis magnitudine, ex vno pediculo, pingue, iulos nōnulli vocāt. Constant ex parvis particulis veluti squamulis, eodē ordine quo in nucibus Pineis, vt p̄similis sit nuci Pineæ nouellæ viridiq; figura iuli, nisi quod iulus oblōgior, & fere æqualiter crassus. Hyeme augetur, ineunte vere dehiscit: squamata illa flaua fiunt, & in trium digitorû longitudinē increscunt. Vere aut folia cū erūpūt illa decidūt: ac tū nucis totidē caliculacea tegumēta gignuntur cōpactim iūcta in vno pediculo, quot & flores, horūque singulis singulæ nucs insunt. Hęc Theoph. Nucs Augusto mense sunt maturæ, Diosc. auctore, stomacho infestæ: trita tamē & in aqua mulsâ potæ rursi veteri medētur: tostæ & cū exiguo Piperis potæ, destillationē cōcoquūt. Crematarum cinis cum axūgia aut adipe vrsi peructus, alopecijs capillū reddit. Aiūt nōnulli vsta earū putamina, & in cineris speciē redacta, cæsiōrū oculorū pupillas, infantibus denigrare, perfuso cū oleo sincipite, id quod Cornarius illustri experimēto facto aliquoties, se cognouisse asserit, & verissimū comperisse. Nucs ponticæ Galeno plus habēt essentiæ terrestris ac frigidæ, quā iuglades: itaque etiâ gustāti austerior tū cortex, tū plātātū fructus apparet: cætera iugladi similes sunt. Simeō Sethi calidas & humiditas esse asserit, magis verò nutrire quā iuglades nucs, difficiliusq; cōcoqui, inflationes facere, & vt quiddâ aiūt ieiunū intestinū ledere, facilius autē cōcoqui, minūsq; vëtrē sistere, si interior earū cortex abiiciatur. Aiūt ei neque morsus, neque venena officere illo die posse, & scorpiones ab ipso fugere, q̄ ante alios cibos cū Ruta sumpserit. Sūptæ cū caricis iā à scorpione ictis auxiliātur. Ad aciditatē oris vëtriculi à nigro humore excitatā cōferūt. Nucs auellane, inquit Tragus, stomacho tenuioribūsq; intestinis infestæ sunt, maximè si nō satis maturæ fuerint, id quod non solum versiculus Macri.

Tempus.

Li. 1. c. 142.

Vires.

Emble. 139. li. 3. Diosc. Lib. 7. sim.

Lib. 3. c. 67.

Ex minimis nucibus nulli datur esca salubris, sed etiâ experiētia docet. Etenim pueri cū Augusto mēse Nucs Auellanas auidē deuorāt, facilē indysenteria incidūt: bilē enim augēt, inquit Marth. Oleū nucū istarū destillationes efficacissimè cōcoquere idē tradit, & articulorum dolores inunctū leuare. Adhæc putamina ipsarum cruda in puluisculū trita, & ex vino

Lib. 1. Dio. cap. 142.

austero hausta drach. duarū pondere, diarrhœā cohibere, & alba fœminarū profluua. Verū ad id, ac etiā ad mēses cohibēdos magis valere quidā affirmāt subruffam medullā quæ putamini intus inhærens nucleū ambit. Plutarchus scriptū reliquit, quoties Coryli nucula laquearibus appēsa cohærebit, scorpiū in domicilia nō irrepturū. Neque est omittēdū quod simplex rusticitas obseruauit, serpētē obtorpescere, quæ Coryli caudice vel furculo fuerit icta, & tādē emori. Sed Coryli virga magis quā alia ictus serpēs occiditur, quia cūea flexilis admodū sit, parti serpentis quā attingit validius incutitur, ac illiditur: ideoque spinę vertebra rūpit quas ferit. Sic natiuo suo motu serpendi anguis priuatus, fuga euadere non potest, & aliquanto post tum doloris cruciatu, tum inedia moritur.

STAPHYLODENDRON.

CAP. XXXV.

Hæc arbor, quę vt plerūque syluestres, sæpe fruticis tantū formam habet, Staphylodendrō Plinij à quibusdā esse existimatur. Matthi. scripsit quibusdā in locis Pistaciorū syluestriū nomine cuiusdā arboris fructus appellari, quā Plinius Staphylodēdrō vocat, & si à pistaciis hgura saporeque plurimū dissideāt. Scaliger ad Pistaciorū species refert. Tragus Nucē Vesicariā & follicularē appellat. Quidā, inquit Dodon. Pistacium Germanicū: fructus ipsius Germ. *Pimpernuszle*, vocāt. Gesnerus ait ab Italis quibusdā, vt Romæ, vocari *Sambucum Validā*. Anguillara *Albero de l'vua*, & quibusdā in

STAPHYLODENDRON.

locis *Pistacio saluaticho*. Arbor est humilis, foliis Sābuci, sed viridioribus, & tenerioribus. Mēse Maio flores albicātes, rotūdi, multiplices, sæpe quaterni aut terni emicāt, qui tādē in cauas abeunt vesicas. Autumno verò in ipsis maturis binę ternęque reperiūtur nucleę, Ciceris effigie maiores tamē in quibus subuirides includūtur nuclei, sapore dulces, sed nausēā mouētes. Pl. Est trās Alpes arbor, simillima Aceri albo materia, quæ vocatur Staphylodēdrō. Fert siliquas, & in his nucleos sapore Nucis auellanæ. Ex quibus verbis Plinij falsum esse perspicitur quod multi cōtēdūt, Staphylodēdrō istud Plinij Colyteā esse Theoph. quæ folio est Salicis, ramosa comosāque, atque magna prorsus arbor, fructū in siliquis leguminū modo gignēs, latis nō angustis: semē inclusum paruū, durum modicē, nō multum pro siliquæ magnitudine. Quæ omnia diuersa sunt à Plinij Staphylodēdro. Verū cū Plinius, inquit Tragus, Staphylodēdrō siliquas ferre dicat, hæc verò arbor vesicas, nō video quo iure ex nuce vesicaria Sta-



Nomina

Lib. 1. Diof.
ca. 140.
Li. & c. 16.
In libr. 1. de
plan. Arist.
Lib. 3. c. 68.
Li. 6. c. 60.
In Hort.
Germ.

Forma.

Ibidem.

Ibidem.

Lib. 3. Hist.
cap. 14.
Ibidem.

phylodēdrō faciāt, nisi fortē per siliquas, vesicas intelligāt. Eandē arborē luculētē descripsit Scaliger. Apud Iesuates nostros, inquit, arbor est, è qua virga pacta, & adoleuit celerrimē, & effusis stolonibus frequentissimam circa se confecit syluā. Enodis, si qua alia, Oliuæ folio, simplici, aut Salicis frōdi proximo. E ramis folliculū demittit, qualē Halicacabus, durū tamē. In eo fructus cōdūtur bini terniue, esculenti, natura, colore, sapore Pistaciorū, sed orbiculatiore facie. Quare qui Pistaciorū arborē ignotā habeā, ex hac Pistaciorū medullam esitarim, an sit hæc ad Pistaciorū species referenda non ambigā? Nux vesicaria, inquit Tragus, quocunque in loco plantata facilē prouenit. Seritur autem nuculis, neque non furculis

furculis, seu stolonibus, qui quotānis è radice profiliunt, sicut & virgæ Cotoneæ Mali, & Coryli singulis annis fruticare cōsueverunt. Hi stolones Autumno aut vere incunte euulsi transplantari possunt. Crescit, ait Gesnerus, apud nos spōte in sepibus, quamvis rara, & videtur locum humidum amare. Frequentior, vt audio, circa Arouiam. Ex nuculis orbiculi precatorij fiunt.

Ibidem.

Trag. Ibid.

LABURNUM CAP. XXXVI.



ARBOR hæc fruticosa est, aut frutex arborefcens, inquit Solerius de Cytiso tractās, trium quatuorue vlnarum altitudine, caudice non admodum crasso, ramis hinc & inde diffusis. Nonnunquam fruticosa tantum spectatur (quia plerūmque cæditur, & Coryli modo ab imo caudice regerminat) stolones innumeros ab vna radice fundens, longos, rectos, ex viridi candicantes, Viticis virgis similes, ex quibus per certa interualla erumpunt folia terna, longo pediculo nitentia, Viticis foliis similia, læuia, supernè viridia, infernè candicantia. Ex ramis prope foliorum pediculos emergunt flores lutei, quales flores Genistæ aut Brassicæ, è longis pediculis inæqualiter dependentes, rarioreq; illa ac prælonga textura, cubitalem æquantes longitudinem, apibus ingrati. Floribus decussis succedunt cornicula, siliquæque, Pisorū hortensium siliquis similes, compressiores, fractu contumaces. In extremis ac nonnunquam intermediis spatiis continetur semen Lentis magnitudine, ex latitudine subrotūdum, imo loco qua siliquæ per petiolum hæret, tantillū excauatum, renis prorsus effigie, quod antequam maturuerit virescit, post maturitatem varium est, durum, & ob læuorem splendidum. Floret mēse Maio, & Iunij initio, deinde sensim siliquatur æstate, ac tandem durescit maturefcente vua, & circa calendas Octobris integrè perficitur. Hanc arborem Plinij Laburnum esse putat Dalechāpius. Alpina, inquit, est arbor, nec vulgo nota, dura ac candida

Forma.
In schol. in
Act.

LABURNUM.



materie, cuius florem cubitalem longitudine, apes non attingunt. Hæc quidem plantæ appictæ conueniunt, hodièq; de hac arbore à rusticis & montium incolis prædicantur. Natales eius in Alpibus, & montibus fermè omnibus Delphinatus, Sabaudia, Terræ cognomento nouæ, vmbrosis & syluosis locis, sæpius siccis, nonnunquam humidis. Ab eorum locorum indigenis voce ex Laburno detorta, *Albour*, & *Aulbour* nuncupatur, materia durissima, ac palis conueniente, natura apibus inimica. Matthiolus hanc arborem Anagyrin Diosco. esse existimat, primum scilicet eius genus, quod maius est, in Apulia frequentissimum, & eo Cāpaniæ tractu quo Terracina itur Fundos, ad Tyrrheni maris litus: foliis Vitici proximis, flore Brassicæ, racemoso, fructu hortensi Smilaci simili, amplioribus tamen, & breuioribus paulò siliquis incluso, colore purpurascente, vsque adeo duro, vt aqua maceratum duritiam suam pertinaciter seruet. Sed Anagyris Dioscoridis est perquam grauis odore frutex: Laburni nostri, nec flores, nec folia fœtent. Semen illius ἐν κερძοῖς μακροῖς, id est in corniculis longis: huius semen in corniculis breuib; Folia maiora latioraque habet quàm Anagyris, vt ostendemus cū veram Anagyrin exhibebimus. Præterea tria quæ

Tempus.

Nomina
Lib. 16. c. 18.

Li. 3. c. 149.
Dioscor.


Tempus. Nomina. Li. 3. c. 149. Dioscor.

Ibidem.

hodie huic arbori à Rusticis tribui diximus, quòd Alpina sit arbor, quòd materie dura, ideoq; palis apta, quòd flores eius apes non attingant, nullus, quod sciam Anagyridi, at Laburno certè Plinius tribuit, quæ hîc depictam arborem non Anagyrin, sed Labarnum esse testantur. In eadem sunt sententia Cordus, & Gesnerus, quam reprehendit Matthiolus. Laburni, inquit, materies à Plinio candida describitur, non contrà medullitus nigra, cortice tenuis lutea, modo Gaiaci, qualis Egheli materies cernitur. Ad hæc Eghelus arbor est omnibus ferè cognita, quod frequentissima in sylvis reperiatur, non ea quidem vulgo incognita, vt de Laburno refert Plinius. Iam verò Egheli Flores qui in arbore ramorum instar pendent, palmi longitudinem non excedunt, quos Laburno Plinius cubitales tribuit. Postremò, illud experientia compertum, quod apes Egheli flores non aspernantur. Hæc sententiam nostram labefactare, aut infirmare non possunt. Laburnum enim hîc Matthiolus accipit, quod secundum, seu minus Anagyridis genus ipse constituit, quòdque rura Tridentina vocant Eghelo. At quod Gesnerus Laburnum, quòdque nos intelligimus, primum est à Matthiolo positum ac depictum Anagyridis genus, vt ex pictura apparet, & quod maius appellat, vt paulo ante indicauimus. Huic omnia quæ adscripsimus optimè cōueniunt, minimè verò ea quæ secundo Anagyridis generi ipse adscripsit. Quod si nostra Gesnerique sententia Laburnum Plinij, sit ea arbor quam hîc proponimus, & quam Matthiolus pro primo Anagyridis genere depinxit. Cur non secūdum eiusdem Matthioli Anagyridis genus, alterum etiam Laburnū iure dicetur, cum similes natales habeat, foliorum figuram situmque similes, vires ferè easdem, materiam similiter duram? Maio & Iunio mensibus grato in montibus spectaculo floret. Micat enim aureo flore, primo Anagyridis siue Laburni nostri generi simili: folio est non foetente, nec ingrati saporis, Trifolij pratensis ferè. Huic cornicula prodeunt, Genistæ emula, in quibus semen continetur, feminis eiusdem Genistæ magnitudine, sed oblongum Phaseoli modo, colore subnigro. Quod si quando ignari pastores comederint, vti legumina alia, crebris magnisque vomitionibus adeo vexantur, vt testetur Matth. se vidisse qui ad sanguinis vsque reiectionem vomuerint. Materies ligni durissima, Gaiaci modo exterius lutea, interius nigra. Incorrupta diu durat: quare vinitores ex ea palos faciunt sustinendis vitibus aptissimos, quos & cæteris omnibus præferunt. Quin & sagittarij

Forma.

LABURNVM alterum.

Matth ibi.
Tempus.

Vires.

Vfus.

In Schol. in
Act.

ex ea validissimos arcus cōficiūt. Hac planta scatet Vallis Anania, ac vniuersus Tridentinus ager. Solerius certo & indubitato se scire scripsit Laburni Alpino- rum siccatum corticē in pollinē redactum, & drachma plus minus vna, ex quo- piam liquo- re potū, maximas vacuationes moliri. Verū diuersa ratione, quan- do quidem si ab infernis ad superna procedendo corticem euulsum porrigas, vomitum, sin verò à supernis ad inferna descendendo, per alium deiectiones insignes mouebit. Quod si quis obstinatè Matthioli sententiā tueri malit, hoc saltem optimo iure mihi tribuet, & concedet, primum Laburnum Anagyrin Alpinam esse, atque fortasse etiam secundum Anagyridis Alpinae speciem.

A N A

ANAGYRIS CAP. XXXVII.



ANAGYRIS Latinis, vt ἀνάγυρις & ἀνάγυρος Græcis dicitur, Gallis Bois **Nomina**
puant, Italis Anagiri, Arelatensibus Pudis. Frutex est aut arbuscula, ra-
mulis tenuibus, in quibus folia terna semper, Vitici similia flores
lutei, & pallidi, Brassicæ haud absimiles, quibus succedunt siliquæ
longæ, semen continentes durum, compressum, Phasiolorum figura, sed mi-
nus. Tota planta fædo est & ingrato admodum odore. Dioscoridi Anagyris
frutex est arboris instar, per quam grauis odoris, foliis Viticis, virgisque, flore **Li. 3. ca. 149.**
Brassicæ: semen in corniculis gignit, subrotundum, firmum, versicolori facie,

ANAGYRIS

Dodonæi.



ANAGYRIS

vera ex agro Arelatensi.



simile renibus, quod durefcit vua maturefciente. Anagyris Plinio, quam aliqui
Acopon vocant, fruticosa est, grauis odore: flore oleris: semē in corniculis non
breuibz gignit, simile renibus, quod durefcit per messes: in quibus cum Dio-
scoride consentit. Neque enim multum refert, an per messes, an vua mature-
fciente semen durefcit. Ex his perspicuum est veram esse Anagyrin quam hīc
exhibemus, quæ tetro suo odore ita se prodit, vt nullum vnquam in eam inci-
disse putem (maximè consentientibus cæteris notis quas ex Dioscoride & Pli-
nio tradidimus) qui non Anagyrin esse sibi ipse persuaferit. Inde natum pro-
uerbium, Anagyrin commouere, in eos dici solitum, qui sibi ipsis malorum au-
ctores sunt, quique in suam perniciem aliquem irritant. Eandem ob causam
sunt qui Anagyrin à Plauto Nauteam vocari putant, sed auctorem non habent.
Nauteam porro herbam grauem esse scribit Festus, qua coriarij vtuntur, à naui,
quasi Nauseam dictam. Matthiolus duas alias Anagyridis species depinxit,
quas non Anagyridis, sed Laburni species esse iam demonstrauius. Anagyris
locis incultis prouenit, prope Arelaten, paludosis, vnde hæc collecta, & ex
viua planta depicta. Aprili & Maio mense floret. Septembri fructum parit, Au-
tumno perficit. Tenera eius folia trita, inquit Dioscorides, tumores illitu repri-
munt: si partus hæreat, & secundæ mensesque morentur, drachmæ pondere bi-
buntur

Lib. 27. c. 4.

In cap. 149.

Lib. 3.

Locus.

Tempus.

Li. 3. ca. 139.

Vires.

buntur in passo: sic & suspiriosis dantur, & contra dolores capitis in vino. Difficulus parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Radicis, cortex concoquendis discutiendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciet. Hæc Dioscorides: In quibus verba ista, Radicis cortex concoquentis, &c. aliter vertit Ruellius quàm Græca significant: τῆς δὲ ῥίζης χυλὸς διαφορεῖται, καὶ ἐκπέσσει. Id est radicis succus discutit, & concoquit. Plinius: Folia collectionibus imponuntur, difficulterque parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Quod si fœtus emortuus hæreat, & secundæ mensesque morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo folia. Sic & suspiriosis dantur, & in vino vetere ad phalangiorum morsus. Radix discutiendis concoquendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones facit. In his Plinius in quibusdam à Dioscoride dissentit: illi enim radix, huic radicis succus discutit & concoquit, Galeno & Oribasio radicis cortex. Nisi quis dicat quod Plinius simpliciter de radice, Galenus de radicis cortice dixerit, fieri posse ut in Dioscoride τῆς ῥίζης φλοιὸς, & non ῥίζης χυλὸς legendus sit. Quod verò sequitur multo maioris est momenti. In vino vetere folia dari ad phalangiorum morsus Plinius ait, Dioscorides πρὸς τὴν κεφαλαλγίαν συνὸν οἶνον, id est ad capitis dolorē in vino, ita ut vox φαλαγγίων pro voce κεφαλαλγίαν in Plinio supposita sit, aut in Dioscoride pro κεφαλαλγίαν voce, τὰ φαλάγνια legere oporteat. At certè verisimilius est in Dioscoride τὰ φαλάγνια pro κεφαλαλγίαν legendum esse. Quid enim Anagyridis folia quæ subacria sunt, excalfaciētisque ac incidētis facultatis ad capitis dolores valere possunt? Procliuius quidē fuit, ut vox κεφαλαλγίαν in Dioscor. pro τὰ φαλάγνια supponeretur, quam ut Plinius τὰ φαλάγνια pro κεφαλαλγίαν verteret. Galenus de Anagyridis natura hæc scripsit. Anagyris frutex est grauius oleus, & digerentis excalfaciētisque facultatis. Sed folia etiamnum virentia cū propter humiditatis admistionem minùs sint acria, idcirco tumentia reprimunt. At resiccata incidentis sunt, excalfaciētisque facultatis. Similem ferè facultatē habet radicis cortex. Semen autem magis subtilium est partium. Sed & vomitum prouocat. Eadem omnino Oribasius quoque habet.

RHUS CAP. XXXVIII.

Nomina
Li. 24. c. II.

Forma
Li. I. ca. 124.

Lib. I. Dio-
scor. c. 124.
Embl. 121.
Li. I. Diofc.

Ibidem.

Rhus, & Hippocrati ῥόος dicitur à colore coccineo acinorum: ῥῆς enim ἐρυθρὸν interpretatur, unde Ruffus vox Latina, & Roux vulgo Gallicum, nobis Rhus, vel Rhos: Latinum enim nomē nō habet, ut scribit Plinius, cū in vsum pluribus modis veniat. Tamen Theodorus, quæ est fatalis eius audacia, Fluidam interpretatur, nomen illi à ῥέω positum fuisse existimans, Arabes vocant Sumach, Adurion, Rosbar Sadisticos, seu Rosaidicos, Itali Rhu, & Sumacho, Hispani Sumach, & Sumagro, Germani Gerberbaum. Rhus arbuscula est siue frutex hominis altitudine, vel binum ferè cubitorum, ut ait Dioscor. ramis multis, foliis oblongis subrubentibus, binis ex aduerso sitis, in ambitu ferratis Illicis modo, id est τὴν περιφέρειαν ἐν ἐξοχῇ μὲν περὶ δὲ σῶμα, ait Dioscor. quæ postrema vox à Ruell. & Marcel. interpretibus omissa est, nescio qua ratione, inquit Matthiol. cum non modo eam quoque legat Oribasius, sed quod etiam Rhus foliis pulchrè Illicem æmuletur. Cornarius verò Latine reddit, circūcirca velut ferra incisa, nō enim περιφέρειαν, id est Illicis modo, sed περιωνοφδῶς, id est velut ferra, legendum censet. Fructus Rhos racemis paruis similis est, densus, magnitudine Terebinthi, quadantenus latus, corticosa tunica perquam vtili. Sic enim legitur in publicis Dioscor. exemplaribus, ὅτι τὸ περιεμεινῶν φλοιῶδες ἐστὶν ὡς χρῆται. At postremæ vocis loco Cornarius legit ἀχρηστον: id est inutile, vertitque, cuius circumdatus ipsi cortex inutilis est: nullum enim eius vsum in sequētibz præscri

RHVS.



præscribit. Theophrastus hanc plantam depinxit his verbis, Græca ego adscribam, quia in vulgatis exemplaribus integra non sunt, nec Gaza interpret omnia reddidit: τῆς δὲ ῥῆς τὸ μὲν ἄρρεν, τὸ δὲ θῆλυ χαλδοί, τῷ τὸ μὲν ἀχαρπον εἶναι, τὸ δὲ χαρπικόν. ἔκ' ἐχ' δὲ ἔ' δὲ ἔ' δὲ ῥάβδος ὑψηλὰς, ἔδ' ἐ' παχείας. φύλλον δὲ ὁμοιον πτελέα, πλὴν μικρόν, καὶ ὡρομηκέσπον, καὶ ἐπιδασύ. τῶν δὲ κλωνίων τῶν νέων ἐξ' ἴσ' τὰ φύλλα εἰς δύο, χαλδῶν δὲ (pro χαλδῶν, δε.) ὅκ' τῶν πτερίων, ὥς ε' τοιχεῖν. βάπτισι ἃ ἔ' οἱ σκυλοδέσαι τὰ λυκά δέρματα. ἄνθος λευκόν, βορυσώδες, ὃ χήμαλι δὲ ὀλόχερες, ὅς τινας ἔ' χον (ὅς τινας habent nostri Codices) ὥσπερ ἔ' ὁ βότρυς. ἀπανθή- (ἀνθος δὲ, ὃ χαρπὸς ἄμα τῇ σταφυλῇ ἐρυθραίνε'), καὶ γί- (γον') ὅιον φακοὶ λεπτοί, συγκείμενοι. βοτρυδὸν δὲ τὸ χήμα καὶ τέτων. ἔ' χ' δὲ φαρμακῶδες τὸ τὸ δὲ καλεῖται ῥῆς, ἐν αὐτῷ ὅς ὡδες, ὃ ἔ' τῆς ῥῆς διητημύνης ἀπέχ' πολλὰ χ' ῥίζα δὲ ἐπιπόλαιος, καὶ μενοφυῆς, ὥς ἀνα- σκάπτεται ῥαδίως ὀλόρριζον. τὸ δὲ ξύλον ἐντεριώνην (hic deest, ἔκ' ἐχ' δὲ) ἄφθαρτον δὲ κοπιόμην. ἐν πᾶσι δὲ γίνε' τοῖς τόποις. ἐνθ' ἵν' ἃ μάλιστα ἐν τοῖς ἀργιλώδεσι. Id est, Rhus alia mas, alia foemina: hæc sterilis:

Cap. 18. lib. 3. Histor.

illa fructifera: neque virgas rectas, neque cras-

Lib. 13. ca. 6

fas habet: Folium Vlmi simile, sed paruum, oblongius, pilosum (sic Plinius ἐπιδασύ interpretatur, Gaza densum aliquantulum.) Ramulorum nouellorum folia paribus spatiis bina disposita coniugatim ex lateribus ordine seruato prodeunt. His pelles albas inficiunt (vel spissant,) qui coria condepfant. Flos est albus, racemosus, figura rotundus, cinnis, seu villis, vuae modo capillatus. Flore delapso, fructus cum Labrusia rubescit, aceruatis veluti lentibus multis, ac tenuibus, congestus, racemi quoque figura. In eo fructu osseum medicamentum est, etiam Rhu vocatum, quod dum vua colatur à carne separatum, huc illuc abscedit. Colatur vua, succus vt exprimatur acore grato commendatus ad ciborum condimenta, qua de causa Rhu, obsoniorum vocant. Radix per summa cespitum hæret, simpléxque est: quamobrem cum integra radice facile arbor effoditur. Lignum sine medulla est, cæsumq; non corrumpitur. Nascitur in omnibus locis, sed in argilosis potissimum luxuriat. Hæc Theophr. quæ omnia si non satis rectè expressero, conatum meliora ea faciendi æqui bonique consulant lectores. Plinius non omnia transcripsit, quædam veluti obscura transi- liens. Etiam Rhus Syriæ, inquit, mascula fert, sterili foemina, folio Vlmi, paulo longiore & piloso, foliorum inter se semper contrariis pediculis, gracili breuiq; ramo. Pelles candidæ conficiuntur iis. Semen Lenti simile, cum vua rubescit, quod vocatur Rhus medicamentis necessarium. Plinius alibi tria Rhois vide- tur fecisse genera. Nam & herba est sylvestris, inquit, foliis Myrti, cauliculis breuib, quæ venena & tineas pellit. Est & frutex coriarius subrutilus, cubita- lis, crassitudine digitali, cuius aridis foliis coria vt Malicorio perficiuntur. Et paulopost. Rhus quæ Erythros appellatur, frutex est, & huius fruticis semen vim habet adstringendi, refrigerandique. Aspergitur pro sale obsoniis, Al- uos soluit, omnesque carnes cum Silphio suauiores facit. Quo in loco hallu- cinatus esse videtur Plinius, cum de coriario priuatim scripserit, ipsumq; diui- serit ab eo, quo in ciborum condimentis antiqui utebantur. Quamuis enim

Lib. 3. ca. 6.

Li. 24. c. 11.

Lib. 1. Dio- scor. c. 124.

apud

apud medicos, præsertim apud Galenum, tum alibi, tum maximè libris τῶν ῥῶν ῥοῖς, multa sint Rhois nomina, vt qui Syriacam appellent, Ponticam, Rhoem obsoniorum, coriariam, rubram, tamen non sunt hæ plantarum quæ genere vel specie differant appellationes, cū vnum sit duntaxat Rhois genus à Dioscor. descriptum. Sed hoc animaduertendum, ῥῶν ἐπὶ τὰ ὀψα, id est Rhoem obsoniorum, nihil aliud esse quàm semen fruticis, at ῥῶν βυρσοδέφυκον, id est Rhoem coriariorum, folia & ramusculos eiusdē. Rhus quæ obsoniis aspergitur, Dioscoridi semen est coriarij fruticis. Galen. Rhoē coriarij ad desiccandas, & adstringendas pelles vtuntur, propterea coriaria appellata est. Porro medicis in vsu est in primis fructus eius, ac succus, multum austeræ qualitatis. Rhus rubra dicitur semen eius immaturum, maiore astringendi vi præditum quàm vbi maturuit, acinis quodammodo nigricantibus. Syriaca & Pontica à regionibus in quibus nascitur, quemadmodum Iberica, & Italica dici potest. At Plinium errore liberat Cornarius, loco ex veteris manuscripti Codicis lectione emēdato, quo cum de Rhoē frutice coriario tractasset, mox subdit. Rhus quæ Erythros appellatur, semen est huius fruticis. Vim habet astringendi refrigerandique. Aspergitur pro sale obsoniis aluo, soluta, omnesque carnes cum silphio suauiores facit. Quantum ad Theophrastum attinet, ex eius verbis intelligi minimè potest, alteram esse Rhoem obsoniis, alteram coriis destinatam. Cum enim eam sexu tantum discreuisset, vtrāque coria alba spissari tradit. Quare non immerito reprehendendus Fuschius, qui cū duo Rhois in vniuersum genera esse tradidisset, quod Græcis μαγδαλόν, id est Culinarium nominatur, alterum βυρσοδέφυκον, id est coriarium, subiunxit Galenum, Nicolaum Myrepsum, & alios Syriaci etiā Rhois mentionem facere, qui à duobus supradictis differat, sitq; peculiaris cuiusdam Syriacæ arbusculæ succus. At Rhus Syriacus, vt rectè Cornarius annotauit, nihil aliud est quàm Rhus qui in Syria prouenit, succus autem Rhois qui ex Syria defertur, idem est cum Rhoē culinario, & coriario. Syriacus verò propterea dictus videtur, quod in Syria multus proueniret, velut ex Plinio apparet, qui Rhois Syriacæ plantæ ad pelles conficiendas commodæ, semen, quod Rhus vocatur, medicamentis necessarium adscripsit. Denique Rhoem obsoniorum, siue rubrum, siue culinarium, & Rhoem coriariorum eandem planè esse plantam, Paulus paucis, & apertè declarauit: ῥὸς τῆς βυρσοδέφυκῆς καλεμύνης τοῖς ἰατροῖς, ὁ καρπὸς μάλιστα, καὶ ὁ χυλὸς εἰς χρῆσιν ἡκιστίν, ἱκανῶς ὅντες τυπτικοὶ μὲν, καὶ ξυραντικοὶ ἐκ τῆς τελευτῆς τῆς ἡμέρας, ψυκτικοὶ δὲ τὸ διὰ τέρους id est: Rhois coriariæ à medicis dictæ fructus & succus magno in vsu sunt. Abundè enim astringunt, & siccant, ordine tertio, refrigerant secundo. Quare toto cælo errāt, qui Rhoem Syriacū à Celso Mannam intelligi arbitrantur, pharmacū aluo leniter soluendæ aptum, quod ex Syria adfertur, cū nihil aliud sit Rhus Syriacus, quàm Erythros siue ruber, siue coriarius, & apud eum non ros, sed Rhos, siue Rhus Syriacus legi oporteat, sicut etiam apud Columellam non Rorem sutorium, sed Rhoem Syriacum legendum est, cum Syriaci appellatio Latinis vsitata sit, vt Græcis familiaris, & recepta. Neque enim sutorium à sutorum siue coriariorum vsu ipsum dixisse noua appellatione efficta credere par est, veluti quidam somniarunt: neque etiam Rosmarinum paulo post legendum est, veluti recens edita exemplaria habent. Nam alio in loco idem Columella in conditura ex Cydoniis, Rhois Syriaci contriti & cribrati heminam habet, de quo adeo in huiusmodi pharmaca ac condituras addendo etiam Galenus egit. Habetur tamen apud Marcellum medicum Rhus marinus, siue Rhus orientalis, dysentericis tritus propinandus ex vino, vt etiam apud Columellam Rhoem marinum legere possis, non rorem. Libet verò credere eundem Rhon, siue Rhoem à diuer

Li. 8. simpl.

Embl. 121.
li. 1. Diosc.Matth. ibi.
Li. de com.
med.
Li. 6. med.
part.In lib. 6.
med. part.

Lib. 7.

Crinit. lib.
7. de hon.
discipl.

Lib. 9. ca. 13.

Lib. 12. c. 41.

Li. 6. med.
part.

à diuersis locis in quibus prouenit tam varias appellationes sortiri, cum etiam Eupatoricam & Ponticam Rhun (est enim generis cōmunis) Damocrates probet. Rhus nascitur in petris Diosco. auctore. Nascitur in Italia, inquit Matthi-
 lus, Apennino monte pluribus in locis, cuius aridis foliis hircorū caprarumq; pelles concinnantur, quas vulgo Somachi vocant. Aspergebatur olim pro sale obsoniis, vt scribit Plinius, & Dioscor. *ῥῆς ἐπὶ τὰ ὄψα*. Quod ita accipit Matthio-
 lus, & plariq; alij, ac si pro sale antiqui in condimentis vterentur, quem eius vsum apud Syros & Ægyptios, vbi Rhus præstantior prouenit, etiamnum ho-
 die durare aiunt. Cornarius verò non satis sese intelligere dicit, an is fuerit eius feminis vsus, vt salis locum obtineret. Is enim obsoniis aspergi solitū arbitra-
 tur in fluidis affectionibus, maximè cœliacis, ac dysentericis astringendi gra-
 tia, non pro sale, sed cum sale, velut hodie in Saxonia magna, in omnibus ferè eduliis ac obsoniis farina auenacea crassior, quam ipsi Gorte vocant, vna cum sale aspergitur. Vires Rhois medicas has esse scribit Dioscor. Folia vim habent astringendi, & Acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat: dysente-
 ricis infunditur, & in potus eorum infususq; adiicitur: instillatur auribus puru-
 lenti. Gangrænas & pterygia folia cohibent, ex aceto aut melle illita. Ligua-
 mentum fit ex aridis foliis, ad crassitudinem mellis, in aqua decoctis, eadem cū lycio facultate. Semen eosdem effectus exhibet: cœliacorum dysentericorumq; obsoniis aspergitur: fracta desquamata, liuidaq; illitum ex aqua ab inflamma-
 tione vindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit: candida fœminarum profluvia sistit: hæmorrhoidas sanat, cum Querneo carbone intrito admotum. Aqua in qua semen maduit, decocta cogitur, coitq; , efficacior quodammodo ipso semine Gummi defert, quod dentium cauis imprimitur ad dolores finien-
 dos. Galenus. Rhus fruticosa planta astringit & desiccatur. Nam & coriarij ad de-
 siccandum & astringendum planta vtuntur, ac proinde *ῥυσοδεύων*, id est coria-
 ria nominatur. Porro medicis in vsu sunt imprimis fructus eius, & succus, mul-
 tum austeræ qualitat. Consentaneus est vsus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit itaque & hoc medicamen ex tertio ordine exiccantium, ex secundo verò refrigerantium. Medici, inquit Plinius, Rhoicis vtuntur ad contusa: item cœlia-
 cos, & sedis vlcera, aut quæ phagedænas vocant, tritis cum melle, & illitis cum aceto. Decoctum eorum instillatur auribus purulentis. Fit & Stomatice decoctis ramis ad eadem quæ ex moris, sed efficacior, admisto alumine. Illinitur eadem hydropicorum tumoribus. Galenus etiam Rhois succum Stomasticis admiscet:
 & apud eundem Damocrates in confectione ex capitibus papaueris ad fluxio-
 nes & vigilias. Quæ Rhois species ab herbariis esse putantur, subiungēdæ. Pri-
 mæ hic propositæ, Rhus à Plinio is primo loco ponere videtur. Nec Rhus Lati-
 nū nomē habet, inquit: nā herba est sylvestris, foliis Myrti, cauliculis breuib. quæ venena & tineas pellit. Quidam etsi fruticem istum ab ea Pliniana Rhoe
 notis aliquot discrepare aperte videant, vt mox dicetur, tamen quia multis aliis Rhois naturam & figuram refert, malunt eo nomine depingere, quàm (sicut in plurimis aliis fecimus) ambitiosius & curiosius de nominibus altercando tem-
 pus terere. Frutex igitur ad hominis altitudinē adolefcit. Caule est crassitudi-
 nis pollicaris, fragili, cauo Sambuci modo, cortice cinereo, maculoso, membra-
 na rufescente subiecta, paribus interuallis in nodos quosdam intumescēte, à quibus furculi siue ramuli prodeunt, lenti, & flexiles, in quibus folia sunt, æqua-
 libus spatiis bina, aduersum disposita, Myrto sylvestri & latifoliæ omnino si-
 milia, aliquantò ampliora, venosa, altera parte rubescentia. Flores purpurei in summis virgis hinc illinc nascuntur: fructus nigri è tenui pediculo pendent, aliquantum compressi, veluti striis quibusdam comaliculati, fibris quaternis

Lib. 7. med. part.

Locus.

Ibidem.

Lib. 1. Dio-

scor. c. 124.

Li. 24. c. 11.

Ibidem.

Embl. 121.

lib. 1. Diosc.

Vires.

Li. 8. simpl.


Li. 24. c. 11.

Li. 6. med. part.

Li. 7. med. par.

Li. 24. c. 11.

discreti, sapore acerbo: semen intus album rugosum, vinaceis simile. Ergo florum & fructus congerie, eiusdem sapore, foliorum effigie cum Rhois natura & Pliniana descriptione satis conuenit, nisi fruticis proceritate, causis crassitudine, ramulorū longitudine discrepare videretur. In sepibus agri Monspelienensis,

RHUS sylvestris Plinij.*RHUS sylvestris altera.*

Lib. 6. c. 12.

pingui, densoq; solo prouenit. Rhus sylvestris Dodonæi, & Plinij Rhus altera videtur esse plāta, quā alij Myrtum vocant, alij Pseudomyrsinē, & Myrtum Brabanticā, Germani, *Gagel*. Humilis ea est, lignosa, dura, surculis multis, in quibus folia longiuscula, Buxi arboris foliis satis similia. Inter surculos ramuli exoriuntur multas veluti spicas ferentes, primū flosculis multis onustas, deinde seminibus multis cōgestis, angulosis, pingui quodam liquore refertis, saporis foliorum, florum, fructus, surculorum amarissimi, sed odoris iucūdi. Rhotomageneses in quorum agro plurimus hic frutex nascitur per saltus herbidos, & vligine madentes, vocant sua lingua *Piment Royal*, quasi *Melissophyllum regium*. Rustici æstate surculos foliosos & seminibus onustos, in manuales fasciculos collectos vendunt, non ad alium vsum, quam vt vestes odoris suauitate commendent, & à rodentium vermiculorum noxa custodiant. Sapor tamen egregiè amarus insignem habere vim siccandi & discutiendi monstrat, sed præsertim valere tam sumptum quàm admotum ad lumbricos necandos, & pellendos.

Locus.

Vires.

Tempus.

Maior mense & Iunio floret, Iulio & Augusto fructum perficit.

ZIZIPHVS CAPPADOCICA CAP. XXXIX.

Lib. 21. c. 9.

Nomina




Æc arbor Ziziphus Cappadocica à Plinio nominatur, ex cuius odorato flore olearū flori simili coronæ nectebantur: quibusdam arbor Paradisæa, ob floris odorem suauissimū, quod nomen aliis etiam tribuitur. Sunt enim qui Thuiam odoratam, arborem Paradisæam etiam vocent, vt diximus. Crescit hæc Ziziphus ad Salicis magnitudinem, radicibus multis nixa, crassis, circumquaque sparsis, locique multum occupan

ZIZIPHVS

Cappadocica.

& exucca, qualis est Baccarum Oxyacanthæ cū maturuerunt. Huius arboris taleæ excisæ, & in terram defixæ facillè comprehendunt, & radicantur, Salicis modo. Amatus Lusitanus hanc arborem Salicem esse Amerinā videtur existimare. Bellunenſis Auicennæ interpretis, Chalef arborē describit, specie Salicis,

*OLIVA Boemica, siue
Elaagnus Matthiol.*



occupantibus, summa terra vagis, Stolones multos gignentibus, qui nisi putentur matrem emaciant, & tandem enecant, putati verò & depacti viuunt, & arborescunt. Cortex albicat, in stipite valdè rugosus & crassus, in ramis tenuior, & molli quadā lanugine obfusus. Porro in multos & lōgos ramos arbor finditur, in quibus lōgæ validæq; per interualla spinæ. Folia cādida, oblōga, Oleæ, Saliciue similia, densa, multaq; in furculis. Flos hians aureus, in sex cuspides dissectus, priusquam dehiscat in Alabastrum fastigiatus, ex viridi candicans, paruus, Rhamni secūdi nostratis, aut Mali Citriæ figura, veluti flosculis cōsertis pendulus, ternis ferè simul ad imam foliorum partem emicantibus, odoris iucundissimi, mea quidem sententia suauitatem Mali Citriæ, quæ summa nobis habetur, superantis. Fructum fert, paruam scilicet baccā, Oleastro similem minorem, breuissimo pediculo nexam, viridem, & qua parte solem magis excipit, rubescentē, lanuginoso quodā puluisculo tectam, gustu subacido, carne valde sicca

in locis humidis nascentem, foliis Cerasi: quæ arbor fructum non fert, sed flores valde odoratos, veris initio, antequam folia prodeant. Ex quibus floribus in Syria destillatur aqua suauis odoris, qua frequēter vtūtur in cordis morbis calidis. Ex iisdē in oleo maceratis fit oleum Chalef, nō aliter quam violaceum. Ex iis etiam permixtis cum Amygdalis, quoad eorum odore & humore imbuta fuerint, exprimitur oleum, quod etiam oleum Chalef nominatur. Id Arabum Chalef, quidam Ziziphum hīc à nobis descriptam esse putant, sola, opinor, in vtriusque flore odoris gratia & suauitate moti. Nam alioqui magnum inter has arbores reperio esse discrimen. Ziziphus enim hæc nostra editis iam foliis floret, Chalef ante foliorum exortum: hæc baccis grauari solet, illud fructum nullū profert. Verum tamen nō dubito, quin ex huius Ziziphi floribus in operculata concha prestantissimi odoris aqua stillare possit, oleumq; ex iisdem cum Amygdalis tritis parari, eo modo quo ex Be'llunensi recitauimus, odoris fragrantia

Lib. I. Dioscori. ca. de Vitice. Chalef arbor.

Vires.

Locus. præcellens, ac pretiosum. In natali humo sylvestris hæc arbor, à Lugdunensibus quibusdam in hortis colitur, huc olim, vt narrant, Rhodo, à quodam Equitum Rhodiorum procuratore translata, priusquam ea insula in Solimani Turcarum Imperatoris ditionem venisset. In horto etiam Cænobij D. Irenæo sacri id genus arbores aliquot lætissimæ visuntur. Matthiolus nomine Oliuæ Boemicæ, siue Elæagni pictam dedit. Nascitur in Boemia, inquit, fruticosa, folio Vitici simili, molli, ac lanuginoso: flore albo ex virgis ordine propè foliorum exortum prodeunte, odore non insuavi, ex quo nullus provenit fructus. Huic alia per omnia similis visitur Viennæ in horto Cæsaris Ferdinandi, quæ baccas proferr Oleæ figura, sed minores, apice in summitate aculeo simili. Hanc Elæagnum appellarem, quod folio ac virgis Agnum, fructu Oleam referre videtur.

CERATONIA CAP. XL.

Nomina
Li. 7. simp.

Forma.
Marth lib.
1. Diosc. ca.
330.

CERATONIA quasi cornuta siliqua arbor hæc à Galeno & Paulo vocatur, fructus κεράτιον, à Latinis Siliqua, & siliqua dulcis, ab Arabibus *Charnub*, ab Italis *Carobe*, & *Carobole*, à Gallis *Carouges*, ab Hispanis *Alcarobas*, à Germanis *S. Ioans brot*: Boemis *Suuatheo*, & *Ianachleb*. Græci recentiores *Xylocerata* vocant. Arbor in magnam satis proceritatem attolitur, cortice cinereo in cæruleum inclinâte, vt in Loto arbore, ramis in latitudinem potius quâ longitudinē expâsis: foliis

CERATONIA.



Tempus.

Lib. 15.
Geog.
Locus.

Ibidem.

eo positis ordine quo in Fraxino, latioribus tamen quâ in Fraxino, durioribus, rarioribus, magis circinatis, supernè ex fusco viridibus, infernè dilutæ viriditatis. Floret Ceratonia hyemis fine, aut vere iam appetente. Fructum profert æstate & Autumno. Fructus Siliquæ sunt latæ, compressæ, aliquando pedem vnum, aut eo plus longæ, quæ semen continent amplum, latum, etiam compressum, Castaneæ colore. Hæ recètes ab arbore decerptæ gustui sunt ingrata, sed diu in cratibus siccate adeo mitescunt, vt & dulces fiant, & gustui suaves. Præter semen, melleum intus succum habent. Eo potissimū refertæ sunt in Oriente provenientes, quo Indi & Arabes Zinziber, Myrobolanos, Myristicas nuces, aliæq; aromata condiunt, vt testatur Strabo de Indicis arboribus scribens. Arbor hæc amat loca maritima, calida, sicca, campestria. Multum hæc cognita Niceæ & maris Ligustici accolis, vbi eam esitant pueri, etiamq; porci. Nascitur & in agro Neapolitano, inquit Matthio. præ-

fertim in Apulia, ac etiam in Campania. In via Appia frequentissima conspicitur. Incolæ Salequa vocant, nomine à Siliqua detorto. De Siliquis hæc pauca Plinius. Haud procul abesse videantur, & prædulces Siliquæ, nisi quod cortex in iis manditur. Digitorum hominis longitudo illis, interim falcatis, pollicari latitudine. Idem aliquanto post. Cùm in pluribus semina placeant, in Siliquis damnantur: Idem in Siliquis vetò, quod inquit manditur, quid nisi lignum est? non omittenda seminis earum proprietate. Nam neque caro, nec lignum, nec cartilago

Li. 15. ca. 24.

cartilago dici potest, neque aliud nomen inueniat. Longe alia est Siliqua quam Ceroniam vocat Theophr. Ceronia, inquit, fructum ex ramis producit, non tamen copiosum. Vocat enim Ceroniam quæ Ficus quas Ægyptias vocant, producit. De illa Plini. Similis his Siliqua quam Iones Ceroniam vocant: trunco & ipsa fertilis, sed pomo Siliqua. Ob id quidam Ægyptiam Ficum dixere, errore manifesto. Non enim in Ægypto nascitur, sed in Cypro, Ioniaq; , & circa Gnidum, atque in Rhodo semper comantibus foliis, flore candido cum vehementia odoris: plantigera imis partibus, atque ideo superficie flauescens, succum auferente sobole. Pomo anteceditis anni circa Canis ortus detracto, statim alterum parit: postea florem, post Arcturum hyeme fœtus enutrient. Siliquarum de quibus hic agitur naturam breuiter exponit Dioscor. Siliquæ recentes stomacho aduersantur, aluum soluunt: eadem siccata sistunt, stomachoq; vtiores fiunt. Vrinam ciunt, sed præcipue quæ vinaceis condiuntur, vel, vt vertit Cornarius, maximè quæ vuarum retrimentis compositæ asseruantur: *μαλίστα δὲ τὰ ἐκ τῶν τεμνύλων σωτιθέμενα*. Sic enim seruari solent, velut etiam vuarum Ollares dictæ, itemque Oliuæ, ita vt vicissim & retrimentorum, & siliquarum aut vuarum, aut oliuarum compositio fiat. Has compositiones Dioscor. *τὰ ἐκ τῶν τεμνύλων σωτιθέμενα* vocat: *τέμνυλα* enim solidas vuarum in torculari expressarum reliquias, aut retrimenta appellari auctor est Galen. qui Siliquas in cibis damnat his verbis. Ceratia prauī succi sunt edulium, ac lignosum, quam rem necessario sequitur, vt concoctu sit difficile. Quinetiam incōmodum id ipsis inest, quod non celeriter deiiciantur. Proinde satius esset à regionibus Orientalibus, in quibus nascitur, ad nos non importari. Idē alibi. Ceratonia exsiccantis est, & adstringentis facultatis, sicut & fructus eius quem Ceratia vocant, non nihil etiam dulcedinis continens. Accidit autem istis simile quiddam Cerasiis. Nam si humida sumas, magis ventrem subducunt, sicca verò magis sistunt, vt pote cum humiditas absumatur, & quod essentia est crassioris tantum reliquum habeant. Siliquæ sicca, inquit Matthiol. etsi omnium consensu manifesto adstringant, certum est tamen earum decoctum potum mirificè conferre tussientibus, ob dulcem melleamq; substantiam quæ iis inest.

Lib. 3. Hist. ca. 23.

Lib. 13. ca. 8.

Lib. 1. c. 130.

Vires.

Embl. 127. lib. 1.

Li. 2. Alim.

Li. 7. simpl.

Li. 1. Diosc. cap. 130.

SILIQVA, SIVE CASSIA CATHARTICA.

CAP. XL I.



ΑΣΣΙΑ μέλαινα Græcè, hæc planta, Latine Cassia nigra dicitur. Medici, Seplasiariique, Arabum, à quibus inuenta est, sectatores, Cassiam Fistulam vocant, alij Cassiam solutiuam, alij Siliquam Ægyptiam, siue Catharticam. Italis *Cassia*, & vulgo *Cannela*, Germanis *Zimmet Roertim*, Hispanis *Canela*, Gallis *Casse*. Huius Siliquæ arbor inter proceras numeranda est, in India & Taprobana excelsissima, in Arabia & Ægypto mediocris proceritatis, radicibus magnis Iuglandis modo, cortice cinereo, materia solida, compactaque, cortice tenuis Buxei coloris, medullitus nigri, Ebeni, aut Gaiaci colore, quæ recens grauiter olet, sicca minime: folio est Siliquæ dulcis, sed maiore, & in acutum desinente. Ex ramis fructus fistulosus, siue Siliquæ pendent, densæ, sæpius pedes duos longæ, teretes, duræ, lignosæq; , pollicis crassitudine cum maturæ sunt, colore ex rubro nigricante. Nigrum dulcēque intus humorem concretum habent, non, vt in animalium ossibus, continuum, sed crebris, tenuibus, lignosisq; membranulis diremptum. In singulis loculis granum quoddam est durum, Siliquarum granis adeo simile, vt alterum ab altero internosci vix possit: hac de causa

Nomina

Forma.

Math. lib.

1. Diosc. c. 13.

*SILIQVA, siue Cassia
Cathartica.**Vires.*

fortassis errauere, qui has arbores congenere esse crediderint. Deligenda quæ ex Memphi, & Alexandria Ægypti aduehitur, Fistula insigni, plena, ob id graui, & recente, & quæ coccussa inclusis seminibus minime constrepat, splendente, foris ac etiam in pulpa pingui. Pulpa excalfacit, & humectat ordine primo: clementer & innoxie à ventriculo bilem & pituitam purgat leniendo, febribus inchoantibus confert, sanguinem hac ratione puriorem reddit, ac eius sanguinis ac bilis, flauæ acrimoniam frangit, aluum commodissime ciet, eiusque vis ventriculum non pertransit. Quare securissime datur à Medicis febribus inchoantibus, aliisque calidis morbis ante venæ sectionem. Resoluit thoracis & pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmonas, easque partes lenit ipsa morsus expers. Sitim sedat, præsertim sumpta cum succo Intybi, vel Cichorij, vel Solani arte defecato. Intemperiem denique renum calidam mitigat cum diureticis sumpta, & Glycyrrhizæ decocto, ob idque calculum in his gigni prohibet,


suntque qui affirmant eum à renum calculis, à ventriculi doloribus & apostematibus prorsus liberum fore, qui quotidie ante prandium tres pulpæ Cassiæ drachmas deuorauerit. Exterius illita erysipelata extinguit, cæterasque inflammationes quæ in cutem emergunt. Si viscera sunt sicciora, Cassiæ lubricitas augenda est oleo Amygdalarum dulcium: si debilia & lubrica sint, minuenda Myrobalanis vel Rhabarbaro, vel aqua cum Mastiche cocta, vel Spica addita. Si ad vias vrinarias ferri eam volumus, vrinæ enim difficultati mirifice auxiliatur, vretica misceantur. Sine tardius, aut imbecillius purget, veremur, acre aliquod, quale thymum, Hyssopum, actionem eius intendens misceatur, aut potius aliquot medicamentorum valenter purgantium. Efficacius autem purgat, si ex ferro lactis propinetur. Tam est benignum & innoxium hoc medicamentum, ut omni ætati, ipsis etiam pueris, & prægnantibus tuto sumatur. Salubre est sanis & ægris ad aluum clementer leniendam. Quouis tempore tuto sumitur, etiam initio epularum, aut paulo ante cœnam. Datur hodie pulpa Cassiæ cortice, membranis, & seminibus per cribrum purgata (recens enim sumenda potius, quam vasis asseruata) ab vncia dimidia ad fescunciam, vel drachmas decem, mane, vel ante cœnam. Sed paulo ante cibum duabus tribusue horis, etiam drach. duabus, tribus, quatuor datur his quibus est alius natura pigrior. In quem usum quibusdam iucundius est pulpam lata cultelli cuspide exceptam deuorare. Saccharo conditur recens ab indigenis ad eisdem usus, quam primum ostenderunt Veneti, & Lusitani, nunc etiam in Galliam sic condita aduehitur. Quam autem vim purgatoriam tribuit Manardus semini ipsius, maiorem scilicet, quam pulpæ ipsi, non recipiendum confirmat Musa, suo multiplici experimento. Quod præterea nonnulli Medici existimant huius Cassiæ corticem ad menses mouendos, ad partum iuuandum, ad remorantes secundas aliquid valere, absurdissimum est, cum de Cassiæ aromaticæ siue odoratæ corticibus id sit accipiendum.

STYRAX.

CAP. XLII.

VT Græcè *Σύραξ*, ita etiam Latine *Styrax* dicitur, Arabicè *Miha*, *Nomina*
Mehaha, seu *Astarach*, Italicè *Stirace*, Hispanicè *Estoraque* Officinis
Storax calamita. *Styrax* arbor est proceritate ac forma *Malo Coto-*
neæ similis, foliatamen longe minora profert, auersa parte albicā- *Forma.*
 tia, solida, oblonga, sed paulo latiore ambitu. Flos illi est albus Aureæ Mali si-
 milis. Baccas edit longo pediculo appensas, tenui quadam lanugine obductas,

STYRAX.



rotundas, in acutum desinētes, Nucis fere *Pō-*
ticæ magnitudine, in quibus aliquot conclu-
 duntur ossicula semen continentia. Ab hac
 manat liquor seu lacryma eiusdem nominis.
 Arbor est eodem nomine *Cotoneæ Malo* si- *Li. 12. c. 25.*
 milis inquit *Plinius*, succo prægnans lacrymæ
 exaustero, vel vt quidam legunt, dulcioris iu-
 cundioris: intus similitudo harūdinis: In hanc
 circa carnis ortum aduolāt pennati vermicu-
 li, erodentes: ob id scribe sordescit. Reperiun-
 tur arbores huiusmodi in Italia, non solum in *Locus.*
 hortis, ac viridariis, sed etiam sponte proue-
 nientes in Romano & Tiburtino agro. Viret
 & sylua iis arboribus, nō procul ab eo religio-
 so templo quod incolæ vocant *les Maries*, in
 Prouincia Romana Galliæ, verum gummi
 non emittunt. Proxima Iudææ Syria, inquit *Lib. 12. c. 25.*
Plinius, *Styracem* gignit, circa *Gabala* & *Ma-*
rathunta, & *Casium Seleuciæ* mōtem: Et mox:
Styrax laudatur post supradicta ex *Pisidia*, *Si-*
done, *Cypro*, *Cilicia*, *Creta*, minimè ex *Ama-*
no Syriæ medicis, sed vnguentariis magis.

Exit & in *Pamphylia*, sed aridior vel, vt quidam legunt, acrior, minúsque suc- *Lib. 1. c. 68.*
 cosus. *Styrax* auctore *Dioscor.* præfertur pinguis, flauus, resinofus, albicantibus
 grumis, quamplurimum in sua odoris gratia permanens, qui dum mollitur,
 melleum liquorem reddit, qualis è *Catabalis*, *Pisidia*, & *Cilicia* deuehitur. Sed
 non omittendum pleraque exemplaria habere pro *λιπαρός*, idest pinguis *ρυπαρός*,
 idest sordidus, quam lectionem secutus est *Ruellius*. Verum nostræ scripturæ
 suffragatur *Plinius*, qui pinguius lentum probat. *Colos*, ait, in quacunque na- *Ibidem.*
 tione præfertur rufus, & pinguius lentus. Et Idem alibi: Placet maximè pinguis
 purus, albicantibus fragmētis. Apud *Aetium* sæpe *ξανθὸς καὶ λιπαρός* probatur. Hęc *Li. 24. ca. 6.*
 etiam verba, *τοῖς τοῖς ὅ ἐστιν ὁ γαββαλίτης*, idest, talis autem est *Catabalites*, *Oriba-*
sus legit, *τοῖς τοῖς ὅ ἐστιν ὁ γαββαλίτης*, talis autem est *Gabalites*, quam lectionem
Marcel. approbat, subscribente *Plinio*, qui *Styracem* circa *Gabala* & *Marathun-*
ta gigni tradidit. Sed multum non refert, an *Catabalites*, an *Gabalites* rectiùs
 appelletur: natales enim *Styracis* loci multi sunt. Deterior *Styrax* niger, fufu-
 rosus, friabilis, canóque situ obductus, quæ verba canóque situ obductus, quo- *Li. 12. ca. 25.*
 niam in Græcis exemplaribus non leguntur, ea *Cornarius* in sua translatione
 omisit, sed à *Ruellio* adiecta sunt ex *Plinio*, qui sic scripsit. Deterior furfurosus,
 & cano situ obductus. Cæterum lacryma, inquit *Dioscor.* inuenitur gummi si-
 militudine, perlucida, & *Myrrhæ æmula* (siue id colore, siue odore sit intelligē-
 dum:) verum perpauca manat. Græci probatique auctores vnū tantum *Styra-*
cem agnoscunt. *Seplasiæ* hunc in siccum & liquidum distinguunt, cum *Styrax*,

Matt. ibid.

Libr. 1. de
antid.

Ibidem.

Lib. 2. cōp.
med.Lib. 9. Hist.
cap. 16.Ibidem.
Emble. 6.
Lib. 1. Dio.
Lib. 12.

Ibidem.

Lib. 1. ca. 68.

Ibidem.
Vires.

officinarum liquidus Myrrha Stacte sit multorum iudicio, nec Styrax appellari debeat. Siccus iisdem Sepalsis Storax Calamita dicitur, quæ appellatio ex Galeno sumpta videtur, quo loco paucissimum & optimum Styracem Calamiten esse indicavit, & tanto præstantiorem multo alio Styrace, quanto præstantius est vinum falernum, eo quod in cauponis venditur, eumque in calamis ex Pamphylia adferri, unde Calamitæ nomen. Addit ex hoc sumendum esse pallidissimum, ut qui & odore, & sapore validissimus sit. Porro videtur is esse Styrax, quem Dioscorid. Gummi similem, & paucum nasci scripsit. Itaque cum nullus sit Styrax hoc præstantior, consueverunt medici medicamēta præscribentes, quæ Styracem recipiunt, Calamitæ cognomen adiungere, ut intelligant pharmacopœi optimum atque præstantissimum Styracem requiri. Manardus etiam eadem appellationis ratione ductus, hæc Dioscorid. quæ in vulgatis exemplaribus leguntur, τοῖστος ὃ ἐστὶν ὁ χαλαβαλίτης, legenda esse censer, τοῖστος ὃ ἐστὶν ὁ χαλαμίτης, idest, talis est Calamites: sed Gabalites legi oportere iam docuimus. Præterea Fuchf. Styracem Calamiten liquidum fuisse existimat, non alia ratione fortasse fretus, quam quod in Calamis afferretur. At Styrax Dioscorid. lacryma est arboris, præstatque ille cæteris qui flavus est, resinofus, grumósque habet albicantes, & dum mollitur, melleam humiditatem reddit. Ex quibus constat Styracem hunc liquidum non fuisse, sed in grumos concretum: quin si Galeni tempore in calamis adferretur: id est, harundinum foliis obuolutus, non hinc effici necesse est liquidum fuisse. Neque enim aliam ob causam, opinor, Styracem calamis obtegebant, siue pro emporeticis inuolucris essent, ac Stegestribus harundinis sola folia complicata, & aduoluta, siue ex iis foliis textæ sportæ, quam ut eius odor conseruaretur, id quod in Creta factum fuisse ab iis qui Pictamnum legebant, testis est Theophrast. ne vis eius expiraret. Adhæc veteres Græcos nullam liquidi Styracis mentionem fecisse paulo ante diximus. Verum Calamitæ Styracis appellatio Plinium mouit imprudentem, ut harundinis similitudinem intus quādam esse traderet, quæ nulla prorsus intelligi potest. Idem Scolecitis nomine deceptus, vermiculis similis, fabulam finxit de pennatis vermiculis circa Canis ortum aduolantibus, & erodentibus. Strabo in Selga Pisidiæ vrbe, plurimum Styracem nasci tradit, arborem non magnam, rectam, ex qua hastæ Styracinæ Corneis similes fiunt. Idem etiam liquoris meminit, qui ex ea destillat, ac facile coagulatur, Succino similis. Styrax adulteratur, Plinio Cedri Resina, vel Gummi: aliās melle, & Amygdalis amaris, quæ omnia deprehenduntur gustu: Dioscoridi verò ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserunt, melle Irini sedimento, & quibusdam aliis. Ceram aut adipem odoribus imbutum alij fragrantissimis solibus cum Styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigidam aquam transmittentes, veluti vermiculos exprimunt, venundantque. Styracem hunc, quoniam in vermiculorum speciem contrahitur, Scolecitem etiam cognominant, quem tanquam sincerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. Siquidem acer admodum est odore, qui adulterationis vitio caret. Styracis vires Dioscorides fusius exponit his verbis. Styrax calfacit, emollit, concoquit: medetur tussi, destillationibus, raucedini, gravedini, & interceptæ voci: vuluæ præclusæ, duritiæque laboranti conuenit: Ciet menses potu, appositūque: aluum leuiter molli, si exiguum cum Resina Terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur vtiliter discutientibus Malagmaris Acopisque. Vritur autem, & igni torretur, ut fiat ex eo, veluti ex Thure fuligo, ad eadem conueniens ad quæ Thuris fuligo. Græcè sic ea leguntur, χαίρειν ὃ καὶ ὀπτᾶται, καὶ φάινεται, καὶ ἀθαλάται, non, θαλάται.

θαλσῖται: Idest, vritur, assatur, torretur, ac fuligo ex ipso fit, &c. Ex eo etiam
 in Syria Styracinum oleum componitur, quod calefacit vehementer, & emol-
 lit: verum caput dolore afficit, grauâtque, & soporem affert. Eadem de Styra-
 ce Plinius prodidit. Sed præter ista, Inuenio, inquit, potu modico tristitiam Lib.24.c.6.
 animi resolui, largiore contrahi. Sonitus aurium emendat infusum: strumas
 illitum, neruorumque nodos. Aduersatur venenis quæ frigore nocent ideo Lib.8.sim.
 & Citutæ. Styrax Galeno excalfacit, emollit, concoquit: quamobrem tuf-
 sibus, catharris, pituitæ destillationibus, raucedinibusque prodest. Tum men-
 ses potus, seu admotus, deiicit. Combusti eius fuligo, Thuris fuligini quo-
 dammodo similis est. Oleum ex Styraçe sic parandum esse docet Mat-
 thio. Styrax biduo aqua Rosarum maceratus, in vitreum vas luto
 oblitum, vna cum aqua immittitur, quod altero vase su-
 perimposito in furno collocatur, igne accenso mo-
 deratiore, donec aqua tota, in vas aliud exci-
 piens destillauerit. Cû verò oleum fluere
 ceperit, validiore igne opus est, donec
 totum effluxerit. Valet hoc oleum,
 non solum ad odoramenta, sed
 etiam ad ea omnia: ad quæ
 Styrax: est tamen illo
 valentius.


* *





HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER SECVNDVS,



*Quo describuntur, atque picta ostenduntur frutices in
Dumetis & Frutetis sponte nascentes.*

RUBVS CAP. I.



QVONIAM post nemora & maiores silvas, præsertim circa montes, dum fruticesque sæpius occurrunt plerumque sabuloso & arido solo, nonnunquam vdo vliginosoque, idcirco silvæ nostræ dumetum frutetumque subnectimus. Vt Dumetum (siue, quemadmodum antiqui dicebāt auctore Festo, Dumectum, quasi Dumicetum) locus est dumis, idest spinis cuiusvis generis, quæ etiam penè omnes fruticant, oblitus, siue agros prataue sepibus muniant, siue non sic frutetū soli tractus est in quo frutices, aut Plantæ fruticantes sua sponte proveniunt, nihilque aliud præter dumos ferè ac frutices nascitur. A Rubo, quod vul-

RUBVS.



garis sit notitiæ, faciam exordiū. Huius generaria sunt Theophr. βάτος, χαμαιβάτος κυνοβάτος: Plinio totidē, sed nō eadē omnia. Rubi mora ferunt, inquit & alio genere similitudinē Rosæ, qui vocatur Cynosbatos. Tertiū genus Ideū vocant Græci à loco. Nobis quinque: Batos, Chamæbatos, Rubus, Ideus spinosus, Rubus Idæus non spinosus, Cynosbatos: βάτος, Rubus magnus, & Sentis Latinis dicitur, Arabibus Buleich, siue Haleicho, Gallis Ronce, à runcatione, quæ dumorum tantum est, Italis Rouo, Germanis Bromber Bremen, & Bramen, Anglis Bramble bulhe: Hispanis Carca. In dumetis, silvis, sepibus & agrorū limitibus cum aliis spinosis profilit, radice nodosa, virgis multis, subrectis quidem sed quæ tandem gracilitate proceritateque nimia, nisi à vicinis fulciantur, curuata defixis in terram capitibus radicatur. Id enim de Rubis omnibus verè dixit Plinius, Theophrastus de humili Rubo duntaxat. Rubi, inquit, curvati gracilitate, & simul proceritate nimia defigunt rursus in terrā capita, iterumque nascuntur

Genera
Rubi.
Lib. 3. Hist. cap. 18.
Li. 16. ca. 37.
Nomina
Sca. libr. 3. cauf. ca. 28.
Locus.

Forma.

Li. 17. ca. 13.
Lib. 3. Hist. cap. 18.

tur ex sese, repleturi omnia, ni resistat cultura, prorsus vt videri possint homines terræ causa geniti. Ita pessima atque execranda res propaginem tamen docuit, ac viuiradicem. Theophrastus verò, ὅταν σιωάπῃ τῇ γῇ ῥιζόμενος πάλιν, ὃν χαλδῶσι χαμαίβαλον. Cum se terræ coniunxerit, rursus radicatur, quam Chamæbaton vocant. Virgæ spinis aduncis & pungentibus aculeis vestiuntur, quibus prætereuntium vestibibus sese affigunt, eosque remorantur: folium incisuris diuisum est, asperum, dorso aculeato, inferiore parte candicans, superiore nigricans, hyeme vix decidens, nisi alterum succrescat: flos stellatus, ex candido Roseus: fructus cum maturuit, niger, gustu dulcis, pauxillulum amarus, Moro persimilis, multò minor, cui succus sanguineus inest, veluti cruore atro manus inficiens.

Li. 6. med.
part. c. 1. &
Li. 2. alim.

Hæc Rubi mora βάτινα appellari scripsit Gale. quæ quidam Latini in Vaticana corruerunt, sicut μόρα, & συκάμινα vera Mora, appellationibus à plantis deductis quæ sunt βάτος, μόρεα arbor, & συκαμινέα. Sed quum locus vnus Gale. de hac re sit corruptus, eum sic restituit Cornarius. τὸν τῶν βάτων χαρπὸν ὀνομάζουσιν οἱ παρ' ἡμῶν ἄνθρωποι βάτινον, καθάπερ μόρα τε καὶ συκάμινα τὸν τῆς μόρεας καὶ συκαμινέας. Quæ verba τὸν τῆς μόρεας καὶ συκαμινέας in vulgatis exemplaribus Græcis desunt, vt ex præcedentibus nullus sensus erui possit. Vult enim, vt diximus, Batina à Bato dici, sicut Mora à Morea, & Sycamina à Sycaminea, Latine Mora Rubi nominantur. Plinius, Mora nascuntur & in Rubis, multum differente callo. Quanquam in publicis exemplaribus, Romæ nascuntur & in Rubis, &c. leui, tamen à nemine animaduerso errore legitur, inquit Cornarius. Non enim Romæ, sed vbiq̃ue Mora in Rubis nascuntur. Id quod repetit idē Plin. alibi, Rubi mora ferunt &c. Ouidius.

In com. li.
6. m. p. c. 1.

Lib. 15. c. 24.

In com. lib.
6. m. p. c. 1.
Li. 16. c. 37.
Li. 1. Metā.

Cornaque & in duris hærentia Mora rubetis.

Tempus.

Lib. 4. c. 33.

Vires.

Folia Rubi vere, flores æstatis initio colliguntur: fructus cum maturuit, per messes, & extrema æstate decerpitur. Rubus auctore Dioscoride vim habet siccandi & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum potu aluum sistit, & fœminarum profluvia, præsteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firmant, & oris vitiis medentur folia commanducata: cohibent vlcera quæ serpunt vlceribus in capite manantibus, oculisque procidentibus remedio sunt: condylomatis & hæmorrhoidibus folia illinuntur: cardiacis & stomachi doloribus trita conuenientissimè imponuntur. Caules cum foliis tunduntur, exprimiturque succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia quæ modò dicta sunt. Mori in Rubo nascentis quàm optimè maturi succus ad oris medicamenta conuenit. Sistitur aluus præmaturi cibo, nec non flore in vino poto. Sed quod Ruellius interpres habet, singulari remedio contra omnia quæ modò dicta sunt, Græcè legitur, βέλιον ποιεῖ εἰς πάντα τὰ εἰρημένα, est remedium ad omnia dicta præstantius: ite sistitur aluus præmaturi cibo, Græcè est, ἵστησι τὸ κοιλίαν ἐσθιόμενος ὁ μέσως ὡπείρος: quod est, Rubi fructus in medio consistens maturitatis aluum supprimit; vel, vt vertit Cornarius, fructus is, si in media edatur maturitate, aluum sistit. Galeno Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente pollent, eaque non obscura. Sed hoc inter se differunt, quòd folia mollia & recens nata plurimum in se habent substantiæ aqueæ, parum verò adstrictionis: eadem ratione & germina. Itaque si mandantur, aphthas, & alia oris vlcera sanant. Quin & alia vulnera glutinare possunt. Est enim eorum temperies ex terrea frigida essentia, & aquea tepida. At fructus, si quidem maturus fuerit, nō parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est. Itaque ob hoc, & ob modicam adstrictionem esui non insuauis est. At immaturus frigidam terreamque substantiam vincetem habet, & proinde acerbus est, ac valde exsiccatorius. Sane vterque reconditus, validius quàm recens desiccatur. Sed & flos eandem vim quàm fructus immaturus possidet. Vtraque ad dysenterias, & ventris profluvium, roburque

Lacuna in
Dioscor.

Lib. 6. sim.

burque exolutum, & sanguinis sputum idonea remedia. Porro radix præter adstrictionem non paucam habet substantiam in sese tenuem, per quam & lapides renum comminuit. Idem alibi scribit Batina magis quam mora adstringere, & si quis largius iis vescatur, capitis dolorem sentire. Proinde fructum hunc abluamus oportet, priusquam ipsum comedamus, qui tamen ventrem non subducunt, sed potius cohibet. At si quis immatura ipsa prius siccata reposuerit, multo etiam magis cohibebunt. Omnia certe medicamenta quæ ex Mororum succo parantur, si facta ex his quoque fuerint, facultatem habebunt efficacior, Quare ex succo Mororum Rubi, itidem ut ex succo Mororum arboris stomaticum medicamentum fit. Nec Rubos, inquit Plinius, ad maleficia tantum genuit natura, ideoque ex eis Mora vel hominibus cibos dedit. Vim habent siccandi, adstringendique, gingiuis, tonsillis, genitalibus accommodatissimi. Adversantur serpentium sceleratissimis Hæmorrhoidi, & Presteri flos, aut Mora. Reliqua idem fusius persecutus quæ Dioscorides tradit, ad Stomaticem deinceps compositionem progrediens, ait. Mora quæ in his nascuntur, vel efficacior Stomaticen præbuerint, quam sativa Morus. Cum eadem compositione, vel cum Hypocistide tantum, & melle bibuntur in cholera, & à cardiacis, & contra araneos. Inter medicamenta quæ Styptica vocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice, decocta cum vino ad tertias partes, ut colluantur eo oris ulcera, & sedis foueantur: tanta quidem eius vis est, ut spongiæ ipsæ lapidescant. Alterum Rubi genus Chamæbatos dicitur, idest humilis Rubus, humirubum interpretatur Gaza. Ripis fluuiorum humectis, macriis, incultisque agris gaudet. Eum intellexisse mihi videtur ideo Theophrastus, cum scripsit *βαλλον ἐνυδρον*, aut *παρυδρον*, ut & Paliurum, esse. Is longe lateque diffunditur, humi serpentibus tenuissimis & aculeatis flagellis, nunquam sese attollens, sed protinus deorsum vergens, minor reptansque: radice, flore, folio priori similibus, fructu dissimili: quoniam cum maturus fuerit, cæsius est, non ut superioris niger, minor, minusque succulentus, gustus dulcedine fere eadem qua Mori arboris fructus. Aliud genus est Rubi in quo Rosa nascitur, inquit Plinius, Dioscoridis *κωὸς βάτος*, qui in sepibus cum Rubis aliis gignitur. Latine Rubus caninus is appellatur, aut Canirubus, Arabicè *Sent*, Italicè *Rouo canino*. Fruticem eum esse putant nonnulli quem Galli *Englantier*, & *Eglantier* vocant, id quod notæ à Dioscoride positæ testantur. Nam frutex est Rubo grandi maior, & firmitior, ut qui arboris instar assurgens rectus stet, nec ob imbecilitatem Rubi modo in terram flectatur. Folia fert Myrti, sed latiora, robustas circa ramos spinas, qua de causa Ruborum potius, quam Rosarum generibus comprehendimus. Florem ædit sæpius candidum, interdum ex candido subrubentem, odoris iucundissimi: fructum oblongum, nucleo oliuæ similem, qui per maturitatem fuluescit, & floccos intus continet. Fructus is exemptis interioribus floccis (nam hi arteriam lædunt) siccatus, & in vino feruefactus, ac potus, aluum sistit: quæ postrema Ruellius mendosos codices secutus sic vertit, fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruefacti enim ij in vino mox poti arteriam infestant. Integer autem codex habet. *ἡ τῆσι ὃ κοιλιὰν ὁ καρπὸς, ξηρὸς διχὰ τὸ ἐν αὐτῷ (ἐπιώδης καὶ κωλῖκὸν γὰρ τῆς ἀρτηρίας τοῦτο) ἀποζεννύμενος ἐν οἶνῳ, καὶ πινόμενος*. Recte sic Corn. hæc expressit. Fructus siccatus, inquit, sistit aluum absque interno illo lanuginoso, hoc enim arteriam lædit, si in vino, feruefactus bibatur. Addo Dioscor. historiæ, non Cynosbati florem solum, sed etiam folia, si digitis terantur, suaviter olere. Serapio historiæ Dioscorid. quam transscripsit, adiicit radicem fructu calidiorem esse: tusam & in emplastro admotam, spinas & infixas corpori extrahere: folia quoque trita & imposita phlegmonas impedire, ac prohibere:

Li.2. Alim.

Lib.6.m.p.
cap.1.
Li.24. c.13.2. Genus.
Nomina
Locus.
Lib.4. Hist.
ca. 13.
Forma.3. Genus.
Locus.
Li. 4. ca. 13.
Nomina
Li. 1. c. 106.
Forma.Lacu. in
Dioscori.Embl. 102.
li. 1. Diosc.

- quæ cum in nostris Dioscoridis exemplaribus desiderantur, non sine ratione ea manca hîc esse suspicari licet. In hac Dioscoridis historia cum nihil sit quod non sententiæ herbariorum de hac planta adstipuletur, dubitant tamen adhuc de eare quidam. Dodonæus scribit Album spinam videri Cynosbaton Theophrasti. Traguseam pro Cynosbato depinxit, ac descripsit. Alij apertè refragantur, imprimis doctissimus Matthiolus. Nam si Cynosbatos esset aliquod sylvestrium Rosarum genus, inquit, sat erat Dioscoridem dixisse Canis rubum Rosæ similem esse, non autem arboris instar assurgere, Rubo longe maiorem. Præterea Rosæ sylvestris folia à Myrto plurimum dissident. Eius etiam fructus nō modo Oliuarū nucleis, sed oliuis ipsis crassior est. Adhæc Plinius Rosam sylvestrem peculiari nomine Cynorrhodon appellat, non Cynosbaton. Præterea Cynorrhodon veteribus nihil aliud fuisse quàm spongiolam illam quæ mediis Rosarum sylvestrium ramis oboritur: idem scribit. Cū verò de Cynosbato tractat, à Rosa sylvestri longè diuersum facit, nempe folium habere vestigio hominis simile, & quod omisit Matthiolus, ferre vuam nigram, in cuius acino neruum habet, vnde Neurospastos dicitur. Iam verò Theophrastus Cynosbaton tradit Malo Punicæ similem esse, & ei fructum similem edere, folium verò Viti: quibus omnibus respondent alterius sententiæ autores, hoc primum quod Matthiolus vehementer probat, & aduersus Marcellum contendit, Cynosbaton à Cynorrhodo siue Rosa sylvestri differre caulium robore, proceritate, crassitudine, aculeorum multitudine, & rigiditate, folio iucundi odoris, inquit Plinius, sed angusti, nec latè sese diffundentis, quod in Rosa sylvestri prorsus odoris est expers, in acutum desinente, cum Rosæ sylvestris folium summa parte latiusculum sit, & maioribus incisuris diuisum, quæ cum tantopere inter se dissideant, Cynosbaton neque cum Rosa sylvestri, neque cum satiuâ à Dioscoride conferri oportuit. Nullo verò pacto aduersatur Plinij auctoritas Rosam sylvestrem Cynorrhodon, non Cynosbaton appellantis, qui etiam non scribit veteribus Cynorrhodon nihil aliud fuisse, quàm spongiolam illam quæ mediis sylvestrium Rosarum ramis oboritur, vt ait Matthiolus, sed Cynorrhodi medicinam vnâ fuisse, spongiolæ quæ in mediis spinis eius nascitur, cinere, cum melle, alopecias capitis expleri. Perspicere verò ex hac historia licet Cynosbati folium Myrto, præsertim sylvestri, simillimum esse, verum latius, in ambitu ferratum, paulo minùs acuminatum. Eiusdem fructum nucleo oliuæ ἑοικότα, vt scribit Dioscor. idest similem, non ἴσον, idest magnitudine parem: quanquam nec eius magnitudo ea sit, vt oliuas superet Hispanicas, aut Narbonenses. Quod autem in Theophrast. legitur de Cynosbato, δένδρου εἶναι καὶ θάμνος μετὰ ξύλῳ καὶ παρόμοιον ταῖς ῥόαις mendosum est, scribendum enim παρόμοιον τῇ ῥόδῳ. Sic enim Plinius hæc reddidit: Rubi Mora ferunt, & alio genere similitudinem Rosæ, qui vocatur Cynosbatos. Ex quibus reliqua in eodem Theophr. per facile est emendare, κυνόσβατον τὸν καρπὸν ὑπέρυθρον ἔχειν, καὶ παραπλήσιον τῷ τῆς ῥόδου. Idest Cynosbaton fructum habere subrubrum, similem Rosæ, non τῆς ῥόαις, vt in exemplaribus nostris habetur: Et, τὸ ὅ φύλλον, non ἀγνώδες, sed ἰχνῶδες, vt legit Plinius, folium hominis vestigio simile interpretatus. Hominis enim vestigium si cōsideres, principio non nihil latum, medio latius, in angustum & acutum summo cacumine desinit, quale à calceatis arenæ lutove imprimitur, tali præsertim calceo, qualem veteribus in vsu fuisse ex antiquis statuis apparet. Ea figura imaginem foliorum Cynosbati representat. At quod scribit Plinius Cynosbaton vuam nigram ferre, Cynosbaton sane, id quod in plerisque facit, cum Chamæbato cōfundit, improprièque eius fructum vuam, non Morum appellat, quanquā inter vuæ & Mori figuram parū intersit. Hoc inde cognosci potest, quod ex Theoph.

tria Rubi genera eo loco enumerare velle videatur. Cùm enim de Rubo gradio-
redixisset, subdit, Alterum Rubi genus est in quo Rosa nascitur: Chamæbati
vero tertij scilicet generis nulla mentio, nisi ea quæ modo dixi ad eum referā-
tur, cui sententiæ subscribit vetusti exemplaris auctoritas, in quo legitur, fert
& vnam nigram Chamæbatos, in cuius Acino, &c. Tam in Cynosbato quam
in Cynorrhodo excrementum quoddam gignitur globosum, hirsutum, tactu
asperum, quod in Cynosbato pilulam Castaneæ similem Plinius appellat, præ-
cipuo remedio calculosis, in Cynorrhodo Spongiolam. Cynosbati meminit
Galen. his verbis. Huius fructus haud segniter adstringit, folia verò mediocri-
ter. Itaque particularis eius vsus haud ignotus est. Cauendum ab eius fructu qui
veluti lanam inclusam habet, arteriæ infestam. ac rursus: fructus Canirubi
multo magis quàm Ruborum adstringit, ob eamque causam ventrem magis
cohibet. Vescuntur autem ipso frequenter rustici, exiguum alimentum corpo-
ri suppeditante. De Cynosbato quidem satis diximus: iam de Rubo Idæo spino-
so, & non spinoso differamus. Rubus Idæus appellatus est, non, vt Plinius exi-
stimauit, quod in Ida non aliàs nascatur, sed quod copiosius in Ida proueniat
Dioscoride auctore. Et certe Theophrastus Idæ peculiare arbores recensens,
inter eas Rubum Idæum non numerat. Eum fruticem herbariorum maior pars
esse censet, quem Galli *Framboisier*, vocant, quasi fragariam ligneam aut siluo-

Lib. 24. c. 13.
Li. 25. ca. 2.
Lib. 7. tim.

Vires.

Li. 2. alim.

4 Gen. Ru.

Nomina

Li. 2. ca. 14.

Lib. 3. Hist.

cap. 17.

Forma.

Lib. 4. c. 34.

Li. 16. ca. 37.

Tempus.

Vires.

Ibidem.

Li. 6. ca. 37.

Li. 24. c. 14.

5 Gen.

Locus.

Forma.

RUBUS IDÆVS

spinosus.



sam. Germani *Hymbeerem*, vt propemodum id
sit extra controuersiam. Est enim, vt scribit
Dioscor. longe tenerior priore, ac minoribus
spinis horrens: quanquam & sine spinis in-
ueniatur, præsertim in nouellis surculis, qui-
que annum nondum exceßerunt. Insuper eadē
præstat quæ supradictus. Eadem Plinius ha-
bet. Tertium genus Idæum vocant à loco: te-
nerius est quàm cætera (sic enim Hermolaus
ex Dioscoride reposuit, pro tenuius est) mi-
noribusque spinis, & minùs aduncis. Radice
est longa, per terram sparsa, quot annis sur-
culos producente, qui secundo anno flores
fructusque proferunt. Ii, Rubi Moris similes
sunt, sed rubri, similiterque Rubi Idæi Mo-
ra nominantur, Galli *Framboises*, Allobroges,
Ampes, Itali *Ampomele* vocant. Rubus Idæus
Maio & Iunio mensibus floret. Fructus Iulio
maturescit. Flos eius, inquit Dioscorid. cum
melle oculorum collectionibus illinitur, ignē
sacrum extinguit, stomachicisque ex aqua bi-
bendus datur. Plinio flos contra lippitudines
illinitur ex aqua, quæ alio in loco idem repe-
tit. Idæus Rubus appellatus est, quoniam in

Ida, non aliàs nascitur. Est autem tenerior ac minor, rarioribus hamis (non
calamis, vt in vulgatis codicibus scriptum est) innocentioribusque, sub arborū
vmbra nascens. Huius flos cum melle epiphoris illinitur, & ignibus sacris, sto-
machicisque (non stomaticis) ex aqua bibendus datur. Cætera eadem præstat
quæ supradicta. Rubus Idæus non spinosus non æque omnibus notus est. Gi-
gnitur frequens in Allobrogum monte Gratianopoli vicino, quem vocant *la*
Motte, caulibus multis sesquipedalibus, vt Idæus Chamæbatos iure nominari

RVBVS Idæus, non spinosus.
Chamæbatos Tragi.

Lib. 3. ca. 12.

Lib. 24. c. 4.

Nomina

Genera.



stris, aut sativa. Sylvestris species multæ, quæ in silvis, dumetis, sepibus. vñ cū Rubis, & sentibus aliis proueniunt. Satiuarum species plures, quæ tum quòd

ROSA.

Lib. 6. Hist.
cap. 6.



Lib. 21. c. 4.

plura sunt genera, locorum colorumque varietate distincta. Genera, inquit, nostri fecere celeberrima Prenestinam, & Cāpanam: addidēre alij Milesiam, cuius sit ardentissimus color, nō excedens duodena folia. Proximam ei Trachyniam, minùs

possit, foliosis, sine spinis vllis: folio Rubo Idæo simili, auersa parte candido, & lanuginoso: fructu rubro, sed non vt in superiore rotundo, & dulci, verum ex granis sic coagmentato, vt in metæ modum fastigietur, acido sapore, etiam cum maturuit, Fragi magnitudine. Incolæ vocant *Des Asnes*, & ab Idæi rubi fructu probè distinguunt, quem vt suprà diximus vocant *Des Ampes*. Tragus Chamæbati speciem esse existimat, nec malè Rubo Idæo coniungi, & in hortos translatum in Rubum Idæum mutari, omniâque quæ de Rubo dicta sunt, huic frutici rectè attribui posse scribit.

ROSÆ CAP. II.

ROSA fruticosi spinosique generis est, imo nascitur spina verius quàm frutice, inquit Plinius. Græcis ῥόδον dicitur quòd largum odoris effluuium emittat, Plutarcho auctore, Arabibus *Nard*, *Naron*, seu *Vard*, Italis *Rosa*, Germanis *Rosen*, Hispanis *Rosas*, Gallis *Rose*, Boemis *Ruoz*. Ea est aut sylvestris, aut sativa. Sylvestris species multæ, quæ in silvis, dumetis, sepibus. vñ cū Rubis, & sentibus aliis proueniunt. Satiuarum species plures, quæ tum quòd ex sylvestribus in hortos translata, atque educata cultu & arte mites factæ sunt, tum quòd cum sylvestribus magna cognatione coniunctæ sunt, hîc simul cum sylvestribus explicabuntur. Quanquam de iis libro de floribus, inter quos principatum obtinent, & quarum vsus in coronis prope nimius est, tractare consentaneum foret. Rosarum differentias Theophrastus declarat his verbis. Rosarum differentia multæ ex foliorum multitudine, paucitate, asperitate, læuore, colore, odore. Multis enim quina (in flore) folia sunt, quibusdam duodena, ac vicena, aliis numerosiora, cum sint quas cētifolias vocent, cuiusmodi plurimæ circa Philippos proueniunt, quas ex Pangæo transferentes conferunt: illic enim multæ sunt: folia interna (in harum flore) parua sunt admodum: ita enim exoriuntur, vt alia intus, alia extra sint: iucundi odoris non sunt, nec amplæ magnitudinis. Odoratiores inter amplas, quibus pars inferior scabra. Sylvestres autem Rosæ asperioribus sunt, tum virgis, tum foliis flore minùs colorato, minùs odorato, & minore. Plinio

minùs rubentem: mox Alabandicam; vilio rem, albicantibus foliis. Vilissimam verò (vel vt alij legunt vtilissimam) plurimis, sed minutissimis, Spineolam. Est & genus eius quam centifoliam vocant. Est & quæ Græca appellatur à nostris, à Græcis Lychnis, non nisi in humidis locis proueniens, nec vnquam excedēs quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Est & alia Græcula appellata, conuolutis foliorum paniculis, nec dehiscens nisi manu coacta, semperque nascenti similis, latissimis foliis. Alia funditur è caule maluaceo, folia oleæ habente, Moscheuton vocant: atque inter has media magnitudine Autumnalis, quam Coroneolam vocant. Omnes sine odore præter Coroneolam & in Rubo natam. Rosas Campanas, Rosas nostras albas esse existimo, quæ nobis omniū vilissimæ sunt, demptis Damascenis, quædam foliis densissimis, vt antiquis Alabandicæ, Spineolæ fuisse arbitror, quæ à spinis dictæ, & Centifoliæ: Rosas vero Prenestinæ, rubras & in iis Milesias, quas Galli *Roses de Prouins* appellant: trachinias, minùs rubentes quas *Roses incarnates*. Græca rubra etiam est, vt ego equidem sentio, quamuis Plinius colorem non expresserit, eaque, multorum sententia, quæ Damascena rubra nominatur, *Rose de Damas rouge*. Græcula multorum etiam iudicio, Rosæ Damascenæ genus est, flore ex albo ad puniceum nonnihil vergente, *Rose de Damas incarnate*. Moscheutos quæ sit ambigitur. Sunt qui inter Damascenas, numerant, alij inter Rosas sylvestres passim nascentes in dumis. Damascenarum cortex maluacei corticis modo lætius quidem vi-
ret quàm cæterarum, sed quæ foliis sit Oleæ nullam adhuc comperi quanquam in quibusdā exemplaribus folia læuia leguntur, non Oleæ. Ceterū Moscheuton Rosam dictā putat Dalechampius, nō quòd Moschū oleat antiquis incognitū, sed quod *μύχοις*, idest stolonibus multis fruticet, vel quod *μύχοις*, idest malleolis

ROSA Damascena.



feliciter pangatur Vitis modo, nō solūm viuiradice. Rosam Coroneolā à coronis nominatā, siue seram, siue autūnalē, Damascenam esse ferè omnes autumant, tum quòd autūno proueniat, tū q̄ odore suauis prædita sit. Galli *Rose Musquee*, & *Muscadelle* vocāt, Itali *Rosa Moschetta*. Anglis, Germanis & Belgis *Rosanbau*. Ea duplex est: vna enim quinque tantū foliis: Altera densa foliorum congerie constat, quod olitorū arte & mangonio factū putant. Vtraq; eximia odoris suauitate delectat. His addenda Rosa lutea, veteribus indicta. Cynorrhodon vniuersè quidem Rosam omnē sylvestrem Plinius appellat, vt supra annotauimus. Huius genera duo obseruarunt herbarij, sylvestrē Rosam vulgarem, quæ passim in dumetis reperitur, & Cynorrhodon Polyacāthon, forma Rosæ satiux. Rosa radice est ramosa, & lignosa, virgas emittit longas, lignosas, multis in locis aculeis curuis plenas: folia longiuscula, incisuris diuisa, nigricantia, aspera. Inter hæc ex longo satis pediculo emergit qui calix dicitur, ipsum ambientibus

Nomina

quinque foliolis viridibus, duobus vtraq; parte barbatulis, duobus minimè, quinto vna duntaxat parte. Hæc foliola cortices Rosarū nominantur. Paulatim Rosa dehiscit, ac sese pandit, emicantq; aut rubescentia, aut candicantia folia, tū aspectu pulchra, tum odoris suauissimi, quorum imæ partes candidæ, quibus capiti

Lib. 21. c. 18. herent, quæq; cum ex Rosis conficitur conditum aut syrupus, forficis defecatur,
 Lib. 1. c. 112. vngues Rosarum à Plinio nominantur, à Diosc. ὀνυχες τῶν ῥοδῶν. Iis detractis Rosæ
 Lib. 4. me. part. ὀνυχισμέναι & ἐξωνυχισμέναι dicuntur, hoc est exunges, & resectis vnguibus. A
 Galeno etiā vngues σαρπελοβοί, id est extremitates dicuntur. Nam & ῥοδῶν χλωρῶν
 χωρὶς τῶν λοβῶν apud eum legitur, & ῥοδῶν φύλλων χωρὶς τῶν λοβῶν. Sunt enim Græ-
 cis λοβοί rerum omnium summitates. Qui in medio calicis stant lutei apices, cū
 capillamentis etiam luteisquibus insident, flores sunt Rosarum, Græcis ἀνθή
 τῶν ῥοδῶν. Hos flores qui Antheram appellant, vehementer errāt. Anthera enim
 Galeno, Celso, Paulo, Aetio cōpositionis nomē est, quæ apud diuersos auctores
 varia est. Sunt enim Antheræ stomaticæ, & aliæ aliis partibus cōueniētes: sunt &
 siccæ, quæ pulueris specie inspergi possunt: sunt & melle exceptæ, & non à flori-
 bus rosarum, quos multæ nō recipiūt, sed à floridis medicamentorum coloribus quæ
 in eas cōpositiones addūtur, nominatæ. Virides illi alabastrum qui flores sustinet,
 & in quibus semen cōtinetur, κεφαλὴ τῶν ῥοδῶν, Latine capita Rosarum dicuntur quæ
 foliis floribusq; breui dilapsis instāte Autūno maturescētia rubescunt, semēque
 includunt durū, lana obuolutū. Rosa Græca à Græcis Lychnis dicta, quod flore
 lychnidē æmuletur, nascitur sponte in sepibus, valde humilis, spinis carēs, quod
 huic tantū generi Rosarum propriū est, flore lāguidius rubro, vere & autūno pro-
 deūte: quod etiā huic Rosæ cū Coroneola, & Græcula cōmune est. Quæ in hortis

ROSA Lutea.



Lib. 6. Hist.
capi. 6.

Forma
Græcula.

nostris colitur, & in quibusdā mōtib⁹ luxuriat, odoris est expers: at, humi iacētē & valde humi-
 lē, foliis tā exiguis, vt vix Rosa esse videretur, flore suauissimi odoris in Cemeneorum mōtiū
 iugo altissimo Lugduni propinquo, quod mō-
 tē Pilati vocāt Dalechāpius collegit. Contra in
 Chartusianorum cœnobio primario, Gratiano-
 poli vicino prorsus inodora est, vt verissimū
 esse cōperiat quod scripsit Theophr. de his
 ipsis Rosis tractās, odoris præstantiā loci ratio-
 ne contingere, & quæ eadē in diuersa tellure
 proueniūt à sese differre, quod iucūdū vel nul-
 lū odorē spirēt. Eū locū Gaza (vt id obiter dicā)
 nō rectē est interpretatus. Hanc si quis Rosam
 Græcā esse Plinij negauerit, certē cū sit sylue-
 stris Rosæ genus, Cynorrhodon læue esse mihi
 iure cōcesserit. Græcula Rosa flore est suauiter
 olente, quæ sub æstatis initiū paulo serius quā
 Damascena cādida promit, & florere per æsta-
 tem ferē totā perseuerat, foliis Damascenæ al-
 bæ latiorib⁹, sese nō explicātibus, nisi quis ma-
 nu diducat, sed veluti cōglobatis, & cōuolutis,

Ibidem. vt scribit Plini⁹. Cinnamomū olere hāc Rosam vulgus ait. Rosa lutea siue aurea
 q^{ue} luteo aureōue colore fulgeat nominata est. A cæteris Rosarum generib⁹ foliis,
 Forme Lutea. flore, odore discrepat. Nā parua eius folia sunt rotūda, obscure viriditatis, valdē
 infecta, incisurarū crenis propemodū rigētibus: caulibus valde spinosis, flore au-
 reo siue luteo, cætera aliis simili, sed simplici, & quinque tātū foliis cōstāte, non
 autem numerosis hortēsiū Rosarum modo: odore graui, atque ingrato, accusanda
 Locus. natura, quæ flori egregio suauē odorē, id est Roseū ac suū inuiderit, quo si nō ca-
 reret, haud prostremū locū inter flores excellētes obtineret. Nascitur in Italia,
 Forme Rosa silu. at nō ita pridē in hortis colere nos cœpimus. Rosa syluestris quā Cynorrhodō
 à Plin. appellari diximus, foliis est asperis, aculeatis: rami surculique, vt in satiuā

CYNORRHODON

Polyacanton.

ROSA SYLVESTRIS

Pomifera.

spinis horrēt, sed graciliores sunt, foliāque multò minora: Rosę ipsę simplices, albę, aut in albo purpureę, in odore quibus tandē succedūt capita rotūda, vt in fatiua, rubra cū matura sunt, in quibus semen lana opertum. In mediis ramis nasci pilam quandam, hirsutam, à Plin. spongiolam nominatam iam diximus. Hanc Seplasiarij quidam Bedegar appellant, nō sine errore, cū Bedegar Cardui genus sit. Sylvestris Rosę multę sunt varietates, exq; notatu dignę. Sunt Cinnamomeę, foliolis omnium florum minimę. In Francia, Belgia, Anglia rursus sponte oriuntur, ipso odore notissimę. Luteę sylvestres sunt in Africa: sunt & Cæreuleę in hortis Italicis. Est & altera species foliis Myrtinis, sed latioribus, flore & elegantia Rosę Moschataę, vulgo *Eglantier*, de qua prius egimus, cum de Cynosbato differeremus. Inter sylvestres etiam non postremę venustatis, inquit Pena, alia Anglię familiaris, & Esplantinę cognatior fruticat pumila, bicubito non altior, inodora, folio minore, Aronię non dispari pomo donata, minore multo, colore viuidiore, rubello subpuniceo, per Augustū maturo: flos Rosę sylvestris est. Hęc Pena. In nostris Rosis luteis, delapso flore, talia poma succedunt, adeo Sorbis similia, colore, figura, & interdum magnitudine, vt imperitus ac in exercitatus ea vix à Sorbis discernat. Alterum Cynorrhodi genus, à spinarum densissima multitudine, quibus caulis, furculi, ramuli, folia rigent Polyacanthon nominavit Dalechampius. Id pedis altitudinem nunquam excedit. Flore est rubro, exiguo. Reperitur in Gramuntio nemore prope Monspe-
 lium. Vera Rosa, inquit Plinius, plurimū solo præualet. Cyrenis odoratissima est, ideoque ibi vnguentum pulcherrimum. Carthagine, Hispanię hyeme tota præcox. Refert & cæli temperies. Quibusdam enim annis minùs odorata prouenit. Præterea locis omnis siccis, quàm humidis odorator. Serineę pinguibus vult, nec argillosis locis, nec riguis, contenta raris, (vel ruribus, vt emendauit Hermolaus) proprięq; eruderatum agrum amat. Præcox Campana, sera Milesia. Nouissimè tamen desinit Prenestina. Fodiuntur altius quàm fruges, leuius quàm vites. Tardissimè proueniunt semine, quod in cortice est, sub ipso flore, opertū

*Forma.**Poliac.**Locus.*

Lib. 21. c. 4

Tempus.

lanugine: ob id potius caule conciso inferuntur. Ex ocellis radicis, vt arundo, vnum genus feritur pallidæ, Spineolæ, longissimis virgis, quinquefoliæ, quæ à Græcis altera est. Omnis autem recisione atque vstione proficit. Translatione quoque, vt Vitis, optimè ocissimèque prouenit, surculis quaternum digitorum longitudine, aut ampliore, post Virgiliarum occasum sata, dein per Fauonium translata, pedalibus interuallis, crebroq; circumfossa. Qui præcocem faciunt pedali circa radicem scrobe aquam calidam infundunt germinare incipiente calyce. Hæc Plinius: ex quibus locum Theophr. vnde ista magna ex parte translata sunt, illustrare atque emendare licet: *Ὅσμοτάτα δὲ, inquit, τὰ ἐν κυρήνῃ. διὸ καὶ τὸ μῦρον ἥδιον. ἀπλῶς δὲ καὶ τῶν ἰων, ἔ τῶν ἄλλων ἀνθῶν ἀκρατοί. μάλιστα δὲ ἐκείναι αἱ ὀσμαι, διαφέρουσιν διὰ τὴν χρόνῳ. πλεῖστον γὰρ ἔτος διοικεῖ παραλλάττειν.* Gaza. Odoratissimæq; apud Cyrenam gignuntur, & proinde vnguentum iucundissimum illic faciunt. In plenum verò, & Violarum, & reliquorum florum odores ibidem sinceri præcipuè sentiuntur. Lege *ἀπλῶς δὲ καὶ τῶν ἰων, καὶ τῶν ἄλλων ἀνθῶν ἐκκεῖται μάλιστα ἐν εἰ μὴ ἔσιν αἱ ὀσμαι, &c.* Id est, prorsus autem & violarum, & reliquorum florum eximius odor illic est, si tempus commodum fuerit: id enim plurimum immutat. Plinius. Refert & anni temperies: quibusdam enim annis minùs odorata prouenit. Et mox. *φύει μὴ οὖν ἡ ῥοδωνία καὶ ἐκ τῆς σπερμάτος. ἔχει δὲ ὑπὸ τὸ ἀνθος ἐν τῷ μῆλῳ κνηκῶδες, ἢ ἀχνῶδες, ἔχον δὲ τινὰ χνοῦ, ὥστε ἐγγὺς εἶναι τῶν πρώτων σπερμάτων.* Gaza, Nas-
citur Rosa etiam ex semine, quod flori subditum suo in malo contētum, Cne-
ceum, vel Acanaceum lanugine quadam obductum gerit, vt primis seminibus proximum sit. Emenda. *κνηκῶδες, ἢ ἀχνῶδες ἔχον γετινὰ χνοῦ, ὥστε ἐγγὺς εἶναι τῶν πρώτων σπερμάτων.* Id est, nascitur Rosa etiam ex semine, quod sub flore malo inclu-
sum habet, lanugine Cnici modo, aut echini carduorum, obductum, omnia se-
mina proximè ambiente. Quondam prope Allobrogum Cularonam, siue Gra-
tianopolin, è medio floris Rosæ rubræ, cum iam folia decidissent, enatus cauli-
culus, gracilis, tres digitos altus, secundum florem extulit, priori similem, cum
calyce subiecto, ac florem sustinente. Plinius, Tardissimè proueniunt semine,
quod in ipso cortice est, sub ipso flore, opertū lanugine. Quod igitur Theophr.
τὸ μῆλον Rosæ, Plinius corticem appellat, vt & paulo supra. Germinat omnis pri-
mo inclusa granoso cortice, *τὴν κεφαλὴν*, id est caput appellari diximus: *ἐμὴν ἄλλα*
διὰ βραδέως παραγίνασθαι, κατὰ κόπρον τὸν χαυλὸν φυτεύουσιν ἐπικακομῆν δὲ, καὶ ἐπιλεμνομῆν
βέλτιον φέρει τὸ ἀνθος, ἐωμῆν γὰρ ἔξ ἀνξέ, καὶ ἀπολοχμῆται. δὲ ἡ καταφυτεύειν πολλὰ καὶ, καὶ
γὰρ τὰ φασὶ κάλλιον γίνασθαι ῥόδον. Plinius. Ob id (quod tardissimè semine proue-
niunt) potius caule conciso inferuntur. Omnis autem recisione atque vstione
proficit: relictæ enim (quod omisit Plinius) excrescit, & in fruticosum dumum
degenerat. Translatione quoque, vt ait Plinius, sicut Vitis, optimè ocysimeq;
prouenit Rosæ satiuæ & syluestres Maio & Iunio mensibus florent. Rosæ Da-
mascenæ seu Moschatæ etiam Maio, sed iterum Septembri mense, siue Autum-
no, quod nemini mirum videri debet, cum sint etiam Pestanæ Rosæ bifferæ
Virgilio. Rosa refrigerat & adstringit, inquit Dioscor. Sed sicca magis adstrin-
git. Idem Plinius quoque dixit. Quia verò locus corruptus est, & quæ ad Iuncū
odoratum præcedentem pertinent, cum Rosa confusa sunt, ex vetusto exem-
plari sic restituit Cornarius. Ad muliebres vsus decoquitur. Opisthotonicis
cum Resina arida imponitur, excalfactoria. Et hætenus quidē de Iunco, dein-
ceps autem sequitur de Rosa. Rosa astringit, refrigerat, &c. Noster verò codex
manuscriptus habet: imponitur, excalfactoria. Rosa adstringit, refrigerat, &c.
Galen. Rosam ex aquea substantia & calida, duabus aliis qualitatibus astringen-
te videlicet & amara admixtis compositam esse tradidit: eiúsque florem magis
quàm Rosam ipsam astringere, ac proinde etiam exsiccare Alio in loco oleum
Raso

Lib. 6. Hist.
cap. 6.

Temper.

Li. 4. Geor.

Temper.

& Vires

Lib. 1. c. 112.

Lib. 21. c. 18.

Embl. 109.

lib. 1. Diosc.

Li. 8. simpl.

Lib. 3. simp.

cap. 10.

Rosaceum idem scribit in primo esse ordine refrigerantium: ac Rosarum succum esse frigidiore quidem temperie, sed non ita multò, verùm caloris tepidi, & tenuis essentia. Auctores hi diuersa ratione ducti rectè scripserunt, illi quidè Rosam frigidam esse, hi calidam. Nam Rosa in caliditatis frigiditatisq; medio quodammodo sita est, quum sensu qualitas alterutra in ea non percipiatur. Etenim quæ caliditate sua aut frigiditate sensum mouent, ea secundo calidi frigidique ordine collocantur, sicut quæ ratione deprehenduntur, primo. Rosa igitur, vt rectè tradit Mesues, frigida est primo gradu, sicca secundo, ex substantiis diuersis etiam separabilibus composita, aquea quidè mediocri, & terrea adstringente, aërea verò, dulci & aromatica, ignea denique tenui, à qua est amaritudo, rubor, perfectio, & forma. Ignæ tamen substantiæ vis, quæ ruborem & speciem impressit, valentior fuit, quam quæ amaritudinem. Quamobrè hæc sola siccatione exolescit, illis adhuc permanentibus. Ob eam scilicet amaritudinem Rosæ recentes succo præsertim, purgant bilem & aquas, quam vim veteres Græci videntur ignorasse: siccata verò resoluta caliditate amaritudinem excitante, substantiam adstringentem & stipantem ostendunt. Quare frigidiores sunt, & magis adstringunt, ac eæ magis quæ non fuerint perfectæ: & albæ magis, quam rubræ. Succus calidus est, prope ad primū gradū, nimirum à substantia terrestri & frigida secretus. Is recētibus foliis exprimitur, inquit Diosc. defectis forfice vnguibus, reliquum in pila teri debet, & in vmbra exprimi, donec cogatur, & ita ad oculorum circūlitiones recondi. Siccantur etiamnum folia Rosarum continuo versata, ne muceant, néve situs infideat. Aridis Rosis in vino decoctis expressus liquor facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac vuluæ, penna illitus, aut infusus. Eadem sine expressione rusæ præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitiis, igni sacro illini profunt: siccæ, ac trite fœminibus insperguntur. Misceri solent oculariis antidotis, atque compositionibus, quas Antheras vocant. Folia vruntur in Calliblephara. Flos qui in mediis Rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita potu citam aluum, & cruentas reiectiones sistunt. Folia Rosarum, cor, vetriculum, iecur, & eorum retentricem facultatem roborant: dolores à caliditate ortos mitigant: inflammationes tollunt. Vngues lotionibus & clysteribus ad inhibendas fluxiones vtiliter admiscetur. Flos, tradente Plinio, somnum facit. Inhibet fluxiones mulierum, maximè albas, in posca potus, & sanguinis excreationes. Calyx caputque alui fluores, & cruentas excreationes sistunt. Fructui maturo rubroque, & semini ac lanugini conclusis non obscura adstringendi vis inest. Quamobrem contra alui fluores, contra fœminarum abundantiam qualemcūque, maximè contra Gonorrhœā, remedio sunt. Succus ex Rosis puniceis efficacior est, ex rubescentibus infirmior: succus adularum melior: itémque dilutum quod ex rubescentium foliis aqua maceratis paratur, quanquam quæ Damascenæ, seu Moscatæ vocatur, longè præstent. Earum enim vicenis foliis deuoratis facilè & innoxie aluus subducitur. Rosarum succus purgat, resoluit, aperit, terget. Quare bile flaua sanguinè expurgat venarum & arteriarum. Confert ictero: quia obstructions ventriculi, iocinorisque aperit, & purgat. Cor, vetriculum, hepar roborat. Cordis tremorem sanat, vacuata eius causa: febribus biliosis confert. Dilutū ex quo pharmacopæi syrupum Rosatum quem vocant solutium, cōficiunt, ex eorum medicamentorum genere est, quæ quoniam clementer, & absque vlla noxa aluum subducunt, recentiores Benedicta vocant. Bilem & aquas purgat estate salubriter, ab vnciis duabus ad vnc. quatuor. Albæ Rosæ nihil aut minimum purgant: potentiùs astringunt, & roborant quàm rubræ: quod cum de Rosis albis vulgaribus

Lib. i. met.
purg.

Lib. i. c. 12.

Matth. li. i.
Diosc. c. 12.

Lib. 21. c. 19.

Lib.2.m.
purg.

ribus quibus passim abundant fruteta, Mesues intellexerit, iniuste à Manardo reprehensus esse videtur, quoniam albæ Rosæ quas Damascenas appellamus, inquit, maiore deiciendi vi quàm ceteræ præditæ sunt, Damascenæ Mesuæ, ut opinor, incognitæ fuerunt, atque etiam veteribus Græcis, & Latinis, tum quod non ita pridem in Italia, & Gallia coli cœperint, tum quod nullus veterū, quod sciam, de his aliquid memoriæ prodiderit, nisi eæ sint quas Coroneolas à Plinio appellari diximus, Oleum rosatum, & aqua ex Rosis educta, cor, ventriculum, hepar, facultatēque retentricem eorum roborant, cogendo ipsorū substantiam laxam, inflammationem omnem extinguunt, & ortum ab ea dolorem sedant, somnum conciliant: coryzam tamen & sternutationem excitant, sed longè vehementius recentis floris odor, iis quibus facile caput repletur, catarrhis obsunt. Vuam stringunt, & guttur, illasq; partes roborant: crapulā arcant, & discutiunt. Aqua in qua maceratae sunt Rosæ, mundat, terget, purgat: at quæ vi caloris extillauit multum roborat, sed non purgat: quia subtilis eius caliditas igne est dissoluta. Acetum Rosatum inflammationes omnes sedat, incidit, purgat, roborat. Sylvestres Rosæ maiore adstringendi vi præditæ sunt, quàm satiuæ, sed multo minùs odoratæ, & purgandi facultate destitutæ. Sylvestris Rosa, ut auctor est Plinius, cū adipe vrsino alopecias mirificè emendat. Scribit præterea Spōgiolæ quæ in mediis Cynorrhodi spinis nascitur, cinere cum melle alopecias capitis expleri: tum etiam, ad canis rabidi morsum vnicum remedium oraculo quodam nuper repertum, radicem sylvestris Rosæ quæ Cynorrhodos appellatur. Spongiolæ ac fructus Cynorrhodi plurimū valent contra calculum, & vrinæ difficultates, si leuigatæ in puluerem exhibeantur.

Li.21.ca.19.

Lib.8.c.47.
&c.8.li.25.
Fu.h.c.254
Dodo.li.6.
c.1.

PRVNVS SYLVESTRIS. CAP. III.

Nomina

PRVNVS sylvestris Græcis κοκκυμηλέα ἀγρία, siue ἀγριοκοκκυμηλέα dicitur, Gallis *Prunelier*, & *Prunier sauvage*, & *Pelossier*, Germanis *Schlehen*. Etymon nominis est, quod magnitudine & rotunditate Cocci, mala ferat. Virgilius masculino genere Spinum hoc hemistichio, & Spi-


Li.4. Geor.

PRVNVS sylvestris.

Locus.

Forma.

Li.2. Alim.

Tempe-
ram. &
Vires.

nos iam Pruna ferentes, appellat auctore Seruio, quem constantissimè alij sequuntur, ut refragari non liceat. Nascitur vbiuis in sepibus, cum Rubis & Dumis aliis, quorū & ipsa genus est. Frutex est, & vix in arborem magnā adolefcit, radice lenta, lignosa, longe, latēque serpente, ex qua multos producit ramos, pungentibus aculeis horrentes: folia satiuæ Pruno similia, sed multo minora: fructus rotundus, Prunis satiuis minor, gustus acerbi, & plurimum adstringentis, quem ἀγριοκοκκυμηλὸν appellari scripsit Galen. & in Asia πρέμνον, Latini Prunum sylvestre vocant, Prunellum, & Prunulum, Galli *Prunelle*. Theophrastus cap.7.lib.3. Historiæ, ἀποδιάδα, vel, ut apud Athenēum legitur lib.2. σπονδιάδα, vocat. Pruna sylvestria refrigerant, siccant, & adstringunt. Ipsorum succus aluum sistit, aduersus ventris & sanguinis profluuium, fœminarūque fluores plurimū valet. Ex iis coctis succum expressum, insolūtū, ac tessellatim diuisum, vsurpamus Acaciæ veræ

veræ loco, minimo errore, inquit Siluius, quia refrigerat, siccatur, astringit, ut veterum Acacia. Syluestrium quidem Prunorum bacca, inquit Plinius, vel è radice cortis in vino austero si decoquantur, ita ut triens ex hemina supersit, aluū & tormina sistunt. Satis est singulos cyathos decocti sumi. In syluestri satiuāque Pruno reperitur limus arborum quem Græci lichena appellant, rhagadiis & condylomatis mirè utilis.

Lib. I. m.
simp.
Lib. 23, c. 7.

GROSSULARIÆ CAP. IIII.



N veteribus Græcis ac Latinis frutices tres quos hîc exhibemus cogniti fuerint, multi dubitant. Quia complures incognitos fuisse affirmant, eorum vulgaria, & quibus omnes herbarij hodie vtuntur, nomina vsurpabimus. Eorum primus Vua crispa nominatur ab intortis, ferèque in circulum versis (ac veluti crispis,) foliis, & acinis quos producit. Nōnullis Vua marina, à pluribus Vua Crespina, vulgo nostrati quod

Nomina
Fuch. c. 68.

GROSSULARIA

Alba.



grossorum exiguum quandam referat imaginem, Grossularia nuncupatur: Groselher, Germanis Kruselbeer: quibusdam Vitis Precia Plinij, sed perperam, quia Vitis Precia vinifera est. Post Rhamnos Theophr. Ifos vel, ut alij legunt, Oesos memorat, quorum alius est flore fructūque candidus, alius flore fructūque niger. Ifon, vel Oeson candidū nonnulli Grossulariam nostram esse arbitrantur, de quorum iudicio post hac amplius differemus. Gesnero Vua Crispa Ceanothus spina Theophrasti videtur esse. Ceanothon Anguillara Carduum esse credit, satis vulgarem, quem Patauini rustici Astoni vocant: sed de hoc aliās. Vua Crispa frutex est radice gracili, dura, lignosa, fibrata: ramulis multis, candicantibus, aculeatus, rectoque spinarum mucrone horridus: foliis ex viridi pallentibus, Apij modo dissectis: flore ex herbido purpurascēte: acinis cādicantibus, primū acerbis, à maturitate splēdescētib, flauescētib, nōnunquā subrubescētib, sub dulcibus. Is fructus Grossula à nostris vocatur, Groselle. In Gallia passim frutetis & se-

Lib. 3, Hist.
cap. 17.

In hort.
Germ.
Lib. 4, Hist.
cap. 11.
Forma.

pibus nascitur. Seritur etiā in hortis. Veris statim initio frutex iste pubet, Primū folia, dein flores, ac nō ita multo post acinos seu baccas proferens. Fructus immaturus, tunc enim magis in vsum venit acerbæ vuæ loco, frigidus siccusque ordine secundo, astringit, eiusdem ferè cum vua acerba facultatis. Quare grata placet acerbitate, magnamque à palato init gratiam, & iuribus innatat. Appetentiam excitat: feruentem bile ventriculum refrigerat, incoctus iusculis febrientibus vtiliter exhibetur: maturitate dulcescit in cibum, qui tamen lautioribus mensis repudiatur, grauidis mulieribus, tam maturus, quam immaturus valde expetitus: Immaturus alui fluorem, & sanguinis profluuium cohibet, maximè succus ab eo expressus, siccatusque. Idem fructus inflammationibus, & erysipelatis vtiliter admouetur. Ad idem valent folia, sed minus efficacia. Recentia & cruda si edantur, vrinā cient, & calculosis prosunt. Alter frutex Grossularia rubra, & Vua transmarina à vulgo vocatur, à nostris Groselher rouge, & Groselher

Locus.
Temper.
Temper.
& Vires.

Nomina

GROSSULARIA

Rubra.

In Hort.
Germ.
Forma.



Locus &
Temper.
Ribes of-
ficin.
Matth. li. i.
Diosc. c. 105.

Vires.

Li. de Co-
nif.
Ibidem.

In Hort.
Germ.

Ibidem.

Nomina

Forma.

Vfus.

Tempus.

Locus.

Lib. 3. Hist.
cap. 17.

Grosellier d'outre mer: Officinis Ribes nominatur, Gesnero Ceanothus laevis. Germ. *S. Iohansz treublin, oder beerlin*. Ramis est lignosis, lētis, cortice furuo opertis: foliis latis, nigricātibus, vitigineis, vel Populo albæ similibus, sed minoribus inter quæ flores emergunt racematim congesti: dein bacca primū virides, cū maturuerunt rubræ ex pediculis longis tenuibusq; pendulæ, sapore subacido, admixta quadam dulcedine, magnitudine Piperis. Nostri *Groselles rouges*, & *Groselles d'outre mer*, appellant. Frutex hic nullis spinis horridus est, sed toparius magis, in Sequanorum & Allobrogū montibus nascitur sponte, à nobis vero in hortis cultus eleganter sepit illorum pulvinos thoros & areas. Iulio mense fructus maturi, adstringunt, frigidi sicciq; ordine secundo. Qui hunc fruticem Arabum Ribes esse credunt, valde allucinantur. Nam vt Serapio scripsit, Ribes arbor est, capreolos proferens, è viridi rubescentes, folia lata, magna, rotunda, quæ sanè notæ huic nostræ plantæ minime conueniunt, vt ex pictura perspicere licet,

tametsi fructus Ribis fructui qualitatibus similis sit, acidus scilicet, simul & dulcis, qualem esse Ribis fructum Serapio tradidit: quare eadē quæ Ribis fructus præstare potest. Febribus igitur acutis opitulatur, æstuantem ventriculum refrigerat, sitim restinguit, nauscam ac vomitum sistit, cibi appetentiam inuitat, cœliacos, & lentericos biliosis defluxionibus vexatos iuuat, sanguinis feruorem mulcet, bilis acrimoniam retundit, eiusq; impetum domat. Laudandi igitur Pharmacopœi, qui ex huiusmodi fructu vinum exprimunt, & in hos vsus recondunt. Bellonius Ribem Serapionis sese inuenisse scripsit in summo cacumine montis Libani, foliis Oxylapathi, grandioribus, retusioribus, è quorum medio racematim exeunt bacca rubentes, vt in Hypoglossō, Rusco, Lauro Alexandrina. Eius porro iudicio Matthiolus non subscribit. Neque enim Serapionis Ribes folia habet Oxylapathi, sed rotunda, baccas è mediis foliis nō exerit, & Capreolos habet, quibus Bellonij Ribes caret. Huius Grossulariæ rubræ, siue Ceanothi lævis genus, proceritate sesquicubiti circa syluas quasdam ditionis Bernensium, Heluetiorum prouenire scribit Gesnerus, & à rusticis *Keozbeer* dici, quod tussi medeatur. Tertius frutex quibusdam Ifos, siue Oesos niger. Theoph. Grossularia nigra, est aliis Pipirella, à baccis magnitudine, colorēque Piperi similibus, Officinis Ribes niger, Gallis *Poiurier*, & *Groselier noir* dicitur. Frutificat vt Ribes ruber, eiq; ramulis, foliis, flore, fructu similis est, nisi quod huius folia latiora, odorem nonnihil grauem cum manduntur, sed non ingratum spirant: fructus niger, ex subdulci austerus, *Groselles noires* nobis appellatur. Quidam acetariis, iusculis, condimentis viridibus admiscunt, salubremq; eius vsum esse prædicant: nullius alioqui in medicina est vsus. Floret, fructūque edit eodem tempore quo Ribes ruber. Sponte in locis humidis, & incultis nascitur, in aggeribus fossarum, & fluuiorum ripis. Ne quid verò hic prætermittatur quod attentum Lectorem torquere possit, obseruandum Theophrastum de fructibus & arboribus tractantem, quæ vno genere comprehensæ, priuatis quibusdam

notis

GROSSULARIA

Nigra.



notis inter se differūt, exempli gratia memorasse ῥάμνον, ἰσον, κιτλόν, βάτον, quorum differētias sigillatim persequitur, & Iſi vua Oeſi præcipuè, qui nunc candidum florem & fructum gignit, interdum nigrum, interdum mediū, nec coloris albi dilutioris, nec craſſi vini modo nigreſcentis, ὀνωπὸν vocat, ſed ad purpuram inclinantis. At cū doctus quiſpiam & acris iudicij vir, pro Iſo planta incognita, ad marginē ſcripſiſſet ὀισος, qui poſt tranſcripſerunt, & ὀιτον loco τῷ ὀισον immiſerunt, & non deleta voce ἰσος literæ Theophræſti interſeruerunt, gemino errore, quo Gaza etiā inuolutus eſt: ὀισον quidam Amerinam eſſe volunt, quā Galli Pariſienſes, ſeruato Græco vocabulo adhuc vocant *Oſier*, coloribus à Theophræſto recitatis variā. At illorum ſententiam vanam id demonſtrat eſſe, quod ὀισος ſpecies omnes fructum edunt, qui Amerinæ, & Salicibus nullus eſt. Vero propius fuerit, quod ὀισον Agnum eſſe quidā cenſent, in eaq; arbore conſpici floris ac fructus tres illas differentias à Theophræſt. recitatas.

Ideoq; Plinium cū indicatum locum Theophræſti verteret, in genera duo Viti- cem diuiſiſſe, alterum floris è candido purpuraſcentis, alterum purpurei. Ceterum inuenio Theophræſtum Agnon, quam Amerinam inſcitè Theodorus vertit, priuatim nominariſſe vt plantam ab Oeſo diuerſam. Euaſtathius clarus ſanè Homeri interpres magna inconstantia nunc λόγον ὀισον appellari tradit, & ὀισόκαρπον ἀγνόκοκκον exponit, nunc ὀισόταν ſpinoſam plantam eandem eſſe cum Oeſo putat, cū Agnus minimè ſpinoſus ſit, ſicut nec Amerina, nec Salix, nunc hoc verſu ῥιπίσι διάμπερες διουίνουσι, ſportas exponit contextas ex Salicis viminibus. Hæc Dalechampius.

Li. 24. ca. 9.

Lib. 1. Hiſt. cap. 5. & 22.

VVA VRSI CAP. V.



A GALENO ἀρκίου σαφυλὴ hęc planta nominatur, id eſt, Vva Vrſi, quæ radicibus eſt craſſis, numeroſis, caudice recto, firmo, candicante, vel ſubcinereo, ſimili eius arboris quam pro Oxyacantha Matthiolus exhibuit: ramis multis, longis, huc illuc diffuſis, ſpinis crebris, validis, ſubrectis, atrociter pungentibus: foliis Arbuti, ſive Pyri ſylueſtris, venoſis, in ambitu diſſectis: floſculis aceruatim congeſtis, ex luteo rubentibus: fructu ſimiliter ex aureo colore ad coccineum vergente, denſius coaceruato, rotundo, acidi guſtus. Naſcitur in Alpinarum gentium Brammouicum, & Ebrodunenſium ſaxoſis conualibus: maximè qua torrentes præcipiti curſu vicinas terras glarea & arenis obruunt. Prouenit & in agro Senenſi Hettruriæ prope Alcinum montem. Galenus ad hæmoptoicos Pharmacum Arrhabiani, quod Ponticum dicitur, ſic deſcribit. Vvæ Vrſi lib. xvi. aquæ pluuiæ ſextarios xvi. Coquito ad tertias, & expreſſum liquorem reponito. Quibus mox ſubiungit. Quæ Vva Vrſi appellatur, in Ponto naſcitur. Planta eſt humilis, & fruticoſa, folio Memacyli, fructum ferens rubrum, & rotundum, guſtu auſterum, quem

Lib. 7. med. part.

Forma.

Nomina


Li. 1. Dioſc. cap. 105.

Locus.

Ibidem.

Vires.

VVA VRSI.



Corol. 124.
lib. I. Diosc.

Li. I. ca. 106.

Vuam Vrsi appellant. Sunt qui Ribem rubrum, quem descripsimus Vuam Vrsi esse putant, quorum sententia ex Galeni verbis modò citatis facilè refelli potest, vtpote qui scribat Vuam Vrsi folio Memæcili virefcere.

OXIACANTHA.

CAP. VI.

EX senticosis stirpibus quibus abundamus, quænam sit ea quæ Oxyacanthæ nomine à Dioscoride describatur, inter auctores ambigitur. Rura, inquit Hermol. Oxiacanthā Crispinam, quasi acrem Spinam vocant, ex cuius Acinis vinum etiam conficitur, Crispinum vocatū, eodē ferè vsu quo vinū ex Malo Punico. Singulares in Acinis quibusq; nuclei sunt. Acini oblongi, racemosi, congesti, folia quoque oblonga. Ruellius Hermolaum secutus, scribit Oxyacantham à Gallis, quod huius

Lib. Histo.
plan. c. 205.
Lib. 3. ca. 21.
Embl. 101.
li. I. Diosc.
In li. I. Diosc.
cor. c. 123.
Li. 8. simp.

Acinis vinum exprimatur, Spiniuineta vocari, ab aliquibus acrem Spinam. In eadem sunt sententia Fuschius, Tragus, Cornarius, & recentiores ferè omnes Medici, quibus dum aduersatur Cordus, Oxyacanthæ nomine scribit cōfundi apud auctores duos frutices natura diuersos. Aliā enim esse Dioscor. Oxyacantham, aliam Galeni. Dioscor. Oxyacantha, pyracantha est, id est albus Spinus. Galeni Oxyacantha est Berberis Officin. Cordi sententia. Et Dioscor. quidem Oxyacantham non esse Spiniuineta, siue Berberim Officinarum ex ipsa descriptione probat: quia Spiniuineta diuersissima à Pirastris figura sit. Pirastrer enim plerumque singulari caudice assurgit, non ita recto, in diuarcatos & intortos ramos diuiso, at Spiniuineta pluribus virgis, fruticis modo se attollit, iisq; rectis. Piraastro antequam senescat cortex est lævis, glaber, in flauo spadiceus, in cæcio candicantibus maculis variegatus: Spiniuinetæ longè diuersus colore, in ipsa adolescentia rimosus, & rugis contractus. Spiniuinetæ fructus quidem ruber est, sed Myrti baccae dissimilis. Ea enim rotunda est, ille oblongus, & vtrinque acuminatus. Præterea Oxyacanthæ fructus à Dioscoride *ὄξυανθος*, id est friabilis describitur, Spiniuinetæ bacca, quoniā lenta cute succu lentam carnem continet, friabilis esse non potest. Nam friabile non de re lenta, humida, & succosa dicitur, sed arida, & fragili, quæ digitis facilè, velut in puluerem atteri queat. Quare aliam esse Oxyacantham à Dioscor. descriptam, contendit Cordus, à Galeni Oxyacantha, cui adstringendi & incidendi vires tribuit, in Berberi Officinarū manifestas. Vt autem quæ sit Dioscoridis Oxyacantha explicet, annotat Dioscoridē inter Oxyacanthæ synonyma *πυράκανθα* numerare, quæ vox cum apud nullum auctorem extet, perperam exaratam fuisse suspicatur. Cum verò Dioscor. ipse hoc eodem libro de Mespilo agens Pyracanthæ meminerit, eam esse censet quæ hîc corrupto nomine *ὄξυανθα* vocatur, facili scribentium lapsu. Dioscoridem igitur pro Berberi, quæ vera est Oxyacantha, Pyracantham descripsisse iudicat, eamque Oxyacanthæ nomine descriptam Pyracantham esse Spinam, quæ inter arbores à veteribus Latinis simplici

Lib. I. c. 105.

Cap. 133.

simpliciter Spina, à Gallis *Aubespina*, id est Albus Spinus, à Germanis *Hagedorn*, nominatur. Hæc enim habitu figuraque Piraastro similis est. minor tamen, spinosiorque. Fructum fert Myrteis baccis æqualem, rubentem, nucleos intus habentem, omnisque succi expertem, ideoque friabilem. Idem testatur Plinius, inquit, cum dixit Aquifoliae & Spinæ baccas sine succo esse. Accedit etiam foliorum figura, quæ Apio similia sunt. Nam talia Pyracantha habere debet, Dioscoride Mespili Aronia, scilicet folia cum Pyracanthæ foliis comparate, & Theophrasto Mespili Anthenoidis, quæ Aronia Dioscoridis est, folia Apio similia describente. Hæc Cordus. Cui alio in loco de Sorbo aculeata, id est Pyriacantha tractanti Gesnerus album Spinum appinxit, annotavitque Oxyacantham Dioscoridis videri, & Spinam Appendicem Plinij. Idem Gesnerus alibi Oxyacantham Dioscoridis, Spinam albam vulgo dictam arbusculam videri ait, & Plinij Spinam Appendicem, & simpliciter Spinam. Matthiolus acutissimè eos refellit qui Oxyacantham Vuam Crespinam, siue Crespinum esse credunt. Dioscorides enim, inquit, Oxyacantham Piraastro similem esse scribit, minorem tamen, spinosiorèmq; & fructum ferre Myrti similitudine, plenum, friabilem, rubentem, & intus nucleum, radicisque subesse multifidas, & altè descendentes: ex quibus perspicuum est alias Oxyacanthæ notas non expressisse quam proceritatis, crassitudinis stipitis, ramorum, radicum, ac fructuum, omissa foliorum, florum & corticis historia, quæ qui accuratius expendit, Crespinum is notis omnibus Piraastro dissimilem esse comperiet. Nam sylvestris Pirus simplex è solo profilit, vno duntaxat caudice attollitur, atque tandem ita crescit, ut in proceritatem arboream confurgat, Crespinus verò nullum ab radice caudicem emittit, sed furculis multis stolonibusque fruticat, qui virgarum modo crescunt, nec unquam arboreescunt, nisi rarò, longoque tempore: omnium enim maximi pollicarem crassitudinem vix excedunt, raroque hominis altitudinem æquant. Præterea Piraaster cortice integitur aspero, crasso, squamoso, Crespinus albo, læui, multum tenui, adeo ut vel leuissima lapide, aut ferro illata plaga disrumpatur, croceusque subtus color appareat. Adhæc licet Pirus sylvestris, Pruni sylvestris modo aculeata sit, ramique frequentibus horreant spinis nigris, validis, tamen singulæ ex vno tantum loco erumpunt, in Crespino verò ternæ ex eodem loco, albæ, planæ, nec rotundæ, nota insigni, nec à Dioscoride prætermittenda. Iam verò Oxyacantha fructum fert Myrti magnitudine, Crespinus autem racematim Vuæ modo, Acinis oblongis, rubentibus. Præterea Crespini folia Aronia Mespilo similia non sunt, sed potius Malopunicæ, latiora, nec tam in mucronem desinentia, per ambitum Spinis tenuissimis, frequentissimisque horrida. Radices quæ crocei sunt coloris, multæ quidem, sed tenues, nec altè descendentes ut Oxyacanthæ, & in obliquum summo cespite vagantes. Denique flos à Piraastri flore plurimum dissidet: est enim melinus, ex racemo Vuæ simili prodit fruticis sui colorem referens, qui dum sese pandit, suauissimè spirat. Ex his effici vult Matthiolus Dioscoridis Oxyacantham, quæ & Oxyacanthos dicitur, id est acuta Spina Crespinum non esse, sed eam aculeatam arborem, stipitem, corticem, ramis, proceritate, floribus, ligni materie Piraastrum planè referentem, quem Itali *Bagaia* vulgò nominant, Ananienses, & Tridentinarum vallium incolæ quidam *Amperlo*, alij *Pan d'orso*, Goritienses *Barazzo bianco*, Arabes *Amirberim*, seu *Amyrbarim*, seu *Berberim*, Galli *Aubespina*, Hispani *Pirlitero*, Germani *Hagedorn*, Boemi *Hloc*. Id apertè demonstrant arboris stipes, rami firmis, acutissimisque spinis armati, à quibus arbori nomen, ligni materies, subscaber squamosusque cortex, veluti Piraastro, flos albus Piraastro haud absimilis, fructus Myrti crassitudine, rubescens, plenus, friabilis ori subaustris, quo, modò vnus, modò plures conclu-

Lib. 15. c. 24

Li. 3. de pl. cap. 7.

In hort. Germ.

In li. 1. Dioscor. ca. 105.

Nomina

Forma.

OXYACANTHA,

Acuta Spina Matthioli.

Lib. I. ca. 133.

Lib. 3. Hist.
cap. 12.Lib. I. Hist.
ca. 15. & lib.
3. Hist. ca. 4.Li. 16. c. 20.
& 21.

Locus.

Temper.

Temper.

Vires

Dodo. li. 6.

cap. 31.

Lib. I. c. 105.

Li. 8. simpl.

Lib. I. Hist.
ca. 15. & lib.
3. cap. 4.Li. 4. Hist.
cap. 4.

duntur nuclei: radices in altum descendentes. Folia quidem à Piraastro dissident: Apij modo dissecta, pauloque longiora: hoc tamen sententiam Matthioli labefactare minime potest: similitudines enim ex pluribus partibus potius sumi constat, quam ex paucioribus. Quali ergo folio sit Oxyacantha Dioscor. non explicat, sed tantum dixit esse arborem Piraastro similem, quod magis ad stipitis, corticis, ramorum, florum delineationem, ligni materiam respiceret, quam ad folia, quæ nihilominus qualianam sint, ex ipso Dioscor. & Theophrasto colligere licet, quoniam Dioscor. de Aronia Mespilo agens, scribit eam arborem spinosam esse, foliis similem Oxyacanthæ (alii Pyracanthæ legunt, ut diximus) Theophrastus verò Anthenoïdis Mespili folia dissecta esse ait, quæ, ut monuimus, Aronia est, & per extrema Apio similia. At Theophrasti ipsius auctoritate fretus, poterit aliquis sententiam Matthioli oppugnare, quod locis duobus Oxyacantham inter eas arbores recenset, quæ perpetua

fronde virent, cum Oxyacanthæ nostræ folia, decidere omnibus constet. Sed hos locos mendosos esse ex eo intelligere licet, quod Tiliam Myricam, Quercum, Terebinthum inter, perpetuifolias numeret, id autem falsum esse sciunt omnes qui has plantas cognoscunt. Hoc itaque loco pro Oxyacantha Pyxacantham docti viri reponunt. Nec Plinius easdem arbores ex Theophrasto recensens, Tiliæ, Quercus, Oxyacanthæ meminit. Hæc est Matthioli de Oxyacantha sententia, hæ rationes quibus eam confirmavit. Oxyacantha in Dumetis, sepibus, & agrorum limitibus frequens provenit. Maio mense floret: fructus Septembri maturescit. Is refrigerat & adstringit. Potu aut cibo, inquit Dioscorides, alui profluuium, & abundantiam sceminarum sistit. Radix illita aculeos, & spicula extrahit: abortum fieri tradunt, si ter radice venter, aut sensim feriat, aut perungatur. Oxyacanthus arbor Galeno, ut Piro similem habet speciem, ita & vires similes. At fructus Piri sylvestris prorsus acerbus est, Oxyacanthæ verò, cum partium tenuitate, modicam incidendi vim habet. Cæterum Oxyacanthæ fructus, Piri sylvestris fructui similis non est, sed Myrti, rubens, & rarus (αδρὸς videtur legendum ex Dioscoride, id est plenus pro ἀπαρὸς.) Habet item & nucleos. Porro non esu tantum, sed & potu affectus omnes fluxionū quos ποῶδες Græci vocant, cohibet. Serapio eadem ad verbum transcripsit de Amirberi, seu Berberi tractans, quæ Dioscorides & Galen. de Oxyacantha tradidit. Anguillara eorum sententiæ vix assentitur qui Oxyacantham illam esse putant, quæ Italarum vulgo *Spinbianco* dicitur, tum quod Theophrastus Oxyacantham inter arbores perpetuæ frondis numeret, tum quod Mali Medicæ spinas, Piri aut Oxyacanthæ spinis comparet, quæ in Spinum album competere non possunt. At Matthiolus priorem locum falsi suspectum esse ostendit: Spinarum verò Mali Medicæ, cum Piri aut Oxyacanthæ spinis comparatio non inepta. Est enim Pirus quædam sativa, spinis armata, Lugduni satis frequens, quam ideo *Poirier d'espine* vocant, & fructum

Poire

Poire espine. Fructus is magnus est, viridis, qui in seram hyemem prorogatur & durat, gustus suauissimi, præsertim cum in pruna coctus apponitur, insperso saccharo. Surculos ex Neapoli, huc allatos fuisse olitores aiunt. Hæc profecto Pirus est, cuius spinas cum aculeis Oxyacanthæ comparat Theophrastus, nec immerito: sunt enim inter se prorsus similes. Multo meliore ratione, sententiam illam oppugnat Anguillara, cum scribit Oxyacanthæ à Galeno & Dioscoride tributas facultates albo spino minimè conuenire. Huius enim fructus non acerbos, sed dulces, maximè cum maturi sunt, aluum ducere magis quàm adstringere, & mulierum fluores elicere potius quàm cohibere. Hæc Anguillara. Certè vulgus Gallicum, vt scribit Ruellius, deturbandis calculis vtitur acino, singulari remedio, ex vino, quem peculiari vocabulo Senelle nominat. Rustici viuas sepes hoc frutice extruunt, quæ pecus minacibus aculeis valenter arceant. Dos eius omnis in odore, tametsi non defuerint, qui tradant hanc stirpem, instar Lauri fulmine non ici, nec vnquam de cælo tangi. Aiunt quoque pisces marinos floris odore tactos statim corrumpi, quod Ruellius arbitratur, fragranti grauitati acceptum ferendum. Huius rei piscatores gnaros florem deuitare. Mirum est, inquit, si fulminis ictum tuta respuat. Sed fama tantum hoc didicit nullo certi scriptoris testimonio. Pisces verò non ob odoris florum Oxyacanthæ vehementiam, aut noxiam aliquam qualitatem, vitium contrahunt, sed quoniam Maio iam progressu arbor illa floret, quo tempore ob æstuosum cælum pisces qui è mari vehuntur in vrbes procul remotas corrumpuntur.

Lib. 3. ca. 12.

BERBERIS OFFICINARVM, CAP. VII.

PLANTA hæc à Sepalsiariis Berberis nominatur, ab Italis *Cressina*, à Gallis *Espine vinette*, à Germanis *Ponsselbeel*, *Saura h*, *Versich*, à Boemis *Drac*, siue *Dristal*, ab Anglis *Berberis*. Plinij Spinam Appendicem esse multi credunt. Frutex hic è terra surculos plurimos mittit, coryli modo, ab imo ad summum spinis armatus acutissimis: longis, compressis, albicantibus, fragilibus, ternis ex eodem loco prodeuntibus. Cortex extimus totius fruticis candidus, læuis, tenuis, interior autem exilior, & ligno proximus flauus, ac cerusei, ligni materies alba, fragilis, fungosa. Numerosæ radices valdè flauæ, per summa terræ sparguntur. Folia ex viridi candicant, Punicæ similia, sed tenuiora, latiora, minùs acuminata, toto ambitu spinis tenuissimis horrentia. Flores sunt lutei, racematim congesti, odoris non ingrati. Fructus sunt Acini oblongi, racemo penduli, Punicæ Mali Acinis haud absimiles, quanquam oblongiores, paruis intus conclusis nucleis, qui maturi maximè rubent, gustuque sunt acido, & subaustero. Ex his vinum exprimitur, quod vinum ex Berberi falsò vocant Officinæ, acerbius acidiùsque Malorum Punicorum succo. Id in acutis, pestilentibusque febribus zulapio violaceo permixtum cum aqua vtiliter exhibetur. Etenim non modo sitim extinguit, sed biliosas pestilentésque exhalationes suppressit. Datur commodè cœliacis, cibum reiicientibus, dysentericis, iisque quibus bilis à iocinore in ventriculum regurgitans, cholemicum excitarit affectum. Tam sumptum quàm admotum mensium profluvia cohibet. Tineas ventris enecat, præsertim si bibatur ex aqua Graminis, vel Portulacæ, vel Abrotoni, addito sacchari tantillo. Prodest cruentis excreationibus, firmat commotos dentes, si eo sæpius foueantur, gingiuas roborat, gargarizatu faucium & Vuæ inflammationes discutit, atque destilla-

Nomina

Lib. 24. c. 13.

Forma.

Matth. li. I.

Diosc. c. 105

Vires.

BERBERIS

Officinarum.


Ruel. lib. 1.
cap. 106.

Lib. 24. c. 13.

Dodo. li. 6.
cap. 21.

Locus.

Tempus.



tiones eo confluentes reprimat. Vulnere recentia in carnis superficie glutinat, & vlcera vetera deficcat. Nocet iis qui ventriculi doloribus ex flatu & frigidityte ortis vexantur, atque etiam agrè spirantibus. Condiuntur item Acini vel melle, vel faccharo ad restinguendam sitim, depellendamque febricitantium inappetentiam, quorum morosum nimis palatum cibum ferè quemcunq; respuit. Nam elanguescens appetitus cibi mirum in modum grato huius acore recreatur. Spina Appendix appellata, inquit Plinius, quoniam bacca Puniceo colore in ea Appendices vocantur. Hæ crudæ per se, & aridæ in vino decoctæ, aluum citam, & tormina compescunt. Lixiuio in quo radix maduerit sæpe eloti capilli flauescunt. Ex foliis viridibus, quemadmodum ex Oxalide, succus in ciborum condimenta exprimitur refrigerans, & appetentiam inuitans, atque biliosis, & febricitantibus perutilis. Frutex hic multis locis nascitur, nempe syluis, frutetis, campestribus, montanis,

ficcis, & aquosis. Germinat ineunte vere, ab occasu Virgiliarum fructum præbet, qui per Septembrem mensem, & Octobrem demetitur, campos & sylvas exornans.

RHAMNVS, CAP. VIII.

Lib. 1. c. 102.

Lib. 3. Hist.
cap. 17.Genera
Li. 24. c. 14.Embl. 98.
lib. 1. Diosc.

Lib. 1. c. 102.

RHAMNI historia, si vlla alia, valdè est perturbata, atque impedita, & ob variam de iis scribètiū tractationem magna obscuritate inuoluta. Ac primùm Dioscoridis caput, quo de his agit, apertè corruptum, multisq; modis deprauatum esse ostendunt tres asterisci, in contextum inserti eius exemplaris, alioqui fidelissimi, quo Ruellius vsus est. Primus φύλλα μικρά * ὑπομήκη, &c. Secundus, ἐπὶ δὲ καὶ ἑτέρα * λευκοτέρα, &c. Tertius εἰκὼς * ἀσποδέλω. Deinde Theophrastus duo duntaxat Rhamni genera facit, candidum & nigrum, diuersumq; ipsorum fructum, vtrumque tamen spinosum. Plinius item duo, quæ inconsideratè Ruborum generi adscribit. Eius verba quia à Dioscor. sententia variant, & alioqui corrupta leguntur, ex veteri manuscripto Codice à Cornario emendata adscribam. Inter genera Ruborum Rhamnus appellatur Græcis, candidior, fruticosior, ramos spargens rectis aculeis, non vt cæteri (vel Rhamni, vel spinosi frutices) aduncis, foliis maioribus. Alterum genus eius sylvestre, nigrius quadantenus rubens, fert veluti folliculos. Huius radice decocta in aqua fit medicamentum quod vocatur Lycium (id porro falsum esse norunt herbarij omnes) Semen secundus trahit. Hoc Dioscor. minimè habet. Galenus, & eum secuti Paulus, atque Ætius, velut de vno solùm genere, aut certè de vna omnium facultate, omisis eorum differentiis loquuti sunt. Dioscorides tria genera descripsit, cuius breuitas, & inemendata librorū nostror


nostrorum lectio, ut diximus, in ambiguo multos habet, quinam ex tot dumis Rhamni dici possint. Dioscoridem siue is ex Andrea, siue ex Crateua Rhamnorum historiam concinnarit, certe Oribasius, & Serapio secuti tria quoque Rhamni genera memorant, Paliuri mentione à neutro facta, celebris alioqui plantæ, & facultate sua, qua vesicæ lapides exterit, insignis perinde ac si Rhamnorum historia inuoluatur, aut eorum genere contineatur. De utroque tamen seorsum dicemus ex Diosc, qualia qualia sint eius exēplaria. Rhamnus, inquit, fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos Oxyacanthæ modo, foliis paruis, oblongis, subpinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus, latioribusque foliis constat, & quadantenus rubentibus, cuius rami quinum ferè cubitorum sunt longitudine, spinosiores quidem, sed infirmioribus, minúsque rigentibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tenue, folliculari specie, verticillo similem. His, diuersi auctores diuersas plantas aptarūt. Cornarius & Tragus Rhamni genus esse existimarunt fruticē eum quem Vuam crispam siue Grossulariam appellari diximus. Item aliud Tragus, Hermolaus, Ruellius, quem Spinum ceruinū, Itali, *Burgam spinam*. Galli vocant. Prima Rhamni species, inquit, Anguillara, omnium sententia ea est, quæ Romæ *Spino santo* nominatur, à Sānitibus, *Spino di Christo*, à Marcello lib. de re medica, Salutaris, & Spina alba. Salutaris herbæ fasciculū, inquit, idest, Spinæ albæ qua Christus coronatus fuit. Cordus etiam Rhamnum à Latinis Albam spinam dici testatur, prudenter interim nos monens ne stirpes diuersas hoc nomine confundamus. Nam præter Rhamnū spinam arborecentem, Albæ spinæ nomine passim ab auctoribus in herbaceo genere duo Cardui indicantur. Secunda species, inquit idem Anguillara, priori in omnibus similis est, nisi quod candidior, foliis longioribus & tenuioribus, in Illyrico copiosa, ex qua sepes conficiunt. Tertiam Rhamni speciem in Diosc. supposititiā esse autumat: quia in eius descriptione sibi ipse refragatur, ut pote qui fructum eius dicat esse latum, candidum, tenue, veluti folliculum, Hastulæ regię similem. Fructus verò eius Rhamni quem repræsentant, & si latus sit, nimirum cōpressus, minimè tamen Aspodeli fructui similis est, rotūdo, non compresso. Sed hæc ratio deprauatæ lectionis correctione facile refelli potest. Neque enim dicitur à Dioscoride tertij Rhamni fructus *εὐκλὺς ἀσποδελῶ*, sed *εὐκλὺς σπονδυλῶ*, id est similis verticillo. Ad hæc spinæ eius infirmæ non sunt, quales Diosc. esse vult. Præterea Theophrastus duo duntaxat Rhamni genera posuit, Rhamnósque perpetuo esse folio, Paliurum minimè. Matthiolus tria Rhamni genera statuit. Primum in sepibus nascens, cuius longis aculeis Hetruscæ, mulieres ficus recentes perforant, & ad solem appendunt. Hos Oxiacanthæ modo fert: folia oblōga, mollia, subpinguia: caulem habet album, læuem, & rubentes inter folia baccas. Hic spinosus Matthioli frutex ad Rhodani ripas & glareosa vada frequentissimus visitur, sæpè humilis, nonnūquam ad hominis proceritatem assurgens, cortice cinereo, ramis firmis, ex quibus surculi hinc illinc oriuntur, per interualla foliis brevioribus vestiti, spinas per interualla proferentes, & semper in rigidum aculeum desinentes, qua nota ab aliis discrepat. Fructus est circum ramos copiosus, rotundus, cum maturuit phoeniceus, folliculo aut vesiculæ similis, succo luteo plenus, acidi gustus, nec ingrati, cuius Omphacij vice ad ciborum condimenta vsus esse possit. Gratianopolitani vocant *Des Argouffes*. Tertium Rhamni genus Matthioli cæteris nigrius est, quinum ferè cubitorum longitudine, infirmioribus aculeis aliis, rectis, aliis incuruis, foliis latioribus, solidioribus, neruosioribusque: floribus muscosis, subcroceis: fructu tenui, folliculari specie, rotundo, verticillo haud absi-

Lib. I. c. 102.

Forma.

Nomina


In cap. 102. lib. I.

*RHAMNVS**Primus Matth.**RHAMNVS secundus**Dodonai, primus**Penz.**RHAMNVS**Secundus Matth.**RHAMNVS secundus**Monspelienisium**Penz.*

mili, in cuius medio nucleus est durus, rotundus ciceris ferè magnitudine, in quo semen concluditur, lentis instar compressum, rubro cortice, & alba intus medulla

medulla. Secundum genus cæteris candidius est. Hæc Matthiolus, Penæ Rhamnus primus frutex est in Italiæ, Galliæ, & Hollandiæ, maritimis locis multis nascens, ab imo ad summū ramosus, aculeatus, furculis albidis, foliis angustioribus, multis, Chamælææ longioribus, fructu iuxta alas denso, racematim congesto, Asparagi, aut Agrifolij, minore, succo flauo turgido. Hunc pro Rhamno secundo Dodon. pinxit & descripsit. Idem Pena Rhamnum secundum Mompeliensium, magis exquisitè Dioscoridis notis respondere ait, quam secūdum Matthi.

RHAMNUS 1. Clusij.



Tota planta alba est, cortice ex viridi pallefcēte, foliis Oleæ, sed candidioribus, floribus minoribus. Clusius Rhamnos tres exhibuit. Est autem primus frutex faciēdis sepibus idoneus, ramis rectis, in multa virgulta sese findētibus, candidis, validis ac firmis aculeis ridentibus, foliis plerumque quaternis aut quinis ad singularum spinarum exortum, oblōgis, subpinguibus, Oleæ similibus, subalbidis, teneris, & succulentis, quæ Autumno nouis succrescentibus, interdum decidunt: flores longiusculi, candicantes, extremis oris in quinque crenas diuisi, quibus dilapsis quoddam seminis rudimentum vt in Iasmino relinquitur. Radix subest crassa, & multiplex. Istius generis alium

Libr. stirp.
Hispa. c. 16.

se obseruasse ait, similem ferè, sed humiliorem, & frequentioribus ramis fru-

RHAMNUS

Alter Clusij.



RHAMNUS

Tertius Clusij.



ticosum

ticofum, minoribus foliis, & magis carnofis, falfo guftu superiore cãdidiorem, floribus eiuſdem formæ, ſed purpureo planè colore. Prior in multis Hiſpaniæ, Luſitaniæ, Galliæ Narbonenſis locis gignitur. Illius alteram ſpeciem vno tantum loco ſe inueniſſe ait, iuxta Orcelim urbem, ad flumen Serabin, vt Valentini regni extremis limitibus. Secundus eiuſdem frutex ramis eſt & virgultis flexibilioribus, ſpinarum etiam vallo horrentibus, anguſtioribus foliis, neque adeo carnofis, perpetuis, flore Oleæ herbaceo, circa ramos frequenti, fructu rotundo, per maturitatem flaueſcente, totâque hyeme in frutice perdurante. Totus verò frutex puluere obſitus videtur. Is in maritinis Belgicis, & quorundam montium vallibus iuxta amnes, vt & ſuperior prouenit. Tertium addit fruticofum, frequentibus ramis, ſpini magnitudine, cortice nigro tectis, & ſpinis longis armatis, folia ex quibuſdam tuberculis, vt in priore, multa ſimul exeunt, oblonga, anguſta, carnoſa, colore viridi, guſtu adſtringente, & Rhabarbari ſaporem ſatis referente, ſemper virentia. Flos veris initio paruus, iuxta folia plurimus, & cõfertim naſcens, colore herbaceo: æſtate nigrũ fructum fert Pruno ſylueſtri ſimilem, rotundũ, acerbum. Hunc frequentem Granatenſi & Murciano regno locis incultis inuenit inter alios frutices. Pro Rhamni etiam genere ſpinoſam plantã Germanus quidam rei herbariæ ſtudioſus ex Ingolſtadio Dalechãpio attulit, quàm Rhamnum Bauaricum vocabat, quod alius aptius nomen non inueniret. Hæc planta, vt narrabat, hominis altitudinem ſuperat, cortice eſt purpureſcente, ſpinoſo, foliis deſiſ, pallidis, omnibus ſerratis, ſed aliis longioribus & anguſtioribus, prima ſcilicet ramorum parte, nec Ilici abſimilibus, aliis breuioribus & rotũdioribus circa ramorum extrema, Rhois folia vtcumque emulantibus, ſpinis multis, tenuibus, ſed acutiſſimis, folioſis, vt in primo Rhamno Matthioli. Spinofarum enim ſtirpium, (Cuius rei lectores hîc admonuiſſe prodeſt) quibuſdam exertæ, foliis que nude ſunt ſpinæ, vt Paliuro, Meſpilo, Oleaſtro: aliis furculi folioſi in rigidas ſpinas mucronati deſinũt vt in hac planta, Rhamno primo Matthioli, & nõnullis aliis. Rhamnus auctore Galeno, deſiccatur & digerit ordine ſecundo, refrigerat primo completo, aut ſecundo incipiente. Proinde hirpetas ſanat & eryſipelata, non magnoperè calida. Cæterũ ad hoc teneris vtendum eſt foliis. Sic etiam Dioſcor.

RHAMNUS
Bauaricus.



cis incultis inuenit inter alios frutices. Pro Rhamni etiam genere ſpinoſam plantã Germanus quidam rei herbariæ ſtudioſus ex Ingolſtadio Dalechãpio attulit, quàm Rhamnum Bauaricum vocabat, quod alius aptius nomen non inueniret. Hæc planta, vt narrabat, hominis altitudinem ſuperat, cortice eſt purpureſcente, ſpinoſo, foliis deſiſ, pallidis, omnibus ſerratis, ſed aliis longioribus & anguſtioribus, prima ſcilicet ramorum parte, nec Ilici abſimilibus, aliis breuioribus & rotũdioribus circa ramorum extrema, Rhois folia vtcumque emulantibus, ſpinis multis, tenuibus, ſed acutiſſimis, folioſis, vt in primo Rhamno Matthioli. Spinofarum enim ſtirpium, (Cuius rei lectores hîc admonuiſſe prodeſt) quibuſdam exertæ, foliis que nude ſunt ſpinæ, vt Paliuro, Meſpilo, Oleaſtro: aliis furculi folioſi in rigidas ſpinas mucronati deſinũt vt in hac planta, Rhamno primo Matthioli, & nõnullis aliis. Rhamnus auctore Galeno, deſiccatur & digerit ordine ſecundo, refrigerat primo completo, aut ſecundo incipiente. Proinde hirpetas ſanat & eryſipelata, non magnoperè calida. Cæterũ ad hoc teneris vtendum eſt foliis. Sic etiam Dioſcor.

Li. 8. ſimp.
Vires.

omnium folia eryſipelatis & ſerpentibus vlceribus efficaciter illinuntur: fama eſt ramos eius valuis fenestrisque impositos veneficia depellere: quas vires Ouidius Spinæ albæ, quæ Rhamnus eſt, vt diximus, ſeu Virgæ Ianali, quæ eadem eſt, tribuit his verſibus.

Li. 6. falto.

Sic fatus spinam qua tristes pellere posset.

A foribus noxas, hac erat alba, dedit.

Et paulo post,

Virgæque Ianalis de spina sumitur alba

Qua lumen thalamis parua fenestra dabat.

DE PALIVRO CAP. IX.

PALIVRI qui *παλίωρος* Græcis dicitur, vnius duntaxat meminit Dioscorides. Alij plura fecere genera, Imprimis Theophrastus ita scribens. Paliuri differentia quædam sunt, omnes quidem fructifera: ac rursum Paliurus velut in siliqua foliosa fructum habet (sic enim legenda Græca, ἐν λαβῶ τινὶ τὸν καρπὸν ἔχει καθάπερ τὸ φύλλον, pro τὸ φύλλον ut in vulgatis legitur: alij legunt τῇ φύσσει, idest in vesica, alij θυλακίῳ, folliculo: alij, καθάπερ σφονδύλιον, idest veluti verticillum, ut in Dioscoride) in quaterna aut quaterna semina gignuntur, quibus tussis medici contra tussim vtūtur: habent enim lentum quiddam & pingue veluti Lini semen. Nascitur locis humidis, atque etiam siccis, sicuti Rubus: non minùs autem iuxta aquas provenit. Foliis est deciduis, non perpetuis, quemadmodum Rhamnus. Idem alibi. In Africa Loti vt & Paliuri maxima copia est: Et mox: Paliurus Loto fruticosior est, folio huic nostrati similis, fructu diuerso, non enim lato, sed rotundo, Cedridis magnitudine, aut paulò maior, nucleum habet qui non simul manditur, acinorū Mali Punici modò: fructum verò suauem, quem si vino infundas, tum se ipso suauior redditur, tum vinum suauius, reddi aiūt, quæ breuius conuertit Plin. Cyrenaica regio Loton suæ postponit Paliuro. Fruticosior hæc, fructū que magis rubens (magis in Theophr. nō legitur) cuius nucleus non simul mādatur, iucūdus per se (fructus subaudi, ex Theophr.) atque è vino suauior, quin & vina succo suo cōmédans. Hæc Plinius. At Paliurus Agathoclis, auctore Athenæo, arbor est magnitudine Vlmò aut Pino nō inferior, ramis frequentibus, longis, non nihil spinosis, folio tenero, virente, figura rotundo, fructu valde dulci, magnitudine Oliuæ Phauliæ, carne, & osse illi simili, sed gustus suauitate præstanti, quem anno bis, Vere & Autumno profert. Is recens estur, cū autem siccatus fuerit, in farinam molitur, quam nec manibus subactā, nec aqua perfusam, sed negligenter, qualis est, pedibus cōculcatā reponunt in cibariū quotidianū. Ex his tribus generibus

Genera.
Lib. 3. Hist.
cap. 17.

Lib. 4. Hist.
cap. 4.

Lib. 13. c. 19.

Li. 14. cap.

Li. 1. c. 104.

Lib. 15. c. 3.

Paliu. 1.

PALIVRVS
Rhamnus III. Matth.



Diosco. Paliurus, notus est frutex, aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum est, si rectè *λγνύωδες* legatur. In duabus posterioribus descriptionibus non videntur congruere folium rotundum Paliuri Agathoclis, at in Paliuro Africano, vulgari simile: itē duplex quotannis in Agathoclis Paliuro fructuum proventus, & eorundem magnitudo, Oliuæ Phauliæ par, omnium grandissimæ, quam & Regiam, & Maiorinem ideo vocant, auctore Plinio, non sylvestris: vt exposuit Anguillara, cū superioris Paliuri fructus Cedridibus æqualis sit magnitudine, aut eas parum excedat. Quare diuersa hæc Paliuri genera esse necesse est. Paliurus primus Theophrasti, Anguillare sententia, frutex est Italiæ & Græciæ familiaris, tertia prorsus Rhamni species, in textu Dioscoridis significata. Nascitur enim locis, tum aquosis, tum siccis, hic frutex, est valde spinosus, foliis Ziziphi sylvestris, sed latioribus & rotundioribus, & qua parte pediculo hærent, fuscioribus: multos ramos à terra summittit, quaternum aut quinum cubitorum altitudine,

ne, furculosos, colore Castaneæ, quo & Spinæ, quæ semper binæ sunt, altera recta superiore, altera adunca inferiore: fructum edit latum, rotundum, in medio aliquantulum tuberosum, figura verticilli, in ramulis copiosum, initio ex viridi albicantem, cum inaruit fuliginosum (quod de semine legitur in Dioscoride, non de eius operimento) ternis aut quaternis seminibus intus conclusis, Lino & figura & magnitudine similibus. Hic frutex non alius esse videtur, quam Paliurus primus Theophrasti, nec non Paliurus Dioscoridis, qui etiam nū hodie in multis Græciæ locis nomen retinuit, sed corruptum: nam Apalizu & Paliru nominatur. Hæc Anguillara. Cui assentiuntur multi periti herbarij. Eundem esse Paliurum Theophrasti, & Paliurum Dioscoridis, demonstrant facultates eadem huic ab utroque assignatæ: præterea semen utriusque pingue & Lino simile: est enim legendum in Dioscoride *λίνο ὁμοιον*, vel quidpiam simile, non *λεγνῶδες*, idest fuliginosum. Cum etiam Rhamnus tertius Dioscoridis, pleræque notas habeat, quas Theophrasti Paliurus, verisimile est illius descriptionem Paliuri descriptioni adiungendam, ideoque Rhamnum istum tertium Dioscoridi falso adscriptum fuisse. Est igitur multorum sententia, tertius Rhamnus Dioscorid. & Theophrasti Paliurus, frutex quem pro Rhamno tertio pinxit Matthiolus. Hanc sententiam confirmarunt Mompelienses Medici, Paliurum nominantes, & seminum eius vim diureticam, ad comminuendos & expellendos calculos efficacissimam longo usu, felicissimisque successibus experti. Quod etiam ita scribit Dioscorides. Paliuri semen potum rursi auxiliatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur, folia & caulis adstrictoriam vim habent, quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresque omnes discutit, trita, & imposita. Huic de Paliuro sententiæ refragari quædam videntur. Primum quod ait Theophrastus Paliuri semen *ἐν λοβῷ* contineri, idest, in siliqua longa, carnosa, ut in faba, non lata & corticosa, ut in hoc frutice. At *λοβός* non folliculus tantum longus & carnosus dicitur, sed omnis folliculus, & cuiusvis figuræ, *λοβός* igitur siue folliculo siue siliqua, Paliuri semen includitur, sed peculiaris naturæ, & ab aliis diuersæ, ut quæ foliosa, & membranea substantia sit, ac lata. Quamobrem euidentius exprimere Paliuri semen Theophrastus non potuit, quam cum dixit Paliurum fructum habere foliatum, qui folliculo continetur. Alterum est quod dixit Theophrastus Aceris fructum oblongum esse, & pennatum, Paliuro similem. Huius igitur testimonio Paliuri fructus oblongus fuerit, non rotundus. Quæ ratio æquè facile ac prior refellitur. Magna enim est Aceris fructui cum fructu Paliuri similitudo, non inuolucris rotunditate, nec verticillata figura, sed quod duriusculum semen, ut in Paliuro, membraneo tegumento operiatur, oblongo, & alis grandiorum muscarum simili, sed non tam oblongo in Paliuro, miranda Theophrasti diligentia, qui cum dixisset Aceris *τὸν καρπὸν ἔχει μὲν ὡρομήκη, παρόμοιον ὃ τὸ παλίερον*, idest Aceris fructum non valde oblongum, Paliuro tamen similem, statim subiicit, *πλεον προμήκεστερον*, idest in Acere oblongiorem quam in Paliuro, in quo rotundus est. Hactenus de primo Theophrasti, & Dioscoridis Paliuro. Agathoclis verò Paliurum sibi esse incognitum scribit Anguillara, nisi sit ziziphus. Idem Paliurum Africanum Theophr. ziziphum sylvestrem esse arbitratur, quod Paliuro nostrati, de quo modò diximus, similis sit, non modò folijs, sed etiam ramis, & aculeis. Est enim ziziphus sylvestris, frutex quatuor, siue quinque & plures cubitos altus, ramis in terram sic inclinatis, ut in semicirculum intorti esse videantur, crassioribus spinis, & similiter acutis, semper binis, ita prorsus dispositis quemadmodum in nostrate Paliuro: folijs sicut in

Sorbo

Vires.

Li. I. c. 104.

Sorbo collocatis, fructu Iuiubis mitibus simili, nisi multo minor esset, & ad Oxycedri vel Lauri fructum magis accederet: maturus rufescit, & manditur, sed non cum nucleo, quia ossea est duritie. Sunt qui etiam Paliurum Africanum Theophr. & Ægyptium Agathoclis eundem esse existimant, vtrūque verò nostrā Ziziphum, quorū hæ sunt coniecturæ. Paliurū in Aphrica semper extitisse scriptorū omniū veterū monumentis constat: Ziziphū quoque Aphricæ peculiarē fuisse, & D. Augusti nouissimis tantū tēporibus, inde à Sexto Papinio in Italiā aduectā Plinius scriptū reliquit. Quamobrē Dioscor. qui sub Antonio vixit homo natione Græcus, sed Romanæ ciuitatis incola, cū adhuc Italiæ peregrina foret suo sæculo, nec eam cognouit, nec in opere suo celebrauit. Theophrastus in recensendis externis plantis, quas aut vidisset, aut ab alijs descriptas sciuisset, diligens admodū, Ziziphi mentionē nusquam fecit, nec vllus quidem eorū qui eius memoriam aut antecesserūt, aut secuti proximē sunt. Causam esse putant, quod Græcorū, qui primi in Aphricam nauigantes eam arborem conspexerunt, cū ignorarent eius nomen, ob similitudinem quam cū Paliuri Græci folijs habet, Paliurum Aphricanum nominarunt: reliqui iis posteriores eodem nomine vti maluerunt, sibi facili, ac pronūciantibus non molesto, quā̄m barbara, & insolita voce Ziphziphi, qua fortassis tum Aphricani, vt verisimile est, eam arborem nuncupabant, nomine postea à Romanis recepto, sed linguæ suæ accommodato. Cum ergo nunquam Zizipho caruerit Aphrica, cuius fructus ad alenda seruitia in maximo vsu est illius populis, & gentibus, quod etiam apparet ex eorum historia, qui nuper Aphricæ ritus & mores enarrarunt, gustu palmulis, & vuis passis, haud absimilis, seruīque alendis idoneus, vt est eius regionis mos, & Paliuri Aphricani historia nostræ Zizipho foliorum figura, fructūsque specie optimē quadret, Paliurum Theophrasti & Agathoclis nostram Ziziphum esse non absque ratione arbitrantur, haud tamen præfractē aliorum sententiæ & iudicio, qui meliora proferent repugnāturi. Quod si hunc Paliurum alium esse, quā̄m Ziziphum existimandum sit, nullam aliam magis ad eius naturam accedere putant, quā̄m Rabich Arabum Aphricanorum, aut alteram à Ioanne Leone descriptam capite de Hain Elchallu. Rabich, inquit capite de Zarfa, spinosa arbor est, fructu minore quā̄m Cerasi, sapore fermē Ziziphorum. Idem loco citato de Hain Elchallu. Nascuntur illic Corni, & arbores multæ spinosæ, fructu terete, luteo, simili Ziziphis, nucleo maiore quā̄m Oliuæ, gustu non admodum grato. Hæc Dalechampi, huius sententiæ tacitis autoribus.

Lib. 15. c. 14.

RHAMNVS CATHARTICVS,
sue Spina infectoria, CAP. X.

RUTEX iste aculeatus, Rhamnus Catharticus vulgo dicitur, non quod Rhamnus sit, aut vlla ei cum Rhamni generibus à Dioscoride & Theophrasto traditis affinitas, est enim Pruno syluestri similior quā̄m Rhamno, sed quod, vt Rhamni, spinis horret, ei que spinis tantum non nihil similis est. At cum ei nullum nomen à veteribus positum sit, Matthiolo Spinam infectoriam appellare libuit. Hetrusci *Spino merlo*, Longobardi Venetique *Spin ceruino*, Foroiulienses *Spin guerzo* appellant, Galli *Bourgespine*, & *Nerprun*, Germani *Vueghedornbeer*, à viis, quia nusquam maiore copia inuenitur, quā̄m in dumetis secus vias sitis. Frutex est caudice tibie hominis crassitudine. Cortex illi subniger, & nitidus, qualis Ceraso, intus virens, post luteus: lignum extra candidum, interior medulla rubet. Eo validos arcus nostri fabricant. Rami spinis duris, acutis, & pungentibus rigent. Folia lata sunt, Piro quadantenus similia: flores albi, bæcæ rotundæ, Myrtis similes, initio foris

Nomina

Forma

RHAMNVS

Catharticus.

Vires.



virides: maturæ verò foris nigræ, intus virides ob id colore eo pingentibus idoneæ: iis enim aqua dissolutis in qua liquatū Alumen sit, color viridis fit, qui Gallis *Verd de veschie*, dicitur: iisdem non maturis in eadem aqua dissolutis color luteus. Huic succo vis purgatoria inest. Fit ex eodem quæ diu asseruari potest compositio, hoc modo. Succi baccarum leniter tufarum quatrduo in fictili vitreato per se maceratarum in loco calido, libras duas prælo extrahito, quibus addito Sacchari optimi sesquilibram, vel Mellis selecti probè despumati tantumdem: lento igne decoquito ad Zulapij, vel serapij crassitudinem, linteolo rariore colato: admiscetóque pulueris Cinnamomi selecti, Zingiberis singulorum drach. quatuor, Caryophyllorum drach. duas, mundóque vasculo conseruato. Datur vnciæ pondus, & vsque ad drachmas decem. Educit faciliè pituitam, inquit Matthiolus, & crassos ac lentos humores. Alij contra, inquit Pena non ad pituitam crassam ac viscidam, sed potius tenuem educendam, & impetum eius in

articulos citatum auertendum, & cohibendum, prudentius vtuntur. Nam sine caliditate molesta purgat, & nõnulla vi adstringendi partibus robur conciliat, neque liquefacit humores, vnde maior fluxus subsequatur. Quare podagricis optimè confert. Alij baccas in pila lapidea contundunt, dein exprimendo percolant: succum expressum coquunt lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum colant. Excolati huius & iam crassioris facti succi libram vnā accipiunt, mellis despumati vncias octo: coquunt vnā, donec syrupi bene cocti crassitudo fiat. Coctis, & iam prope auferendis ab igne, iniiciunt mastiches; *Tempus.* Cinnamomi optimi singulorum drach. duas, seruántq; in vsum. Exhibetur aliquando dissolutus vino, aliquando iure carnis. Serosos humores educithic syrupus, vt & prior, aliqua ex parte biliosos, minùs pituitosos, crassosque. Frutex, hic Maio mense floret. Septembri maturæ sunt baccæ, aut Octobris initio.

AQUIFOLIUM,

CAP. XI.

Lib. 16. c. 6. & 8.

Nomina

Li. 16. c. 24.

Lib. 16. c. 21.

Lib. 16. c. 18.

Lib. 3. Hist.

capi. 4.

Li. 27. ca. 8.

QUAM PLINIVS IN Prouinciis Aquifolias Ilices appellari scripsit, indicasse videtur Ilicis folia perinde vt Aquifolij lateribus sinuosa & spinosa esse, neque enim Ilicis species est Aquifolia, quia glandifera non est, natalisque Ilicum feraces adeoque æstuosos odit: tamen, quemadmodū Ilex, folio perpetuo viret. Syluestriū generis, inquit, folia nõ decidunt Ilici, Aquifolio, &c. Theoph. τῶν δὲ ἀγέλων, αἰφύλλα πρῖνος, ἀγέλα, &c. quo loco ἀγέλαν Aquifoliam rectè vertit Theodorus. Plinius. Montes amant Cedrus, Larix, &c. Item Aquifolia, Buxus, Ilex. Theophrastus ἰδὲ τῶν ὀρεῖων ἐλάτην, πεύκη, πῖττος, ἀγέλα, &c. Id est, montibus propria sunt Abies, Pinus, Picea, Aquifolia, &c. Quare cum his & aliis locis τὴν ἀγέλαν Theophrasti Plinius, & eum imitatus Gaza Aquifolium interpretetur, eandem planè stirpem esse iudicamus. Sed id silentio non prætereundum videri Aquifoliam apud Plinium etiam pro alia stirpe accipi, cum ait: Theophrastus arboris genus intelligi voluit

luit Cratæogonum, siue Cratæogona, quam Itali Aquifoliam vocant. At Pliniū hic vehementer errasse periti omnes herbarij existimant, ἀγελαν quoque apud Theophrastum pro alia arbore idem videtur significare, cum scribit, Arcadum Phellodryn Dorum esse ἀγελαν, sic enim legit Gaza, & agrestem conuerti. Verū in vulgatis exemplaribus pro ἀγελαν ἀπλα, exaratum reperias. Hic etiam scrupulum iniicit Theophrastus, cum scribit Suberem fructum ferre glandosum, vt vertit Gaza, similem Aquifoliæ, cum Aquifolium baccas ferat. Sed eum facile eximet emendata eius loci lectio, quæ est, καρπὸν ὃ φέρει βαλανώδη, ὁμοιον τῇ ἀπρίᾳ. Idest, fructum fert vt Glandem, Phellodryi similem, quæ Dorum est ἀπρίᾳ, cuius paulò ante meminit. Eam non rectè Ruellius cum Agria confundit, pro Illice Aquifolia, inquit, à Doribus vsurpata. Nec probanda est eorum sententia qui Aquifolium, de quo hîc agimus, Paliurum Dioscoridis esse censent. Hoc enim semen folliculo inclusum habet, pingue, & fuliginosum, illud baccas rubentes. Est igitur Aquifolium Ruellij, Dodonæi, Tragi, Matthioli sententia, quod of-

Lib.3. Hist. cap. 16.

Ibidem.

Lib.1.ca.53. & 68.

Lib.1.ca.73. & 88. Lib.6.c.34. Li.3.ca.154. Lib.1.Dios. cap. 104.

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires Lib.1. Dio. ca.104.

Li.24.ca.13.

Ibidem.

AQUIFOLIUM.



ficinæ Agrifolium vocant, Theophrast. vt diximus, ἀγελαν, Lugdunenses seruatis Græcæ vocis vestigiis Agron, & Agreun, reliqui Galli *Houx*, & *Housson*, rusticis non ignotum, qui sæpè spinatum iniuriam experiuntur, Itali *Agrifolio*, Hispani *Azebo*: Belgæ *Hulsti*: Angli, *Holy*. Germani *Vualddistel*. Frutex est hæc plâta, & multis in locis tam pumila arbor, & tam crescendo pigra, vt ad fruticosas plantas potius sit referenda. Aliis in locis in quibus sibi commodam nacta est humum, in iustam arborem attollitur, perpetua fronde virens, caudice, ramisque læuibus, cortice duplici connectis, exteriori viridi, interiore pallido, odoris ingrati: ligno candido, durissimo, grauissimo, quòd Gaiaci modo in aqua fidit, eique non admodum dissimile est. Folia sunt Lauri æmula, carnosæ, solida, densa, pungentibus aculeis toto ambitu armata, ex viridi splendentia, vt in Malis aureis, & Medicis, pediculo breui pendentia, saporis non tam ingrati quàm cortex. Flores venusti, albi, parui, plures simul, breuibus pediculis annexi, vt in Lauro, qui quaternis foliolis, & quaternis apicibus constant, in quorum medio baccarum rudimenta apparent. Hæ tandem rotundæ sunt, rubræ, umbilicatæ, paruæ, baccis Oxyacanthæ quodammodo similes, gustu subdulces, cum tetro quodam sapore, quaternis intus nucleis, triangularibus, & striatis. Hoc Aquifolio plæræque Galliarum syluæ scætent. Sæpe etiam in incultis iuxta vias, & inter sæpes cum aliis dumis reperitur. Fructus Septembri mense maturus est, diuque in arbore manet, temperamento calidus. Radicum decocto foueri vtiliter articulos auctor est Matthiolus, qui prius luxati duritiem contraxerint, quoniam id decoctum emollit, resoluit, tumores discutit, ossaque fracta ferruminat. Aquifolia arbor, inquit Plinius, in domo aut villa fata veneficia arcet. Flore eius aquam glaciari Pythagoras tradit, itémque baculum ex ea factum, in quoduis animal emissum, etiam si citra ceciderit defectu mittentis, ipsum per sese recubitu proprius allabi, tã præcipuam naturam inesse arbori. Scribit Dodon. quosdam iactantes se vires Aquifolij.

expertos, affirmare quinque huius baccas deuoratas, aduersus colicos dolores perutiles esse, & aluum mouere. Fit apud nos viscum ex Aquifolio, hoc modo. Huius cortices detrahunt, & facto humi scrobe, locis vliginosis maximè, obrunt, frondibus arborum inuoluentes, & ibi putrescere sinunt, quod ferè duodecim diebus fieri solet, tum marcidos eruunt, & tantisper in pileo tundunt, dum in viscum lentescant: demum in profluente, vt obhærentes corticum reliquiæ sordēsque fluitent, proluunt, & adiecto olei nucum momento, fictilibus recondunt ad aucupia.

LYCIVM,

CAP. XII.

Lib. I. c. II. 4.
Nomina



Forma.


Li. I. Diosc.
cap. II. 4.

Li. 6. ca. 33.
Locus.

LYCIVM Dioscoridi, arbor spinosa, etiam Pyxacantha dicitur, vt & succus, qui ex ea fit: & Lycium quidem, à Lycia, in qua, velut & Cappadocia, magnus erat huius prouentus, etiam si Indicum optimum habeatur, vt ex Galeno dicemus. Pyxacantha verò à Buxi similitudine quadam, cum Græcè Pyxacantha nihil aliud sit, quàm Buxus aculeatus: Arabicè *Hadhadh*, *Hadad*, *Kilulem*, siue *Felzacarag*, Italicè *Licio*. Est igitur Lycium arbor spinosa, ramis tres cubitos longis, nonnunquam etiam longioribus: foliis Buxi, densis: fructu Piperis, nigro, læui, amaro, densoque: cortice pallido, non dissimili Lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Hunc fruticem appictum, quoniam notis ferè omnibus Lycium repræsentat, vnde etiam Lycium rectè fiat, Brasauoli, Matthioli, Dodonæi auctoritate fretus, non dubitavi pro Lycio hîc proponere. In Liguriæ Alpibus prouenit, & in Dalmatia. Alia est planta Lycio non parum similis, inquit Matthiolus Verona à Calzolario missa, cuius effigiem hîc damus. Pinxit etiam Lobellius Lycium aliud Hispanicum, quod Clusius descripsit his ferè verbis, frutex est spinosus, multas à radice virgas ferens, cubitales, & ampliores, rectas, tenues, rubentes,

LYCIVM

Alpinum.



LYCIVM

Italicum.



multis

multis ramulis donatas, qui in acutam spinam plerumque desinunt: tametsi alios huc illuc sparsos aculeos habeant, breues interdum & infirmos, nonnunquam verò oblongos, firmos, & multis foliis obsitos, folia multo ordine digesta, Myrti Tarentinæ aut Buxi quodammodo æmula, gustu læuia, & cum quadam aciditate mordicantia. Apud Complutum aliisque Castellæ veteris locis, & Baticæ parte, quam Extremaduram vocant, circa fluentia, & decliuibus locis nascentem obseruauit Clusius. Plinius, Spinam ex qua Lycium fit in Græcia pyxacanthon Chironium vocari dicit, in cuius historia aliquantum à Dioscoride dissidet. Fert & Spina, inquit, Piperis similitudinem, præcipua amaritudine: foliis paruis, densisque, Cypri modo: ramis trium cubitorum, cortice pallido, radice lata, lignosaque, buxei coloris. Hac in aqua cum se-

L Y C I U M

Hispanicum.

mine excepta in æreo vase medicamentum fit, quod vocatur Lycium. Ea Spina & in Pelio monte nascitur, adulteraturque medicamentum. Item Asphodeli radix, aut fel bubulum, aut Absinthium, vel Thus, vel Amurca. Lycium aptissimum medicinæ, quod est spumosum. Indi in vtribus camelorum, aut Rinocerorum id mittunt. Spinam ipsam in Græcia quidam Pyxacanthum Chironium vocant. Dioscorides folia Buxo similia dixit. Plinius radicem buxei coloris, eandemque latam, cum in Dioscoride obliqua esse legatur, vt *παραλίαν* pro *παραλία* à Plinio legi potuerit, sicut & ab Oribasio legitur. Elicitur succus ex foliis vnâ cum frutice tuis, & ad multos dies maceratis, deinde coctis. Tum abiectis lignis liquor itidem coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lycium adiecta decoctioni Amurca, aut Absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendū exempta, oculorum medicamentis additur: reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit Lycium semine expresso, & insolato. Plinius ex Rham-

Dioscori.
Ibidem.

Li. 24. c. 14.

Cap. 8.

cium, de quo iam diximus. Sed mox subdit. Lycium præstantius è Spina fieri, quam & Pyxacanthum Chironium vocant, qualem in Indicis arboribus diximus, quoniam longè præstantius existimatur Indicum. Coquuntur in aqua tuis rami, radicesque summæ amaritudinis, in æreo vase, ferè per triduum, iterumque, exempto ligno, donec mellis crassitudo fiat. Quo loco rursus à Dioscoride dissentit, quia ramos & radices coqui scribit, Dioscorides folia cum frutice. Ruellius tamen in versione sua Plinij sensum exprimere maluit quàm Dioscor. Rami, inquit, cum radiculis tuis, &c. Cum in Diosco. legisset, *χυλίζεσαι τῶν φύλων τῶν θάμνους θλασθέντων* idest, colligitur succus foliis cum frutice tuis, &c. Lycium optimum est, quod vri potest, restinctumque rubentem spumam *καπνον*, idest fumum legit Oribasius ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus, cum fregeris, rufis, odore minimè viroso, cum amaritudine astringens, crocino colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstantius, & efficacius. Hoc & Galenus confirmat. Lycium hoc in Lycia & Cappadocia plurimum prouenit. Alterum

Electio.
Dioscor.
Ibidem.Lib. 7. sim.
& 4. med.
p. cap. 4.

verò Indicum ad omnia valentius est. Hæ lycij notæ diligenter sunt animad-
uertendæ, quibus legitimum ab adulterino dignoscamus, etiamsi id facile non
sit, Galeno teste. Quare cum id quod passim Officinæ hodie vtuntur, nec igni
admotum accendatur, nec intus rufescat, nec vlla eius amaritudo gustu perci-
piatur, cum denique notis omnibus à vero dissideat, adulterinum esse constat.
Alij enim ab impostoribus ex Ligustri fructu, alij ex Periclymeni baccis, alij ex
Sanguineæ virgæ Corymbis, alij ex iis omnibus simul contusis fieri tradiderunt.
Quod verò Lycium Indicum scripsit Diosc. fieri id ex frutice Lōchitide, Corn.
penitus supposititiū esse iudicat, & de Lonchitide herba huc trāsata, de qua in-
frā eadē ferē traduntur. Lycium verū, auctore Diosc. adstringit, caliginē oculorū
discutit, genarū scabiē, pruritus, veterēsque fluxiones sanat, facit ad purulentas
aures, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque
illitum: coeliacis, dysentericisque potum inditūque conuenit: datur sangui-
nem excreantibus, & tussi, ex aqua: contra rabiosi canis morsus in catapotio
deuoratur, aut in aqua bibitur, flauos facit pilos, reduuiis, vlceribus quæ ser-
punt, aut putrent, medetur: sceminarum profluua appositum sistit, rabiosorum
ictibus ex lacte potum, aut vice catapotij deuoratum, auxiliatur. Quæ postrema
apertè corrupta sunt. Cum enim paulò ante de commorsis à cane rabido dixe-
rit, quid attinet statim eadem repetere? Quare in iis quæ in Dioscoride legun-
tur, ἡ γὰρ καὶ ῥόω γυναικείον προστιθέμενον, βοηθεῖ ὃ καὶ λυσσοδήκιοις, ποθεν μέλα γάλακτος, ἢ
ἀντὶ καὶ λαπολίστα λαμβανόμενον, Cornarius has voces redundare putat, βοηθεῖ καὶ λυσσο-
δήκιοις, & pro iis particulam ἢ reponendam, vt accipiamus sistere fluxum mulie-
brem appositum, aut potum cum lacte, aut catapotij modo sumptum. Plinius
enim, Bibitur & à mulieribus in lacte contra profluua, perspicuè dixit. Galen.
verò, lycium siue Byxacanthum, inquit, arbor spinosa, ex qua lycium conficitur
id videlicet medicamentum liquidum, quod ad sugillata vtūtur, & sedis orisque
phlegmonas & vlcerationes, tum herpetas, putredines, vlcera contumacia, au-
res purè fluentes, intertrigines, & paronychias. Est autem facultatis exsiccato-
riæ, compositum ex diuersi generis substantiis, altera quidem tenuium partium,
digerente, atque calida, altera terrestri & frigida, ex qua adstrictionem habet.
Porro hæc qualitas pusilla medicamento inest: digerit verò & desiccatur non pa-
rum, in secundo scilicet ordine: in calore autem symmetris proximū est. Pro-
inde ad varia hoc vtuntur, vt abstergente quidem: ad ea quæ pupillas obtene-
brant vt contrahente verò coeliacis, dysentericis, ac muliebri profluuiio adhi-
bentes. Lycij spuma Plinio, ac flos quidam, oculorum medicamentis additur.
Reliquo succo faciem purgat, & psoras sanat, erosos angulos oculorum, ve-
terēsque fluxiones, aures purulentas, tonsillas, gingiuas, tussim, sanguinis
excretiones, fabæ magnitudine deuoratum, aut si ex vlceribus fluat (sub. san-
guis) illitum: rhagadas, genitalium vlcera, attritus, vlcera recentia, & ser-
pentia, ac putrescentia in naribus: suppurationes. Bibitur & à mulieribus in
lacte contra profluua. Indici differentia, glebis extrinsecus nigris, intus rufis,
cum fregeris cito nigrescentibus. Astringit vehementer cum amaritudine. Ad
eadem omnia vtile est, sed præcipuè ad genitalia. Garcias in Aromatum Indi-
corum historia, auctor est Cate siue Cato medicamentum esse apud Indos cum
amaritudine astringens, arboremque ex qua succus is extrahitur magnitu-
dine Fraxini, folio minuto, Ericæ vel Tamarici simillimo, perpetuo virente.
Florere aiunt, sed fructum ferre negant: multis spinis horrere: materia ligni
robusta, dura, densa, ponderosa, nec, vt aiunt, putredini obnoxia, siue so-
libus exponatur, siue aquis immergatur: quam ob causam incolis lignum Sem-
peruiuum

Lil. Antid.

Emb. III. li.
i. Dioscor.
Lib. I. c. II. 4.

Vires.

Ibidem.

Lib. 7. sum.

Li. 24. c. 14.

3. 920

R.

Li. I. c. 10.

peruium nuncupant. Hanc arborem Hacchie vocant, cur autem siccum Cate vocent, ille intelligere non potuit. Porro succi extrahendi rationem hanc esse tradit. Ramos huius arboris minutim concisos elixant, deinde contundunt, postremo cum farina Nachani (semen id est nigrum & minutum, sapore Secales, conficiendis panibus aptum,) & cuiusdam nigri ligni, quod illic nascitur scobe (interdum etiam sine eo) pastilli aut tabellæ formantur, quas in umbra siccant, ne solis ardore earum facultas exhalet. Optimum est medicamentum non modo ad confirmandas gingiuas, & desiccandum & constringendum, verum etiam ad alui profluvia curanda, oculorumq; dolores tollendos, in quibus plerumque se optimo successu vsum fuisse affirmat. Idem auctor hoc Cate nihil aliud esse existimat, quam Græcorum & Latinorum Lycium. Nam eius extrahendi ratio ab omnibus eadem describitur, iisdemque facultatibus pollere, quibus Indicum Lycium, censetur. Huc adde quod Indicum Lycium præfertur à Dioscoride, Plinio, Galeno, Auicenna, & Serapione, qui Hadhath appellant. Hæc Garcias. Sed vnum hoc refragatur, quod & à Clusio annotatum est, Dioscoridi Lycium Buxi folia habere, & pusillam esse arborem, ut alia esse videatur arbor quæ à Garcia describitur. Tametsi non satis sibi constare videatur Dioscorides in Lycij historia, si modo postrema capitis de Lycio pars Dioscoridis sit. Hic etiam plantam secundo loco pictam, haud absurdè

Li. 2. c. 399.
Lib. simpl.
cap. 7.

LYCIVM

Dalechampi.



Lycium dici posse Dalechampus arbitratur. Est enim Spina tres cubitos alta, cortice incinereum pallescente, radicibus multis, lignosis: foliis densis, figura Buxo non dissimilibus, colore, crassitudine, venularumque ductu ad Prunum utcumq; accedentibus: aculeis multis, rigidis, foliosis, fructu Piperis magnitudine, nigro, adnexo breui pediculo, nunc triangulo, nunc quadrangulo, nunc cordis figura, pro nucleorum numero, è cuius fastigio pilus duplex subtilissimus eminet, gustu astringente & valde amaro. Baccis ad tingendum aureo colore sericum infectores vtuntur, easque vocant Tinctorium granum, *Graine a teindre*, aut flauum granum, *Graine iaune*, aut Auenionense granum, *Graine d'Auignon*. Id quod de Lycio Dioscorides prodidit, nimirum *ἔαυθις δὲ τὰς ρίζας*, flauos reddere pilos, facit ut credam, quod & multi asserunt, verum Lycium quamuis hæc planta non sit, eius succosis nos vtamur, eosdem effectus deprehensuros, quos veteres suo Lycio tribuerunt. In asperis & saxosis circa Auenionem & Carpentoracte locis prouenit.

Forma.

Locus.

Nomina

Forma


Lib. I. c. 18.

Vires.



OLEASTER, olea sylvestris & Æthiopica dicitur, Græcis, ἄγριελαία, κόνινος, αὐθιοπική, ἐλαία. Olea domesticæ fere similis est, sed foliis paulo minoribus, inter quæ pungētes aculei multi: fructus etiam minor, qui difficilè maturefcit. Quod ex eo elicitur Oleum viride est, & immaturū, cuius in Galliæ Officinis nullus est vsus. Dioscorides tamen diuersas Oleastri partes, multos & diuersos in medicina præbere vsus ostendit.

OLEASTER.



Folia, inquit, adstringunt: trita & imposita ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, reduuias, nomasque cohibent: crustas emarginant cum melle illita: quinetiam sordida vlcera repurgant, inflammationes panosque cum melle illita discutunt: cutem à capite vulsam conglutinant: oris vlceribus, & priuatim infantium, comanducata medentur. Succus & decoctum eisdem habet effectus: Sanguinis eruptiones ac muliebre profluuium admotus succus inhibet: vix oculorum, pustulisque prodest: vlcera, & veteres defluxiones sistit: quapropter in collyria additur, ad palpebrarum erosiones perquam utilis. Exprimitur succus tuis foliis, affuso vino, aut aqua, siccatusque sole, in pastillos digeritur. Sed longè validior, & ad recondendum aptior succus habetur, qui cum vino, quàm qui cum aqua expressus est: auribus subuenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter celiacis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur cum floribus folia, vt Spodij vicem cinis præstet, in cruda

olla, oblito ore luto, vsque dum figlinum percoquatur: restinctaque vino, & rursus subacta eodem modo vruntur. Postremò cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum, constat spodio non cedere, sed iisdem viribus præditum esse. Oleum sylvestris oliuæ gingiuis putri vligine laborantibus colluitur, dentium mobilitates stabilit: calfacti & ex colati foris gingiuis fluxione laborantibus utilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admouere, donec albæ spectentur. Olea Æthiopica lacryma Scammonio quadam tenus similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem Ammoniæ aut Gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostates Olea Oleastriq; similem lacrymam sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices, albuginesque illitu emendat: yrinam & menses ciet: cauis dentium impressa, ad dolorem efficax est. Inter venena scribitur, aut vt quidam interpretantur, numeratur inter ea quæ foetum corrumpunt: partus pellit: lepras & impetigines sanat. Hippocrates ad fluxum rubrum inter reliqua medicamenta ψώραν ἀγριελαίας, id est olea agrestis scabiem habet: sic enim Plinius ψώραν morbum arborum interpretatur. Idem limum vel lichena appellat. Sylvestris seu Æthiopica Olea lacryma licet multis polleat viribus, inquit, Matthiolus, eius tamen in Officiis nullus est vsus, neque vlla ad nos adfertur. Sed sunt qui hanc esse putant, id quod recentiores medici

Lacryma
olea Æthiopica.

Vires.

Lib. 2. mor.
mul.

Lib. 17. c. 24.

Lib. 23. c. 7.

Lib. 1. Dioscor.
ca. 119.

Lacryma
olea Æthiop.
non est gummi
elemni.

medici

medici & Officinæ Gummi Elemni vocant. Illos vehementer errare gustatus ipse indicat. Neque enim mordax est id Gummi, neque linguam vellicat. Gummi verò improprie dici, cum in Resinarum genere sit potius, ex eo intelligi licet, quòd igni exposita hæc lacryma, statim colliquescit, ac diffunditur, non aliter quàm Resina quæ ex Pinu, Picea reliquisq; resiniferis stirpibus manat. Nul- lum autem Gummi genus igni liquatur, nisi addito aceto, aut vino, aut liquore alio, sed vritur. Cæterum etsi nobis prorsus ignota sit planta, ex qua in Oriente hæc Elemni lacryma prouenit, tamen notissimæ sunt Chirurgis eius vires. Ea enim in emplastris & vnguentis ad caluariæ fracturas, & vulnera sananda vt præstantissimo vtuntur medicamento. Est & alia, auctore Theophrasto, Oleæ maris rubri lacryma, ex qua medici ad cruenta recentiaque vulnera medica- mentum componunt præstantissimum.

Vires gū-
mi ElemniLi. 4. Hist.
cap. 8.

PHILLYREA, CAP. XIIII.

PHEOPHRASTI Phillyram à Dioscoridis Phillyrea plurimum distare nemini iam dubiū est, id quod maximè descriptiones confir- mant, vt fusius diximus, cum de Tilia ageremus. Est enim Philly- ra procera, crassaq; foliis latiusculis, modicè serratis, ferè Hedera- ceis, at Phillyrea Dioscoridi arbor est Ligustri tantum magnitudine, foliis Oleæ nigrioribus, latioribus: fructu Lentisci, nigro subdulci, racematim cohærente.

Forma.
Lib. I. c. 108.

PHILLYREA

Matthioli.




In asperis nascitur. Hanc Matthiolus Philly- reæ Iconem proposuit tantum, nō descripsit, quia descriptioni Dioscoridis haud parum conuenire videatur: non affirmat tamen legiti- mam esse, quod eius baccae subdulces non sint. Pena pro Phillyrea *φιλυραία* dicere ma- uult, id est Oleæ amasiam, vt ait, quod Oleæ non modò similis sit, sed etiam socia, vt ab Oleastris quibuscum frequens nascitur, nihil ferè discrepet. At potius *φυλελαία* dicas, id est folio Oleæ similem. Huius ille genera duo descripsit, & depinxit, quæ arborescunt in Gal- licæ prouinciæ viarum marginibus, & Oliue- tis Monspelio vicinis. Maior & rarior, persi- milis est pumilæ Oleæ, caudice, ramisque ni- grioribus, longioribus quàm Oleæ agrestis, folio magis ad Ligustrum accedente: baccis exiguis multis, è ramis prodeuntibus cum suo pediculo, minoribus quàm in Oleastro, non amaris, vt in oleastro, sed subdulcibus, nucleo intus Cerasi. Minor multò frequentior in iis- dem natalibus & Monspelij collibus glareo- sis, folio æquè longo, sed angustiore duplo. Est etiam duplo minor tota plâta: acini simi-

les lentiscinis, & similiter racematim proximè hæretes, breui admodum pedi- culo, qui maturi subdulces sunt, aliquantùm acres, sed non ingrati vt Oliuæ fatiuæ, & agrestes. Has duas Alaterni nomine, in fine huius libri exhibuimus. Serapi Mahaleb describens, totum Dioscoridis de Phillyrea caput transcri- psit. Sed planta, inquit Matthiolus, quam nonnulli Mahaleb vocant, cuius bac- carum nucleis Vnguentarij ad odores conficiendo vtuntur, Dioscoridis Phil- lyreæ

Cap. 44.
simpl.
In cap. 108.
lib. I.


lyreæ respondere non videtur. Nam hæc folia habet Oleæ, sed latiora, baccas racematim cohærentes, quæ notæ in Mahaleb hîc appiçto non reperiuntur.

MAHALEB
Matthioli.



na arbore expressit, quam hîc depinximus. Hanc prorsus refert maior priorq; illius Phillyrea hoc capite descripta. Reperitur in Gallica prouincia circa Tholonum.

PHILLYREA
Mahaleb Serapionis.



Vires.
Lib. I. c. 108.

Verum vt Mahaleb illud, cuius nucleorum Vnguentariis est vsus, negat Phillyream esse Matthiolus, ita legitimum esse Mahaleb, de quo Arabes scripserunt, multis rationibus persuasus credit. Arabes enim quos citat Serapio suo Mahaleb facultates à Phillyreæ facultatibus multum diuersas tribuunt, quoniam Phillyrea Dioscoridi adstringit Oleæ agrestis modo, Serapionis vero, Abē Mesues & Rhasis testimonio Mahaleb calfacit, & emollit, id quod vulgaris Mahaleb nucleos, quibus vnguentarios vti diximus, euidenter præstare ait Matthiolus. Nam cutis asperitatem duriemque læuigant, & emolliunt illiti, affrictiue: ex quibus colligit rectè eos sentire, qui plantam hîc pictam genuinum Arabum Mahaleb esse arbitrantur. Quod, si verum est, non parum hallucinatus fuerit Serapio, qui putarit Arabum Mahaleb, Dioscoridis esse Phillyreā, præsertim cum Arabas citet, qui Mahaleb vires assignent, tum eas quas diximus, tum ventris tineas pellendi facultatē, quæ Phillyreæ minimè insunt. Pena Phillyream aliam de vi-

na arbore expressit, quam hîc depinximus. Hanc prorsus refert maior priorq; illius Phillyrea hoc capite descripta. Reperitur in Gallica prouincia circa Tholonum. Æquat scapo, & sparsis stolonibus Prunū & Cerasum, folio planè Phillyreæ, aliquanto latiore: flos Ilicis muscosus, albidus: & plusculæ vna aceruatæ & congestæ bacca, Terebinthi, maiores, nigricantes, herbida, subdulces, nucleis, quales prorsus prostant hodie in Officinis nomine Mahaleb. Hæc, verius Serapionis Mahaleb, id est Phillyrea fuerit. Phillyreæ folia adstringunt, auctore Dioscoride, ad eadem vtilia, ad quæ Oleaster, cum adstrictione opus est: maximè ad oris vlcera, commanducata, aut si decocto dentes colluantur. Pota vrinam ac menses cient. Alias Clusi Phillyreas adiungimus illis pridem à nobis declaratis. Priorem Ilice coccifera proceriorem, ramis pollicem & amplius crassis, cortice viridi, sed albicantibus, maculis asperso, foliis Ilicis cocciferæ, maioribus, viridioribus, densioribus, in ambitu nonnihil spinosis, gustu adstringente, sed sapore non ingrato. Fructus Lentiscino maior non est, ex foliorum alis dependens, niger cum maturuit. Hanc altera magnitudine superat

PHILLIREA

secunda Clusij.



superat, multos proferens ramos, candicante cortice obductos, folia ei frutici quem ille pro Alaterno maiori, nos pro Apharca depinximus, ferè similia, sed firmiora, & minùs nigricantia, sapore aliquantulum acri, cum quodam amarore. Fructus Decembris initio racematim inter folia propendere visus est, magnitudine granorum Piperis, aut baccarum Myrti, niger, calidus, nucleum osseum & durum cortice candido & fragili opertum contegens. Præter has, tertiam & quartam Phillyreas Clusius ostendit, easdem cum Penæ Phillyreis maiore & minore, supra memoratis, quas alibi pro Alaterno descripsimus.

CAPPARIS, CAP. XV.

Vτ κάπραις Græcè, ita Capparis Latine nominatur. Quidam, teste Plinio, Cynosbaton appellarunt, quod, opinor, quædam illi sint cum Cynobato cõmunia: alij

Nomina
Lib. 13. c. 23.

Ophiostaphylen, id est Vuam viperinā, pro qua in nothis Dioscoridis Phyllostaphylen legimus. Gaza Inturin vocauit, Arabicè *Cappar*, siue *Kappar*, dicitur, Italice *Capparo*, Gallicè *Cappres*, Germanicè *Kappern*. Hispanicè *Alcapparas*. Fructus est aculeatus, cum humi sternitur, ac iacet: huc illuc in orbem euagatur. Spinas ut

Forma.

CAPPARIS.



CAPPARIS folio Acuto.



Rubus

Rubus habet in hami modum aduncas: folia Mali Cotonæ, rotunda: fructum Oleæ similem: is cum dehiscens panditur, florem candidum promit, quo excusso nonnihil Glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana Acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda. Radices lignosas spargit, grandes, numerosasq; Capparis retuso folio hîc picta est: item altera folio acuto, ea sola varietate à priore discrepans. Tenui plerumque solo, asperisque locis, in insulis, & inter rudera nascitur. In cultis Capparim prouenire negat Theophrastus.

Lib. 6. Hist.
cap. 5.

Lib. 19. c. 3.

Lib. 11. ca. 3.

Qua de causa inter frutices & dumos eam reposuimus. Seruntur tamen, columbæque perinde ac segetes & legumina. Plinius. Quippe cum Capparis quoque feratur siccis maxime, area in defossu cauata, ripisq; vndiq; circumstructis lapide: aliàs euagatur per agros, & cogit solum sterilefcere. Columella. Capparis in plurimis prouinciis sua sponte in noualibus nascitur. Sed quibus locis eius inopia est, si ferenda fuerit, siccum locum desiderabit: isq; debet ante circumdari fossula, quæ repleatur lapidibus, & calce, vel punico luto, vt sit quasi quædam lorica, ne possint eam perrumpere prædicti seminis frutices, qui ferè per totum agrum vagantur, nisi munimento aliquo prohibiti sint. Quod tamen non tantum incommodum est (subinde enim possunt extirpari) quantum quod noxium virus habent, succoq; suo sterile solum reddunt. Cultu aut nullo, aut leuissimo contenta est: quippe quæ res etiam in desertis agris citra rustici operam conualescit. Seritur vtroque æquinoctio. In Cypro Capparis plurimum prouenit. In Italia, Hispania, Gallia Narbonensi frequens. Floret æstate. Viret vsque ad Vergiliarum Occasum, sabulosis familiarissima. De huius multiplici, tum in cibis, tum in medicamentis vsu, hæc ab auctoribus traduntur, à Dioscoride. Caulis & fructus cibi gratia cõdiuntur. Aluum turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho, quàm cruda vtilior est. Fructus drach. duabus in vino potus quadraginta diebus lienem absumit, & vrinam cruentumque excrementum emittit: bibitur vtilissimè in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis & conuulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadẽ proficit: vlcera omnia vetera & sordida, & quæ occaluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei illinitur: dente demorsa dolori eius auxiliatur: cum aceto trita vitilignes albas extergit. Radix foliaque intrita strumas ac duritias discutunt. Aurium vermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica Capparis vehementer inflat. Apula vomitus facit. Quæ à Lybico, & rubro mari defertur, mirum in modum acris est, si quidem in ore pustulas excitat, gingiuasque osse tenus exest. Quare in cibis non ab re damnatur. Capparis Galeno radicis cortex vincentem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde acerbam. Ex quo liquet diuersis pugnantibusque constare facultatibus. Nam abstergere, purgare, incidere potest amaritudine, excalfacere, incidere, digere: re acrimonia: contrahere, densare, constringere acerbitate. Idcirco lienes induratos, si quod aliud, hoc medicamentum iuuare potest, tum foris idoneis illinendis remediis admixtum, tum intro in corpus assumptum, siue decoctum in aceto, aut Oxymelite, siue aridum contusum, illisque permixtum. Quippe cum apertè crassos, lentosque humores hoc pacto sumptum euacuet, nec eos tantum per vrinas, sed & per ventrem: sæpe etiam sanguinolentos deferat, vnde & lienes iuuantur, & coxarum dolores. Quinetiam menses promouet: ex capite purgat, detrahítque: auxiliatur ruptis, & conuulsis. Radicis eius cortex, vlceribus malignis cataplasmatibus modo impositus, non malum est remedium, vt qui illa extergere valeat, & potenter desiccare. Præterea dentium dolores, prædictarum qualitatum ratione adiuvat, interim cum aceto coctus, interim cum

vino

Temper.
Plin. ibid.

Li. 2. c. 169.

Vires &
Vsus.

Li. 7. simpl.

viño, sæpe etiam solus dentibus mansus. Radicis cortici fructus proportionem virium respondet, nisi quod ad omnia imbecillior est. Imo & folia, & caules eius similem vim obtinent. Memini me foliis quandoque, paucis diebus, duritiem cœradis naturam referentem discussisse. Sed admiscemus illis quippiam, quod virium obtundat vehementiam. Iam non mirum est, quod aurium vermes succus amaritudine occidat sua. Porro Capparis quæ in feruentibus admodum regionibus prouenit, ut quam fert Arabia, multò est nostrate acrior, adeo ut plurimum etiam habeat facultatis adurentis. Idem alibi. Capparis facultas tenuium admodum est partium: proinde minimum alimenti in corpus eorum, qui ipsa vescuntur, distribuit, quemadmodum & alia omnia quæ tenuibus constant partibus. Vtimur autem fructu huius plantæ, magis ut medicamento, quam ut alimento. Importatur ad nos etiam sale conspersus: quia solus asseruatus putrescit. Clarum ergo est. Capparis adhuc virentem, antequam sale condatur, plus habere nutrimenti. Nam ex salis conditura plurimum eius amittit, & nisi sal abluatur, prorsus haud quicquam nutrit, aluum tamen subducit. Verum ablutus, & maceratus, donec omnem salis naturam exuat, ut minimi sane alimenti cibus est, ita obsonium, & medicamentum, cum ad excitandum prostratum appetitum, tum ad deradendam deiiciendamque pituitam ventri adhaerescens accommodatum erit, ac denique ad lienis iecorisque amolendas obstructions. Verum in hos usus cum Oxymelite, aut Oxelæo ante alias omnes dapes sumi oportet. Tenellis porro Capparis germinibus homines, ut Terebinthi turionibus vescuntur, cumque adhuc virent, in oxalme, & aceto non secus atque hos reponunt. Plinij verba hinc adscribam. In Ægypto & Capparis, firmioris ligni frutex seminisque in cibis vulgati, caule quoque vna plerumque decerpto. Cauenda eius genera peregrina. Siquidem Arabicum pestilens, Aphricum gingiuis inimicum, Marmaricum vuluis, & torminum inflationibus. Apulum vomitus facit: stomachum & aluum soluit. Marmaricum dixit, quod apud Marmaridas Libyæ nasci Dioscorides ait. De usu Medico idem hæc scripsit. Non utendum transmarino. Innocentius Italicum est. Ferunt eos qui quotidie id edunt, paralyti non periclitari, nec lienis doloribus. Radix eius vitilignes albas tollit, si trita in sole fricentur. Spleneticis prodest in vino potus radicis cortex, duabus drachmis, dempto balnearum usu. Feruntque xxxv. diebus per vrinam & aluum totum lienem emitti. Bibitur in lumborum doloribus, ac paralyti. Dentium dolores sedat tritum semen, ex aceto decoctum, vel manducata radix. Infunditur & aurium dolori (semen, sub.) decoctum oleo. Ulcera quæ Phagedænas vocant folia, & radix recens cum melle sanant. Sic & strumas discutit radix: parotidas vermiculosque cocta in aqua. Iocinoris quoque malis medetur. Dant & ad tineas in aceto & melle. Oris exulcerationes in aceto decocta tollit. Stomacho inutilem esse inter auctores conuenit. Nunc ut olim floribus & fructibus muria asseruatis frequentissimè in cibis vtimur. Suauiores palatoque gratiores sunt recentes acerrimo asseruati aceto, quod plerique faciunt in Hetruria. Præstantissimæ Cappares ex Alexandria Ægypti Venetias adferuntur. Est & in Apulia earum prouentus, sed Ægyptiis deteriorum. Proueniunt etiam Romæ in collapsis ædificiorum parietibus, ruderibusque, præsertim circa Pacis templum, itemque Senis, quæ quidem Apulis saporis præstantia minimè cedunt. Paulus earum usum commendauit ex aceto, & oleo, quod & appetentiam inuitent, & lienem laxent, pituitamque per aluum exigant. Theuetus auctor est in Insula Suachem Æthiopico litori adiacente nasci herbam quandam *Alhaut* nomine, in rupibus, late sese diffundentem, foliis, fere Capparis: cuius fructus germina sunt, siue capitula rotunda. Folia, radices, fructus gustu

Li. 2. Alim.

Lib. 13. c. 23.

Lib. 20. c. 15.

Matth. li. 2.
Diosc. cap.
169.I. i. ca. 74.
The. i. Col.
mo. li. 5. c. 6.

suauissimi sunt, & cordi salubres, quibus indigenæ ad coliros & stomachi dolores quosuis, præterea ad hepatis & pulmonum affectus vtuntur, decocto ex tota herba parato cum corallij albi puluere.


APHARCA, CAP. XVI.

Nomina

DEPICTVM hîc fruticem herbarij quidam Apharcam Theophrasti esse putant: alij Lycium alibi descriptum. Alij Phillyream Græcorum: Monspelienses Pharmacopœi. *Bourgespine*, id est, Spinam Burgundicam vocant. Pena eo nomine depinxit & descripsit, an Apharca sit Theophrasti dubitans. Ego de nominibus digladiari nolo, sed pro virili parte plantas minimè vulgatas & adhuc veluti reconditas in apricū pro-

APHARCA

Theophrasti.



Lib.1. Hist.
cap.15.
Lib.3. Hist.
cap.6.

ferre. Scio enim non defuturos viros ingeniosos, qui iis cognitis nomina sua, vel fortuito, vt plerunque fit, vel ex diligenti veterum auctorum lectione sint imposituri. Cæterum frutex hîc in arborem etiam crescit, magnitudine Mali Punicæ, radice crassa, caudice recto, ramoso, cortice non admodum spisso, ex cinereo albicante, aspectu tristi: foliis ima parte angustis, superna latiusculis, Portulacæ modo, obtusis aliquando, interdum in acutum fastigium terminatis, per ambitum insectis, incisurarum eminentiis rigidiusculis, carnosissimis, Ilicis, aut Oleæ modo, venosis elata costa per medium diuisis: flore albo, baccis racematim coherentibus, angulosis, principio virentibus, cum maturuerunt, nigris, gustatu subdulcibus. Arbor ista perpetua fronde viret, ea dote Laurum Ilicem, & cæteras sua coma semper ornatas prouocans Apharcæ folia non decidere scripsit Theophrastus. Præterea illam & Adrachnen germinare cum vrbani arboribus, ac vtramque biferam videri, his verbis: Ἀδράχνη δὲ ἔσ' ἀφάρκη. τὸ μὲν πρῶτον πεπαίνεσσι ἅμα τῷ βότρυϊ περχάζονται. τὸ δὲ ὑπερὸν ἐν-

θῆντι. δλεκεῖ δ' ταῦτα δι' ἄλλα, ἀρχομύς δὲ χυμῶνος, &c. Quæ cum malè à Theodoro sint versæ, sic mihi rectè videntur exprimi posse. Adrachne & Apharca fructum primum cum Vua nigrescit, & varia fit, maturant: alterum cum vitis floret. Bis enim ambæ fructum ferre videntur. Ineunte hyeme, &c. Prouenit in asperis & saxosis oræ maritimæ locis, non procul à Monspeliensi vrbe, quæ Vicum itur, pagum Apiano vino percelebrem.

Locus.

ALATERNVS CLVSII: CELASTRVS


Theophrasti, CAP. XVII.

MIRANTVR, & iure quidem, in stirpium cognitione versati, cur Plinius Apharcæ, Phyllicæ, atque Celastri plantarum à Theophrasto sæpè memoratarum nusquam mentionem fecerit. Ego sanè Plinium tacuisse de illis puto, quia Græciæ, & semotis ab Italia prouinciis peculiare esse, vt & Adrachnen, crederet. Phillycæ solius meminisse quidam censent, Alaterni nomine, quòd vbi Phyllica nascitur, eius regionis incolæ


incolæ adhuc vocent Alaterno, Linterno, & Alarders, vocabulo ad Alaternum accedente. De illa planta nos posthac agemus. Celastrum Theophrasti plerique esse volunt plantam, quam pro Alaterno huius rei peritissimus Clusius pingit, & describit, & eam duplicem: Maiorem, nonnunquam arborecentem, ramis

ALATERNVS prior

Clusij: *Celastrus mas*
Theophrasti.

*ALATERNVS secundus*

Clusij: *Celastrus Theo-*
phrasti fœmina.



longis, non admodum crassis, in alas minimè diuisis, furculis flexilibus, cortice è viridi candicante, membrana subtus flauescente: Foliis nullo ordine dispositis, media inter Oleam & Ilicem magnitudine, crassiusculis, in ambitu leuiter serratis, è nigro virentibus, ingrati gustus, amaris, cum acrimonia quadam leui: Floribus Oleæ, pallidis, ad foliorum pediculum exorientibus, racemosis, vere ac interdum media hyeme prodeuntibus: marem hunc esse volunt. Minorem alteram, fœminam, humilem: breuioribus ramis: corticis colore ex albo viridi ac subpurpureo confuso: folio minore, rotundiore, serrato, dilutius virente, flore superiori simili, maiore, pallidiore: fructu racemoso, Acinis Lentisci magnitudine, ex tribus veluti granis constantibus, primum viridi, post rubente, ac tandem nigro. Floret sub finem mensis Februarij, & initio Martij. Theophrasto Celastrus semper viret: summis locis gaudet, frigoriq; & sæuis tempestatibus expositis: fructu per hyemis rigores deciduo, tardissimè maturescente, vt in Ilice, ac Iunipero. Cultum omnem recusat. Falluntur qui putant, quoniam Celastrum Theophrastus in summis & gelidissimis nasci montibus scripsit, eum reperiri posse in Alpibus, Apennino, Cemeniis montibus, & aliis vsq; adeo excelsis. Dictum id Theophrasti prorsus intelligendum de summis & frigidissimis locis, non nostratis regionis, sed eius in qua prouenit. Thuiæ, & proceræ quidem, in frigidis montium verticibus gignitur, eodem teste. Frustra operam sumat, qui in Alpibus requireret, vbi, ne nomen adhuc quidem est auditum.

Frigidos eos tractus Tauri mōtis Amani, & reliquorum montium eiusmodi in Asia & Europa Theophrastus significat, non nostros ad Septentrionem sitos.

ACACIA, CAP. XVIII.

Nomina

Lib. 4. Hist.
cap. 3.



OMEN huius spinosi fruticis Græcum est ἀκανθία, idem etiam Latinum Acacia, Arabicum Achachie. Dicitur autē ab ἀκός, id est acuo, vnde Acacia, quasi acuta: Theophrastus ἀκανθίαν simpliciter, id est spinam, & ἀκανθίαν ἀγυπτίαν, spinam Ægyptiam vocat, ita vt Acaciæ nomine & spinam, & succum ex fructu Spinę expresseum accipiamus: Spinę verò Ægyptiæ appellatione ipsam arborem Acaciam intelligamus. Sic Dioscorides videtur vsurpasse. Acacia, inquit, in Ægypto nascitur, Spina arboris instar, &c. & rursum: Alterum Acaciæ genus in Cappadocia, Pontoq; provenit, &c.

Lib. 1.

Lib. 3. ca. 13.

Li. 6. simpl.

Cornar.

Embl. 1. 12.

lib. 1. Diosc.

Lib. 24. c. 12.

Aetius, Spina Ægyptia, ex qua Acacia præparatur, &c. A Spina Ægyptia longē diuersa est Spina Arabica, similis Spinę albę, de qua Diosco. Galen. tamen Spinam Ægyptiam, à quibusdam vocari scribit Arabicam, similem Spinę albę, &c. seorsumq; de Acacia, & eius succo tractat. Plinius quoque Spinam Arabicam ab Acaciæ Spina distinxit. Spinę Ægyptiæ siue Arabicę laudes in odorum loco diximus, inquit, &c. Ita enim vetus Codex habet, sed in vulgatis, hæc duę voces desunt, (Ægyptiæ siue.) Idem aliquāto post eodem capite. Est & Acaciæ Spina, &c.

Lib. 1.

Veteribus igitur duplex Spina est Ægyptia, hæc, quæ etiam Acacia vocatur, & ea quæ Spina Arabica. Qua Homonymia deceptus Aetius duas diuersas plantas in vnam confudit, cum scripsit. Spina Ægyptia ex qua Acacia præparatur, adstringendi ac siccandi vim habet. Quare & fluxui muliebri prodest, & vlcera sedis insufflata ad cicatricem perducit. Est enim hæc Aetij Spina Ægyptia, Ara-

Li. 6. simpl.

bica, cuius vires ex Galeno tradit, non Spina Ægyptia, ex qua Acacia fit, cuius paulò ante ipse meminit. Apud Plinium cap. 12. lib. 24. legendū: Spinę Ægyptiæ laudes in odorū loco diximus, Arabica spissat, &c. Huic enim Spinę omnia quæ à Dioscoride Arabicæ tributa sunt, rectē adscribit. At locus is quo se Ægyptiæ

Lib. 3. ca. 13.

Cap. 9. & 11

Lib. 13. ca. 9.

Spinę laudes dixisse ait, est lib. 13. de Ægyptia Spina, ex qua fit Acacia, nō de Arabica, id quod contextus ipse apertē declarat. Nec minus, inquit, Spina celebratur in eadem gente, duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat, ob id vtilissima nauium costis. Candida facilē putrescit. Aculeus Spinarum & in foliis. Semen in siliquis, quo coria perficiuntur Gallæ vice. Flos & coronis iucundus, & medicamentis vtilissimus. Manat & Gummi ex ea. Sed præcipua utilitas, quod cæsa anno tertio refurgit. Circa Thebas hæc, vbi & Quercus, & Persea & Oliua, c. c. à Nilo stadiis, syluestri tractu, & suis fontibus riguo. Idem paulò post. Gummi optimum esse ex Ægyptia Spina conuenit, Hunc Plinij locum

Lib. 3. ca. 9.

citant Ruellius in Spinę Arabicæ historia, Spinam Ægyptiam & Arabicā pro eadem planta, non sine errore vsurpat. Acaciæ duo sunt genera, Dioscoride auctore. Vna quę in Ægypto: altera, quæ in Cappadocia, Pontoq; provenit. Aca-

Genera.

Lib. 1. c. 15.

Diosc. ibid.

Forma.

ciæ Ægyptiæ Spina est instar arboris, fructicosa, non sese in altum attollens, ramis pungentibus aculeatis, inter quos proveniunt folia, in plurima alia foliola diuisa. Florem habet candidum, semen Lupino simile in folliculis, ex quo succus expresseus siccat in vmbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligitur modicē rufus, & odoratus, vt in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex foliis & semine succū. Manat & Gummi ex ea. Spina. Acaciā Ægyptiā Dodo-

Li. 6. ca. 22.

In cap. 115.

Lib. 1.

nai hic depinximus, à qua permultū distat Matthioli Acacia prima hic quoq; appicta, de qua Penę sententiā audiamus. Sequinus Martinellus, inquit, medicus, & peritus Pharmacopæus misit ex Syria siliquarū Acaciæ Ægyptiæ saccos plenos Alberto Martinello fratri suo, perquam sædulo & erudito Pharmaco-

ACACIA

Ægyptiaca.

ACACIA

l. Matthioli.

pæo, ex quo semine in horto Patauino, aliisque quamplurimis Venetorum locis sato, orta est ista Acacia. Accepit & Morganus plantam nuper ex maris Occidui insulis Perunianis, ne quis putet peculiarem Ægypto aut Arabia. In neruulis prælongis foliola sunt Scorpioidis leguminis similis, aut herbae Sferre cauillo nominatae, in toto virgulto, gracili, aliquot rigidis spinis in surculis exertis. Seminis tota siliqua non maior vno alteroue Lupino simul iunctis, sed suis alueolis distincta. Quare Matthiolus non Acaciam, sed si spinas demas, arbori Indæ similem pictam dedisse videtur, cuius siliquæ, siue lobi non sunt Lupini similes, sed Genistæ, duplo latiores, ut Senæ compressæ: à Pena hîc descripta verior. Alterum Acaciæ genus, Ægyptiæ Spinæ est simile, longe minus, tenerius, humile, aculeorum vallo munitum: Folia habet Rutæ: semen Lenticulæ, minus, Autumno, in loculis conuexis, ternum, quaternumue capacibus. Acaciam alterâ genuinâ esse hîc appictâ censent Periti Herbarij, foliis Rutæ aut Cytisi, ternis, siliqua Genistellæ, aut vulgaris Glycyrrhizæ, nouaculæ effigie, dorso obtusiore, & altero latere, quasi acie acutiore, tria aut quatuor etiam Genistellæ semina dura continente, quæ nondum matura flauent, postea nigricant. Hac Tyrrhenum & Ligusticum, atque Mediterraneum litus scatet, & plerâque alia Italiæ loca. De Acacia, eiusque generibus hæc prodidit Theophrast. Spina ex eo nomen accepit, quod tota arbor aculeis horreat, excepto caudice: nam & super germina, foliaque aculeos habet. Altitudine procera est, ut quæ ad duodecim cubitos perueniat. Materies ex ea ceditur rectis idonea. Eius duo genera: quædam candida, quædam nigra. Candida imbecillis, & facile putrescens, nigra robustior, & incorrupta. Quare in nauibus fabricandis ad earum costas illa vtuntur. Recta non valde assurgit. Fructus in siliqua modo leguminum, quo incolæ coria perficiunt Gallæ vice. Flos vsque adeo aspectu pulcher, ut ex eo coronas faciant, est & medicamentis utilis: quamobrem à medicis colligitur. Manat & Gummi ex ipsa, tum vulnerata, tum sponte sine vlla plaga. Cum

Forma al-
terius Aca.

Lib. 4. Hist.
cap. 3.

Gummi.

Locus.

ACACIA ALTERA

Matthioli.



Lib. 13. ca. 9.

Li. 24. ca. 12.

Electio
Gummi.Lib. 9. Hist.
cap. 1.Lib. 1. Diosc.
cap. 115.
Gumi Aca-
cia, nō est
Gumi Ara-
bicum.Lib. 7. me.
gen.Lib. 4. Hist.
cap. 3.
Vires succi

Lib. 3. ca. 63.

caſa fuerit, tertio anno ſtatim renaſcitur. Eius copia & ſylua ingens circa agrū Thebanum eſt, vbi & Quercus, & Perſea Olea quoque eodem loco gignitur, non aquis fluuij riguo (diſtat enim pluſquam trecentis ſtadiis) ſed manantibus ſponte aquis, multi enim fontes in eo ſunt tractu. Hæc Theophræſti, Plinius eo quem ſupra indicauimus loco trãſcripſit, atque vertit. Eadem de re alio loco idem ſic ſcripſit, quo vulgati Codices ex vetuſtiſſimis ſic ſunt emendandi. Eſt & Spinæ ſuccus Aca-
cia. Fit in Ægypto alba, nigræque arbore: item è ſemine viridi, aut maturo, ſed longè melior è priori. Fit & in Galatia, teneriore ſpinosaq; arbore. Semen huius lenticulæ ſimile: minore eſt tantum & grano, & folliculo. Colligitur Autumno, ante collectum nimio validius. Spiffatur ſuccus ex folliculis aqua cæleſti per-
fuſis: mox in pila tuſis exprimitur organis: denſatúsque ſole in mortariis cogitur in pa-
ſtillos. Fit & ex foliis minùs efficax. Ad coria perficienda ſemine pro Galla vtuntur. Folio-
rum ſuccus & Galaticæ Acaciæ nigerrimus

improbatur: item qui valde rufus. Hic Plinius alteram Acaciæ ſpeciem, quam in Cappadocia & Ponto naſci ait Dioſcorides, Galatiam appellat, & cum prio-
re, Ægyptia, ſcilicet, confundit, ſi ſemen omnium, & non Galatiæ tantum Len-
ticulæ ſimile facit. Dioſcorid. enim prioris ſemen Lupino comparat, alterius
minus Lente eſſe ait. Gummi quod ex Acacia Spina ſtillat, id præfertur, quod in
vermiculorum ſpeciem contrahitur, & vitri modo perlucet, ligni expers: proxi-
mum eſt candidum: ſordidum verò ac reſinoſum inutile. Id etiam optimum eſ-
ſe tradit Plinius, vermiculatum, colore glauco, purum, ſine cortice, dentibus
adhærens. Theophræſtus lacrymoſum humorem hanc Spinam ferre tradit, non
è cortice, ſed in folliculo. Serapio Arabicum nuncupat, quod ex Arabia regione
Ægypto finitima ſuo tempore importaretur, inquit Matthiol. Scire autem
oportet Gummi Arabicum Officinis dictum, multum à Spinæ Ægyptiæ Gum-
mi differre: neque enim contractis vermiculis ſimile eſt, ſed grumis verſicolori-
bus conſtat. Aduchi non ita pridem cœpit ad nos ex Ægypto vera Acacia,
in paranda Theriace, aliſſque componendis medicamentis valdè expetita,
qua nos ad hoc uſque tempus caruimus. Id Gummi Galenus aliquando
κόμμι ῥηλαίων vocauit, ob id fortasſe quod Theophræſto auctore in agro
Thepano magna ſit ſpinosæ huius arboris copia, & ingens ſylua. Spinæ
Ægyptiæ ſuccus, inquit Dioſcorides, oculorum medicamentis vtilis: valet
ad ignem ſacrum, vlcera quæ ſerpunt, perniones, pterygia, & oris ylcera:
procidentes oculos reprimat: menſium abundantiam ſiſtit, prociduam
yuluam cohibet: citam aluum ſiſtit, aut potus, aut ſubter inditus: capillos
denigrat. In qua Ruellij translatione id meritò reprehendendum videtur,
quod ἐπὶ τῷ ποτὶ γυναικείων, menſium abundantiam ſiſtit, interpretetur, cum
fluxum muliebrem dicere debuiffet. Differt enim fluxus muliebris à menſibus,
ſeu menſtrua purgatione immodica, vt perſpicuè docet Paulus. Sed Plinium,
Ruellius imitatus eſt, quo loco eadem quæ Dioſcor. habet. Acacia purpurea, aut
leuco

leucophæa, & quæ facillimè diluitur, vi summa ad spissandum, refrigerandumque est, oculorum medicamentis ante alias utilis. Lauantur in eos usus pastilli ab aliis, torrentur ab aliis, capillum tingunt. Sanant ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, & humida vitia corporis, collectiones, articulos contusos, perniones, pterygia. Abundantiam mensium fœminis sistunt, vuluamque, & sedem proidentes. Item oculos, oris vitia, & genitalium. Sed non hoc tantum loco Plinius menses pro fluxu muliebri reddidit. Gummi verò Acaciæ spissandi, refrigerandi que vi peditum esse scribit Dioscorides, cutis meatus obstruere, & medicamentorum quibus admiscetur acrimoniam hebetare: ambustis ex ovo illitum pustulas non pati erumpere. Acaciæ planta Galeno, & ipsa acerba est, & fructus, & succus, qui lotus quidem & imbecillior, & minus mordax redditur, vt pote acrimoniam quandam dum lauatur deponens (idest vehementius adstringentem vim, qua contacta corpora distrahit, ac veluti dilacerat. Ea scilicet vis aquæ perfusione diluitur, & obtunditur. Sic locum hunc exponit Dalechâpius: omnis enim acrimoniam prorsus expers est Acacia, etiam si Galeno credamus partes quasdam calidas in eius substantia mixtas esse) Porro si parti alicui sanæ illinatur, protinus eam & sicciorem, & contractiorem efficiet, nullum quidem caloris sensum inuehens, sed nec frigoris admodum valentem. Vnde constat medicamen id esse frigidum & terreum, immixta quadam etiam substantia aquea, videturque sanè non esse similium partium, verum quasdam in sese dispersas habere partes tenues, & calidas, quæ in ipsa lotionè segregantur. Esto porro tertij ordinis exsiccantium, & secundi refrigerantium, cum lotum fuerit, illotum verò primi Acaciæ veræ substituunt tum Officinæ, tum medicorum vulgus succum ex syluestribus Prunis expressum, in tenues placentulas diuisum ac in sole siccatum. Dioscorides tamen eius vice tum Rhois folia, tum Lentisci foliorum succum, tum Hypocistidem medicamentis admiscet, quibus vtendum potius fuerit, quam syluestrium Prunorum succo.

Vires
Gummi.

Ibidem.

Lib. 6. sim.

Lib. 1. c. 124.
& 75. & 109

SCORPIVS THEOPHR. CAP. XIX.

HANC plantam Scorpionem Theophrasti (Gaza Latinè nepam vocat) herbarij esse iudicant: quia multa ei conueniunt, quæ de Scorpione Theophrastus prodidit. Scorpium, inquit, spinosa planta, tota spinis constat vt Corruda. Sic hæc adulta nullo modo foliosa est, sed spinas tantum pro foliis habet. Præterea radice singulari breuique constat, ante æstatem non germinat, germinationem prorogat in autumnum. Floret etiam post æquinoctium autumnum: florem in carne extuberante sub extremo aculei profert. Quæ omnia de Scorpione scripsit Theophrastus. Quod verò idem alio loco scripsit Scorpionem radicem figura Scorpium esse similem, vtilemque & ad eius ictum, & ad alia quædam, id huic sententiæ nostræ non repugnat. Etenim de Thelyphoni, non de Scorpionem spinosi radice id accipiendum esse ipsemet Theophr. aliquanto post perspicue demonstrat his verbis. Thelyphonum quod alij Scorpionem appellant, quia radicem Scorpium similem habet, &c. Quare Gaza superiore loco nepam vertere non debuit, hunc Scorpionem siue Thelyphonum cum Scorpione spinoso perperam confundens. Planta hinc depicta radice est crassa, lignosa, nigra, simplici, dimidium pedem longa: caulibus multis, ferè pedibus, qui plurimis aculeis rigidis, firmisque horrent: foliis in paruula & tenella planta minimis, Tragacantho similibus, in vetusta & dura nullis: flore paruulo, ad aculeorum imā partem emergente: semine in siliquis latiusculis incluso. In aridis locis & perflatis nascitur. Huic affinè, vel eundem Scorpionem descripsit Clusius. Pedis altitudinem raro superat, totus densissimis spinis horret, quæ seriè quādā

Nomina

Lib. 6. Hist.
cap. 1.

Tempus.

Li. 6. Hist.
cap. 3.Li. 9. Hist.
cap. 14.Lib. 9. Hist.
cap. 19.Lib. 9. Hist.
cap. 14.

Forma.

Locus.


SCORPIVS

Theophrast.

2.Sco.gen.


Lib.6.ca.9.

Lib.33.ca.4.



SCORPIVS ALTER,

sive Genista Spinosa.



seruāt, & semper cōtrario inter se exortu bine nascuntur, neq; aliæ ex aliis: summis ramulis inhæret bini aut terni flores, lutei, mense Martio, quo tēpore exiguas, breuēsque siliquas, vel potius semina Erui magnitudine multa incanāque lanugine hirsuta profert, dēfissimis spinis occulta: radix singularis, sed in plures deinde ppagines sparsa, dura, liquosa. Hęc Clusius. Alterū Scorpij genus quidā statuūt fruticem spinosum, descriptum à Dodonæo pro Genista spinosa secūda, foliis carentem, spinis vndique horridum. Maio & Iunio mēsis florere scribit. Vlicem Plinij quidam esse volunt, Roris marini similem, asperum. Belgæ *Gaspeldoren* vocant, Armorici, apud quos syluæ huius plantæ sunt, tam proceræ vt propemodum arborescat, vocant *des lans*. De spinosa hac planta, quæ sequuntur Pena tradit. Prorsum cognata Genistæ hæc, sed multum aspectu horrida, sentibus præduris, innumeris, cancellatim armata, semper virentibus, striatis, lignosis virgultis, Spartio similibus, spinis pene folia occultentibus. Quare doctiorum nonnullis placuit Gazæ Nepam esse, aut Scorpium Theophrasti: sed obstant Genistæ siliquæ, aliquanto breuioribus, & flores non ab similes, concolores, eiūdem saporis, qui aurei particulatim emicant, tota æstate, etiāque hyeme in Anglia, vbi frequentissima in sterilib⁹ & Ericetis, in Prouincia item Narbornēsi penē par proceritate. Sed Monspelij ad Ladum in collibus saxosis triplo minor, rigidior & squalidior est, adeo vt parum Genistam representet, folijs lentis. Illic Aspalathum secundum faciunt, tametsi inodora, & funis instar pertinax frāgēdo sit: floribus quidam ad iēterum vtuntur, & tota planta calfaciunt furuos. Clusius Aspalathum alteram, tum Salmantiæ, tum Mōspelij sic dictam pinxit, cubitum non excedentem, fruticosam admodum multis horrentem spinis, deorsum inflexis, firmis, acutis, in quibus nascuntur puella folia, lentis magnitudine, viridia, qualia etiam (sed tene-riora) fert in nouellis ramulis, quibus subsunt

recens nati aculei: flores in firmioribus & rigidioribus spinis, terni, quaterni, aut plures simul, Genistæ similes, sed minores, nunc lutei, nunc pallestētes: semen in siliquis exiguum. Legitimā Aspalathū alteram esse non faterur Clusius: verū cū à nonnullis sic vocetur, nomē mutandū non censuit, præsertim cū ad quam plantā à veteribus memoratā referēda sit, adhuc nesciat: fortasse ad scorpiū Theoph. inquit Clusius, Eadem est cū Genista spinosa, aut certē persimilis.



RACIS *πύξος*, Latinis Buxus & Buxum dicitur, Gallis *Bouys*, Italis *Bosso*, Hispanis, *Box*, Bœmis, *Possan*: Anglis, *Burs*. Belgis *Palmeboom*: Germanis *Buxbaum*, Buxus quædam frutex tantum est, quædam in arborem magnam assurgit. Tria eius genera, inquit Plinius. Gallicum quod in metas emittitur, amplitudinemque proceriorem: Oleastrum in omniusu damnatum, grauem profert odorem. Tertium genus nostrate vocant; sylvestre, ut credo, mitigatum satum, diffusius, & densitati parietum virens semper, ac tonsile. Hoc Plinij loco mirum certè est, cur secundum Buxi genus Oleastrum vocet. Annotat Dalechampius Plinium, aut eius scribam libertum in Oleastri voce deceptum fuisse. Nam cum apud auctorem Græcum reperisset secundum Buxi genus *ἀγρίον ὄλον εἶναι*, omnino agreste esse, nec utile materia, ut primum genus, nec vestiendis parietibus idoneum ut tertium, imo etiam abominandum foetore, & grauitate odoris, incautè legit *ἀγρίελατον εἶναι*, Oleastrum esse. Buxus arbor crasso est trunco, spisso, duro, valido: ramos emittit multos cæ-

Nomina


Genera.

Dodon. li.

6. cap. 32.

Li. 16. c. 16.

BUXUS.



terarum arborum more, duros, crassosque, foliis plurimis vestitos, Myrto similibus, minoribus, densioribus, crassioribus, subrotundioribus, saturatæ viriditatis, perpetuis nec vnquam decidentibus: flore herbaceo: fructu quaternis apicibus in cacumine diuiso, Ciceris magnitudine, semine rufescente, omnibus animantibus inuiso, quod Carthegō vocari Plinius scripsit ineptè, cum enim Theophrastus libr. 3. cap. 15. historiæ Buxi Cratægi descriptionem statim subiecisset, Plinius hæc confundens, dixit Buxum granum ferre quod Cratægum vocant. Ineptius idem Buxo tribuit, quæ de Ilice Theoph. prodidit, nempe à Septentrione viscum gignere, à meridie hyphear. Buxus tertius, frutex, ramos multos sepe ex ipsamet radice, nonnunquam ex paruulo trunco in latum spargit. Folia habet dilutioris viriditatis, rotundiora, minora, cætera similia supradictis duobus generibus. Buxus, inquit Theophra. magnitudine est haud procera, folium ei Myrteo simile, (Plinio cō-

Forma.

Li. 16. ca. 30.

Lib. 3. Hist.

cap. 15.

Li. 16. c. 24.

Locus.

cauum.) Buxus montes amat, in planisque nasci recusat. Pyrenæis ac Cytoriis montibus plurima, & Berecynthio tractu: crassissima in Corsica, flore non spernendo, vel, ut quidam legunt, apibus florē non spernentibus, quæ causa amaritudinis mellis. Semen illius cunctis animantibus inuisum. Hæc in Olympo Macedonia gracilior, sed brevis. Amat frigida, & aprica. In igni quoque duritia, quæ ferro, nec flamma, nec carbone utili. Hæc Plinius ex Theophrasto, transtulit, sic scribente. *φύεται ὅ πυξος ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις, καὶ τραχέσιν: καὶ καὶ τὰ κύλωνα ταιῆτον, ὅ ἢ πλείη γίνεσθαι. ψυχρὸς δὲ ὁ ὀλύμπος μακεδονικὸς: καὶ ἐν ταύθῃ γίνεσθαι, πλὴν οὐ μεγάλοι μέγιστοι δὲ καὶ χαλλισταὶ ἐν κυρήνῃ* legendū ἐν κύρνῳ in Corsica, καὶ ἐν μὲν καὶ πάχος ἔχουσαι πολὺ πὰρὰ τὰς ἄλλας: διὸ καὶ τὸ μέλι οὐχ ἡδύ, ὅσον τῆς πυξου, πλεῖσθαι δὲ πολὺ. Id est, Buxus locis frigidis & asperis nascitur, etenim Cytorij montes tales sunt, in quibus plurima prouenit. Olympus quoque Macedonia frigidus, in quo nascitur, sed non magna. Maxima autē & pulcher-

rima

rima in Cyrene, (in Corsica.) Nam procera est, & crassitudine cæteras longè superat. Quamobrem mel insuaue est, Buxum olens, multum autem, & copiosum. Plinius dixit Buxum in Corsica crassissimam esse, flore non spernendo, hancque esse causam amaritudinis mellis: Theophrastus in Corsica crassissimam, melque illic insuaue, quia Buxum oleat. Quod vterque de Cytoriaca Buxo tradidit, id & Poëtæ cecinerunt: Cyturus enim buxifer à Catullo dicitur:

Et iuvat undantem Buxo spectare Cytorum, dixit Virgilius. Buxus Februario &

Li. 2. Geor.

Tempus.

Temper.

¶ Vires

Ibidem.

Libr. Hist.

pl. ca. 347.

Plinius li.

16. cap. 16.

Plin. ibid.

ca. 40.

Plin. ibid.

Ruell. li. 1.

cap. 60.

¶ Usus.

Buxus gaia
cū non est.

Lib. 1. Dio.
cap. 114.

Fusc. Ibid.

Martio mensibus floret. Septembri semen maturum est quibusdam in locis. Buxi folia calida siccaque esse, atque adstringere ipse gustus perspicuè demonstrat, inquit Dodon. In eadem sententia est Fuchsius scribens à recentioribus temperatam eius arboris essentiam statui, sed id multas ob causas verisimile non videri. Haud dubiè verò adstringere, & siccare. Quia Buxus immortalis coma virescit, topiario operi accommodatissima est, ac tonsilis. Imprimis verò materies honorata illi est, raro crispanti (crispulanti, vetust. cod.) nec nisi radice: cæterò lenis quies materiæ, silentio quodam, & duritie ac pallore commendabilis. Idem alibi: spississima ex omni materie, ideo & grauissima iudicatur Ebenus, & Buxus, graciles natura, vel, gracilis natura, ut de Buxo tantum hoc intelligatur. Neutra in aquis fluitat, nec Suber, si dematur cortex nec Larix cariem vetustatēque Buxus non sentit. Nunc sola pectinum dote commendatur, ad plaustrorumque axes, & aratrorum buras. Fiunt & ex ea tibiæ ac fistulæ, pertusæ rotundis foraminibus, quibus digitorum appositu clausis, aut apertis, cantus moduli variantur & pyxides, quibus nomen dedit. Nullus Buxi in medicina usus: folio tantum cum materiei Scobe & lixiuio capillum rufat. Sunt qui dicant ligni scobe hausta sanari alui profluvia. Nec desunt ex recentioribus, qui sentiant nihil aliud nobis esse Buxum, quam Indis lignum, quod Gaiacum appellatur: quoniam Buxi decocto feliciter sanatos esse lue venerea affectos, frequenti experientia compertum est, quam opinionem refellit Matthiolus. Nam & si, inquit, eas esse Buxei ligni vires experientia doceat, id tamen, & Indorum Gaiacum eandem esse plantam non rectè colligas. Gaiacum enim lignum est pingue, resinosum, materia intus nigra, Ebeni fere modo, amara, acrique. Quibus notis siccam Buxi materiam carere constat. Præterea Gaiaco (testibus iis qui in India viderunt) folia sunt Plantaginis, breuiora, crassiora, duriora: lutei flores: fructus Iuglandis magnitudine, Buxo verò folia Myrti, breuiora: flores herbacei: fructus Myrti nunquam maior. Somnum capere sub hac arbore cerebro vehementer incommodat, quod eius odor naturæ prorsus aduersetur. Ferunt serpentes vulneratas eius radice degustata, statim sanitatem recuperare. Germani ex Galliæ Narbonensis locis Hispaniæ finitimis, præcipuè montibus Pyrenæis, circa oppidum Limons, haud procul Carcassona, crispum Buxi radicum magnam copiam aduehant, ob varias maculas & intortos linearum discursus ad opera lantiora expetitarum, ex quibus cochlearia, cultellorum manubria, latrunculi, & imungulæ fiunt, ab his præcipuè qui oppidum incolunt celebre nomine D. Claudij in monte Iura: Eas radices quamuis seruato prisco vocabulo, sine discrimine *Brouchin*, quasi Bruscum vocent, in iis tamen, ut & tuberibus Aceris Bruscum & Molluscum facile discernas, lineis vel simpliciter sparsis, vel flexuosis distortis. In eodem monte Iura quod antea nos monuimus, lignarij Abietum & Picearum candidissimos truncos recto venarum discursu fissiles, nullis interceptis nodis, ad opera faciles, seruata dictione vetusta *λασόν*, qua Theophrastus usus est, adhuc Louchon vocant: Aruerni verò cuiusvis arboris crassiorem rammum *Lusse*.

Nomina

Li. I. ca. 84.

Lib. 4. Dio.
cap. 152.

Libr. de
Hist. pl. 6.
cap. 7.

In frumc.
Hist. ca. 33.

In libr. 4.
Diosc. c. 158

Lib. 3. Hist.
pl. ca. 34.

Li. 24. ca. 9


Emble. 137.
lib. 4. Diosc.

DE Spartio, Genista, & Sparto, lunco, magna est inter auctores controuersia. Hermolaus, & Marcellus Dioscoridem cum Spartiū dixit, Genistam, non Spartum Hispaniæ descripsisse videri aiunt. Horum summus alioqui imitator Ruellius falli eos scribit, qui Genistam eandem esse cum Spartio contēdunt. Amatus Lusita. & Andreas Lacu. superiorum sententiæ subscribunt. Matthiolus cum aliquando idem sensisset, tandem mutata sententia, Spartium Dioscoridis, & Spartum Hispanicum eandem stirpem esse existimauit, atque à Genista diuersam. Fuchsius & Tragus pro Genista exhibent, eam quæ Genista angulosa à nobis dicetur, at pro Spartio ille quidem eam quæ à Matthiolo depingitur Spartij nomine, hic verò florem tinctorium vulgo nominatum, quem seorsum describemus. Dodonæus Spartum nomine Genistæ Hispanicæ descripsit, quæ in Hispania & Gallia Narbonēsi prouenit, & eam pinxit, quam à Fuchσιο & Matthiolo Spartij nomine pictam esse diximus. Alia in historia, Spartum est, inquit, non quæ Genista appellatur, siue illa Italica dicta, aut alia quæuis, sed alia stirps Hispaniæ familiaris, Genistæ quidem Italicæ virgarum multitudine, ac tenuitate quadantenus similis, nullis, aut omnino paucissimis, ac minimis foliolis, quæ non siliquas veluti Genista, aut legumen aliquod, sed lobos paruos, hoc est exigua vnde quaque conclusa capitula, in rotunditate oblonga, & sub candida fert, Bonis, id est, Fabis minoribus magnitudine formæque æqualia, & candidis earum colore quoque similia, in quibus semen vnum aut alterum conditur, nigrum, aliquantulum compressum, Aphacæ fructum satis referens. Hæc ille, qui in Sparti historia parum sibi constare videtur. Vtroque enim loco Spartum non Spartiū Genistam Hispanicam appellās, illo in Hispania & Gallia Narbonensi eam nasci tradit, hoc, Hispanicam ab Italica differre, cum Italiæ, & Galliæ Narbonensis Genista eadem plane sit, nec Amatus Lus. nec And. Lac. inter Hispanicam & Italicam aliquid esse discriminis arbitrentur. Dicit verò non potest Spartij, id est Genistæ Hispanicæ nomine, Spartum Hispanum designari: de eo enim post eum locum quem citauimus seorsum tractat Dodon. ex Plinio. Cordus Spartum Latinis vocari Genistam scripsit. Esse autem duplicis differentię. Quandam in funes torqueri, ex qua etiam corbes Vuis passis, & ficubus seruandis texuntur in Hispania, Spartumque à veteribus eam plantam vocari: Alteram non tam Lentas habere virgulas, vt simile quiddam ex iis fieri possit. Alio in loco Genistam idem Iunceam depinxit, ac descripsit, eam planè quæ fuchσιο Matthioloque Spartum est à Genista diuersum. Sed quid mirum de hac re inter recentiores controuersiam extitisse: cum Plinius ipse dubitauerit, an Genista sit, quam Græci auctores Sparton appellauēre, ex qua lina piscatoria apud eos factitabantur. Cornarius Genistam esse Spartion Dioscoridis vult, cui Plinius easdem vires, quas Dioscorides Spartio adscribit, neque dubitat, vt Plinius, quin Spartum Græcorum Genista sit, sed Hispanici generis, apud Græcos rari, ex quo Asiæ populi lina ad retia præcipua facerent: quandoquidem ex Genista nulla fieri possunt. Ex quibus intelligere licet Cornarium aliam sentire esse Genistam Hispanici generis, aliam ex qua lina piscatoria fieri non possunt, quæ fortasse nostra est Genista angulosa: duplexque esse Spartion, alterum etiam hodie in Hispania copiosum, alterum quod Dioscorides Spartum appellat, Plinius Genistam. In hac opinionum varietate, si quid statuere & decernere mihi liceat, iis potius assentiendum puto, qui Spartium Dioscoridis & Græcorum Genistam esse

esse arbitrantur Spartum vero Iuncum Hispanicum. Nam Ruellij Matthiolique rationes facile dilui possunt. Prior, quod Dioscoridis Spartum frutex sit sine foliis, quibus scatet Genista: Altera quod Spartum florem habet, ut albæ Violæ, luteum verò Genista ferè piso similem. Spartum enim plantam quæ iam virgas floresque protulerit, id est senescentem Dioscorides describit, quo tempore foliis caret. Eius verò adolescentiæ statum, quo novos ramos, foliaque minuta profert, negligentius prætermisit. Sic dictamnium Dioscorides flore semineque Chamæscen flore carere scripsit. Quæ si vera essent, nothæ essent hæ Dictamni & Chamæscyes plantæ, quæ pro veris habentur. Quare ex eo quod Spartum iam adulto folia nulla sunt, non efficitur id Genistam esse non posse, quæ pululans folia habeat. Quod de flore dicunt, nullius est momenti. Dioscorides enim non floris Spartij figuram cum floris Leucoij figura hic comparat, sed colorem cum colore. Esse autem Leucoium aliud flore albo, aliud melino, &c. Dioscorides ipse alio loco testatur. Spartum igitur planta hæc dicitur, quod funiculi, & vinculi vsum in alligandis vitibus præbeat τὸ ἀράριον, id est Iunci Sparti modo, & Genista, fortasse quia genu modo flexilis ad nexus sit, vel quia genibus medeatur dolentibus, vel quia, ut alij censent, facillimè & celerrimè sobolem generet suo semine Gallis, *Genest*, & quibusdā in hortis sata, *Genest d'Espagne*, *Genest de Florence*: hodie vulgo in tota Græcia, quæ Iuncū Spartū nō nouit, ἀράριον vocatur, Italis *Genestra*, Hispanis *Genestra*, *Giesta*, & *Giesteira*, Genista hæc, siue Spartiū Dios. & Græcorū frutex est, cuius rami in multas virgas diuiduntur, longas, rectas, teretes, glabras, iunceas, firmas, fractu contumaces, foris lento, neruoso, flexili, egregiè virente cortice, intus inani, fungoso, candidoque, leuem Iuncum prorsus referentes. De foliis, qui plantam diligentius contemplatus fuerit, hæc verissima esse comperiet, in teneris scilicet, & nuper enatis virgis folia esse latiuscula, utrimque acuminata, pauca, ex interuallis plerumque singula, non ut in


SPARTIVM DIOSC.

siue Genista.



SPARTIVM MATH.

siue Genista.



Genista

Lib. 3. ca. 31.
Li. 4. c. 164.

Li. 3. c. 121.

Fuch. c. 289

Nomina

Forma.

Cord. libr.
3. de pl. c. 43.

Genista vulgari & Scoparia angulosa, in vno quoque exortu terna. Quo magis adolescit planta, eo pauciora habet folia, angustioraque, in locis æstuosis adeo exilia, vt marcida facta, nulla prorsus, extitisse videantur, in vetustioribus, & senescentibus, quæque iam siliquas habent, virgæ ac ramuli foliis omnino carent: Flores habet luteos, vt Leucoium, figura Pisi flori similes, quibus singulæ succedunt siliquæ, angulosæ Genistæ siliquis longiores quidem, sed angustiores, in quibus semen compressum Lenticulæ simile, Phasiolorum modo nascitur, angulosæ Genistæ semini simile & æquale. Cortex caudicis, ramorum, radicisque gustu Genistam angulosam æmulatur, vt & semen illius gustum. Omnes tamen eius partes remissiores sunt tam odore, quam sapore. At extremæ virgæ, & nouella germina nihil graue, nihil nauseosum, nihilque amarum olent, aut resipiunt, sed herbaceam, & insipidam Iunci qualitatem. Mesues breuius sic descripsit. Spartium Genista Latinis, arbor est montana, cuius rami desinunt in virgas multas, rectas, flexiles, fractu contumaces, quibus vites, & alia ligantur. Flores habet flauos, lunata figura: siliquas Phasiolis similes, & semina in his Lenti similia, interuallis distincta. Hæc ille à quo Genistæ semen non rectè obseruatum esse Matthiolus ait, quod Erui, aut Viciæ faciem potius referat, quam Lentis. Imo verò Matthioli negligentiam hîc mirari licet, Genistæ in Italia vulgatissimæ semen adeo oscitanter contemplati, vt id Erui, vel Viciæ compararit, quod compressum est, & Lenti simile, etiam auctoribus Fuchsio, Ruellio, Dodonæo, nisi semen siliquas accipiat. Etenim Genistæ huius siliquæ, Erui vel Viciæ siliquis similiore sunt, quam Lentis. Nascitur Genista in Italia, & Gallia Narbonensi, locis siccis, adeo copiosè, vt Maio & Iunio mensibus iucundissimo sint viatoribus spectaculo, collibus huius pulchris floribus ita ornatis, vt proculaurei videantur. In multis aliis regionibus non passim in agris reperitur, sed in hortis seritur, & colitur. Semen Augusto mense & Septembri maturescit. Id calidum siccumque esse, tum gustus, tum vires indicant. Purgant, inquit Dioscorides per superna vehementer, Ellebori vice, citra periculum flores, & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectiones mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tuis extractus succus ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, vel infundere ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta. Quæ postrema Græcè sic leguntur. *ἐνίοι δ' ἐναποβρέξαντες ἀλμῆν, ἢ θαλάττην ἐγκλύζουσι τὰς ἰσχιαδικὰς ἀγέι δ' αἰμαλώδες, καὶ ξυσμαλώδες.* Id est. Nonnulli autem ipsos macerant muria, vel aqua marina, quam clystere infundunt ischiadicis. Educit enim cruentum quendam humorem, & veluti intestinorum ramenta. Plinius dubitans, an hæc Genista spartium sit Græcorum, eadem illi tribuens quæ Dioscorides Spartio, mox tanquam iam sublata omni dubitatione iudicat Genistam, & Græcorum Spartium idem esse, vt & Cornarius annotauit. Semen inquit, in folliculis phasiolorum modo nascens, purgat Ellebori vice, drachma & dimidia pota in aquæ mulsæ cyathis quatuor ieiunis. Rami similiter cum fronde in aceto macerati pluribus diebus, & tuis, succum dant ischiadicis vtilem, cyathi vnus potu. Quidam marina aqua macerare malunt, & clystere infundere. Perunguntur eodem succo ischiadici addito oleo. Quidam ad stranguriam vtuntur semine. Genista tusa cum axungia genua dentia sanat. Præterea quod scribit Genistam vinculi vsum præstare, & Asiam lina ex ea facere ad retia præcipua, in piscando durantia, frutice madefacto decem diebus, id de Genista nostra intelligi oportet. Hæc enim ligandis vitibus in Italia Salicis vicem ex-

Lib. 2. met.
pur. ca. 29.

Lib. 4. Dio.
cap. 152.

Locus.

Tempus.

Fuc. & Do-
don. ibid.

Temper.

& Vires.

Lib. 4. c. 152.

Lacu.

Emb. 137. li.
4. Diof. Pl.
li. 24. ca. 9.

Lib. 19. c. 1.

Matt. ibid.

Ibidem. plet, maceraturque etiam in aqua Cannabis modo, fiuntque inde funes, & rudia lintea faciendis faccis aptissima. Hæc cum Genistæ angulosæ non convenire perspiceret Cornarius, Genistam quandam Hispanici generis confinxit. Dubitat etiam Plinius, nunquid Genistam designauerit Homerus, cum dixit nauium Sparta dissoluta. At verò mox illa, neque ad Genistam, neque ad Spartium Græcorum, neque ad Spartum Hispanicum pertinere satis declarat, cum dicit, Nondum fuisse Africanum, vel Hispanicum Spartum in usu, certum est, & cum sutiles fuerint naues, Lino tantum non Sparto vnquam sutas.


Li. 19. ca. 1. Idem alio loco, ex Lino fuisse nauium armamenta apud Homerum eruditiores interpretatos esse asserit: quoniam cum Sparta dixit, significauerit sata, hoc est res sativas, Cannabim & Stupam. Versus Homeri est Καὶ δὴ δὸν πασέση πένων, καὶ σπάρα λέλυσαι. Scholiastes σπάρα interpretatur σπαρρία, χοινία, idest funes, & rudentes. Mesue auctore Genista calida & sicca est ordine secundo, semen calidius, floribus & ramulis humiditas inest, incidens, sed excrementosa, ob id vomitoria. Quin planta hæc omnibus suis partibus conturbat, prouocat, incidit, tenuat. Pituitam & humores extrahit ab articulis valenter, vomitu, & deiectione: renes omnibus excrementis perpurgat: vrinas strenuè mouet, calculum frangit in renibus, atque adeò in vesica, nec in his materias spissari, ac in calculum durescere finit. Flores quoque huius cum Melle Rosaceo, aut ouo strumas resoluunt. Oxymel etiam ex his, aut feminibus, tumores lienis discutit. Vomitus quoque cum his frequens, ischiadi, podagræ, & renum doloribus prodest. Nocet stomacho & cordi. Ob id cum Melle Rosaceo sumi vult Philagrius, vt his partibus nocere desinat, & eadem ratione cum Rosæ & Mastiche. Semen verò eius cum aqua Mellis Rosati sumendum est. Anisi quoque, & fœniculi, vel Dauci semen eius noxas castigant. Flos modicum coqui potest, semen diutius. Datur flos à drach. duabus, vsque ad drach. quinque: semen autem à drach. duabus ad drach. quatuor. Sparti vires breuiter perstrinxit Galenus. Spartij, quo vites apud nos alligant, tum semen inquit, tum virgarum succus non instrennuè trahentis est facultatis. Paulus eademquæ Dioscorides habet. Genistæ flores apibus gratissimi: quare circum aluearia feruntur. Coronis etiam eos addidit antiquitas. Alia duo Spartij eiusdem genera in Hispaniis à Clusio obseruata noua quidem, & à nemine adhuc descripta hîc ob oculos ponimus. Prius stipite est plerumque cubitali, pollicari crassitudine, cortice scabro, & striato, qui in multos ramos cubitales, virescentes, & striatos diuiditur: deinde hi in virgulas iunceas, virides etiam & striatas, quæ dum nouellæ sunt & primum germinant, aliquot foliis exornantur, statim atque planta florere incipit deciditibus, vt postea ἀφύλλος tota planta conspiciatur: è virgularum lateribus prodeunt oblongi pediculi, ex quibus dependent flores aliquot exigui, Clycyrrhizæ ferè vulgari

SPARTIUM

Hispanicum alterum Clusij.


Lib. 8. n. 2.

Libr. 7.
Plinius li.
24. cap. 9.



modicum coqui potest, semen diutius. Datur flos à drach. duabus, vsque ad drach. quinque: semen autem à drach. duabus ad drach. quatuor. Sparti vires breuiter perstrinxit Galenus. Spartij, quo vites apud nos alligant, tum semen inquit, tum virgarum succus non instrennuè trahentis est facultatis. Paulus eademquæ Dioscorides habet. Genistæ flores apibus gratissimi: quare circum aluearia feruntur. Coronis etiam eos addidit antiquitas. Alia duo Spartij eiusdem genera in Hispaniis à Clusio obseruata noua quidem, & à nemine adhuc descripta hîc ob oculos ponimus. Prius stipite est plerumque cubitali, pollicari crassitudine, cortice scabro, & striato, qui in multos ramos cubitales, virescentes, & striatos diuiditur: deinde hi in virgulas iunceas, virides etiam & striatas, quæ dum nouellæ sunt & primum germinant, aliquot foliis exornantur, statim atque planta florere incipit deciditibus, vt postea ἀφύλλος tota planta conspiciatur: è virgularum lateribus prodeunt oblongi pediculi, ex quibus dependent flores aliquot exigui, Clycyrrhizæ ferè vulgari

S P A R T I V M

aliud Hispanicum
Clusij.

S P A R T I V M

Aphyllon fruticosum,
Iunceis lanatis
capitulis.

vulgari similes, aut trifolio pratensi, colore luteo, inodori: deinde siliquula cartilaginea, rotundiuscula, colore ex flauo rufescente, in quibus semen vnicum saepius continetur, (raro bina) durum, nigrum, exiguo reni simile, quod in siliquulis, dum quatiuntur, crepitat, & sonum edit: radix dura, lignosa. Alterum planè huic simile, longè tamen maius, & hominis altitudinem superans inuenitur, virgulis priore tenuioribus, lentioribus, magis obsequiosis flore paulo maiore & omnino candido: siliquulis à superiore, forma non differentibus, sed minoribus, semen etiam minus continentibus. Primum variis Castellæ vtriusque locis crescit, arenoso solo, florétque Maio: semen maturum est Iulio. Secundū Gadibus, & locis vicinis aura marina perflatis, arenoso, & sterili solo Februario floret. Aliud Spartiū ἀφυλλον, fruticosum iunceis, aculeis lanatis capitulis depinxit & descripsit Pena, inuentu minus frequens, nascens in asperioribus præruptisque cliuis Alpium Magdalenæ in Gallo Prouincia paruus hic frutex est, Latiusculè in latera aliquot Sparteos striatos, ex pullo Buxeos, lignosos, & sesquipedales surculos spargens, ea radice Tragacanthæ simili, prolixiore, nullis foliis, sed multis Senticosis ac rigidis stilibus pungentibus, iunceis, in summo tantum aduncis, quorum singulis fastigiis aduoluuntur tomentaceæ gemmulae, vitis oculo similes, minores, sed concolores partim longiusculæ, & incuruæ, partim breuiusculæ, gustus nonnihil amari, exsiccantis, adstringentis: nullo aut folio, aut flore, qui hæc contemplanti visus sit.

GENISTA ANGULOSA,

sive vulgaris. CAP. XXII.

Lib. 6. ca. 6.

In Hist. ca.

79.

Li. 3. pl. c. 33.

Nomina



ENISTA hæc species, veterum Genista non est, quod & si Dodon. senserit, tamen eam nomine Genistæ descripsit: Fuchsius pariter Genistæ nomine depinxit: Cordus Genistæ angulosæ nomine proposuit, Chamæspartij Tragi addita figura. Genista hæc vulgaris Gallis, *Genest*, & *Geneste*, Italis *Genestra*: Hispanis *Genestra*: *Giesta*, & *Giestra*, Germanis, *Ginst*, & *Geinst*, & *Pfrin*, & *Pfrymmen* nominatur. Fruticis huius rami in

Forma.

GENISTA

angulosa seu vulgaris.



virgas plurimas distribuuntur, longas, gracilitate iunceas, angulosas, egregie virente, cortice vestitas, rectas, lentas, flexiles, distractu difficiles, & scoparum modo in densam cogeriem stipatas, in quibus folia sunt parua, oblonga, vtrinque acuminata, singulis ferè exertibus terna. Flores vere virgas totas vestiunt, pisi florum figura, valde lutei, ex quibus singulae prodeunt siliquæ, parua, principio leuiter hirtæ, in latitudinem quandam compressæ, cum maturæ sunt nigricantes, in quibus semen clauditur fuscum, Lenticulæ simile, minus, mediocriter durum. Radice nititur multifida, neruosa, lenta, flexili, minime fragili, coloris lutei. Totus frutex grauius olet, Sambuci propemodum instar. Saporem caudicis ramulorumque cortex, folia, virgæ, flores, semina, & radices habent, amarum, & quod reliquorum purgantium medicamentorum modo nauseam moueat. Folia Autumni exitu amittit, virgis tota hyeme inter niues grato aspectu virentibus. Nascitur in montanis & asperis locis, nec non in planis campis. Hac

Dodon. li.

6. cap. 6.

Tempus.

& Vires.

Aruerniæ montes maximè scatent. Est autem Genista hæc calida, sicca ordine ferè tertio, terget, tenuiumque est partium. Huius foliorum, virgarum, summorumque partium decoctum ex vino, aut aqua hydropicis summopere auxiliatur, omnibusque qui hepatis, lienis, renum, vesicæ obstructionibus laborant, quia partim per aluum, partim per vrinas aquosos, serosos, aliosque superuacuos humores educit. Eadem præstat semen drachma sumptum. Crenitibus vrinam medicamentis, & lapidem comminuentibus vtiliter permiscetur: quoniam sua partium subtilitate eorum vires adauget. Flores cum axungia tusi, & admoti arthritidis dolores leniunt. Denique hanc Genistam easdem prorsus vires habere quos Spartium Dioscoridis, auctor est Dodonæus.

GENI

GENISTELLA

CAP. XXIII.



B superioris Genistę similitudinem hæc planta à recētioribus herbariis Genistella appellatur, quod illa exilior, & humilior sit: Gallicè, *Petite Geneste*, vel *Petit Genest*, Germanicè, *Erdpfrymmen*, & *Stechende Ginst*. Frutex est virgas plurimas emittens, graciles, lignosas, quę

Nomina

Dodo. li. 6. cap. 9.

Forma

GENISTELLA.



initio, & adhuc teneræ, vestiuntur foliolis virentibus spinisque, tum etiam mollibus horrent, & parum pungentibus: At cum annum ferè excesserunt, foliolis ferè destituuntur, spinęque tum rigent, & vehementer pungūt. Inter foliola flores exoriuntur lutei, superiori Genistę similes, sed minores, & pallidiores. Semen exiguis siliquis includitur, rotundum & rufum: radix lenta est, & sublutea. Nascitur in incultis & arenosis, ac secus vias, Maio & Iuniomensibus floret. Adstringenti cum amaritudine facultate prædita est, ac proinde valenter, citra mordacitatem exiccat. Decoctū foliorū ex aqua aut vino, si bibatur, profluviiū menstruorum sistit. Ventris etiam fluiori succurrit. Quare non sine magno errore quidam pro Genista vtuntur, quum facultatibus diuersis prædita sit. Genistella, inquit Ruellius, colore Rosmarini, & pene folio, flore luteo, semine rufo, quod serpentibus aduersari tradunt. Sed & frondis decocto utilis natura ad sistendos mulierum cursus menstruos: eodem aluinis succurrunt potio. Sunt qui hanc esse putant quam Galli Rosmarinum aculeatum, vel potius Lomarinum appellant, Libanotidis folio, sed rigido, ac pungente, cuius floribus pastæ apes improbum mel conficiunt. Nascitur in arenosis, secus vias, flore melino. Scorpium secundum, & Vlicem nos antea suo loco vocauimus. Armorici in quorum vastis saltibus frutex is plurimus nascitur, appellant *des Ians*, quod supra nos monuimus.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires

Fu. h. c. 80.

Dodo. Fu. ch. Ibid.

Lib. i. c. 84.

GENISTA minima.



GENISTA MINIMA.

CAP. XXIIII.



B caulis breuitatem, & cum cæteris Genistis similitudinem hæc planta Genista minima vocatur, in sabulosis, & lapidosis tumulis Oeno fluuiio per Sequanos labenti propinquus nascens, quæ è Liono Salinario Nozereum oppidum itur. Radice est longa, crassa, lignosa, in multas radículas diuisa, nigricante: caule breui: ramis multis per terram spar-

Nomen.

Locus.

Forma

GENISTA

Ilvensis.

sis: folio densissimo, Hyperico, aut Rutæ simili, minore, candicante, villoso: flore luteo, Genistæ simili, croceo suo colore oculis prætereuntium adblandiente, & iucundo spectaculo terram in qua porrigitur exornante fructus in siliquis continetur. Idem ei sapor qui Genistæ.

GENISTA ILVENSIS

CAP. XXV.



Locus.

Forma

Vires.

IN Ilua Tyrrheni maris insula hoc Genistæ genus provenit, ramulis multis luxurians tenuibus, densis, ex albo subflavis, crebris nodorum articulis distinctis, ac veluti geniculatis. foliis circa genicula multis, angustis, breuib, subhirsutis, radiorum modo genicula ambientibus: flore in summis ramis copioso, luteo, piso, aut reliquis Genistis simili: siliqua, fructuque etiam similibus. Eadem ei quæ cæteris Genistis facultas, & si diuersa sit effigies.

GENISTA HUMILIS, SIVE

Tinctorius flos. CAP. XXVI.



NE rei herbariæ studiosos homonymia fallat, eos monitos velim florem tinctorium nominari plantam quæ etiam herba lutea nominatur: item tinctorium florem Tragos dici, quem pro Astore Attico Fuch. depinxit, eundemque Tragum Chamæspartium vocare florem tinctorium paruum. Nos de Tinctorio flore Fuchij hîc agimus, quem Dodon. Genistam humilem nuncupat. Gallicè *Petit Geneft*, vel *Petite Genefte*. An hæc herba veteribus cognita fuerit, nondum compertum habemus, inquit Fuchsius. Quapropter ad Germanicam alludentes appellationem, Tinctorium florem, interim dum certius nomen nacti fuerimus, nominabimus. Germani *Gilb bluom*, vel *Streich*, vel *Ferb blumen*, quod florum illius in tingendis libris, & aliis quibusdam vsus sit, nuncupant. Galli, *Fleur à teindre*, & *Herbe à iaunir*, quia eius floribus ad pannos laneos luteo colore inficiendos vtuntur. Tragus ferulæ nomine describit, atque etiam Thapsiam vocat, nec non à quibusdam Tinctorium florem dici scribit. Est igitur noster hic tinctorius flos proculdubio Genistæ species, Genistæ vulgari haud multum absimilis, nisi quod non tam attollitur, sed ferè per humum serpit, ramulis multis, ex vno stipite productis, gracilibus, herbaceis, circa quos folia sunt tenuia, paulò longiora, & latiora quàm in Genista vulgari, ad Hyssopi ferè formam accedentia: in summitate flores lutei, venusti, Genistæ vulgari similes, minores: Semen in siliquis angustis, compressum, Lenticulæ ferè par. Radix planè lignea. Provenit hæc planta locis altis & aridis, atque pratis nonnullis, inquit Fuchsius. Dodonæus verò nasci scribit in locis decliuibus & incultis, nonnunquam in terra humida, & argillosa. Floret Iunio & Iulio mensibus, atque deinceps semina profert. Amara est haud aliter quàm Genista vulgaris, vt calefacere illam & siccare in secundo

Dodo. li. 1. cap. 46.

Lib. 1. c. 49.

Lib. Hist.

pl. cap. 47.

Lib. 2. ca. 7.

Lib. Hist.

cap. 311.

Lib. 6. ca. 8.

Nomina

Ibidem.

Lib. 2. ca. 8.

Forma.

Lib. 1. stirp.

Hisp. c. 46.

Locus.

Ibidem.

Tempus.

tempera

Fuch. &

Dodo. ibi.

TINCTORIVS FLOS,

sive Genista humilis.

GENISTA

Tinctoria Clusij.



secundo ordine sit euidentissimum. Quemadmodum forma & temperamento Genistæ vulgari similis est, sic etiam facultatibus, haud dubiè illi respondet, verum minus efficacibus. Commodè hîc Genistam Tinctoriam Clusij appingemus, fruticem ad binum cubitorum altitudinem sese attollentem, nudo stipite, enodi, recto, digitali crassitudine, candicante cortice obducto, in multiplices breuèsque ramos summa parte fissum, tenellos, & fragiles, quos ornant folia Lini, aut Thymeleæ frequentia, supernè virentia, inferiore verò incana, & planè argenteo splendore, gustu, primùm linguam exsiccante, & nonnihil adstringente, deinde subamaro: Flores in summis ramulis nascuntur, spicatum, Genistæ Tinctoriæ Germanicæ similes, lutei. Tota planta elegans est aspectu. Nusquam fruticem hunc se vidisse ait Clusius, quàm in Murciano regno, secus vias, mense Martio florentem. Theuetus in Canariis insulis, ea præsertim quæ ferrea cognominata est, locis lapidosis, & montosis, nasci herbam refert, quam Oricelle vocant, Arabes *Sereth*, qua coria eleganter tingunt, ex Hispaniis eò delata.

Vires.

Lib. 1. stirp.
Hisp. c. 46.

CHAMÆSPARTII TRAGI,

CAP. XXVII.

CHAMÆSPARTII nomen à Trago factum retinemus, nunc meliore veròque destituti. Maio mense, inquit, cùm Genistæ florent, in aridioribus, & incultis campis exiguus frutex hîc reperitur, totus haud temerè dodrantem excedens, radice lignosa, cauliculis multis herbaceis, angulosis: foliis Lenticulæ, seu Genistæ: flore luteo, stipato, spicato, Orobo simili conspicuus: semine atro, terete, instar exigui Orobi, in siliquis nigris, rotundis concluso. Cauliculi vsque ad insequentem annum illæsi frigora hyemis sustinent, tum enim noui regerminant.

Nomen.

Lib. 2. ca. 7.

Locus.

Tempus.

Forma.

CHAMAESPARTIVM

Tragi.



CHAMAEGENISTA

peregrina Clusij.



Planta omni prorsus odore caret. Hæc paucis cognita est : nonnullæ tamen mulierculæ *Clein Strehblumen*, hoc est paruos Tinctorios flores vocant. Sunt qui *Erdpfrimmen*, id est terrestrem, seu humilem Genistam nuncupant. Græcè fortè licebit χαμαίσαρτιον dicere. Flores puerorum quoque crepundiis, & lusibus inseruiunt, & temperamento Orobi Fœnigraci esse mihi videtur. Hæc Tragus in cuius figura Chamæspartij, flores non rectè sunt expressi. Plantam hanc si Gesnerus Genistam esse angulosam Cordi existimavit, quod eius picturam Genistæ angulosæ descriptioni apud Cordum apposuit, rem non satis inspexisse videtur. Cordus enim Genistam angulosam à nobis descriptam, vulgarem nostram Genistam, siue Spartium angulosum intellexit. Chamæspartij etiam meminit Gesnerus. Alia quædam in Genistarum genere, inquit, caulibus angulosis, & peculiari quodam modo foliatis. Chamæspartium dixeris. Ab hoc diuersa est Chamægenista peregrina Clusij, quam Lobellius pingendam curauit, Clusius sic descripsit. Vix palmari magnitudine assurgit, admodum fruticosa, foliis Chamælexæ proximis, breuioribus, duris & carnosiss, per ambitum aliquantulum sinuosis, & crispis, rigidiusculisque, vno ex altero è medio neruo prodeunte, quemadmodum in Chamægenista illa, quàm nonnulli Sagittalem vocant, interdum vero binis ternisque simul exorientibus : hic verò neruus paulatim intumescit, & in ramulum conuertitur, quandoquidem tota planta foliosa sit : in extremis istis foliis quini senive, aut plures flores simul iuncti, ex villosis caliculis nascuntur, Genistæ similes, sed minores, aurei planè coloris, quorum bina inferiora folia incana lanugine pubescunt. Floret Martio in incultis locis Valentini regni.

Li 3. Plant.
cap. 33.
In Hort.
Germ.

SPAR

SPARTVM HISPANICVM, CAP. XXVIII.



ONCE aliud esse Spartum Hispanicum à Græcorum Spartio. Hermol. Marcell. Dodonæus, Cornarius, Amatus Lusitan. Andreas Lac. rectè existimarunt. Id hodie in Betica Hispaniæ regione, & Algarbia Lusitanorum, Aphricæ finitima prouenit: & ab incolis Sparto etiamnum vocatur. Est autem frutex Iunci aculeati modo aceruatim sponte sua nascens, virgis ad summum cubitalibus, solidis, fractu cõtumacibus sine folio, semine, & flore, præcipui ad vincula vsus. Ex his etiam sportulæ, corbes, calathi fiunt, quibus ficus, Vuæ passæ, aliæq; merces in alias regiones asportantur. Hoc Spartum Plinius à Græcorum Spartio distinxit, eiusque naturam seorsum explicauit his verbis. Sparti quidem vsus multa post sæcula cœptus est, nec ante Pœnorũ arma, quæ primũ Hispaniæ intulerunt. Herba est hæc sponte nascens, & quæ non queat feri, Iuncusq; propriè aridi soli, vni terræ dato vitio. Namq; id malum telluris est, nec aliud ibi feri, aut nasci potest. In Aphrica exiguum & inutile gignitur. Carthaginienſis Hispaniæ citerioris portio, nec hæc tota, sed quatenus parit, montes quoque Sparto operit. Hinc strata rusticis eorum, hinc ignes facèsque, hinc calceamina, & pastorũ vestis, animalibus noxium, præterquam cacuminum teneritate. Ad reliquos vsus laboriosè euellitur, ocreatis cruribus, manibusq; tectis manicis conuolutum osseis ligneisque conamentis. Nunc iam hyeme vix: facillimè tamen ab idibus Maiis in Iunias: hoc maturitatis tempus. Vulsum & examinatum, fascibus in aceruo biduo, tertio resolutum, spargitur in sole, siccaturq; , & rursus in fascibus reddit subtecta. Postea maceratur aqua marina optimè, sed & dulci, si marina desit, siccaturq; sole, iterum rigatur: si repentè vrgeat desiderium, perfusum calida in folio, ac siccatur stans, compendium operæ fatetur. Hoc autem tunditur, vt fiat vtile, præcipuè aquis mariq; inuictum. In sicco præferunt è Cannabi funes: At Spartũ alitur etiam demersum, veluti natalium sitim pensans. Est quidem eius natura interpollis: rursusq; quamlibet vetustum nouo miscetur. Verũtamen completetur animo qui volet miraculum æstimare, quanto sit in vsu omnibus terris, nauium armamentis, machinis ædificationum, aliisque desideriis vitæ. Hæc Plinius: qui paulo post Theophrastum nullam omnino Sparti mentionem habuisse tradit, cuncta cura magna persecutum ante ipsum annis cccxc. Cornarius tamen Linospartum Theophrasti non aliud esse quam Spartũ, è quo Plinius Lina ad retia præcipua fieri dixit, constanter credit, eiusq; mentionem fecisse Theophrastum, cum inter ea recenset, quæ multiplicem corticem habent. Verba eius hæc sunt. καὶ τῶν μὲν πυλὺλος ὁ φλοιὸς, οἷον φιλλύρας, ἐλέτης, ἀμπέλαι, λινωσάρτον, κρομύων. Matthiolus aliam Genistæ, aliam Spartij Dioscoridis figuram pinxit, quod idem esse cum Hispanico à Plinio descripto videtur existimare. Sed in hac figura quædam absurdè picta esse animaduertuerunt docti Herbarij. Eam tamen imitati Dodon. & Fuschius pro Spartio etiam exhibuerunt. Gesnerus Genistæ Iunceæ Cordi eandem apposuit. Flores enim minimè quadripartiti esse debent, etiam si Dioscorides Spartium florem habere vt Leucoium dixerit, colorem colori, non figuram figuræ, ferens, vt iam indicauimus. Spartũ certe Hispanicum folio, floræ, fœminæ destitutum est, nec ramos habet, qui in ramulos diuidantur, atque adeò Sparti planta nihil aliud est, quàm tenuium Iuncorum aceruus. Qua de re vt diligentes Herbarij ex collatione verius iudicare possint, Spartij Icones aliquot ex Clusio hîc adiecimus. Spartum Hispanicum, siue Plinij, numerosa, tenuia, Iunceæ viridiaq; folia habet, ex eadem radice prodeuntia, cubitali longitudine, quæ dum nouella sunt, latiuscula cernuntur, & in teriore parte canescentia, tempore verò contrahuntur & conuoluuntur, fiuntq;

Iunceæ

Corol. 160.
lib. 4. Diosc.
In hist. fru.
cap. 33.Embl. 137.
li. 4. Diosc.
Enar. 158. li.
4. Dioscor.

Nomina

Locus.

Forma.

Vfus.

Lib. 19. c. 2.

Embl. 137.
li. 4. Diosc.
Lib. 19. c. 2.Lib. 1. Hist.
cap. 8.
Lib. 4. Diosc.
cor. ca. 152.
Lib. 19. c. 2.Li. 3. pl. c. 34
Lib. 4. c. 152.

Lib. 2. stirp.

SPARTVM PLINII


ex Clusio.



Iuncea, dura, flexilia tamen, & marginibus, sic agglutinatis, vt vix rima appareat, nisi curiosius obserues. Ex his foliis culmi emergunt paulò longiores, qui vere & æstate paruum paniculam arundinaceam ferunt. Arundinis ferè modo florentem, deinde oblongum semen, veluti nonnulla graminis genera. Radices subsunt fibratæ & perennes. Multæ simul nascuntur huiusmodi plantæ, contiguæ Iunci modo, vt nonnunquam vna planta, siue multarum congestarum cumulus duorû pedum spatium, aut amplius in ambitu occupet. Plurimum nascitur in multis Baeticæ locis, sed omnium copiosissimû ab initio Regni Granatensis siue Baeticæ limitibus vsque ad Murgim urbē, vulgo Murcia dictâ, vt non sine causa totus ille tractus à veteribus appellatus sit Căpus Spartarius, quo noua Cartago, vulgò Cartagena, vrbs maritima cõtinetur, à nōnulis etiā Spartaria cognominata, ob Sparti eo in loco nascentis copiâ. Nascitur & in Valétino agro longè vberius, & lætius. Est verò Spartum hoc, quod etiam ab Hispanis apud quos nascitur Sparto nuncupatur, à Prouincialibus Elpho, illud ipsum quod Plinius eo loco, quem hoc capite citauimus, descripsit. Eodem est in vsu nunc apud Hispanos, qui fuit Plinij tempore. Nam ex crudo & siccato tapetas, siue aulæa, storeas, corbes, rudentes, aliósque funes cōficiunt: Ex eo aqua, veluti


SPARTVM ALIVD

Plinij ex Clusio.



SPARTVM tertium

Clusij.



linum,

linum, macerato, deinde ficcato tusoq; calceaminis genus quod ipsi Alpergates vocant, funes etiam & alia subtiliora opera neunt. Aliud Sparti genus nascitur in Murciano regno, humidioribus præsertim locis, superiore tenuius, cuius rarus est vsus storeis, aut aliis huiusmodi conficiendis, sed plurimus ad lineos faccos quos lectis substernunt, implendos, quemamodum nos stramine vti solemus, quoniam molliore tenuioreq; sit Iunco quàm superius: paniculam fert breuem, & membraneo folliculo, instar floris Narcissi, & similiū ferè, inclusam. Nascitur eodem quo prius modo, & paulò maturius floret; nempe Martio mense. Incolæ *Albardin* vocant, fortasse quia clitellas ex crassiore cannabina tela confectas, quas iumentis imponunt, quasque *Alabardas* vocant, isto Sparto compleant. Inuenitur apud Bergas atque etiam in nonnullis Galliæ locis, in aggeribus sabulosis Oceano propinquis. Sparti genus quoddam *Halm* ab incolis vocatū quasi ὄλμυρον, ἀπὸ δ' ἁλὸς, id est à sale, priori ferè simile, sed multo maius, & rigidius, cruribus eorum, quibus per eos aggeres iter est sine ocreis, permolestum: pungit enim, & cutim penetrat. Crescit eodem modo quo superiora, spicam ferens secales fere instar. Hæc de Sparto Hispanico literis mandata, & obseruata.

TAMARIX, CAP. XXIX.

Myrice, Latinè etiam Myrice, & Myrica, & Tamarix Plinio etiā Tamarice, in Achaia Bria sylvestris, Officinis Tamariscus, Arabicè *Tarfa*, seu *Carfa*, Gallicè *Tamaris*, Italicè *Tamarigio*, Germanicè *Tamarisken*, aut *Porst*, Hispanicè *Tamargueira*. Eius genera duo sunt Dioscoridi, altera sylvestris, arbor vulgo cognita, quàm hîc pictam damus, altera quæ in Ægypto, Syriaq; gignitur, mitior sylvestri. Rursus Tamaricis duplex

TAMARIX
Matthioli.



genus in Germania inueniri tradit Cordus. Alterum solidiore ligno, medullaq; admodū exili, & foliis tenuioribus, copiosè ad Rhenū circa Argentoratum nasens: alterum ampliore medulla, foliis latiusculis, lignoq; non vsq; adeo sólido, quod frequenter ad Danubij, & Vuertachi ripas in Vindelicia prouenit, præsertim circa Augustam. Tamarix quæ vulgo in Italia, & Gallia Nabornensi nascitur, frutex est, aut arbuscula, sæpius hominis tantum altitudine. Quam ob causam Virgilius humiles Myricas appellauit, ramis plurimis aliquando in viridi pallidis, aliquando fuscis: foliis Sabinæ, aut Ericæ, paruis, carnosiss, & nūquam deciditibus, vt ait Plinius, fructu flori simili in purpureum inclinante, muscoso, qui demū in pappos euolat. Plinius fructum nullum ferre, hoc est ne semen quidem, sed scopis tantum nasci scripsit. Vt qui id quod Dioscorides dixit, καρπὸν ὡς περ ἄνθος φέρει, βρυῶδες καὶ τὴν σύστασιν, neque semen, neque fructum esse, aut dici debere putarit. Narbonensem & Germanicam Tamaricem Pena sic descripsit & depinxit. Vulgatiorē, inquit, facieq; Ericæ

prioris videas præcipuè in riguis & maritimis Gallo prouinciæ & Lio Venetorum,

Nomina
Lib. 13. c. 21.

Lib. 1. c. 99.
Genera.

In li. 1. Dioscor. ca. 117.

Forma.

Eclo. 4.

Lib. 16. c. 21.
& 24.
Li. 16. c. 26.

TAMARIX | *TAMARIX*
Germanica. | *Narbonensis.*



rum, in Cotonei magnitudinem & caudicem crescere, è qua ad splenem detornantur pocula. At quæ hîc proximè appicta est, ad Rhēni ripas in Germania spontè frutescit, sed exilior, humiliorque multò, nec arbor fit, imo plerumq; in hortis Angliæ bruma interit. Flores huic tometosi papposiq; diffluunt vnà cum semine, maioresq; sunt, aut ferè pares, & similes vulgari Lamplanæ, sed purpurei. Narbonensi autem ramosi exiguiq; flosculi, non papposi, sed rotûdi, Oleæ similes, ex albo punicei, cum acinulis, quos interdum totum tri-duum Soli obiectos se obseruasse ait subsiliētes, & tripudiantes, vermiculo intus orto agitante, qui pertusis aut desilientibus tandem granis, foras prodit. Satiua syluestri similis est, fructum parit Gallæ proximum, inæqualiter adstringentem gustu, quo conuenienter utebantur antiqui vice Gallæ in medicaminibus oculorû orisq;. Tamaricem, inquit Plinius Corinthus, & quæ circa est regio Oryoniam vocat, eiúsque duo genera facit. Syluestrem planè sterilem, alteram mitiorem. Hæc

fert in Ægypto Syriaq; etiam abundanter lignosum fructum, maiorem Gallæ, asperum gustu, quo medici vtuntur vice Gallæ, & in compositionibus quas Antheras vocant. Quæ alicubi reperitur in hortis, & in quibusdam viridariis, mitior credita, inquit Matth. non alia est quàm sylvestris in locos mitiores translata. Indicio sunt fructus & flores sylvestribus omnino similes, non autem Gallæ. Romæ Tamaricem insigni proceritate sese vidisse idem testatur, in hortulo quodam, quæ etsi pro satiua ab omnibus haberetur, tamen fructus, florésque ferebat sylvestri similes. Apud pigras & stagnantes aquas nascitur. Ad fluminû ripas frequentissima prouenit in Italia. Satiua in Syria & Ægypto copiosa est, cuius infœlicia ligna appellantur, inquit Plinius. Cur autem infœlicia alio loco docet. Infœlices arbores existimantur, inquit, damnatæq; religione, quæ neque feruntur vnquam, neque fructum ferunt. Rursus alio loco de Tamarice loquēs. Vulgus infœlicem eam arborem appellat, quoniam nihil ferat, nec feratur vnquam. Steriles igitur arbores infœlices nominantur. Cicero. Infœlici arbôri suspendito, & ita Liuius. Attamen hanc Myricam, cuius infœlicia ligna appellari ait, fructum ferre Gallæ similem idem Plinius scribit, & infœliciora ligna esse Græciæ, Ostryiæ quæ Ostry n gignat. Ostrys tamē ordeo simile semen habet, figura, & colore: Illa verò puella Catulli, quæ vouet se daturam Vulcano lectissima Volusij Poëtæ carmina, Infœlicibus vstulanda lignis, non temerè infœliciû lignorum meminit. Sciendum enim veteres solitos esse plerumque prodigia & portenta sic procurare, vt exurerent lignis infœlicibus. Macrobius. Arbores quæ inferum deorû auertentiumq; in tutela sunt, eas infœlices nominât: subiicitq;, quibus portenta prodigiaq; comburi iubere oportet. Græci ex spinosis lignis quæ infœliciora videbantur, comburere solebant, & cinerem in profluentem proiicere, vt ostendit Theocritus de anguib; quos Hercules in cunis eliserat. Ergo Catulli puella, vt malum quoddam prodigium vouerat se crematuram versus optimos Volusij lignis infœlicibus. Sed ad Tamaricem redeat oratio.

Huius

Lib. 24. c. 9.

Lib. 1. Dios.
cap. 99.

Locus.

Lib. 13. c. 21.
Li. 6. c. 26.

Lib. 24. c. 9.

Pro Rab.

Cap. 21. 13.

Tur. T. 2.
Ad lib. 18.
cap. 11.
Lib. 3. c. 20.

Huius fructus, inquit Dioscor. datur cruentæ excreationi in potu, & cœliacis, & contra profluvia fœminarum, regium morbum, & Phalangiorum morsus: illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum lienem absumit: ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxione vulvæ opportunis, in dessefsionibus: phthiriasi, Lendibusq; circumfusum prodest. Abundantiam fœminarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calyces è caudice lienosis moliuntur, quo datus in his potus proficiat. Myrica Galeno abstergentis est incidentisq; facultatis, absque manifesta desiccatione. Habet verò etiam adstrictionem nonnullam. Has ob qualitates, facultatesque admodum prodest lieni duro, decocta cum aceto, aut vino, siue radice, siue foliis, siue extremis ramulis: sanat etiam dentium dolores. Cæterum fructus, & cortex non paucam sortita sunt adstrictionem, adeo ut Gallæ Omphacitidi proxima sint, nisi quod acerbitas evidens est in Galla, sed Myricæ fructui temperatura inest inæqualis, quoniam immixta est naturæ eius multa partium tenuitas, atque vis adstringendi, quod sanè in Galla non inest. Attamen ubi Galla fortè ad manum non erit, eo uti liceat ad omnia, ad quæ illa utimur, ad eademque, præterea & cortice. Porro Myricæ combustæ cinis admodum desiccatoriae facultatis est, plurimam habens abstergendi facultatem, pauxillam adstringendi. Myricen & Ericen vocat Lenæus, inquit Plinius, (Sic emendat Cornar. ex vetere libro manu scripto vulgatos Codices, in quibus habetur, Myricē, quam & Tamaricen vocat Lenæus) similem scopis Amerinis dicit. Sanari ea carcinomata, in vino decocta, tritaque, cum melle illita. Arbitrantur quidam hanc esse Tamaricen. Sed ad lienem præcipua est, si succus eius expressus in vino bibatur. Adeoque mirabilem eius antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt, ut affirmant, si ex ea alueis factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini quoque splenetico cibum protumque dant in vasis ex ea factis. Grauis auctor in medicina virgam ex ea defractam, ut neque terram, neque ferrum attingeret, sedare ventris dolores asseueravit impositam, ita ut tunica cinctumque corpori apprimeretur. Datur sanguinem reiicientibus cortex tritus, & contra profluvia fœminarum, cœliacis quoque. Idem tusus, impositusque, collectiones omnes inhibet: Foliis exprimitur succus ad hæc eadem. Et in vino decoquuntur. Ipsa verò adiecto melle gangrænis illinuntur. Decoctum eorum in vino potum, vel imposita cum rosaceo & cera sedant: quidam hæc conturbata sic legunt. Et in vino decoquuntur ipsa: adiecto vero melle gangrænis illinuntur, vel imponuntur cum Rosaceo & cera. Sedat & decoctum eorum in vino potu. Sic & epinyctidas sanant. Ad dentium dolorem, auriumque, decoctum eorum salutare est: radix ad eadem, similiter & folia. Hæc amplius ad ea quæ serpūt imponuntur cum polenta. Semen drachmæ pondere aduersus Phalangia & Araneos bibitur. Cum altillium verò pingui furunculis imponitur. Efficax & cōtra serpentium ictus, præter quam Aspidum. Nec non morbo regio, phthiriasi, lendibusque decoctum infusum prodest, abundantiamq; mulierum sistit. Cinis arboris ad eadem omnia prodest. Scribit Columella, sues dum dulcedinem pabuli confectantur, supra modum æstate splenis incremento laborare. Cui succurritur, inquit, si fabricentur canales ex Tamaricis trunco (sic enim legendum, non ut habent exemplaria ex Tamaricibus, & Rusco) repleanturq; aqua, & deinde sicientibus admoueantur. Quippe ligni succus medicabilis epotus intestinum tumorem compescit. Myricæ cinerem omnia vlcera ignis exustione contracta efficaciter exsiccare auctor est Serapio. Folia, inquit Matthiolus, simul cum tota planta potu frigidas collectiones inhibent, ac reprimunt. Rami contusi ex aceto illiti lienem attenuant. Datur ramorum cortex ad diuturnas alui fluxiones.

Lib.1. c.99.
Vires.

Li.7. simp.

Lib.24. c.9.
Embl.95.li.
1. Dioscor.

Lib.7. c.10.

In li.1. Dioscor. c.99.

Fructus potui datus confert viperæ morfib. Elephantiasim lienis vitio obor-
tam Myricæ radicem decoctam, cum vis passis epotum sanare tradidit Alcan-
zizus Arabs, id quod se vidisse ait in duabus mulieribus, quæ illo morbo tene-
bantur. Ex quo colligit Matthiolus id decoctum commodum fore morbi Nea-
politani remedium, Gaiaci ligni decocto fortasse haud absimile. Myricæ radices
pro odorata Cassia venditabant impostores. Sed fraude à Peritis materiæ me-
dicæ viris deprehensa, eius in Officinis vsus penitus exoleuit. Hippocrates eo-
dem libro *πρόμαλον* bis habet, qua voce Myricam Cornarius intelligit. Postero-
re loco, id ad suffitus, cum vteri loco moti vexant, probat. Priore verò
sic habet: *ἢν δὲ ἔτι φέρηται ὁ ῥόος, πρόμαλον φάξας, ἔτρίψας ἐν οἴνῳ δίδω.* Id est Cornario
interprete. Si verò adhuc feratur fluxus, Promalon, siue Myricā torreto, & tri-
tam in vino dato. Græci dictionarij *πρόμαλον*, *ἡ μυρική*, *ἡ ἄγρυον* exponunt. Quidam
eam quæ fœlici auctu adoleuit *πρόμαλον* intelligunt. Videtur autem Hippocra-
tes liberum reliquisse, siue quis fructu, siue cortice Myricæ vti velit: vtrumque
Dioscorides fluxione laborantibus fœminis commodum esse tradit.

SABINA, CAP. XXX.

Nomina

SABINA, vel Sauina Romanis, *Βράθυς* Græcis, & *Βάρυθρον* dicitur, Ara-
bibus *Abhel*, seu *Alharar*, Gallis *Sauinier*, Italis & Hispanis *Sabina*,
Germanis *Sebenbaum*, Boemis *Klaßterska*, *Cunogka*, Belgis *Sauelboom*,
Anglis *Sauin tre*. Officinæ Sauinæ nomen retinuerunt. Sabina duum
est generum auctoribus Dioscoride & Plinio. Vna foliis Tamarici similis, altera
Cupresso, quare quidam Creticam Cupressum dixerunt. Vtraque in multis Gal-
liæ nostræ hortis prouenit, miranda natura, & contemplatione dignissima.
Frequētior quæ Tamarici similis est, Fruticis, seu arbusculæ forma crescit, sem-
per tamen altera humilior, ad sesquicubiti, aut vix ad cubitorum duorum alti-

Genera.

Lib.1. c.88.

Li.24. ca.11.

Locus.

Forma.

SABINA

Tamarici similis.

SABINA

Cupresso similis.

rudinem

rudinem sese erigens, trunco brachij interdum crassitudine, ramos plurimos in latum fundente, & explicante. Folia cùm oriūtur, Cupresso similia sunt, deinde in foliorum Tamaricis figuram abeunt, candidiora, leuiusculè pungentia, perpetuò virentia. Odorem planta hæc valde grauem & validum spirat. Quæ Cupressum refert, procerior est. Sæpè etenim hominis altitudinem attingit, interdum celsior. Folia recentia, & adhuc tenella Tamaricis foliis proxima sunt, cùm adoleuerint foliorum Cupressi figurā imitantur. Imbecillioris hæc ac minùs grauis est odoris quàm prior: immortali, vt & altera coma viret: vtraque baccas fert nigras Iuniperinis similes. Id testantur Fuschius, Dodon. Cordus, Gesnerus, atque ipsa experientia. Quare non rectè videtur Matthiolus partiri Sabinam in sterilem & fructiferam: & hanc baccarum colore differentem, quæ in altera caruleæ, in altera rubentes spectantur. Quanquam Plinij auctoritate sese tueri potuerit, qui Sabinam negat fructum ferre, cùm dicit. Sabina herba propagine feritur, & auulsione. Et paulò post. Iisdem modis Rosmarinum ferunt, & radio: quoniam neutri semen. Hts accedit Serapionis testimonium, sic scribentis. Abhel, idest Sabina, quæ & Brathys dicitur, non habet fructū. Sed hac in re temerè his auctoribus fides adhibenda non est. Vtraq; enim tam Rosmarinus, quam Sabina semina ferunt, demonstrante id annua experientia. Sabina verò non semina tantum, sed & fructum fert Iuniperi baccis colore & figura similem, vt diximus, verum paulò maiorem, & gustu acriorè. Sed cū non in omnibus locis, & rarissimè fructum proferat, id in causa fuit, cur multi sterilem esse existimauerint. Secundæ Sabinæ coniungenda alia quam Lobellius ostēdit, ramulorum exilitate, & foliorum lenitate duntaxat diuersa, inquit, media inter Sabinas, & Cedros Phœnicias videtur, sed folia tenuiora & delicatiora, minimè aspera & pungentia sunt. Fructus Iuniperi minori par, similis, & concolor. Natalibus gaudet mōtosis Calabria, & Apulia. Hæc Lobellius. Nascitur & in cōualibus Alpinis supra Gratianopolim, prope vicū quē incolæ vocāt *Bourgduisantz*.

De Histor.
ca. 54.
Lib. 6. c. 84.
In li. 1. Dioscor. c. 105.
In Hort. Germ.
Lib. 17. c. 13.

Cap. 280.
Cordus
ibidem.

S A B I N A
Baccata altera.



Mirum etiam quod herbam Plinius appellet Sabinam, cùm omnibus constet fruticem, atque etiam arborem esse, non herbā. Quæ verò Sabina baccis rubentibus à Matthiolo esse dicitur, Sabina proculdubio non est, sed Thuia Mafsiliensis, quam *Serbin* vocant, à nobis iam descripta, & quam Cedrum Lyciam esse Bellonius putat, à qua non solum baccarum colore Sabina differt, sed & odoris proprietate. Idem Bellonius Sabinam alterā Cupresso similem affirmat se frequentissimam vidisse in Amano, & Olympo Phrygiæ montibus, tota facie Iuniperum maiorem referentē, magnitudine Amygdalæ arboris maioris, foliis Cupresso per omnia similibus, baccis per maturitatem in caruleo nigricantibus, & caudice resinam ferente. Eum Matthiolus meritò reprehendit, Sabinam hanc ineptè inter resiniferas recensentem, quam tot notis ab altera Sabina non distinxit Dioscorides. Eandem paulò post, parum sibi constans Bellon. quam Sabinam alteram Dioscoridis esse asseribat, arborem eam esse statuit, quæ à Plinio Brutes

Li. de Conif.

Lib. 12. c. 17

- Lib.12. c.11. appellatur, quasi vero Plinius Sabinæ vtriûsque suo loco non meminerit, nulla
 Inhil. c.16. Brutæ arboris in Sabina describenda facta mentione. Hanc Bellonij Sabinam
 pro Thyiæ genere alibi descripsimus. Sunt qui Auicennam censent Sabinam
 vno loco cum Iunipero altero cum Absinthio marino turpiter confudisse.
 Lib.2. ca.5. Prior locus is est. Abhel quid est? Est fructus Alharar, similis Alzarur. Et mox,
 Arboris eius duæ sunt species. Vna cuius folia sunt sicut folia Cupressi, multas
 habens spinas, quæ dilatatur, & non elongatur. Alia est cuius folia sunt, sicut
 Tamaricis, &c. Quem locum sic exponunt. Abhel fructus est Iuniperi, similis
 Li.2. ca.368. Mespilo Azarolo, vt quæ sequuntur de Iunipero non sint accipienda, quam ali-
 bi nomine Harar in minorem & maiorem distinguit, sed de vtrâque Sabina,
 cum Abhel, id est Iunipero perperam commixta. Quare Matthiolum hoc Aui-
 Ibidem. cennæ testimonio Sabinam fructiferam esse probare volentē, nominis Abhel
 homonymia deceptum fuisse arbitrantur: quod vt à Serapione pro Sabina, ita
 hîc quoque ab Auicenna fructum Harar esse definiente, pro eadem vsurpari
 crediderit. Imo ipsos falli, ac vehementer errare putauerim. Auctorem enim
 habeo Andr. Bellunensem, qui scribit Abhel non esse verum Alharar, sed eius
 speciem, & in libro Ebenbitar reperiri, eos errare, qui dicunt Abhel esse Alha-
 rar: quare ex eius effectis, & foliis Tamarici similibus colligi Abhel Sabinæ, aut
 generis ipsius fructum esse, & non Iuniperi. Verborum igitur Auicennæ is sen-
 Li.2. c.668. sus erit. Abhel fructus est Iunipero similis, & Mespilo Azarolo, siue Aroniæ, &c.
 Posterior locus Auicennæ est de Sceha, id est Absinthio marino. Sceha sunt duæ
 species. Vna est spinosa habens folia Cypressi, &c. Et alia habet folia vt Tama-
 Li.3. ca.24. riscus, &c. Quo loco cum de Absinthio marino ex Dioscoridis sententia tra-
 ctet, absurdè admodum vt Sabinam in duo genera distribuit, vt alterum foliis
 Cupresso, alterum Tamarici simile sit. Nunc de Sabinæ viribus dicamus. Vtriuf-
 Lib.1. ca.88. que folia nomas sistunt, inquit Dioscorides, collectiones illitu mitigant: quin
 Vires. & cum melle illita nigritias, sordesq; repurgant, & carbunculos rumpunt: cum
 vino pota sanguinem per vrinas eliciunt: partus apposita extrahunt, & suffitu
 idem præstant. Quod de carbunculis Dioscorides dicit, in Græcis legitur, ὅτι
 Embl.8. li. ἀνθραξας μελεππύπτει, id est carbunculos deterunt, sed falso, vt annotat Cornarius,
 1. Dioscor. legendum enim μελεππύπτει, id est, abrumpunt, emarginant, circumscribunt, vt
 idem sit quod μελεχαραζοῦσι ἀνθραξας, velut de Pice liquida dixit. Sabina Galeno est
 Li.6. simpl. ex numero fortiter exsiccantium, idq; secundum tres qualitates quas in gustu
 præse fert, similiter Cupresso, nisi quod ea acrior est, & vt sic dixerim magis
 aromatica, seu odoratior. Igitur huius quam modo dixi qualitatis particeps est,
 nempe acrimoniæ consistentis in temperamento calido, præterea amaritudi-
 nis, & adstrictionis obscurioris quàm in Cupresso. Siquidem quantò magis
 acrimonia superat, tanto etiam potentiùs digerit. Itaque glutinare nequit ob
 ficcitatis & caliditatis robur. Nam vtriûsque illi tantum inest, vt etiam tendat.
 & inflammationem adferat. At putredinibus similiter Cupresso accommodari
 potest, maximè vbi rebelliores, & diuturniores fuerint. Nam hæc citra noxam
 vim medicamenti perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum for-
 dida cum melle expurgat: carbunculos soluit. Porro essentiæ tenuitate menses
 quoq; prouocat, vt si quid aliud, & sanguinem per vrinas mouet. Fœtum etiam
 viuentem interficit, & mortuum eiicit. Esto autem hoc medicamen tertij ordi-
 nis tum excalfacientium, tum desiccantium, ex numero eorum quæ maximè
 tenuium sunt partium. Quidam Cinnamomi vice duplum eius substituunt. Est
 Lib.24. c.11. enim extenuantis & digerētis facultatis, si potum fuerit. Sabina, inquit Plinius,
 à multis in suffitu pro Thure assumitur. In medicamētis verò duplicato podere
 eosdem effectus habere, quos Cinnamomum, tradunt. Collectiones minuit, &
 nomas

nomas compescit. Illita vlcera purgat. Partus emortuos apposita extrahit, & suffitu. Illinitur igni sacro, & carbunculis. Cum melle & vino pota regio morbo medetur. Gallinacei generis pituitas fumo eius herbæ sanari tradunt. Matthiolus auctor est Sabinæ puluerem cum butyro permixtum, ad manantia infantium capitis vlcera magnopere conferre. Eundem drachmæ pondere ex butyri vnciiis tribus & duabus mellis sumptum asthmaticis mirificè prodesse. Dari quoque summo auxilio succi Sabinæ drachmas duas cum Chrysocollæ fossilis drachma, & vini albi vncia, ægrè parturientibus, sed non nisi flagitante necessitate. Tragus herbæ cuiusdam meminit, quam Sabinam nominat. Sed cum musci genus sit, de ea magis idoneo loco dicetur.

Lib. I. Dioscor. ca. 88.

Lib. I. ca. 189.

ERICA, CAP. XXXI.



VÆ Græcis ἐρεῖκη, Latinis etiam Erica nominatur, similiter Italis, Germanis, & Belgis Heyden, Hispanis Queiro, Gallis Bruiere, Anglis Heth. Athenienses, ut Plinius ait, Tetralicem appellant. Eubœa Sisaram. Codices quidam Tetradicè habent, & Sisarum. Theophrasto quidem ἡ τετράλιξ recensetur in genere aculeatorum fruticum, & æstate germinantium. Sed hanc Ericen hîc intelligi non puto. Varro Sisaram habet, ex Sisaræ flore liquidum mel fieri scribens. Lenæus, Plinio auctore, Myricam etiam Ericam vocat, & ob similitudinem quandam vtrâsq; inter se confundit, quod

Nomina

Lib. II. c. 16.

Lib. 6. Hist. cap. 3.

Lib. 3. c. 16.

Lib. 24. c. 9.

ERICA PRIMA

Matthioli.



ipse quoque Palladius fecit, cum scribit. Huius mensis (Nouembris) initio Apes ex Tamarisci floribus, reliquisq; sylvestribus mella conficiunt. Quod Plinius de Erica tradit, ut mox dicemus. Erica planta est lignosa, fruticosa, Tamarici similis, longè minor, tenerior & humilior. Folia sunt minutissimè incisa, Chamæcyparissi foliis haud multum absimilia, fusciora, & duriora: Flores in candido purpurei, venusti, nonnunquam, sed rarius, albi, qui sunt veluti capitula quadripartita, ramos à medio ad summum usque exernantia. Radix est longa, lignosa, in rubro nigricans. Dioscor. Ericam Myricæ similem facit, sed longè minorem: alio in loco Corin folio Ericæ, pinguiore, minore. Plinius scribit Ericam fruticem esse non multum à Myricæ differentem, sed colore Rosmarini & pene folio. Ex quibus colligere licet diuersa esse Ericæ genera. Primam hic pictam veterum Ericam esse multa arguunt. Nam fruticosa est arbor, Myricæ similis, longè minor, ut scribit Dioscorides. Præterea vere primo, & Autumno floret, prima videlicet, & vltima

Lib. 12. c. 8.

Lib. II. c. 16.

Forma.

Lib. I. c. 100.

Lib. 24. c. 9.

ma sylvestrium, quod huius fruticis proprium esse rei herbariæ scriptores asserunt. Adhæc huiusce flore Autumno maximè depascuntur Apes, quod de Ericæ tradiderunt antiqui. Dioscor. Huius flore Apes improbum mel efficiunt. Plinius. Tertium genus mellis minimè probatum, sylvestre quod Ericæum vocant. Conuehitur post primos Autumni imbres, cum Ericæ sola floret in sylvis,

Ibidem.

Lib. II. c. 16.

ERICA ALTERA

Matthioli.

ERICA TERTIA

Dodonai.



ob id arenoso simile. Gignitur id maximè ab Arcturi exortu , Pridie Calend. Septembris. Quidam æstiuam mellationē ad Arcturi exortum proferunt, quoniam ad æquinoctium Autumni ab eo supersunt dies xiiii. & ab æquinoctio ad Vergiliarum Occasum diebus xlviii. plurima floret Ericæ. Dodonæus & Fuschius eandem plantam pro Erica representarunt. In frigidis regionibus & ad Septentrionem versis prouenit , macilento & sterili solo, atque etiam in calidioribus, eodem solo, sed rarius. Marcel. Ericam in Genistarum genere esse non rectè scripsit. Ericæ plura genera fecerunt Herbarij. Matthiolus Ericam alteram , hîc depictam , quæ fortasse non minùs quàm superior, Ericam veram referat. Plurima ea nascitur in Exiceto Palifsiæ oppido vicino , toto eo saltu per quem iter faciunt qui Lugduno Lutiæ proficiscuntur. Frutex ramulis densissimis cubito procerior est, foliis oblongis, tenuibus, exiguis, creberrimis, ramos vestientibus, & vndique ambientibus : Flore in ramorum vertice copioso, ultra ramorum fastigium proiecto, ac prominente, coloris è puniceo subrubentis, aspectu pulcherrimi, & qui ad decerpendum prætereuntes inuitet. Sapor idem qui & primi generis Ericæ, verum amariusculus. Eius florem Apes consectari credibile est potius quam superioris. Floret Augusto mense. Dodonæus Ericam aliam humilem, surculis quamplurimis fruticantem, teneris, gracilibus, ex radice nascentibus, colore rubro, aut fusco, ex quibus scopæ Gallis fiunt excutiendo vestium pulueri. Vnde Scoparia iure nominari potest. Folia ei parua sunt admodum, Thymi vulgaris foliis haud absimilia, minora, & tenuiora. In summis surculis flores emicant, quini seniue, in terram vergentes, è rubro purpurei, oblongi & rotundi, caui, parte extrema aperti, dolioli instar. Radix tenera per humum serpit, hic atque illic nouellos surculos producons.

Gaudet

Lib. 6. c. 16.

Hist. ca. 95.

Locus.

Lib. 1. Dio-

scor. c. 19.

Ibidem.


Lib. 6. c. 16.

ERICA IIII. Monspel.*ERICA V. Chrysanthemos.**ERICA VI. BACCIFERA**Dodonai.*

Gaudet locis sabulosis, muscosis, & riuulorum fontiumque vligine madentibus. Copiosa gignitur in Aruernorum pago quem Dium Anthemium vocant, alibi ferè inutilis. Rhotomagenfes & Lugdunēfes scoparij inde mercantur, ac in suas tabernas comportant, prætenues eas virgulas cultellis radentes, ac dirigētes contortas, vt in scoparū structurā aptari possint. Quartū Erica genus in agro Monspelienfi, & in Aquitaniæ saltibus crescit, prope Burdegalam, & à Burdegalensibus, vicinisque Bronde nominatur. Radix illi subiacet crassa, longa, lignosa, dura: rami sunt sesquipedales folia parua, Thymo nostro vulgari, aut Coridi similia: flos Erica vulgari similis, exiguus, purpureus circa summos ramulos vtrique prodit. Ad hominis proceritatem hoc Erica genus assurgit in Aquitania, nisi amputetur, aut à pecore arrodatur, aut, quod sæpè fit, admoto igne vratur. Radicem commendant ad carbonem faciendum, ideo fabris ferrariis expetitur, quod non nisi flatu accendatur, flatūque cessante protinus extinguatur, fabris sic sæpius recoquentibus. Quintum genus Erica Chrysanthemos, à floris colore sic nuncupata. Humilis est frutex, radice crassa, nigra, lignosa, furculosa, fibrata. Ramulos emittit multos, sæpius per terram repentes, nonnunquā paululum supra terram sese attollentes: folia Coridis circa ramulos densa, gustus adstringentis. Flos est violæ similis, aureus: semen durum, Milio grandius, in folliculis turbinatis, & striatis, per maturitatē flavescentibus. In sabulosis æditorū colliū locis, apricis & perflatis gignitur. Floret Iulio. Sextum genus esse dicemus Ericam eam quam Matthio. in postrema com-

mentariorum in Diosc. editione Ericam bacciferam vocat. Nascitur in mōtibus, inquit, qui Bohemiam à Silesia separant, humi serpens, & latas occupans areas, folio pene vulgaris Erica, Baccas edit purpureas, Iuniperinis haud minores, sed molliore pulpa, lenta, & colore subuirescente, vt in Pruno. Ramis est lignosis, lentis, ex atro rufescentibus. Hanc plantam descripsit & depinxit Dodonæus pro Vaccinio palustri, quod *Coussines de marais* Gallicè vocari scripsit, cauliculósque habere paruos, breues, graciles & teneros, per terram sparsos, foliis

Lib. 6. ca. II.

*ERICA BACCIFERA**Matthioli.*Lib. I. stirp.
Hisp. ca. 30.

paruis, angustisque vestitos, Thymi vulgaris foliis satis similes, sed minores. Circa cauliculorum summitates nasci baccas ex pediculis valdè tenuibus pendentes, Vacciniis rubris ferè similes, tamen oblongiores & maiores, coloris aliquando tantum rubri, aliquando maculosi, gustus acerbi, adstringentisque. Clusius primū Erica genus statuit simile Myricæ, alterum diuersum, quod Myricam folio non refert, sed Corin & forma foliorum & situ admodum æmulatur: cuius generis multæ sunt species, magnitudine, foliorum & florū forma, coloréque, inter sese differentes. Prima omnium maxima, hominis altitudinem interdum superat, fruticosa admodum, ligno duro, ex rubro nigricante, foliis exilibus, & breuibus, quaterno ordine ramos ambiētibus, gustu admodum adstringente, flore copioso, racematim totos ferè ramulos occupante, vt interdum maiores rami pedali longitudine floribus onusti conspiciantur. Est autem is flos concavus, vti paruum cymbalum, oblongus, odoratus, pulcher, albus. Nascitur in Lusitaniæ solitudinibus, inter Vlyssi ponē, & Conimbricam. Floret Nouembri & Decembri. Prima Matthio. Erica videtur hæc esse. Secunda eiusdem ferè cum prima altitudinis, æque fruticosa, tenuioribus ramis, eiusdem cum superiore coloris, foliis etiam exilibus, quaternis semper simul ramulos amplectentibus, quorum extremis insidēt flores oblōgi, superioribus similes, colore purpurascens. Tota etiam est adstrictionis parti-

ERICA II. Clusij.*ERICA III. Clusij.*

ceps.

ceps. Prouenit iisdem quibus prima locis, atque etiam abundantius: eodem etiam tempore floret. Illi ferè similis est. Narbonensi agro frequens, longiore paulò & copiosiore folio, flore purpureo, minore, extremos ramulos occupâre. Hæc secunda videtur esse Matthioli Erica à Fallopio missa. Tertia eius Erica est secundæ admodum similis, sed paulò humilior, folia maiora & latiuscula aliquantulum, & nigriora habet, quaterna semper circum ramulos nascentia, flores plurimos per interualla secundum ramulorum longitudinem proueniētes, superioribus forma similes, primum herbacei coloris, deinde ex albo purpurascentes. Tota etiam adstrictoria facultate pollet. Supra Vlyssiponem frequens cum superioribus, pluribus tamen locis occurrit. Floret Decembri, & Ianuario. Quarta Clusij eadem est quæ à nobis etiam quarta & depicta est, & descripta. Vulgaris in tota Hispania, Lusitania, & Aquitania, nota etiam Gallia Narbonensi, scopis faciendis maximè idonea vere & sub hiemem floret. Huic similis inquit Clusius, sed minor omnino pedalēmque altitudinem rarò superans, & plerūque humi præcumpens, foliis quaternis etiam semper ramulos ambientibus contrariis inter se pediculis, inuenitur in montibus Pannoniæ quæ florem herbaceum alteri similem extremis ramis, & foliacea illa capitula profert mense Augusto & Septembri. Quinta minor est superioribus, cubitali tantum altitudine plerūque, ramis gracilibus fruticosa, quos terni per interualla ramuli ambiunt, ternis foliis admodum exilibus circa eos ordine dispositis, flores superioribus paulò maiores plurimi & conferti circum ramulos, longis pediculis hærentes, colore purpureo obsoletiore. Incultis Lusitaniæ locis supra Vlyssiponem frequens. Florebat illis Decembri. Sexta superiori admodum similis est, paulò tamen humilior, neque fruticosa, sed omnes ferè virgas, seu tenues ramos à radice proferens, singulares, cortice cinereo obductos, quos ambiunt ordine terna ramulorum rudimenta, seu germina ex multis foliis confertim nascentibus constantia, nigrioris quàm alterius coloris,

ERICA V. Clusij.



ERICA VI. Clusij.



flores



flores concaui, iam postremo descriptæ floribus forma similes, colore saturatioris purpuræ, elegantissimo, è longis pediculis verticillato ambitu per intervalla, & è summis ramis pendent. Nascitur in Hispaniæ Castella veteri, tum in Gallia supra Lutetiam, & in Anglia supra Vindeforam. Floret Septembri. Septima fruticosa est, cubitalibus assurgens ramulis, fragilibus, nigriore quàm reliquæ cortice: folia superioribus similia, sed nigriora, & crassiora, gustu cum adstrictione calidiusculo, trino ordine circa ramulos disposita. Septembri & Octobri fructum à reliquis diuersum, summis ramulis inhærentem gerit, pulcherrimum, candidum, pellucidum, vniones obscuriores, tum forma, tum colore referentem, succulentum, sapore acido, tria granula dura plerumque continentem, qui Nouembri desiccatur, & per se decidit. Nescit Clusius, an floreat, incolæ negabant. Est verò hæc longè diuersa Matthioli Erica baccifera. In Lusitania dūtaxat genus hoc obseruauit non procul Vlysi pone. Octaua cubitali ferè est altitudine, fruticosa etiam, & tenuibus ramulis prædita, qui terni semper circum maiores ex intervallis prodeunt, folia etiam similiter terna, exigua quidem, sed latiora quàm in reliquis supra descriptis, inferiore parte nonnihil candicantia, hirsuta, & gustu adstringente: summi ramuli ad foliorum exortus verticillatim exornantur per intervalla ternis semper floribus, æquali distantia à sese nascentibus, & in vnā partem spectantibus, maioribus quàm in reliquis generibus, concauis, prominulo magis ventre, colore ex rubro purpurascente, nouem numero, duodecim, quindecim, aut pluribus. Inuenitur plerumque cum septima, & aliis, in arenosis Lusitanix locis. Floret Octobri. Semen huic quale in reliquis supra descriptis (præterquam septima) exiguum, nigricans. Nona non multum ab hac foliorum forma differt, & plerisque Brabantix locis, nonnullis etiam Castellæ veteris crescit, pedalibus solum fruticans ramusculis, tenuibus, ex rubro nigricantibus, cingentibus eos frequentibus foliis, quaternis simul dispositis, superiore angustioribus, & Thymi vulgaris minoribus, hirsutis. E summis ramulis pendent plerumque quini, aut seni flores simul iuncti,

iuncti, floribus Lilij conuallium similes, paulò tamen oblongiores, neque adeo uti superioris ventrosi, colore ut plurimum ex rubro dilutius purpurascēte, interdum etiam albo. Floret vere & autumnò. Hæ sunt Erica species à Clusio traditæ. Nunc facultates eius declarandæ. Erica tam flos quàm coma serpentium ictibus illitu medetur, inquit Diosco. Erica Galeno digerendi per halitum facultatem obtinet. Paulus citra rosionem adiecit. Flore eius potissimum ac foliis vtendum. Erice Plinio contra serpentes prodest. Idem Erices folium aduersari serpentibus tradit. Erica vulgaris decoctum, inquit Matthiolus, in aqua tepidum sumptum, tam mane quàm vesperi, triginta dies, quinque vnciarum pondere, tribus horis ante cibum valet ad vesicæ calculos comminuendos, & expellendos. Sed postea malè affecti in balneum ex decocto eiusdem plantæ descendere debent, atque in eo Erica decocto insidere, idque sæpius faciendum. Hoc tantum decocto epoto, seruataque recta victus ratione, nonnullos affirmat. Matth. vesicæ calculum in minimas partes comminutum eiecisse. Florū decoctū potū lumborū & vētris doloribus succurrit: foliorum succus oculorum imbecillitatem sanat, si iis guttatim instilletur. Rondeletius oleo ex Erica floribus confecto fœlici successu utebatur ad delendos herpetas fœdos, & iam inueteratos totā faciē occupātes. Vaccinia palustria, auctore Dodon. sitim sedāt, aduersus calores febriles, sanguinis, partiūque interiorū inflāmationes cōferūt.

Vires.

Lib. I. c. 100.

Lib. 6. sim.

Lib. 7.

Li. 13. c. 20.

Li. 24. ca. 9

Li. I. Diosc.

cap. 100.

Ibidem.

IDÆA VITIS, CAP. XXXII.

IDÆA vitis, ut scribit Theophrastus, nascitur in parte Idæ, quam vocant Phalacras. Est fruticosa, virgis paruulis, & ramulis cubitalibus penè exporrigitur, quibus acini ad latera adhærent, nigri, fabæ magnitudine, dulces, vinaceorum instar, (γυαπῶδες τι) aliquid intus continentes, molle: folium rotundum, indiuiduum, paruum. Plinius hunc locum sic transtulit. Alexandrina appellatur Vitis circa Phalacram, brevis, ramis cubitalibus, acino nigro, fabæ magnitudine, nucleo molli & minimo,

Lib. 3. Hist. cap. 17.

Nomen.

Forma

Lib. 14. c. 3.

IDÆA VITIS.



obliquis racemis, prædulcibus: folio paruo & rotundo, sine diuisuris. Alexandrinam vocat, quam Theophrastus, Idæam, non ab Alexandria Ægypti, sed Alexandria Troadis iuxta Idam montem. Sic & ficus Idæa Theophrasti, Plinio Alexandrina dicitur. At hæc Vitis non solum circa Idæ, sed etiam Aruerniæ, Phalacras, idest montosa loca siluis nuda, ac veluti caluitio glabra nascitur copiosissima nonnūquam etiam in siluis ipsis. Airelles, vocant Itali Vua dell'orso, Germani Heidelbeer, Est autem frutex humilis, ramulis plurimis, nonnunquam cubitalibus, sæpè minoribus: foliis rotundis, saturæ viriditatis, Buxeis, Myrteis ve similibus, instante hyeme cæterarum modo decidentibus, vere ex iisdem ramulis renascentibus: flosculis rotundis, cauis, circa ramulos inter folia emergentibus: bacculis rotundis vmbilicatis, primū viridibus, deinde per maturitatē nigris, succo nigerrimo plenis, gustui non ingrato. Radice nititur longa, gracili, lenta, lignosa. In syluis nostris nascitur, duro, macro, edito, & ventis exposito solo.

Hermol. in Plin.

Li. 15. ca. 18.

Locus.

Vuam

Lib.6.ca.11. Vuam vrsi Anguilara vocat, Dodonæus Vaccinia nigra, à paruis baccis: quia Vaccinia docti quidam existimant dicta esse quasi Baccinia à baccis, minimè tamen Vaccinia nigra Virgilij esse intelligit. In quibusdam Galliæ locis idem *Coufines* nominari scribit. Sunt qui putant Vitem Idæam esse illam quæ passulas Corinthiacas vulgo dictas fert. Sed nobilissimum illud vuæ passæ genus, inquit Gesnerus, non in Ida, nec in aliis æditis, niuosisque montibus nascitur, verum in planitie, vel in collibus apricis, magna hominum cura. Vitis Idæa mense Maio floret, baccæ Iunio sunt maturæ. Refrigerant secundo gradu, adstringunt, & paulum siccant. Crudæ coctæve cum Saccharo, aut abs-

In Horru.
Germ.

Tempus.

Temper
Dodo. ibi.

Vires.

MYRTILVS

Germanica.



que eo si edantur, febre biliosa, & ardenti cruciatis profunt. Valent aduersus ventriculi ardorem, hepatis, aliarumque interiorum partium inflammationes, ventrè adstringunt, & nauseam reprimunt: ab hac Idæa vite differt à Lobellio picta Myrtus Germanica foliorum incisuris, & magnitudine, flore & fructu eadem, de qua hæc tradit Matthiolus. In Germania & Bœmia, quia legitima Myrto carent, aliam in syluis nascentem sibi compararunt Pharmacopæi & Myrtillum vocarunt. Frutex est cubitalis, caudice & ramulis viridibus, foliis Buxo ferè similibus, sed tenuioribus, & leuiter per ambitum ferratis, floribus tintinabuli figura è pediculis inter folia pendentibus, colore subpuniceo, rufo intus, stamine. Floribus baccæ succedunt, quæ maturæ, colore & magnitudine Iuniperinis non sunt absimiles, vinosæ, teneriusculæ, umbilicatæ. Hæc Germanis cum vniuersa planta haud inefficaciter Myrti vicem præstant. Peculiariter autem iis vtuntur ad inficienda stamina, & chartam ceruleo colore. Eduntur etiam à rusticis, nec gustui sunt ingrata. Hæc Matthiolus.

IDÆA RADIX. CAP. XXXIII.

Nomen.

Forma.

Lib.6.c.11.

Li.4.c.40.

Lib.27.c.11.

IDÆA Radix, siue Idææ vitis species hæc planta esse putatur, superiori & magnitudine, & ramulis similis, nisi quod huius folia sunt maiora, duriora, Buxi maioris foliis similia, hyeme non decidunt: flores in candido purpurei, longi, rotundi, multi simul in summis ramulis. Baccas edit rotundas, quæ à superioribus parum differunt, non ita succi plenas, gustu acerbas & astringentes. Radix subest lignosa, & longa. Dodon. Vaccinia rubra nūcupauit. Lobellio & Penæ est. Alpina Chamærtio dodædros, odora, Clusio vuæ vrsi Galeni, Italis Rhododaphne parua, rustica: quibusdam Balsamum Italicum vulgare: Therionarca Plinij Guilandino. Idææ radici, inquit Dioscorid. folia sunt ea quæ Rusco: adhærent iis veluti exigui capreoli, è quibus flos. Radix spissandi naturam habet, iis conueniens quibus adstrictione opus est. Bibitur etiam ad alui fluxiones, & fluxum muliebrem, omnemque sanguinis eruptionem sistit. Idææ herbæ folia sunt inquit Plinius, quæ Oxymyrines: adhærent iis veluti pampini, in quibus flos. Aluum mensæque, & omnem

IDÆA RADIX.



nem abundantiam sanguinis sistit, spissandi, cohibendique natura. Ita enim vetus Plinij codex habet. Quæ cum Dioscoride consentiunt, præterquam quod herbam vocat, quam ille radicem, & menses, more quodam suo, pro fluxu muliebri reddidit. Idæa radix Gale-
no, gustu admodum acerba est, ac si opere periculum facias, eam vim præferet, nimirum alui profluvia, dysenterias, profluvium muliebri, & quæcunque eius sunt generis, tū pota, tū foris imposita curans. Quæ omnia cū frutici hîc depicto satis bene convenire videantur, non absurdè fortassis pro Idæa radice ostenditur. Gignitur in altissimis Allobrogum montibus, humi iacentes cauliculos huc illuc spargens.

Lib. 6. Hist.

COGGYGRIA THEOPHRA.

CAP. XXXIIII.



THEOPHRASTVS arbusculæ cuiusdam meminit Arbuto & Adrachnæ similis, cui hoc proprium esse tradit, ut fru-

Lib. 2. Hist. cap. 16.


Nomen.

ctum lanugine amittat, Quo loco Gaza κοκκυμηλέαν legit, & Prunum vertit. Sed fallitur, ut opinor, quod Theophrasti locum turpi mendo inquinatum esse nō animadvertit, quem ex Plinio emendasse debuerat, qui Coggygriam, siue Coggyriam legit. Theophrast. cum de Arbuto & Adrachne dixisset, subiicit, ὁμοίον ὅ τούτοις τὸ φύλλον καὶ τῆς κοκκυμηλέας, τὸ δὲ δένδρον μικρόν, ἴδιον δὲ ἔχει καὶ τὸ ἐλαπτοπύλον τὸν καρπὸν τοῦτο γὰρ οὐδ' ἐφ' ἐνὸς ἀκηκόαμεν ἄλλῃ δένδρου. Plinius cum eandem Adrach-

Li. 13. ca. 22.

COGGYGRIA THEOPH.

Cotinus Plinij.



nem depinxisset, ait. Similis & Coggygia folio, magnitudine minor. proprietatem habet fructum amittendi lanugine, pappum vocant, quod nulli alij arborum euenit. Præterea quid absurdius quàm Prunum dicere arborem esse, quæ fructum lanugine amittat? Fortasse & Cotinus quoque Plinij appellari potest illa arbuscula Italico & vernaculo nomine, ut postea dicetur. Verū Coggygia Theophr. nihilo secius esse creditur, hac maximè ratione ducti, quod eius fructus in pappos abeat, quæ nota huic peculiaris à Plinio tribuitur. Frutex est, nunc humilis, nunc ad Punicæ magnitudinem assurgens, radicibus multis, modicè crassis: ramis surculosis, cortice subrubro vestitis: folio Terebinthi, carnosio, & spisso Arbuti modo, leui, parum laciniato, minúsque acuto, venoso, maiore, & latiore, qua cum Terebintho similitudine decepti quidam Macedonicam Terebinthum esse putauerunt: flore per initia racemoso, ex viridi pallescēte, qui tandem in papposum muscariū dilatatur, & evanescit, innu-

Ibidem.

Forma.

Locus.

Vires. &

Usus.

Usus.

Lib. 16. c. 18.

meris tenuissimisque capillamentis villosum, nutantibus in militum galeis plumosis cristis non absimile, papporum lanugini inter sparsis minutis granis, nigris, figura cor æmulantibus. Crescit in montibus Allobrogum tractu aprico, cliuoso, aspero, non nimis alto, nec insidentium niuium frigore rigido. Alicubi cum Terebinthis pumilis, breuib, contortis, quales circa Idæ & Macedonia montefos tumulos prouenire Theophrastus scripsit. Folia, flores, tenella germina, cum teruntur odorem spirant resinofum, Terebinthi modo, non iniucundum. Eorundem sapor austerus est, & valde astringens, gustanti non insuauis. Dientes Allobroges sua lingua Rhu vocant, corticēque coria spiffant ac concinnant, id quod nonnullos mouit, vt rhoem coriariorum esse crederēt. Gratianopolitani eius foliis summisque ramusculis ad Lineas vestes nigro colore inficiendas vtuntur, quas aliis mulierculæ super imponunt, ne subiectæ puluere & sordibus inquinentur. Allobroges Sabaudi arbusculas integras, vel earū grandiores ramos delibratos vendunt, suāque lingua Fustet vocant, ad pannos luteo colore tingendos. Is enim est ligni color. Qui radices Apennini incolunt Rossolo vocant: qui ædita Apennini iuga, Scotano: quotiesque ictericum felle suffuso luridum esse significant, eum magis quam Scotanum flauescere dicunt, hac voce Cotinum Plinij exprimentes, fruticem, vt ait, ad lineamenta modo, conchylij colore insignem. Quamquam falsi suspectus sit is locus, flauo colore, quo lignum Cotini tingit, à conchylij colore multum distante, nisi de arboris cortice subrubro aut purpurascēte intelligēdū id tantū sit: quā ob causam Rossolo vocāt, à roseo colore. An verò huic soli peculiare sit, in pappos fructū auolare, multis dubium est, cum Nerij siliquæ papposa lanugine semen includant.

IOVIS BARBA, CAP. XXXV.

Nomina

Lib. 16. c. 2.

Forma.



Vne fruticem Iouis Barbam esse, cuius à Plinio fit mentio, Herbarij putant. Ac quoniam Aizoō Iouis Barba Officinis dicitur, hanc quoque plantam Aizoon arborem, quidam nuncuparunt, vt sic ab Aizoo herba distinguerent. Fruticosa est arbuscula, magnitudi-

IOVIS BARBA.



Locus.

ne hominis, ramis densissimis, folio Lentisci, argenteo, sic collocato, vt lateribus folia paria sint, impar autē foliis versum claudat: coma in opere topiario tonsilis, & in rotunditatem spissa, elegantissimi aspectus, si quis in hortis serat, vestiendis arearū viarūque marginibus, vt à nobis de Lauādula fieri solet, flore in summis ramis copioso, coaceruato velut in cumulum, luteo, Genistæ simili, si sumas singulas quasque floris coaceruati partes. Gignitur in lapidosis, & saxosis locis maritimis, præsertim montibus ad litora positis. Pulcherriam hanc plantam mons Setius (hodie Cap, de Sette vocant) ab Agatha & Bliterris non admodum semotus nutrit. Anguillara in Monte nigro prope Liuornam gigni tradit, foliis ordine dispositis, candidis, nitentibus, Lenticulæ similibus, angustioribus, flexilibus ramis, luteis floribus.

ARBVTVS, CAP. XXXVI.



ARBVTVS frutex, siue arbor est: Arbutum fructus eius à Virgilio dicitur. Cum iam glandes, atque Arbuta sacrae deficerent syluæ. Græcè κόμπος, fructus μεμαίχυν, Arabicè *Hutiladib*, Italicè *Albatro*, Hispanicè *Madronho*, seu *Madromeiro*, Gallicè *Arbousier*, fructus *Arbouses*. Arbutus frutex est, siue arbuscula Cotonea Malo non maior: caudicis cortex subruber, asper, squamosusque, à quo rami prodeunt rubentiores, læuiorésque, præsertim nouelli: folia Laurinis, Iligneisve similia, paulò tamen breuiora, crassioraque, non decidua, toto ambitu serrata, colore pallido potius quam

1. & 2. Geo.

Nomina

Forma.

Matt. 138.

lib. 1. Diof.

Dodon. li.

6. cap. 33.

ARBVTVS.



viridi, rubra per medium excurrente costa. Flores parui, candidi, caui, floribus herbe quæ vulgo Liliū conuallium dicitur, figura similes, racematim pendentes. Fructus parui, rotundi, Sorborum ferè magnitudine, qui primo exortu virent, deinde flauescunt, maturi verò rubent, tactu asperiusculi, nullis intus ossiculis, fragorum modo, quorum etiam effigiem referunt. Sapor his insipidus, simul & austerus, qui dum eduntur, acerosa pulpa linguam palatūque vellicant. Ab his paulum discrepare videtur Dioscorides cum scripsit. Arbutus arbor est Cotoneæ Malo non dissimilis, tenui folio: cuius fructus Pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo, huic Memæcylum cognomen est. Maturus aut flauescit, aut rubet, in esu acerosus. Sed cum Arbutum Malo Cotoneæ comparat, magis id ad arboris proceritatem, quàm ad folia, & caudicis corticem referri intelligendum. Deprauatos etiam esse hoc loco Dioscoridis codices suspicio est: quoniam Serapio qui omnia ex Dioscoride transcripsit, totam Arbutum non

Lib. 1. c. 138.

Matt. ibid.

dicit Cotoneæ Malo similem, sed folia proferre Malo Cotonea minora, nec tenuia folia habere scribit. Alij λεπτόφυλλον, non tenuifolium, sed angustifolium interpretantur. Plinius folium Mali Assyriæ folio Vnedonis rectè videtur comparasse. Theophrastus sic descripsit. Arbutus quæ Memæcylon fert esculentū, non valdè magna est arbor. Corticem habet tenuem, Tamarici similem: folium inter Vlicem & Laurum medium. Floret mense Iulio. Flores prodeunt ex vna appendice, extrema parte, racematim: quorum quisque Myrti bacca oblonga, forma similis est, & magnitudine par, nō foliat⁹, cauus, velut ouū exscalptū ore aperto. Cum autē defloruerit, etiam retinaculū quod adhæret perforatum est. Quod defloruit, tenue est, ac veluti verticillum circa fusum, aut Doricæ columnæ capitulum. Fructus anno maturescit, vt simul contingat & hunc haberi, & alterum florere. Plinius. Aliud corpus est terrestribus fragis, aliud congeneri eorum Vnedoni, quod solum pomum simile fructui terræ gignitur. Arbor ipsa fruticosa: fructus maturescit, pariterque floret subnascens, & prior colligitur fructui terræ, inquit Hermolaus, hoc est fragis terrestribus, nihil enim est ferè tam Vnedoni simile quàm fraga. Ob id quidam fraga montana in Ouidio Arbutos interpretantur, ad differentiam terrestrium. Cæterum quia Theophrast. aliter & melius Arbutum expressit, aliam esse hanc à Dioscor. Arbuto quidam

Lib. 12. c. 3.

Lib. 3. Hist.

ca. 16.

Li. 15. c. 24.

In Casti. in

Plinium.


centent. Sed eruditiorum sententia eadem planè est vtriusque Arbutus, exni-
 mirum ea quam hîc depinximus. De eius fructu etiam inter veteres controuer-
 sia est. Dioscorides, & Theophrast. vt diximus, eum Memæcylon appellant.
 His ad stipulari videtur Galenus, qui non vno loco eum fructum Memæcylon
 nominat. Plinius & arborem & fructum vnedonem vocat. Vnedo, inquit po-
 mum in honorum, vt cui nomen ex argumento sit, vnum tantum edendi. Duo-
 bus tamen hoc nominibus Græci appellant, Comarum & Memæcylon. Ex quo
 apparet totidem esse genera & apud nos. Alio nomine Arbutus vocatur. Qui-
 bus verbis Plinius quatuor voces Vnedonem, Comarum, Memæcylon, Arbu-
 tum vni arbori ac fructui tribuit. Et alibi. Arbutus siue Vnedo fructum fert dif-
 ficilem cōcoctioni & stomacho inutilem. At verò Vnedonem fructum Arbuti
 non esse, sed Epimelidis arboris Galenus tradit his verbis. Epimelis acerba est
 planta, & vt, ita dicam, sylvestris Malus. Appellatur autem à rusticis in Italia
 ὤνεδον, idest Vnedo. Frequens in Calabria nascitur. Fructus eius acerbus est, sto-
 macho incommodus, & capitis dolorem inducens, admixta enim est ei pere-
 grina quædam qualitas. Idem alibi perspicuè Memæcylon ab Vnedone distin-
 xit: Et qui frutex inquit, Epimelidas fert. Appellatur autem is fructus in Italia
 Vnedo, stomachoque nocet, & capiti dolorem adfert, acerbûsque est admodum
 cum exigua quadam dulcedine. Quibus mox subiungit. Cornis quidem & Ca-
 nirubi fructu, & Glandibus, & Memæcylis (sic autem Comari fructus appellan-
 tur) rustici passim vescuntur. Galenum Paulus secutus est. Quare dubitandum
 non est, quin alia arbor sit Epimelis, quæ vna cum fructu suo in Italia Vnedo
 appellatur, & alia Arbutus, cui⁹ fructus Memæcylō Græcis dicitur. Has arbores
 Plinius fortasse ob similes vires pro eadem vsurpauit. Quod igitur Ruell. scrip-
 sit Galenum & Paulum Arbutum, Comarum, Vnedonem à rusticis Italiæ vo-
 cari scripsisse, minimè verum esse ex supradictis intelligitur, atque adeo nec il-
 lud quod alio loco ait, Galeno & Paulo Epimelida esse genus quoddam Arbu-
 ti, quæ Græcis Comaros dicitur, cui eandem omnino vim reddiderunt, hoc
 addito, quod fructum Memæcylon nominant. Perspicuè enim illi Arbutum ab
 Epimelide distinxerunt, & de iis diuersis in locis tractauerunt, nec, si similibus
 præditæ sint facultatibus, inde efficitur eandem esse stirpem. Plurimæ enim stir-
 pes iisdem qualitatibus, viribûsque præditæ, forma & genere sunt diuersæ. Que-
 nam sit Epimelis in historia Mespilarum nos ostendemus. Arbutus in syluis,
 Italiæ & Galliæ Narbonensis copiosa nascitur. Bellonius scripsit in monte, qui
 Athos dicitur, arbutos quæ aliis in locis frutices sunt, in magnas arbores euade-
 re. Iuba auctor est, tradente Plinio, quinquagenum cubitorum altitudine in
 Arabia esse eas. Florent mensibus Iulio & Augusto. Fructus Septembri, & sub
 hiemem maturus est, qui frigidus stomacho aduersatur, inquit Dioscorides, ca-
 pitisque dolorem mouet. Eadem omnino tradit Galen. Arbutus Arbor ipsa
 qualitate acerba vna cum fructu est, eum Memæcylon nuncupant. Est autem
 hîc & infensus stomacho, & capiti dolorem adfert. Idem in omni capitis do-
 lore vitandum esse præcipit Arbuti fructum. Sunt qui credant, inquit Matthio-
 lus, Arbutum magno esse aduersus pestem præsidio, aquam quæ ex eius foliis
 extillauerit, admixto osse in corde cæui reperto, statim ipso Morbi initio pro-
 pinantes. Arbuti fructibus Turdi Merulæque delectantur. Quare hyeme, quo
 tempore ij maturi sunt huiusmodi aues ab aucupibus facillè capiuntur. Fron-
 des ab hædis expetuntur teste Virgilio.

Dulce satis humor, depulsis arbutus hædis.



Theophrasto *θηλυκρανεια* dicitur Cornus fœmina, à quibusdā *ψευδοκρανεια*, idest falsa Cornus, ab aliis diuersis nominibus nuncupata, diuersas quoque plantas pro Corno fœmina repræsentâtibus. Cornus fœmina, inquit Ruellius, dumetis & nemoribus familiaris. Sed quia neglectas & ingustabiles fert baccas, indignam quæ Corni nomine vocaretur rura putauerunt. Arbore quam Cordus Pseudocraniam vocat describitque, præfixit Gesnerus eius fruticis picturam quam Tragus Germanicè à ligni duritia *Hartriegel* appellari scripsit: hicque admonet Gesnerus quærendum,

CORNVS
fœmina.



an hæc Cordi Pseudocrania, sit arbuscula seu frutex, quem Germani *Hartriegel*, vocant, Plinius virgam sanguineam appellauit. Eruditi quidam Cornū fœminam esse coniiciunt. Sed paulò post Cordus aliam Cornum fœminam describit, cui Gesnerus figuram Corni à Trago descriptæ apposuit. Idem Gesnerus Sanguineam virgam Plinio dictam, quæ passim in sæpibus crescit, Cornum fœminam esse ait quorundam sententia. Cornum fœminam esse putat Cornarius, quam Germani ex argumento *Faulbeerbaum*, & *Faulholtz*, vocant. Sed an is Alnum nigram Dodonæi, de qua iam dixi, an Tragi *Faulbaum*, arborem à foetido, tū odore, tum sapore sic dictam intelligat, scitu difficile est. Dodon. Cordi pseudocraniam Cornum fœminam, syluestremue, ac Opulum Columellæ esse arbitratur. Eandem plantam etiam Cornum fœminam ac sanguineos frutices esse Bellonius videtur existimasse cū scribit. Arbor quam Macedones olim Cornum fœminam nominarunt, nunc Galli Latinos imitati *Des Sanguins*, in monte cui nunc Castagna nomen, inter vrbes Philippos, & Bu-

cephalum, nunc Cauallam vulgo dictam sito, non multo minores proueniunt, quam magnæ nostræ Corni mares. De planta igitur hîc agimus, quam Tragus *Hartriegel*, Cordus Pseudocraniam, Dodon. Cornum fœminam, & syluestrem, & Opulum Columellæ vocant. Hæc Cornus fœmina frutex est in arborem non assurgens, durissimo stipitum, veterumque ramorum ligno, nouellis ramulis nodosis, medulla plenis, Sambuci modo: folio Corno mari simili: flore in muscariis albo: baccis rotundis, primū viridibus, per maturitatem nigris. In sæpibus ac dumetis cum reliquis fruticibus nascitur. Floret mense Aprili, & Maio. Fructus Septembri sunt maturi, nullius in medicina vsus. De Virga autem sanguinea, si eadem est quæ Cornus fœmina, pauca hæc Plinius. Nec Virga sanguinea, inquit, fælicior habetur. Cortex eius interior cicatrices quæ præsanare aperit. Et, Sunt qui Virgis sanguineis tangunt ea quæ nolunt Erucis obnoxia esse. Idem alibi sanguineos frutices inter vitilia numerat. Corno non multum absimilis est planta, inquit Matthiolus, quam Hetrusci, à sanguineo virgarum colore Sanguino, & Sanguinello vocant. Crescit in dumetis, & sepibus, virgis Corno tenuioribus, robustis, nodosis, cortice sanguinis modo rubescente: foliis Corno proximis, paulò tamen latioribus, neruosis, rubenti pediculo

Nomina

Lib. I. ca. 71.

Lib. 3. pl. c. 26.

Lib. 3. c. 26.

Cap. 36.

Lib. 3. ca. 37.
In hortul.
Germ.Emb. 132. li.
I. Dioscor.

In Sil. c. 30.

Lib. 6. ca. 51.

Lib. I. Obf.
cap. 56.

Forma

Locus.

Tempus.

Li. 24. c. 10.

Li. 20. c. 10.

Li. 19. c. 37.

Lib. I. Dios.
cap. 135.

nitentibus. Floret vere umbellis albicantibus: flores baccas edunt racematim coherentes, sanguineis tenuibusque petiolis appensas, Orobi magnitudine, primum virides, per maturitatem nigricantes, è quibus rura Tridentina oleum ad lucernarum vsum torculari exprimunt, iis prius in aqua decoctis. Ligni materies dura, ossæaque est, Corno minimè cedens. Quare quidam Cornum fœminam esse volunt, sed infirmis rationibus nixi. At fortasse non erraret, qui diceret virgam sanguineam esse, cuius Plinius meminit. Id tamen non affirmat Matthiol. cum nondum periculum fecerit, an planta Sanguino vocata id præstet, quod de virga sanguinea Plinius tradidit. Baccæ maturæ amaro, acerbo, adstringentèque sunt sapore. Quare oleum ex iis expressum tale quoque esse necesse est.

EPIMELIS. CAP. XXXVII.

Li. I. ca. 13.
Nomina
Lib. 6. sim.
& li. 2. Ali.

Li. I. Diosc.
cap. 133.

In Diosc.
lib. I. c. 170.

Lib. 6. c. 43.



Væ ἐπιμηλὶς à Dioscoride secunda Mespili species ponitur, à Latinis etiam Epimelis vocatur. Galeno Epimelis acerba planta est, ac ut dixerit quispiam, Malus sylvestris: vocatur ab Italiæ incolis Vnedo: eius magnus est in Calabria prouentus. Hæc de Epimelide, non ut de Mespili specie, sed seorsum à Mespilo scripsit. Qua ratione moti quidam, aliam Dioscor. aliam Galeni Epimelidem esse censuerunt. Matthiolus Dioscor. Epimelidas vulgares nostras Mespilos esse ait, Sed Galenum Epimelidis appellatione diuersam arborem à nostrate Mespilo intellexisse. In eadem est sententia Andr. Lac. Cordus Epimelidem quidem vulgarem nostram Mespilum esse putat, sed Galenum in viribus illius explicandis aberrasse. Scribit enim Cordus Epimelida, siue Hama melida dici, quod iuxta Malos nasci soleat. Copiosè in Germania & satam, & spontè prouenire. Cum spontè, semper vicinam habere agrestem Malum, vnde & nomen à Græcis illi positum. Huius fructum Vnedonem ab Italis vocatum fuisse, teste etiam Galeno, quod præter vnum nemo comedere, & deglutire possit antequam mollescat, adeò fauces adstringit. Sed non verè ab eo dici stomacho eum esse noxium capitisque dolorem excitare, quæ vitia Arbuti sunt, Epimelidi immerito attributa, cum constet Epimelida, idest Mespilum vulgarem, nec stomacho inimicum esse, nec capitis dolores adferre. Dodonæus etiam Epimelidis nomine vulgare nostram Mespilum describit, ac depingit. Gesnerus Chamæmespilum appellat. A quibus omnibus dissentit Dalechampius. Nam Mespilus nostras, nec folia habet Malo similia, nec minora, qualia Epimelidis esse dicit Diosc. quin potius Lauro similia, & foliis Mali maiora. Adhæc fructus illius, ut Epimelidis, rotundus non est, sed oblongus, inferne gracilior, superne latior. Arbusculam igitur hîc appictam, Epimelidem Dioscoridis esse arbitrat, & Theophrasti Mespilum Antheno idem Epimelidemque nuncupatam, ob foliorum cum Malo similitudinem, Anthenoidem verò, quod eius fructus rubro colore, globosa figura, & umbilicato vertice fructum Mespili Anthedonis, de qua suo loco dicam, æmuletur, à quo Mespili nostratis

EPIMELIS.



nostratis

nostratis fructus multum dissidet, turbinatus, & ex rufo liuescens. Ex vnica autem lacunosi vmbilici nota in Mespilo nostrate valde perspicua, quam etiam Epimelidi Dioscorides assignat, inductos fuisse Herbarios verisimile est, vt hanc crederent esse Epimelidem. Sed & hæc in Epimelide hîc depicta euident est, cæteris à Dioscoride traditis notis consentientibus, nostrati vero Mespilo repugnantibus. Est igitur hæc Epimelis arbuscula, cortice rubescente, sed cinerea quadam cuticula obducto. Folia fert Mali, minora, inferne candida & lanuginosa, supernè viridia, venosa: fructum rubentem, rotundum, ex longiusculo petiolo pendentem, vmbilico lato, ternis intus ossiculis, duris, oblongis, hinc angulosis, illinc planis & læuibus. Fructus is adstringit, gustu plane vulgaris Mespili, acerbior, ideoq; minus grato, Peculiari nomine Italis olim Vnedonè appellatū fuisse ex Galeno iam aliquoties diximus. In Alpibus, Apennino, & in excelsi môtis iugo qui apud Allobrogas diui Râberti cœnobio imminet. Frutex

Forma.

Vires.

Locus.

Lib. 1. mor. muli.

EPIMELIS ALTERA,
Cotonastrum Gesneri.



hic copiosus nascitur. Hippocrates ἀμαμαλίδας dixit Epimelidas à Dioscoride nūcupatas, vt Galenus in Glossis testatur, velut hoc loco παραμίσσας ὃ ἐμέλι, ἢ ἀμαμαλίδας, εἴτα ἐπ' οἷον μέλανι δίδοναι πίνειν. Id est, & mel aut Hamamalidas permisceto, deinde in vino nigro bibenda dato.

EPIMELIS ALTERA,
CAP. XXXVIII.

FRUTEX hic ramosus furculosusque est, cortice subrufo, folio Mali Cydoniæ, neruoso, paulò obtusiore, auersa parte candicante, & lanuginosa, aduersa virente: fructu paruo, rubente, vmbilicato, Mespilo exiguo simili, saporis acerbis. Cotonastrum Gesnerus clarissimus Philosophus, ac Medicus, & plerique Herbarij nominant, ob foliorum cum Malo Cydonia similitudinem. Eius ramum fructu onustum cum ad Dalechampium ille misisset, Epimelidis genus esse iudicauit, ex fructus tū figura tū sapore. In niuosis Alpibus nascitur.

Forma.

Nomina

Locus.

FICUS IDÆA, CAP. XXXIX.



FÆ hîc planta exhibetur, pro Halimo à Trago, & Lonicero depicta est, à quo quantum differat, cum de Halimo agetur, demonstrabimus. A nonnullis Idæa Ficus esse dicitur, ab aliis Chamæmespilus. Fruticat ex radice crassa, dura, lignosa, brachiata, ramis tam multis, vt cubiti circumquaque spatium cum sua sobole vnica planta occupet. Hi plerumque ad hominis altitudinem attolluntur, nonnunquam breuiore, lenti, flexilesque in orbem prosiliunt, minimè spinosi, cortice cinereo, qua primum erumpunt folia, tuberoso, velut quodam articulo nodosi: ligno distorto, infernè læui, supernè frondis suæ comam fundente: folio Mali Cydoniæ, molli, venoso, altera parte virente, altera pallido, siue cano, sic digesto, vt ex quouis alarum sinu bina semper exeant, Oleæ folio multo latiore & longiore, illiq; planè dissimili, etiam si Tragus & Lonicerus

Nomina

Lib. 3. c. 22. Cap. de Rube in Hist. plan.

Forma.

Ibidem.



aliter scripserint : flore inter rubrum & phœniceum medio, calathi figura, Idææ Vitis, quam Myrtum Germanicam idem Tragus, Dodon. Vaccinium nigrum appellauit, vt diximus, florem nonnihil imitante: baccis coralli modo rubris, longo pediculo appensis, gemellarum instar binis coëuntibus, & coalescentibus, linea tantum distinctis, cordis figuram ob huiusmodi coalitum penè referentibus, Oesi rubræ, quam Ribes vocant, magnitudine paribus, binis velut Ocellis nigris in vertice pertusis, gustu principio subdulci, sed postea tam ingrato & insuaui, vt fastidium nausæamque moueat, & vomitum prouocet. Nascitur in Germania cum aliis fruticibus secus vias, in sæpibus, & Dumetis Alsatix prouinciæ. Apud nos verò in editissimis & gelidissimis Sequanorum & Allobrogum montibus, nec vnquam in plana descendit. Floret Aprili mense. Eorum sententiam magis probat Dalechampius, qui Idæam Ficum hunc fruticem esse putant, quod eius historia à Theophrasto descripta huic sententiæ adstipulari videatur. Ficus Idæa, inquit, fruticosa est, nec excelsa, sed crassa, sic vt cubiti spatium in orbem fruticantes ramuli occupent: ligno contorto, lento, infernè læui, sine nodis, supernè in orbem comoso, colore tam folij, quàm corticis liuido: folio figura Tiliæ simili, molli quoque & lato, magnitudine pari: Flore Mespili, qui & cum Mespili flore emergit. Fructus quem Ficum appellant, rubet, magnitudine Oliuæ, sed rotundior: esu Mespilum refert. Crassas radices habet mitis Ficus modo, & lentas. Arbor hæc non putret. Cor illi solidum est, & sine medulla. Ex quibus hæc Plinius transtulit. Idæa Ficus rubet, Oliuæ magnitudine, rotundior tantum, sapore Mespili: Alexandrinam hanc ibi vocant, crassitudine cubitali, ramosam, materie valida, lenta, sine lacte, cortice viridi, folio Tiliæ, sed molli. Hunc fruticem Chamæcerasum montanam vocat Gesnerus, seseq; audiisse scribit quatuor aut quinque huius Cerasa deuorata vomitum ciere, aliquando etiam aluum. Sunt & multæ aliæ, variæq; plantæ Chamæcerasi nuncupatæ.

Cap. 28. huius lib.

Tempus.

Lib. 3. Hist. cap. 17.

Lib. 15. c. 18.

CHAMAECERASVS, CAP. XL.

LDEM Gesnerus in variarum rerum cognitione optimè versatus, hanc etiam fruticis effigiem ad Dalechampium misit, quæ nascitur, vt scripsit, in montis Generosi Insubriæ crepidinibus, cliuis, ac præcipitiis, folio Aceris albi, quod Galli, vt diximus *Plane* appellant, latiore & ampliore, per ambitum valde infecto: Fructu rotundo, rubro,

Locus.

Forma.
In syl.c.28

CHAMAECERASVS

montis Generosi.



CHAMAECERASVS

Matthioli.



CHAMAECERASVS

Alpina.



Ceraso simili, vnde Chamæcerasi nomen. Est alia Chamæcerasus Alpina à Lobellio picta, Cordietia Chamæcerasus, Xylosteu alterum, quorundam. Rara est, hæc cubitum pedemue æquans, foliis, ramis, & stipite Corni, albidis, squallidis, nodosis: floribus candidis, pallentibus, aut luteolis. Fructus binos maturat in pediculis longioribus, pedulis, Cerasi ritu, sed in imo duo foramina parua albida, quoddam rudimentum pupillarum, aut oculorum adumbrantia: grana quina, aut sena, albida, lucida, Oxyacathæ paria. Hæc quæ Pena scripsit, tanquam de rara planta, & paucis cognita, Idæam Ficum modo descriptam videntur ostendere, pictura etiam, si attentè consyderes à nostra, vel parum, vel nihil discrepante.

MATTHIOLVS sylvestre Pumilumq; Cerasorū genus, nullo adhibito cultu in Tridentino agro, & in Bohemia circa Pragam, ac in Austria, circa Viennam sponte prouenire scribit, gustu admodum acido, imo acerbo, colore perpetuò rufescente, nec vnquam in atrum vergente

Forma.

Lib. 15. c. 25. vergente, quæ ex breui pediculo pendent in pusillis fruticibus, & admodum paruis, tantæq; breuitatis, vt pauci sint, vel potius nulli, qui dodrantem æquent, vt credat (etsi id non affirmet) ea esse hæc Cerasia quæ Plinius Macedonica vocat. Cæterum hunc fruticem Chamæcerasum potius vocandum esse censet. Ibidem. Meminit etiam Plinius Chamæcerasi Ceraso Macedonica minoris. Sunt & Macedonica Cerasa parvæ arboris, raroq; tria cubita excedentis: & minore etiam frutice Chamæcerasi.

ARIA, CAP. XL I.

Nomina

Forma.



R BOREM hîc depictam Sequani & Aruerni *Alisier* appellant, Nantuatenfes, Galli etiam ipsi *Cirier*, vocabulo ex Aria detorto. Itali *Matallo*, Herbariorum bona pars Ariam. Humilis est arbor, seu frutex in Cædua sylva, sæpibus, ac Dumetis, si verò crescere permittatur procera, vasta, ramosaq; Vlmò & Tilia nihilo minor, nec minùs ampla, diffusaq; Cortex nonnihil in cæruleû colorẽ vergit: folia sunt magna, & lata, Tiliæ,

ARIA CVM FLORE

& fructu Dalechamp.



Locus.

Tempus.

Vires.

Lib. 5. Hist.

cap. 5.

Ibid. ca. 6.

Ibid. ca. 10.

aut Matthioli Viburno, siue Spiteæ non dissimilia, venosa, per oras incisa, supernè viridia, infernè candida: flos qualis hic exprimitur in summis ramis candidus, densus, odoratus: fructus ruber Oxyacanthæ similis, summa parte denticulatus, suavi dulcedine gratus: semen Malo Pirouæ simile, tenero & subatro cortice medullam occultans, saporis non in iucundi. Gignitur in frigidissimis & altissimis montibus. Cultum omnino dedignatur, ac respuit. Quare in hortos translata minimè proficit. Floret mense Maio, tardè fructum perficit. Maturum huius arboris fructum rustici legunt, & condunt: neque enim fugax nimis est, sed in hyemem usque durat, si bene asseruetur. Tussis non aliter quàm Zinziphi bacca lenit, sputum adiuuat, crudos humores pulmonis infarctos coquit. Materia arboris dura, candida, baculis apta: ex ea enim firmi ac solidi fiunt. Theophrastus Ariam inter eas arbores recenset, quæ cariem vetustatemq; non sentiunt, idemq; Ariam ac Quercû omnium in opere difficillimas esse paulò post

tradit, carbonemque optimum fieri ex spississima materia, vt Ariæ, Quercus, Arbuti.

HAMAMELIS ATHENÆI, CAP. XLII.

Nomina

Lib. 14.



Ic expressam plantam censet Dalechampius esse eam quæ ab Athenæo ἀμαμηλὶς, & ὁμομηλὶς dicitur. Cordus Myrtomelidem vocat, ob fructus cum Myrti baccis similitudinem. Vulgus Allobrogum *Amalenchier* vocat, perinde ac si μελίχιον, id est, mellitum pomum dicere vellet, aut Hamamelida, Nantuatenfes *Manternier*, quæ vox ex Alaterno videtur esse deprauata, cum tamen Alaternus esse non possit, cui folium est, Plinio auctore, inter Ilicem & Oleam, nec vlla fructus fecunditas. Est hic frutex

Li. 16. ca. 16.



frutex hominis altitudine, cortice subrubro, folio ad Pruni figuram accedente, venoso, ferrato, altera parte virescente, altera candicante: flore albo. Fructum edit Myrtis similem, umbilicatum, prædulcem, cum maturuit purpureum ante maturitatem, ex purpureo sub rubescentem, semina terna, quaternæue includentem, Piro similia, nigra. Quæ faciunt, ut credibile sit Hamamelida esse Athenæi, quia fructus purpurascenti similis est, valde dulcis, & ἀπύρηνος, id est, sine nucleis lignosis, quorum loco semen continet, nec durum, neque lapidosum, sed ut in Piro, tenero contextum cortice, quæ de Hamamelide tradidit Athenæus. Nascitur in locis asperis confragosisq;: interdum ex scopulorum rimis profilit, nec est ut quidam autumant, Gallorum *Alisier*, de qua superiore capite diximus.

Forma

Locus

LAVRVS TINVS, CAP. XLIII.

DE PICTAM hîc arborem Laurum Tinum Plinij esse inter Peritos Herbarios constat, quam Laurum nonnulli sui generis arborem intelligunt, alij sylvestrem Laurum, etiam Theophrasto in iis numeratam quæ perpetuò virent, tametsi Gaza eo loco simpliciter Laurum vertit, cum tamen in omnibus nostris exemplaribus ἀγρία δάφνη legatur, id est, sylvestris Laurus. Alij δάφνην ἀγρίαν, id est Laurum sylvestrem esse malunt veram Laurum sine hominum cultu operaque sponte provenientem, & ob id sylvestrem, quales multæ circa Monspelium in sapibus visuntur. Arbor hæc cortice vestitur subrubro: ramis abundat, ex quorum nodosis articulis folia enascuntur, bina semper aduersis pediculis sita, venosa, carnosæ, minime dissecta, in acutum desinentia. Flos ex albo purpurascens est in umbellis, copiosissimus: Cærulea bacca plurima, oblonga, angulosa, gustu adstringens. Arbor ista foliis nunquam exuitur. Quare mirificè intuentium oculos delectat, & allicit frondis honore sempiterno, umbellarum aureo fulgore, & baccarum Cæruleis.

Lib. 15. c. 30.
 Nomina
 Lib. 1. Hist.
 cap. 15.

Forma

LAVRVS TINVS

Dalechampij.

Locus.




ruleis aceruis. Nascitur in asperis, saxosis & maritimis Gallicæ prouinciæ, Hetruriæ, agrique Latini collibus. Itali vocant *Lantagine*, & *Lagro saluatico*, diuersam à Lantana sua, quam Matthiolus Viburnum esse arbitratur. Nascitur & in plerisque locis montis Cestij, inter cocciferas Ilices. Clusius duas alias Lauros Tinos exhibuit. Alteram quæ eadem est qua superior altitudine, ramis frequentioribus & firmioribus, cortice ex rubro virescente tectis, circa quos folia superioris, angustiora & oblongiora, aliquantulum, venulis quamplurimis distincta, inter sese opposita, vt in priore: flores extremis ramis umbellarum specie etiam nascuntur, colore nonnihil purpurascente, neque adeo odorati vti superioris: fructus etiam minor, plenior, nigrior. Vno tantum loco in Lusitania quodam monasterio Pera Longa dicto supra Vlyssiponem extructo se obseruasse ait, secundum piscinas, & in Beticæ maritimis. Tertia in hortis Belgicis colitur à rei Herbariæ studiosis, semine ex Italia delato nata, arbusculæ magni-

TINVS II. CLVSII.



TINVS III. CLVSII.



tudine, quæ quotannis & florem & fructum profert, minore est quàm superiores folio, Laurino, tamen latiore, læui & nigricante, perpetuo, ramos ordine quodam per interualla ambiente, vt in prioribus generibus: Umbellæ florum alborum, foris nonnihil purpurascentium, summos ramos coronant, deinde fructus

fructus ex Caruleo nigricans, lævis minor, quàm in aliis, Bis plerùmque floret, vere, & sub hyemem. Lucitani *Vua de Perro* vocant, & *Fallado*.

LAVRVS TAXA, CAP. XLIIII.

LINIVS Lauri genera multa enumerat, tum ea quæ verè Lauri sunt, quales Delphica, Cypria, Mustax, Regia, Spadonia, Triumphalis sterilis: tum ea quæ verè Lauri non sunt, Lauri tamen vel à Græcis, vel à Latinis nominantur, ob foliorum cum vera Lauro similitudinem quandam, quales Laurus Tinus, Laurus Taxa, Chamædaphne, Daphnoides, Laurus Alexandrina, quod cum non satis accuratè perpendisset Manardus, pro Lauro Taxa, Laurum Fraxineam, vel Fraxinum Laureum (vtrum enim velit, non satis explicat) legendum esse censet, quoniam Lauri folio Fraxineum simile sit. Sed cum inter tot Lauri genera nemo vnquam Fraxinum retulerit, nec Lauri Fraxineæ vllus vnquam meminerit, exquirere & perscrutari debuerat, quænam esset illa Laurus Taxa, præsertim tam illustri nota ei à Plinio assignata, quæ Fraxino minimè congruit, potius quam Plinij lectionem sine

Lib. 15. c. 30.

Nomina

LAVRVS TAXA.



ratione immutare. Laurus Taxa Dalechampio ea est, quæ Matthiolo & Dodon. Hyppoglossum, Italis *Bislingua*, & *Bonifacia*, Hispanis *Lengua de Cavallo*, Germanis *Zeptfir krant*, quibusdā *Pagana lingua*, Herbariis Vuularia, Fuschio Laurus Alexandrina. Id ita esse conuincit sola, & insignis illa nota, quæ huic plātæ cum nulla alia communis est, nempe in maioris medio folium paruū accrescēs, quod veluti maioris lacinia, pediculi cui bacca insidet scapū & exortū cōtegit. Accedit in topiario opere Taxa, inquit Plin. exrescente in medio folio paruulo, veluti lacinia folij. His adde Lauri & Taxæ appellationes optimè conuenientes: Lauri quidem à Laurini folij figura: Taxæ verò à colore, figura, magnitudine fructus, qui Taxi baccas omnino refert, hac aptissima nominis ratione à Dalechampio primum obseruata, & explicata. Idem plantam istam Dioscoridis Chamædaphnē esse non sine multis & validis rationibus arbitratur, quas capite de Laureola fœmina diffusius explicabimus. Hæc Laurus, Mat-

Lib. 4. Dioscor. ca. 27.
Lib. 6. c. 14.
Hist. plant. cap. 87.

Lib. 15. c. 30.

Li. 4. Dioscor. c. 127.

Locus.

Vires.

Lib. 4. Dioscor. c. 32.

thioli Hippoglossum nascitur in Liguria Alpibus, Vrbinatæ agro, & in aliis syluosis montibus. Ab Herbariis colitur in hortis. Tradunt recentiores radicis aut herbæ puluerem Coclearis mensura ex vino potum strangulationibus vteri succurrere: herniis à prolapsu intestinorum protuberantibus mederi, si diutius diluculo, puluis idem sesquidrachmæ pondere ex maioris Symphyti decocto hauriatur. Sed ventrali cingendus est æger, & fasciandus primis diebus, ne rursum foras intestina prorumpant. Folia, radixq; vuæ, gutturis, ac tonsillarum tumores, ac earūdem vlcerationes gargarizatu sanant. Scribit Marcellus in Italia plantam istam puerorum collo appendi ad vuam reprimendam, quo ad vuam prolapsam contrahendam vsu, Vuulariæ nomen. Tradit Cordus constare etiam certissimis vulgi experimentis, Vuulariæ radicē etiam siccam bubones in peste maturare: quin etiam Vuulariam epotam difficulter parientes adiuuare,

menes ciere & calculos pellerē, quæ licet omnia vulgi experimenta sint, tamen easdem etiam facultates Lauro Alexandrinæ auctores adscribere.

HYPOGLOSSVM, CAP. XLV.

Nomina
In lib. 4.
Diosc. c. 133.



VIDNAM sit Hypoglossum verum, nunc ostendamus. Ac primum cum in multis Dioscoridis exemplaribus Hippoglossum in Plinio Hypoglossum legeret Marcel. Verg. de huius nominis ratione & varietate ita differit. Rusci, inquit, folia habere Hypoglossum omnes testantur. Sed non adeo grandia sunt: præterea, in cuspidem acuminata desinunt. Quam ob causam, siue magnitudinem, siue equorum linguæ figuram ea voce intelligas, nulla in foliis ratio eius erit. Nec si etiam, ut in Plinio legitur, Græcam præpositionem ὑπὸ, coniunctam linguæ à Græcis fuisse credideris, Dioscoridis Historiæ respondebit: ἐπ' ἄκρῃ enim, id est in summo lingulas exire hic ait, παρὰ τοῖς φύλλοις, id est secus & secundum folia, quæ hic intelligit in caule suprema. At caulis desinens non folia profert, sed conferctæ lanuginis potius quàm foliosæ comæ in latitudinem se aperiens inuolucrum non aliter quàm in spicatis seminibus aliquibus, & floribus fit. Differt tamen à Spica, quod rotundæ, quatuorue plerumque angulis Spicæ surgunt: in hoc quod ultimum in caule exit in latitudinem se explicat. Et quoniam humanam linguam imitatur, ideo Hippoglossum quasi grandis lingua dicta. Hæc Marcello origo nominis & causa est. Quæ licet Plinij Historiæ aduersari videantur: (ait enim & in iis ceu linguas, folio paruo exeunte de foliis) meminerint omnes, inquit Marcel. sequi nos Græcos scriptores, præcipueq; Dioscoridem, & in vertendis eius verbis quam debemus illi fidem præstare, qui ἐπ' ἄκρῃ παρὰ τοῖς φύλλοις prodire linguas in Hypoglossio dicit, quod est in summo, & secundum folia, non ex foliis, sed ex summo caule, qua parte desinunt folia: id enim ἐπ' ἄκρῃ apertè significat: quibus verbis intelligi vult Marcel. Hippoglossum neque à foliorum quæ Rusco similia habet magnitudine, neque ab Equinæ linguæ figura dici, neque Hypoglossum à Plinio rectè nominari, cum ἐπ' ἄκρου, id est in summo caule proferat quæ humanam linguam imitantur, vnde Hippoglossum, id est grandis lingua nuncupandum. Quam Marcelli mentem non satis intellexisse videtur Cordus, cum scribit Marcellum Hippoglossum malè legi censere: imo Hypoglossum legi vult, ob causam modo dictam. Multò verius dixit ille Marcellum nequaquam verum Hippoglossum in commentario suo indicare: qui nescio quam Spicatam lanuginem inducere conatur, cuius nullus vnquam auctor in hac planta mentionem fecerit. Præterea, ut cum eodem Cordo sentio, Hypoglossum, siue Hypoglossidion, siue Hypoglotion cum præpositione Græca ὑπὸ, scribendum esse, quod paulò post ostendam, ita ab eodem dissentio dicente Hypoglossum eandem esse plantam cum Lauro Alexandrina, eam nimirum quam pro Lauro Taxa exhibuimus: Atque etiam à Matthiolo, eandem quidem pro Hypoglossio pingente, sed à Lauro Alexandrina rectè distinguente. Si enim, id est, Dioscoridis Hypoglossum, quomodo eius folia Rusco figura similia intelligi possunt? aut quas in summo linguas è foliis exeuntes habet? non è mediis foliis totius plantæ, non ex summis, neque ex summo caule hæ linguæ exeunt. Quare aliud Dioscoridis Hypoglossum esse putat Dalechampius, id nimirum quod hic depinximus, & quod idem Matthiolus pro priore Lauro Alexandrina proposuit, & hoc Dioscor. caput mendis inquinatum, atque deprauatum Legendum igitur: ὑπόγλωσσον γαμνίσκος ἐστὶ μυρσίνη ἀγρία καὶ λεπτή (melius fortasse λευκή) τὰ φύλλα ὁμοίως. Κόμην δὲ ἀκανθώδη ἔχει ἐπ' ἄκρῃ, καὶ ὡς γλωττίδα παρὰ

Li. 4. Diosc.
cap. 132.

Ibidem.

Li. 4. Diosc.
cap. 142.

Forma.



παρὰ τοῖς φύλλοις. Id est, Hypoglossum frutex parvus est, Myrto sylvestri (non rusco, ut vertit Ruellius) tenui (melius candidæ: nam & Lib. I. c. 128. Dioscor. Myrtus sylvestris est candida, folio quàm Myrtus nigra latiore & maiore.) Comam in summo spinosam habet, & prope folia ligulas. Vel ut Andr. Lacu. ex veteri codice legit, καὶ ἐπ' ἄκρου ὡς περ ἐπιγλωττίδας παρὰ φύσιν μικρὰς ἐν τοῖς φύλλοις. Quod est, & in summitate foliorum germina quædam exigua instar ligularum. Quæ si sic legisset Marcel. nec in verbis illis ἐπ' ἄκρου declarandis tantum operæ sumere, nec in summis caulibus nescio quas linguas cōminisci necesse fuisset. Nullorum sanè foliorum aptius inter sese facies comparari potest, quam huius Hypoglossi, & Myrti sylvestris candidæ. Nam ea in summitate aculeata sunt: præterea, iuxta folia graciles longique petioli nascuntur ligularum instar, qui fructus sustinent. His accedit grauißimi auctoris Galeni testimoniū sic scribentis: ὑπόγλωσσον, ὠνόμαται μὲν ὅτι

Li. 3. simpl.

παρὰ φύσιν ἐπ' ἄκροις τοῖς κορύμβοις ποιεῖται γλωσσάριον. Id est, Hypoglossum sic nominatum est, quia propagines paruarum linguarum sub summis corymbis producit. Ex quibus verbis intelligere licet γλωττίδας, siue γλωσσάριον, id est, ligulas, non esse foliola in mediis foliis nascentia, ac proinde Matthioli cæterorumque Hypoglossum, quod hæc foliola habet, non esse verum hypoglossum, sed propagines, siue petiolos ex quibus corymbi pendent, simul, & appellationis rationem reddi: dictum enim esse Hypoglossum quod ligulas sub corymbis habeat. Idem demonstrat literarum ordo, quo plantarum tractationem digessit Galenus. Ita etiam legit Paulus. Plinius autem Hypoglossum pariter vocat, ac sic describit. Hypoglossum folia habet figura sylvestris Myrti, concaua, spinosa, & in his ceu linguas, folio paruo exeunte de foliis, & cætera: postremis verbis male interpretatus Dioscoridis illud, παρὰ τοῖς φύλλοις. Hæc cum ex Dioscoride traducta esse constet, videtur legisse Plinius: ὑπόγλωσσον γαμνίσκος ἐστὶ μυρσίνη ἀρχαία ὁμοίος. Κοιλὴν, vel πολλὴν διὰ κόμην ἔχον καὶ ἀκανθώδη, καὶ ἐν ταύτῃ ὡς περ γλώττιδας. Porro cum vocem tenuis omiserit, nonnullos hoc mouit, ut suspicarentur eam in Dioscoride redundare. Qui retinent, sic legi ab Oribasio aiunt, ideoque magna ratione adiectam, ut ex ea cum qua Myrto sylvestri compararetur Hypoglossum, cognosceremus. Est enim Myrtus sylvestris duplex, altera odorata in ora maritima prouinciæ nostræ frequens, ad hominis proceritatem assurgens, crassis stipitibus: altera inodora, humilis, tenuibus virgulis fruticosa, Rusco à Latinis appellata. Posterioris folia crassiora, superioris tenuiora, cum quibus Hypoglossi folia comparata sunt. Hypoglossum in syluis, & montosis locis nascitur. Capitis dolorem corona ex huius coma imposita minuit, inquit Dioscorides. Malagmatis radix, succusque admiscetur. Galenus. Radix & succus mollendi vim habent.

In li. simpl.

Lib. 7.

Lib. 27. c. 11.

L. 11.

Idem.

Nomina

Li. 4. Diosc.
 cap. 132.
 Lib. 4. Diosc.
 scor. c. 142.
 Embl. 127.
 li. 4. Diosc.

FOLIORVM, fructus, & nominis similitudo in tribus fruticibus effecit, vt à diuersis auctoribus aliter atque aliter nominarentur, atque vsurparentur. Quam enim Bilinguam vocant, alij Hypoglossum, alij Laurum Alexandrinam, vt diximus, nuncupant. Cor-
 do Bilingua, & Hypoglossum cum Lauro Alexandrina idem esse videtur. Matthiolo, & Cornario, Hypoglossum, à Lauro Alexandrina diuersum cense-
 tur. Dalechampius aliter, & aptius, vt arbitror, distinxit, vt quæ Bilingua, Bo-
 nifacia, & Vuularia dicitur, sit Laurus Taxa Plinij: Hypoglossum vero Diosco-
 ridis & Galeni, & Hypoglossa Plinij, sit frutex præcedenti capite descriptus.
 Laurus autem Alexandrina ea de qua nunc agitur, hîc depicta, etiam si Hypo-

LAVRVS ALEXAN-
 drina vera.

In lib. 4.
 Diosc. c. 148.
 Lib. 15. c. 30.

Forma.
 Li. 4. c. 142.



glotton, & Hypoglossidion etiam quidam appellent. Δάφνη ἀλεξάνδρεια, & ἰδαία à Græcis dicitur, à Latinis Laurus Alexandrina & Idæa, ab Alexandria Troadis, vbi mons est Ida, circa quam nascitur, non vt scribit Marcel. quod Alexander victor ea vsus fue-
 rit. Alij Hypoglotton, alij Daphnitin, alij Carpophyllon, alij Hypelaten vocant, in-
 quit Plinius. Eam esse quam hîc exhibemus apertissimè declarat eius historia à Diosco-
 ride & Theophrasto tradita. Δάφνη ἀλεξάν-
 δρεια, inquit Dioscorides, φύλλα ὀξύμυρσινῃ
 ὅμοια ἔχει, μείζονα δὲ, καὶ μαλακώτερα, καὶ λευκώτερα.
 Καρπὸν δὲ ἐν μέσοις, ἐρυθρὸν, ἐρεβίνθοιο τό μέγεθος.
 Κλώνας ἐπὶ γῆς, σπιθαμαίους, ἢ καὶ μείζονας. ῥίζαν
 ὡραπλησίαν τῇ ὀξύμυρσινῃ, μείζονα δὲ καὶ εὐώδη,
 καὶ μαλακώτεραν. φύε' ἐν τόποις ὄρεσιν. Id est, Lau-
 rus Alexandrina foliis est Rusci (Myrti Plin-
 ius habet) maioribus, mollioribus, candi-
 dioribus (Plinius addit acutioribus) fructum
 habet in mediis foliis (non vt Plinius, &
 Ruellius, semen inter folia) rubrum, Cice-
 ris magnitudine, ramos humi iacentes, do-
 drantales, vel etiam longiores: radicem Ru-

Lib. 1. Hist.
 cap. 16.

Li. 3. c. Hist.
 cap. 17.

sco (non syluestri Myrto, vt Ruellius) similem, maiorem, molliorem, odora-
 tam. Inuenitur in montosis. Theophrastus. ἔνια δὲ τῶν φύλλων καρποφόρα ἐστὶ, μέτα-
 ξυ περικληφόντα τον καρπὸν, ὥστε καὶ ἀλεξάνδρεια δάφνη ἐπιφυλλόκαρπος. Id est, Stirpium
 quædam fructiferæ sunt, fructum mediis foliis amplectentes, vt Laurus Ale-
 xandrina, fructum super folia gignens. ac rursus: τῆς δάφνης ἐν τέτρω τὸ ἴδιον, ὅτι
 ἐπιφυλλόκαρπός ἐστι, ὥστε καὶ ἡ κεντρομυρσίνη. ἀμφότεροι γὰρ τὸν καρπὸν ἔχουσιν ἐπὶ τῆς ῥαχέως
 τοῦ φύλλου. Id est, Lauri hoc proprium, quod fructum super folia ferat, quem-
 admodum Rusci: fructus enim vtrique dorso ipsius folij insidet, quæ nota
 cum in ea stirpe quam exhibemus sit euidentissima, omnibus aliis consen-
 tientibus, Laurum Alexandrinam esse planè conuincit. Laurus quidem Taxa
 in medio folio paruulum habet, pediculi qui fructum fert exortum tegens:
 Hypoglossum ex foliis ligulas exeuntes, quæ fructus sustinent: Laurus hæc
 Alexandrina ipsimet foliis fructus gignit nullo foliolo tectos: quibus notis

tam

tam perspicuis cum hi tres frutices à sese secernantur, cum Dioscor. Galenus, alij eos secuti seorsum tanquam de diuersis tractarint, tamen Cordus, vt diximus, pro vna eadēque planta his rationibus adductus accepit. Hypoglossum, inquit, siue Hypoglossidion, siue Hypoglotton, etiam Laurus Alexandrina à Dioscoride, & aliis omnibus vocatur. Vtrūque folio Rusci describitur, tamen in Lauro Alexandrina paruorum foliorum ex foliis nascentium Dioscorides non meminit, contra in Hypoglossi historia foliis adnati fructus mentionem non fecit. Sed quod vtriūque descriptioni deest, id etiam ex vtriūque historia sarciri potest. Quòd Hypoglossi, & Lauri Alexandrinæ descriptio cum historia Vuulariæ optimè conuenit, quod ex eius foliis minora alia nascantur folia, quæ omnia Rusci modo aculeata sunt, quòd iuxta parua folia rubentem ferat fructum, Ciceris magnitudine, hinc vnam tantum plantam esse Hypoglossum & Laurum Alexandrinam colligit, eam scilicet quæ Vuularia vulgo dicitur. Nec me mouet, inquit, quod Galenus, & Ægineta diuersis locis de Hypoglosso, & Lauro Alexandrina agant. Ægineta enim ex Galeno, Galenus ex Dioscoride earum vires transcripsit. At Galenus Hypoglossi nomine ab Alexandrina Lauro diuersam herbam non nouit. Potuit itaque hæc vna planta ab alio Hypoglossum, ab alio Daphne Alexandrina appellari. Nam Theophr. Alexandrinæ Lauri tantum meminit, sub hac etiam Hypoglossum intelligens, cuius alibi nusquam meminit. Vnde Dioscorides etiam, & qui Dioscoridem secuti sunt scriptores, occasionem nacti sunt credendi Hypoglossum ab Alexandrina Lauro differre. Talis quoque error ipsi Dioscoridi in Phyllo & Mercuriali accidit. Similes etiam innumeros in Plinio inuenias. Alexandrina Laurus etiam Idæa dicitur, quod si aliquis ignorauerit, & nomen illud solum apud auctorem aliquem inuenerit, statim opinabitur, eam sui generis esse herbam, sed falsò. Constat etiam, inquit, certissimis vulgi experimentis Vuulariæ radicem etiam siccam bubones in peste maturare. Hinc est, quod malacticam vim Hypoglossi radici auctores tribuunt. Quinetiam Vuularia difficile parientes epota adiuuat, menses, & calculos pellit, quæ licet omnia vulgi experimenta sint, tamen easdem etiam facultates Lauro Alexandrinæ auctores adscribunt. Quare cum Vuularia vtriūque descriptioni respondeat, & vtrique etiam attributis viribus, polleat, ac Alexandrina Laurus, & Hypoglossum etiam eandem historiam, & idem nomen habeant, proculdubio Vuularia eadem est cum Lauro Alexandrina, & Alexandrina Laurus eadem cum Hypoglosso. Hæc Cordus, quæ etsi ex iis quæ de tribus fruticibus modò à me dicta sunt, facile refelli possunt, tamen hic monebo sapissimè diuersis plantis idem positum esse nomen, eamque ob causam falli multos & errare, qui diuersas pro vna habeant. Præterea eandem non esse Lauri Alexandrinæ & Hypoglossi descriptionem Dioscorides docet, qui Hypoglossi folia *μυρσίνη ἀγρία*, idest Myrto syluestri similia esse scribit, & in iis veluti ligulas, Lauri vero Alexandrinæ folia *ὄξυμυρσίνη*, idest Rusco, & in ipsorum medio fructum, &c. Postremò si vulgi experimenta vera certaque sint, ac eadem sunt Vuulariæ vires quæ Hypoglossi, & Lauri Alexandrinæ, eas tamen vnicam esse plantam non rectè concluderis: quoniam plurimæ sunt, & forma, & genere differentes, quæ iisdem pollent viribus. Sed de nostra Lauro Alexandrina dicamus. Nascitur plurima in Ida, & circa Heracleam Ponti, inquit Plinius, nec nisi montosis. Lauri herbæ, quam & Laurum Alexandrinam appellant, inquit Galenus, temperatura euidenter est calida, sapore gustantibus acri simul & subamaro: ideoque pota tum vrinæ, tum menses prolicit. Difficiles partus accelerare, Dioscorides ait,

Locus.
Lib. 15. c. 30.
Lib. 6. sim.
Tempera.
& vires.
lib. 4. c. 142.

Lacu.

radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci, & stillicidio vrinae auxiliari, sed sanguinem extrahere. Additur in veteri codice, *μετὰ οἶνῳ γλυκέως κυάθου ἑνὸς*, id est, in vini dulcis cyathos uno. Plinius maiorem modum habet. Scribit enim. Laurus Alexandrina partus celeres facit, radice pota trium denariorum pondere in vini dulcis cyathis tribus. Secundas etiam pellit, mensesque eodem modo pota.

Lib. 23. c. 8.

DAPHNOIDES, CAP. XLVII.

Nomina

Lib. 15. c. 30.

Lib. 23. c. 8.

Li. 4. Dios.

cap. 143.

Lib. 3. c. 36.

Ibid. ca. 38.

Lib. 3. ca. 6.

& 7.

Ibidem.

Ibidem.

NON minùs obscura est Daphnoidis, & Chamædaphnes, quàm Hypoglossi & Lauri Alexandrinæ historia, tum ob nominum varietatem, tum ob diuersas auctorum de his plantis sententias. Id quoque quod Daphnoides vocatur genus, inquit Plinius, in nominum ambitu est. Alij enim Pelasgum, alij Eupetalon, alij Stephanon Alexandri vocant. Alio in loco syluestrem Laurum, idem appellat. Officinis & Herbariorum vulgo Græcæ vocis imitatione Laureola dicitur. Sed cum Laureolæ duplex sit genus, mas, & fœmina, alij Daphnoidem Laureolam fœminam esse contendunt, Chamædaphnen marem, alij contra, alij Chamædaphnen esse à Laureola diuersam arbitrantur. Quam Chamædaphnen, siue Laureolam marem, Matthiolus: (alij fœminam, siue albam), Dodon. Daphnoidem & Laureolam marem vocat: quam Matthiolus & Fuschius Daphnoidem & Laureolam, Dodon. Chamæleam Germanicam, & Meze-reon vulgare. Hanc Tragus etiam pro Thymelæa, & Chamæleâ describere ac depingere videtur, & in eum errorem incidisse cuius alios insimulat, qui Chamæleam cum Daphnoide, seu Laureola confundunt. Nam illas minimè Thymelæam & Chamæleam esse suis locis demonstrabitur. Germanorum autem *Zeiland*, quam ille Thymelæam, & *Zeidelpast*, quam Chamæleam vocat, Fuschio auctore eadem est planta, scilicet Daphnoides, seu Laureola. Quare figuras duas, & descriptiones duas vnius plantæ exhibet, & Thymelæam, Chamæleamque cum Daphnoide confundit, si Fuschium sequamur: si Dodonæum Thymelæam similiter cum Daphnoide quam Germanicè *Zeiland*, vocari etiam scripsit. Quam autem ille Chamæleam Germanicè *Zeidelpast* vocat, Dodon. veram Chamæleam esse negat. Dicit aliquis Tragum his duabus figuris Chamædaphnen, & Daphnoidem expressisse. At Daphnoides nostra, vt dicemus, folia magna in summo caule habet, quibus Tragi pictura caret: neque flores in caule habet sine foliis, quales in vtraque figura pinguntur. Dalechampius cum Dodonæo Laureolam Officinarum, siue Laureolam marem Dioscoridis Daphnoidem esse rectè censet, quæ Matthiolo est Chamædaphne, vt dictum est, à Germanis *Zeiland*, nuncupata, à Gallis *Laureole*, ab Italis *Olinella*, vel *Oreola*, ab Hispanis, *Loreola*. Est autem frutex paruus, cubitalis, ramos multos habens Lauri modo flexiles, à medio sursum: versus folia ferentes, cortex est circa ramos admodum viscidus, folia Lauro similia, sed molliora, graciliora, (*ἰσχυρότερα* legimus in vulgatis Codicibus vetus *ἰσχυρότερα* habet, id est validiora, sic etiam Plinius legisse videtur, crassiore, inquit & molliore quàm Laurus folio: quale reuera est Laureolæ folium) & quæ non facillè franguntur, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores edit multos densos, oblongis quibusdam, gracilibus stellatisque veluti calathis, ex herbaceo albos, vel luteolos: semen initio viride, cum maturuerit, nigrum, baccis Lauri simile, sed minus: radicem lignosiore & durior. Daphnoidem siue

DAPHNOIDES,

sive Laureola.

DAPHNOIDES,

sive Laureola cum flore



sive Laureolam cum flore : item Laureolam cum fructu Lobellius exhibuit. Theophrastus Daphnoidis crocei meminit, quod de fructu interpretantur. Sunt qui Laureolam scæminam, intelligant. Daphnoides inquit Plinius, frutex est ramosus, crassiore ac molliore quam Laurus folio, cuius gustatu accenditur os atque guttur, baccis è nigro rufis. Laureola in montibus asperis, & silvis provenit, Germaniæ, Galliæ, Angliæ. Citò floret, Febuario scilicet mense, semen Maio maturescit. Dodonæus Laureolam calidam siccâque esse tertio gradu, & ferè ad quartum usque scripsit. Pituitam, inquit Dioscori extrahit folium recens, vel aridum in potu : menses ciet, & vomitum : caput inanit comâducatû : sternutamēta mouet. Baccæ quindecim potæ aluum resoluunt, Quæ cum Græcè sic legantur, Ἀγρί τῇ τὸ φύλλον αὐτῆς ξηρὸν, ἢ νεαρὸν ποθὲν, κατὰ κοιλίαν φλεγμώδη, sic etiam perspicuè verti possunt : folium eius aridū recensve potum humores pituitosos per aluum ducit : ac rursus διαμασσηθὲν ἀποφλεγμολίξει, Pituitam à capite extrahit commanducatum. Daphnoides Plinio, sive his nominibus quæ diximus sylvestris Laurus, aluum soluit, vel recenti folio, vel arido, drachmis tribus, cum sale, in hydromelite. Manducata pituitas extrahit : folium : & vomitus, stomacho inutile. Sic & baccæ quinæ denæ purgationis causa sumuntur. Sic enim ex veteri codice emendandus & distinguendus locus iste. Galenus eodē loco Daphnoidis id est, Clematidis prioris, seu Vincæ peruinæ, quæ etiam Chamædaphnen Plinius vocat cap. ii. lib. 21. & Chamædaphnes, idest, Lauri Taxæ, meminit his verbis. Chamædaphnes germina tenera edi quoque assolent. Est autem persimilis viribus Lauro Alexandrinæ, sicut sanè & quæ Daphnoides, idest, Clematis, vocatur. Folia Laureolæ sumpta hydro-picis multū prosunt, quia vacuāt aquas : similiter & baccæ : sed ventriculum evertūt, eūque ac cæteras partes internas inflāmāt, quæ noxa corrigitur, si in aceto macerentur, cui iniectum sit nonnihil Mali Cotonei, & granorum Berberis.

Li. 9. Hist. cap. 15.

Li. 15. c. 30.

Locus.

Lib. 3. c. 36.

Temper.

¶ Vires

Li. 4. c. 143.

Li. 23. ca. 8.

Lib. 6. sim.

Ibi. Dodo.

HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,
LAVREOLA FŒMINA, CHAMÆDAPHNE
MVLTORVM, CAP. XLVIII.

Nomina
 Lib. 3. ca. 38.



AURI quoque siue Laureolæ effigiem vendicat hæc planta, herbariis & Officinis Laureola, fœmina, seu alba nuncupata, Dodonæo Chamælæa Germanica, siue Mezereon vulgare, Germanis, *Zeidelphast*, Sequanis *Bois Gentil*, Eandem periti etiam herbarij Dioscoridis Chamædaphnen esse censuerunt, idest humilem pumilamve Laurum, tum quod illi effigie sit affinis, tum quod probabile sit Dioscoridem tractare incipientem de Catharticiis validis, Daphnoidi, idest, Laureolæ mari, Chamædaphnen, idest Laureolam fœminam statim subiecisse, congenerem plantam, &

Forma

LAVREOLA
fœmina.

Dioscorid.
 li. 4. c. 144.
 Capit. 334.
 simpl.



iisdem præditam facultatibus, purgandi aquas bilem, pituitam. At cum Dalechampius descriptiones propius inspexisset, & accuratius expendisset Chamædaphnes effectus ac facultates, mulcendi ardores stomachi, sedandi capitis dolores, & quod addit Serapio, discutiendi inflationem stomachi, mitigandi tormina, menses & vrinas ciendi, quæ omnia cum viribus Alexandrinæ Lauri conueniunt, & ab albæ Laureolæ naturæ plantæ acerrimæ & feruidissimæ plurimum, remota sunt, præterea cum animaduertisset Chamædaphnes fructum foliis adnecti, qui albæ Laureolæ ramis & non foliis inhæret, ab aliorum sententia desciscere coactus est, & statuere Chamædaphnem Dioscoridis, minimè habendam pro Laureolæ genere. Cum autem ex his tribus suprâ memoratis, quæ ob foliorum cum Lauro similitudinem Lauri vocantur, duæ, nempe Laurus Taxa Plinij, & Laurus Alexandrina fructum rubrum adnexum foliis ædant, tertia verò Hypoglossum ligulis siue gracilibus pediculis affixum, & Lauri Alexandrinæ

tradita historia Dioscorides Lauri Taxæ nullam mentionem fecerit, insignis herbæ, nec silentio prætereundæ, Laurum Taxam Plinij ab eo Chamædaphnē vocatam fuisse prorsus arbitratur, optimè congruente tota narrationis serie, si folioli laciniam fructum contegentem Dioscorides addidisset, quod etiam nonnulli putant in eius historia memoratum, sed deletum & inductum fuisse: quoniam virgas emittit cubitales, singulari ramo constantes (quæ præter Dioscoridis literam ex Plinio Ruellius adiecit) rectas, tenues, læues: folia Lauri, læuiora multo, pallidiora: semen rotundum, rubrum, annexum foliis. Quibus adde ex Galeno Chamædaphnen Alexandrinæ Lauro viribus esse similem, quemadmodum Vuulariam, Dalechampij Chamædaphnen, viribus iisdem præditam esse, quibus Laurus Alexandrina, Cordus quotidianis vulgi experimentis constare affirmat, vt diximus. At hic duo valdè refragantur, & ambiguos nos reddunt. Primum, si Laureola alba Chamædaphne non fuerit, quænam planta sit apud Dioscoridem pro hac Laureola habenda? Alterū quidnam significet Galenus, cum scribit Daphnoides similem Chamædaphne vim habere, cum acerrima & feruidissima planta sit Daphnoides, Chamædaphne verò

non

Lib. 6. sim.

Ca. de Lau.
 Taxa.

Lib. 6. sim.

non solum non vrat, sed ardores stomachi leniat: Ad id quod priore loco proponitur, respondet Dalechampius, albam seu fœminam Laureolam nostram ignotam fuisse Dioscoridi, ut quæ in nostris montibus gelidissimis, & à Græciæ Asiæque montium cælo, statu, temperie diuersissimis gignatur, saltem nulum apud Dioscoridem locum extare vnde notam illi fuisse coniectemur, aut veterum scriptorum cuius, nisi fortè Plinium eam indicasse putemus, cum scribit Daphnoiden fruticem esse ramosum, folio crassiore & molliore quàm Lauri, os atque, guttur accendente, baccis nigris vel rufis, sic enim quidam legunt, non è nigro rufis. Sed hanc Daphnoidem, Laureolam marem esse diximus. Quod quæritur secundo loco, apud Galenum sic legitur, τῆς ὀχραμειδάρνης, καὶ ἑοδόσιαι οἱ ἀπαιδοὶ κλώνες: παραπλησία ὅτι καὶ ἡδε τὴν διωάμιν ἐστὶ τῇ ἀλεξανδρείᾳ δάφνη καὶ θάπερ, καὶ διαφνοειδὲς ὀνομαζόμενον. Paulus qui ad verbum Galeni orationem transscribere solet, pressius hæc ita retulit, Καὶ τὸ γε δαφνοειδὲς τῆς αὐτῆς ἐστὶ διωάμεως, καὶ ἡ χραμειδάρνη, αὐτὴ ὅτι ἑοδόσιται. Ætius qui Galenum ubique sequitur, non aliter quàm Paulus, cum de Lauro strictim verba fecisset, de Chamædaphne, Daphnoide, atque adeo Clematide tacuit. Serapio ex Galeno & Dioscoride colligere solitus omnia quæ ad historiam & vires explicandas pertinet, cum recitasset quæ de arbore Lauro, Chamædaphne, & Lauro Alexandrina vterque auctor prodidit, eandem post historiam Daphnoidis petitam ex Dioscoride, scripsit ex Galeno, Ortus. (Alij, & rectius, virtus) eius est sicut Chamædaphnes. Oribasius pro suo more tradita ex Dioscoride nuda historia Lauri arboris, Chamædaphnes, Daphnoidis, Lauri Alexandrinæ, de hac facultatis similitudine inter Chamædaphnen & Daphnoides prorsus silet. Ex quibus intelligitur Galenum eam similitudinem primum ostendisse absque Dioscoridis testimonio, sic tamen ut ei fides constet, si vel διαφνοειδὲς, accipiamus non quidem vlcérantem & vrentem fruticem Laureolam nostram, sed Clematidem Galeni secundam quam paulo post διαφνοειδὲς, μυρσινειδὲς, πολυγονειδὲς etiam vocari testatur. Ambabus

Li. 15. c. 30.

Lib. 6. sim.

L A V R E O L A

cum fructu.



enim vis est adstringens & siccans. Vel si parem vtriusque vim, Chamædaphnes, inquam, & Daphnoidis cathartica, in prouocandis tantum mensibus intelligas: menses enim & hæc & illa ciet. Hæc est Dalechampij de Chamædaphne sententia. Nunc quæ de Laureola fœmina dicenda sunt persequamur. Frutex est parvus, binum, ternumve pedum, ad summum quaternum altitudine, ramulis breuib⁹, fractu contumacibus, cortice & foliis pallidè virentibus Laureolæ, vel Ligustri, vel Oleæ: secundum ramulos flores oriuntur odorati, subpurpurei, deinde bacculæ initio virides maturæ rubent, aridæ & iam viætæ maturitatis, nigre, & rugosæ: piper rusticum eis vocant, & perperam Granū Cnidium. Cortex exemptus detegit granum medullosum, Canabino/aut Lithospermo maiori simile, gustu feruidissimo, & fauces gulam adurente, diu multumque durate impressione similiter vrunt folia, cortex & radix. Nascitur in montosis & sylvestribus locis Sequanorum, Germaniæ, & Heluetiæ, tum in Allobrogum, Ligurum & Delphinatus montibus

Forma

Locus.

Tempus.

Tempus. tibus ac collibus syluosis, opacis. Flos puniceus, aspectus venustissimi, prodit Martio, antequam folia erumpant: semen cum maturuit rubrum visitur Augusto. Non minus hæc per aluum deiicit crassam viscidamque pituitam, & intestina abradit, quàm Laureala mas, cui non dissimilis, sed vehementior facultas inest, eadèmq; in aceto maceratio ad corrigendum debetur. Huius ramulum præcisum à Matthiolo pictum hîc posuimus. Quod monuimus, Sequani Lignum nobile vocant, ob floris elegantiam, sua lingua, *Bois gentil*, & initio veris ante aliorum ferè omnium florum prouentum, hunc decerptum & in vasa coniectum voluptatis gratia domi seruant. Daphnœiden alteram esse plantam hanc ignoraremus si Theophrastus in his enarrandis alioqui brevis, & concisus apertè non docuisset, Daphnœidis esse genera duo, fructu præcipuè distincta, qui niger in altera est, in altera croci colore, nempe staminum quæ à flore croci auulsa reconduntur, non autem Croci liquore diluti, vt merito hæc Daphnœides, crocea nominari possit.

COLUTEA VESICARIA, CAP. XLIX.

Lib. I. Hist.
cap. 16.

Nomina

Lib. 3. Hist.
cap. 7.

Forma.



ARBOR quæ à Theophrasto κολυσία dicitur, nisi mendosi sint codices, & κολυσία, à quibusdam κολωτρία, Latinè etiam Colutea dicitur, à Gallis *Baguenaudier*, Locis incultis frutex est, cultis arbor, in multos sese ramos diffundens, ligno Sambucino ferè simili, satis duro, cortice exteriori cinereo, interiore viridi, in cuius medio cauitas parua inest, medullæ loco. Folia sunt Fœnogræco similia, Sennæ foliis rotundiora, nec in acutum desinentia, superne glabra & viridia, inferne candidiora & hirsuta, gustu amara: flores multi ex longis pediculis propendent, vt in Piso & Cicerula coloris crocei, horum & Genistæ floribus forma similes, non quadripartiti, quales à Matthiolo pinguntur. His succedunt membranosi folliculi, pellucentes, interdù rubentes, prætumidi, ac veluti quodam spiritu distendēte tur-

Lib. 3. Dios.
cap. 70.

COLUTEA VESICARIA,
seu Liparea Theophrasti.

COLUTEA
vesicaria. Matth.



Lib. 3. Hist.
cap. 17.

Lib. I. c. 70.

Li. 3. Diosc.
cap. 70.In Hist. pl.
ca. 168.

Capit. 170.

Lib. 3. Hist.
cap. 17.

gidi, ita ut si digitis præmantur, crepitantes dissiliant. In his semina multa, quæ immatura renis formam habent, lutea, gustu Pisi vel fabæ: matura lentis ferè forma sunt nigra, dura, in medio compressa. Colutea Liparæ peculiaris inquit Theophrastus, arbor procera, fructum fert in siliquis, magnitudine Lentis, qui mirum in modum oues faginat. Nascitur semine, fimo stercoreata, præcipuè ouillo. Serendi tempus cum Arcturus occidit. Mandari solo debet præmacera- tum, cum iam in aqua tumet, siue flatu distenditur (legendum enim Græcè ὅταν ἡδὴ διαφυσᾷται, vel διαφυσῇται ἐν τῷ ὕδατι, non διαφύσσει, ut legit Gaza, & ut ha- bent vulgata exemplaria) folium mittit sænogræco non absimile. Germinat primùm singulari caudice, triennio maximè, quo concidendis scipionibus me- lioribus idonea. Si quis decurtauerit, emoritur: stolonibus enim non regermi- nat (ὃς δὲ ἀπαρὰ βλαστὸν ἐστίν. Gaza, haud enim latere plantigera constat) Spargitur deinde in ramos, quadrima prorsus arborefcit. Hæc Theophrasti Colutea, quæ non temerè alibi quàm in Lipara nascebatur, nunc in Gallia, quo nomine dixi- mus cognita est, notis omnibus maximè adstipulantibus, & Matthiolo, Do- donæo, Ruellio consentientibus. Sed Ruellius istam Coluteam, Gallorum *Baguenaudier*, Mauritanorum Sennam esse scripsit, quod fortasse ut apud Theophr. legerat coluteæ fructu oues mirè pinguescere, ita apud Serapionem in Sennæ historia, caducas eius siliquas ab opilionibus legi, faginandis ouibus perquam vtilis, demirarique se ait hanc arborem Theophrasto celebratā, à Plinio, Dio- scoride, Galeno, Paulo prætermisam: cuius & siliquarum & foliorum, furcu- lorūque tantus inualuerit vsus, ut apud posteros nullam ferè sit purgantis me- dicamenti confectio, quæ eius mixturam non admittat. Hunc Ruellij errorem facile refellit Matthiolus, quod Senna herba sit paucis mensibus superstes, Co- lutea verò arbor multis perdurans annis: hæc siliquas proferat primùm purpu- rascentes, deinde albicantes, flatu turgentes, semine intus paruo, rotundo, Len- tis effigie, illa folliculos falcatos, compressos, in quibus includitur semen vina- ceorum figura. Fuchsius, κολυτέαν, Græcis Colyteam, & Coluteam Latinis dici scripsit, duoque eius genera esse. Vnum quod priuatim colytea vocatur, officini- nis incognitum, à Germanis *Vuelchlinfen*, appellatum (Gallorum id est *Baguenaudier*.) Alterum officinis cognitum, & frequenti vsu à medicis vsurpatum, quod Mauritano sermone *Sena*, nominatur. Altera, opinor, editione, de Colutea & Sena tractans ait se Græco Theophrasti codice destitutum putasse Latinè hanc plantam Colyteam & Coluteam dici, sed cum Græcum Theophrastum nactus esset, facile se κολυτέαν & κολυτέαν, diuersas esse deprehendisse: & rectè quidem. Theophrastus enim cum Coluteam Liparæ propriam descripsisset, statim sub- iicit. Aliud genus est Colytea circa Idam proueniens, fruticosa, nodosa, alis multis concava, non admodum rara (σπάνιον ὃ οὐ πολὺ. Gaza legit σπάνιον ὃ καὶ πολὺ. inuentu rarum, non crebrum) folio Lauri latifoliae, sed rotundiore, am- plioréque, Vlneo simile ut videatur, oblongiore, superne viridi, inferne cano, fibris tenuibus ac rotundis neruoso, inter eas positis, quæ à media, costarum in- star ducuntur: legendum enim, πολὺνον, ταῖς λεπταῖς ἰσὶ, μεταξύ τῶν πλευροειδῶς ἀπὸ μέσης κατὰ τὴν σῶν. deletis superuacuis his dictionib⁹, ἐκ τῶν ὀπιθῆν, & καὶ τοῖς ῥίζαις. Gaza, tum ibidem neruulis prætenuibus, fibrisque inter eas propagines quæ de medio callo in costarum speciem adducuntur, cortice non læui, sed quasi viti- gineo, materia dura spissaque, radicibus per summa gracilibus, fungosis, crispis, & mirum in modum flauis. Fructu floréque carere aiunt. Cachryn autem in thyrsum fastigiatam (τὴν ὃ κορυμώδη καὶ χερὴν) gemmāsque circum folia id est, quæ globum nascentium foliorum nondum explicatum ac reclusum obuoluunt, & operiunt, valde læues, pingues, candidas, cachryi similes gignit. Præcisa vel

igne

Lib. 3. Hist.
cap. 14.

igne exusta ab imis rediuiua iterum surgit. Secundam Colyteam, Idæam, Theophrasti, Berberim nostram quidam esse volunt, vt ita credant adducti præcipue fungosæ radicis gracilitate, coloréque valde flauo. Cæterum nec videtur conuenire spissæ materiæ durities, nec foliorum delineatio. Quod ad fructum & florem spectat, eum statim scrupulum eximam. Quidam potius eam plantam esse arbitrantur Sambucum montanam, non reiicienda opinione, si esset dura spissaque materia, & radicis color admodum flauus. Nam quod hanc Colyteam flore ac fructu lignatores & incolæ montis Idæ carere aiebant, non affirmat Theophrastus, & idipsum de Corno mascula Idæi prædicabant, asserentibus contra Macedonibus eam esse fructuosam, quod vbiuis esse verissimum nemo nescit. Sambuci quidem montanæ cachrys, id est foliorum primus conceptus, siue, vt Plinius loquitur, excrecentium cacuminum articulatio geniculata, flos, fructus, sunt prorsus κορυώδη, id est, in thyrsum fastigiata, quam notam in eius plantæ τῇ κἀχρῶι Theophrastus insignem proponit. Sambuci profecto vulgaris folium à qua parum montana dissidet, Capit. 13. 3. Histor. Theophrasti, simile est folio Lauri Latifoliæ, maius, latius, infernè ad sui exortum, & in medio rotundius, in extremo acutius. Eiusdem, veris initio, aut extrema hyeme, germinantis conspicuæ tanquam clauatæ cachryes, (κορυώδεις.) Materia, recens, fungosa: siccata, valida, nec senescens, etiam delibrata, & vel in aquis demersat radices per summos cespites fusæ: quæ omnia à Theophrasto prodita de hac Idæa Colytea, agnoscuntur in montana Sambuco. In Colyteæ tertix historia sub finem Capit. 14. libr. 3. literam Theophrasti sic lego: ἡ ὅ κερκίς, ὡς περ κολυτέα ἔλθοσος, ἔχει τὸ μὲν φύλλον ἐγγύθεν τῆς κίως: πολύορον καὶ πολλύφυλλον τὸ δένδρον, ὅλον μέγα. τὸν ὅ κερκὸν καθάπερ χέδροπα, ἐν λοδοῖς ἔχει πλατέσι, καὶ τὸ περιμάτιον τὸ ἐνὸν, μικρὸν, σκληρὸν ὅ μετρίως, ὀλίγα ὅ τοιαῦτα τῶν δένδρων: deletis aliis vocabulis, quæ ineptam & ridiculam stultitiæ imitationem præse ferunt, indignam oratione terribissima Philosophi tam disertis. Sonant autem hæc verba: siliquata est Cercis, vt & Colytea. Arbor tota nodosa, foliosa, magna. Fructus, vt leguminum in siliquis latis Semē exiguum paucum pro magnitudinis ratione inclusum siliquis, modicè durum. Tales verò paucae arbores: &c. qua oratione dilucidius & apertius nihil est. Si probetur hæc lectio arborem Iudæ hanc stirpem esse omnino arbitror, præsertim si turbatis his & confusis historiis, ex descriptione secundæ Coluteæ huic assignes, folium esse ἐπὶ θάτερα χλαρόν, ὅπιθεν ὅ ἐπιλευγαῖνον, καὶ πολύνον ταῖς λεπταῖς ἰσὶ, μεταξὺ τῶν πλευροειδῶς ἀπὸ μέσης κατὰ τὴν σὺν: id autem est, altera parte virere, inferiore & auersa candicare folium, tenuibus multis fibris neruosum, inter eas sitis, quæ costarum instar à media protenduntur. Folij namque huius figura tametsi à folio montanæ Sambuci aliena non sit, tamen in huius plantæ foliis euidentior ac manifestior est. Theophrastus sane cap. 18. libr. 1. historiæ, Colyteam & Cercida tamquam congenereæ affinesve plantas inter siliquatas recensuit. Colyteam istam tertiam, seu rectius Cercidem, nonnullis senam esse placet, vt Amato Lusitano, quem non iniuria Matthiolus reprehendit, quod Sena herba sit, aut humilis frutex, Colytea arbor magna, foliis Salicis, vt habent nostri codices, à quibus Senæ folia multum discrepant. Sed iustiore de causa miratur Constantinus, cuius auctoritate contendat Amatus Lusit. Coluteam arborem Theophrasti, Latinorum esse alburnum: cum sciamus Plinium alburnum vocasse partem illam in arboribus, quam adipis loco natura tribuit. Ipsius hæc verba sunt. Atqui in toto corpore arborum, vt reliquorum animalium cutis, sanguis, caro, nerui, venæ, ossa, medulla. Pro cute cortex: proximi plerisque adipēs: ij vocantur à colore alburnum, mollis ac pessima pars ligni, etiam in Robore putrescēs, teredini obnoxia, quare semper

In Amat.
Enar. 83. li.
3. Dioscor.
Li. 16. ca. 38.

ampu

amputabitur. Et alio in loco Robur exalburnatum vocauit, cui alburnum detractum. Coluteam primam Theophrasti quo Liparę peculiarem multis locis sponte natam vidimus, inquit Matthiolus, præsertim in Tridentino agro apud Ananios. Iam nouit & Gallia, vt dictum est. Maio mense floret, semen Augusto maturum est. Folia seminâque temperatè calida & humida sunt, auctore Dodoneo. Fuchsius scripsit Sennam & Coluteam facultate inter se minime differre, non sine errore, inquit Matthiolus, quod certò sciam Coluteę non minus quàm Genistę semen vomitiones ciere.

Li. 16. c. 40.
Locus.
Lib. 3. Diosc.
cap. 70.
Tempus.
Temper.
& *Vires.*
Lib. 6. c. 61.
In histo. pl.
cap. 168.
Ibidem.

COLVTEA SCORPIOIDES. CAP. L.

COLVTEA secundum hoc genus videtur, Scorpioides à scorpionis caudę figura nominatum. Frutex est ex radice crassa, brachiata in caules multos assurgens, lentos & flexiles, angulosos, ruuido cortice vestitos, ex viridi rufescente: ramis multis, quotannis ex stipitum duriorum veluti nodis prodeuntibus, virgatis, angulosis, ex quibus virgulta nascuntur, septenis plerumque foliis pinnata, Lenti similibus, senis, ex ad-

Nomen
Forma.

COLVTEA

Scorpioides.



uerso collocatis, septeno in vertice, foliorum Trifolij, situm, & figuram, cum binis proximis plane referente: flore Pisi, copioso, luteo. Siliquas fert ferè semper geminas, longas, tenues, longo tenuique pediculo hærentes, rotundas, tanquam articulis sine nodis discretas, hîc graciles, qua semen includunt, crassiores, caudæ scorpionis, aut Scorpioidis à Matthiolo descripti effigie. Semen fere rotundum est, fœnogræco utcumque simile, sed oblongius, angulosum, nigrum, sapore fœnigræci. Nascitur in asperis locis, & saxosis, sæpe ex rupium fissuris. Eadem vires huic plantæ tribuuntur, quæ & Coluteæ.

Locus.

SENNA, CAP. LI.

SENNA Hermolao, Serapioni Sene, Officinis & Gallis Sene, Italis Senna, Hispanis Sene d' Alexandria, Arabis Sene, Germanis Senet, dicitur. Hanc quidam Dioscoridis Delphinium, alij Pelecynum, alij peplium, alij Empetron, alij Alypon, alij Theophrasti cercidem, siue Coluteam, tertiam, alij Coly-

Nomina

team primam esse putant, quæ falsò credi videbit, qui eam cum horum picturis & facie conferet. Res autem noua potius videtur, veteribus Græcis, & Latinis scriptoribus indicta. Constat Senna foliis Glycyrrhizę, crassis, subpinguibus, fabarum sapore, caule cubitali, à quo ramuli exeunt, lori modo flexiles. Flores aurei, velut Brassicę, purpureis intercurfantibus venulis. Post hos nascuntur folliculi falcati, adeoque natura compressi, vt superior membrana inferiori hereat: in quibus semen includitur ex nigro subuirescens, vinaceis adeo simile, vt non facilè primo aspectu alterum ab altero secernatur. Folliculi ex ramusculis tenui pediculo pendent. Quamobrem maturescentes paruo ventorum flatu decutiuntur. Planta est frigoris impatiens: quare serenda Maio, nec ultra Autumnum perdurat. Prius sata frigore facilè perit: seriùs verò hyemem nõ to-

Forma.
Matth. l. 3.
Diosc. c. 70

S E N N A.

Capit. 8.

Lib. 2. sim.
purga.

Locus.

Ibidem.

Tempus.

Ibidem.

tempera.

Vires.

Lib. 3. c. 43.
Li. 5. meth.
cap. 8.

Lib. 15. coll.

lerat. Huius meminit Serapio his verbis. Senna asseruatur sicca. Siliquas lunatas & oblongas profert, in quibus semina in ordinem digesta clauduntur. Siliquæ tenui pediculo pendent: ob id facile ventorum impetu deturbantur. Caducas opiliones colligunt. Senna, inquit Mesues, est folliculus plātæ dictæ Persis Abalzemer, Orobi modo nascentis. Satiua est, & agrestis. In Syria & Ægypto nascitur, vnde Alexandrina dicta. Nunc in Hetruria passim feritur, inquit Matthiolus, præsertim in Florentino agro, in Apulia, Liguria, & Prouincia Gallia. Ægyptia siue Alexandrina, & Syriaca præstantissima est. Vere feritur, media æstate flores & siliquas profert. Folliculus sennæ auctore Mesue, calfacit initio secundi ordinis, siccatur primo. Folia etiam primo calfaciunt. Dodonæo folia calfaciunt secundo ordine, siccant primo. Actuarius solus ex Græcis qui extant Sennæ meminit, & eam citra noxam purgare ait, pituitamque ac bilem educere, id quod experientia comprobatur, quamuis ne-

get Auerrois Sennam purgare posse pituitam. Contra eius sententiam Manardus purgare pituitam, & in morbo Hispanico valere se expertum tradit. Aquas etiam purgare sæpe visa est Siluio. Mesuæ Senna terget, expurgat, digerit, purgat clementer melancholiam, & bilem vltam à cerebro, sensuum organis, pulmone, corde, hepate, liene. Proinde morbis harum partium ab humore huiusmodi proficiscentibus succurrit, vt melancholicis febribus, & antiquis. Gaudium gignit sublato humore siue causa interna quæ tristitiam affert, & floridum corpus efficit, obstructions viscerum aperit. Foliorum huius & Chamæmeli decoctum lotionem cerebrum, & nervos roborat. Eadem quouis modo vsurpata visum & auditum firmat. Eius purgationem tardam & imbecillam celerat, & intendunt mixta acria, vt Zingiber, Sal Possilis, Sal Indus: ne verò stomachum lædat, cardiaca, vel stomachica sunt miscenda. Ob id Galeni decreto coquenda largo pondere ex iure galli, gallinæ, vel aliarum carnium, vt citra molestiam purget, vel fero lactis infusa cum Spica, deinde parum diu feruefacta, vel pulvis eius ex lacte dulci sumendus est. Vino musteo albo miscebat quidam vim magnam Sennæ, post tres menses potandum vinum dabat, sicque purgabat cerebrum, sensuum organa, & gaudium augebat. Sunt qui decocto eius cum prunis & Spica foeliciter purgant. Mediocre autem coctionem sustinet. Infunditur ab aureis tribus ad vnciam vnam. Hæc Mesues, qui in Sennæ præparatione declaranda male Galenum citat, cum illi Senna prorsus ignota fuerit. Senna, inquit Serapio mirificè prodest delirio, amentia, scissuris totius corporis, resolutioni nervorum, phthiriasi, cephalalgia, scabiei, pustulis, pruritu, & epilepsia. Cor etiam roborat, potissimum si iis misceatur quæ ipsum maximè confirmant vt Viola. Is tritæ drach. vnam quod parum esse videtur, coctæ drach. quinque dat, vnciam ex aqua cocta mediocriter purgare affirmat Manardus. Mesues Sennam folliculo quàm foliis esse efficaciorē tradit, præsertim si is ex viridi nigricat, & modicè amarus est. Substringit absolutus, & recens, nam vetustate exanimatur, in quo semen amplum, & compressum: subalbidus & imperfectus improba

Senna an
foliis, an
folliculis
magis pur-
get.

improbatur. Folia viridia præstantiora sunt subalbidis & tenuibus: surculi verò inutiles. Actuarius de Sennæ tantum fructu purgandi vi prædito loqui videtur. Contra folia valentius purgare folliculis affirmat Manardus, ei subscribente longa medicorum experientia, & si Brasauolus dissentiat, Mesuénque tueri velit. Ad quam controuersiam dirimendam cum certam longamque experientiā Matthiolus adhibuisset, sic decreuit. Sennæ folliculos duūm esse generū. Vnum in planta arefactum, & per se caducum, à quo semen eximunt nigrum, prorsus euanidum. Alterum ante perfectam maturitatem decerptum, succo prægnans, crassum, ponderosum, quod tegetibus expansum in umbra siccatur, raroque venditur: huic non minor quàm foliis purgandi vis inest: illi quo omnes officinæ abundant, non modo minor, sed prope nulla. Mesuen autem de secundo folliculorum genere loqui aperte declarant ipsius verba quæ supra citauimus, non de caducis illis, & euanidis folliculis, quibus tantum vtuntur ij qui ipsi reclamant. Præterea scribenti Mesuæ Sennam obesse ventriculo, ob id cardiaca, & stomachica admiscenda, iisque qui torminosum esse medicamentum conqueruntur, non assentiuntur Manardus, & Matthiolus. Cum enim Senna submara sit, adstrictionis & siccitatis particeps, roborare potius ventriculum, quàm perturbare, & debilitare iudicandum. Quod si quibusdam, præsertim mulieribus, accadat vt epoto Sennæ diluto torminibus vexentur, id non medicamento, sed variæ sumentium naturæ, & pituitosis, crassis, viscidisque humoribus adscribendum, qui cum à medicamento impelluntur, intestina distendunt, & ex solutione continui dolores pariunt: at vix quempiam inuenias, qui sumpta Senna ventriculi dolore se vexari queratur: vt rectè Actuarius Sennam citra noxam purgare scripserit. Recte tamen Mesues scripsit Sennam stomachicis & cardiacis esse corrigendam. Nam si siccitate & adstrictione ventriculum iuuaret, sic brassicæ marinæ, Thymelææ & chamælææ siccitas stomachum iuuaret, quem tamen lædunt viroso illo odore, & purgatrice qualitate, à qua non longe absunt folia Sennæ, vt dum virent adhuc, aut macerantur, odoramur. Sennæ dilutum, quod nulla ex parte exhalet, decocto præstat, cuius vnciæ quinque vel sex aluum sine molestia soluunt, tutoque dari potest id medicamentū prægnantibus, pueris, & cuiusvis ætatis hominibus. Redditur in deicienda aluo præstantius atque valentius, si Cassia cathartica aut Manna, aut Rhabarbarum, aut Rhodopharmacum, quod officinæ syrupum Rosatum solutiuum vocant commisceatur, aut caprino fero Senna maceretur. Ex Senna etiam adhuc virente & Rosarum diluto paratur syrupus tuto & abunde omnes purgans humores. Præstantissimum quoque dilutum hoc modo conficitur. Selectissimæ Sennæ drachmæ sex, Zingiberis, aut Cinnamomi triti drachma vna, florum Buglossi drachmæ duæ, miscentur simul, & fictili vitro circumlito, aut stanneo vase oris angusti excipiuntur, & affusis feruentis aquæ, aut feri caprini vnciis decem, vas ita obturatur, vt nullus omnino vapor pateat exitus. Id puluinari plumis anserinis facto, ignique calfacto inuoluitur, & totam noctem in arca reponitur. Sic enim conseruato calore dilutum omnem Sennæ virtutem in sese recipit. Miratur Ruellius Sennæ esu oues pinguescere & sagina quadam exhilarari, quod ante hac diximus Theophrastum de Liparæa Colutea prodidisse homines macrescere, & inaniri.

Ibidem.

Li. 3 Diosc. cap. 70.

Lib. I. c. 70.

Gesne. in
Gor. ger.
Nomina



ENVSTA hæc arbor Monspeliensibus arbor Iudæ dicitur, Gallis *Gainier*, à siliquarum cum vaginis, quas *Gaines*, vocant, similitudine, quibusdam hodie *Ceratonia sylvestris*, *Carrobaria*, Italis quam id nomen, *Ceratonie* aptius tribuunt. Folio est prorsus rotundo, Alari aut Cyclamini, neruoso, & venoso, crasso, nitido: flore copioso ex stipitis capitato globosoque vertice, non ex ramis surculisque prodeunte, cō-

Forma.

ARBOR IVDÆ.



Cap. 14. lib.
3. histor.

In Hort.
Germ.
In Sil. c. 36.
Cap. 49.

Li. 1. ca. 79.

Lib. 1. Hist.
cap. 8.

Lib. 3. Hist.
cap. 14.

fertim pullulantibus aut nondum exortis foliis, purpureo, punicante, hilari, Cicerculæ aut Pisi. Siliquæ per Augustum maturantur: semen Lentis effigie compressum, Genistæve. Ipsæ siliquæ foris xerampelino aut spadiceo fulgore micant compressæ, digito latiores, & longiores, quadantenus Sennæ, sed rectæ, nascitur prope riuos aut latiorum agrorum margines, interdum & in collibus Veronæ, amœnis, & Narbonæ, Hetruriæ etiam non procul Senis & prope Tinum oppidulum, Turnoni ex aduerso situm, in altera ripa Rhodani, videtur quibusdam esse vel Laburnum, vel eius species. Sunt qui sentiant Theophrasti *Colyteam* tertiam esse. Sed quamuis siliquata hæc sit arbor, à Laburno tamen *colytea*que plurimum differre. Gesnerus censet, quoniam Laburnum, autore Plinio, Alpina est arbor, flore cubitali, quæ huic minimè conueniunt: *Colytea* verò siliquata, Theophrasto, folio est salicis vel *Coluteæ*, vt in publicis codicibus legitur, siliqua lata, vt Sen-

na, non angusta. Sed de hac tota quæstione dum *coluteorum* historiam excute remus, paulo ante iudicium nostrum exposuimus. Esse porro eo non potest, de qua Ruellius scripsit his verbis. Ostenditur apud nos in cortibus, arbor, *Sycomori*, vt aiunt, nomine, frondosa, Moro non dissimilis conspectu, folio, magnitudine. Sed neque germinibus, neque ramis quicquam prouenireprehendimus, nisi quippiam ineunte vere cum parturit, veluti nucamentum prælongum: fructum foliacea siliqua, inflexu fere falcato gerit. Sed sculptu vulnerata nihil remittit lactis, cum vera *sycomorus* æstate multo humore lacteo scateat. Hæc Ruellius, At hæc arbor florem non nucamentum vere parit, nec foliaceas & falcatas siliquas fert, sed rectas, & leguminum siliquis similes, vt pictura ostendit. Sed hic intelligat Lector arborem quam Ruellius *sycomori* nomine describit, *Acer album* esse, Gallorum *Plane*, ante hac descriptum, & depictum, illumque falli, cum Moro foliis similem esse scribit. Sunt quibus *Cercis* siliquata Theophrasti videatur esse. Quædam etiam arbores, inquit, semen in siliquis inclusum habent, vt *Cerania* quam *Ægyptiam* ficum vocant, *Cercis*, & *Colutea Liparæ*. Alio tamen loco *cercida*, quam Alpinam *Populum Gaza* interpretatur, particulatim describens siliquarum non meminit. *Cercis* populo albæ similis, tum magnitudine, tum ramorum candore, folio *Hederæ*, sed parte altera non anguloso, altera oblongo, in acutum coacto, colore parte supina pronæque fere simili, pediculo longo, tenuique adnexo,

adnexo, ob id non recto, sed inclinato: cortice asperiore quàm Populus alba, scabrioreque velut Pirus sylvestris. Hæc Cercis populus est Lybica, à Matthiolo depicta libr. 1. Dioscorid. cap. 93. de qua fuse suo loco tractauimus. Hic Lector, meminerit Matthiolū secunda commentariorum in Dioscoridem editione, arborem hanc pro vera Acacia depinxisse atque descripsisse. Acaciæ imaginem, inquit, detulit ad me Constantinopoli Augerius de busbech, Cæsaris ad Turcarum Imperatorem Orator, quæ omnibus suis partibus, notisque veram, legitimamque Acaciam imitatur. Nam plantæ integræ imago caudicem habet non in rectum, sed in obliquum se attolentem, nigro omnino libro, ramos surculosque vbique spinis rigentes. Foliis est rotundis, Piri magnitudine, venosis, parte prona fuliginosis, supina ex viridi subalbicantibus, minimè serratis, subnigricante pediculo: floribus ex albo purpurascentibus: siliquis & semine Lupino similibus. Hæc Matthiolus. Cuius pictura vna duntaxat re ab hac nostra differt, quod hæc spinis careat, illa spinis horrida sit, quas commentitias esse suspicantur multi.

Lib. 1. c. 115.

XYLON,

CAP. LIII.

VT Græcè ξύλον & γοσσίπιον hæc planta, ita Latine Xylon & Gossipiū nominatur, Officinis Bombax; Gallis Cotton, Germanis Baummol, Italis Bambagia, & Cotone, Hispanis, Algodon: frutex est humilis, foliis latis, altius incisus, Viti aut Alceæ quadantenus similibus, sed minoribus: incanis floribus luteis, in medio nonnihil purpureis, per oras crenatis: fructu Nucibus Ponticis compressis & latis ferè simili, aut Malis exiguis, pullo colore candidissimo vellere pleno, quo semen occultitur, Terebinthi aut Cubebæ, oblongum, copiosum, medulla plenum, alba, oleaginosa, non in-

Nomina

Forma.

GOSSIPIVM

sive Xylon Matth.



suauis gustu, Pinæ aut Amygdalarum, præsertim dum recens est. Superior pars Ægypti in Arabiam vergens inquit Plinius, gignit fruticem, quem aliqui Gossipion vocant, plures Xylon, & ideo lina inde facta Xylina. Paruulus est, similèmq; barbata Nuci fert fructum, cuius ex interiore bombyce lanugo netur. Nec vlla sunt ei in candore, mollitiæ præferenda. Vestes inde sacerdotibus Ægypti gratissimæ. Id Gossipium priscis rarum, & ferme ignotum, adeo frequens est nostro æuo, vt ex tractibus & insulis Arabicis non opus sit petere. Multis enim Mediterraneis in litoribus alitur, & venum inde aduehitur. Plantam istam veteribus Græcis incognitam fuisse multi arbitrantur. Sed illi errant. Est enim ad lanigeras Theophr. vites planè referenda. In Tylo insula quæ in sinu Arabico est, inquit Theophrastus, parte adoriète spectante tanta est arborum multitudo, vbi æstus recesserit, vt Locus incultus deferatur: earum autem multæ lanigeræ. Folia vitis habent, verum minora, fructum nullum (fortasse vescum intelligit) quo lana continetur, Mali magnitudine, vere nascitur, occlusum: at tem-

Lib. 19. ca. 1.

Li. 4. Hist. cap. 9.

Locus.

Temper.

Vires

Matt. lib. d.

pestiua maturitate aperitur, lanâque eximitur, ex qua telas texunt, alias viles, alias pretiosas. Hoc idem in India, & in Arabia fit. Xylon non solum sponte in Ægypto & India, sed etiam hodie in Cypro, Cræta, Melita, Sicilia insulis satum copiosissimum prouenit, atque etiam in Apulia aliisque regionibus. Huius lanugo sine dubio excalfacit, & siccat, & combusta mirum in modum sanguinem ex vulneribus manantem sistit. Semen auctore Serapione calidum est, & humidum. Eius medulla tussi, & difficile spirantibus auxiliatur, genitale semen procreat, quare Venerem stimulat. Oleum ex ea exprimitur, quo tum lentigines in facie, tum aliæ etiam corporis maculæ optimè delentur.

CISTVS,

CAP. LIIII.

Nomina

Genera.

Forma

Matt. lib. i.

Dioscorid.

cap. 109.

CISTVS MAS

Matthioli.

Li. i. c. 109.

Li. 24. c. 10.

Lib. 16. c. 34



CISTVS & κισθος, κισθαρον & κισθαρον Græcis, Latinis similiter Cistus, & Cisthus dicitur. Arabibus *Ramet*, Hispanis, *Cerguacos*, & Italis, *Cisto*, fortasse quod κισθον idest, hederæ foliis, sit rotundis. Duo eius genera. Cistus non Ladanifer, & Cistus Ladanifer. Illius duo etiam genera: mas, & fœmina. Quibus marinum addidimus. Cistus non Ladanifer, frutex est stipitibus rotundis, hirsutis, geniculatis, ramosis: foliis mas rotundis, crispis, hirsutis, albicantibus, acerbis: fœmina oblongis, Saluiaz æmulis. quam ob causam rustici Patauini hanc Saluiam agrestem vocant. Flos emicat in summis stipitibus, vt Mali Punicæ, vel vt Rosæ syluestris, in mare rubescens, in fœmina albus, deinde in triquetro & tricocco, fructus inuolucro pusillū semen Hyposcyami, quale & reliquis Cistis. Cistus inquit Dioscorides, ramosus frutex est, non altus, foliosus, saxosis locis nascens: foliis rotundis, acerbis, hirsutis: flos masculo ὡσπερ ροῖας, idest, vt Mali punicæ, alias ὡσπερ ρόδω, idest, vt Rosæ: fœminæ albet. Græci, ait Plinius, vicino Hederæ vocabulo, Cisthon appellant fruticem maiorem Thymo, foliis Ocimi. Duo eius genera, flos masculo rosacens, fœminæ albus. Quæ de Dioscoridis Cisto à Plinio dicta esse dubiū non est, & si non omnia prorsus similia sint. Id verò cuius recte nos admonet, hederæ nomen Cisson, Cisto vicinum esse, si memoria retinisset, Hederam idest Cisson, penitus cum Cisto nominum vicinitate deceptus non confudisset, cū scribit. Duo genera eius (loquitur de Hederæ) prima vt reliquorum mas, & fœmina Maior traditur mas corpore, & folio duriore etiā & pinguiore, & flore adpurpurā accedente. Vtriusque autem flos similis est Rosæ syluestri, nisi quod caret odore. Quæ Cisti

propria ad Hederam à Plinio translata esse, eūque plantas has natura diuersas cōfudisse, iam dudū à Leoniceno demonstratū est, quamuis frigidi, argumentis Plinium defenderit Collinutius. Leoniceno assentiuntur Marcel. Matthiolus, Cordus, Ruellius Verū Pliniani erroris originem manasse credimus ex Theophrasti

phraſti in emendata lectione. Καὶ ὁ κίττου δύο γένη διαίρει, τὸ μὲν ἄρρεν τὸ δὲ θῆλυ. Lib. 6. Hiſt. τῷ τὸ μὲν μείζον ἔσκληρότερον, καὶ λιπαρότερον ἔχει τὸ φύλλον, ἔτὸ ἄνθος ἐπιπορφυρίζον. cap. 2.


CISTVS MAS FOLIO

rotundiore Matthioli.



CISTVS FOEMINA

Matthioli.



CISTVS CVM

Hypocistide Matth.



ἄμφω δὲ ὅμοια ῥοδοῖς τοῖς ἀγρίοις. Quæ verba cum apertè Plinius verterit, exēplaria verò Theophrast. etiam hodie κίττου pro κίττω habeant, ita vt Theodorus quoque Hederam pro Cisto reddiderit, verisimile est etiam Plinium falsa lectione deceptum, Hederam pro Cisto legisse, ac expressisse. Nam & alioqui in breui hoc loco vox φύλλον post ἔχειν, & vox ῥοδοῖς ante voces τοῖς ἀγρίοις in impressis Theophr. Codicibus desiderantur. Κίττω autem pro κίττω legi ex ipso Theophrasto facilè confirmatur, qui alio loco Hederam multiplicem esse tradit, alteram humi nascentem, alteram in altum sese attollentem. Huius tria esse summa genera, cādidam, nigram, & Helicem. Parum igitur sibi constitisset Theophrastus, qui tot Hederæ genera prodidisset, & aliquanto post duotantum, solo sexu discreta retulisset. Hypocistis iuxta vtriusq; Cisti, etiā Ladani radices nascitur, floris Mali punici figura, vel potius Orobāches. Dioscor. Hypocistis Orobothron, aut Cytinus à nonnullis cognominata, iuxta Cisti radices nascitur, floris Mali Punicæ similitudine. Quædā rufa, altera

Cor. Emb.
105. lib. 1.
Dioscor.

Hypocistis

herbacea, tertia candida. Liquatur Acaciæ modo. Aliqui tamen exsiccant, frætamque macerant, & incoquunt, reliquæque, vt in Lycio, prosequuntur. Sub Cistis maximè nascitur Hypocistis, inquit Plinius, ac rursum: Hypocistis Orobethron quibusdam dicta, Malo granato immaturo similis. Nascitur, vt diximus sub Cisto, vnde nomen. Hæc arefacta in vmbra sistit aluum ex vino austero, nigroque, vtraque: duo enim genera eius, candida, & rufa. Eadem duo genera tantum posuit Oribasius, prætermisso eo quod *χλωρόν*, id est, herbaceum Dioscorides habet. Fuschius Pastillos ex Succino examinans, Hypocistida fungum esse falsò prodidit. Hypocistis enim, vt scribit Matthiolus, fungus non est, sed veluti germen è Cisti radicibus pullulans, effigie ferè Punicorum Cytinos referens, vt sciunt ij qui Cistum sæpe viderunt, & in eius radicibus Hypocistida, quam colligere ex eaque succum elicere seplasiarios oporteret. Hypocistis enim qua passim omnes vtuntur, adulterina est, ex Barbæ hirci radicibus succo ab impostoribus expresso, atque insolato, cui imposturæ causam dederunt Arabes, quod Cistum Hirci Barbulam appellent. Cistum enim eam esse stirpem rati, quam Græci *τραίγοπώγωνα*, id est, Hirci barbam dicunt, ex eius radicibus adulterinam, vt diximus, Hypocistida conficiunt.

Locus. Cistus in Cyprio, Creta, Sicilia, Italia, vt in Hetruria, præsertim in Apennino monte, Gallia Narbonensi, locis incultis, asperis, & saxosis prouenit. Cisti flores & folia ordine secundo desiccant, & modicè adstringunt. Hypocistis eodem prædita est temperamento, sed magis adstringit. Cisto, inquit Dioscor. vis adstringens inest: vnde flores in vino austero bis in die poti profunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent: vetustati vlcerum, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis vires Acaciæ habet, verum aliquanto magis siccant, & adstringit. Proinde dysentericis, celiacis, sanguinem excreantibus, foeminarum profluuiis & pota, & indita prodest. Cistus frutex Galeno, est gustu adstringens, omnibusque particulatim operibus. Attamen folia, & parua germinata adeo desiccant, adstringuntque, vt vlcera glutinare possint. At flores magis sunt efficaces: itaque cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates fluxusque ac humiditates sanant: cataplasmatibus modo illita vlcerum putredinosa iuuant. Est enim facultas eorum non instrenuè desiccans, ferèque secundi excessus absoluti. Sic verò frutex hic frigidus est, vt tepidi caloris sit particeps. Porro Hypocistis multo magis adstringit quàm folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta, sanguinis reiectiones, muliebria profluuia, celiacos, dysentericosque. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ scilicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac siccitatem illi non segniter addit. Sic sanè stomachicis epithematis, hepaticisque commiscetur, & ex viperis confecto antidoto inditur, nimirum quia corpora confirmet ac roborat. Ambo (Cisti genera) dysenterias prodesse tradit Plinius, & solutionibus ventris, in vino austero ternis digitis carpto flore, & similiter bis die poto: vlceribus veteribus & ambustis cum cera, & per se oris vlceribus. His subiungimus longe plures Cisti species à Clusio obseruatas & traditas, ac primùm Cisti maris quinque, inter se foliorum forma, aut colore differentes. Primus Cistus, cuius hic Iconem cum sua Hypocistide vides, hominis altitudine, plerumque fruticat, ligno satis fragili, cortice candicante tecto, frequentibus ramis alternatim semper ex aduerso respondentibus, eandem etiam seriem seruantibus foliis, quæ omnino sunt incana, molliora & longiora in nouellis plantis in adultis verò contractiora, duriora, & aspera, foliorum Saluæ modo, mucronata, gustu adstringente: Flos eius Cynorhodi, aut Rosæ syluestris magnitudine, quinque foliis constans, colore rubro dilutiore, multis staminibus croceis medium florem,

Li. 24. c. 10.
Lib. 26. c. 8.

Hypocisti.
Vires.
Lib. 11.

Lib. 2. com.
med.

Lib. 1. Diosc.
cap. 109.

Matth. ibi.

Tempera.
& Vires.
Dodo. li. 6.
cap. 3.

Li. 7. simpl.

Li. 24. c. 10.

CISTVS MAS

I. Clusij.



disposita, molliora, longiora, angustiora, & magis acuminata: Flos superiori similis, ex albo purpurascens: capitulis & semine parum differt. Nascitur etiam

CISTVS MAS

II. Clusij.



mum, pedalibus ramis aut paulo amplioribus, multis ex eadem radice prodeuntibus: folia crispa, & quodammodo sinuosa, candicantia, hirsuta, gustu acerbo,

florem, vt in Rosa simplici occupantibus. Flori succedunt capitula quædam pentagona, dura, hirsuta & incana, mucronata, in quibus est semen exiguum, ex rufo nigricans, seminis Hyascyami, aut Papaueris magnitudine. Ad huius Cisti radices quæ summis cespitibus vagantur copiosè nascitur elegantissima omnium Hypocistis primo vere, cū Cistus iam ad florendum se præparat: cum primum è terra emergit, purpureum, siue Kermesinum sericum esse diceret: deinde paulatim assurgens, & sese explicans, multum de pristini coloris elegancia remittit, cum Cytinos suos profert, candicantes, turgidosq; & lento succo plenos, qui à Peritis Pharmacopœis in Hypocistidis succū densatur. Frequens est hic Cistus cum in Hispania præsertim Bætica, tum in Lusitania, & Gallia Narbonensi. Secundus hic quoque depictus eadem altitudine qua superior assurgit, interdum etiam maiore, non minus fruticoso stipite, neque minore ramorum frequentia, minùs tamen candicat: folia eodem ordine

hic in Hispania, & diutius reliquis maris generibus floret: illius etiam ramuli teneriores sub Autumnum, rarulentum quiddam pingue & odorum contrahunt. Tertius superioribus breuior est, non minus fruticosus, sed tenuioribus ramis, folia superiore breuiora, & dilutioris viroris, rugosiora, pinguiora, odoratiora, flos aliis similis, dilute rubens, & aliquantulum odoratus: capitula superioribus paulo minora, & suis inuolucris (quæ florum calyces sunt) diutius occultantur: semen in capitulis ceteris æquale. In Lusitania sponte nascitur supra Vlyssiponem. Quartus hominis altitudine plerumque attollitur, vt reliqui fruticosus, ramulis aliquantum in canis, folia reliquis maiora, & quasi orbiculata, hirsuta nonnihil & rugosa: flores reliquis forma similes, paulo maiores, & colore saturatius rubente: capitula hirsuta, dura, pentagona, superioribus maiora, in quibus semen rufum maius, quàm aliorum continetur. Reperitur in regno Valentino, atque Arragonia. Quintus humilis est, & supinus vt pluri-

CISTVS MAS

V. Clusij.




CISTVS FOEMINA

Clusij.



acerbo, & adstringente: flores ramulorum summitatibus æquali altitudine & quasi umbellatim nascuntur, superioribus paulo minores, sed eleganti & purpureo colore: capitula reliquis minora, suis inuolucris plerumque contexta semen continent reliquis simile, sed atrius. Hunc in Lusitania tantum nascentem vidit Clusius, qui Cistum foeminam etiam in suas species distribuit. Nam aut elatior est, & rectis virgis fruticans sicuti mas, aut supina, & humi se diffundens. Vtriusque generis color in flore variat: nam vel candidus est magna ex parte, vel luteus, seu Ochrae colore. Est igitur Cistus foemina frutex ramosus, cubitum interdum altus, nonnunquam humi stratus, gracilibus ramis, nigricantibus, folio non minore quam in maris quarto genere, ferè rotundo, rudi & aspero, viridi, sapore, ut maris adstringente, & acerbo: flos paulo minor quam in mare, quinti generis flori ferè similis, albus nonnunquam, interdum luteus, fibris luteis, ut in Rosa sylvestri, medium florè obtinentibus: capitula minora & nigriora sunt quam in mare, non acuminata, sed compressa nonnihil superiore parte, semen paulo nigrius & satis magnum continentia. Eius qui albo est floretum recti tum supini magna est copia in Hispaniis, Lusitania, Gallia Narbonensi & Aquitania. Qui verò luteum profert, nonnullis duntaxat Hispaniae locis, & extrema Aquitania, Cantabris finitima, circa Baionam visitur. Aliquot alia Cisti genera per Hispanias & Lusitaniam Clusius se observasse ait, quæ ad foeminam potius referenda esse putat, quam ad marem, aut Ledon, quoniam nullo pingui lentore sint prædita, neque florem Roseum, siue purpureum habeant, nisi fortè quis eam speciem quæ Thymi foliis est, inter Ledi genera recenseat. Horum primus Cistus est Halimi folio: Is cubitales, aut ampliores profert ramos, graciles, satis fruticosos, in quibus folia Portulacæ marinæ similia, sed omnino incana ut Halimi, mucrone obtusiore, sub acido & adstringente gustu. Summi rami multos proferunt flores, quinque foliis constantes, colore luteo, cum suis in medio fibris, minores quàm in superioribus. Semen in capitulis longiuscu




longiusculis, & triangulis exiguum, & subrutum. Ad huius radices Hypocistis nascitur, lutea omnino, siue Ochrae colore, quæ plantæ ipsius florem colore æmulatur. Cistus alter folio Halimi procerior est priore, ramis firmioribus, incanis vt priori folia superiore paulo longiora, angustiora & magis mucronata,

CISTVS LAVAN-
 dula Clusij.



dorso elatiore, incana tamen tota, & sicca, gustu etiam subacido, & adstringente. Vterque frequens est in Lusitaniae solo arenoso, & aura marina afflato, inter Ericas, non procul Vlyssipone, nusquam alibi à Clusio visus. Cistus folio Lauandulae plerumque cubitali est altitudine, admodum ramosus, sed breuib. ramis, foliis confertim nascentibus, angustis, incanis, sapore adstringenti: Floribus parvis non multum à superiore differentibus, albis. Est hic frutex Lauandulae adeò similis, vt nisi sapor & odor prohiberent pro Lauandula sumi posset. Flores etiam perspicuè distingunt. Hunc solummodo in regno Valentino vidit, aridis & petrosis locis, quarto à Valentia miliari, Aprilis initio. Cistus folio Sampsuchi planta fruticosa est, multos tenues ramulos proferens: Folia in his parua, pene rotunda, incana, Sampsucho similia, minora paulo, & dorso eminente, cum quadam aciditate & salsedine adstringentia: Flos in summis ramis candidus, copiosus, villis & staminibus luteis, vt in reliquis Cisti generibus extantibus in medio flore, quinis foliis constante



constante, quorum medium macula ex purpura nigricans occupat: capitula exigua Lini fere, trigona, in quibus semen minutum Hyoscyami, ex nigro candicans, siue cinereum continetur: totus ille oblongus ramulus, qui flo-

CISTVS ANNVS

1. Clusij.

rem & fructum sustinuit, arescit eo maturo, vt in singulis Cisti generibus. Primus hic repertus est in Castella veteri, deinde copiosum in Castella noua, & toto Bætico agro, inter Tagum & Anam flumina. Cistus folio Thymi pedali fruticat altitudine, ramulis ex purpura nigricantibus, duris, lignosis, qui magna ex parte sine foliis conspiciuntur, præterquam circa summities, in quibus confertim nascuntur, exilia admodum, viridia, Thymi æmula, gustu adstringente: Florem summis ramis superiori similem, minorem, nullis maculis notatum fert. Visus hic est in extrema Bætica parte, qua Castellam & Lusitaniam spectat. Superioribus plantas duas adiungit Clusius, quarum priorem Helianthemi albi, alteram Helianthes luteæ nomine ostendunt Herbarij. Postrema Clusio est ea quæ in vinetorum Salmanticensium marginibus & Granatensi regno gignitur, rectis, longioribus, & rarioribus virgultis, foliis amplioribus Helianthemo, & virentioribus, gustu



gustu adstringente: flore pallido, aut albicante, semine minuto, rubescente, in capitulis trigonis. Inuenitur & eodem autore, alia in sylua Madriciana, secundo ab vrbe Lutetia miliari, ad Cisti genus referenda, pedali altitudine, exilibus cauliculis, rectis, tenellis, non admodum ramosis: foliis oblongis, angustis, hirsutis, virefcentibus, quæ cum ramulis per caniculæ æstus, humore quodam pingui & lento obsita sunt: flore pusillo, quinque foliis constante, pallidi coloris, & macula punicante insignibus: capitulis tenellis admodum, triquetris semen pusillum & cinereum continentibus. Hanc Lobellius pictam monstrat. Annua est vtraque hæc: postremo descripta planta: vel altero à satù anno floret, deinde perit. Florent Cisti omnes eodem quo mas tempore, & semen etiam ad maturitatem perducunt. Omnibus perpetuum folium, sed eorum flos admodum caducus, statimque senescens: radices duræ, lignosæ, diuisæ, in diuersa tendentes.

LEDVM, CAP. LV.


ISTI Ladaniferi genus λήδον (sic fortasse dictum, quia folia eius, neque læuia, neque nitida sunt, sed scabra & pannosa: λήδος enim vestis est ex panno raro & detrito) & λείδον, similiter Ledum & Ladum appellatur, Arabicè *Chafus*. Frutex est, inquit Dioscorides, Cisti modo nascens, longioribus foliis, & nigrioribus, quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Hunc à superiore, velut diuersum Galenus non distinguit, sed de illo ita tradit. Cistus Ledō in calidis regionibus proueniens, tamen si haud alius sit genere, quam qui apud nos nascitur, eximiam tamen à regione, ac peculiarem digerentemque caliditatem nactus est, atque vtroque à nostrate differt, tum quia frigiditatem deposuit, tum quia calorem assumpsit. Pingue illud, quod ex eo colligitur λείδανον, Latinis etiam Ladanum dicitur, Officinis Lapdanum, Mauritanis Leden, & Laden dictum, Italis Ladani colligendo modi. *Lodano*, & *Odano*, Hispanis *Xara*. Huius colligendi modos duos prodidit Dioscorides. Cum Cisti frondes pascuntur capræ hirci, pinguitudinem ait ille, conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhærescentem reportant: quam depectentes incolæ, colantésque cogunt in offas, & ita reconducunt. Alij attractis funiculis, insidentem fruticibus liquorem abstergunt, conglomerantque in Ladanum. Arabia etiānum & Ladano gloriatur, inquit Plinius. Forte, casuq; & iniuria fieri hoc odoris genus plures tradidère, Capras maleficum aliàs frondibus animal, odoratorum verò fruticum appetentius tanquam intelligant pretia, carpere germina caulium prædulci liquore turgentia, distillantemque ab his, quasi cæsura succum improbo barbarum villo abstergere. Hunc glomerari puluere, incoqui sole. Et ideo in Ladano caprarum pilos esse. Sed hoc non alibi fieri quam in Nabatæis, qui sunt ex Arabia contermini Syriæ. Recentiores ex auctoribus Strobōn hoc vocant: traduntq; sylvas Arabum

Nomina
Forma.
Lib. 1. c. 110.
Li. 7. simpl.

Lib. 12. c. 17.

L E D U M

Matthioli.



Lib. 26. c. 8.

Lib. 1. Obf.
cap. 7.

pastu caprarum infringi, atque ita succum villis inhærescere: verum autem Ladanum Cypri insulæ esse: vt obiter quoque genera odorum dicantur, quamuis non terrarum ordine. Similiter hoc & ibi fieri tradunt, & esse æsypum hircorum barbis genibusque villosis inhærens, sed Cisti flore derofo, pastibus matutinis, cum est rorulenta Cypros. Deinde nebula sole discussa, puluerem mandentibus villis adhærescere, atque ita Ladanum depecti. Sunt qui herbam in Cypro, ex qua id fiat Ladam appellant: etenim illi Ladanum vocant. Huius foliis pingue insidere: itaque attractis funiculis super herbam eam conuolui, vel, vt alij legunt attractos funiculos ei herbæ aduolui, atque ita offas fieri. Idem Plinius tertium quendam modum Ladani colligendi docet. Lada appellatur herba, ex qua Ladanum fit in Cypro barbis caprarum adhærescens. Nobilius in Arabia. Fit iam & in Syria, atque Africa, quod Toxicon vocant. Neros enim in arcu circumdatos lanis trahunt, adhærescente roscida la-

nugine. Toxicon à modo colligendi Ladanum hoc dictum est: quia Toxon Græcis arcum significat. Et aliam quandam legendi Ladani rationem hodie in Creta vſitatam Bellonius declarat his verbis. Inter ea quæ memoratu digna in Creta spectantur, numeranda est Ladani conficiendi ratio, inter odoramenta nostra maximè celebris. Id ex Ledo planta non fit, vt veteres existimauerunt, sed ex arbuscula quæ Cistus nominatur (quasi verò Ledon species Cisti non sit) tam copiosa, vt ea Cretæ montes sint referti. Hæc natura sua perpetuò virens folia hiberna, florésque vernos exuit, æstate noua induit, ferè lanuginosa, ad solis calorem ex vliginoso quodam rore in superiore parte pinguitudinem quandam contrahunt, quòue maior est æstatis ardor, eo maior huiusmodi roris copia foliis insidet. Qui eum colligunt instrumento ad id comparato vtantur, quod vernacula lingua Ergastiri appellant, Id rastello non dentato simile est, loris multis ex corio non deſato aptatis, & ex eo pendentibus. His loris leniter ea foliis affricando, ros ille adhærescit, qui deinde cultello deraditur, loris iis ardentissimo soli expositis. Maior Ladani copia ad radices Idæ montis conficitur in vico qui Cigualinus vocatur, & prope Milipotamum. Hæc Bellonius. Ex suprà citatis Plinij locis alia duo licet cognoscere: nimirum Plinij ipsius errorem, & quibus in regionibus Ladanum proueniret. Quod aperto errore Cisson pro Cisto vsurpauerit, iam ostendimus. Quid verò apertius quam cum Ladanum Cyprium dicit hircorum barbis genibusque villosis in hæere Hederæ flore derofo, pastibus matutinis, rorulenta Cypro. Quin ipsemet indicat Cisson, id est, Hederam pro Cisto se dixisse, cum subiungit, esse qui herbam in Cypro ex qua Ladanum fiat, Ladam appellarent? Minimè verò ex Cisso, id est, Hedera cuiusuis generis, sed ex Cisto Ledo tantum Ladanum legi Dioscorides, Galenus, cæteri que omnes testantur. Quare Hermolao non assentior, temerè reprehendi Plinium scribenti, quod Hedera vocet herbam, ex qua Ladanum fiat, quòd Paulus Cisson hanc

In cast. Pl.
lib. 12. c. 17.
& Cor. 130.
lib. 1. Diosc.

hanc etiam vocet Hederam quandoque, & Dioscorides herbam vnde Ladanum conficitur, Cissarion à quibusdam vocari tradat, id est, Hederulam. Nam ex Cissari, siue Cissarij appellatione Ladanum alia ex planta, quàm ex Ledo fieri, nemo rectè colligat: neque id prætermisissent Dioscorides & Galenus. Quod si alicubi apud Paulum Cissos, id est, Hedera pro Cistos legatur, id scribentium errori imputandum, in quem ob nomen Cissi & Cisti afinitatem facilis est lapsus: neque is, Dioscoridem & Galenum secutus ex alia stirpe quàm ex Cisto Ledo fieri Ladanum intellexit. Idem error in Galeni Codices etiam irrepsit, quo loco versus Rufi Ephesij recitat, de Ladanò hæc scribentis.

Lib. I. c. 109.

Lib. I. m. p. cap. I.

Ἄλλο δὲ πρὸς κατὰ γαῖαν ἐρέμβων λάδανον εὐροῖς

Αἰγῶν ἀμφὶ γένει, τὸ γὰρ καταθύμιον αἰγῶν

Κίως ἀνθηέως ἐπέδμεναι ἄκρα πέτηλα.

Quæ sic vertit Cornarius:

Inuenias in Eremborum quoque Ladanon orbe

Caprarum circamentum: gratissimus illis

Succus is è Cisti folio decerptus amico.

Tertio igitur versu mendose κίως pro κίτου legitur. Nunc de locis in quibus Ladanum proueniebat, dicamus. Dioscorides in Cypro optimum nasci scripsit, in Arabia Libyâque vilius. Galenus in calidis regionibus gigni, & in Asia. Plinius. apud Nabatæos Arabas hoc fieri, atque mox verum Ladanum Cypro insulæ attribuit. Nobilius in Arabia: fieri etiam in Syria, atque Africa: Rufus apud Erembos populos prouenire. Sunt autem Erembi Æthiopix populi, qui & Troglodytæ, vtrique simili nominis etymo appellati. Siquidem ἐρέμβως ἀπὸ τῆς ὑπὸ τὴν ἔραν ἐμβαίνειν, id est, quod terram subeant, & sub terra habitent dictos volunt: sicut τρωγλοδίτας ἀπὸ τῆς καὶ τὰς τρώγλας διύεσθαι, id est, quod in cauernis condantur. Possidonius apud Strabonem ἐρέμβως, & ἀράβως

Locus.

Lib. I. c. 110.

Lib. 7. sim.

Lib. 12. c. 17.

Lib. 26. c. 8.

Lib. 16.

LEDI SPECIES

Bauhini.



eosdem esse dicit, facta leui nominum commutatione & corruptela, ἐρέμβων nimirum ἀντὶ ἀράβων λεγομένων. Hodie Ladanum in Creta fit, vt diximus. Ledum planta in Gallia Narbonensi nascitur, cuius species à Bauhino reperta hic expressa est, candicantibus foliis longis, acuminatis, cortice rubente, foliis circa florem luteum multis. Ladanum maximè probatur, inquit Dioscor. odoratum, subviride, facile mollescens, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum est, resinosum. Plinius. Probatur maximè purum odoratum, molle, viride, resinosum, cui cum dissimile sit Ladanum Officinarum, facile intellectu est, id minimè sincerum esse, sed omnino adulteratum, nullarumque virium. Natura ei spissandi, vt docet Dioscorides, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit: capillum fluentem continet, addito vino, myrrha, & Myrteo oleo: cicatricibus decorem reddit cum vino illitum: medetur aurium doloribus cum hydromelile, aut rosaceo infusum: suffitu secundas eicit:

Electio. Ibidem.

Lib. 26. c. 8.

Ibidem.

Vires.

Li. 7. simp.
Tempera.
& Vires.

peſſis immiſtum vuluæ duritiã ſanat. In medicamenta quæ aurium dolo-
rem tuſſimque finiunt, & malagmata vtiliter inferitur: aluum ſiſtit cum
vino vetere potum, & vrinã ciet. Foliorum vis adſtringens, ac eoſdem
quos Ciſtus effectus præbens. Ladanum Galeno primo exceſſu quodammo-
do completo calidum, vt videlicet & ſecundum attingat, habet etiam ad-
ſtrictionis paululum. Adhæc ſubſtantia eſt tenui, ac proinde emolliens, pa-
ritérque moderatè digerens, atque etiam concoquens. Itaque mirandum
non eſt, ſi peculiariter ad vteri vitia conueniat: quandoquidem ad dicta
paulum quidam adſtrictionis obtinet: quocirca deſtuentes capillos conti-
net. Nam quicquid ad radices eorum prauis humoris inſederit, id omne
abſumit, tum meatus quibus infixi ſunt contrahit. Cæterum alopecias &
ophthalmias ſanare non poteſt, vtpote maiores & efficacioreſ vires, quam
quæ Ladano inſunt, poſcentes. Quippe proueniunt iſtæ ex prauis ſuccis,
lentis craſſiſque, quos ſiccantia ac digerentia medicamenta potiffimum
euocant, atque euacuant. Sed tenuium partium ſint oportet, non tamen
uſque adeo tenuium partium, & deſiccatoria, vt nimio plus deſiccant, vnaq;
cum collectis ibi ſuccis præter naturam, naturalem quoque humiditatem in-
crementa pilis ſuppeditantem abſumant. Nam ſic non tantum alopecia li-
berarent, ſed & caluitiem afferrent. Natura Ladano molliendi, Plinioteſte, ſic-
candi concoquendi, ſomnum alliniendi. Capillum fluentem cohibet, nigri-
tiamq; cuſtodit. Auribus cum Hydromelite, aut roſaceo infunditur. Furfures
cutis, & manãtia vlcera ſale addito ſanat. Tuſſim veterem cū ſtyrace ſumptum.
Efficaciſſimum ad ruſtus. Ladanum Cyprium potū interaneorum vitiis occur-
rit: cicatrices cum elegantia ad colorem reducit, ſuffitu corrigit vuluas: dolori
earum exulceratiſque imponitur. Præter hæc Ciſtos ſemper virentes rarior
alia ſpecies quædam Ladanifera depicã eſt, à Pena & deſcripta, virgis,

Lib. 26. c. 7.

Lib. 26. c. 8.

Li. 26. c. 14.

CISTVS LEDON

aliud latifolium Pena.



CISTI LEDI AR-

bor peregrina Pena.



ſurculis

furculis, foliis multò crassioribus, latioribus, lōgioribus, Rhois Plinij, aut Rusci modo fruticans, semine tricocco: multa lasciuit in mōte quopiā celsissimi agri sterilis Seuena, cui nomen S. Columbæ, alioqui gustu Cisti Ledi, & odore non-nihil graui. Idem arboris peregrinæ ramulum pingendum curauit, Cisti Ledi


CISTVS LEDVM

I. Clusij.



LEDVM II.

Clusij.




folio, extremis virgultis lignosis, Cisto similibus, & eiusdē coloris, folio rugoso, oblongo, Saluix, aut Menthæ: in summis ramulis villosos prorsus sphæricos globos ostentantibus, siue lanosa capitula Platani. Hæc Pena. Clusius multò plures Cisti Ledi species descripsit. Primum Ledon, inquit, fruticat ad hominis altitudinem, quam etiam interdum superat, ramis frequentibus, lignosis, duris, nigris. Folia, vti rami, ex aduerso sita, oblonga, transuersum digitum quandoque lata, nonnunquam etiam latiora, superne nigra, inferne candicantia, quæ cum tenellis ramulis pingui quodam, odorato, calidoq; & pelucido liquore adeò copioso aspersa sunt, vt procul etiam conspici possit, & octaua miliaris parte odor naribus percipi. Flore est inter reliqua Cisti genera pulchertimo & latissimo, magnæ Rosæ amplitudine, simplici quoque foliorum textura, omnino interdum candido, sed cuius maxima ex parte folia singula, circa vnguem purpurea nigricantēue macula, rhomboide, nunc maiore & latiore, nunc minore & angustiore insignita sunt: floris vmbilicus multis fibris croceis plenus, vti reliquorum Cisti generum: capitula in longis pediculis, foliorum delapsum omnium maxima visuntur rotunda ferè, & plana, non mucronata, sæpenumero decagona, dura, intus flauescencia, quibus dehiscentibus semen decidit copiosum, subrufum, omnium minutissimum. Crescit in multis Hispaniæ & Lusitaniæ locis frequentissima. Alterum genus vbi Sponte nascitur non tam alte fruticat, sed bicubitalibus duntaxat assurgit stolonibus, ramis multis, fragilibus, foliis omnium maximis, virentibus superne, non-nihil inferne candicantibus, Hedera foliorū speciem interdum, & Populi nigrae plerumque æmulantibus, satis carnosus & rudibus, hyeme nonnihil rubentibus, gustu subacido, & adstringente: Flos Cisti foeminæ, cum forma, tum magnitudine, candidus: capitula pentagona, acuminata, semine exili & nigricante referta. Huius generis alia species reperitur per omnia ferè similis, sed humilior,

neque cubitum excedens, foliis etiam minoribus: alioqui neque facie, neque flore, neque semine, neque sapore dissimilis. Vtraque nascitur in Mariano monte, per quem transeunt qui Vlyssipone Hispalim proficiscuntur. Reperitur etiam in collibus Granatæ vicinis. Tertium semine ex Italia misso Ledi Cy-

CISTVS LEDON

III. populnea fronde.




LEDVM IIII.

Clusij.



prij nomine in Belgio natum est, cubitali, interdum maiore amplitudine, fruticosum, ramis nigricantibus, foliis carnosiss, in viridi nigricantibus, mediæ inter primi & secundi generis folia magnitudinis, brevioribus tamen quàm vtriusque, & rhomboide quodammodo figura, quæ cum nouellis ramis lento & viscida humore obsita sunt, non adeò tamen copioso & denso, neque etiam adeo odorato, vt in primo genere: flos albus secundo generi similis, semen etiam exile, nigricans in capitulis rotundis. Cistus Ledo populnea fronde à Lobellio depictu est, & secundo modo descriptum cultu fortasse, duntaxat diuersum. In Belgij horto viret: odore grato Ledi Gallici, folio latiore quàm superioris. Flos non dissimilis, sed fruticat ad hominis, sæpè proceritatem, quam & interdum superat. Hec Lobellius. Quartum genus multis ramis fruticat, cubito longioribus, lentis & flexilibus, hirsutis, albicantibus: folia reliquis Ledi generibus molliora, ad Cisti fœminæ folia accedentia, verum angustiora, hirsuta, nigriora, & pingui lentoque succo conspersa, non modò verno tempore, sed etiam per totam æstatem: flos candidus, Cisti fœminæ flore non minor, nec absimilis: capitula exigua membranosis, quibusdam & laxis inuolucris tecta semen continent omnium, maximum, nigrum. Nusquam hoc genus quam in Castella veteri inuentum Clusio, vicinis pago S. Martini del Castannal locis, vbi Ardiuieja nuncupatur. Quintum genus eodem quo quartu assurgit modo, veru ramis duris, lignosis, nigricantibus, foliis longis Oleæ angustioribus, nigricantibus, pinguibus, & cū nouellis ramulis lento humore cōspersis: flos albus, omnium ferè minimus: capitula oblongiuscula, angulosa, in quibus semen ex rufo nigricans, exiguum. Nihil isto Ledi genere vulgatius toto regno Valentino, & Gallia Narbonensi: in plerisque etiam aliis Hispaniæ & Lusitaniæ locis reperitur. Sextum ferè simile est quinto breuius paulo, minoribus angustioribusque foliis, lento etiam humore aspersis: flos maior: quinque



quinque foliis constans, candidus: semen etiam simile. Septimum cubitale est, multis & frequentibus ramis fruticans, colore cinereo, frequentissimis foliis ramos septientibus, Rorismarini coronariæ, sed omnino canescentibus, & hispidis, non tamen minus pinguibus & glutina illitis cum suis tenellis ramulis quàm quintum genus: flos in summis ramis copiosus, candidus, superiori similis: semen etiam non dissimile. In Valentia regno hæc duo postrema gi-

LEDVM VIII. Clusij.



gnuntur. Octauum genus eadem qua superius magnitudine crescit, ramis tamen magis expansis: & foliis tenuioribus, superna parte ex atro virentibus, inferna verò candidantibus, Rorismarini coronariæ ferè æmulis, sed gustu adstringentibus tametsi lentro quodam humore & pingui sint cum tenellis ramis obducta: flores numerosi secundum ramorum longitudinem, quinque foliis constantes, exigui, lutei: semen in exiguis capitulis ex cinereo nigricans. Reperitur hoc frequens in incultis illis locis citra Tagum, supra Vlyssiponem, cum Cisto foliis Halimi, & aliis nonnullis Baticæ locis. Nonum minus est superiore: folia paullo maiora, neque subtrus incana vt in octauo, rariora item, & magis glutinoso succo madida: ramuli quibus flos inhæret tenues, & ex succi, planèque retorridi, in quibus capitula. Decimum attollitur pedali duntaxat altitudine: ramulis exilibus, lignosis, & satis fragilibus, nigricantibus, pinguibus, & lentore quodam saliuosis: folia



longe minora quàm in nono, non multum à Thymi foliis dissidentia : in oblōgis ramulis flores, deinde capitula exigua quasi vmbellæ specie prodeunt. Nascuntur hæc duo postrema in extrema Bætica parte qua Castellam spectat. Non minus perpetuo folio sunt ista Cisti genera quàm mas & fœmina.

MYRTVS, CAP. LVI.

Nomina



MYRTVS & Murtus Latinis, Græcis *μυρσίνη*, & *μυρρίνη* nominatur à Myrsine Atheniensi puella pulchritudine & robore insigni, amica Palladi, quam iuuenis ab ea cursu & palestra superatus interemit, invidia ductus, quod elegantia, cæterisque naturæ dotibus reliquis virginibus præstaret. Arbuscula in demortuæ vicem succedit,

Corol. 157.
li. I. Diosc.

Genera.


semper, vt olea, Mineruæ chara. Quidam sic vocatam volunt, auctore Pena, propter æmulam Myrrhæ quandam odoris gratiam, in eius baccis recentibus. Dicitur etiam, inquit Hermolaus, Myrsinos, item Phibaleos ab Antiphane sed & Myrton ab Archilocho. Ab Arabibus, *Aes*, *Alas*, *As*, à Gallis *Myrte*, & *Meurte*, ab Italis *Myrto*, ab Hispanis *Murta*, aut *Raiam*. Myrti genera sunt multa. Est enim Myrtus sylvestris, & Myrtus satiua : Hæc vero, nigra, & candida. Sylvestris itidem alia nigra, alia candida. Sed hic Lectores monitos esse volumus, cum de sylvestri Myrto loquimur, non de Rusco, qui sylvestris & acuta Myrtus Dioscoridi & Plinio dicitur, nos intelligere, sed de vera Myrto sylvestri, quæ satiua opponitur. Hæc duo Myrti genera quamuis Dioscor. non exprefert, tamen cum dicit, Myrtus satiua nigra vtilior est, &c. atque rursus, è Myrto nigra sylvestri, aut satiua, &c. sylvestrem etiam eiusdem generis esse indicat. Sylvestri quidem Myrto Tyrrheni maris litora virescunt. In toto Ligustico, Neapolitano, & Romano tractu Myrti sponte proueniunt. Nascuntur etiam copiosè in Gallia Narbonensi, maximè qui in parte eius maritima, quam Provinciam vocant. Seruntur etiam in hortis à plurimis in Italia. Myrtus frutex

Li. I. ca. 128.

Lib. I. ca. 37.

Forma

Pœtarum



Pœtarū carminibus celebris, sed viribus quas in medendo præstat multo clarior. Quæ satiua est, in aliquam proceritatem, si studiose colatur, adolescit, atque etiam arborescit, ramis flexilibus, rubro cortice: foliis longiusculis, perpetuò virentibus, Punicæ æmulis, aut lentisco vel buxo similibus, acuminatioribus tantum, gustu aromatis aliquid præseferentibus, & odoratis, quæ in nigra Myrto nigriora, in candida candidiora spectantur. Flores omnibus sunt candidi, & odorati. Baccas fert vtraque Myrtus satiua oblongas, agrestes Oleas quadantenus referētes, multo sanè sylvestribus maiores, & si aliter sentiat Marcel. hac in re experientiæ repugnans, quæ docet Myrta satiuarum, aliarum stirpium more, cultu mansuescere, atque grandiores vegetiores que baccas à Myrtis satiuis edi. Sylvestris Myrtus forma haud multum superiori dissimilis minor est frutex, foliis Buxo similibus, minoribus, angustioribus, nec tam saturatæ viriditatis: floribus candidis. Baccas candidas, vel

in purpura albicantes candida, nigra nigras parit. Vnde & Ouid.

Myrtea sylua subest bicoloribus, obsita baccis.

Hæ μύρτα Græcis dicuntur, Latinis Myrta & Murta, Officinis Myrtilli. Sunt vteribus plura Myrti genera, de quibus fusè Plinius, sed hæc imprimis scripsit. Fuit (Myrtus) vbi nunc Roma est, inquit, iam tum cum conderetur. Quippe ita

Li.15. c.29.

MYRTVS
Tarentina.



traditur Myrtea verbena Romanos Sabinosque, cum propter raptas virgines dimicare voluissent, depositis armis purgatos in eoloco qui nunc signa Veneris Cluacine habet. Cluere enim antiqui purgare dicebant. In ea quoque arbore suffimenti genus habetur, ideo tū electa, quoniam coniunctioni, & huic arbori Venus præest. Cato tria genera Myrti prodidit, nigram, candidam, coniugulam (in nostris Catonis exemplaribus Myrtum, nigrum, candidum, coniugulum legimus masculino genere) fortasse à coniugiis ex illo Cluacinae genere. (Alij coniugulam dictam volunt, quod opere topiario cum pergulis & parietibus hortorum elegantissimo spectaculo aptissimè coniūgatur.) Nunc & alia distinctio, satiuae & sylvestris. Satiuarum genera. Topiarij faciunt. Tarentinum folio minuto, nostratem patulo, exoticam densissimo, senis foliorum versibus. Hæc non est in vsu: ramosa vtraque alia. Coniugulam existimo nūc nostratem dici. Hæc Plinius: Huius Myrtum Tarentinam & Exoticam sibi notas Matthio.

Capitu.133.

Li.1. Diof. cap.128.

his

MYRTVS MINIMA

Angustifolia.

MYRTVS

Exotica.

his picturis repræsentavit, ac descripsit. Tarentina Myrtus, inquit, à Tarento Apuliæ ciuitate dicta, folio est nostrate longè minutiore robustioréque: fructu minore, copiosiore, in summitate pluribus apicibus coronato, colore ex nigro purpurascente, minutis, crebris, albicantibusque intus ossiculis. floribus vulgari Myrto similibus. Myrtus minor, Gallis *Myrte petit*, Italis *Myrto mortella* dicitur. Eius differentias aliquot facit Lobellius: harum vna est Myrtus minima, foliolis angustis Thymi Cretensis, longioribus. Exotica Myrtus Plinij pluribus foliorum versibus, nunc in Italiæ hortis & viridariis colitur, folio nostrati non absimili, dilutione tamen, acuminatio-

MYRTVS BAETICA

Latifolia domestica II. Clusij.

Exotica.

Libr. stirp.
Hisp. ca. 33.

re, copiosioréque, & adeo denso, vt eo rami vndique stipentur, fructum fert oblongum vulgari Myrto haud absimilem. Vtraque topiariis operibus peridonea est, virésque easdem quas nostras habet. Clusius cum in Hispaniis, tum aliis locis multo plura Myrti genera obseruauit. Vnum ramis satis crassis, foliis duplici serie rarius dispositis, magnis, vt interdum ad Lauri tenuifoliæ aut Arbuti foliorum amplitudinem fere accedant, colore dilutius paulo virente, odoratis. Rarius hoc floret aut fructum fert, quoniam eo sepibus texendis, quas tondere solent, plerumque vtantur. Nusquam id genus visum Clusio, nisi in cœnobio quodam Hispali, & in latissimis Maurita

MYRTVS BÆTICA

Syluestris Clusij.

Mauritanorum Grauatæ viridariis, omnibus sepibus ex illo Myrti genere confectis, & ex alio quodam huic non multum dissimili, minoribus tamen foliis, & paulo densioribus, hîc depicto, & quod Myrtum Bætiam, Latifoliam, domesticam, secundam vocauit. Idem aliam quoque pinxit Myrtum Bætiam siluestrem non adeo dense fruticantem, neque admodum sese attollentem ramis tenuibus, & fragilibus: foliis mucronatis, duplici serie rarius circa ramos nascētibus, nigricantibus, odoratis, flore aliis simili, candido: fructu rotundo, oblongis pediculis ex foliorum alis prodeunte, inhærente tenacius, copiosa, primum viridi, deinde candicante, per maturitatem verò nigro, vinoso, grati admodum cū adstrictione quadam saporis. Sponte prouenit in plerisque agris & collibus Bæticiæ, ad Anam flumen sitæ, & Lusitaniæ, adeo copiosè, vt per aliquot miliaria nulli ferè alij frutices conspiciantur. Octobri interdum florent, sed maxima ex parte fructu tum onusta est.

Myrtus celerrimè à frigore vritur, auctore

Theophrasto. quamobrem nulla in Olympo, nulla in Ponto gignitur, etiam si summo studio, adhibitâque omni solertia etiam religionis causa conseruerint. Circa Bosphorum Cimmericum, inquit Plinius in Panticapæo vrbe omni modo laborauit Mithridates Rex, & cæteri incolæ sacrorum certè causa Laurum, Myrtumque habere, quod non contigit. Montes igitur, & frigidos tractus odit. Tamen partim in mediterraneis, scilicet hortis, viridariis, vinetis diligenti cultu maximè prouenit, partim in amænis stagnorum & lacuum ripis, sine vlllo cultu edita mirè proficit, sed maximè in litoribus marinis. Quamobrem Veneri sacra est, quæ & è mari orta dicitur: hinc & arbor sacra coniugio. Circum promontorium excelsum refert Theophrastus Myrtis abundare, quod Circen incoluisse tradunt indigenæ, & tumulum Elpenoris monstrant, ex quo Myrti enascuntur humiles, ac veluti coronariæ, cū cæteræ magnæ sint. In hoc tumulo ex omnibus Europæ locis primùm visam fuisse Myrtum tradit Plinius. Græcūque ei nomen remansisse, quo peregrinam esse apparet. Myrtus etiam umbras amat, vt scribit Theophrastus. Præter baccas Myrtus Myrtidanum producit tanquam appendicem quandam Dioscoridi, seu adnatum tuber inæquabile, verrucosum, intumescens, & concolor, quod perinde quasi manus Myrti caudicem amplectitur. Id, inquit Matthiolus, notissimum est, vbi Myrtus frequens nascitur. Galenus Myrtada appellat, Paulus Myrtida. Sed in Glossis Hippocraticis idem Galenus Myrtidanum à plerisque piper appellari scribit, & citato hoc Dioscoridis loco, in quo appendicem circa Myrti truncum esse ait, subiungit. Hippocrates tamen fructum ex planta sic nominat, quem ipse à Persis Piper appellatum esse dicit. Est autem id aliquot locis apud Hippocratem, ex quibus hi duo sunt insigniores. Προσθεν ἡ κόκκυσ ἐκλέφαντα, ὅσον τριάκοντα, ἰνδικοῦ φαρμάκου τοῦ τῶν ὀφθαλμῶν, ὁ χαλέσει πέπερι, καὶ τῷ τροχύλῳ, ἐχέτω τρία. Ταῦτα λεία τρίβειν, καὶ οἶνω παλαιῷ χληρῶ διέξει, βαλάνιον περὶ πλερὸν ὀρνίθος τιθέναι, καὶ ὡδε προσάγειν: quæ sic reddi possunt. Subdititium. Aut graua Cnidia triginta detracto cortice, &

Indici

Locus.

Li. 4. Hist.
ca. 6. & li.
5. auf. 18.
Lib. 16. c. 32.

Lib. 5. Hist.
cap. 9.

Li. 15. ca. 29.

Lib. 3. caus.
cap. 8.
Myrtida-
num.

Li. 1. ca. 128.

Ibidem.

Lib. 7. sim.
Lib. 7.

Lib. 1. mor.
mul.

Li. 2. mor.
mul.

Indici pharmaci oculorum, quod vocatur piper, & rotundi, vtriusque grana tria. Hæc autem terito, & vino veteris diluta, instar glandis circa gallinæ pen nam formato, & sic adhibeto: acursum: *προςθεθὲν ἐκλεψας κόκκους τριάκοντα, τὸ ἰνδικόν, ὃ χαλῆουσιν οἱ πέρσαι πᾶσι, καὶ ἐν τῷ τῷ ἐν τῷ ῥόγγυλῳ, ὃ χαλῆουσι μυρτίδανον ξὴν, γὰρ καὶ γυναικὶς ὁμοῦ τρέφειν, καὶ μέλιτι διέναι: ἔπειτα ἔριον μαλθακὸν καὶ καθαρὸν ἀναφυρήσας περὶ πῆλρον περιελίξας προαθεῖναι.* Hoc est, Grana Cnidia decorticata triginta, Indicum quod piper Persæ vocant, & in hoc inest rotundum, quod appellant Myrtidanum, cum lacte muliebri simul terito, & melle diluito: Deinde lana molli ac pura excepta, & pennæ aduoluta subdito. Græca hæc quidam sic legunt: *ἰνδικὸν φαρμάκειν ὃ χαλῆται τῶν ὀφθαλμῶν*, Indici medicamenti quod oculare vocatur, nempe Lycij, *καὶ τῷ πεπέρειος τῷ ῥόγγυλῳ*: posteriore verò: *τριάκοντα, καὶ ὃ χαλῆουσι πέρσαι τὸ ἰνδικόν: πεπερί, καὶ τοῦτο μὲν ῥόγγυλῳ, καὶ ὃ χαλῆουσι μυρτίδανον: &c.* At Plinius Myrtidanū vinum esse scribit, ex siluestris Myrti baccis factum. Attamen alio libro, Myrtidanum, inquit, diximus quomodo fieret: Et mox subiicit eius vsum, eadem tradens de Myrtidano vino, quæ Dioscorides scripsit de suo Myrtidano trunci Myrti appendice. Vulvæ, inquit, prodest appositu, potu, & illitu. Multo efficacius & cortice, & folio, & semine. Gale no Myrtus ex contrariis substantiis constat: vincit tamen in ea frigidum terrenum. Habet verò etiam tenue quiddam calidum. Itaque valenter desiccatur. Porro ramis & trunco adnascens tuber, quod quidam Myrtada nuncupant, quanto dictis siccius est, tanto & desiccatur, & adstringit vehementius. Quidam id tundentes reponunt, postea vino subigentes in pastillos formant, folia item arida viridibus plus desiccant: miscetur enim virentibus humiditas quædam. Porro succus non tantum ex virentibus foliis exprimitur, sed & fructu. Adstringendi vim hæc omnia habent, tum foris imposita, tum intro sumpta, quod scilicet nullam deleteriam, aut purgatoriam substantiam habeant admixtam.

Lib. 14. c. 16.
Li. 23. ca. 8.
Cor. Emb.
125. lib. 1.

Li. 1. ca. 128.

Lib. 7. sim.
tempera.

¶ Vires.

Lib. 1. c. 128.

De hisdem hæc. Vis & Myrti & fructus adstringit Dioscoridi, fructus viridis aut aridus in cibo datur sanguinem excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus ex virentibus baccis expressus eisdem effectus exhibet: stomacho utilis: urinam ciet: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero. Seminis decoctum capillum tingit. Ius decocti in vino vlcera in extremis membris nata sanat: oculorum inflammationes illitum cum polentæ polline lenit: contra ægilopas illinitur: crapulam arcet præsumptum vinum, quod feruefacto aliquantum eius fructu exprimitur, alias enim acorem contraheret. Præstat eundem semen effectum: utile procidentia vulvarum in desefsionibus, sedis vitiis, & fœminis fluxione vulvæ laborantibus: purgat furfures, vlcera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta quas Liparas vocant, vti oleum, quod ex foliis eius fit. Decoctum foliorum ad desefsiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & male solidescentes. Eo fracta ferruminationi repugnantia utilissimè fouentur: vitilignes emendat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eorum eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis vlceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, cœliacisque prosunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo, cum vino, ad vlcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arenium foliorum farina utiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum fœminumque madores: cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsque medentur. Exprimitur folijs succus affuso vetere vino, aut aqua cælesti, cuius recentis vsus est: nam exiccatus planè cariem sentit, & vires amittit. Myrtidanum magis quàm Myrtus

Myrtus adstringit. Tufum addito austero vino reponitur, coactumque in pastillos siccatur in vmbra: multò efficacius & folio, & semine, cerato, pelsis, infessionibus, cataplasmatibus admixtum, vbi adstringendum aliquid est. Eadem etiam de Myrto, & quædam alia Plinius tradidit, sed multum confusa, quædam etiam repetita. Semen Myrti, inquit, medetur sanguinem excreantibus. Item contra fungos in vino potum. Odorem oris commendat, vel pridie commanducatum. Item apud Menandrum Synaristufæ hoc edunt. Datur & dysentericis denarij pondere in vino. Vlcera difficilia in extremitatibus corporis sanat cum vino subferuefactum. Imponitur lippitudini cum polenta, & cardiacis in mamma sinistra, & contra scorpionis ictus in mero, & ad vesicæ vitia, capitis dolores, & Ægylopos, antequam suppurent. Item tumoribus, exemptisque nucleis in vino vetere tritum eruptionibus pituitæ. Succus seminis aluum sistit, vrinam ciet. Ad eruptiones pustularum, pituitæque cum cerato illinitur, & contra phalangia. Capillum denigrat. Lenius succo oleum est ex eadem Myrto. Lenius & vinum quod nūquam inebriat. Inueteratum sistit aluum & stomachum, tormina sanat, fastidium abigit. Foliorum arentium farina sudores cohibet inspersa, vel in febris: utilis & cæliacis, & procidentia vuluarum, sedis vitiiis, vlceribus manantibus, igni sacro foru, capillis fluentibus, furfuribus: item aliis eruptionibus, ambustis. Additur quoque in medicamenta, quæ Liparas vocant, eadem de causa, qua oleum ex his, efficacissimum ad ea quæ in humore sunt, tanquam in ore, & vulua. Folia ipsa fungis aduersantur trita ex vino, cum cera verò articularibus morbis, & collectionibus. Eadem in vino decocta dysentericis, & hydropicis potui dantur. Siccantur in farinam, quæ inspargitur vlceribus, aut hæmorrhagiæ. Purgant & lentiginis, pterygia, & paronychias, & epinyctidas, condylomata, testes, tetra vlcera: item ambusta cum cerato. Ad aures purulentas & foliis crematis vtuntur, & succo, & decocto. Comburentur & in antidota: item cauliculi florentes decerpti, in nouo fictili operto cremantur in furno, dein teruntur ex vino. Et ambustis foliorum cinis medetur ex vino. Inguen ne intumescat ex vlcere, satis est surculum tantum Myrti habere secum, non ferro, nec terra contactum. Exprimitur & succus è foliis mollissimis in pila tuis, affuso paulatim vino austero, aliàs aqua cælesti: atque ita expresso vtuntur ad oris sedisque vlcera, vuluæ, & ventris, capillorum nigritiam, alarum perfusiones, purgationes lentiginum, & vbi constringendum aliquid est. Sic enim legendum pro malorum perfusiones, vt vulgati codices habent. Est enim id quod Dioscorides dixit: *καπλατρίται καὶ καθύχρως μαχάλας, καὶ μηροῖς*. Est etiam ibidem legendum, Additur quoque in medicamenta, quæ Liparas vocant. Intelliguntur enim medicamenta, siue *ἐμπλάστρα λιπαρά*, quæ Celsus Lenia emplastra appellare maluit quàm pingua, Plinius Græcam appellationem hîc retinuit, & alio in loco: Additur in medicamenta quæ vocant Liparas. Dicuntur autem *λιπαρά ἐμπλάστρα*, ob adipis suilli, aliarumque pinguitudinum, & oleorum admixtionem, & contra, quæ hæc non habent, aut omnino parum *ἀλίπανα* dicantur. Celsus de emplastris quæ protinus vulneribus iniiciuntur. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideoque *ἀλίπανα* nominantur, quam alipenæ corruptè eo in loco legitur. Succorum natura præcipuam admirationem in Myrto habet, inquit rursus Plinius, quando ex vna omnium, olei vini que bina genera fiunt item Myrtidanum, vt diximus. Et alius vsus baccæ apud antiquos fuit, antequam Piper reperiretur, illius obtinens vicem, quondam etiam generosi obsonij nomine inde tracto, quod etiam nunc Myrtatum vocant. Eademque origine aprorum sapor commendatur, plerumque ad

Lib. 23. c. 9.

Corn. Em.
bl. 125. libr.
1. Dioscor.Corn. libr.
1. m. p.

Lib. 5. ca. 19.

Lib. 33. c. 6.

Ibidem.

Li. 15. c. 29.

Myrteum
condim.

Lib. 1. Diosc.
cap. 128.

Plin. li. 14.
cap. 16.

Diosc. li. 5.

Myrtites
vinum.

Oleū myr.
Silu. in lib.

3. Antid.
Mefu.

Ibidem.

Theophr.
lib. 6. Hist.
cap. 7. & li.
2. caus. ca.
18. Plin. lib.
15. cap. 29.
Lib. 15. c. 29.

intinctus additis Myrtis. Veterum exemplo Hetruscæ mulieres, inquit Matthiolus, ex Myrtibaccis bene maturis ciborum intinctus parant, qui cum assatis carnibus esitati maximam cum palato ineunt gratiam. Myrteum hoc condimentum languidos ventriculos roborat. Quare & cœliacis, & dysentericis vtile est, & scæminarum fluxiones quascunque cohibet. Fiebat & olim tum Myrtites vinum, tum oleum Myrteum. Illud obsoleuit, hoc hodie quoque in vsu est. Quod per expressionem baccarum Myrti conficitur, adstringit, & siccatur: quod ex oleo & Myrtis, aut Myrti succo compositum est, astringit solum à Myrtis, digerit ab oleo. Myrti folia, Matthiolo, baccarumque semen tritum, contra fungorum strangulationes mirificè valent: foliorum autem baccarumve decoctum calidis collectionibus succurrunt, scilicet erysi pelatibus & herpetibus. baccæ quoquomodo haustæ aut deuoratae corroborant, & eius tremori valde conferunt. folia sicca vruntur in fictili crudo, quousque in cinerem albissimum redigantur, deinde lauantur, ac pro spodio, & pompholyge supponuntur. Ex Myrti floribus destillata aqua odoris suauitate præstat, myropolis multum expetita. Ea tamen longe sit odorator, si ex Myrti Ægyptiæ floribus eliciatur: quia Myrtus odoratissima est in Ægypto, vt ex Theophrasto scripsit Plinius. Myrto in Hetruria pelles perficiuntur, densantur, crispantur, atque crassescunt. Bellicis quoque se rebus Myrtus inseruit, vt prodidit Plinius, triumphansque de Sabinis Posthumius Tubertus in consulatu (qui primus omnium ouans ingressus urbem est, quoniam rem leniter sine cruore gesserat) Myrto Veneris victricis coronatus incessit, optabilemque arborem etiam hostibus fecit. Hæc ouantium postea fuit corona, excepto M. Crasso, qui de fugitiuis & Spartaco Laurea coronatus incessit. Massurius auctor est curru quoque triumphantes Myrtea corona vsos L. Piso tradit Papyrium Massonem, qui primus in monte Albano triumphauit de Corsis, Myrto coronatum ludos Circenses spectare solitum. Ma. Valerius duabus coronis utebatur Laurea, & Myrtea.

RUSCUS, CAP. LVII.

Nomina

Lib. 3. Hist.
cap. 17.

Forma.

E. lo. 7. &
Geor. 2.

Li. 4. c. 141.



VI Latinis Ruscus & Ruscum, officinis addita litera, licet corruptè, Bruscum vocatur, Græcis μυρσίνη ἀγρία, idest Myrtus syluestris, & ὄξυμυρσίνη, idest acuta Myrtus, & μυρτιάχνη. Alij, inquit Plinius. Chamæmyrsinen vocant, alij Acaron à similitudine: est enim brevis, & fruticosa. A Theophrasto κεντρομυρσίνη nominatur, ab Arabibus qui Cubebas cum Rusco confundunt, Cubebæ, ab Italis Rusco, & Pongitopi, quod arcendis muribus à falsa carne appensa circum ligetur, à Germanis Bruosch, ab Hispanis Insbarba, à Gallis quibusdā Bouys piquant, ab Anglis Kuehull, & Kuehulme. Humilis est frutex, lignosus, radice alba, ramosus, stipitibus rotundis, cortice fusco, tectis, & spisso: foliis densis, nigricantibus, spissis, Myrto, aut Buxo haud multū dissimilibus, sed duris, mucrone aculeatis, rigentibusque. Quare horridum Ruscū Virgilius dixit, & aspera Rusci vimina. Fructus in foliis ipsis crescit, ruber, duro intus semine. Dioscorides, Ruscus Dioscoridi folium fert Myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum. Baccæ per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio pendentes, osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi: radix gramine similis, acerba, & subamara: in qua Ruellij versione baccæ à medio folio pendentes haud rectè dicuntur, cum Græcè legamus, καρπὸν ὃ ἐν μέσῳ τοῦ πτελέως περιφέρει. Idest, Baccas habet in medio folio rotundas: non enim ex foliis illæ quidem

R V S C V S.



quidem pendent, sed ipsi hærent, id ipsa experientia docente & approbante, his verbis Theophrasto. Τῆς διάρνης ἀλεξανδρείας τοῦτο τὸ ἴδιον, ὅτι ἐπιφυλλόχαρπὸν ἐστὶ, ὥσπερ καὶ ἡ κεντρομυρρίνη: ἀμφότεραι γὰρ τὸν χαρπὸν ἔχουσι ἐπὶ τῆς ῥάχεως τοῦ φυλλοῦ. Lauri Alexandrinæ hoc proprium est, quod in folio fructum habeat, veluti & Ruscus. Vtrique enim fructus ex foliis ipsius dorso enascitur. Hic Rusci fructus plurimum differt à Cubebis aromaticis granis. Serapio verò duos hos fructus eosdem esse credidit: errore iamdudum deprehensso, & scriptis mandato à doctissimo viro Leonicensio. Prouenit Ruscus in asperis & præcipitibus locis. Ab herbarijs in hortis seritur: folia nunquam amittit. Germinat vere Asparagi modo, turionibus tamen breuioribus, crassioribus, hirsutis qui elixi eduntur ex oleo, sale, & aceto. Sed quum non obscurè eorum amaror gustatu percipiatur, in medicamentis potius, quàm in cibis sunt habendi: ad ciendam enim vrinam, aperiendâsque obstructions plurimum valent. Plinius quo-

Lib. 3. Hist. cap. 17.

Locus.

Tempus.

Lib. 21. c. 15.

Dodo. li. 6. cap. 13.

Temper.

et vires

Lib. 4. c. 14

Li. 23. ca. 81.

Li. 21. ca. 27.

que inter herbas sponte nascentes, & in cibos expetitas, quæ in Italia paucissimæ sunt Ruscum recenset. Fructus Augusto mense maturus est. Radix & folia secundo gradu calfaciunt, siccant primo. Galenus, Paulus, Ætius ruscum in simplicium censu silentio præterierunt. Eius igitur virtutes ex Dioscoride hæ sunt. Folia & baccæ in vino potæ vrinam cient, menses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio vrinæ medentur, dolores capitis sanant, & regium morbum. Decoctum radice in vino potum eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorum vice in cibo sumuntur: amari tamen sunt, sed vrinam mouent. His admodum consentanea sunt quæ scribit Plinius. Myrtus sylvestris, inquit, siue Oxymyr sine, siue Chamæmyrsine baccis rubentibus & breuitate à satiua distat. Radix eius in honore est, decocta vino ad renum dolores pota, & difficili vrinæ, præcipuè que crassæ, & graue olentis: morbo regio, & vuluarum purgationi trita cum vino: Cauliculi quoque incipientes asparagorum modo in cibo sumpti, & in cinere cocti: semen cum vino potum, aut oleo, aut aceto calculos frangit. Idem in aceto & rosaceo tritum capitis dolores sedat, & potum morbum regium. Castor Oxymyr sinem hanc Myrti foliis acutis, ex qua fiunt ruri scopæ, Ruscum vocauit, & ad eosdem commendauit. Idem vsus alio in loco. Rusci radix inquit, decocta bibitur alternis diebus incalculorum valetudine, & tortuosiore vrina, vel cruenta. Radicem pridie erui oportet, postero mane decoqui: ex ea sextarium, vini cyathis duobus misceri. Sunt qui crudam radicem tritam ex aqua bibant: & in totum ad virilia, vel, vt quidam legunt, vrinam difficilem, cauliculis eius in vino & aceto tritis nihil vtilius putant, aut, quomodo in vetere codice legitur, cauliculis eius aceto tritis, &c. In quibus Plinij verbis vrinam tortuosam intelligimus, exitu flexuoso prodeuntem, ac procursu veluti diuiso, ob crassum humorem impactum vri-

nario meatui, aut extumescens carunculam, quam Græci vocant Hyper-
 farcosin, in vrinæ via, lotij meatum impredientem. Porro hic animaduer-
 tendum Plinium proculdubio Ruscum cum Myrto sylvestri confudisse, de
 qua suprâ tractauimus, maximè cum de oleis factitiis loquitur. Simile est
 (oleum) è Myrto nigra: & hæc latifolia melior. Tunduntur baccae aspersæ
 calida aqua, mox decoquuntur. Alij foliorum mollissima decoquunt in oleo,
 & exprimunt. Alij deiecta ea in oleum, prius sole macerant. Eadem ratio &
 in satiuâ Myrto, sed præfertur sylvestris, minore semine, quam quidam
 Oxymyrsinen vocant, alij Chamæmyrsinen, &c. Sylvestrem Myrtum pro
 Rusco à Plinio hîc vsurpari ex iis quæ ex ipso iam citauimus perspicuum
 est. At ex Rusco Myrteum oleum non fieri, sed ex Myrto sylvestri satiuæ op-
 posita, de qua præcedenti capite egimus, Dioscorides à quo modo recita-
 ta Plinius mutuatus est, apertè demonstrat his verbis. Myrtei faciendi ratio
 hæc est è Myrto nigra sylvestri, aut satiuâ, foliorum mollissima quæque tusa
 premuntur: succo pares olei omphacini portiones adiiciuntur, subiectisque
 carbonibus inferuescunt, donec concoquantur: innatans oleum deraditur.
 Sed longè facilius hæc compositio. Tenera folia contusa coquuntur in oleo &
 aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole
 macerant. Præterea cum Myrtei olei vires ex Dioscoride persequitur, nempe,
 quod adstringit, indurat, medetur gingiuis, dentium dolori, dysenteria,
 vuluæ exulceratæ, vesicæ, vlceribus vetustis, vel manantibus, cum squa-
 ma æris, & cera: item eruptionibus, ambustionibus: attrita sanat, rhaga-
 das, condylomata, articulos luxatos, odorem grauem, Denique quod ad
 omnia valet, adstrictionem spissationemque desiderantia, vt ait Dioscori-
 des, subiicitque Chamæmyrsinæ, siue Oxymyrsinæ eandem esse naturam,
 perspicuum est Oxymyrsinen, id est Ruscum, vt ipse interpretatur, cum
 vera Myrto sylvestri confundere. Est autem Ruscus ad ea præstanda plane
 inepta, ad quæ Myrteum oleum Plinius ipse, atque Dioscorides commen-
 darunt, vt ex ipsius Rusci viribus suprâ ex vtroque auctore narratis liquet.
 Ruscilentis ramulis ad colligendas vites utebantur antiqui. Virgil.

*Nec non etiam aspera Rusci,
 Vimina per syluam, & ripis fluuiialis arundo
 Cadatur.*

NERIVM SIVE RHODODENDRVM,

CAP. LVIII.

Normina

In Theri.

Lib. 24. c. II.

Forma

Lacu.



RÆCI νήριον, & ροδόδενδρον vocant hanc plantam, alij ροδοδάφνην,
 à flore Rosæ simili, & foliis laurinis: Nicander Nerin. Nos quia
 ne nomen quidem Latinum inuenit, vt ait Plinius, Nerium
 etiam vocamus, & Rhododendrum, & Rhododaphnem, Apu-
 leius Rosam Lauream, Galli Rosage, & Rosagine, Itali Rosalauro, & Oleandro,
 Hispani Adelfa: Germani Olander. Frutex est vulgaris notitiæ, inquit Diosco-
 rides, longioribus quàm Amygdala foliis, crassioribusque: flore in Rosam
 conformato: fructu Amygdalæ simili, corniculato, qui patefactus quan-
 dam lanosam naturam ostendit, spinarum nimirum Carduorum pappos
 representantem: radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa. Hæc Diosco-
 rides interprete Ruellio: qui vbi vertit, longioribus quàm Amygdala foliis,
 legitur in vetere codice, ἀμυγδαλῇ φύλλῳ ἔχον ὅμοια, μακρὸ τέρα τε, καὶ παχύτε-
 ρα, καὶ

NERIVM SIVE

Rhododendron.

ρα, καὶ πλεονέστερα, καὶ τραχύτερα: Hoc est, Habens folia similia Amygdalæ, longiora tamen, crassiora, latiora, & asperiora. Rectè verò fructum intus lana quadam refertum dixit, spinarum, seu carduorum pappis simili, quæ in quibusdam Dioscoridis exemplaribus falso ὑακινθίους πάππους similis esse legitur, cum hyacinthus nullos prorsus pappos habeat. Quare legendum ἁκανθίους πάππους, idest spinarum, seu carduorum pappis, vt meliores codices, & ipsa experientia testantur. Similitudo fructus Nerij cum Amygdala intelligenda prorsus est, vel adhuc exigua siliqua, & adolescente, vel ob corticis viriditatem, & crassitiem, alioquin haud rectè adulta siliqua, angusta, oblonga, nullo subiecto duro & lignoso nucleo, lanuginosis tantum villis facta cum Amygdala comparetur. Et quamuis herba dicatur Sabina, Rhododendrō, inquit Plini⁹ vt nomine apparet à Græcis venit. Alij Neriō vocarūt, alij Rhododaphnē, sempiterno frōdis honore, Rosæ similitudine, caulibus fruticosum: qui locus falsi suspectus est. Sunt qui legant Sabinē, hoc est lingua Sabinorum, quibus non accedit Hermolaus,

Li. 16. c. 20.

In cast. Pli.

huncque eius loci sensum esse ait, Rhododendron Sabinam herbam dici, cum tamen in Sabinis primum orta non videatur, ex ipso nomine quod Græcum est: Sciendum enim aliud fruticis genus Sabinam vocari, Græcè brathy. Nerion nascitur in amænis, maritinis & secus amnes, inquit Dioscorides. In hortis etiam colitur ab herbariis. Copiosissimum prouenit in tractu maritimo alpino & montoso Liguriæ, inter Nicæam, & Genuam, cum Siliquis. Vidit hoc primum Matthiolus ad Benaci ripas, & in Argentario promontorio in maritimis Senensibus. Planta est Laurifacie, non iniucunda spectatu, præsertim suis floribus ornata, quorum similitudine deceptus quondam L. Apuleius in asinum mutatus, dum Rosas quæreretur, quarum pastu in pristinam formam restitueretur, parum ab fuit, quin imprudens eos deuoraret. Verum qui in plantarum historia, & viribus cognoscendis diligentissimus fuerat, recordatus Nerij flores asinis venenum esse præsentaneum, statim labra substraxit, demissis que auribus abiit. Idem Lucianus sibi in asinum quoque transformationem narrat accidisse. Sed Nerium δάφνην ἀργεῖαν, idest Laurum siluestrem vocat, perniciosum asino & equo cibum, cum asserant id comedentes euestigio mori. Dioscorides etiam tradit flores & folia mulis, asinis, canibus, & quadrupedum plurimis venena esse, hominibus verò contra serpentium morsus conferre, è vino pota, eoque magis ruta addita. Imbecillas etiam animantes, vt pecus & capras, si aquam bibant in qua folia ea maduerint, mori. Eadem planè tradit Plinius. Nerium iumentis, caprisque & ouibus venenum est. Idem homini contra serpentium venena remedio: quæ iterum alio loco repetit. Mirum folia Nerij quadrupedum venenum esse, homini verò contra serpentes præsidium, Ruta addita, è vino pota. Pecus etiam & capræ, si aqua biberint,

Locus.

Ibidem.

In libr. 4.

Diosc. c. 77.

In Lucio.

Ibidem.

Vires.

Li. 16. c. 20.

Lib. 24. c. 11.

Lib. 8. sim.

Ibidem.

in qua folia ea maduerint, mori dicuntur. His maximè refragatur Galenus, ita scribens. Neriion aut Rhododaphne notus omnibus frutex, foris quidem illitus digerendi vim obtinet: intro verò in corpus assumptus, perniciosus ac venenosus, non solum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus est. At dicendum, inquit Marthiolus, Nerium sumptum hominibus à serpentibus non demorsis perniciosum esse, Dioscoridis verò sententia idem iis remedio esse quos serpentes momorderint, qua ratione Cantharides auctore Auicenna, à cane rabido demorsis medentur, & Euphorbium à scorpione ictis, alia denique letalia medicamenta aliis venenis aduersantur. Cordus alio modo conciliari posse hos auctores scripsit. Si intra corpus sumatur Nerium venenum esse, si foris imponatur, contra venenatorum morsum auxiliari. Sed reuera Nerium intro sumptum contra serpentium morsus opitulari Dioscorides intellexit: fideliora enim exemplaria habent


Li. 4. Diosc.
cap. 82.

NERIION

albis floribus.

Li. 13. c. 100.
Lib. 7. ca. 11.

Ibidem.

In Exhort.
ad art.

συνέειναι τινόμενα, cum vino pota, videlicet flores, & folia. Sic etiam in Plinio perspicuè legitur, qui proculdubio videtur hac ex Dioscoride transscripsisse. Præterea in Esdræ antidotum, cuius contra venenata animalia præcipuus est usus, flores Nerij recipiuntur, cœu medicamentum contra venena efficax. In hac verò apud Ætium, & Paulum compositione Esdræ, malè legimus flores Nerij, deinde paulo post, Rosæ Rhododaphnes. Neriion enim & Rhododaphne idem est frutex, & Rosæ Rhododaphnes nihil aliud sunt, quàm flores Nerij. Videtur itaque flos Nerij, interpretatio esse Rosarum Rhododaphnes, quæ in margine notata, ab aliquo indocto in contextum inserta est. Id tamen verum esse tradit Cordus florem Nerij insaniam parere, sed non semper: accidere enim id quibusdam locis, & quibusdam temporibus, arborémque quibusdam temporibus venenatam esse, ex cuius & Aconiti floribus in Ponto venenatum melapes colligunt. Scribit etiam Galenus athletarum dorsum Rhododaphnis vellicari. Καὶ ῥοδodάφνης ἐνὶ τοῖς τὰ νῶτα διακταλοναί. Nerium aliud pinxit Lobellius, flore albo quale se vidisse ait Pena, tum in hortis Italicis, tum in maritimis.

GLYCIR

GLYCYRRHIZA. CAP. LIX.

VT à Græcis γλυκύριζα, ita à Latinis Glycyrrhiza, & Glycyrrhizon appellatur, & dulcis radix, à Seplesiariis corrupto, aut potius barbaro nomine Liquiritia, ab Arabibus *Sus*, Italis *Rigolitia*, Gallis *Reclisse*, & *Regalisse*, à Germanis *Lechkritz*, & *Sueszholtz*, ab Hispanis *Regaliza*, Boemis *Lekrice*, Polonis *Lackrijca*. Fruticosa est planta, inquit Dioscorides, ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: foliis Lentisci, densis, pingui-
 bus tactuque gummosis: flore Hyacinthi: fructu pilularum Platani magnitudinis, asperiore, in siliquis Lentium modo, rufis, parvis: radicibus longis, ut Gentianæ, coloris buxei, sub acerbis, & dulcibus, quarum succus densatur Lycij modo. Vel ut in vetere Codice legitur, χαλιζόριζα ὡς περ τὸ γλάυκιον, ἢ λύκιον. Id est, ex quibus elicitur succus, veluti ex Glaucio, au Lycio. Ea est planta quam hic primo loco proposuimus, ramis ternos, quaternosue cubitos altis, in quibus folia bina ex aduerso sita, Lentisco similia. Flores breuibus pediculis hærent,


Nomina

Lib. 3. ca. 5.

Forma.

GLYCYRRHIZA

echinata Matthioli.



GLYCYRRHIZA

echinata Dodonei.



Hyacinthi purpureo colore, in globulos veluti congesti, post quos fructus oriuntur, quorum globosum acerum cum Platani pilulis comparat Dioscorides. Sunt enim rotunda capitula, echinata, magnitudine pilularum Platani, aut maiora, composita ex siliquis parvis, multis, Lenti similibus, coacervatis, hirsutis, & tenuiorum aculeorum stipatu velut armata, ut pictura monstrat, colore in atrum rufescente, in quibus semen compressum clauditur. Radix longa ut Gentianæ, foris nigricans, intus lutea, dulcis. Est & altera Glycyrrhiza priori addita, à Matthiolo priore editione commentariorum in Dioscoridem pro Glycyrrhiza Dioscor. depicta, qua abundat Apulia, inquit, præsertim in Gargano monte, ex qua quotannis succus in pastillos densatus conuehitur, & magna radicum copia. Visitur etiam in multis Italiæ hortis, non modo ad spectaculum sata, sed & ad medicamentorum vsum. Nam recens effossa radix sicca præstan-

Lib. 3. Dio-

scor. cap. 5.

Locus.

GLYCYRRHIZA NON

echinata: Scythica herba.

Ibidem.

Lib. 6. c. 28.

In Hist. pl.
cap. 70.Ruel. lib. 3.
cap. 5.Lib. 2. pl.
cap. 156.

si præsertim agro producitur. Hodie nusquam ferè non feritur in hortis, eaque vt semel comprehenderit, tam pertinaci fertilitate cohæret, vt vix vnquam possit radicitus extirpari, vsque adeo restibili fœcunditate regerminans. A Cordo verò prolixè admodum & curiosè describitur, his ferè verbis. Glycyrrhiza ab vno radicis capite caules emittit, virgis Althææ similes, binum ternumue cubitorum altitudine, prope terram minimi ferè digiti crassitudine, teretes, solidos, lignosos, in viridi subflavos, intus fungosa medulla plenos, inferne tactu asperos, ex interuallis inæquali ordine surculos proferentes, in quibus folia alatham figuram referunt, vtrinque quina, sena, & nonnunquam septena, pari ferè interuallo distantia, ea ratione vt bina semper in vno exortu coniungantur, atque breuib. admodum pediculis ex aduerso opponantur, prominente in summitate surculi recto folio in reliquo surculo, foliorum pari numero, impari autem vno hoc efficiente. Singula folia sesquiuncialem longitudinem habent, latitudinem vncia minorem, aut vncialem, quædam etiam nonnunquam maiora. Eadem sub crassa, pingua, glutinosaque sunt vtraque parte, ideoque tactu digitis adhærentia. Inest præterea iis peculiaris quædam natura, & cum paucis communis. Oriente sole singula folia in latitudinem primum æqualiter explicantur, mox vna cum ascendente sole eriguntur, atque interdum sursum omnino rigent, & vna cum surculo cymbam, aut nauium carinam forma referunt. Occidente sole rursus se demittunt, demissaque pendent. Quinetiam aëris constitutionibus reguntur. Nam si dies sereni fuerint, interdum eo modo quo dictum est, erecta sunt, pluuiosis verò, nubilis, tristibus, & frigidioribus diebus, etiam æstate, atque ipso meridie se demittunt: quæ de foliis tantum intellige, non de eorum pediculis, quorum positus neque a sole, neque ab aëris constitutione mutatur. E summis caulium alis oblonga quædam, dissecta, & veluti aculeata prodeunt capitula. (Hæc Dioscoridem pilulis Platani comparare, fructus improprie appellando, perperam scripsit Cordus, non enim huiusce,

huiusce, sed superioris Glycyrrhizæ fructus cum Platani fructibus confert.) ea se paulatim in quadrantalem, & nonnunquam in quincuncialem pediculum extendunt, vndique vsque ad summitatem parvis floribus, oblongis, papilionum alis similibus, & colore in candido, cæruleoque purpurascens, circumdatum, ex quibus vncialis, gracilis, subrubens, atque in latitudinem compressa prodit exigua siliqua, tribus, aut quatuor oblongis seminibus grauida, vel, vt Dodonæus ait, circa graciles pediculos flores & parvæ siliquæ proueniunt, spicarum effigie, vt in Galega, & Vicia sylvestri, non vt rotunda capitula, hirsuta, quæ ex pluribus parvis siliquis echinatis constant, Platani pilulis similia, quemadmodum in superiore Glycyrrhiza. Diu frutex hic viret, antequam folia amittat, quæ postea cum florum defluuij tempus aduenerit, non singillatim, sed vniuersa simul vna cum pediculo decidunt, & illi etiam postquam deciderint, adhærēt. Radice nititur superne trunco simili, quo vetustior fuerit, eo crassiore, plerumque crassitudine pollicari, inferne in multas longissimas radices quaquaversum in obliquum exeuntes distracta, quæ arenosum solum, aut arenam tantum nactæ, duarum orgyrum longitudinem excedunt. Substantia eis est neruosa, flexilis, distractu difficilis. Ideo cum inter effodiendum extrahuntur, raro abrumpuntur, maximè solo arenoso. Colorem habent foris in spadiceo, aut subruffo pallentem, intus buxum. Superior radice pars, à qua modo dictæ exeunt, & quæ veluti truncus, seu caput earum est, peculiare, & à prioribus diuersas emittit radices, minimi digiti crassitudine omnino transversas, Asparagis similes, sub terræ superficie quoquo versus serpentes, quæ cum in cubitale, bicubitale, & interdum longius spatium progressæ fuerint, acuminato germine è terra emicant, & caules producunt, qui sequenti anno deorsum obliquas demittant radices, quales descripsimus, flaccescentibus postea, & pereuntibus iis à quibus ortæ sunt, transversis radicibus, quibus veris tempore in candido pallidus est color, substantia autem tenera, succosa, fragilis: ab æstate deinde in Autumnum superficies earum in fungosum corpus mutatur, interior verò pars obliquarum radicum modo in neruosam, minus tamen firmam, aut lentam, & colore buxam substantiam transit. Saporem radices habent valde dulcem, imo etiam Saccharo dulciorem, modicè astringentem, & subacrem, cui etiam iuncta est minima quædam amaritudo. Colitur in Germania lucris causa, præsertim Bambergij in Franconia, vbi maximus est eius prouentus. Ex his Glycyrrhizam Dioscoridis, eiusque aliud à Matthiolo, & Dodonæo proditum genus omnibus fore notissimum arbitror. Plinius in describenda Glycyrrhiza Dioscoridem secutus est, nisi quod eam inter aculeatas plantas falsò retulit. Et ipsa, inquit, sine dubio inter aculeatas est, foliis echinatis, pinguibus, tactuque gummosis, fruticosa, binum cubitorum altitudine: flore Hyacinthi: fructu pilularum Platani magnitudinis. Et alio in loco. Quædam spinosa foliata sunt, vt Carduus, Eryngium, Glycyrrhizon, Vrtica. Horum enim in omnibus foliis inest aculeata mordacitas, Cuius erroris causam Matthiolus, Cordus, Cornarius mendoso, quo Plinius usus est, Codici imputant, quod *φύλλα ἰσικότα ἐχίνω* facile lubricoque non aduertentium lapsu, falsò legerit, cum Dioscorides rectè habeat *ἰσικότα χλίνω*, id est similia Lentisco. Nec sunt audiendi qui ne desciscant à Plinij sententia, credunt Glycyrrhizâ spinis olim fuisse præditam, verum mangonio longi cultus edomito rigore tandem mitigatam. Nam diligentia, opinor, minores innocentioresque spinas reddere potest, in totum abolere minimè. Scythica planta Theophrasti nihil aliud est quàm Glycyrrhiza Germanica secundo loco descripta, frigidas etiam regiones, qualis est Scythia, minimè respuens, sic dicta, quod eius usu aliquot dies sitim famemque tolerare Scythas posse

Ibidem.

Locus.

Lib. 22. c. 9.

Lib. 21. c. 15.

Lib. 3. Dioscor. cap. 5. In Diosco. lib. 3. cap. 7. Embl. 5. lib. 3. Dioscor.

Scythica planta.

- posse auctores tradant, de qua tamen & de Hippice Plinius tanquam diuersis
 seorsum à Glycyrrhiza tractat. Sed quæ de ea scripsit cum à Theophrasto sum-
 pserit, omnesque quas Scythicæ Theophr. vires tribuit, ipse Glycyrrhizæ assi-
 gnauerit, ut dicemus, hinc perspicere potuit, eandem esse Theophrasti Scythi-
 cam, cum aliorum Glycyrrhiza: Γλυκεῖα δὲ ἢ σκυθικὴ, inquit Theophr. ἢ ἐνίοι γε κα-
 λῶσιν γλυκυρρίζαν αὐτὴν (sic enim ex vetusti Codicis fide legendum) γίνεσθαι δὲ παρὰ
 τὴν μαζῶτιν, χρησίμισε πρὸς τὰ ἀσθματικά, & βῆχα ξηράν, & ὅλως τὸς περὶ τὸν θώρακα πόνους,
 ἐπὶ δὲ πρὸς τὰ ἔλκη ἐν μέλει. διώεται δὲ τὴν δόξαν πάντων, ἐάν τις ἐν τῷ στόματι ἔχῃ διὰ τὰύτην
 δὲ ἢ τῇ ἱππακῇ διαγῆν φασὶ τὸς σκύθας ἡμέρας ἢ ἑνδεκά, ἢ δώδεκα. Id est, Dulcis quidē
 & Scythica est, quam nonnulli Glycyrrhizā appellant. Ad Mæotim nascitur.
 Vtilis est asthmati, tussi siccæ: denique thoracis malis. Præterea vlceribus cum
 melle prodest. Sitim sedat, si in ore habeatur. Quapropter Scythas contentos
 ea & Hippace vndecim, aut duodecim dies vitam sustinere aiunt: quem locum
 permirum est quam supinè atque peruersè Plinius vertisse, & intellexisse vi-
 deatur. Inuenere herbas & vniuersæ gentes, inquit Plinius. Scythia primū eam
 quæ Scythice vocatur, circa Bæotiā nascens, prædulcem alias, vtilissimamq; ad
 ea quæ asthmata vocant (nam ex vetere Codice, & Theophrasto sic legendum,
 non ut in vulgatis exemplaribus, prædulcis. Aliam vtilissimam ad ea quæ spaf-
 mata vocant) Magna & ea commendatio, quod eam in ore habentes famem si-
 timque non sentiunt. Idem præstat apud eos Hippice dicta, quod in equis
 quoque eundem effectum habeat. Traduntque his duabus herbis Scythas
 etiam in duodenos dies durare in fame sitique. Hæc Plinius, qui circa Bæotiam
 nasci Scythicam scripsit, Theophr. ad Mæotim: at huius erroris minimè Plinius
 est accusandus, sed mendosa exemplaria quibus ille utebatur. Ipsemet enim ali-
 bi Scythicam herbam à Mæotidis paludibus portari scripsit. Ad hæc Hippacen,
 id est caseum equinum in ciborum necessitate pro alimento Scythis esse, sicut
 delinitam Glycyrrhizæ radicem pro potu in aquarum penuria, vagantibus per
 aridas vastasque solitudines iis populis. Plinius verò ex Hippace, id est caseo
 equino Hippicen herbam confinxit, addita perinde absurda etymologia, quod
 scilicet equorum famem sitimque sedaret. Hippacen alibi de hac eadem re scri-
 bens rectè vsurpasse videtur. Quædam inquit, rursus exiguo gustu famem ac si-
 tim sedant, cōseruantque vires, ut Butyrum, Hippace, Glycyrrhizon. Idem ipse
 Hippacen caseum equinum esse dixit. Sestius eosdem effectus equino, quos
 bubulo tradit. Hunc vocant Hippacen. Alibi coagulum equi sic vocari idem
 scribit. Equi coagulum, inquit, quod aliqui Hippacen vocant. Gazæ errandi oc-
 casionem præbuit Plinius, vterque Hermolao. Ille enim Hippacen equestrem
 herbam interpretatus est: hic differre Hippacen ab Hippice scribit, quod Hip-
 pace caseus, & coagulum sit, Hippice verò herba Scythica, equestris à Theodo-
 ro dicta. Glycyrrhiza plurima, inquit Dioscor. gignitur in Cappadociā & Pon-
 to. Præstantissima in Cilicia, auctore Plinio, secunda in Ponto, radice dulci, &
 hæc tantum in vsu. Capitur ea Vergiliarum occasu, longa ceu vitis, coloris bu-
 xei. Melior, quæ nigra, quæq; lenta, quàmque fragilis. Prouenit in Italia, & Ger-
 mania, ut dictum est. Est & alia Glycyrrhizæ sylvestris species, Lobellio Glaux
 vulgaris, Cordo Polygalon, Gesnero, Glycyrrhiza sylvestris à consimili radicis
 sapore: radice crassa, longa, ramosa, nigra, lignosa, caulibus multis, ima parte ru-
 bentibus, rotundis, per terram sparsis, gustu dulcibus, odore, saporeque Glycyrr-
 rhizæ, quæ in hortis nostris alitur, similibus. Quam ob causam Glycyrrhizam
 sylvestrem vocant: flore Lentis, copioso, in luteo palescente: siliquis angulo-
 sis, curuis, & falcatis, semine Lenticulæ. Tragus pro Fænogræco sylvestri descri-
 psisse ac depinxisse videtur. In vmbrosis sæpius subaltis sæpibus gignitur non-
 nunquam

nunquam & in apricis. Glycyrrhizæ succus, auctore Dioscoride, in arteriæ scabritia efficax habetur: verum oportet, vt linguæ subditus eliquescat: æstuantî stomacho, thoraci, ac iocinori conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renum dolores cum passo potus: idem eliquatus sitim sedat: vulneribus illitus accommodatur: commanducatus stomacho prodest: recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygiis commodè inspargitur.

Vires.
Lib. 3. ca. 5.

GLYCYRRHIZA

glycestris.



Plinius similia ferè omnia habet, quibusdam additis. Vfus in linguæ subditis: sic enim legendum, Plinio Hypoglottidas ita appellante, decoctæ ad tertias, cætero ad mellis crassitudinem, aliquando & tusa: quo genere & vulneribus imponitur, & faucium vitiis omnibus. Item voci utilissimo succo, sic vt spissatus est, linguæ subdito. Item thoraci, iocinori. Hac diximus sitim famémque sedari. Ob id quidam ad ipsam appellauere eam, & hydropicis dedere ne sitirèt. Ideo & cõmanducata stomatice est, & vlceribus oris inspergitur sæpe, & pterygiis. Sanat & vesicæ scabiem, renum dolores, condylomata, vlcera genitalium. Dedere eam quidam potui in quartanis, drachmarum duarum pondere, & Piperis vna, hemina aquæ. Commanducata sanguinem ex vulnere sistit. Sunt qui & calculos ea pelli tradiderunt. Hactenus Plinius, qui sicut errore deceptus ἐχίνω pro χλινω in Dioscoride legit, sic in eodem Dioscor. falso nunc legitur succum Glycyrrhizæ esse

Lib. 12. c. 9.

Lib. 12. c. 54.

τομαχικὸν διαμασώμενον, vt rectè mihi anno-

Emb. 5. li. 3.
Dioscor.

rasse videtur Cornarius, contra rectè in Plinio, Ideo & commanducata stomatice est, Nam qui suprà dixit, ad ardorem stomachi facere, nunc ait stomaticum esse medicamentum, tum ipsam, tum eius succum. Cæterum quod idem scribit Glycyrrhizæ radicem capi, vel carpi, Vergiliarum occasu, longam, ceu Vitis, coloris buxei, Dioscorides longam esse inquit, & coloris, sicut Gentianæ, buxei. Huius fruticis radicem succus, Galeno imprimis utilis est, perinde vt radix, dulcis, simulque leniter adstringens. Proinde asperitates lenire potest, nec modo in arteria, verum etiam in vesicæ scabie, idque temperaturæ mediocritate. Quocirca fuerit sanè natura eius familiaris nostræ temperaturæ: nam tale monstratum est esse dulce. Sed cum adstrictio quædam adiuncta sit, vniuersum eius temperamentum, quantum ex caliditate & adstrictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quam proximè accedens ad temperatum. Porro quoniam temperie quoque est humidum id quod

Li. 6. simpl.

modice est dulce, iure etiam siti congruens medicamentum est,

nimirum modicè humidum, simulque humana natu-

ra frigidius. Refert Dioscorides radicem siccam

ad læuorem redactam oculorum Ptery-

gij idoneum esse illitu

medicamen-

tum.

LIGV

Nomina



LIGVSTRVM Latinis, Græcis *κύπρος* appellatur hic frutex, Arabibus *Kenne, Henne*, Officinis *Alcanna*, Italis *Guistrico*, *Oliuella*, *Oliuetta*, & *Chambrossena*, Patauinis *Conastello*, Gallis *Troesne*, Germanis *Rheinweiden*, *Beynholtzlin*, & *Mundholtz*, Hispanis *Alfena*, seu *Alhena*, Boemis *Piacij*, *Zob*, Anglis *Pryuet*, Belgis *Keeleruyt*, & *Mondthoudt*. Ligustrum fru-

Forma.

tex est, seu arbuscula, virgas producens multas, graciles, lentas, flexilisque. Circa has folia Oleæ similia, latiora, molliora, & colore viridiora. In harum cacumine flores proueniunt candidi, muscosi, vel vt Oribasius legit, racemosi, odorati, sed

LIGVSTRVM.



Lib. I. Diosc.
cap. 107.
In li. I. Diosc.
scor. ca. 25.

Lib. I. c. 24.

Lib. 3. c. 27.
Enar. II. 4. li.
I. Dioscor.

In Hist. pl.
cap. 181.

Li. 12. c. 24.

Lib. 6. Hist.
cap. 25.

In Enar. A-
mat. II. 4. li.
I. Dioscor.
Li. 24. c. 10.

Li. 12. c. 24.

qui decerpti statim flaccescant. Oriuntur ex eis bacca racematim coherentes, Pyramidis figura, Sambucinis similes, nigrae, Hederæ bac-
cis minores, læuiore, nigriore, sapore amaro ac iniucundo, purpureo intus succo. Tale est Matthioli, & permultorum Herbariorum Ligustrum, siue Cyprus, quibus assentitur Cordus. Ligustrum, inquit, sine dubio arbuscula est, quæ Græcis Cyprus vocatur: propterea Plinium idem scripsisse nunquā pœniteat. Ruelius, Ligustrum apud nos eandem arborem esse ait, quæ in Oriente & Græcia Cyprus, Gallis *Troesne*, Officinis tum *Alcanna*, tum *Henne*. His *Tragus*, & *Amatus Lusit.* consentiunt, quia Ligustrum omnibus suis notis Cyprus Dioscoridis refert, foliis circum ramos Oleæ similibus, latioribus tamen, mollioribus, ac viridioribus, gustu adstringentis: flore candido, muscoso, odorato: fructu nigro, Sambucini æmulo. Præterea, inquit Matthiolus, nullus est medicus qui nesciat Ligustrum iis omnibus præditum esse virtutibus, quibus Cyprum pol-
lere Dioscorides & Galenus prodiderunt. Alij

Ligustrum & Cyprum diuersas esse stirpes censent, Fuschius quo nomine Ligustrum Græcis appellatum sit, certò nobis constare negat: neque enim vt ferè omnes hodie putant, Cyprum esse, quæ Plinio teste semen habet Coriandri, & arbor peregrina est. Ligustrum enim semen non Coriandro simile, quod rotundum ac subflauum est, sed potius atrum, & altera parte latum, modicèque concavum in racemis profert. Præterea arbor peregrina non est, sed sponte in sepibus & senticetis ubique prouenit: Phillyream, itaque Dioscoridis potius esse Ligustrum is arbitratur. Dodonæus eandem plantam quam Fuschius ostendens, Phillyream Dioscoridis vocat, Plinijq; Virgilij, Columellæ Ligustrum. Anguillara quoque eam, Ligustrum Latinorum esse non negat, sed Cyprum non esse contendit, Ligustrum autem Phillyream Græcorum esse. Lonicerus quoque Ligustrum Latinorum Dioscoridis Phillyream esse ait, & Phillyreæ apud Dioscoridem descriptionem Ligustro nostro pulchrè conuenire. Horum igitur sententia Ligustrum ea stirps erit, quàm hîc pinximus, Cyprus autem minimè. Constantinus idem esse Ligustrum & Cyprum existimat, sed quid sit ignotum esse his nostris temporibus, à Plinio quidem Cyprum Ligustrum dici his duobus locis. Prior est. Ligustrum eadem arbor est, quæ in Oriente Cypros. Suos in Europa vsus habet. Succus eius neruis, &c. Alter est, Cyprus in Ægy

in Ægypto est arbor Ziziphi foliis, semine Coriandri, flore candido, odorato. Coquitur hic in Oleo, premiturque postea quod Cyprinum vocatur. Pretium ei in libras x. (id est, denarij) quinque. Optimum habetur è Canopica in ripis Nili nata: secundum Ascalone Iudeæ: tertium Cypro insula odoris suauitate præcipuum. Quidam hanc esse dicunt arborem, quæ in Italia Ligustrum vocatur. Sed Dioscor. Cyprus folia habet Oleæ, Ligustrum Plinij Ziziphi, & semen Coriandri, Dioscoridis verò Sambuci. In flore etiam vix conueniunt, cum Dioscoridi muscosus sit, Plinio tantum albus & odoratus. Quare Cyprus Dioscoridis à Cypro, siue Ligustro Plinij dissidet. In hoc solum hi duo auctores consentiunt, quod vterque dicat esse arborem: qua vel sola nota ab huius consortio excluditur vulgaris hæc planta, quam cum multis aliis pro Cypro & Ligustro ostendimus, quod hic frutex sit tantum in sæpibus frequens, vix vquam arborescens. Non erit igitur Cyprus Dioscoridis, aut Plinij, Ligustrum, imo nec Columellæ, qui dixit. Et nigro permista Ligustro. Balsama, Cyprum siue Ligustrum, id est Arabum Alcannam, arborem raram esse, & inter pretiosa simplicia semper adnumeratam probatur testimonio Iosephi, cuius hæc verba sunt, cum de valle Hierichuntina loquitur: *φέρει δὲ ὀπὸς ἑλσαριον, ὅδη τημιώ ταιλον τῶν τῇ δεκαρπῶν, κύπρον τε, καὶ μυροβάλανον.* Et subiungit, *εἶναι παλαιά ταιλα καὶ κάλαιστα.* Cyprus, inquit diuus Hieronymus, cum Nardo, Nardus & Crocus, fistula & Cinnamomum cum vniuersis lignis Libani. Hæc Constantinus. Quia verò Alcannam Arabum Cyprum illam raram, & nobis ignotam esse ait, quid de ea alij sentiant exponamus. Qui Arabas scriptores Latine interpretati sunt, Henne, siue Alcannam Cyprum verterunt, Serapionis, opinor, auctoritate freti, qui Henne, siue Alcannam nihil aliud esse vult quàm Cyprum. Henne, id est Alcanna, inquit, Isaac Ebenamram, flos Alcannæ est, similis floribus Myrti, nisi quia est velut in racemis, & flos eius est albus, decliuus ad glaucedinem, acuti odoris. Dioscorides. Est arbutum habens folia super ramos suos, & cætera, quæ hic citare superuacaneum foret, cum sint ea omnino quæ Dioscorides & Galenus de Cypro scripserunt. Auicennæ interpretes Alcannam etiam Ligustrum vocat, cui Auicennas easdem virtutes tribuit, quas Dioscorides & Galenus Cypro inesse tradiderunt. Bellonius Henne, siue Alcannam arborem in Ægypto nasci prodidit, eoque à Ligustro diuersam, quòd huius folia hyeme decidant, illius verò minimè. Alio in loco fruticem, siue arbusculam esse ait, quam Latini Arabum interpretes Ligustrum falsò vocant, quod ab illa Ligustrum differat. Henne igitur ad Mali Punicæ proceritatem assurgere: sed quia crebro ab Ægyptiis ceditur, & diligenter colitur, virgas sæpius tenues, vt vimina producere. Folia eius siccari in farinam, luteo colore tingentem, quo cum valde delectentur omnes qui Turcarum imperio parent, atque aliæ etiam gentes, adeo vt mulieres eo colore manus, pedes, crura obscænas partes ad vmbilicum vsque infici pulchrum, ac decorum existiment, maximum ex hoc puluere vectigal colligere Turcarum Imperatorem. Quanam igitur tandem hæc erit stirps quam pro Ligustro proponimus? fortasse, inquit Constantinus, Ligustrum Virgilij. Qua de re minimè ambigunt citati iam à me auctores, qui hoc nostrum Ligustrum Dioscoridis Cyprum esse autumant, in eoque Seruium Grammaticum reprehendunt, qui illo Virgilij versu,

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.

Ligustrum eam Cauioluuli speciem esse scribit, flore candido, Lilij, seu Calathi effigie, quæ vicinis sese circumuoluit. Sunt etiam qui Ligustri baccas à Virgilio Vaccinia nigra vocari putent. Sed non rectè illi quidem sentiunt, inquit Matthiolus, nec etià Fuschius qui Rubi mora, quæ Græcis *βελίνα*, & *βατίνα* dicuntur,

In Hist. pl.
cap. 55.

à Virgilio vnus literæ immutatione Vacinia vocari scripsit. Vaccinium enim pro flore non pro fructu vsurpari constat, inquit Matthiolus. At cum in nothis Dioscoridis stirpium nomenclaturis legamus Hyacinthum Romanis Vaciniū dici, credendum Vaccinium Virgilij Hyacinthum esse, flore cum Violis purpureo colore certante, qui cum ab aliis, tum ab ipso Virgilio niger appellatur, Vacinia cum floribus, non cum fructibus numerante, his versibus:

Eclo. 2.

Alba Ligustra cadunt, Vacinia nigra leguntur.

Mollia luteola pingit Vacinia caltha.

Eclo. 10.

Et nigra Viola sunt, & Vacinia nigra.

Li. 1. ca. 107.

Li. 12. c. 24.

Locus.

Tempus.

Lib. 1. c. 107.

Oleum Cy
prinum.

Li. 24. c. 10.

Embl. 103.
lib. 1. Diosc.

Li. 12. c. 24.

Ibidem.

Lib. 2, c. 4.

Quidam Vaccinium aliam ab Hyacintho plantam, arbusculam nimirum bac-
cis nigris à Virgilio intelligi credunt, de qua proximo capite dicitur Matthioli
sententiæ accedit Vvlichius, & Vaccinium in Virgilio Hyacinthum interpre-
tatur, flore purpureo, quem vulgo brunum appellant, Græci φαῖδον, cum nigro
aliquid ruboris admiscetur. Plautus morulum appellare videtur. Nec placet
Marcelli opinio, Vaccinium Irim esse putantis. Nam neque Iris in coronas ve-
niebat, neque color respondet, quod varius sit, adeo vt à colorum cælestis ar-
cus varietate nomen inuenerit. Adhæc cū Iridis flos maximè fragilis, cadu-
cūque sit, Poëta Ligustro non prætulisset. Sed ad Ligustrum nostrum redeat
oratio. Id optimum nasci in Canopo & Ascalone scribit Dioscorides. Plinius
optimum haberi è Canopica in ripis Nili nata, secundum Ascalone Iudææ, ter-
tium Cypro insula. Nihil frequentius Ligustro nostro in Dumetis occurrit, ita
vt hoc nomine contemnatur. Qua propter Virgilius eius flores negligi à pa-
storibus, & inutiliter perire cecinit. Maio mense floret, Autumno maturæ bac-
cæ nigrescunt. Folia adstrictoriam vim habent, inquit Dioscor. Quare com-
manducata oris vlceribus medentur: illita feruidis inflammationibus, carbun-
culisque profunt: decocto eorumdem igni ambusta fouentur: capillum rufant
trita folia, quæ in radiculæ succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus capitis
dolorem sedat. Cyprinum Oleum quod ex eo fit odoratū est, excalfacit, emol-
litque neruos, si quæ feruenti natura sunt assumat. Quas sex postremas voces
Græci Codices, neque Cornarius in translatione sua habent. Quare has ex Olei
Cyprini compositione, quæ ex quibusdam natura calfacientibus constat, adie-
ctas fuisse credibile est. Ligustrum eadem arbor est, quæ in Oriente Cypros, in-
quit Plinius. Suos in Europa vsus habet. Succus eius neruis, articulis, algoribus:
folia vtrique veteri vlceri cum salis mica, & oris exulcerationibus profunt. Aci-
ni contra phthiriasim, item contra intertrigines, foliæ. Sanant & gallinaceo-
rum pituitas acini. Cornarius annotat hoc loco in vetusto Pliniano exemplari
coniunctionem, si, haberi, quæ in vulgatis deest: perinde ac si ambigat, an Ligu-
strum sit Cyprus, quemadmodum alio loco Cyprum in Ægypto dictam, à qui-
busdam in Italia Ligustrum vocari tradit. Deinde acinos hic dici quos alio lo-
co semen Coriandri dixit, Dioscor. verè, semen nigrum, Sambuci fructui simile.
Plinius alio loco de Cypri viribus hæc scribit. Cypri natura excalfacit, mollit
neruos. Folia stomacho illinuntur, & vuluæ concitata: succus quoque eorum
apponitur. folia recentia commanducata vlceribus in capite manantibus, item
oris medentur, collectionibus & condylomatis. Decoctum foliorum ambustis
& luxatis prodest. Ipsa rufant capillum tusa, adiecto Struthei Mali succo. Flos
capitis dolores sedat cum aceto illitus. Idem combustus in cruda olla nomas sa-
nat, & putrescentia vlcera per se, & cum melle. Odor floris suauis, & qui somnū
faciat. In quibus de foliis Cypri dicit, Ipsa rufant capillum tusa, adiecto Stru-
thei Mali succo, quod Dioscorides, ξανθὸς δὲ τὰς τεύχας τρυθίου χυλῶ τὰ φύλ-
λα λεῖα βραχύντα, καὶ ἐν χειμάτεσσιν. Ex quibus perspicuè apparet deceptum fuisse Pli-
nium

nium, qui pro $\epsilon\rho\sigma\theta\iota\varsigma$ $\chi\upsilon\lambda\omega$, id est pro Radiculæ, siue Herbae lanariæ succo, Struthi Mali Cotoneorum generis succum accipit. Neque Constantino assentior, meritò reprehendi ad Amato Marcellum & Ruellium scribenti, quod cū succo Lanariæ herbae, non cum succo Struthi Mali & foliis Cypri rufari capillos interpretati sunt. Cypri arboris folia, summâque germina, inquit Galen. in vsum veniunt, facultatis & qualitatis mixtæ. Habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modice calida, habentque etiam quiddam adstringens ex terrea substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam ambusta fouent. Utuntur etiam aduersus igneas phlegmonas, & carbunculos: nam absque molestia & morfu desiccant. Quinetiam sponte prouenientibus in ore vlceribus aphthis cognatis, & ipsis aphthis mansa commoda sunt. Fit ex Ligustri floribus oleum, inquit Matthiolus, cum oleo insolatis, quod ad vulnerū inflammationes plurimum valet, & ad capitis dolorem à bile ortum. Destillatur ex iisdem floribus aqua non inodora, ad ea utilis quæ refrigerationem adstrictionemq; postulant. Eadem pota, cœliacis, dysentericis, & cæteris alui fluxionibus affectis auxiliatur. Vteri fluxiones inhibet, tum pota, tum supposita. Datur vtiliter potanda sanguinem reiicientibus. Oculorum fluxionibus per se, aut cum Pompholyge medetur.

Ibidem.
Enar. II. li.
1. Dioscor.

Li. 7. simpl.
Tempera.
& Vires.

Lib. I. Dio-
scor. c. 107.

VACCINIVM PLINII, CAP. LXI.

SUNT qui plantam, cuius figuram hic proponimus, Vacciniū Plinij, Theophrasti verò Lacatham arborem in Macedonia planis nascentem esse suspicantur. In sœpibus gignitur, sœpius humilis frutex, nonnunquam arborefcens, ad magnitudinem Mali Punicæ crescit, ramosa, & furculosa arbuscula, minimè spinosa, radicibus crassis, multis, brachiatis: caudice cum arborefcit plerumque intorto, cortice, rimoso,

Nomina
Lib. 16. c. 18.
Lib. 3. Hist.
cap. 4. & 7.
Locus.
Forma.

VACCINIVM PLINII, *Lacatha Theophrasti.*



scabro, subcinereo, ramorum verò cortice ex cæruleo nigricante, ac læui, colore oculis non ingrato: folio Pruni sylvestris, lætius & pallidius virente, venoso: flore albo, suauissimè olente ex quatuor foliolis composito, filis intus candidis, apice rubro coronatis: baccis nigris, rotundis, gustu subamaro, non tamen insuauis, succo plenis purpureo, qui expressus linthea, coriâque munda, & candida, floridissima purpura tingit, colore nec fugaci, nec caduco, sed diutissimè permanente, nucleis, Cerasorum nucleo odore & sapore similibus, ossiculo similiter Lacunato inclusis, ex quibus oleum conficitur iucundi odoris, quo ad illinendas, manicas vtuntur. Baccis istis maturis turdi, merulae aliæq; auiculæ avidissimè vescuntur. Quamobrem Italia ad eas alliciendas sœpes ac Dumeta Vacciniis conferebat. Plinius. Item Vaccinia Italiæ in aucupiiis sata: Galliæ verò etiam purpurea, tingendi causa, ad seruitiorum vestes. Nonnulli hunc fruticem Chamæcerasum, siue sylvestrem Cerasum esse

Lib. 16. c. 18.

existimarunt. Verùm à quouis Ceraforum genere differt, florescendi celeritate paruulis foliis, fructus amarore, apicibus in flore rubris, in Ceraso luteis. Fructus quidem Cerasi sylvestris esset, nisi breuiore pediculo niteretur, ac minor foret, quippe qui Pisi magnitudinem non excedat. Hyacinthum Romani Vaccinium vocant, rura nostra hodie *Vaciet*, in quo nomine, quia pristini vocabuli quædam rudimenta relucet, quasi Vacinium & Vaccinium innuant, Ruellius Vaccinium Hyacinthū esse arbitratus est, à quo planè dissentio. Nam hæc Hyacinthi appellatio in iis habetur, quæ Dioscoridi falsò sunt adscriptæ, & incerta est, fallaxque coniectura ex sola nominum affinitate sumpta: neque etiam Hyacinthi vllus ad aucupia vsus esse excogitariue potest, neque Hyacinthi flores, quatumuis eos manibus teras, purpureo succo digitos inficiunt. Præterea Vaccinium à Plinio inter arbores, non inter herbas numeratur. Quod si quis Hyacinthum ideo Vaccinium appellatum fuisse contendat, quod eius flos veluti Vaccinij succo imbutus purpureo colore niteat, huic non valde repugnauerim. Sed ab hoc, Plinij Vaccinium, quo de hîc agitur, longe diuersum esse dico. Non desunt etiam qui Vaccinij nucleos ex Oriente aduectos pro nucleis Mahaleb ostendant, & vendant. Tamen Mahaleb de qua nos antea tractauimus, longè alia est arbor. Vaccinium in sæpibus ferè semper, vt dictum est, prouenit cum Ligustris. Quam ob causam Virgilius fortasse eodè versu coniunxit:

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.

VIBURNVM, SPIRÆA THEOPHR.

CAP. LXII.

Lib. I. Dioscor. c. 124.

Nomina

Ecl. I.

Forma.



RUTEX hic qui ab Italis *Lantana*, & *Viburno*, appellatur, Germanis *Schlingbaum*, maximè lentus est, obsequiosus, flexuq; inuictus, quale esse Viburnum Virgilius cecinit hoc carmine:

Quantum lenta solent inter Viburna Cupressi.

Ramos edit digitali

VIBURNVM,
Spiræa Theophr.



Locus.

In Lexi.

Lib. I. Hist.

cap. 23.

Lib. 6. Hist.

cap. I.

crassitudine, bicubitales, folia Vlmea, incana, & hirsuta, paribus internodiis & aduersis pediculis coniugatim adhærentia, per ambitum tenuissimè ferrata: florem album, velut in umbellam coaceruatum, à quo acini prodeunt lentium modo compressi, primum virides, deinde rubri, postremò nigri: radices per summa cespitum vagantur. Virgæ adeo flexiles, lentèque sunt, vt ad fasciculos colligandos iis vtantur rustici. Nascitur in sepibus & frutetis, incultoque solo. Fruticem hunc *Spiræam* esse Theophr. primus animaduertit Dalechampius, cuius sententiam probauit Constantinus his ferè verbis. *Spiræa* frutex est lentus, & vitilis, ita vt in *Spiram* torqueri possit, vnde & nomen ἀπὸ τῆς σπείρας. Fructum fert in summitate racematim rubrū, & maturitate nigrescentē. Theophr. τῶν γαμινδῶν (ἀκροκάρπων) ἐρείκη, σπείρα, ἄγνος, id est, fruticū qui in cacumine fructū ferunt, *Erica*, *Spiræa*, *Vitex*. Alio loco corruptè scribitur σμηρέα, pro σπείρα, nec alij rectè σπείρα emendarunt: οἷον κισσὸς, μηλωθρόν, ἐραθέδανον, σπείρα, κνέωρον

κνέωρον, δέγγανον, &c. Sic etiam Plinius legit. Ergo in coronamenta folio venire Melothron, Spiræon, Trigonon, Cneorum, &c. Ruellius cum de Rhoe ex Dioscoride & Theophrasto scriberet, vt Rhoe quam non nouerat, in Lutetiæ suburbanis reperiret, fruticem depinxit, quem antea citra Historiam solo nomine Halini indicauerat, & à Gallis *Blancheputain* vocari dixerat. Idem apertissimè capite de Vite syluestri eam *Viorne*, & *Hardeau*, (à Gallica voce *Hard*, quæ vinculum & funē significat) nominari tradit: vt necesse sit aut Ruellium hæc obliuiofè & incogitanter confudisse, aut duas illas plantas æquè vocari à Gallis *Viorne*: quo nomine appellari iure possunt aliæ quæuis lentæ, flexiles, vietæ. Nam ruborem tantum etiamnū rustici ex baculis contortis & simul implicatis, spiras factas quibus clatros aditui suorum hortorum obiectos ligant, vocant nunc *Viorne*, nunc *Riorte*. An verò spirea Viburnum sit Virgilij, an potius Vitis syluestris, parum refert, cum vtraque planta, si cum Cupresso comparetur, humilis sit, & altitudine longe inferior. Flexilis tamen lentor Viti syluestri magis quàm Spirææ conuenit. Præterea obseruandum: quod Ruellius non animaduertit, Rhoe & Vitem syluestrem coriarias esse plantas, sed à Vite syluestri coria depfari, à Rhoe perfici. Nam plantarum id genus aliæ feruidæ & acres, vt Vitis syluestris, calcis modo: qua nostro sæculo vtuntur coriarij, tanquam Psilothro, pelles aqua maceratas, pilis nudant, & sic molliunt, vt subigi, radiolisque purgari ac exteri possint, quod depfare est. Aliæ deglabratas pelles, maceratas, emollitas, derasas sic rursus spissant, densant, durant, vt ad vsum calceorum, solearum, ocrearum, thoracum firmæ solidæq; sint, quod perficere est. Eiusmodi sunt Rhus, cortex Quercus, & Galla. Hoc quidem modo. Rhus sanè Coriaria est, altero, Vitis syluestris, & aliæ multæ plantæ, id quod Theophrastus scripsit his verbis: *ἡ ῥίζα. διὸ καὶ εἰς ψιλῶθρον χρησίμων, καὶ ἐφηλίδας ἀπαγφ(non ἐπάγφ) τῷ δὲ καρπῷ ψιλῶσι τὰ δέρματα (non δένδρα) τέμνεται διὲ πᾶσιν ὥραν, ὁ πῶρας δὲ μάλιστα.* Id est, Vitis syluestris radix acris est, & calfactoria, ideoq; ad psilothrum utilis: maculas in facie sole contractas delet: fructu coria depfantur. Cæditur quouis tempore, sed Autumno præcipuè. Absurdum est quod scribit Ruellius, acinorum & radicis huius plantæ naturam esse gelidissimam, cum feruidissima sit. Viburni folia aspera sunt, & adstringentia, auctore Matthiolo. Quare ad vacillantes dentes confirmandos valent, & ad gingiuarum rheumatismos, si eorum decocto cum Oleæ foliis in aqua & aceto dentes sæpè colluantur. Gargarizatur ad columellæ prolapsam, & ad faucium fluxiones. Vuarum acini ante maturitatem arefacti, in puluerem redacti, & poti alui profluuia sistunt. Ex radicibus sub terra maceratis, deinde decoctis, diuque tufis fit viscum ad aucupia, Folia in lixiuio decocta pilos denigrant, & fluentes inibent.

Lib.21. c.9.

Lib.1. c.125.

Lib.1. c.85.

Lib.3. c.163.

Ibidem.

Lib.9. Hist. cap.22.

Lib.3. c.152.

Vires.

Ibidem.

PHILYCA CAP. LXIII.

PHILYCA Græcis dicta, arbor hæc Dalechamptio esse videtur, Illyrici gentibus, Comoricha. Galli oppido S. Spiritus nuncupato, ad Rhodanum sito vicini, in quorum sepibus frequens hæc stirps gignitur *Alardens* vocant: Monspelienses sepplasiæ Phillyream, vt & Pena, Clusius tertium & quartum Phillyræ genus has duas plantas esse putat. De qua Theophrastus: *ἐντονὼ τατον διὲ φιλύκη, καὶ ἡ λευκότης ὥπερ τοῦ κηλάτρου.* Quæ sic Gaza vertit. Obedientissima

Nomina

Lib.1. Obs. cap.16.

PHILLYREA PENÆ

maior, III. Clusij, Alaternus
maior Dalechampij.



PHILLYREA MINOR

Penæ, & IIII. Clusij, Alaternus
minor Dalechampij.



PHILLYCA

Dalechamp.

Forma.



Philyca est, candorque ei Celastrî modo: rectius firmissima, sed legisse videtur *ἐυκαμπὴς*, siue *Ὀξύον*, vel quid simile. Philyca Ligustri est magnitudine, multum fruticosa, coma perpetua, caudicis cortice cinereo, rugoso: foliis Lentisco fere similibus, amplioribus, longioribus, carnosissimis, obscurè virentibus, gustu adstringentibus: fructu racematim congesto, antequam maturescat anguloso, cum maturuit, rotundo, nigro. Is constat pulpa tenera, succosa, gustu principio dulci, mox amaro, cum acrimoniæ tantillo, ac dum manditur suaue quiddam olente, quod cum baccarum Iuniperi odore comparari possit: Pulpæ subiectum est lignosum, sed valde tene- rum ac fragile putamen, nucleum contegens rotundum, gustu amarum. Huiusmodi est hîc depicta à nobis arbor. In Grammontio luco haud procul à Monspelio, ac in eius tractus saxosi glareosiq; sâpibus crescit.

CYTISVS,

CAP. LXIIII.



PRUTEX, non herba est, qui *κύθισος* Græcis dicitur, Latinis Cytisus à Cythno insula, in qua inuentus est, auctore Plinio, vnde translatus in omnes Cycladas, mox in vrbes Græcas magno casei prouentu: propter quod maximè miratur idem Plinius rarum esse in Italia. Est autem Cytisus, Dioscoridi, frutex albus in totum, vt Rhamnus, ramos spargens cubitales, sæpe maiores, in quibus folia fœnigræci aut Loti tri-

Nomina

Libr. 13. ca. 24.

Lib. 4. c. 108

CYTISVS MATTH.



CYTISVS TRAGI.




foliæ sæpe minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita Erucam olent, gustatâque Cicer recens sapiunt, quæ descriptio tam accurata non est, vt ex ea verus Cytisus cunctis innotuerit: diuersi enim auctores diuersos Cytisos exhibent. Ac primum Matthioli credidit aliquândo Cytisum eam esse Trifolij odorati speciem, quam Itali Trifolium equinum, quod equis gratissimum sit pabulum, vocant. Sed cum postea trifolium illud Loton urbanam esse deprehendisset, & Cytisum non herbam sed fruticem esse Myrti magnitudine apud Galenum legisset, imo inter arbores recenseret à Plinio, & Strabone, ipse sententiam suam retractans, aliam Cytisi plantam à Cortuso missam pingendam curauit, quam legitimū Cytisum notis omnibus referre putat, non solum foliis & totius plantæ colore, sed etiam ipsius ligni materie, quæ nigra est, & Ebeni modo firmissima, quod de Cytiso Theophrastus & Plinius tradidere. Hanc nasci copiosam audiit in Regno Neapolitano, ac etiam alibi fortasse gigni in Italis suspicatur, nusquam tamen ante à se visam. At hanc non Cytisum, sed Medicæ speciem esse autumant periti herbarij. Trago Cytisus pes milui pandectario, trifolij genus, nihil aliud est quam procerus & nodosus caulis, multis adnatis iisque geniculatis brachiatus, foliis vestitus Trifolij, fœnogræco quadâtenus similibus at maioribus, firmioribus, acutioribus & prolixioribus, per ambitum leuiter serratis, incanis, gustu Trifolium referentibus in agris sponte nascitur. Marcellus Empiricus Cytisum etiam sua sponte prouenientem describit his verbis. Herba vel frutetum, quod maximè circa sepes vinearum nascitur, Latine Cytisus dicitur. Virgultis est sub tortis vel curuis, foliis oblongis, bene virentibus: floribus conclusis, oblongis, albis vel galbineis, bene olentibus, idest mellito odore frutetum ipsum semper virens æstate atque hie-

In cap. 108. libr. 4.

Lib. 2. ca. 6.

me: quæ descriptio fortasse Tragi Cytisum-exprimit. Constantinus Scholiis in Dioscoridem Cytisum verâ se vidisse affirmat in hortis monasterij D. Germani Lutetiæ Parisiorum, omnibus Dioscoridis notis congruentem, vidimus ac rursus in hortis Franciscanorum Lugduni. Hunc eadem qua plurimas alias

CYTISVS GESNERI.



Lib. 13. c. 24.

CYTISVS ALPINVS

Dalechampij.



stirpes diligentia & fidelitate delineavit Dalechampus his verbis. Cytisus in hortis Franciscanorum Lugduni multos annos vixit, iniuria mortuus cum æstate feruidissima transferre coactus fuisset olitor, ob metum imminentium hostium subrutis eius sodalitijs hortis. Frutex est hominis fere altitudine, ramis multis, canis, folio fœnigraci, perpetuo, flore Pisi luteo, nigris maculis compuncto, semine Genistæ, siliquis abdito: radice pro fruticis proceritate, crassissima, alba, in profundum obliquè acta, carnosâ Raphani modo, tenera, gustu subdulci. Floret hyeme tota vsque ad vernum æquinoctium, æstate siliquatur, fructum Autumno perficit. Folia trita prorsus Erucam olent, & gustata Cicer recēs sapiunt. Quod florem edat hyeme, anni tempestate ad euocandos flores incômodissima, hæc esse potest causa, quam Constantinus Scholiis in Dioscoridem reddidit, nempe quod vegetali calore adaucto externi frigoris percussu, fructuosa alioqui planta, & obradicis teneritatem maximè obediens, cum minimè sit alsiosa (neque enim æstuum, neque frigorum, inquit Plinius, neque grandinum aut niuis iniuriam expauescit) vberius alimentum ad fruticandum proliciat. Cytisum cuius imago hîc appicta est, Conradus Gesnerus ad Dalechampium misit. Est autem, vt eius verbis utar, frutex *τριφυλλος*, sapore glutinoso maluæ, id quod in eo Galenus requirit. Alius Cytisi effigies sequitur, quem à natalibus Alpinum vocant. In Appennino crescit, frutex ad hominis proceritatem assurgens, interdum humilior, stipitibus multis, ramosis, foliis fœnigraci, aut Loti trifoliæ, trigeminis, ex ramorum quibusdam velut extantibus tuberculis prodeuntibus, gracili pediculo appensis, vno ex loco nonnunquam binis pediculis, nonnunquam ternis enascentibus, qui singuli terna folia sustinent. Flos in summis ramis est copiosus, luteus, vel pallidus, Pisi similis. Folia, surculi, denique totus frutex candicant. Pena cum diu anxius in Cytisi veri historia hæsitasset, subductis hinc inde rationum momentis, ac collatis

CYTISVS

prior Pena.

ramosas, è quibus folia terna oriuntur, (ea pictor omisit, binis tantum pictis,) maiora quam in priore Cytiso, rotundiora, ex atro virentia: flores Genistæ similes in summis cauliculis copiosi pusilli, lutei, densius stipati, quàm pro magni-

CYTISVS

alter Pena.

collatis variis plantis, tandem eum probatū iri credit candidis arbitris, quem vidit in via regia qua Roma Florentiam itur, in oppidulo cui nomen Aquæ pendulæ, declivi & depressa planitie feracissima nempe fruticem, quinque sexve cubitis proceriorem, Genistæ samentis pluribus, gracilibus, præduris, striatis, statim ab imo sese attollentibus, aut paullo supra lignosam radicem foliis ternis, pediculo subnixis, non ita numerosis, simili fœno-græco, angustioribus, habitioribus, rutaceis: flore Genistæ, vel Spartij, aut Pisi, luteo, sed minore: siliquis Genistæ paribus, cinericiis, gracilioribus, compressioribus, semine Genistæ, intus loculis discreto, ex atro virenti. Tota planta incana est, ut Rhamnus Mompelienensis. Sapor Ciceris aut similis leguminis. Alteram idem notiolem frequentiorēque, Italiæ & Galloprovinciæ exhibet, in squallidis saxosisque collibus inter Ilices cocciferas, & maiores Ericas virentem, florumque amœnissima copia oculos oblectātem, & capras pascentem æstatis initio. Sesquicubitales spargit is frutex virgas, tenues, lignosas,

CYTISVS

Hispanus Clusij.tudine

tudine fruticis, quo aduolant apum mellificantium examina: odor illi gratus: sapor alterius: siliqua, & semen minora. Hos frutices pro Cytisis periti herbarij proponunt. Post eos Clusius aliquot alios frutices recensuit, ad Cytisi genera referendos, vt putat. Primus ad arbusculæ magnitudinem crescit, interdum,

CYTISVS II.

Clusij Hispan.



CYTISVS III.

Clusij Hispan.



stipite duro, materia flavescente, medulla nigricante, maioribus ramis, & virgultis cortice candidate obductis Tenelli ramuli toti hirsuti sunt: folia numerosa ramos ambiunt, terna singulis pediculis hærentia Medicæ modo, dilutiore virore, sapore leguminum viridium, amaro tamen. Aliquot flores extremis ramulis ferè spicæ modo insident, Genistæ similes, lutei, nonnihil odorati: deinde siliquæ Genistæ figura, oblongæ, asperæ tamen, & hirsutæ, in quibus semen exiguum, tumidiusculum, nigricans, Genista minus: radix lignosa, in diuersa tendens. Secundus est duorum cubitorum duntaxat altitudine, fruticosus, virgas ferens prorsus candidas, tenues, ramosas, folia superiori similia, terna semper, ex singulis pediculis pendentia, sed minora, omnino incana, & nunquam expansa, sed ferè semper complicata, dorso prominente, impense amara: flores vt in superiore extremis ramis insident, eidem forma similes, sed colore nitidiori & plane aureo: siliqua itidem oblōga, aspera, mucrone deorsum inflexo ex nigro purpurascens: semine quàm in superiore paullo maiore, & subnigro: radix superiori similis. Vterque prouenit in Salmanticensi agro, & aliis vtriusque Castellæ locis, secus vias: florêt Iunio, semen edunt Iulio, & Augusto. Tertius pedalibus, & raro cubitalibus, assurgit ramulis, tenuibus, prorsus incanis, quos exornant folia terna, breui pediculo nixa, quorum medium folium dupla lōgitudine reliqua folia superat, colore cinereo, & incano, sapore adstringente, & linguam exsiccante. Ramusculi fere ab imo ad summum per singulorum foliorum exortus floribus onusti exeunt, binis, aut ternis, simul nascentibus ex vaginula quadam molli, & candida lanugine hirsuta, aureo colore fulgentibus, odore iucundo, simili cum superioribus forma, sed minoribus. Inuenitur in variis Hispaniæ locis, præsertim Batica, sed nusquam copiosior quàm in regno Valentino, vbi plurimus eius vsus. Nam qui bombyces alunt, eius ramos supra tegetes spargunt, quibus iam Mori foliis saturi bombyces stamina sua aduoluant, quæ deinde

CYTISVS IIII.

Clusij Hispanus.

gallinis, apibus, capris, bubus quoque, & omni generi pecudum utilissimus est, quod ex eo cito pinguescit, & lactis plurimum præbet ouibus: tum etiam quod octo mensibus viridi eo pabulo vti, & postea arido possis. Præterea in quolibet agro, quamvis macerrimo, celeriter comprehendit: omnem iniuriam

CYTISI FACIE

Alyssan quorundam Lobell.

deinde à mulierculis & pueris explicantur. Quartus, hominis est altitudine, oblongis virgis, non admodum fruticosus, neque obsequiosus, cortice nigrescente obductis: folia ei sunt Trifolij aut Medicæ, terna simul ex singulis pediculis, superna parte virentia, prona verò subrufa, lanugine hirsuta, sapore leguminum, amariuscule: flores ex alarum sinu quam in reliquis maiores, Genistæ similes, luteo auri colore. Solummodo ad montium radices circa Calpen, & Baticæ maritima, Februario florentem Clusius vidit. Cytisi folia auctore Dioscoride, refrigerant, tumores initio discutiunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu vrinam ciet. Nonnulli quod apes alliciat prope aluearia ferunt. Quod inquit Galenus, Cytisi folia digerendi facultatem obtinent aqueæ temperatæ mistam, sicut & Malux folia. Eius vero longe maximus fuit apud veteres vsus ad pecoris pastiones, & ad lactis fœtuūque prouentum, vt diligenter tradidit Columella his verbis Cytisum, in agro esse quam plurimū maximè refert, quod

Li. 4. c. 108.

Vires.

Lib. 7. sim.

Libr. 5.
cap. vlt.

sine noxa patitur. Mulieres quidem si lactis inopia premuntur, Cytisum aridum aqua macerari oportet, & cum tota nocte permaduerit, postero die expressi succi ternas heminas permisceri modico vino, atque ita potandum dari: sic & ipsæ valebunt, & pueri abundantia lactis confirmabuntur: &c. Eadem declarat Plinius, frutex est & Cytisus, inquit, ab Aristomacho Atheniensi miris laudibus prædicatus pabulo ouium, aridus verò etiam suum: spondetque iugero eius annua H-S. MM. vel mediocri solo redditus (alias mediocri soli redditu) utilitas quæ Eruo, sed ocyor satietas, per quam modico pinguescente quadrupede, ita vt iumenta hordeum spernant. Non ex alio pabulo lactis maior copia aut melior, super omnia pecorum medicina à morbis omni vsu præstante (alij legunt medicinæ in omni morbo. Alij medicinæ & morbis ouium.) Quin & nutritibus in defectu lactis aridum, atque in aqua decoctum potui cum vino (dari iubet, & firmiores celsioresque infantes fore. Viridem etiam gallinis, aut si aruerit, madefactum. Apes quoque

Li. 13. ca. 24.

quoque nunquam defore Cytisi pabulo contingente, promittunt Democritus, & Aristomachus. Nec aliud minoris impendij est. Seritur cum hordeo, aut vere, semine, vt porrum: vel caule autumnno, ante brumam. Si semine, madidum: & si defint imbres, solum spargitur (Alij solum aqua spargitur) Plantæ cubitales feruntur scrobe pedali. Seritur per æquinoctia tenero frutice. Perficitur triennio. Demetitur verno æquinoctio cum florere desiit, vel pueri vel anus vilissima opera. Canus aspectu, breuiterque si quis exprimere similitudinem velit, angustioris Trifolij frutex (verius amplioris) Datur animalibus post biduum semper. Hyeme vero quod inaruit, madidum. Satiant equos denæ libræ, & portione minora animalia, &c. In hac Cytisi historia inscite Plinius vertit, (vt Porrum) ex aurore Græco, apud quem fuit, *ἡς ὑπαρσας φητέον*, id est, in areolis feri, quemadmodum & Columella reddidit. Cytisis subiungi potest Cytisi facie Alysson fruticans quorundam, auctore Lobellio, Parum admodum notus, perelegans frutex, exoticus rarus, nisi cultioribus Belgij viretis, vbi floribus luteis, Leucoij, minoribus æstate nitet, è sparsis numerosis, anfractuosis, Polemonij, istriatis cauliculis. Folia Cytisi, habitiora, albida, hispida, setaceis pilis villosa. Radix lignosa, durior & in folliculis semen.

HALIMVS, CAP. LXV.

Nomina

Herm.cor.
122. libr. I.
Dioscor.
Corn.Em.
bl. 99. lib. I.
Dioscor.



ARIÆ sunt plantæ à rei herbariæ scriptoribus Halimi nomine descriptæ, & picturis expressæ. Nos de vero, vt arbitramur, Dioscoridis Halimo hîc dicemus ex Dalechampij sententia. Reperitur modo aspirata, modò nude scripta litera. Placet aspiratio, quoniam à falso humore nomen inuenit, vnde Ætius Halimum Halmyrida à falsugine appellari dixit. Solinus Alimon in Creta nasci tradidit, mirabili, si credatur, effectu, quod admorsa ea interdum fames nulla sentiatur, vt nomen inde impossibile sit ei quod famem arceat, propterea que nec aspirationem prima litera recipiat. Halimon Latini, vt Plinius, Anreonem vocant, Tolosates *L'herbe du mascalou*, id est, herbam colicis doloribus vtilem. Multa alia Halimi nomina, in iis quæ falso Dioscoridi sunt adscripta, legere quiuis potest, quæ sciens omitto. Est Halimon non parui erroris inter auctores, ait Plinius. Alij fruticem esse dicunt densum, candidum, & cætera ferè omnia quæ Dioscorides habet: alij olus maritimum esse dixere falsum, & inde nomen. Duorum præterea generum, siluestre, & mitius. Cratenas tertium genus addidit. Sunt & aliæ plantæ, vt diximus, Halimi nomine appellatæ. De primo genere, id est, de Diosc. & vero Halimo hîc tractamus. Halimus frutex paruus radicem habet altam, inflexam, longius euagantem, crassam, duram: caules multos, latius in orbem terram opacantes, cubito altiores, angulosos, ramosos: folia multa in surculis, per caules, cauliumque ramulos imparib⁹ interuallis dispositis acervatim cumulata, crassa, candida, Oleæ similia, breuiora, quamuis Rhamno longitudine paria interdum sint; qualia in secundo genere Halimi sui describit Clusius, latiora Dioscoridi, molliora Plinio, vtrumque enim verum est, etiam hyeme virentia, saporis primum quidem falsi, ac subastringentis, qualis in permultis maritimis plantis percipitur, deinde subdulcis. Ab hoc falso sapore Halimo vt diximus, nomen positum est, nequis à maritimis solum natalibus dictum existimans alibi prouenire neget. Semen producit latum, candicans, in summis ramis copiosum.

Li. I. ca. 103.


Locus.
Libr. II.
Li. 4. Hist.
capi. 20. &
libr. 5. cauf.
cap. 22.

Tertiū Halimi genus in maritimis frequens à Clusio descriptum, Crithmum est Dioscoridis, Italicorum *Bidone*, quod suo loco declarabimus. Halimus Dioscoridi frutex est sepimentis idoneus, similis Rhamno, sine spinis, foliis Oleæ, sed latioribus, Nascitur in sepibus, & maritimis. Eadem planè Oribasius habet.

Theophra

HALIMVS

verus Dalech.



Theophrasto, Halimus autore vicinas plantas enecat, valentius quàm Hedera aut Citysus, nam & Citysum ipsum interimit, eoque perniciosius quò plus habet falsuginis. Scribit Ruellius in viuis Galliaë sæpibus frequentem esse fruticem quem *Blancheputain*, rura vocant, gustu subacerbo in falsuginem vergente, quare mensis folia cum tenerescunt non esse ingrata. Eum fruticem si Halimon esse existimat, vehementer errat, vt capite de Spiræa diximus. Bellonius multis locis Halimi meminit, sed ita vt ex illius verbis quænam planta sit Halimus intelligi non liceat: Frutex Halimus, inquit, in Creta Halimatia vocatur, adeo ftequês, vt magna pars sepium ex eo constet. Cima sunt dulces. Idem alibi: Recensetur Halimus inter plantas perpetuò virentes. Idem in prato quodam plano se Halimum vidisse affirmat, qui licet natura se attollat in fruticem ramosum, sine spinis, vt in Creta, illic tamen per terram spargebatur instar Capparum spinosarum. Idem alibi. In Ægypto aggeres Nili mu-

Lib. I. c. 85.

Lib. 7. obs. cap. 18.

Ibid. ca. 44.

Ibid. ca. 60.

Lib. 2. Obs. cap. 31. Ibid. ca. 78.

niuntur fascibus ex Halimo: ac rursus. Sepes in Ægypto fiunt ex Halimo. Amatus Luf. etiam de Halimo satis multa, sed ita vt ex iis Halimum non interno-
scas. Nec magis in hac historia sibi constat Anguillara, qui aliquot locis pro-
uincia Samnitum mari vicinis, Halimum propriè à Dioscoride descriptum re-
periri tradit, qui estur, sepimentis que est idoneus: Aliud etiam genus ei non
simile conspici aliis in locis maritimis: postremo esse plantam iis cõgruentem,
quæ de Halimo scripsit Dioscor. in Creta edulem ibi vocatam Sandalida, ex
qua & sepes fiunt in Sicilia. Cordus Halimum sibi incognitum esse fatetur, con-
siderandumque in hac planta censet, ait quomodo concilientur Dioscorides,
& Serapio. Ille enim scribit Rhamno similem esse Halimum, sed spinas non
habere, hunc autem plures illi quàm Rhamno spinas tribuere. Serapionis hæc
verba sunt. Dioscorides. Quæ ex hac planta nascitur in campis, assimilatur
Rhamno, idest Nausegi, nisi quia multas habet spinas, & folia eius similia sunt
foliis Olearum. Ex quibus nihil aliud colligas, quàm Halimum similem esse
Nausegi, idest Rhamno, nisi Rhamnus spinas multas haberet, quo sensu Sera-
pio Halimo, quam Molochiam vocat, spinas non tribuit: quamobrem eum
cum Dioscoride conciliare nihil opus est. Halimus Tolosæ in hortis colitur,
sponte verò nascitur in sepibus, vt etiam auctor est Dioscorides, præsertim ad
vicum tribus miliaribus ab vrbe distantem, quem *Saint Hourens* vocant, loco
macro, squalido, alto: vt rectè dixerit, Oribasius nasci in maritimis locis, &
præruptis, itémque in sepibus. Plurimum in Cilicia prouenire, Galenus
scribit, vbi & germina eius recentia esitant, & reponūt, in posterum futura vsui.
Semen pariter, & planta ipsa hæc generat, gustus falsi & sub adstringentis. Ex
quibus omnibus perspicuum est ipsam dissimilium esse partium. Maior autem
pars eius calida est temperatè, cum humiditate incocta, & leuiter flatuosa, folia
inquit Dioscorides, decoquuntur ciborum gratia. Radix conuulsa, rupta, tor-
minaque mitigat, drachmæ pondere in aqua mulsâ pota. Eadem lactis vberta-
tem facit. Quod autem radici tribuit Dioscorides, Tolosates in foliis quotidie

In li. 2. Dio. cap. 121. Ca. 85. sim.

Locus.

Lib. I. c. 103.

Lib. II. Lib. 6. sim.

Vires.

Li. I. ca. 103

experiuntur. Horum enim manipulum terunt, & ex vino albo propinant, maximo doloris colici, torminúmque leuamento. Quam ob causam *L'herbe du mascalou*, vulgo vocant. Quod lac attrahat, ipsúmque ac semen augeat, rationi valde consentaneum est. Salsa etenim nitrosáque substantia crassio rem sanguinem extenuat, vt in mammas fluat, & penetret facilius, sub adstringente parres glandulosas roborat, ad lactis materiam melius concoquendam, dulci sanguinem copiosiore m gignit: quoniam dulcia in sanguinem facílè commutantur. Rustici pabulo sale condito, in pecudibus etiam lac magis affluere credút.

S A M B V C V S, CAP. LXVI.

Nomina

Corol. 184.
lib. 4. Diosc.

Lib. 4. c. 168
Genera.

S A M B V C V S.

Capit. 31.

Forma.

Li. 4. c. 168.

Andr. Lac.

Lib. II.

SAMBUCUS à Græcis ἀμύκτος dicitur, ab Arabibus *Infacti*, ab Italis *Sambuco*, à Gallis *Sureau*, & *Suyer*, ab Hispanis *Sabugo*, & *Caninero*, à Germanis *Holder*, à cauitate, siue *Holler*. Sambucum arborem dictam putat Hermolaus à *Sambuca*, musico instrumento, quod alij *petida* vocant, alij *Magadin*. *Sambuca* porro ab auctore videtur appellata, cui nomen *Sambyx* fuerit. Vsam ea primam omnium Sibyllam perhibent. Dicitur & *Sabucus* arbor à Quinto Sereno. Sambuci duo genera sunt Dioscoridi. Vnum, *Sambucus* vulgo cognita in arborem assurgens: alterum humilius, *Ebulus* nomine, de quo sequenti capite. Prioris & si vnú tantum genus descripserit Dioscorides, id nimirum quod notum omnibus est, hícque depictum, tamen à posterioribus duo alia obseruata sunt genera, sylvestre scilicet, siue montanum, de quo in Silua egimus, & quibus notis à superiore differat ostendimus. Alterum palustre, siue aquaticum, de quo etiam infra dicemus. *Sambucus* vulgaris frutex est, sæpe in arborem accrescens, trunco crasso, lignoso ex quo rami multi prodeunt, harundinú modo rotundi, longi, recti, geniculati, caui, medulla alba, dulcíque pleni, cortice cinereo obducti, cui subest alius viridis, medianus Officinis dictus. Ex geniculis prodeunt furculi, circa quos folia saturæ viriditatis, in ambitu parum crenata, grauis odoris. In ramorum summitatibus flores sunt candidi, in vmbellis. Deinde baccæ rotundæ, initio virides, tandem ex nigro purpureæ, copioso succo vinosæ, in quibus semen est minutulum, & cōpressum. *Sambucus* Dioscoridi, furculos spargit arundinaceos, teretes, cauos, candicantes,

proceros: folia iuglandis terna, quaternáue ex interuallis circa ramos exeunt, graui odore, minutim in ambitu secta: in ramulorum cacuminibus cauliculisque circinatæ vmbellæ, quæ florem candidum pariunt, mox acinum *Terebintho* similem, in nigredine sub purpureum, racemosum, succo madentem, vinosúmque. Quos híc furculos cauos vertit Ruellius, Græcè legimus *ὑποκόιλως*, idest aliquantum cauos: neque enim Sambuci furculi omnino sunt caui, sed laxa medulla pleni. Vbi verò folia dixit graui odore, minutim in ambitu secta, legitur in vetere codice, *βαρύνοντα ὃ καὶ πικρότερα*, idest, odore graui, amarioraque. *Oribasius*



basius legit *μακρότερα*, idest *lōgiora*, alij *μικρότερα*, *minora*. Theophr. diffusius Sambucum expresit his fere verbis quæ ideo refero, quia Theodori interpretatio non placet. Sambucus maximè iuxta aquas nascitur, & in vmbrosis locis, in aliis tamen etiam prouenit (legendum enim, ἐν μὴ τοῖς τοῖς τοῖς) fruticosa est, virgis anniculis vsque ad foliorum defluuium in longitudinem crescentibus, postea in crassitudinem. Virgarum proceritas non valde magna, sed senūm cum maximè cubitorū. (Τῶν ὃ ἐλέχων πάχος τῶν γερανδρῶν ὅσον περικεφαλῆας,) caudicum veterum crassitudo, quæ trabis in nauium prora super carinā posita (nam περικεφαλῆα polluci τὸ λος, lignū mediū super carinā erectū vnde pēdet anchora, & cui vtrinque affiguntur conti lignei, ἀπὸ προεμβολίδες, excipiendis rostris æreis, vel ferreis subrecti, & prominentes, ἔρβολα vocant, quibus ad cōfringendā hostilē classem impetus fit. Cū ea trabe vetusti Sambuci caudicem Theoph. cōfert, non cū galea. Vocabulū id nauticū Atheniensibus & Lesbiis notissimū & vsitatissimū fuit) cortex læuis, tenuis, rufus: materies fungosa, si resiccet, leuis, medullā mollē habens, vt totæ virgæ concauentur. Ex hac baculos leues faciūt. Siccata valida est, & in aquis minimè senescens, etiam si delibrata fuerit. Delibratur autem sua sponte cum aruerit. Radices per summā terram spargit, non multas, neque magnas. Folium sigillatim exit molle, oblongum, veluti Lauri latifolia, sed maius, latius, rotundiūsq; à medio & inferiore parte, suprema autem in acutum contractius, in ambitu ferratū: totū autem circa vnū pediculū crassum neruosūque, veluti ramulū pender. Foliorū alia hinc, alia inde geniculatim coniugatimque adhærent, à sese distantia, vno ex pediculi fastigio exeunte, subruffa leuiter, rarāque. Defluit totum simul. Quare id totum vnū folium esse merito putaueris. Rami quoque nouelli quædā geniculorū specie habent. Flos albus ex multis paruis candidis constans, specie faui, pediculi diuisi surculis infidet. Huic odor validus, qualis est Lirij, non nihil grauis. Similiter fructum edit, racematim, pediculo crasso subuectum. Maturescens nigrescit, immaturus ὀμφακώδης, idest acerbus est, vel vix acerbæ colore, magnitudine Erui, paulo maior. Quæ sequuntur adeo sunt deprauata, & mutila, vt vix vllus ex iis sensus elici possit. Sic in vulgatis exemplaribus leguntur. Τὴν ὑγρασίαν ὃ δινώδη τῇ ὀψεί, καὶ τὰς * χεῖρας ὃ τελεῖς, ἀναβάττει ὃ καὶ τὰς κεφαλὰς, ἔχει ὃ, &c. Quæ Theodorus sic interpretatus est. Humore aspectu vinaceus, & interna visu Sesamacea continet. Sed sic corrigi, restituique possunt ex Diosc. & Plinio. Τὴν ὑγραπίαν ὃ δινώδη τῇ ὀψεί καρπὸς τελεῖος ἀνίστι, τὰς χεῖρας ἀναβάττουσαν, καὶ τὰς κεφαλὰς ἔχειδε, &c. Idest, humorem specie vinosum maturus fructus reddit, manus & capillum tingentem. Quæ intus continentur Sesamo similia sunt. Sambucus in sepibus nostris frequentissima, locis humidis & vmbrosis gaudet. Maio mēse floret, aut paulò serius. Septembri fructus maturus est. Sambucū aliam Lobellius ostendit, foliis Laciniatis & minutim dissectis, in Belgij hortis virentē, quæ alioqui fructu, flore & ligno, à vulgari nō differt. Sābuci & Ebuli vis eadem, inquit Diosc. & vsus exsiccans, aluo detrahens aquā, stomacho inutilis. Folia Olerū more coquūtur ad pituitam bilēmque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti eadē efficiūt. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiuuat: prodest viperarum morsibus eodem modo, vuluas emollit insidentiū decocto, patefacit earū spiracula, & vitia corrigit. Acinij in vino potī eodem funguntur munere: denigrāt capillos illiti. Folia prætenera ac mollia si ex polenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis, & canum morsibus illita prosunt: vlcera quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant. Iis qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino prosunt illita folia. Plinius partim eadem, partim etiam ampliora quam Diosc. tradit. Sambuci & Ebuli decoctum inquit, in vino vetere foliorū, vel seminis,

Locus.
Tempus.Li. 4. c. 168.
Vires.

Li. 24. ca. 8.

SAMBUCUS foliis,
Laciniatis Lobell.



Lib. 16. c. 37.

Lib. 6. sim.

Lib. 7.
 Li. 4. Dios.
 cap. 168.

Dodo. li. 3.
 cap. 44.

acinos habent nigros, atque paruos, humoris lenti, inficiendo maximè capillo, qui & ipsi aqua decocti manduntur. Vtraque Sambucus, Galeno, tū magna illa, & arborescens: tum herbacea, quam & Chamæacten vocant, desiccandi, conglutinandi, modicèque digerendi facultatem obtinet, quibus verbis Paulus adicit, potam & manducatam aquam per aluum educere. Aqua ex Sambuci floribus, auctore Matth. fronti & sincipiti admota capitis dolores mulcet à calido humore ortos. Succus ex radicis cortice vomitum valentissimè ciet, & aquā inter cutem pellit. Ex Sambuco vnguentum præstantissimum ad igni ambusta fit hoc modo. Corticis viridis qui libro & ligno intercedit librā vnā, olei ex aqua stillatitia florū Sābuci sæpius loti libras duas simul feruere aliquādiu finito, percolato, exprimito: deinde additis ceræ nouæ odoratæ, succi furculorū Sābuci, singulorū, vncias quatuor rursus ferueant simul, quousque succus euanescat. Ab igne sublata hæc rudicula agitato: post, sub cocturæ finē Vernicis liquide vncias duas, Thuris in tenuem pollinē triti vncias quatuor, albumen ouorū duorū diu pri⁹ cochleari agitātū addito, permiscetōq; omnia diligēter, & mūdo vase asseruato. Fungi ad imū Sābuci caudicē nati, aqua rosacea prius macerati, capitis dolores & inflāmationes mulcent. Stillatitia tū Sābuci, tū Ebuli radicū aqua hydropes tympanite laborātes mirificè iuuat, si huius binas, illius quaternas vncias simul mistas hauriāt ægri diebus triginta cōtinuis, vsta Sābuci folia, & in puluere trita manātē ex naribus sanguinē sistūt. Baccarū Sābuci succus à recremento purgatus, & cū melle optimo coctus ad zulapij crassitudinem, aurium dolores sedat, si calidus instilletur. Sābuci tenerrima folia, quæ prima statim germinatione prodeūt, cū pari pōdere radicū plātaginis, suillæque axūgiæ veteris cōtrita, subactāq; podagricos dolores præsentaneo auxilio mulcēt. Quod in baccis semē cōtinetur minutulū & cōpressum hydropicis pdest, & nimiū obesis qui macilēti fieri volunt, si quotidie drachmā vnam in vino biberint. Sed id diu faciendum.

EBVLVS

vel radicis ad cyathos duos potum stomacho inutile est, aluo detrahens aquam. Refrigerat etiam inflāmationem; maximè recentis ambusti, & canis morsum, cum polenta, mollissimis foliorum illitis. Succus cerebri collectiones, priuatimque membranæ, quæ circa cerebrū est, lenit infusus. Acini eius infirmiores quàm reliqua, tingunt capillum. Poti acetabuli mensura vrinam mouent. Foliorū mollissima ex oleo & sale eduntur ad pituitā, bilēque detrahendam. Ad omnia efficacior quæ minor. Radicis eius in vino decoctē duo cyathi poti hydropicos exinaniunt: vuluas emolliunt: has & foliorū decoctū insidentiū. Caules teneri minoris Sambuci in patinis cocti aluū soluunt. Resistunt folia & serpentium ictibus in vino pota. Podagricis cum seuo hircino vehementer profunt cauliculi illiti. Idēque in aqua macerātur, vt ea sparsa pulices necentur. Foliorū decocto, si locus spargatur, muscæ necantur. Boa, appellatur morbus papularum cū rubent corpora, Sambuci ramo verberatur. Cortex interior tritus, & ex vino albo potus, aluum soluit. Idem alibi: Sambuci

EBVLVS, CAP. LXVII.

QUAMVIS Ebulus herba sit potius quàm arbor, aut frutex, tamẽ veterum omniũ exemplo Sābucos nos coniunximus. Dicitur hæc etiam Latinis Ebulum, Græce χαμαῖς ἄνθος, idest humilis Sambucus, aliis Hælion, inquit Plinius, Arabicè Kameaētis, Gallicè Hieble, Italicè Ebulo, Anglicè, Maluourt: & Bloedtuourt: Belgicè Hadick, Germanicè Attich, & Niderer holder, Hispanicè Hiez guos, & Sabugo pequenno. Ebulus caules producit longos, rectos, crassos, angulosos, geniculis distinctos, ramulorũ Sābuci modo, in quibus folia obscuræ viriditatis, foliis Sābuci, tũ odore, tũ figura similia. In cauliũ summitate

Nomina

Lib. 24. c. 8.

Forma

Li. 4. c. 168.

Locus.

Lib. 25. c. 10.

Vires.

Lib. 26. c. 8.

Capitu. 11.

Emb. 153. li.

4. Dioscor.

Lib. 27. c. 7.

Actæa non est Ebulus.

Li. 3. ca. 48.

Marth. lib.

4. Dioscor.

cap. 168.

EBVLVS.



calidi hemina: ac mox, Actæ quã quidã Ebulũ esse putant, radice cõtrita in vini cyathis tribus, si febris absit, vel semine ex vino nigro. Præcipuè tamen chamæactæ succus aptissimus creditur, ac rursus, Ebuli folia contrita, & è vetere vino imposita Boã sanãt, idest rubêtes papulas. Scribit Cornarius Pliniũ alio loco videri Ebulũ Actæã appellasse. Actæa graui foliorũ odore, caulibus angulosis (non asperis, neque anisi, vt vulgata exẽplaria falsò habet) geniculatis, semine nigro vt Hederæ, baccis mollibus. Nascitur in opacis & asperis, & aquosis. Datur acetabulo pleno interioribus fœminarũ morbis. Paulus quoque Actæę radicẽ in vino coctã hydropicis bibẽdã exhibet quo loco ipsemet Cornarius, & Andernacus Actæã Sābucũ interpretati sunt, etiã si mox corticis radicis Sābuci succũ cũ cõdito iisdẽ hydropicis Paul⁹ propinet. Alij Plinij Actæã lōge diuersam ab Ebulo esse statuũt, de qua suo loco dicemus. Reliquas ebuli vires persequamur. Ex radicibus Ebuli extractus succ⁹ magnopere vomit⁹ ciet, & aquas detrahit, crassamque pituitã ad articulos fluentẽ. Ebuli semẽ permultis in aqua lotionibus à nigro succo expurgatũ datur vtiliter ex Chamæpityos decocto drachmæ pondere podagricis, ischiadicis, & hispanico morbo laborãtibus: dolores enim eorum mulcet, humores cõfluentes tum reuocãdo, tũ deiiciẽdo. Sunt qui ex Ebuli radicibus succum eliciant, & insolatum in pastillos redigant. Hic clystere infusus intestinorum & coxendicum dolores à frigiditate & flatu genitos mirigat.

Lana exceptus inditur fœminarū locis ad menses euocandos. Illitus Ebuli radicū succus procidentem sedem reprimat, & anginam tollit, si circa gulam calidus illinatur.

SAMBUCVS AQUATICA, THRAUPALVS
THEOPHR. (AP. LXVIII.

Nomina

Lib. I. c. 105.

Lib. 4. Hist.

cap. 1.

Forma



LIAM Sambuci speciem diximus esse Sambucum palustrem, siue aquaticam. Galli *Obier*, vel *Opier*, Germani *Bachhoder*, vocant. Belgi, *Gelders Roosen*. Opulus tamen non est, ut Ruellius existimauit. Theophrastus multorum iudicio *θραύπαλον* appellat. Arbuscula est vliginosis & palustribus locis nascens, virgis Sambuci æmulis, geniculatis, alba in-

S A M B U C V S

aquatica, Thraupalus

Theophrasti.

Tempus.



Nomina

Li. I. ca. 77.

Lib. 27. c. 4.

Lib. 3. Hist.

cap. 18.

Lib. 3. Hist.

cap. 6.

Li. 24. c. 10.

Lib. 3. Hist.

cap. 18.

Locus.

Lib. 5. ca. 3.

Forma

Li. 13. ca. 22.

tus medulla, sed fragili, & caduca materie: folio vitigineo, sed minore: flore in muscariis albo Sambuci modo, odore non prorsus iniucundo: qui in multis Germaniæ locis cultu & crebro satū dēfissimus fit ac spississimus, fertisque additur, aspectu valde formosus. Ab eo baccae prodeunt rubentes, baccarum Oxyacanthæ magnitudine, vinoso succo plenæ, quæ deuorata vomitiones cient. Floret Maio mense, baccae Septembri sunt maturæ.

EVONYMVS, (AP. LXIX.




VONYMVM (quam aliqui Anonymum vocant, quasi à non habendo nomine nomen inuenerit inquit Ruellius: quanquam Anonymos alia planta, herba Plinio sit,) arbusculam esse hîc depictam, & à Theophrast. descriptam herbarij non pauci credunt, multis sanè notis eorum sententiæ adstipulantibus: aliis Chamænerion dicitur, idest humile Nerium, siue Rhododendron, siue Nerium Alpinū, quod foliis, flore, fructu siliquato, quam-

uis siliquis diuersis Nerium vtcumque referat. Balsamum Alpinum Gesnero, & Rosa Alpina: Matthiol. vero libr. primo in Discor. Cneoron vocat quamuis idem alterum Cneoron Theophr. pinxerit libr. quarto in Dioscor. qui hanc Euonymum esse putat, arborem pro Euonymo hætenus receptam, Fusoriam, & Fusanum appellatam, Euonymum esse negant, sed Theophrasti Tetragoniā esse volunt, Plinij virgam sanguineam à Sanguineis eiusdem fruticibus diuersam. Euonymus auctore Theophrasto, cum alibi, tum in Ordymno Lesbi monte nascitur (sic enim ex Plinio legendum, non *ἐρυκνίω ὀρδύνω καλασμένω*, ut Theophrasti exemplaria habent) magnitudine foliis que Punicæ, pariter molli, maiore quam Chamædaphnes. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color qualis in Leucoio, odore graui, & qualis sentitur trucidato caduere in tabum putrescente, vel quasi cæsum animal referat (sic enim hæc vertenda videntur, *ὅς ἐστι ὁ δεινὸν, ὥσπερ φόνος*, Plinius transtulit statim pestem denuntians, sed non satis rectè alioqui cum floreat quotannis, pestem quotannis scire necessum quoque foret,) fructu cum suo putamine loculouē Sefami siliquis

quis non abſimili, intus ſolido, ſed in quatuor verſus diſtincto. Eſu letalis eſt arbor tam fructu, quàm foliis pecori, & ouium gregibus, ſed præcipuè capris, niſi purgentur. Purgantur autem inedia & cibi abſtinentia. Quæ poſtrema ſic

EVONYMVS

Theophraſti.



ſidelius opinor, traducta ſunt, quàm à Theodoro, qui ſic reddidit. Hic pecus enecat guſtatus: quinetiam folium idem facit, & potiſſimum capras, niſi purgentur, interimit, purgantur autem anocho. Nuſquam certe legi quid ſit ἔνοχον. Quare ἔνοχον legi poteſt, id eſt inedia, & cibi abſtinentia. Alij ἔνοχον interpretantur vomitionem, & per ſuperna purgationem, vt vox ſit ἀπὸ τῆς ἀνω. Sic interpretatur Dodonæus, cùm ſcribit eſu foliorum capras interire, niſi ſuperne & inferne purgentur. Plinius vertit. Succurrit aliquando præcipuè alui inanitio. Noſtras hæc Euonymus in Allobrogum ſaxoſis & aſperis montibus naſcitur, prope Muram oppidum, decem miliaribus à Gratianopoli diſtans, Punica non altior, ſæpius breuior, & frutiſoſa, ramis virgultiſq; multis: folio carnoſo, oblongo, Punica vel Laureolæ albæ ſimili, ni minus eſſet, Rhododendron emulante, quam ob cauſam Chamænerium vocât, tactu molli, ſuperne viridi, infernè ruſo, flore in

Lib. 6. c. 79.
Ibidem.

ramorum faſtigio copioſo, Leucoio ſimili, purpureo, aſpectu pulcherrimo, graueolente, tanquam virus cruores effuſi, & corrupti naribus afflante, fructu ſiliquæ ſpecie. Hanc & capras & oues refugere opiliones aſſerunt. Dalechampius quidem cum attentius contemplaretur caprarum greges, vicina fruteta depaſcentes, nullam vidit quæ hanc attingeret, atque adeo cum decerptam obiiceret, auerſari deprehendit. Allobroges apud quos naſcitur, vocant *Des ourles*. Huic de Euonymo opinioni qui refragabitur, primum obiiciet Euonymum Theophraſti folio eſſe maiori quàm Chamædaphne, cum hæc noſtra folio ſit minori. Deinde florem illius ſimilem eſſe colore τῷ λευκῷ ἴω, id eſt albæ Violæ: at huius flos purpureus eſt. Poſtremo eiſdem florem non tam abominandi eſſe odoris: quibus reſpondere perfacile eſt. Nam quo loco folium maius Chamædaphnes folio eſſe dicitur, mendum ſubſeſſe aſterifcus indicat, & Gaza non Chamædaphnen, ſed Clematidem legiſſe videtur, qui vincamperuincam verterit: florem vero non λευκῷ ἴω ſimilem eſſe lego, ſed λευκοῖω, præſertim puniceo. Multa enim ſunt genera τῆς λευκοῖς præter album, & luteum, figura & colore diſtantia. Adhæc floris tam grauem & deteſtandum odorem poteſt non ſignificare vox φόνος. Nam præter eum quem diximus, ſignificat odorem etiam Atractylidis, quàm φόνον à quibuſdam appellatam fuiſſe auctor eſt ipſemet Theophraſtus: quo loco, pro ἔχῃ δὲ τὴν ὁσμὴν διφνὴν καὶ φονώδη, vel δλυσώδη, legunt alij ῥητινώδη, quem odorem Atractylidi conuenire optimè ſciunt, qui plantam nouerunt. His adde huius noſtræ Euonymi fructus quatuor folliculis conſtare, (Theophraſtus τὰ κελύφη vocat) oblongis, ex quibus coniunctis vnica videtur componi ſiliqua, Sefamo verò à Matthiolo picto ſimilis, grano intus ſolido.

Lib. 6. Hiſt.
cap. 4.

Nomina
Lib. 3. Hist.
cap. 6.
In Diosco.
lib. 1. ca. 114.

Forma.

TETRAGONIA

Theophrastus.



Locus.

Lib. 3. c. 17.

VONYMYM falsò creditam ab omnibus fere herbariis, Theophr. Tetragoniam multorum Herbariorum sententia esse diximus. In Tuschia, inquit Matthiolus, *Silio* dicitur, ab aliis *Fusaro*, quod ex ea optimi fusi fiant, *Fusoria*, & *Fusanum* à recentioribus, à Gallis *Fusan*, *Conillon de Prestre*, & *Bois à faire lardoires*, quod ex ea culinæ transfigendis lardo carnibus verucula faciant, à Germanis *Spindelbaum*. Frutex est in arborem non assurgens, ramis multis, cortice in vetustis, & trunco, candicante, in nouellis virente tectis, qui ob linearum quatuor rufarum, serratarum, dorsi modo extantium, recta per viridem corticem porrectarum discursum quadranguli apparent, id quod huic arbori non solum peculiare est, sed etiam, quod in fructu quadrangula siliqua sit. Quam ob causam *τετραγωνία* dicta est. Gaza *Quadratoriam* interpretatur. Ligno est duro, flauo: foliis longis, latiusculis, teneris: flosculis candicantibus, quinis, senisue simul: folliculis paruis, rotundis, quaternis simul coniunctis, qui maturo intus semine dehiscunt, membranula lutea contexto, quæ si in aqua maduerit, luteo colore inficit. In sepibus nascitur, & in agrorum sylvarumque limitibus. Floret Aprili mense, Septembri fructum perficit. Tragus pro Theophrasti *Συρία*, id est *Carpino* non sine errore descripsit.

PERICLYMENVM TERTIVM,

CAP. LXXI.


Lib. 6. fine.

Forma.

Li. 3. purg.
cap. 22.

IC frutex in plerisque Sabaudia, & Heluetia locis crescit, quem Dodonæus pro tertio Periclymeni genere depinxit. A reliquis Periclymeni generibus hoc differt, quod nullis viticulis vicinis fruticibus sese alliget, & circūuoluat, sed sine adminiculis stat, & per sese erigitur. Foliis est longis, mollibus: floribus item longiusculis, eâdidis, multis intus capillamentis, binis floribus semper in singulis pediculis: binis similiter baccis, roeundis, in rubro nigricantibus cum maturæ sunt. Has ab Heluetiis appellari scribit Dodonæus *Hundskirschen*, id est *Cerasa canina*. Huius fruticis meminit etiam Gesnerus. Periclymeno, inquit, cognatus est sylvestris frutex, qui locis saxosis nascitur apud nos passim, in sepibus, muris, syluis, acinis rubicundis, gemellis. Non circumuoluitur. *Brinthonlgen* vocant Heluetij, à duritie ligni tanquam ossea, vnde *Xylostei*, id est ligni ossei nomen ei dedit Dodonæus, qui luculentius eam stirpem alio in loco descripsit. Caudice est, inquit, mediocris crassitudinis, materia ligni candida, ramulis rotundis, albicante cortice contextis, initio tamen & cum primùm erumpunt subrubentibus, foliis alterius Periclymeni oblongis, mollibus, ex albido virentibus, prona parte candidioribus, ac leniter hirsutis: Flores minores sunt quàm alterius Periclymeni candidi, bini in vno pediculo: succedunt fructus gemelli, instar exiguum Cerasorum, rubentes,

tertium Dodon.



PERICLYMENVN

rectum secundum Clusij.



rubentes, altero eorum sæpe minore. Aprili, aut Maio floret: fructus Autumno maturus est. Clusius alia duo genera Periclymeni erecti, quodq; nullo adminiculo egeat, descripsit. Periclymenum erectum secundum, inquit, superiore multò humilius est, ramis multò gracilioribus & rarioribus, cortice albicante obtectis: folia quàm prioris teneriora, longiora, per ambitum nonnihil serrata, superiore parte virentia, inferiore parum lanuginosa, non adeò tamen ut superioris. E tenellis germinibus inter folia nascuntur exiles pediculi, vnum & plerumque binos flores sustinentes, superiore minores & teneriores, neque ut alterius pallescentes, sed purpurascens, quibus succedunt fructus gemelli non minores quàm in superiore, sed nigri, succulenti, gustu ingrato: radix dura, lignosa. Tertium genus est prorsus humile, & quod raro ad cubitalem accedat magnitudinem, ramis secundo crassioribus, candidioribus, lentis, & fractu contumacibus, contrà quàm in duobus superioribus: folia omnium maxima, Laurinis non minora, in extremo mucronata, superne virentia, inferne candidiora, sed nulla lanugine obducta, neque in ambitu serrata, duriora etiam quàm superiorum: flores in oblongo crassiusculoq; pediculo gemelli, superiori forma similes, candidi: fructus plerumq; vnicus, raro geminus, etiam si gemino flori succedat, omnium crassissimus, exigui Cerasi magnitudine, ruber, succulentus, pellucidus, duobus in summo, ubi flores inhæserunt vestigiis insignitus, vnicum granum continens. Floret vterque cum aliis Periclymenis. Semen secundi Iulio, tertij Augusto maturefcit. Secundus rarus est inuentu: vnicum fruticem se inuenisse Clusius ait, in Pyrenæis, duos aut tres in montibus Sabaudicis, & totidem in Pannonicis alpibus. Tertius in Pyrenæis, & in Sabaudicis montibus frequentior, copiosissimus est in Pannonicis.

Lib. i. stirp.
Hispa. c. 25.

Tempus.

Locus.

SALI

Lib. 3. Hist.
cap. 13.



Nomina

Cap. 37. 16.

Cap. 39. li. 4

VANQVAM Salicē *ῥάπυδρον* esse, id est aquaticā dixerit Theophr. ideoque cum iis plantis quæ vmbrosis, vdisque locis gaudent explicanda foret, tamen cum etiam in frutetis ac nemoribus Salices proueniant, & in sepibus cum aliis fruticibus dumisque, circa hortos, vineas, agros, aquarum ripas, & rusticas casas, hîc de Salicibus tractare haud absurdum fuerit, quamuis tractationis consecutione quædam genera hîc exponantur, de quibus aliis fortasse magis idoneis locis dici possit. Salix Latine appellata dicitur, quod ea celeritate crescat, vt salire videatur. Eadem de causa *ἰτέα* Græcè *ῥάπυδρον* Arabibus *Bulef*, *Bhulles*, *Saffaf*, aut *Chalif* dicitur, Gallis *Saulx*, & *Saule*, Italis *Salice*, & *Salcio*, Germanis *Vueiden*, & *Felbinger*, & *Meydenbaum*, Hispanis *Salce*, & *Salgueiro*, Boemis *Vurba*, Belgis *Milgheboem*. Salicis multas species veteres distinxerunt, colore primum, albo: nigro, siue purpureo, siue phœniceo, & Vitellino, siue rubente, qui in cortice spectatur: deinde, vsu: quod alia sit perticalis, alia viminalis, alia fîsilis. Postremo q̃ alia præbeat vnde vincula fiant, alia virgas textiles ad varia opera tenues & inualidas aliæ, aliæ firmiores, & crassiores: quibus præcipuis differētiis adde si libet & hâc, quod alias steriles esse omnes fateantur, quandam verò fructum edere nonnulli putent, vt Arcades Helicem. Albæ Salices duæ sunt, altera perticalis, arborescens, perticas emittens in magnam proceritatē, vinearum iugis, ridicis, compluuiatis cameris aptas, & stipitibus, quos sustentandis, ac cōtinuandis sepibus defigunt. Huic potissimum conuenit quod scribit Plinius, Cæduæ Salici densiorem esse tonsura fertilitatem, & breui, ligno verius quam ramo, sic enim emaculandus est ille Plinij locus. Viminalis est, alba secunda, quam & Gallicam nominant Autores, excepto Columella, cui Viminalis nigra, Gallica dicitur. Huius inter Viminales firmissimæ quidem virgæ sunt, non vt apud Plinium legimus, tenuissimæ, & aliis crassiores, Theophrasto *ῥαπυδρότεραι*, derisiores, non *ῥαπυδρότεραι*: laudatæ ad corbes, supinas cathedras, & agricolarum plurimam supellectilem, vasis melioribus quàm si è corio fiant, sic enim apud Plinium quidam legendum censent, quamuis seruata scriptura intelligi possit, non tanti esse vasa illa, vt corium magno sumptu conquirendum sit, è quo conficiantur. Natura quidem albicat huic cortex, & nonnihil scaber est, verum eo detracto magis candicat, tractatuq; vel vt quidam legunt, attritu, politur, ac læuigatur. Sic ergo verum est, quod ait Plinius, albæ, nempè vtriusque huius, agricolis vsum esse. Nigra cuius color niger est, vel phœniceus Theophrasto, purpureus Plinio, obsolete purpurascens Columellæ, Gallicam vocanti, vt monuimus, Viminalis quoque est, ad cistarum & calathorum opera lauciora expetita virgarum prætenuium spectabili subtilitate. Rubet seu vitellini coloris est Græca, etiã viminea, quam Latini peculiari nomine vocant Amerinam, nos seruato prisco vocabulo *Amarines*, & *Ambres* nuncupamus. Flauam in hoc genere Columella Græcam priuatim appellat, rubram autem, siue rutilam, gracilibus virgis, Sabinam, & hanc Amerinam veram esse inquit. Flaua Plinio Vitellina à colore vitellorum oui dicitur, agnoscente in Plinio hanc lectionem Hermolao, ex vetustis codicibus, cum in nostrorum quibusdam legatur Nicelina, in aliis, Italina. Quemadmodum arborescentis candidæ, perticæ ad vsus de quibus nos supra differuimus, ita huius virgæ finduntur, sequacis ad vincturas lentitiæ, vitibus iugandis, ligandis, palandis, in hortorumque marginibus, ac ambulationibus Rosiferigendis, ac reuinciendis: ad quem vsum etiam perticarum arborescentis Salicis baltheus corticis laudatur, nimirum cortex ille crassus, quo vestitiæ spoliantur, dum ad pedamenta eas findunt. Apud Plinium, & recte, vt arbitror, quidam

quidam legunt: Finditur Græca rubens, Amerina, vt & candida, haud paulo flexilior: ideo solido ligans nexu: nam fragilioris solidus esse nexus non potest. Theophrastus viminalis albæ & nigrae quoddam genus tradit, vt in Cedris, & Palmis, in altum nunquam crescere, (siue naturæ proprietate id contingat, siue ariditate soli, siue opificibus viminum crebrius tondentibus:) idq; vocari ab Arcadibus Helicem, vel quod Hederae modo, quam Helicem vocant, humi repentis, humilis semper sit, vel quod *ἐἰς τὰ πλεῖστα ἐλίσσεται*, ad viminum textus plicatilis est. Putant, inquit Columella, tria esse genera præcipua Salicis, Græcæ, Gallicæ, Sabinæ, quam plurimi vocant Amerinam. Græca flauī coloris est, Gallica obsoleti purpurei, & tenuissimi viminis. Amerina Salix gracilem virgam & rutilam gerit, quæ omnia intelligenda esse de Viminali ex superioribus liquet, ac eius auctoris testimonio, qui illic de viminea Salice verba se facere apertè loquitur. Matthiolo, Salicis quatuor sunt genera. Nam quædam in tantam proceritatem assurgunt, vt ex eis in Liguria fiant perticæ & pali maximi vsus ad vitium pedamenta. Aliæ non tam proceræ colore rufescentes, sequacis Lentitiæ, quæ ligandis cadorum vinariorum circulis commodè finduntur. Hanc Salicem Græcam vocat Cato: Aliæ firmiores, corbibus, & rusticæ suppellectili admodum expetitæ. Aliæ minores ac mira tenuitate texendis canistris, cistellis, calathis aptissime. Tragus quatuor quoque Salicis genera constituit: Fuschius tria, Dodonæus duo. Vnam quæ cæterarum arborum modo in proceritatem magnam assurgit: alteram quæ semper humilis est, & vimina profert. Huius cortex interdum rubescit, aliquando candicat, nonnunquam flauescit. Salicum differentias à locis in quibus nascuntur, vsu, & corticis colore potissimum hic sumemus ex Dalechampio. Salices igitur aliæ sunt *πάρυδροι*, id est aquaticæ: aliæ sicca loca non dedignantur, vt Amerina, quæ in vinetis quantumuis aridis, & siccaneis passim profilit. Aquaticarum aliæ pigris & stagnantibus aquis gaudet, & ad riuorum fluuiorumque margines, vel leni lapsu fluentium, vel pingue crassumq; solum rigantium proueniunt: aliæ glareosis, lapidosis, arenosisq; torrentium & rapidorum amnium ripis. Ex corticis colore, candido, nigro, phæniceo, luteo differentia aliæ sumuntur. Primum genus ex eiusdem Dalechampi sententia dicimus esse vulgarem Salicem, in magnam arborem crescentem, cortice candido, quæ Theophrasto, ac Plinio est Salix alba, prior, arborescens, & perticalis. Nec Fuschij placet opinio, qui Salicem Theophrasti candidam Plinij Vitellinam, id est flauam, esse putat, quoniam in flaua Salice virgas *πυκνότερας* spissiores, quàm in nigra non videmus, vel, vt quidam legunt, *καπρωτέρας*, id est, fragiliores: quas tamen habet candida, Theophrasto auctore, sed tenuiores Plinij sententia, vel, vt legendum supra monuimus, firmiores. Cæterum folia habet Salix arborescens oblonga, angusta, Oleæ similia, superne virentia, inferne candicantia. In locis madidis crescit, circum prata rigua maxime. Secundum genus Salix est Platyphyllos, siue Leuco-phlæos, id est latifolia, & candido cortice:

Lib. 17. c. 20.
Lib. 4. c. 30.

Lib. 1. Dioscor. c. 117.

Lib. 3. c. 60.
In Hist. pl. cap. 25.
Lib. 6. c. 67.

SALIX ALBA,
Perticalis vulgaris.



solum rigantium proueniunt: aliæ glareosis, lapidosis, arenosisq; torrentium & rapidorum amnium ripis. Ex corticis colore, candido, nigro, phæniceo, luteo differentia aliæ sumuntur. Primum genus ex eiusdem Dalechampi sententia dicimus esse vulgarem Salicem, in magnam arborem crescentem, cortice candido, quæ Theophrasto, ac Plinio est Salix alba, prior, arborescens, & perticalis. Nec Fuschij placet opinio, qui Salicem Theophrasti candidam Plinij Vitellinam, id est flauam, esse putat, quoniam in flaua Salice virgas *πυκνότερας* spissiores, quàm in nigra non videmus, vel, vt quidam legunt, *καπρωτέρας*, id est, fragiliores: quas tamen habet candida, Theophrasto auctore, sed tenuiores Plinij sententia, vel, vt legendum supra monuimus, firmiores. Cæterum folia habet Salix arborescens oblonga, angusta, Oleæ similia, superne virentia, inferne candicantia. In locis madidis crescit, circum prata rigua maxime. Secundum genus Salix est Platyphyllos, siue Leuco-phlæos, id est latifolia, & candido cortice:

1. Salix vulgar. candida.

Forma.
Lib. 3. Hist. cap. 13.
Lib. 16. c. 37.
Li. 17. c. 20.
Ibidem.

Ibidem.
Ibidem.

Locus.
2. Latifol. cand.

Forma.

huic


SALIX PLATTY-

phyllos Leucophlæos.



SALIX PLATYPHYL-

los Leucophlæos Dalechampij.




huic enim etiam candicat cortex, sed vergente in cinereum candore, folio breviori, latiore, aduersa parte incano, aduersa pallidius virente, in ambitu serrato: interiore cortice rubro, quod huic generi proprium est, exteriori ad ligandum apto, ut & ligno contuso, ac intorto. Quamobrem eo rustici Allobroges lignorum fasciculos quos venales in oppida comportant, vinciunt: ligno fragiliore quam in priore. Hanc quidam pro Elæagno depinxerunt. Gignitur in solo macro arenoso, lapidoso, sed vdo, ad torrentium margines, & in sylvis vmbrosis, præsertim qua collectis in lacunas aquis terra humescit, aut qua fontium scaturigines profiliunt. Huius carbocitissimè ignem concipit, quapropter ad puluerem excutiendis bellicis tormentis necessarium vritur. Præstat etiam delineandis iis quæ pictores ante accuratam operam imitanda sibi proponunt. In cōuallibus altissimorū mōtium & frigidissimorū Segusiam tractus, ad fontium scaturigines, & stagnantes in pratis riuulorum aquas, huius generis arbuscula nascitur, velut abortiua, foliis tam exiguis, ut terūcio ampliora non sint rotundis, cōfertim stipatis, supernè, ac infernè candicantibus, & lanuginosis, toto frutice nō altiore palmo, quem ob breuitatem, & ita compressam ramusculorum ac frondis congeriem pro Salice vix agnoscas. Tertium genus Salix purpurea, cortice obscurè purpurascēte, quam μελανόφλοιον, id est cortice nigro amictam,

SALIX PURPUREA

Locus.


nigra, viminalis.




3. Salix
purpur.
Forma.

amictam Theophrastus, & Afiani vocant, Plinius purpureā, viminibus texendis Lib. 3. Hist. ca. 13.
virgas tenues præbentem, quibus corbes, sportas, quallos, canistra, fiscinas, & id Lib. 16. c. 37.
genus alia vtenfilia vasaq; conficiunt spectabili subtilitate. In fluuiorum fabu-
losis ripis, qui præcipiti cursu vorticosi ruunt, Rhodani, & Isaræ hæc provenit, Loc. Ibidem.
hominis altitudine, fruticosa, cortice qualem diximus: foliis venosis, obscure

SALIX PHOENICO-
phlæos, siue Phænicea.



SALIX HELICE
Theophrasti.



virentibus, in ambitu ferratis, ad folij cuiusq; petiolum geminis semper foliolis, subrotundis, quod peculiare nacta est. Iisdem in locis proveniunt reliqua tria Salicum genera, Salix Phœnicea, Helice, Elæagnus. Salix Phœnicophlæos, siue phænicea, quod eius cortex palmularum colorem referat, vnde & nomē, folio proximè dictæ similis est, minus serrato, ad cuius exortum nullæ foliorum appendices emergunt, qua nota à superiore facile distinguitur, viminum & virgarum pari gracilitate. Omnium brevissima Helice fructifera, à nigra certè & alba diuersa, quamvis pumilam in eo utroque genere, ut diximus Theophrastus esse tradat: virgas tenuissimas, maximèque exiles profert, cortice subluteo vestitas. Huic folia paribus semper intervallis gemina, cum in aliis generibus temerè, nulloque ordine disposita sint, candicantia, sed non lanuginosa, brevissima, conferta, in ambitu minimè crenata, protuberante semper ad foliorum radicem velut nouo aliorum foliorum conceptu, quod huic proprium est. Porro sæpe foliis insident vesicæ, quales in Ulmi foliis reperiuntur, subrubentes: ramorum autem, vertici foliosa capitula, squamatum compacta, echinis carduorum similia, sed minimè pungentia, & delapsis iam foliis in arbore manentia, quare hanc Salicem, ut auctor est Theophrastus, fœcundam esse Arcades existimarunt. At cum idem scribat Helicem, pumilam esse Salicem, siue candida sit, siue nigra, hæc autem de qua nunc agitur, omnium sit humillima, & iis quas diximus notis à cæteris differat, Helicem appellare hoc Salicis genus libuit. Elæagnum etiam Salicis genus esse Dalechampius arbitratur, in fabulosis nascētis prope rapidos amnes duntaxat, ut ad Rhodani ripas, quæ huius sunt feracissimæ, cum in Araris propinqui amnis marginibus nusquam reperiatur. Cortice est luteo: foliis inter omnia Salicis genera longissimis, angustissimis, minimè venosis, nervo medio discriminatis, in ambitu minime ferratis, utrobique albicantibus, auersa parte

4. Salix
Phœnic.
Forma.

5. Helice
Salix.
Forma.

Lib. 6. c. 37.

Lib. 3. Hist.
cap. 13.

6. Elæagn.
Loc. Ibidem.

Forma.
Lib. 16. c. 37.

ELÆAGNVS

Dalechampi.

Lib.4.Hist.
cap.II.7. Salix
Amerina.

Genera.

Lib.24 c.9.

lib.16. c.37.

Forma.


Finditur, inquit Græca rubens Amerina, vt & candida, haud paulo flexilior, &c. Sic & Amerinæ duo nobis nota sunt genera. Alteri enim cortex magis rubet, quā Græcā Amerinam, & rubentē vocauit Plinius, Galli *Franc osier*, nominant: alteri nigricat. Vtriusque virgæ cuneis triplici canaliculorum ordine striatis finduntur ad vincula, quibus in aqua maceratis vites, & doliorum circuli vinciuntur, & ligantur. Trunci capitæ ex quibus virgæ prodeunt, humilia sunt,

SALIX HUMILIS

repens angustifolia.

Lib.1.c.141.

Lib.6.ca.2.



lanuginosis, vnde Elæagnus nominatur, ἐλα-
γνος enim ἐξ ἐλαίας καὶ ἄγνου, id est ex Olea & Vi-
tice nomen componitur, quod folio Agno si-
mile sit, & Oleæ modo candicet. Elæagnus, in-
quit Theophrastus, fruticosa planta est, Agno
similis, folio figura eidem simili, molli & lanu-
ginoso, vt Mali Cydoniæ: flore albæ Populi,
minore, fructu nullo. Sic enim Theophrastillo-
cus & legendus & vertendus est. Maximè na-
scitur, inquit in insulis fluitantibus, siue natan-
tibus, scilicet aut ventorum, aut contorum im-
pulsu, quales sunt in lacu Orchomenio, & in
Ægypto circa paludes, & in Thesprotide, & in
aliis stagnis, de quibus multa Plinius libro se-
cundo, cap.95. Sunt qui foliorum squamatim
cumulatorum congeriem carduorum echinis
haud absimilem, sed non pungentem, quæ in
Elæagno, & quibusdam aliis Salicum generi-
bus reperitur, earum fructum esse credant, alij
minimè. Amerinæ duplicis meminit Plinius,
nigræ, Amerinæ nigræ semen, &c. & rubentis.

nec altius eriguntur, putanturque ac cædun-
tur quotannis. Ruellius farragine nomencla-
turarum quæ spurix in Dioscoridem irrepse-
runt deceptus, tradit Viticem auctore Dio-
scoride Salicem Amerinam à Latinis appella-
ri, cum inter has duas stirpes multum intersit,
vt dicemus. Lugdunenses & Allobroges Ame-
rinam, vt diximus seruato prisco vocabulo
des Amarines vocant, Parisienses *Osier*, Norman-
ni *des Ambres*. Theophrastus in Salicū histo-
ria Amerinæ non meminit, nisi eam, quod
quidam arbitrantur τῷ οἴσῳ nomine designa-
uerit, hoc maximè loco: οὗ καὶ χρῶνται πρὸς
τὸ καταδεῖν, καὶ πρὸς λαμβάνειν ὡς πρὸς τῷ οἴσῳ. Id est,
quamobrem hisce vtuntur (de Cneori radici-
bus loquitur) ad colligandum & comprehen-
dendum Amerinæ Salicis modo. Gaza vertit.
Quamobrem hisce ad colligandum Iunci
modo vtuntur. Hic igitur οἴσον Salycem Ame-
rinam & vitilem à Theophrasto significari
putant, ad quam vocem alludentes Galli *Osier*
vocant. Repugnat tamen horum sententiæ
in Oesio altero flos cœruleus, fructus niger, in
altero

altero, flos & fructus candidus, qui in Amerina Salice nullus est. Sed de hac quaestione supra nos, cum grossulariarum naturam explicaremus, fusius disceptauimus. Est præter has Salices alia, humilis, repens, angusti folia, in Ericetis Antuerpiani agri: palmaribus & sequipalmaribus cauliculis: folio Rhamni primi, & floribus muscosis Salicis, gustus amari.

SALIX MARINA,



His Salicem marinam addimus, quæ tamen inter marinas plantas reponi posset. Ea testis ostreorum, & saxis quæ sub aqua marina sunt, innascitur, & sic adhæret, vt iis agglutinata, non radice defixa videatur. Rami multi ex glauco nonnihil rubentes in aqua natant, foliis comantes longis, Salici similibus, maxima ex parte per oras non incisus, quibusdam, veluti incisuras nonnullas ostendentibus, gustu salsis. Inter ramos virgulæ subriguntur, florem Salicis sustinenti furculo haud absimiles, apicibus plurimis, veluti squamatim compactis, non alia forma, quàm quæ spectatur in Salice, dum herbaceo iulo florem parturit. Hactenus de Salicum generibus. Salix initio veris florem mittit, seu nucamentum squamatim compactile, lanuginosum, propendentem, demittitque veluti panos spicatum confertos, & lanitium quoddam, inquit Scaliger. Ἀλλὰ τὴν ἰτέαν ταχὺ προκαταβάλλειν, inquit

8. Salix marina.

Tempus.

Theophrastus, πρὸ τῆς τελείως ἀδριώαι καὶ πέσαι τὸν καρπὸν. διὰ καὶ τὸν ποικίλην τοικῶς προαγορεύειν ἀντὶ τὴν ὠλεσίκαρπον. Quæ sic Plinius interpretatus est. Ocyssimè autem Salix amittit semen, antequam omnino maturitatem sentiat, ob id dicta Homero frugiperda. Hæc Theophrastus, quibus addit Plinius. Secutæque ætas scelere suo interpretata est hanc sententiam, quando semen Salicis mulieri sterilitatis medicamentum esse constat, id est sterilitatem inducere: quod de foliis Dioscorides dixit, ἀσυλληψίαν κατεργάζεσθαι, ita vt Salicem ὠλεσίκαρπον dictam, quia cito semen amittat, interpretati sint, vel quia semen hominis infæcundum reddat & ἄγονον, id est ineptum generationi, efficiat, vt à fœminis non concipiatur. Quod autem καρπὸν & semen dicunt, id Galenus, ipsumq; secuti Aetius, & Paulus, florem solum videntur appellasse, quod nunquam ad perfectam seminis maturitatē perueniat. Huius arboris passim obuiæ permultæ sunt & magnæ vires. Semen, folia, cortex, & succus, inquit Dioscor. spissandi vim habent. Trita folia cum exiguo pipere, & ex vino pota ileosis subueniunt: sumpta per se, & cum aqua, præstant mulieribus, ne concipiant. Salignum semen in potu sanguinem expuentibus prod est. Cortex eosdem præbet effectus. Corticis cinis admisto aceto maceratus illitu clauos & callos tollit. Ex foliis & cortice succus cum rosaceo in calice Punici, siue malicorio calfactus auriū doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri vtilissimum: furfures purgat in corpore. Excipitur succus qui manat ex eo cum floret, exciso cortice, in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda quæ pupillas obtenebrant suam vim præbet. Plinius eadem scribit, sed triplicem colligendi succi modum docet, cùm Dioscorides vnum tantum tradat. Salicis fructus, inquit, ante maturitatem in araneam abit, sed si prius colligatur, sanguinem eiicientibus prodest. Cortex è ramis primis cinis clauum &

In lib. 1. pl. Lib. 3. Hist. cap. 2. Lib. 16. c. 26

Ody. κ.

Vires feminis Salic.

Vires. Lib. 1. c. 117.

Succus Sal.

Lib. 24. c. 9.

callum aqua mistus sanat. Vitiæ cutis in facie emendat, magis admisto succo suo. Est autem hic trium generum. Vnum arbor ipsa exudat Gummi modo: alterum manat è plaga, cum floret, exciso cortice trium digitorum magnitudine. Valet hic ad expurganda quæ obstant oculis, item ad spissanda ea quæ opus sunt, ciendamque vrinam, & ad collectiones omnes interiorum, vel, vt quidam legunt, illitus extrahendas. Tertius succus est detruncatione ramorum, à falce distillans, nempe illa remota, post cæsura. Ex his ergo aliquis cum rosaceo in calyce Punici calfactus auribus infunditur: vel folia cocta, & cum cera trita imponuntur: item podagricis. Cortice & foliis in vino decoctis foueri neruos vtilissimum. Flos tritus cum foliis fursures purgat in facie. Folia contrita & pota intemperantiam libidinis coërcent, atque in totum auferunt vsum, sæpius sumpta. Amerinæ nigræ semen cum spuma argenti pari pondere, à balneo illitum psilothrum est. Salicis foliis, auctore Galeno, ad cruenti vulneris glutinationem vti possis: verum floribus eius maximè propè omnes vtuntur medici ad exsiccantis emplastri præparationem, (quod propterea *δυσήκας* nominant.) Est enim vis eorum ita desiccatoria, vt mordax non sit: habet verò etiam quandam adstrictionem. Sunt verò etiam qui succum ex ea expressum, seruent, vt medicamentum mordacitatis experts, & exsiccatorium, ad multas res vtile. Arboris cortex similem facultatem obtinet, tum floribus, tum foliis, nisi quod temperaturæ sit siccioris, velut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eiusque cinere vtuntur ad ea omnia quæ valenter desiccare oportet, Nam clauos, callos, & myrmecias tollunt, aceto ipsum macerantes. Nonnulli autem dum floret Salix, corticem eius incidunt, & succum quendam colligunt, vtunturque ad ea quæ pupillas obtenebrant, extergente videlicet, simulque tenuium partium medicamento: Cædua Salici fertilitas, inquit Plinius, densior tonsura, & breui ligno verius (non pugno, vt mendosi Codices habent) quam ramo, non vt remur, in nouissimis curanda arbore. Nullus quippe tutior est reditus, minorisue impendij, ant tempestatum securior. Tertium locum ei in æstimatione ruris Cato attribuit, priorémque quàm oliuetis, quàmque frumento, aut pratis, nec quia desunt alia vincula. Aliquanto post idem etiam scribit in iis quæ propter alias feruntur, maximè propter vineas, Cæduo ligno, principatum obtinere Salices.


VITEX, CAP. LXXIII.

Nomina
Li. 6. simpl.
Lib. 1. c. 116.

VITEX Græcis dicitur *ἄγνος*, idest Castus, quod, auctore Galeno, castitatem conseruet iis à quibus aut estur, aut bibitur, aut substernitur, vel vt Dioscorides tradit, quoniam matronæ in Thesmophoriis Atheniensium castitatem custodientes, foliis huius cubitus sibi sternebant. Dicitur & *λύγος*, quasi vimen, propter inuictam ferè ramorum flexilitatem. Officinæ Græca & Latina voce coniuncta Agnum Castum appellant. Arabes *Famanchest*, *Samachest*, & *Bengiechest*, Itali *Vitice*, & *Agno Casto*, Galli *Agnus Castus*, Hispani *Gatillo Casto*, Germani *Schaffs mullem*, & *Keuschlamp*, Boemi *Drimek*. Vitex frutex est, ramos plurimos emittens, flexiles, fractuque contumaces, in quibus folia sæpius quina, aliquando septena, vt in cânabe, longa, angusta, Salicis foliis haud absimilia, sed minora. In ramulorum cacumine flores emergunt spicati, aliquando purpurei, aliquando subpurpurei candido permixto. Semen ob similitudinem cum Pipere, à quibusdam Piper vocatur. Vitex frutex est Dioscoridi in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis. Ramos gerit longos, fractu peruiaces: folia

Ibidem.

Oliuæ,



Oliuæ, sed molliora. Duo genera eius. Altera florem ex albo subpurpureū mit-
 tit. Altera tantum purpureū: vtriusq; semen, vt Piper. Non multū à Salice viti-
 lium vsu distat Vitex, inquit Plinius, foliorū quoq; aspectu, nisi odore gratior
 esset. Græci Lygon vocant, alij Agnon: quoniam matronæ Thesmophoriis
 Atheniensium castitatem custodientes, his foliis cubitus sibi sternunt. Duo
 genera eius. Maior in arborem assurgit, Salicis modo. Minor ramosa, foliis
 candidioribus, lanuginosis. Prima album florem mittit cum purpureo, quæ &
 candida vocatur: nigra, quæ tantum purpureum. Nascuntur in palustribus cam-
 pis. Vitex Dioscoridi, excafactorias vires habet, & adstrictorias. Semen eius
 potum venenatis ictibus, aqua q; cutem subiit, lienosisq; auxiliatur: lac euo-
 cat: menses ciet drachmæ pondere in vino potum: genituram exoluit, caput
 tentat, & soporem adfert. Decoctum herbæ & seminis in defensione mulieri-
 bus vuluæ malo oportunis opitulatur: item inflammationibus. Purgationes
 mouet semen cum Pulegio potum, etiam suffitu, vel appositu: capitis dolorem
 dissoluit illitum: instillatur eum aceto & oleo in lethargo, & phrenitide: folia
 suffitu, aut substratu fugant venenata: illita quoque serpentium moribus au-
 xiliantur: testium duritias eum butyro, & foliis vitium emolliunt. Rimas sedis
 semen cum aqua illitum mitigat: cum foliis medetur luxatis, vulneribusque.
 Virgam qui manu teneat cum iter facit, negatur intertriginem sentire. Semen
 potum, auctore Plinio, vini quendam saporem habet, & dicitur febres soluere,
 & cum vnguntur, oleo admistum sudorem facere, sic & lassitudines dissoluere.
 Vriham Agni ciet & menses. Caput tentant vini modq; nam & odor vtraque
 similis est. Inflationes pellunt in inferiora, aluum sistunt, hydropicis & lienosis
 perquam vtilis. Lactis vbertatem faciunt. Aduersantur venenis serpentium,
 maximè quæ frigus inferunt. Minor efficacior ad serpentes. Bibitur seminis
 drachma in vino, vel posca, aut duæ foliorum tenerrimorum. Illinitur vtraque

Lib. 24. c. 9.

Lib. 1. c. 116.
 Tempera.
 & Vires.

Lib. 24. c. 9.

aduersus araneorum morsus, vel perunctis tantum vtili remedio: suffitu quoque aut substratu fugant venenata. Ad Venerem impetus inhihent: eoque maxime phalangiis aduersantur, quorum morsus genitale excitat. Capitis dolorem ex ebrietate sedant cum rosaceo, flos, tenerique cauliculi. Seminis decoctum vehementiorem capitis dolorem dissoluit fotu: & vuluam etiam suffitu vel appositu purgat: alium, cum Pulegio & melle potum. Vomicas panòsque difficiles concoquit cum farina hordeacea, & mollit, Lichenas, & Lentigines cum aphronitro & aceto semen sanat, & oris vlcera, & eruptiones cum melle: testium duritias cum butyro, & foliis Vitium: rhagadas sedis cū aqua illitum: luxata cum sale, nitro & cera. Et semen & folium additur in malagmata neruorum, & podagras. Semen instillatur in oleo & aceto decoctum capiti, in lethargo, & phrenesi. Virgam qui in manu habeant, aut cinctu, negantur intertriginem sentire. Vitex calidus & siccus est tertio ordine. Galeno, verum multum tenuis substantiæ, tum gustu, acris simul, & adstringens. Ipsas tamen Vitices ad medicinam habet inutiles. Cæterum folia seménque calida siccáque facultate sunt, substantia verò tenui. Nam & vtentibus ita apparet, & gustantibus acre simul, & subastringens percipitur tum folium, tum flos, tum semen. Edendo tamen etiam semen est, verum tam perspicuè calfacit, vt hoc nomine capiti dolorem pariat. At si frigatur, minùs caput tentat. Porro flatus ventris discutit etiam non frictum, & multo magis cum frictum fuerit. Cohibet etiam impetus in venerem, siue frigatur, siue non frigatur. Folia, florésque idem præstare possunt. Galenum secuti Paulus, & Aetius Viticem tertio ordine calfacere siccaréque, & tenuis esse substantiæ tradiderunt. At Galenus duobus aliis locis valde à sese dissidet, quod in tanto scriptore permirum videri debet. Scribit enim. Non quemadmodum planta ipsa Cannabis Vitici quodammodo similis est, ita semen semini facultate est simile, sed plurimum ab eo differt, vt quod concoctu sit difficile, stomacho ac capiti noceat, prauique sit succi. Sunt tamen qui eo quoque frixo cum aliis tragematibus vescuntur. Multum autem calefacit: ideoque sumptum paulò largius caput ferit, vaporem sursum ad ipsum mittens, calidum simul ac medicamentosum. Viticis semen etiã per se crudum, ac frixum manditur, crediturque appetitus venereos inhibere: alimentum autem corpori præbet exiguum, idque siccans, ac refrigerans: flatus autem valde dissipat, quorum omnium occasione, iis qui à venere puros sese seruare volunt, est accommodum: quam sententiam alio in loco approbat, medicamenta ad capitis dolorem ab Archigene conscripta expendens, inter quæ hoc refert. Lauri folia, & Populi albæ, & Viticis cum oleo & aceto. Hoc Pharmacum, inquit Galenus, ex simplicibus facultatibus differentibus composuit. Lauri enim folia calidissima Viticis verò moderatè refrigerantia sunt, in medio vtrorúmque Populi albæ folia sunt. Vides igitur hic Viticem à Galeno frigidum, siccumque statui, cum primo loco calidum siccumque esse, idq; non moderatè, sed tertio excessu posuerit. Nos tamen in medendi ratione vt calido siccóque vtimur ad ea quæ præscripsit Dioscorides. Cæterum vt ab ea secum dissensio ne Galenus vindicetur, acuti homines iudicij legendum putant: Lauri enim folia calidissima: Populi verò albæ moderatè refrigerant: in vtrorúmque medio sunt Viticis folia: quod est verissimum.



SPALATHI duas species Dioscorides memorat. Priorem quidem sat luculenter descriptam: secundam inodoram, lignosam, candidam, deteriorem. Hanc Plantam esse posteriorem Dioscoridis Aspalathum Monspeessulanorum Officinæ crediderunt, ac iactarunt, & vt arbitror, haud probabiliter. Tota Planta cubitum non excedit, fruticosa admodum & ramosa, multis horrens spinis deorsum inflexis, firmis, acutis, in quibus enascuntur pusilla folia Lentis magnitudine, viridia, qualia etiam (sed teneriora) fert in nouellis ramulis, quibus subsunt rerens-nati aculei: flores in firmioribus & rigidioribus spinis, terni, quaterni, aut plures simul nascuntur, Genistæ similes, sed minores, colore nunc luteo, nunc pallescente, semen in siliquis exiguum, Crescit in Cantabris superata Pyrene, variisque Hispaniæ locis: atque etiam in Gallia Narbonensi. Ab herbariæ rei studiosis, cum Salman-

Forma.

Locus.

ricæ, tum Monspeessuli Aspalathus altera dicitur vulgo *Eulalia*. Huius floribus tritis & Saccharo conditis ad firmandas & restaurandas vires collapsas Salmaticenses vtuntur.

Vires.

ASPALATHVS II. HISPANVS, QVIBVSDAM,
 ALTER SCORPIVS, CAP. LXXV.





RVTEX hic rarò pedis altitudinem superat, totum densissimis spinis horrens, quæ non inordinatim vt in alio nascuntur, sed seriem quandam seruant, & semper contrario inter se exortu binæ nascuntur, virentes quidem, sed languidiore colore quàm superiores, neque aliæ ex aliis: summis ramulis inhaerent bini aut terni flores superiori similes, colore Luteo, mense Martio: quo tempore exiguas breuésque siliquas, vel potius semina Erui magnitudine, multa incanâque Lanugine hirsuta deprehenduntur, densissimis spinis occultata vt ex superiore æstate deciderant: adeo verò canescebant, vt initio araneorum telas existimarem: radix singularis, sed in plures deinde propagines sparsa, dura, lignosa. Nascitur in collibus Granatæ vicinis.

Forma.

Locus.

Absoluto iam Dumeto nactus imagines *Erica prima* & quarta Clusij, quarum historiam antea tradidi cap. xxxj. dum eius plantæ genera persequer, illas potius volui spectandas hic præbere, quam lectorem, cuius studio & voluptati inseruiendū precipuè duxi, angere eorum desiderio, secundam editionem expectantem, in qua cognatis addantur, & suis restituatur eis locus.

ERICA I. Clusij.*ERICA II. Clusij.*



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER TERTIVS,



*Quo describuntur, atque pictæ ostenduntur arbores,
quæ in Viridariis & Pomariis coluntur.*

MALUS CAP. I.



ILVIS egressi, densisque fruticibus & dumis extricati in Viridario paulisper spatiemur, Pomiferasque arbores in eo contemplemur, atque alias quæ mitioribus succis voluptatem primæ cibis attulerunt, & necessario alimento delicias immiscere docuerunt, ut ait Plinius, siue illæ ultro, siue ab homine didicere blandos saporis adoptione & conubio: à quibus etiam salutare petuntur medicinæ. Nam si ne sylvæ quidem, horridiorque naturæ facies medicinis carent, quanto magis his Viridarium abundabit, cuiusvis generis stirpibus diligenti cultu atque industria educatis, quæque arte & humanis ingeniis fiunt verius quam nascuntur, consitum. Scire autem licet quemadmodum in sylvis quasdam esse arborecentes stirpes quæ in dumetis & frutetis humiles nascuntur, & fruticosas quæ non solum in frutetis & dumetis, sed etiam alibi proveniunt, ita in sylvis quasdam sponte, & in dumetis frutetisque nonnullas citra cultum prodire, quæ in Viridaria translatae diligenter coluntur atque aluntur, quarum historia utrobique explicari potest. A Malis quæ pueris etiâ & mulierculis notissimæ sunt, Viridariū exordiemur. Dicitur Malus Græcis μηλέα, & Malū μῆλον, Arabibus *Tufa*, *Tufaha*, Italis *Mele*, & *Pomi*, Hispanis *Mansanas*, Germanis *Oepffel*, *Apffel*, Angl. & Belg. *Appel*: Gallis à pomis ferendis nomē retinet, vocatur enim *Pōmier*, & fructus *Pome*, Sed *Pomi* nomē apud Latinos multò latius patet. Verum obtinuit usus, ut quemadmodum caulium appellatio deflecteret à generis significatione ad Brassicam priuatim designandam, ita pomus pro Malo, & Pomum pro fructu caperetur. Tamen Plinius genere neutro ipsam quoque arborem Pomum appellavit, ubi Poma putanda esse docet sicut & vites. Pomum inquit Hermol. cōplectitur quicquid apud Græcos ὀπώρα continet, in quo significatu est, cum dicitur à Medicis omne Pomum refrigerandi & humectandi vim habere, &c. Scaliger fructum omnem in Pomum & Nucem perridiculè secari à Grammaticis scripsit, ut Nuci extra sit cortex, intus caro, Pomo contrà. Nam etiam quæ carnem foris, os intus habent, nihilo

Li. 16. præf.

Nomina

Li. 15. ca. 17.
Cor. 161. li.
1. Diosc.

In lib. 2. de
pl.

nihilominus habent φλοιὸν extrā. Nemo enim vidit fructum cortice carentem, aut corio, aut cute. Simplicior in Malo ratio est. Caro intus, foris cutis multiplicior in Pruno: cutis extima, os intimum, caro media. Operosum æquē in Armeniaco cutis extima, nucleus intimus, os circū nucleū, caro sub corio, nucleus sub cuticula, duo esculenta, caro, nucleus, os inutile ad cibum, cutes indifferentes. Plinius Nuces Poma vocavit. Solum hoc Pomum, inquit, natura compacti-
 li operimento clausit: & Mora, minimē in hac arbore (Moro) ingenia profecerunt, nec nominibus, nec insitis, nec alio modo quā Pomi magnitudine. Neque Varroni assentitur Scaliger, scribenti quod indigent potu Poma dici potuisse: imo Pomum dictum esse ille arbitratur, quia etiam sitim tollant eorum plurima, simul vt sint cibo & potui. Malorum genera Dioscoridi sunt, Vulgaria, Cotonea, Persica, Armeniaca, Medica, siue Citria. Vulgaria, Verna, Melimela, Epirotica, siluestria. Posteritas multo plura addidit genera. Ac primū vulgariū quidem prope infinita, & plura quā vt hīc explicari possint, sapore, forma, inuentoribus, regionibus, atque pluribus alijs differentiis distincta. Malorum multa genera Plinius etiā numerat, Citrea, Zizypha, vulgo (Iuiubes) Tuberes, & vulgo *Peschenoix*, in agro Veronensi nascentia lanata, à lanugine obducente nuncupata: ac rufum, Reliqua cur pigeat nominatim indicare, cū conditoribus suis æternam propagauerint memoriam, tanquam ob egregium aliquod in vita factum? Ni fallor apparebit ex eo ingenium inferendi: nihilque tam paruum esse, quod non gloriam parere possit. Ergo habent originem à Matio, Cestioque (vnde Cestiana quibusdā *Pommes de Capandu*,) & Manlio, item Claudio. Quin & (non quibus, vt vulgo legitur) Cotoneo insito ab Appio è Claudia gente, Appiana sunt cognominata. Odor est his quæ Cotoneorum, magnitudo quæ Claudianis, color rubens. Ac ne quis id ambitu valuisse claritatis & familiæ putet, sunt & Sceptiana, ab inuentore Libertinò, insigni rotunditate. Cato adiicit Quiriana, & quæ tradit in doliis condi, Scantiana. Omnium autem nuperrimè adoptata sunt parua, gratissimi saporis, quæ Petisia vulgo *Apioles*, nominantur. Patrias nobilitauere Camerina, & Græcula. Cætera è causis traxere nomen: germanitatis, cohærentia & gemella, nunquam singula in fœtu: coloris, Serica: (vulgo *Suzine*,) cognationis, Melapia (neque enim accipiendum est Melappia, vt in omnibus ferè exemplaribus legitur, cognationis nomen è gente, vel familia accepisse, sed à cognatione quam Mala ipsa cum Piris habeant (vulgo *Giraudete*, *Pommepoire*;) Mustea à celeritate maturescēdi quæ nunc Melimela dicuntur, à sapore melleo, (vulgo *Pomme de Saint Jean*,) Orbiculata à figura orbis in rotunditatem circumacti (vulgo *Pomme Rose*.) Hæc in Epiro primū prouenisse, argumento sunt Græci qui Epirotica vocant. Mammaram effigie Orthomastica, (vulgo *Pomme Taponne*) A conditione castrali seminis, quæ spadonia appellant Belgæ (vulgo *Pomme Grillote*, & *Pomme de passépomme*) Melofoliis, vel, vt alij legunt, Melophyllis, folium vnum, aliquando & geminum erumpit è latere medio. Celerrimè in rugas marcescūt Pannucea (*Panettes*.) Stolidè tument Pulmonea (*Pommes follanes*.) Sunt quibus sanguineus est color, origine ex Mori insitu tracta. (*Grosses Pommes rouges*, vulgo.) Cunctis verò quæ fuerunt à sole partes rubent. Sunt & parua gratiâ saporis, atque etiam acutiora odore, syluestria. Iis peculiare improbitatis & acerbitatis conuiciū, & vis tanta, vt aciem gladij perstringat. Dacis fermè vilissimis nomen, quanquam primis aduentu, decerpique properantibus. Hæc Plinius. Nunc singulæ regiones plurimas habent malorum differentias. In Gallia sunt propemodum innumeræ. Sed hæc principatum obtinent. Capendula, siue Curtipendula, vulgo dicta, sui saporis, verū adeò grati, vt & trans maria veneant. Gestatum plus quam alicui credibile sit tolerant, in

tanta

Lib. 15. c. 22.

Li. 15. c. 24.

Li. 1. cap. 31.

In li. 1. caus. cap. 21.

Genera.

Lib. 1. c. 131.

Lib. 15. c. 14.

Lib. 15. c. 14.

Corna. li. 8.

ca. ph. par.

cap. 4.

Ruell. libr.

1. cap. 96.

tanta suauitate minimè fugacia, magnitudine media, colore cum maturuerunt luteo, suauis odore, sed angusto, quo tamen animus exhilaretur: cartilagine corporis dura, vt quæ possint in annum custodiri. Sæpe & bina visa sunt. Secundas partes sibi vendicant quæ in Ambianensi municipio Rambura vulgus nominat, prægrandia, rotunda, callo fragili, tenero, vt quæ ventorum flatu deturbata in partes desiliant, mira & suauitate gustus, & teneritudine, ita vt in ore frustra liquecant. Sed vt fugientia diu seruari non possunt, neque ferè ad exitum Autumni prorogantur. Proxima sunt, neque eis suauitate cedentia, quæ vulgus Palsipoma nominantur, quod cum reliquis omnibus de primatu certarent, nisi tam fugacia nascerentur: inde vernaculum nomen ductum est: mediocri magnitudine, turbinatiore figura, carne suauis, prætenera, gustu perquam iucundo, femine per maturitatem in utero sonante. Sed vt mirè placent, ita cito fugiunt. Accedunt quæ Paradisiana, quasi cælitus missa nominantur, præparua, mellea dulcedine, præcoci celeritate, quasi verna, concretu pauco, Dacia Plinij, vt quidam opinantur. Ea malaciis prægnantium expetuntur, omnium ferè Pomorum fugacissima. Alia dulcia sunt callo corporis duriore, rotunda, quæ ob sui nimiam dulcedinem à palato morosiore fastidiuntur, fortasse Melimela dicta à melleo sapore, vt à maturescendi celeritate, Mustea. Melimela tamen non solum natura prouenire, sed etiam mellis conditura fieri, ac dici alia Mala posse indicat Martialis hoc disticho.

Sit tibi Cecropio saturata Cydonia melle,

Ponentur, dicas hac Melimela licet.

In Xen.

Quam custodiendorum & condiendorum Cydoniorum rationem exposuit Columella, eiusque conditura liquorem Melimeli appellari scripsit. Acida vulgus nostrum Malacria à saporis acrimonia nuncupat, oblongiora, dura carne, ex acerbo leuiter acescente. Annum hæc sæpius durant, ægris ad inuitandam elanguescentem appetentiam nonnunquam concessa. Alia Castinia austeriore gustu, dura, velut Castaneæ cartilagine, mediocri magnitudine, oblonga. Alia vulgo francetura, rotundo habitu, & amplo, duriore callo, grata acerbitate, quæ tandem in dulcedinem abeat. Ea diu seruari possunt, & annicula sæpe reperiuntur. Sunt & Rubelliana sanguineo cortice, carne intus friabili, sapore non ingrato, ex austero subdulci, nec cito fugientia. Apud Allobroges celebrantur quæ vulgo Girodeta nominantur, parua, in latitudinem rotunda, & in rubrum rufa, multum ferotina. Reliqua non pigeret nominatim persequi, atque alia plura à Cordo descripta, quædam etiam ab Athenæo breuiter explicata, vbi & Dionysius primus Pomorum inuentor fuisse legitur, nisi prolixior de iis oratio ab utilioribus nos diutius reuocaret. Præterea in tanta Malorum nomenclatura, ferèque nationibus omnibus varia, in tantisque insitionum adulteriis perfacile nos fallimur. Porro genera quæ quotidie nouo insitionis ingenio prodeunt, nec scribit, nec in tanta gentiliū vocabulorum discordia pernotari planè queunt, ea tamen obiter quæ Gallico vulgo peculiaria nascuntur, retulimus. Malus in proceram & crassam satis arborem acrescit tempore, vnico caudice, ramos ex eo statim emittens, in latum longumque sese diffundentes, crasso satis libro contextos, foris cinereo, intus flauo, læui potius quàm aspero. Folia huic videntur oblonga, mucronata, inquit Plinius, carnosæ, per ambitum tenuiter ferrata, instante hieme decidua, Maio mense renascentia. Flores edit verè foliatos, sæpius albos, nonnunquam ex candido rubentes, ex quibus oriuntur Mala innumeris differentiis, vt diximus, discreta. Radicibus nititur paucis, non in profundum actis, sed summa tellure vagantibus. In viridariis & hortis colitur, soloque pingui & fecundo gaudet. Floret mensis Aprilis fine, aut Maii initio.

Li. 12. ca. 45.

Libr. 3.

Forma.

Li. 16. c. 24.

Locus.

Tempus.

fructus

MALVS.

Lib.1.Dios.
cap. 131.

Lib.2.c. m.
pa.
Li. 12. c. 45.
Li. 14. c. 14.

Ibidem.



fructus in quibusdam Iulio mēse maturus est, in aliis Augusto, in aliis Septembri. Seminis nigredo maturitatem ostendit. Matthiolus ea Mala principatum obtinere in Hetruria scribit, quæ Appiole, & Melerose vulgo vocantur: quoniam hæc duo genera tum suauiter olent, tum gustui sunt gratissima. Quare is, inquit, non aberrarit, qui Appia esse dixerit Dioscoridis Melimela, Rosea verò quæ eidem Epirotica, & Latinis orbiculata dicuntur Cornarius Cestiana mala, quæ Sestiana Columella vocat, Arantia, siue Aurantia esse putat, quæ in citreorum genere ab omnibus recensita, hoc maximè persuasus, quod ea frequenter cum Malis punicis Galenus coniunxit. Eum sententia reuocare debuit Plinius apertissimè scribens à Cestio Cestiana, sicut à Matio Matiana, & alia ab inuentoribus à Romanis fuisse cognominata. Quare Galenus cum ex auctoritate Apollonij tradit in capitis dolore ex ebrietate Cestiana mala Romæ sic appellata in cibis cocta conferre, Aurantia intelligere

re non potuit, tum quòd Apollonio & Galeno incognita fuisse censentur, tum quòd ea nunquam cocta exhibentur. Galenus in tanta malorum varietate, quomodo de eorum temperamento, viribus, vsu recte iudicare possimus, docet his ferè verbis. Quædam Mala saporem habent austerum, alia acidum aut dulcem, nonnulla etiam ex iis mistum, apparéntque & dulcia simul & adstringentia. Præterea alia quædam cum dulcedine manifestum habent acorem. Adhæc alia cum acore acerbiteratem. Inuenias autem interdum & quæ hos tres sapores simul habeant euidenter, adeo vt acida appareant & dulcia, acerbiteratîsque habeant nonnihil: Et mox. Quæ quidem astringunt, succum habent frigidum & terream. Quæ acida apparent, frigidum quidem, verum tenuium partium. Mediæ autem temperaturæ sunt dulcia, quæ tamen ad calidius vergunt, quemadmodum quæ omnis qualitatis sunt expertia ac veluti aquosa, ad frigidum inclinât. Malis igitur vtimur pro vincente in saporibus facultate austeris quidem cum ventriculus vel propter calidam intemperiem, vel multam humiditatem fuerit imbecillior. Acerbis autem cum duo hæc aucta admodum fuerint. Acidis quâdo succum crassum, qui non magnopere frigidus fuerit, suspicaberis, in ipso esse collectum. Siquidem succus frigidus non acida, sed acria postulat. Vtraque certe & acida & acria succos crassos incidunt, in eo tamen differunt, quod hæc quidem cum calefactione, illa autem cum refrigeratione hoc præstent. Porro dulcis Malorum succus cum sine acrimonia & crassitie, hoc est cum solus exquisitè fuerit, celerius quantum in ipso est distribuitur: Sin acrimoniam, aut crassitiem habuerit, citius subducitur. Cæterum optima etiam genere Mala vitanda sunt, antequam in arboribus maturuerint, quoniam concoctu sunt difficilia, & frigida, prauiq; succi, & tardè permeant. Adhæc succum habent frigidum & leuiter crassum. Quæ verò bellè matura in hiemem, & ver proximū asseruât, morbis sæpe numero per quam vtilia sunt, aut farina aqua subacta circumlita, aut calidis cineribus mediocriter assata, aut pulchrè in aquæ bullientis vaporibus percocta. Dare autem ipsa conueniet statim post cibum, aliquando etiam cum

Temper.
& Vires
Li.2. Alim.

cum pane, ad ventrem & stomachum roborandum, iis qui cibum fastidiunt, tardèque concoquunt, quique vomitu, diarrhœa, ac dysenteria infestantur. In hunc quoque vsum apta sunt acerba. Nam parata vt modò dixi, mediocrem retinent adstrictionem. Idem Galenus alibi. Malus non omnis eiusdem naturæ est, velut nec eiusdem fructus. Quædam enim dulcia sunt, quædam austera, nonnulla acida, alia summopere exoluta, & aquea. In ipsis sanè aqueum exuperat, vt temperies eorum sit tum humilior, tum frigidior, in acerbis autem terrenum frigidum, in austeris tum istud, tum aqueum frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum: Sic quoque succi, cortices, & arborum folia inter sese dissident. Itaque si austeriora sint, atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio fluxionem repellere, ac stomachum ventremque exolutum & languidum roborare: aquosioribus autem mediocres phlegmonas incipientes & gliscentes lenire. Porro quod plurima Malis omnibus recrementitia frigidæque insit humiditas, vel hinc liquet, quod eorum omnium nullus omnino succus durare, ac vetustatem ferre possit, verū acescunt eorum, in punctumque vniuersi. Folia, inquit Dioscorides, flores, & germina cum omnis Mali, tum maxime Cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi vis inest, maturis verò longè secus. Ex iis verna bilem gignunt, nervos omnes lædunt, inflationes pariunt. Melimela ventrem molliunt, & ab eo animalia expellunt: stomacho negotium exhibent: æstuationem faciunt. Ea multis dulcia Mala vocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho vtilia, sistunt aluum, vrinas euocant, Malis tamen Cotoneis inualidiora. Sylvestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Sanè in hunc vsum immatura omnia opus sunt. Mala verna inquit Plinius, acerba, stomacho inutilia sunt: aluum & vesicam cogunt: sic enim legendum: nervos lædunt. Cocta meliora. Melimela & reliqua dulcia, stomachum & ventrem soluunt, siticulosa, æstuosa, sed nervos non lædunt. Orbiculata sistunt aluum & vomitiones, vrinas cient. Sylvestria mala similia sunt vernis acerbis, aluumque sistunt. Sanè in hunc vsum immatura opus sunt. Mala dulcia, inquit Matthiolus, ad melancholicos affectus valent, atque etiam ad pleuritidem, si in calidis cineribus cocta, & Glycyrrhizæ succo, Amylo, & Saccharo albissimo conspersa pleuriticis edenda præbeantur, tam mane quam vesperi horis duabus ante cibum. Acetum sic è Malis fit acerbis, aut sylvestribus, quæ in cumulo per triduum reseruantur, deinde mittuntur in cadum, cui fontana, aut pluuialis aqua miscetur, & opertum vas per triginta dies sinitur, ac subinde quantum fuerit aceti sublatum ad vsus, reddita pari aquæ copia id reparatur. Fieri vinum è Malis testatur Plinius. Nostri etiam è Malis vinum primum factitant, quod vulgo *Cidre*, vocatur, prelo, vel trusatilibus molis expresso, tortino succo. Deinde rursus secundarium, fratribus & recrementis in aqua maceratis, ita vt è Malis lora dici possit, non parum ad restringendam rusticorum sitim momenti. Vino è Malis vtuntur Septentrionales gentes, apud quos cæli iniuria prouenire vites minimè sinit. Malis omnibus caducis suillum pecus optimè pascitur, sed ea gestantibus dorsuariis iumentis tam graua, vt oneri alioqui viribus non impari succumbant. Siquidem vires (quod Apuleius in Asino aureo tradit,) odore illorum offensæ ita fatiscunt, vt oneri pares non sint, quod paulo aliter tradidit Plinius, nempe Pomorum onera à iumentis statim sentiri, ac nisi prius ostendantur his, quamuis pauca portent, sudare illico. In vniuersum de Pomis seruandis præcipitur, inquit Plinius, vt Pomaria in loco frigido ac sicco contabulentur, Septentrionales fenestræ sereno die pateant: Austri specularibus arceantur, Aquilonis quoque afflatu Poma detur pante rugis: colligantur Mala post æquinoctium autumnale,

Lib. 7. sim.

Lib. 1. c. 131.

Li. 23. ca. 6.

Li. 1. Diosc. cap. 131.

Ruell. libr. 1. cap. 96.

Li. 14. c. 16. Ruell. Ibid.

Li. 24. præf.

Li. 15. ca. 16.

neque ante xv. lunam, neque ante primam horam: cadiua separarentur stramentis, storeis, paleisve substratis: rara componantur, vt limites peruij spiritum æqualem accipiant.

MALVS CYDONIA,

CAP. 11.

Nomina



V *Æ μηλέα κυδωνία*, Latinè Malus Cydonia à Cydone Cretæ oppido dicitur, vnde primùm aduecta. Cotoneam Malum primus Cato nominavit, Officinæ Citoniam, Galli *Coingnier*, & *Coignacier*, Germanis *Quitten*, & *Kuttum*: *Kuttenbaum*, & *Quittenbaum*. Fructus *μηδον κυδωνιον* Græcis nuncupatur, Latinis Malum Cydonium, & Cotoneum, Officinis Citonium, Arabibus *Saffargel*, Gallis *Coing*, & *Pomme de coing*, Germanis *Kuttenopffel*, & *Quittenopffel*, Italis *Melo Cotogno*, Hispanis *Membrilho*, & *Marmello*, Anglis *Quintetra* Belgis *Que perreboerni*: Cotoneæ arboris mala, Dioscor. & Galeno auctoribus, duû sunt generum. Vera, inquit Dioscorides, rotunda, parua, & odorata: quæ verò Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Malorum Cotoneorum quædam dulciora, maiora, ac minus acerba esse Galenus scribit, quæ in Asia Struthia vocantur, alio in loco Cydonia à Struthiis, quæ etiam Struthiomela nominat, aperte distinguens, Cydoniorumque succum minùs esse suauem, & maximè adstringentem. Columella tria ipsorum genera facit. Struthia, Chrysomela (legitur tamen corruptè Chrysomeliana) Mustea. Idem tradit & Plinius, pluribus sed adiectis, Chrysomela, incisuris distincta, inquit colore ad aurum inclinante. Quæ candidiora, nostratia cognominata, odoris præstantissimi. Est & Neapolitanis suus honos. Minora ex eodem genere Struthea, odoratius vibrant, ferotino proventu, præcoci verò Mustea. Strutheis autem Cotonea insita suum genus fecere Muluianum (aliàs Miluianum) quæ sola ex his vel cruda manduntur. Sunt præterea parua syluestria, à Strutheis odoratissima, in sepibus nascentia. Hæc Plinius. Chrysomela syluestribus arboribus Malorum generis attribuit Vergilius, cum dixit.

Quod potui puero, syluestri ex arbore lecta,

Aurea mala decem misi, cras altera mittam.

Eclo. 3.

Struthia verò vel aperto errore Plinius minora esse dixit, vel in eo lectio vitiosa est, leguntur, cum Dioscorides & Galenus palam Struthia magna esse dicant, vera & genuina Cydonia, parua & rotunda. Ætius quoque ad medicamenti ex Malis Cydoniis compositionem, ex ipsis maiora iucundioraque, & minùs acerba, quæ videlicet Struthia appellantur, eligere præcipit. Quare maiora etiam in Plinio legendum esse apparet. Malorum Cydoniorum tria in Italia inveniuntur genera, inquit Matthiolus. Palma illis quæ peculiariter Mala Cotonea nominantur, pressa, incisuris interfecta, colore ad aurum inclinante, lanuginosa, & longè cæteris odoratiora. Proximo loco sunt quibus multo maior corporis moles, Dioscoridis, & Galeni Struthia. Hetrusci hæc, Pira Cotonea vocant, quod forma magis Pira, quàm Mala referant. Pulpa ac succo cæteris prævalent; colore, suavi odore, ac viribus cedunt. Postrema sunt Plinij Miliuana; ea quidam Notha vocant, quoniam ex Cotoneis quæ Strutheis, vel ex Strutheis quæ Cotoneis insitæ fuerant, proueniant. Totidem apud Gallos sunt genera. Quædam minora, rotunditatis in orbem circinata, odoratius spirantia, quæ peculiariter *Coings*, vocamus; Alia grandiora amplitudine pinearum nucum, pauciori lanugine operta, colore tam intus, quàm foris aureo, odorem non tam latè iactantia, quæ *Coignasses*, quasi *Cotonacea* vulgus nostrum

In libr. 7.
Diosc. c. 131.


Ruell. libr.
1. cap. 72.

nostrum appellat. Alia medio habitu inter ea visuntur, sibi priuatim Cotoneorum nomen vendicantia. Malus Cotonea vulgari Malo ferè similis est, foliis angustioribus, lauioribus, carnosioribus, durioribus, à tergo albicantibus, altera parte viridibus: flore albo, vel ex albo rubente, syluestris Rosæ figura,

Forma

MALVS

Cydonia.



quinque per ambitū foliolis distincto. Haud procera est arbor, fructu incuruatos trahente ramos, prohibentēque crescere parentem, tenui lanugine pubescente. In cultis, & hortis prouenit. Locum autem peculiariter frigidū & humidum desiderat. Si in calido statuatur, assidua rigatione illi succari opus est: fert tamen mediocris situs inter vim frigoris & caloris statum. Planis & decliuibus gaudet. Septembri & Octobri mensibus Poma eius maturescunt. Ea frigido & terrestri temperamento prædita sunt, ac propter vincentem adstrictionem minus cæteris Malis humectant. Frigida itaque sunt primo ordine, & sicca secundo. Stomacho sunt vtilia, auctore Dioscoride, vrinam cient: verū tosta nitiora sunt. Profunt cœliacis, dysentericis, purulenta extussientibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor commodè in stomachi aut ventris fluxionibus potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ, & sedes si procidant. Quæ melle condiuntur, vrinam mouent: mel autem sibi constringentem il-

Locus.

Tempus.

Temper.

et Vires

Lib.1. c. 131.

lorum vim, & spissantem adsciscit. Quæ cum melle coquantur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minùs spissant. Cruda cataplasmatibus adiiciuntur ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsis tuis, expressisque: sed quo perduret, quindecim sextariis succi vnus mellis adiungitur, alioqui in acorem degenerat. Fit oleum ex iis, id Melinum vocant, quo vtimur quoties adstringente oleo est opus. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus additur, & iis conuenit quæ adstrictionem desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibusque sanguinis: contra citam aluum, & mensium impetus in vino bibitur. Cotonea, inquit Galen. eximium quiddam, quod in aliis non inuenitur, habent. Nam præterquam quod adstrictionem fortita sunt copiosiore, succus etiam eorum diu durat, si quis ipsum cum melle coctum asseruet: cum aliorum pomorum succus, si reponatur, acescat, quia multam habet humiditatem. Permanet & Struthiorum succus, quando paratus rectè fuerit, quemadmodum & Cydoniorum. Verū hic minus est suauis, & summopere adstringens. Quare ad ventriculi maxime exoluti robur vti eo aliquando possis. Cotonea Plinio, cocta suauiora. Cruda tamen, duntaxat matura, profunt sanguinem excreantibus, ac dysentericis, cholericis, cœliacis. Non idem possunt decocta, quoniam amittunt constringentem illam vim succi. Imponuntur & pectori in Febris ardoribus: & tamen decoquantur in aqua cælesti ad eademquæ supra scripta sunt. Ad stomachi autem dolores cruda decoctæue cerati modo imponuntur. Lanugo eorum carbunculos sanat cocta

Li.2. Alim.

Lib.23.c. 6.

in vino, & illita cum cera alopeciiis, capillum reddit. Quæ ex iis cruda in melle condiuntur, aluum mouent. Mellis autem suauitati multum adiiciunt, stomachoque vtilius id faciunt. Quæ verò in melle condiuntur cocta, quidam ad stomachi vitia trita cum Rosæ foliis decoctis dant pro cibo. Succus crudorum lienibus, orthopnoicis, hydropicis prodest: Item mammis, condylomatis, varicibus: flos & viridis & siccus inflammationibus oculorum, excreationibus sanguinis, mensibus mulierum. Fit & succus ex iis mitis cum vino dulci tufis, vtilis cœliacis, & iocinori. Decocto quoque eorum fouentur, si procidant vuluæ, & interanea. Fit & oleum ex his, quod melinum vocauimus, quoties non fuerint in humidis nata. Ideo vtillissima quæ ex Sicilia veniunt. Minus vtilia Struthia, quamuis cognata. Phylarchus memoriæ prodidit lætaliū medicamentorum vim Cydoniorum Malorum odore iucundo hebetari, Phariacūm que venenum iniectum canistro, quod adhuc olebat Mala Cydonia in eo reposita, euanidum factum, maleficam vim suam amisisse: itaque mixtum & in potu datum, iis nihil attullisse noxæ quibus insidiæ struebantur: causamque postea eius rei cognitam fuisse illius inquisitione ac inuestigatione qui venderat. Compertum enim hoc accidisse, propterea quod condita in eo calatho Mala fuissent. Celtiberi Veratri albi succum, quo sagittis illitis feras immediabili vulnere conficiunt, si vbi Cydonia Mala fuerint, reponatur, elanguescere, & maleficam vim suam exuere vsuprehenderunt, eamque recuperari, si venenum per aliquot dies in foriis suspensum maneat, vbi alui excrementa egeruntur. Est & id animaduersum Cotonea cruda per hiemem asseruata, acerrimo suo sapore vuas pensiles adeo vitare, vt ex statim marcescant, quare seorsum ab iis reponenda esse. Multa hodie ex Cydoniis Malis parata in Officinis conseruantur. Ex iis enim sectis, diutius in aqua elixis donec tabescant, postea per linteum colatis sine compressione, deinde cum Saccharo percoctis in cerati consistentiam, fit quæ vulgo vocatur Galatina Cydoniorum (*Gelle de Coing*, Gallicè nominatur) res perlucida, pulcherrima, & gratissima. Ex eo quod reliquum est Valentius compressu cochleariis excreto, & cum Saccharo percocto, ad emplastri ferè consistentiam, Cydoniatū crassius & vilius fit. Si tam pellucidum illud quàm crassum simul cernantur, & cum Saccharo vt prius percoquantur, Cydoniatum fit (*Codignat* vulgus nostrum vocat) quod omnibus in vsu est, quodque ante epulas ad vnciam vnā sumptum, aluum sistit, post epulas verò soluit, & vapores ad caput ex ventriculo attolli prohibet: Estque id simplex. Aliud verò compositum, ex carne Cydoniorum in vino cocta, & melle despumato igne lento percoctis, iniectis Cinnamomo, Caryophyllis, Galanga, & variis aliis aromatibus, pro vario vtentium scopo, ad ventriculum firmandum, coctionem iuuandam, vomitum biliosum & pituitosum sistendum, ad pristinum calorem corpori restituendum, dissipandos flatus, & id genus cætera, si affectus sit frigidus: Si verò calidus, Cydonia cum aceto coquunt, adiectis quæ refrigerent. Sunt qui cholagogum vt parent, Scammonium admiscent, vt phlegmagogum, Turpetum cum Cnico. Paratur etiam Cydoniatum, siue Diacydonium, ex succo Cydoniorum variis immixtis aromatibus; ad languentem appetentiam excitandam, ventriculum & hepar roborandum, coctionem iuuandam, & confirmandam vtriusque vim retentricem. His accedit Conditum Cydoniorum, quod Miua officinis dicitur. Eaque nūc simplex, ex succo Cydoniorū fit cū vino cocto, addito melle optimo, & despumato: nunc composita, & aromatica, ex succo eodem similiter cocto, & in eo suspensis linteolo exceptis aromatibus diuersis. Ventriculum, hepar, & cætera viscera hoc medicamentū roborat, appetentiā excitat, coctionē iuuat,

vomitum

Athen. li. 3.

Pa de Bitoneis
vbiMefu. lib. 3.
Antid.

vomitum & lienteriam sedat. Galenus in Syria edulium componi tradit, quod *μηλοπλάκας*, idest placenta ex Malis Cotoneis appellatur: id adeo durare, vt patinae recentes ipso plenæ Romam adferrentur. Componebatur autem ex melle, & carne Cydoniorum læuigata simul coctis. Meminit & Galenus medicamenti quod non ex Melle solo & Malorū succo constat, sed & piperis albi habet quidpiam, & Zingiberis, & Aceti. Id diacydonion aliis locis etiam fusius idem describit, item Ætius, quod tum ad appetentiam excitandam his quibus ea languet, tum ad concoctionem iis qui parum foeliciter cibos concoquunt, valet, quod denique ventri robur conciliat, nec non id quod ex Cydoniorum carne, & iisdem ferè constat. Hæc Diacydonio Mesues ex succo, & Diacydonio ex carne, viribus affinia sunt. Illud Diacydonium ex succo. Galeno *διὰ μήλων*, & *διὰ μήλων*, idest ex Malis, scilicet Cydoniis dicitur, quæ absolute *μήλα* dicuntur totius generis appellatione, sicut & oleum priuatim *μήλινον*, idest Cydoniorum, atque emplastra *μήλινα*, quæ colorem Mali Cydonij referunt ex æruginè vsta. Pauli *ὕδρὸς μήλων* ex succi Cydoniorum sextariis duobus, Mellis sextariis tribus, aquæ sextariis sex, omnibus simul coctis, iisdem viribus pollet quibus Miua simplex Cydoniorum. Est etiam in Officinis frequens syrupus de Cydonijs ex eorum succo & Saccharo confectus qui dysenteriam hepaticam mirè sanat, valētior ex Cydoniorum paruorum, quàm ex Struthiorum succo. Oleum Melinum refrigerat, & astringit. Ob id ventrem totum inferiorem & nervos laxiores cogendo roborat, sudores immodicos sistit. Mirum est quod multi aiūt mulierē grauidā, si crebrius Mala Cydonia esitauerit, pariturā infantē tū ingeniosum, tū industriū. Semina eorū decocta in aqua, quousque in mucū liquefiant, prosunt illita omnibus inflammationibus, linguæque scabritiē mirificè læuigant. Eorūde succus libræ pondere, in quo Corallorū rubrorū, seminis Rosarū rubrarum, & Rhabarbari, cuiusque drachma, cū Hypocistidis & Acaciæ binis scrupulis ad tertias bullierint, magno est ad biliosas vomitiones, & ad dysenteria auxilio. Datur bis quotidie potandus, mane & vesperi, horis duabus ante cibum, sed ægris iam purgatis.

Li. 2. Alim.

Lib. 6. fan. tu. & libr. 8. c. ph. par. cap. 4. Lib. 9. c. 24.

Lib. 6. cap. ph. par.

Lib. 2. cap. ph. gen. Lib. 7.

Matt. Ibid.

MALVS PERSICA, CAP. III.

PRÆCIS *περσικὴ μήλα*, Latinis Persica malus dicitur, & Persicus Palladio, Gallis *Peschier*, Germanis *Pfersichbaum*, fructus *περσικὸν μήλον*, Persicū malū, Arabibus *Sauch*, *Chauch*, Gallis *Pesche*, Italis *Persiche*, Germanis *Pfersing*, Hispanis *Pexegos*. In torum quidē Persica peregrina etiā Aliæ, Græciæ que esse, ex nomine ipso apparet, inquit Plinius, atque ex Perside aduecta: ac rursum Persicæ arbores serò, & cū difficultate transiere, vt quæ in Rhodo nihil ferant, quod primū ab Ægypto earū fuerat hospitium, tū etiā Persicæ arbores in Rhodo florent tantū. Quibus accedere videtur Theophrastus testimoniū scribentis Persicā in Ægypto, & in vicinis locis ferre, in Rhodo ad florē tantū peruenire. Hoc tamen loco Græci codices mendosi sunt, quo pro Persica quidā Perseā legunt. Rhodacenā non aliā esse, quàm Malū Persicā, & ipsa Mala Persica Rhodacena esse contendit Cornarius, atque in omnibus Plinij, Pauli Palladij, Constantini de Agric. locis, quibus hac de re agitur, *ῥοδάκνια*, & duracina falso legi pro *ῥοδάκηνα*, & Rhodacena, ita vt ex Latinis Duracinis Græci nomen non sumpserint, sed contrā, vt apud Latinos Rhodacenorū nomen in Duracinenorū appellationē corruptū sit. Rhodacineæ arboris meminit etiā Ætius, inquit, & fructus Rhodacenorū de Persica Malo agens, vbi apertè Rhodace non appellari eius fructū testatur, quod tamen in codice meo non lego. Videtur autem Cornario appellatio ea à Rhodo deducta esse, quod primū ab Ægypto Per-

Nomina Lib. 12. c. 7.

Li. 15. ca. 13.

Li. 16. c. 26.

Lib. 3. Hist. cap. 5.

In lib. 2. ca. ph. par. & lib. 1. Pauli.

Li. 13. c. 108. Lib. 1.

Lib. 1. Diosc.
cap. 131.

Libr. 1.

Lib. 14. c. 3.

Genera.

Li. 15. c. 12.

In libr. 1.
Diosco. 131.

Li. 15. ca. 28.

ficarū arborū fuit hospitium, vt ex Plinio diximus: quomodo Damascena à Damasco sunt appellata. Ab hac Cornarij sententia valde dissentit Matthiolus, negatque eum quid Plinio & Palladio Duracina, quid Paulo *ῥοδάκνια*, quid Ætio, Constantino, aliisque Græcis auctoribus *ῥοδάκνια* significant, intellexisse, quod hæc tria & nominibus, & re ipsa differant. Rhodacenē enim non aliā esse quā Malū-perficā, & Rhodacena ipsa nihil aliud quā Mala Persica cū Cornario cēset: at Pauli *ῥοδάκνια* genus esse præcoci seu Armeniaci Mali q̄ ipse declarat his verbis, τὰ ὅτι πρᾶκτοκία τε, καὶ ῥοδάκνια, καὶ ἀρμένια κρείττονα τῶν περσικῶν: ὅτε ὁξύνει, ὡσάντως διαφθείρει. Id est Præcocia, Doracia, & Armenia Persicis præstāt: neque enim acescunt, neq; similiter corrumpuntur. Hic igitur *ῥοδάκνια*, rectē legi Matth. putat, non *ῥοδάκνια*, quod *ῥοδάκνια* Mala Persica sint duntaxat, non præcocia, *ῥοδάκνια*, Armenia, quæ & si inter Persica numerentur à quibusdam, nō tamen sunt simpliciter Persica. Neque tam ineptē dixisset Paulus, Rhodacena Persicis præstare, cum Rhodacena sint ipsamet Persica. Iam verò Duracina Persica Plinio Persicorū species sunt, non genus, quēadmodū Duracina Cerasa, & Duracinæ vuæ eidē, & Palladio Cerasorū vuarūque species. Quare alia iis erunt Duracina, alia Græcis Rhodacena, quæ vniuersē quidem Persicū omne significant, non autē aliquā eius speciem. Neque, vt Cornarius ait, vocat nostra ætas quædā Persica Mala Duracina, quod sint osse cæteris duriore, sed antiquos secuta, quod pulpa, carnēque gustui gratiora sint, longiorique tempore perdurent, quod de Duracina vna Plinius apertē scripsit. Duracina vna sine vllis vasis in vite seruabilis est: tanta est contra frigus, æstus, tempestatēque firmitas. Hæc ex Matthio. Plinius aliquot Persici genera recenset. Persicorum palma Duracinis. Nationū habent cognomen Gallica, & Asiatica. Post autumnum maturescūt, æstate præcocia, intra xxx annos reperta, & primo denariis singula venundata. Supernatia è Sabinis veniunt, popularia vndique. Pomum innocuum expetitur agris: pretiūmque singulis tricenis nūmi fuere, nullius maiore, quod miremur, quia non aliud fugacius. Longissima nāque decerpto bidui mora est, cogitque se venundari. Persicorū multæ species, inquit Matthio. Quedā rubent, quædam aureo colore fulgent, alia virescunt, alia candida sunt, alia sanguinea, alia Duracina, alia Cotonea vocantur. Præterea nonnulla dulcia, nonnulla acida, quædam vinosā, quædam amariuscūla, quædam etiam austera. Prima laus in cibus Duracinis sic dictis, quod caro tam pertinaciter ossi hæreat, vt auelli non queat. Duracinis adhæret corpus, inquit Plinius, è ligno que auelli nequit, cū in cæteris faciliē separetur. Inter hæc primas tenent quæ ab aureo colore, & odore periucūdo Cotonea cognominantur. Secundas quæ cortice detractō sanguineum succum fundunt, non quod gustu reliquis sint suauiora, sed quia magnitudine excellunt, & pulchro sunt colore. His fortasse non cedunt, quæ à Nucis similitudine Nucipersica nominantur, & colore, saporeque Persica Cotonea referūt, tū nō ingrata dētibus duritie gustū mira afficiūt voluptate. Est & aliud in Hetruria, & aliis Italiæ locis Persicorū genus, agricolarū māgonio factū, quæ Persica Amygdala vocāt, quoniā pro amaro Persici nucleo dulcē Amygdalarū modo includūt. Persicorum in genere multiplex differentia est. Prima *εὐτελεστάτη καὶ φαιδωτάτη*, vulgare est Persicum, carne succosa quidem, sed flaccida, molli, tenera inodora, quæ à nucleo tota recedit, vulgo *Pesche qui laisse le noiau*. In hac specie, Persica quædā parua sunt, quædam magna & ampla, quædam viridia prorsus, quædam rubris maculis picta, quædam carne vsq; adeo rubra, vt sanguinolēta videātur, & hæc nucleo etiā foris rubēte, alia nigro, lanata omnia. Altera species est eorū quæ Duracina Latini vocarūt, Græci quidā Rhodacena. Duracina quidē, non quod seruari possint diuti⁹, sed ob carnis duriorē ac solidiorē callū: Rhodacena verò

verò, aut quod odoris suauitate Rosam imitetur, aut quod plerūque roseo colore, id est rubro altera sui parte niteant. Gallorum alij *Presses*, & *Perses*, vocant, alij *Auberges*, præsertim si candida eorum pulpa fuerit, alij *Myrecotons*, si lutea, veluti Cydoniorum. Omnibus compacta, dura, solida, firma caro nucleo tenacissimè adhæret, & mandentium dentibus non alter resistit, quàm Mali aut Piri: ideoq; postrema mensa vtiliter sumitur, nec ventriculum cōturbat, aut in eo corrumpitur, cum alia Persica prima statim mensa præbenda sint, alioqui putredini corruptionique obnoxia. Duracinorum varietas in pulpæ colore sita est, nunc cādida, nunc lutea, quod genus frequentius reperitur, nunc ex albo subrubentis. Mira in omnibus & saporis, & odoris iucunditas, vinum etiam commendantis, si detracto cortice immergantur. Proueniunt insitione & nucleorum fatu: quod sic fit. Duracinorum præstantiorum nuclei defodiuntur, exacto bienio tenella arbor transplantatur, & cum abierit tertius annus, ea quæ bene comprehendit, vno supra terram pede secatur: cicatrice obducta plaga, qui postea nascuntur rami fructus gignunt, & ampliores, & sapidiores, quàm si arbor insita fuisset: adde quod adulta sic arbor, viuacior est quàm insita, & ætatem melius fert. Apud Paulū qui Latinas voces vsurpauit pro *δωράκια* legēdum est *δυσράκινα*. In Persicorum genere quidam Nucipersica recensent. Armeniaca & præcoccia an Persicorum generi adnumeranda sint, plerique dubitant, & iure quidem. Arboris certè tota facies à Persico discrepat, si proceritatem, vastitatem, ac foliorum figuram spectes. In fructu cognatio quædam intercedere videtur, sed quæ hoc nomen sibi vindicare non debeat. Malus Persica arbor est inter cæteras Malos humilis, folio Amygdalæ, maiusculo, in ambitu leuiter serrato: flore subpuniceo, Amygdalæ simili: Pomo carnosus, succulentus, extrinsecus lanuginosus, cute modò candida, modò rubente, modò lutea, in cuius altera parte profunda incisura, seu rima in longum porrigitur: dura intus & scabra nuce, in qua nucleus qualis Amygdalis, minor tamen, & amarior. Radicibus nititur debilibus, minimè in altum actis. Quamobrè cito confenescit, caditque hæc arbor, materia fungosa & imbecilli. Nucipersica arbor est humilis, præcoccis Persici proceritate, folio Amygdalæ, sed maiore: flore Puniceo. Pomum emicat viride, carnosum, succulentum, nulla exterius lanugine pubescens, dura intus & scabra nuce, in qua nucleis, qualis Persicæ Pomis. Passim in viridariis, hortis, & vineis nascitur Malus Persica. Gaudet etiam aquosis & apricis. Floret vere: fructus Autumno maturescit, celerimè marcescens. Nucipersicæ fructus Autumni exitu maturescit, diutiusq; Persicis ætatem prærogat: τὰ περσικὰ μήλα, auctore Dio-

MALVS PERSICA.



scoride, *εὐτράχεια*, *εὐκοίλια* τὰ *πέπρα*. Id est, Persica Mala stomacho grata sunt, matura faciem reddunt aluum (sic enim melius quàm Ruellius, Persica Poma matura, tam stomacho, quàm ventri vtilia) acerbam eam cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum è siccis alui, stomachique fluxiones sistit. Galenus verò scribit arborem ipsam in germinibus & foliis vincētem habere amarā qualitatem:

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires.

Lib. I. c. 131.

Li. 7. simpl.

ideoque folia eius trita, & vmbilico imposita, lumbricos necare, & alioqui sane etiam discutiens esse medicamentum. Fructum eius esculentum, scilicet Persicum humidius esse, & frigidius temperie. Idem alibi auctor est, Pomorum Persicorum succum, & veluti carnem, facile corrumpi, omninoque noxam inferre. Quamobrem non post alios cibos, vltimaque, sicut nonnulli solent, illa offerri oportere, quod in summo natantia corrumpantur. Hoc verò, quod omnibus commune est, memoria tenendum, quæcunque vitiosi succi, humidæque & lubrica sunt, facileque descendunt, ac se cedunt, præ aliis comedenda esse: sic enim & ipsa celeriter subeunt, & aliis præeunt, ac quasi iter muniunt: Postrema verò sumpta, vnà secum alia quoque corruptioni reddunt obnoxia. De iisdem Persicis hæc Plinius Valerianus. Persicum in cibo est quidem stomacho inutile, eo quod cito succus eius marcescit, & caro æque per concoctionem vitatur, verum minimè graue, dum modo, non diu in intestinis moretur, & ad ima semper exitu celeri festinet. Persica in cibo negant medici membra nutrire: sed & Galenus suadet nunquam omnino post cibum sumere, quoniam corrumpuntur, si cibis cæteris innatent. Persicorum folia trita, & imposita, ventris animalia perimunt, & expellunt. Eadem sicca, & in puluerem tusa, recentes plagas vulnorum cruentorum claudunt. Nucleus Persicorum capitis dolori cū oleo & aceto tritus illinitur, quamuis quidam cum solo rosaceo terere malint. Gummi, seu gutta quam Persicorum truncus illacrymat, fluenti aluo medetur. Eadem mixta cum vino, etiam in vesica lapillos frangit. Trita cū aceto impetigines reprimat. Decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperum arteriæ canalem lauiorē facit. Excreantibus sanguinem miro modo subuenit. Thoracis obstructos sinus reserat, vitia pulmonis expurgat. Non rectè igitur Plinius scripsit Poma Persica innocua expetiri ægris, vtilioraque; Prunis Persica, succumque, eorum etiamnum in vino, aut in aceto expressum, vel, vt alij legunt, succumque, eorum etiam expressum, cū vino, aut aceto. Nec esse alium eis Pomis innocentiorē cibum. Nusquam minus odoris, succi plus, qui tamen sitim stimulet. Folia eius trita & illita hæmorrhagiā sistere. Nucleos Persicorum in aceto & oleo, capitis doloribus illini. Flores Persicæ, inquit Fuschius, Saccharo cōditi instar Rosarum, aut Violarum, aluū haud leuiter mouet, atque subducit. Esu etiā idē præstāt, auctore Matthiolo, vomitionesque cient, Hydropicorum aquas pellūt, si recentes in acetariis edantur, sed nō absque labore. Arboris lacryma datur ex aqua plantaginis, aut portulacæ vtiliter ad cruetas reiectiones, tussientibus verò, & anhelosis ex mulsæ, aut tussilaginis decocto, addito croci momēto: facit ad raucedines, & asperæ arteriæ impedimēta. Datur calculosis cū succo Rhaphani, aut Limonū, aut ex vino duarum drachmarum pōdere. Folia cōtusa illinuntur vtiliter vētri, ex aceto, ad interaneorum vermes. Eorundē succus purulētis, vermiculosisque auribus instillatur. Nuclei tormina vētris tollūt, si deuoretur: ebrietatē mirū quantam arceant, si seni, septenūe præsumantur. Tunduntur, & decoquuntur in aceto, quousque liquecant, pulticulæ modo, ad alopecias: nā illiti mirū in modū capillos euocant. Contusorum cremor ex aqua Verbenacæ vtiliter frōti ac tēporibus illinitur in capitis dolore. Ad idē valet oleū ex iisdē expressum, cōuenit enim peculiariter hemicranie, somnumque cōciliat, id quod & cremor facit. Instillatur idē oleū ad aurium dolores. Tam potū, quā clysteribus infusum, coli dolores à flatu genitos, ac etiā à facibus exsiccatis valde mulcet. Datur quoque potādū iliæcis, ac calculosis quatuor vnciarum pōdere. Maximè verò nuclei Persici calculosis auxiliantur, si quinquaginta cū centū cerasorum nucleis, florū Sābuci manipulo, vini Cretici libris tribus excipias fictili nouo, & in fimo sepelias diebus decē, deinde vitreis organis destilles. Aqua enim, quæ inde fluxerit ante cibū hausta 4. vnc. pōdere mirificè renū calculos expellit.

Li. 2. Alim.

Lib. 15. c. 12.
Lib. 23. c. 7.In Hist. pl.
cap. 28.
Lib. 1. Dio-
scor. ca. 131.

MALVS ARMENIA. CAP. IIII.

MΗΕ' Α ἀρμενιακή, Latinis Malus Armenia, fructus μήλα ἀρμενιακά, **Nomina**
 Mala Armeniaca, seu Armenia, Latinis Præcocia, auctoribus Dio- **Lib. I. c. 131.**
 scoride, & Galeno. Dicuntur & Præcoqua: Græci Bericoca ferè pro- **Li. 7. simpl.**
 nunciant, Galli *Abricots*, Mauritani *Mermex*, seu *Mirmix*, *Mex*, *Mes-*
mes, *Mismis*, Itali *Armeniache*, *Bacoché*, *Moniache*, & *Grisomele*, Hispani *Albiricoques*, *Al-*
barchigas, & *Aluaricoques*, Germani *S. Iohans Pfersich*. Armeniaca peregrina quoque **Li. 2. Alim.**
 fuisse ex nemine cognoscitur. Ex genere Persicorum esse Galenus scribit. Ali- **Genera**
 quot eorum distinguuntur genera, sapore & præcipuè magnitudine differentia,
 quod non solum cœli solique clemètia euenire credendum, sed etiam agrico-
 larum arte: frequenti enim insitione maximè proficiunt, & augeſcunt, Sed duo
 præcipuè Gallis nota, magnitudine tantum paruitatèque fructus distantia. Ma-
 iora & mole corporis, & suauitate præcellentia, Præcocia, Galli vocant *Gros*
Abricots, quod insita fuerint, minora Armenia, quæ in Gallia Narbonensi *Arme-*
gues vocantur: Gallis cæteris *Petits Abricots*, quod sponte gignantur. Malus Arme- **Forma.**
 nia rarò procera est arbor, Persicæ ferè similis, nisi quod folia fect Populi nigra
 æmula, in summo acuminata, per ambitum serrata, quaterna, quinquæ simul
 emergètia: flores albos, Cerasi florum figura, ex quibus fructus proueniunt Per-
 sicorum quadâtenus specie, aureo colore cû purpura mixto, propter quem *Gri-*

MALVS ARMENIA

maior.



MALVS ARMENIA

minor.



somele à Romanis vocantur, quasi Crysomela, id est, aurea Mala, eaque præcipuè
 quæ eo in tractu Persicorum magnitudinem æquant. Os intus cõcluditur, non,
 vt in Persicis, scabrum, vtraque parte turgens, in quo nucleus eadem figura, in
 quibusdam amarus, vt in Persico, in aliis dulcis, vt in Amygdala. In viridariis **Locus.**
 & hortis coluntur. Maturescunt incunte æstate, mense Iunio, ante alios fugaces **Tempus.**
 fructus, vnde Præcocia dicta. Bonitate Persica superant, inquit Galenus: neque **Vires &**
 enim in ventriculo, vt illa corrumpuntur, neque in ventriculo acescunt. Vulgo **Temper.**
 autem

autem suaviora apparent, vnde etiam stomacho sunt gratiora. Idem alibi fructus, inquit, Mali Armeniæ frigidior, humidiorq; est secundo quodammodo ordine. Armeniaca, inquit Dioscorides, minora sunt Persicis, & stomacho uti-
 liora. Quidam tamen recentiores medici refragantur, & ea magis quàm Persica corrumpi affirmant. Oleum ex nucleis expressum, Matthiolo teste, mirificè valet inunctum ad inflammatas hæmorrhoidas, ad vlcerum tumores, linguæ impedimenta, & aurium dolores.

*MALVS CITRIA, LIMONIA, AVRANTIA,
 POMA ADAMI. CAP. V.*

MΗΛΕΪ Α μηδικῇ, Malus Medica, & Assyria dicitur, vtroque nomine à regionibus ducto, præterea Citria, seu Citrea. Fructus, Mala Medica, & Cedromela, & Persica, auctore Dioscoride, ac Theophrasto: ἡ δὲ μηδικὰ χώρα, καὶ πέρις ἅλλὰ τε ἔχει πλείω, καὶ τὸ μῆλον τὸ μηδικόν, καὶ περσικόν καλῶμενον. Id est, Media regio & Persis alia plura profert, & quod Malum Medicum & Persicum vocant. Citria Latini appellant Citrea, & Cedromela, Galli Citrons, Itali Cedri, & Citroni, Hispani Cidras, Germani Citrinoepffel, Iudenoepffel, & Citro naten. Angli Citron tre, Belgi Citrotuen. Malus Medica Aurantiis, & Limoniis arboribus magnitudine par est: folia fert Laurina, vel Aurantiorum foliis similia, foraminibus visum fere effugientibus vndique punctim traiecta. Quare valde deprauatos esse Theophrasti Codices, falsamque Theodori interpretationem, in quibus Mali Medicæ folia Portulacæ foliis comparantur, Matthiolus, doctique alij viri rectè videntur existimasse. Sic enim Theophrastus: ἔχει δὲ τὸ δένδρον τὸτο φύλλον μὴ ὅμοιον, καὶ χεδὸν ἴσον τῷ τῆς ἀνδράχνης, ἀκάνθας δὲ ὅσας ἄπιος, ἢ ὄξυακανθος, λείας δὲ καὶ ὄξείας σφοδρά, καὶ ἰχυράς. Theodorus. Habet hæc arbor foliū simile, & penè æquale atque Portulacæ, aculeos quales Pirus, aut Spina acuta, sed leues, acutosque vehementer, & validos. A quibusdam scribit Matthiolus pro ἀνδράχνης legi ἀράχνης, id est, araneorum telæ, quod iis videantur Mali Medicæ folia tota valde exilibus foraminibus peruia, ut per ea, veluti per linteum spissius, transpici possit, faciliè telis araneorum comparari posse: à quibus tamen dissentit, ex Plinio pro ἀνδράχνης reponens ἀδράχνης, quæ

MALVS CITRIA.



Adrachne Plinio sylvestris est arbor, neque in planis nascens, similis Vnedoni, cuius folio, idem Plinius Medicæ Mali folium simile facit. His addo Athenæi testimoniū indicatum Theophrasti locum citantis: ἔχει δὲ τὸ δένδρον τὸτο φύλλον μὴ ὅμοιον, καὶ χεδὸν ἴσον τῷ τῆς δάφνης, ἀδράχνης καὶ καρύας. Id est, folio est hæc arbor simili, & ferè pari Lauri folio, Adrachnes, & Nucis iuglandis. Non dissimulandū tamen in Codicibus vulgaribus, ἀνδράχνης reperiri, id est, Portulacæ. Sed duæ voces δάφνης, & καρύας legendū esse ἀδράχνης necessario conuincunt. Quæ enim foliorum Lauri, & Iuglandis cum Portulacæ foliis affinitas? Est & hîc pro Theodoro dicendum, videri eum in Theophrasto ἀδράχνης legisse, non ἀνδράχνης, quoniam

Li. 7. simpl.
 Lib. 1. c. 131.

Lib. 1. Dio-
 scor. ca. 131.

Nomina
 Lib. 1. c. 131.
 Lib. & cap.
 4. Histor.

Forma.

In li. 1. Dio-
 scor. ca. 131.

Lib. 13. c. 22.
 Lib. 12. ca. 3.
 Lib. 3.

quoniam in eius versione lego. Habet hæc arbor folium simile, & penè æquale
 atque Portulaca: sic enim ἀδράχνην vertit, ad ἀνδράχνης discrimen, quæ Portula-
 ca est. Malus Medica igitur folia edit Lauri, siue Adrachnes, quæ folio, vt ait
 Theophrastus, & fructu omnino similis est Arbuto, nisi vtrumque id mi-
 nus esset, quod etiāmnū Græci narrāt, præcipuè Cretēses, apud quos Adrachne
 frequens, antiquo vocabulo vtrumq; seruatō Andracle nominatur. Arbutus
 autem folio inter Ilicem & Laurum medio, cuius Arbuti folio, Mali Medicæ
 folium confert Plinius, vt diximus. Ramos habet flexiles, viridi libro vestitos,
 atque spinosos: flores candicantes, Calathi effigie, capillamentis quibusdam
 in medio extantibus. Arbor hæc omnibus horis pomifera est, inquit Plinius,
 aliis cadentibus, aliis maturefcentibus, aliis verò subnascētibus. Quibus verbis
 hæc Theophr. interpretatus est: φέρει δὲ τὰ μῆλα πᾶσαν ὥραν. τὰ μὲν ὅσφρη, (ἀφῆ-
 ρηται. Ath.) τὰ δὲ ἀνθεῖ, τὰ δὲ ἐκπέπιδ. Pomorum aliqua est diuersitas tum magni-
 tudinis, tum saporis. Quædam in molem excreſcunt Melopeponibus parem,
 cuiusmodi sunt quæ ex Liguria, & Adriatici, Ægæique maris insulis afferuntur,
 Pomares ea nos vocamus, quasi Poma Citria. Alia his minora. Alia Limonum
 magnitudine, aut paulo maiora, qualia sunt quæ à lacu Benaco comportantur.
 Hæc principem in cibis locum obtinent, orique suauiora habentur, etsi cæteris
 minora. Illa verò grandia, & speciosa magnitudine præstantia, cum insipida fe-
 rè gustui non multum placeant, non æquè recentia, atque hæc in cibis proban-
 tur. Sed quia pulpæ multo plus habeant Officinis expetuntur Saccharo, vel
 melle asseruanda. Color omnibus aureus, facies oblonga, vt Limonum, sed
 crassior corticis pulpa. Cortex tuberculis, seu rugis asperatus, odore præstat,
 valde grato. Intus medulla succo acido plena, in qua semen hordei figura, gran-
 dius, sapore amaro, duro obtectum cortice. Apud Athenæum magna est inter
 Diphnosophistas quæstio, an mali Citrij apud antiquos facta fuerit mentio.
 Inter cæteros Æmilianus refert Iubam Mauritanorum Regem, in iis quos de
 Libya edidit commentariis Citrij meminisse, & apud Lybes Hesperidum Ma-
 lum fructum eum dici, ab Herculéque translatus, id in Græciam, dictumq; ibi
 à quadam auri similitudine aureum Malum, quod edidisse tellurem nunciato
 Iouis & Iunonis connubio fabulantur: Vnde nuptiale Pomum hoc intelligi
 volunt. Democritus verò apud veteres Citrij nomen reperiri negat. Eresij ta-
 men Theophrasti verba cogunt, inquit, fateri de Citriis audienda, quæ quarto
 de Plantar. Historia Philosophus scribit: ἡ δὲ μηδία χώρα, &c. quæ partim recitau-
 mus, partim referemus post hac. Plinij ætate non erant in Italia, vt ipse testatur
 his verbis: Tentauēre gentes transferre ad sese propter remedij præstantiam fi-
 ctilibus in vasis, dato percauernas radicibus spiramento. Mox subiicit. Sed nisi
 apud Medos & in Perside nasci voluit. Theophrastus: πεῖρεται δὲ καὶ εἰς ὄστρακα
 διαλείρημυα, καθάπερ οἱ φοίνικες. Seritur etiam fictilibus in vasis perforatis, quem-
 admodum Palmæ. Nunc contra vernæ factæ sunt istæ arbores, atque Italo solo
 tam familiares, vt non modò in maritimis, sed in mediterraneis etiam tum
 hortis, tum viridariis, tum etiam insignium lacuum ripis frequentissimæ sint:
 postea quam Palladij diligentia, industriæque (is enim primus proditur artem
 hanc inuenisse) factum est, vt ex Media in Italiam translatae prouenerint, ac
 propagatae fuerint, quem solers imitata posteritas ea Galliæ, Hispaniæq; com-
 municauit. Matureſcunt integro anno, decerpunturq; aureo colore fuluescen-
 tia. Theophrasti sæculo nondum Citria Mala in ciborum vsum venerant, id
 quod testatur his verbis: τὸ δὲ μῆλον ἐκ ἐοικέται μῆνι, ἔυοσμον δὲ πᾶν, καὶ τὸ φύλλον τῷ
 δένδρου, καὶ εἰς ἱμάτια τεθῆναι τὸ μῆλον, ἀκοπα διατηρεῖ. χρήσιμον δὲ ἐπιδὼν τύχη πεπωκώς
 τις φάρμακον, ἢ πρὸς τῷμας δωδῖαν, εἰν γὰρ τις ἐψήσας ἐν τῷ ζωμῷ, ἢ ἐν ἄλλῃ τινι, τὸ
 ἔσθθην

Lib. 3. Hist.
cap. 16.

Lib. 12. ca. 3.

Ibidem.

Lib. & cap.
4. Hist.

Matth. ibi.

Lib. 3.

Cap. 4.
Lib. 12. ca. 3.

Matth. ibi.
Locus.

Tempus.

Lib. 4. Hist.
cap. 4.

Lib.3.

ἔσθθεν τὸ μῆλ' ἐκπέσῃ εἰς τὸ ἔρμα, καὶ καταρροφήσῃ, ποιεῖ τὴν ὁσμὴν ἡδέϊαν. Athenæus verò sic legit. χρήσιμον δὲ, ἐπιδὰν καὶ τύχητις πεπωκὼς θανάσιμον φάρμακον. Ἰδοθὲν δ' ἐν οἴνῳ διακόπῃ τὴν κοιλίαν, καὶ ἐξάγῃ τὸ φάρμακον, καὶ πρὸς ἔρματος, &c. Id est, Pomum eius non estur, sed ipsum odore pollet, & arboris folium, ac si vestibus interferatur Malum, eas ab offensis vindicabit. Vtile etiam cum letale venenum quis hauserit: quippe in vino datum ciet alium, & venenum exigit. Oris quoque suauitatem commendat, & si quis in iure cocti, vel in quodā alio liquore, expressi Pomi interaneis succum sorpserit, suauem halitum cōciliabit.

Lib.12. c.23.

Malus Assyria quam alij vocant Medicam, inquit Plinius, venenis medetur. Folium eius est Vnedonis, inter currentibus spinis. Pomum ipsum aliàs non manditur: odore præcellit foliorum quoque, qui transit in vestes vnà conditus, arcetque animalium noxia, Et paulo post. Hæc est autem cuius grana Parthorum procures incoquere diximus esculentis, commendandi halitus gratia. Refert apud eundem Athenæum Democritus Citrium Malum veneni cuiuslibet remedium esse, quod à ciue suo Ægypti gubernatore, didicerat, qui cum deprehensos in maleficio quosdam ad serpentum morsus damnaasset, quos omnibus eiusmodi bestiis lacerandos obiicerent, productis illis, & ad theatrum euntibus latronum supplicio destinatum, in via fortè caupona quadam mulier eorum miserta, quod in manibus tum habebat, & arrodebat, Citrium Malum dedit, acceptum verò illi comedere, & paulò post ferocissimis maximisque anguibus oblatis, & ab aspidibus commorssi, nihil læsi sunt, hæsitabundo & attonito iudice, qui tandem custodem eorum militē cū interrogasset, nunquid bibissent, aut edissent, vt id comperit quod acciderat, nimirum absque dolo Citrium illis traditum fuisse, postridie alteri rursus dari iussit, alteri minimè. Percussus hic confestim periit, incolumi altero qui Citrium prægustauerat: indeque cognitum est, multis expertis, Citrium aduersari venenis omnibus. Quod si quis Citrium integrum, quale natura est, cum semine, in Attico melle coquat, donec liquatum tabescat, & eius liquoris, matutino, tres quatuorue digitosumat, tutus erit à venenatis omnibus medicamentis. Easdem Mali Medici vires Vergilius quoque celebrauit, & faciem arboris depinxit his versibus:

Georg.2.

*Media fert tristes succos, tardūmque saporem
Fælicis Mali: quo non præstantius ullum,
Pocula si quando seuæ infecere nouerca,
Miscueruntque herbas, & non innoxia verba,
Auxilium venit, ac membris agit atra venena.
Ipsa ingens arbor, faciēmq; simillima Lauro:
Et si non alium latè iactaret odorem,
Laurus erat: folia haud ullis labentia ventis:
Flos apprimè tenax: animas & olentia Medi
Ora fouent illo: & senibus medicantur anhelis.*

Lib.1. c.131.

Malum Medicum Dioscoridi oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum: semen habet Piri. Id in vino potum venenis resistit, alium mouet, oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus: vestiariis impositum ab erosionis vitio vestes vindicare existimatur.

Lib.23. c.6.

Citrea contra venenum in vino bibuntur, inquit Plinius, vel ipsa, vel semen. Faciunt oris suauitatem decocto eorum colluto, aut succo expresso. Horum semen edendum præcipiunt in malacia prægnantibus: ipsa verò contra infirmitatem stomachi, sed non nisi ex aceto facile eduntur. Mali

Li.7. simpl.

Medicæ fructus, quod ait Galenus, non iam Malum Medicum, sed ab omnibus Citrium

Citrium nuncupari solet. In fructu vincentem is habet qualitatem acidā & siccam, vt tertij sit ordinis resiccantium, refrigerantiūque. In cortice verò de-
 ficcantem etiam temperiem est sortitus, non parum habentē acrimoniæ. Qua-
 re hic desiccatur secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut
 paulò infra: Cæterum caro eius crassi pariter succi est, & pituitosa, frigidāque:
 nam & ipsa editur, sicut & cortex. Fructus totus edulis nō est, nempe nec humi-
 dum illud & acidum, de quo primū differui, nec granum quod in illo inueni-
 tur, & reuera semen est. Amarum hoc est, & digerendū videlicet, siccandūque
 facultatem obtinet, secundo propemodum ordine à temperatis recedens:
 folia verò exsiccandi, ac digerendi vim habent. Hæc Galenus. In quibus
 animaduertendum esse annotat Matthiolus, hæc Galeni verba, In fructu, ἐν τῷ
 καρπῷ, quidem vincentem habere qualitatem acidam, & cætera, non de nucleis,
 seu vero semine accipienda esse, sed de acido Citrij succo, cuius in medio semē
 includitur. Eam Galeni mentem esse declarant ipsius verba in fine capitis adie-
 cta, Fructus totus esui ineptus est, nēpe tum humidū illud & acidū, de quo pri-
 mū differui, tum nucleus qui in illo inuenitur, & reuera semen est, & cætera:
 quam Galeni sententiam non rectè assecutus Auicenna, inquit Matthiolus, se-
 men Citrij secundo ordine calidum siccūque esse scripsit: at libro de viribus
 cordis frigidum siccūque tertio, nulla acidi succi Citrij mentione facta, quem
 Galenum seminis Citrij nomine comprehendisse diximus. Ego verò in Codice
 Auicennæ Venetiis excuso, & ab Andræa Bellunensi correcto, lego corticem
 Citri calidum esse primo ordine, siccum in fine secundi: carnem eius calidam
 humidāq; primo: succum ipsius acidum, frigidū siccūq; tertio: semen calidū
 primo, siccum secundo. Libro verò de viribus cordis, semen esse siccū tertio ex-
 cessu, in quibusdam exemplaribus frigidū, siccūq; esse secundo. Citria si cruda
 manduntur, inquit Matth. non facili cōcoquuntur, & crassum generant succū:
 quare iis melle, aut Saccharo conditis vesci satius est: ventriculū enim calfaciūt,
 & roborāt. Nostra tamen ætas gulæ nimiū indulgēs in cibis Citria cruda præfert
 cum assatis carnibus esitata. Citria aduersus atrā bilē, & tristitias quas illa exci-
 tat, opitulantur. Semen priuatim scorpionum
 iētibus & potum, & appositū medetur. Acidus
 eorum succus flauam reprimat bilem, arcetq;
 pestis contagia. Quare recentiores medici
 ad febres pestilentes, Serapiis ex eo confectis
 fœliciter vtuntur. Hominū industria transla-
 tione, insitione, omni denique cultus māgo-
 nio Citria in plures digessit formas, vt remis-
 siore sapore & vehementiore, item dilutiore
 saturatioreque colore differret: non multum
 tamen natura, & viribus, veluti Limonia, Au-
 rantia, atque Poma Adami vulgo nominan-
 tur. Limonia quæ Galli *Limons* vocant, An-
 gli *Limontree*, Itali *Limon*, tum facie, tum facul-
 tate Citria magis referūt: sunt tamen illis mi-
 nora, oblonga, cute minùs crassa, pallida, co-
 piofiore succo prægnantia, & acidiores: semi-
 ne ferè simili, minore. Arantia Poma, siue
 Aurantia, quod colore auri reluceant, ab auro
 meritò dicta esse videtur, vt aurea Mala verè
 nominari possint, Gallice *Aurenges*, Germani

Temper.

In li. 1. Dio-
scor. c. 131.Lib. 2. Can.
ibidem.Lib. 2. Can.
cap. 39.

Traet. 2. c. 3

Ibidem.

LIMONIA MALVS.



tat, opitulantur. Semen priuatim scorpionum
 iētibus & potum, & appositū medetur. Acidus
 eorum succus flauam reprimat bilem, arcetq;
 pestis contagia. Quare recentiores medici
 ad febres pestilentes, Serapiis ex eo confectis
 fœliciter vtuntur. Hominū industria transla-
 tione, insitione, omni denique cultus māgo-
 nio Citria in plures digessit formas, vt remis-
 siore sapore & vehementiore, item dilutiore
 saturatioreque colore differret: non multum
 tamen natura, & viribus, veluti Limonia, Au-
 rantia, atque Poma Adami vulgo nominan-
 tur. Limonia quæ Galli *Limons* vocant, An-
 gli *Limontree*, Itali *Limon*, tum facie, tum facul-
 tate Citria magis referūt: sunt tamen illis mi-
 nora, oblonga, cute minùs crassa, pallida, co-
 piofiore succo prægnantia, & acidiores: semi-
 ne ferè simili, minore. Arantia Poma, siue
 Aurantia, quod colore auri reluceant, ab auro
 meritò dicta esse videtur, vt aurea Mala verè
 nominari possint, Gallice *Aurenges*, Germani

Matthi. ibi.

Forma

Limo.

Nomina

Nomina

AVRANTIA MALVS.

Forma
Aurant.



sed etiam ad medendum perutilis, præsertim ad pestilentes febres cū exanthematibus corpus obsidentibus. Nam sex vnciarum pondere hausta putreos humores ab internis ad exteriora attrahit per sudores, quos valenter euocat, cordiq; plurimū confert. Arbores istæ, vt & Mali Citriæ, semper fructu onustæ sunt. Aurantia calidiore sunt cortice quā Limonia & Citria. Ille enim reliquis acrior & amarior gustu deprehenditur. Dulcia omnibus partibus excalfaciunt,

POMA ADAMI.

Forma
Arbo. A-
dam.



Pomerantzen, Angli *Orenge tree*, Belgæ *Arangie oppel*: Hispa. *Naranzas*. Rotundiora Limonibus, sunt cortice spissiore, amarioreq; , primum viridi, per maturitatem aureo prorsus colore nitente, minutissimis punctis notato. Intus alba caro intercurfantibus membranis conclusa, succo multo abundans, qui in quodam genere acidus, in alio dulcis, in alio vinosus est: semen paruum amarum. Horum & Limonum arbores, vt & Citriorum, coma perpetua virent, foliis Lauro latifoliæ proximis, crassis, læuibus, odoratis, in acutum desinentibus. Sed Aurantium foliis hoc propriū est, vt ad petiolorum omnium exortum, foliolum præcedat cordis figura, cui adnectitur foliū maius quod sequitur. Rami perinde ac in illis sunt flexiles, lenti, aculeati, cortice ex viridi subalbicāte: flores albi, odoris præstantissimi. Quibus in locis copiose proueniunt, sedulò ab vnguentariis ij decerpuntur ad varia odora conficienda: maximè verò ex iis aqua elicitur non solum odore præcellens, sed etiam ad medendum perutilis, præsertim ad pestilentes febres cū exanthematibus corpus obsidentibus. Nam sex vnciarum pondere hausta putreos humores ab internis ad exteriora attrahit per sudores, quos valenter euocat, cordiq; plurimū confert. Arbores istæ, vt & Mali Citriæ, semper fructu onustæ sunt. Aurantia calidiore sunt cortice quā Limonia & Citria. Ille enim reliquis acrior & amarior gustu deprehenditur. Dulcia omnibus partibus excalfaciunt, cæterorum succus refrigerat, & putredini aduersatur: quare febricitantibus conueniunt, dulcia verò contra. Ex Limoniorum sicuti & Citriorum succo fit Serapium ad extinguendum bilis feruorem non inutile, item ad pestilentes febres, & eas quæ contagionis vitio inficiunt. Aqua quæ ex Limonū succo vitreis metis extillauit, præterquam quod à mulieribus expetitur ad ornandam fucandamq; faciem, vitilignes & totius corporis maculas emendat, varos delet, acaros interimit: Serapiis admixta febribus acutis & cōtagiosis mirè succurrit. Epota ventris tineas necat, id quod etiam præstat succus recens expressus vnciæ pondere potus. Ex vino Cretico haustus mirificè calculos pellit. A Limonibus nō multū natura & viribus differunt Poma Assyria, quæ dicuntur vulgo Poma Adami, Gallis *Pommes d'Adam*. Plāta etenim quæ hæc gignit, folio est Limonij arboris, maiore, latiore: ramis similibus, floribus Citrei Mali: fructu Aurantiis duplo triploue maiore, rotūdo, cortice non

non admodum crasso, pallido, crispo rimis quibusdam aspero & inæquali, perinde ac si dentibus demorsus esset: quare putat ignarum vulgus hoc illud esse Pomum, quod in Paradiso deliciarum Adamus ederet. Succosa & acida madet pulpa, sapore Limonibus haud absimili, sed non tam palato grata, in qua latent semina Citreis, aut Limoniis similia. Valet horum Pomorum succus ad ea omnia, ad quæ Limonia, sed minore efficacia. Peculiariter autem valent hæc Pomina ad scabiem, si per medium secta, & tenuissimo sulfuris puluere aspersa, deinde cinere feruente calfacta, corpori scabioso affricentur.

MALVS PVNICA, CAP. VI.

MALVS Punica Græcis ροιὰ & ροὰ dicitur, quo nomine fructus etiam nuncupatur, Latinis Malum Punicum, Africa circa Carthaginem Punicum Malum cognomine sibi vendicat, inquit Plinius, aliqui granatum appellant. Hippocrates σίδας appellat ροὰς, id est Mala Punica, σίδας οἰνώδης ἐκχυλώσας, ἀλφίτα φυρήσας τῷ χυλῷ ξήρανον, &c. Ibidem tamen mox etiam ροιὴν γλυκεῖνῃν habet: Et alio in loco: ροφέν σίδης οἰνώδους τὸν χυλὸν, id est, Mali Punici vinosi succum sorbendum præcipit. Arabes *kuman*, *Ruman*, seu *Roman* vocant, Itali *Melagrano*, & *Pomogranato*, Germani *Granatoepffel*, Hispani *Granadas*, & *Romanas*, Galli arborem *Grenadier*, fructum *Pome de Grenade*, & *Migrazine*, Anglis *Pomaranat tree*, ab interiorum granorum multitudine. Sunt tamen qui ita dici velint à Granata Hispaniæ regione, quod in ea valde multa proueniant. Plura Mali Punici genera sunt. Plinius. Diuisit & in genera, Apyrenon vocando, cui lignosus nucleus abest. Sed candidior ei natura, & blandiores sunt acini, minúsque amaris distincti membranis. Mox addit. Nucleos habentium quinque species, dulcia, acria, mista, acida, vinosa. Quum itaque genera quinque hoc loco tradiderit, superuacua vox legitur alio in loco, in quo legitur: Punici Mali nouem genera nunc iterare superuacuum. Dioscor. tria tantum agnoscit, dulcia, acida, vinosa, quæ vinosa mediam, inquit, sortiuntur naturam. Alij *μέσα* vocant, id est, nec dulcia, nec acida, sed inter hæc media, Arabes *Muza*, quia *μέσων* in Muzum corruerunt. Monspelienses *Mezanas* appellant, seruatō quidem τῶν μέσων nomine, quamuis non integro, Dioscor. igitur vno genere dulcia, altero acria & acida, tertio mista & vinosa comprehendit. Præterea alia sunt syluestria, alia mitia, & in cultis nascentia.

Nomina

Lib. 13. c. 19.
Li. de mul.
nat.Lib. 1. de
mor. mu.Genera.
Lib. 13. c. 19.Lib. 23. c. 6.
Lib. 1. c. 127.

PVNICA MALVS.



Punica Malus arbor est haud adeo procera, folio angusto, nitidique viridis, Olea, aut Myrti emulo, crassiusculo, rubris intercurrentibus venulis, è rubro pediculo pendulo. Rami multi, flexiles, spinosi: flores phœnicei, oblongi, calathi modo paruli, ore stellatim dissecto, è quo folia emergunt tenuia, colore coccineo, agrestis Papaueris æmula, cum granulis quibusdam, mediis capillamentis appensis, vt in Rosa. Fructus Pomum est, corio & membrana tectum, extra rufescente, intra flauescente, innumeris granis farctum, angulosis, rubentibus, vinoso succo refertis ossiculis in eis latentibus, quæ grana intercurrenti-

Forma.
Matth. lib.
1. c. 127.

bus flauis tenuibúsq; membranis miro naturæ artificio distinguuntur. Ligni
 Li.16, c.26. materies flaua, cinereo cortice vestita. Punica in iis numerat Plinius quæ fructû
 perdunt facillimè ante maturitatem, & quæ roribus etiam nimis, & pruinis flo-
 rem amittunt. Qua de causâ inflectunt ramos eius, ne subrecti humorem infe-
 stum excipiant, atque contineant. Si florem non continet, vrinam veterẽ cum
 aquæ mensura pari temperabis, & ter per annum radicibus infundes, vel arbo-
 ris florentis truncum plumbeo concludes circulo. Quidam Punicis Malis sub-
 Plin.lib.17, strato lapide non rumpi Pomum in arboribus tradunt. Punica satiuæ florem
 cap.11. Cytinum Dioscorides vocat, Balauustum syluestris. Plinius sine discrimine Pu-
 Lib.1, c.127. nica florem Balauustum nominat, & medicinis idoneum, & tingendis vestibus,
 Lib.13, c.19. quarum color inde nomen accepit, nimirum Punicaus. Et alio in loco, primus,
 Lib.23, c.6, inquit, Pomi huius partus florere incipientis, Cytinus vocatur Græcis. In hoc
 ipso Cytino flosculi sunt, antequam scilicet malum ipsum prodeat, erumpen-
 tes, quos Balauustum vocari diximus. Sic & Officinæ citra distinctionem Ba-
 laustia nominant & vsurpant, vt quibus Cytinorum appellatio de satiuorû flo-
 re penitus ignota sit. Præstâtissimi Cytini, & valde rubri ex Creta, & Cypro ho-
 die Venetias importantur, aspectu quidem pulcherrimi, & cæteris efficaciores,
 quibus similes fiunt in Italia mangonio, sed non adeo præstantes. Asperû Mali
 Punici putamen Græci Sidion appellant, Officinæ corrupta voce p̄sidion, Lati-
 ni Malicorium, quod Plinio auctore, vulgus coria maximè perficere illo nouit.
 Lib.23, c.6. **Locus.** Punica genera omnia non solum in Africa, sed etiam in Italia, Hispania, Gallia
 Narbonensi, in Viridariis, hortis, & vinetis copiosa nascuntur. Amat solum cre-
 tosum, macilentum, sed in pingui quoque prouenit. Regio ei apta, quæ calida
Vires. est. Malum Punicum omne boni succi est, auctore Dioscoride, stomacho vtile,
 Lib.1, c.127. perexiguum præbens alimentû. Dulcia stomacho vtiliora habentur, sed aliquan-
 tulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, vnde in febre abdicantur.
 Acida adstringunt, æstuanti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt,
 ac vrinâ cient. Vinosa verò mediam sortiuntur naturâ. Nuclei acinorum acidi
 Punici in sole siccati, & obsoniis insparsi, concoctiue, fluentem aluum stoma-
 chumque sistunt: iidem cælesti aqua madescunt, bibunturq; cõmodè sanguinem
 excreantibus: ad desessus dysentericorum, fœminarumq; fluxione vuluæ labo-
 rantium vtilis sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris,
 virilitatis, & sedis vlcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore extuberant, au-
 rium dolores, & narium vitia, præsertim acidorum. Huius flores, Cytini vocati,
 adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant: quas & Malum Punicû
 præstat vtilitates. Humida gingiuarû vitia, mobilésque dentes decocto colluun-
 tur: herniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. Memoria
 tradunt, qui tres quàm minimos Cytinos deuorauerit, nullam eo anno lippi-
 tudinem passurum. Eliquatur Hypocistidis modo. Malicorium asperû est Mali
 Punici putamen, quod aliqui Sidion appellant. Id spissandi vim habet, & quos
 Cytini præbet vsus. Decoctû radicis potu latas ventris tænias pellit, & easdem
 euocat. Balauustum syluestris Punica flos est, Cytino similis. Eius complura sunt
 genera, candidum, fuluum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur Hypocisti-
 dis modo: cui adstrictoria vis inest, eadem efficiensq; Hypocistis & Cytinus.
 Hæc Dioscorides, in quibus quæ Græcè leguntur, *ἐῖς εὐκαθίσματα διυσεύτεσιν αἰσὶν, καὶ
 ῥοικῶν ἀρμόζῃ*, & vertit Ruellius ad desessus dysentericorum, & fœminarum flu-
 xione vuluæ laborantium vtilis sunt, Cornarius aliter interpretatus est, Iis ad
 infessus dysentericorum, & fluxione alui laborantium nucleus commodus est:
 vt sint *ῥοικοί*, qui *ῥοικὰ γὰρ πὸς πᾶσιν* habent, neque *ῥοικὰ γυναικῆς* hîc intelligendæ
 Lib.23, c.6, sint. Punica dulcia, quæ Apyrena alio nomine appellauimus, inquit Plinius,
 stoma

stomacho inutilia habentur, inflationes pariunt, dentes gingiuasque lādunt. Quæ verò ab his sapore proxima vinosa diximus, paruum nucleum habentia, vtiliora paulo intelliguntur. Aluum sistunt, & stomacho profunt, duntaxat pauca, citràque satietatem. Sed alimenti dulcia minimum dant, atque omnino nulla in febris, nec carne acinorum vtilia, nec succo. Medentur æquè in vomitionibus, ac bilem reiicientibus. Vuam in his, ac ne mustum quidem sed protinus vinum aperuit natura. Vtrúmque asperiore cortice. Hic ex acerbis in magno vsu. Vulgus coria maximè perficere illo nouit: ob id malicorium appellant Medici. Vrinam cieri eodem monstrant: immistáque Galla in aceto decocto, mobiles dentes stabiliri. Expetitur grauidarum malaciæ, quoniam gustatu moueat famem. Diuiditur malum, cælestique aqua madescit ternis fere diebus. Hæc bibitur frigida cæliacis, & sanguinem excreantibus. Ex acerbo (Punico) fit medicamentum quod stomatice vocatur, vtilissimum oris vitiis, narium, aurium, oculorum caligini, pterygiis, genitalibus, & iis quas nomas vocant, & iis quæ in vlceribus excrescunt. Contra leporem marinum hoc modo. Acinis detracto cortice tufis, succoque decocto ad tertias cum Croci, & Aluminis scissi, Myrrhæ, Mellis artici, selibris. Alij & hoc modo faciunt. Punica acida multa tunduntur, succus in cacabo nouo coquitur Mellis crassitudine, ad virilitatis & sedis vitia, & omnia quæ Lycio curantur, aures purulentas, epiphoras incipientes, rubras maculas. In manibus rami Punicorum serpentes fugant. Cortice Punici ex vino decocti & impositi perniones sanantur. Contusum Malum ex tribus heminis vini, decoctum ad heminam, tormina sedat, & tænias pellit. Punicum in olla noua, operculo indito, in furno tostum & contritum, potúmque in vino sistit aluum, & discutit tormina. Primus Pomi huius partus florere incipientis, Cytinus vocatur Græcis, miræ obseruationis multorum experimento, (id Dioscorides & sine superstitione tradidit.) Si quis vnum ex his, solutus vinculo omni cinctus, & calceatus, atque etiam annuli, decerpserit duobus digitis, pollice & quarto sinistrae manus, atque ita lustratis leui tactu oculis, mox in os inditum deuorauerit, ne dente contingat, affirmatur nullam oculorum imbecillitatem passurum eo anno. Idem Cytini siccati tritique, carnes excrescentes cohibent: gingiuis & dentibus medentur, vel si mobiles sint decocto, vel succo. Ipsa capitula trita, vlceribus quæ serpunt, putrescuntue illinuntur. Item oculorū inflammationi intestinorūque, & ferè ad omnia quæ cortices Malorum aduersantur scorpionibus. Non est satis mirari curam diligentiamque priscorum, qui omnia scrutati nihil intentatū reliquere. In hoc ipso igitur flosculi sunt, antequam scilicet Malum ipsum prodeat, erumpentes, quos Balauustum vocari diximus. Hos quoque ergo experti inuenerunt scorpionibus aduersari. Sistunt potumenses fœminarum: sanant oris vlcera, tonsillas, vuam, sanguinis excreationes, ventris & stomachi solutiones, genitalia, vlcera quacumque in parte manantia. Siccauere etiam, vt sic quoque experirentur, inueneruntque tuforum farina dysentericos à morte reuocari, & aluum sisti. Quin & nucleos ipsos acidorum experiri non piguit. Tosti tufisq; stomachum iuuant, cibo aut potioni insparsi. Bibuntur ex aqua cælesti ad sistendam aluum. Radix decocta succum remittit, qui tænias necat victoriati pondere. Eadem discocta in aqua, (id est tam diu cocta, quoad coctura tabescat,) quas Lycium præstat vtilitates. Est & syluestre Punicum à similitudine appellatum. Eius radices rubro cortice denarij pondere ex vino potæ somnos faciunt. Semine potæ aqua quæ subierit cutem, siccatur. Mali Punici corticis fumo culices fugantur. Hactenus Plinius. Li. 8. simpl.

Malum granatum omne Galeno teste adstringentem qualitatem habet, non tamen in omnibus ea exuperat: sunt enim inter ea quædam acida, quædam

Dioscor.li.
5.cap.34.

magis dulcia quàm austera, & sane quæ ab vnoquoque eorum procedit utilitas, secundum vincentem eueniat qualitatem necesse est. Porro acini magis quàm succus, tum adstringunt, tum exsiccant: his etiam magis putamina, quæ vocantur Sidia. Similem illis vim habent Cytini. Paratur, inquit Matthiolus ex floribus Punicæ, hoc est, ex internis Cytinorum Puniceis, ac tenuibus foliis, & Saccharo conditum, quemadmodum ex Puniceis Rosis, admirabilis facultatis ad vtrasque vteri fluxiones, si semiunciæ pondere sumatur ex vino rubro austeriusculo, aut ex Punicorum acidorum succo, aut ex aqua in qua stomonia extinctum fuerit, vel etiam ex carniū iure, si alia defuerint. Cæliacis quoque & dysentericis, & gonorrhæa laborantibus valde confert. Malicorum exsiccatum cum sicca similiter marina spōgia, & Aloe tritum, æquali omniū pondere, addito Aluminis vsti momento penis & vuluæ vlcera breui sanat. Punicæ folia diligenter contrita, aut eorum succus Rosaceo permistus, inueteratos capitis dolores valdè mulcet, fronti frequenter illita. Punicum Malum fictili vase conclusum, operculo argilla circumlito, in furno combustum, dysentericos ac torminosos præsentaneo remedio iuuat, pulueris ipsius sesquidrachma hausta. Ofsiculorum Punicorum acidorum vncia cum thuris drachma in tenuissimum puluerem trita, auxiliatur fœminis albo vteri profluuiο laborantibus, si quotidie ex aqua rosacea binas huius pulueris drachmas hauserint. Fit ex Punicis maturis vinum, quod Rhoëtes nominatur, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest. Apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuiο exortam: stomacho vtile astringit aluum, & vrinam mouet. Hodie acini maturi diligenter à coriis & membranis purgati. Prælo committuntur, ac exprimuntur: mox vinum faccis ad id accommodatis percolatur, & in vasculis id excipientibus residere finitur, defæcatum reponitur affuso oleo, ne corrumpatur, vel ace scat.

P I R V S, CAP. VII.

Nomina



RÆCIS ἄπιος, Latinis Pirus dicitur, multis Pyrus à fructus figura, quod ad Pyramidis similitudinem è lato in acutum spectet, & in mucronem turbinetur, Gallis *Poirier*, Germanis *Byrbaum*. Fructus vocantur Pira, Græcis ἄπια, Arabibus *HumeËthe*, *Cirmetre*, seu *Kemetri*, Italis *Pere*, Germanis *Pyren*, & *Byren*, & *Byr*, Hispanis *Pyras*, Gallis *Poires*, Anglis *Pear*,

Genera.

Lib. & c. 15.

Boemis *Hrusky*, Belgis *Perre*. Vt Malorū, ita Pirorū plurima fuere apud antiquos genera, quæ à primis auctoribus, regionibus, colore, sapore, notis quibusdam, tempore quo decerpuntur, nomina inuenerunt. Sunt superba, inquit Plinius, parua, sed ocysima, (vulgo *Poires muscadelles*), cunctis autem Crustumina gratissima, (vulgo *Poire perle*.) Proxima iis Falerna à potu, quoniā tanta vis succi abundat, (vulgo *Poire Bergamote*.) Lactea à candore vocantur, vulgo *Poire Blanchete*: alia colore nigro donauit Syria. Reliquorum nomina aliter in aliis, atque aliis locis appellantur. Sed confelsis vrbis vocabulis auctores suos nobilitauere Decimiana, & ex eo tractum quod Pseudodecimianum vocant. Dolabelliana longissimi pediculi, (vulgo *Poire musset*.) Pompeiana cognomine māmofa, (vulgo *Poire de Bon chrestien*), Liceriana, (vulgo *Poire d'argent*), Seueriana, & quæ ex his nata sunt Tyranniana, longitudine pediculi distātia, Fauoniana rubra, (vulgo *Grosse Muscadelle*), paulo superbis maiora. Lateriana, (à colore laterum, vulgo *Poire preuost*), Aniciana, post Autumnalia, acidulo sapore iucūda. Tiberiana appellantur, quæ maximè Tiberio principi placuere, (vulgo *Poire forest*), Colorantur magis sole, grandef

grandescuntque, alioqui eadem essentq; Liceriana, Patriæ nomina habent, ferensissima omnium Amerina, (vulgo *Poires de saint Martin*.) Picentina, Numantina, Alexandrina, Numidiana, Græca, ex Achrade Spinosa arbore, quam Græci maxima diligentia coluerunt, & adhuc colunt, *Poire d'Espine*: & in iis, Tarétina Siguina, quæ alij à colore Testacea appellant, vulgo, *Poirechat* sicut onychina à colore gemmæ onychis, vulgo *Poire de cuisse madame*: purpurea. Ab odore Myrapiæ, qualis est vnguentorum fragrantium, vulgo *Caluau rosat*, Laureæ: Nardina. A tempore, Hordearia, quæ cum hordeo maturescunt, vulgo, *Poire de S. Ian*, à collo, Ampullacea, vulgo, *Poire d'Angoisse*, à corio, nimirum cortice depresso simili, vulgo, *Poire de ialousie*, Brutæ gentilitatis Cucurbitina, (vulgo, *Poire Courle*), Acidula, succi, vulgo, *Poire pomme*. Incerta nominum causa est, Barbaricis, Veneris que, quæ Colorata dicunt, *Poire Acciole*, Regiis, quæ minimo pediculo sessilia, vulgo *Poire Carmagnole*, Patritiis, Voconiis, Viridib⁹, vulgo *Poires d'hyuer*, oblongis que, vulgo, *Poires Certeau*, Prætera dixit volema Virgilius, à Catone sumpta, (quod volam impleant, vulgo libralia. *Poire de liure*), qui & Sementiua, & Mustea nominat. Scripsit & paulo antè idem Plinius, nec non & quædam è Piris libralia appellata, amplitudinem sibi ponderis nomine asserunt. Multo plura sunt hodie, imo infinita in tota Europa Pirorū genera, quæ propterea sigillatim explicari non possunt. Ex quibus hæc apud Gallos magno habentur in honore. Omnium gratissima sunt *Bon Chrestien*, cognomine, non ob hoc solum quod in eximia suauitate librale pondus æquent, sed quia teneritudine tanta, vt à gustatu, vel in ipso ore statim eliquescant, & perennent, gestatūque tolerant, ad Neapolim vsque delata Carolo octauo ibi res gerente, & à fœlici illa Campania, iis dotibus adoptata. Proxima magnitudine iis Mariana, vulgo Diuæ Mariæ Pira dicta, *Poires de nostre Dame*, aquosa dulcedine suauia, mira teneritudine placent, sed fugaciora multò. Minima omnium sunt Moschata, *Poires Muscadelles*, quæ nomine alio Chia dicuntur, *Poires de Chio*, baccas corporis mole non excedentia, quina, senaue, sæpe plura ab vna origine longis pendula pediculis, odorata, moschi iucunditate & ob id nomen hoc adepta erunt. Condiuntur saccharo à Salgamariis, vt in sequentem annum durent. Media magnitudine sunt Calliona, *Poires de Cailloian*, carne iucunda, dulci, odorata, friabili. A præstantia Piri Græcum nomen vulgus emendicauit, quasi dixeris meliora. Rosatis odor nomen dedit, quod Rosas oleant, *Poires d'eau Rose*. Bicipitia, quod gemino capite visuntur, *Poires à deux Testes*, singulari sunt commendatione, corpore suauis, non lapidoso, succi grati, palatum etiam morosum recreantis. Turbinatiora cæteris Certoliana, quæ Campanica alio nomine dicuntur. Ea in metæ speciem fastigiantur, hiemem tolerant, durioris corporis callo, mira suauitate, succo paucò. Prunis tosta fugacium ad veris exitum suppleant inopiam. Condiuntur & saccharo, adiecto Cinnamomi tantulo, vt cœnas claudant. Alia item Martiniana, *Poires de S. Martin*, quæ ad hiemem vsque in parente propendent, suauis gustu, firmisscula carne, quæ non nisi cocta ferè manduntur. Vbi gelicidia sensere teneriora multò: ea etiam hibernas mensas finiunt. Quæ finora Gallicè vocantur, *Poires de fin or*, quod auri puti colorem referant, asperiores sunt carne, ac duriores, nec priusquam gelu experiantur, edomita duritie mitescunt. Ea diutissime durant, quamuis in eo genere æstiuæ inueniantur, & præcocia. Magnopere commendantur Bergamota, *Poires Bergamotes*, haud ita pridem feri cepta in Gallia, & sapore, & succo præstantia. Non sunt omittenda Pira quæ tametsi pulchritudine, rubroque colore, aut luteo, quasi maturitatis indice, prætereuntes inuitent ad carptum, mansa tamen tanta displicent acerbitate, vt deuorari nequeant, sed demorsa protinus respuantur. Ob id strangulanea vulgo dicun-

Li. 15. ca. 11.

Ruel. lib. 1.
cap. 115.

Lib. I. Dios.
cap. 132.

Ibidem.

Forma.

tur, *Poires d'estrangillon*. Ex his, quamvis sapore adeo ingratis potus fit, paucis mensibus sic mitescens ut à nesciis pro albo vino bibatur, evanescente illa summa acerbitate breui tēporis spatio, feròque & indomito succo in vini gustum dulcescente, quod certè mirum est. Singula quotidie novis insitionum adultēriis emergentia prosequi neminem posse iam diximus. Hetrusci quoque, inquit Matthio. antiquos secuti variis nominibus à diuersis causis inditis sua Pira vulgò appellant, *Moschatelle, Giugnole, Ciampoline, Roggie, Ghiaciuele, Spinose, Quadrane, Carouelle, Papali, S. Nicolo, Durelle, Zuccaie, Cāpane, Vernareccie, Gentili, Porcine, Sementine*. Plura iidem alia habent suis nomenclaturis appellata. Sunt etiam duo in vniuersum quidem Piri genera. Est enim *Pirus sativa*, & *pirus sylvestris*, quæ ἀρχαῖς vocatur, & ὄχνη, idest *Piraster*. Dioscorides tamen cum scribit, ἡ δὲ ἀρχαῖς εἶδος ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ἀρχαῖς, βραδέως ὠπτανομένη. Idest, *Achras Piri sylvestris* genus est, quod tardè maturefcit, *Achradem Piri* speciem quandam facit. At Theophrastus cæterique omnes *Achradem* simpliciter *Pirastrum* quamcūque accipiunt, cuius variæ sunt differentia. Quod per transennam supra nos diximus, *Achras* lirus est spinis quidem horrida, agrestis modo, sed pulcherrimo & optimo fructu, quod insitione factum arbitror: ὄχνη verò, spinis quoque armata, sylvestris omnino est, ac inculta, aliquando mediocris altitudinis, sæpius humilis arbuscula, pusillo fructu, insuauissimo, nec homini eduli, *Pirus arbor* est *Mali* magnitudine, imo maior & procerior. Simplici crassòque caudice assurgit, plurimis ramis brachiato, rutila, crispàque materie trūci: foliis orbiculatis, superne læuibus, & bene viridibus, inferne sæpe nonnihil albicantibus: floribus foliatis: turbinata fructus figura, magnitudine, specie, colore, gustu valde diuerso. Semina in medio tunica concluduntur. Perdit facillime ante maturitatem fructum suum *Pirus*, etiam si non pluat sed austrinum tantum cælum sit atque nubilum. Amittit florem & primos fructus, si cum defloruerit tales dies fuerint: si blandiantur etiam austri cū florem parit, si sequantur protinus imbres, in totū Poma depereunt, & vel si nubibus spiret austrinúsque flatus, amittitur fœtus. *Piraster* ramosa, furculosàque est arbor, caudice rimoso, & hiulco ferè cortice, folio circinato: floribus quoque foliatis, fructu turbinato, sed imprimis acerbo, & gustu adstringente. Materies apprime dura. *Pirus* mensibus Aprili & Maio floret, æstate & autumno fructus maturefcit. *Piraster* hieme fructificat ferè, tardèque sua perficit Poma. *Pirorum* genera omnia adstringunt, autore Dioscor. Quare adduntur conuenienter in repellentia

P Y R U S.



Tempus.

Li. I. ca. 132.

Vires.

Lib. 23. c. 7.

cataplasmata Decoctum è siccis, & cruda ipsa aluum sistunt: ieiunos esitata lædunt. *Achras* nempe sylvestre *Pyrum* vim *Piro* urbano adstringentio rem habet, & ad eadem conuenit. Stringunt etiam eius folia. Ligni *Pirorum* cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si sylvestria Pira cum eis coquantur, innoxios fieri. *Pirorum* omnium cibus, teste Plinio, etiam valentibus onerosus, agris quoque vini modo negatur. Decocta eadem mirè salubria, & grata, præcipuè *Crustamina*. Quæcumque verò, cum melle decocta, stoma

stomachum adiuuant: fiunt cataplasmata è Piris, ad discutienda corporum vitia & decocto eorum ad duritias vtuntur. Ipsa aduersantur Boletis, atque fungis, pelluntque pondere, & pugnante succo. Pirum syluestre tardissimè maturefcit. Conciditur, suspensumque siccatur ad sistendam aluum: quod & decoctum eius præstat. Decoquuntur & folia cum pomo ad eosdem vsus. Pirorum ligni cinis contra fungos etiamnum efficacius proficit. Hæc Plinius. Cæterum pirorum facultates ex saporibus, & gustu dignoscuntur, cū dulcia natura distent ab acerbis, austeris, acidis, & contrà. Rectè igitur Galenus, Quæ de Malis diximus, inquit, si omnia ad Pira transferantur, nihil nouo alio de his sermone opuserit. Nam in his quoque alia austera tantum, vel acerbæ apparent, veluti quædã acida quædam dulcia, quædam ex horum mistione composita, quæ nullam penitus qualitatem exuperantem habeant. Quare cum aquea sint, nulla roborandi vi pollent. Talis igitur omnino Pirorum esus, qualis Malorum. Piri folia quod alio locoidem ait, pariter ac turiones, austera sunt: fructus dulcedinis quiddam obtinet aqueæ, ex quibus clara quoque temperies est, inæqualis secundum partes. Nam pars vna terrea est, alia aquea, cæterum vtraque frigida, tum alia temperata. Proinde Pira esu stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem desiccant, & modicè refrigerant. Nam ego iis illitis vulnus glutinasse memini, cum aliud ad manum non esset. Achrades magis quam Pira reliqua adstringunt, & desiccant, & proinde sanè maiora vulnera glutinât, fluxusque repellunt. Piris, inquit Matthiolus, præsertim grandibus, quæ in Hetruria Menate vocantur, aliqua nutriendi facultas inest. Quare ea secta in tenues orbiculos, & siccata reponunt, quibus coctis per hiemem & ver, in aliorum ciborum penuria vescuntur. In furno siccata Pira Galli seruant, & vel ita dura, liquore nullo macerata edunt, vel cum Saccharo aquæ incoxa & emollita, in cibo sumunt, & ægris præbent, excitandæ appetentiæ.

Li. 2. Alim.

Lib. 6. sim.

Li. 1. Diosc. cap. 132.

CERASVS,

CAP. VIII.

KΕΡΑΣΟΣ Græcis, Cerasus Latinis, Gallis *Cerisier*, Germanis *Kirschenbaum*, dicitur, fructus κεράσια, Latinis *Cerasia*, & *Cerasa*, Arabibus *Sarasie*, Italis *Ciregie*, Germanis *Kirschen*, & *Chirschen*, Hispanis *Cerezas*, Gallis *Cerises*, & *Guines*. Angl. *Cheriff*: Belg. *Kricken*: Bœmis, *Vuissnè*. Athenæus memoriæ prodidit Lucillum Romanorum Imperatorem, posteaquam debellato Mithridate victoria potitus esset, primum arborem hanc à Cerasunte Pontico municipio in Italiam detulisse, fructumque gentilitio nomine Cerasium appellasse. Quibus subscribit Plinius. Cerasi, inquit, ante victoriam Mithridaticam L. Luculli non fuere in Italia. Ad vrbis annum Domin. lxxx. is primum vexit è Ponto, annisque, cxx. trans Oceanum in Britanniam peruenire. Genera eorum nominat Plinius Aproniana quæ maximè rubent: nigerriima sunt Actia, vt & Cæciliana, rotunda. Iulianis gratus sapor, sed penè tantum sub arbore sua, adeo teneris, vt gestatum non tolerant. Principatus Duracinis, quæ Pliniana Campania appellat: in Belgica verò Lusitanis, in ripis etiam Rhæni. Tertius iis color, è nigro ac rubente, viridique similis maturefcientibus semper. Minus quinquennio est quod prodiere quæ vocant Laureæ, non ingrata amaritudinis, insitæ in Lauro. Sunt & Macedonica parvæ arboris raroque tria cubita excedentis: & minore etiam frutice Chamæcerasi. Gallis horum pomorum varia notantur discrimina. Quædam mediocri arbore, interdum pumila, & quasi frutice, pendent, pediculo breui, pomo rotundo, rubente, carne multa, molli, succosa, osse intus duro, nucleo dulci: quod genus maximè grato placet acore

Nomina

Lib. 2.

Li. 15. ca. 25.

Ibidem.
Genera.

acore, morosâque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malacis antequam maturescat, expetitur. Hoc Francis tantum Cerasij nomen meruit, reliqua varias fortiuntur appellationes. Vocant enim *Cerises*, alia vero Galliarum prouinciâ, ab acore, *Griotes*, & arborem *Griotier*, Ruellius Chamæcerasum dici putat. Quædam Pomo prodeunt, superiori proximo, ex arbore grædiuscula, longiore petiolo, gustu multo acidior & acerbo, cætera simili. Ea nimio sui acore respuuntur, ut alia quæ nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, turbinatiore pomi figura, longiorêque, pediculis longis, pluribus vna coeuntibus: baccis partim rubentibus, partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo non insuavi. Hoc malum acidis longe fugacius, primumque in Cerasorum genere maturitatem sentit, vulgus *Guines* & *Guindoules*, appellat. Sed inter ea habentur crassiora, multa carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo pertinacius hærente, qua de causa putat Ruellius Duracina nuncupari. Lugdunenses affini huic nomine vocant, *Dureines*, Quæ in totum rubent, mollitia cedunt: quæ partim albicant, partim rubescunt, cum utrisque societatem ineunt. Celerius maturescunt quæ molliore constant carne. Inueniuntur alia in nemoribus & syluis, nonnunquam in dumetis & cultis, baccis paruis, multum infra supradictorum magnitudinem, callo carnis rotundior, ossibus appresso, parte soli obuersa rubescente, auersa cadicante, sapore dulci quidem, sed dilutiore: ruri familiaria, sponte, nullo humano cultu nascentia. Alia nigerrima quibus succus inest sanguineus. Ea vescentium manus & labra suo sanguine, modo Mororum inficiunt. Vtraque Sessiana rura vocant. Sed posterius hoc veteribus Actianum dici putat Ruellius, ut prius illud forsitan Cæcilianum, curtato (ut plerumque in Gallia fieri solet) vetere vocabulo, sessianum pro Cæciliano concisum proferente. Sic & satiuarum Cerasorum fructus diuersorum esse generum in Italia, diuersisque nominibus nuncupari scribit Matthiolum, inter Cerasa, inquit, principem locum sibi vendicant, quæ Hetruscis vulgo *Marobiane*, & *Duracine*, vocantur: quorum alia maiora, alia minora, alia saturatè rubent, alia albicant. Quæ Plinio Iuliana, vulgo Hetruscis *Acquaiuolo*, hoc est aquea dicuntur, in nullo sunt pretio, adeo tenera & fragilia, ut nisi in ipsa arbore comedantur, facile gestatu collidantur, & marcescant. Præterea ob aquei succi redundantiam insipida sunt, orique ingrata. Quæ autem *Corbine*, quod coruorum modo nigricent, vulgo etiam vocantur, à Plinio Actia, & Ceciliana, cum sint duriuscula, & dulcia, gustui non sunt iniucunda, sed quia manus labraque atro colore inficiunt, mensis raro apponuntur. Sunt & Cerasia quæ ex vno petiolo terna, quaterna, quinaue dependent. Sunt & coaceruata in racemi modum. In cerasis habentur & illa, quæ Romæ *Visciole*, Senis *Amarine*, in aliis Italiae locis *Marasche*, vulgo nuncupantur, ab amarore non iniucundo sic dicta. Horum varia sunt genera, quæ & si omnia acida sunt, tamen quædam magis, quædam minus eo sapore linguam imbuunt. Rura Tridentina *Marasche* vocant, quæ minus acida gustu deprehenduntur. In horum quodam genere dulce acido permistum est, & ob id palato gratum. Alia *Marine*, & *Marinelle* cognominantur, gustu quidem similia sed minora, rotundiora, & breui pediculo appensa. Est & eorum tertium genus, quæ vulgus *Verule*, vocat, longiore pediculo, bacca crassiore, gustu acerbo, & valde acido, colore perpetuò rufescente, nec unquam in atrum vergente, cum cætera prorsus matura in nigrum rubescant. De syluestri paruoque admodum Cerasi genere, quod Chamæcerasum vocat Matthiolum, diximus in Dumeto. Sunt & syluestria Cerasa, quibus montes & sylvæ scatent, auium cibis potius quam hominum, ob acerbum simul & amarum gustum. Hæ sunt

igitur

Li. I. ca. 64.

Ibidem.

Li. I. Diof.
cap. 129.

igitur Ceraforum ex sapore, colore, locisque sumptæ differentiæ. Alterius Chamaecerasi meminit Asclepiades Myrleanus apud Athenæum, quæ in Bithynia nascitur, radice parua: neque arborest, neque arbusculis ceraforum impar: bacis cætera omnia consimilibus quæ copiosè vescentibus caput vini modo gra-

Libr. 2.

CERASVS.



CERASA EX

uno pediculo plura.



uât, & dolores cient. Sed hæc Athenæus putat de Memæcylis intelligi, quod huiusmodi fructum ex arbores edant. Cerasus, tradente Athenæo ex sententia Theophrasti, arbor est folio Mespili, præduro, latiore, cortice Tiliæ simili: flore albo, Piri, vel Mespili, pluribus flosculis racematim congesto, fauorū odore, fructu rubro, Diospyri figura, magnitudine fabæ: quamquam acinus Diospyro, mollis, Ceraso durus. Huic descriptioni multa alia addit Theophrastus, Cerasum scilicet ad viginti quatuor cubita proceritatis erigi, valde rectam esse, & à radice crassam, bicubitali crassamento. Plinius ramosam esse Cerasum prodit, & in quadraginta cubitorum trabes, æquali per totum duorum cubitorū crassitudine reperiri. Hæc de Ceraso potissimum paruula cerasa ferente, quæ Gallis, *Guines*, vocantur, intelligenda esse putat Dodon. Reliquæ enim Cerasi maiora Cerasia, siue acida, siue dulcia gignentes, humiliores sunt in Gallia, & in tantam proceritatem nō acerescent. Apud Theophrastū multo plura sunt, quæ hīc referre superuacuum foret. Cerasus cuius Paulo ante meminim⁹ procera est, crassaque arbor, cortice læui, spisso, colore Castaneæ: foliis magnis, longis, crenatis: floribus albis, in quinque foliola diuisis: fructu paruo, dulci, modò rubro, modò in nigrum vergente, acino intus concluso, in quo nucleus. Cerasus quæ Maiora Cerasia fert, mediocris est arbor, superiori foliis floribusque similis: fructu longiusculo, rotundo, dulci, modò ex rubro albicante, modò nigricante. Quæ acida Cerasia profert, humilis est arbor, tenera, nec diu durans: folia superioribus similia habet, minora: flores item similes: fructum rotundum, acidum, modò rubentem, modò nigricantem, intus nucleum minorem, & rotundiorem. Ex omnibus his, velut ex Persico Prunóque manat gummi siue lacryma, præsertim vulnerato cortice, vt etiam testatur Theophr. Quæ maiora Cerasia & acida edunt, in viridariis coluntur: reliqua ferè in planis campis, montibus, & syluis proueniunt. Septentrione frigidisque gaudent

Libr. 2.
Lib. 3. Hist.
cap. 13.
Forma.

Ibidem.

Li. 16. c. 30.

Li. 6. ca. 50.

Lib. 9. Hist.
cap. 1.

Locus.
Pli. libr. 15.
cap. 25.

Tempus.

CERASA AVSTERA

Matthioli.

CERASA

Racemosa.

Forma
Padi.

gaudent. Martio & Aprili mensibus florent, & inter primæ Pomis colono gratiam annuam referunt. Sylvestris Cerasi speciem quidam esse volunt plantam hîc depictam, quæ Theophrasti Padus Dalechampio esse videtur. Est ea sæpe humilis frutex, interdum iustæ magnitudinis arbor, cortice trunci cinereo, ramorum purpurascens: folio Cerasi acidi, venoso, in ambitu tenuissimè inciso: flore albo, promisso, Laburnique instar Palmum ferè longo, qui ex flosculis albis constat, suavisimè redolentibus, nec minus olfacienti gratis, quàm Mali Citriæ flores, odoris suavitæ alioqui præcellentes. Fructum fert rotundum, nigrum, magnitudine Pisi, gustanti acerbum, Mespilaceique saporis, graue quidpiam cum manditur, naribus afflâtem. Qua de causa Allobroges *Putier*, vocant, idest putidam arborem: Id quod magnam mihi admirationem mouet, Rarò enim accidere solet, vt suavisimum floris odorem fructuum molestus fœtor excipiat. Sequani vocant *Pudis*, quasi *Padis*, voce Pado corrupta. Quidam Cerasum sylvestrem esse putant, vt diximus, in eam sententiam foliorum fructumque inducti similitudine. Verùm à Cerasorum natura flos distat maximè, mea quidem sententia & formosus, & odoratus, adeo vt florem istum Laburnorumque, & structuræ elegantia, & odoris præ-

P A D V S Theophr.



ris præ-

ris præstantia, floribus aliis antepone non dubitem. In glareosis & arenosis locis prodit circa sepes, & dumeta. Nunc de Cerasorum facultatibus differamus. Cerasia, inquit Dioscorides, aluo vtilia sunt, si viridia sumantur: eadem siccata aluum sistunt. Gummi quod Cerasi resudarunt, cum vino diluto tussi vetustæ medetur: colorem commendat, visum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex vino potum calculosis auxilio est. Cerasa Plinio aluum molliunt, stomacho inutilia. Eadem siccata aluum sistunt, vrinam cient. Inuenio apud auctores, si quis maturino roscida cum suis nucleis deuoret, in tantum leuari aluum, vt pedes morbo liberentur. Cerasus arbor fructum fert, inquit Galenus, non paris adstrictionis in omnibus priuatim participem. Nam & in horum sicut in Malorum granatorum, & Malorum quibusdam, austera qualitas, in quibusdam dulcis, in nonnullis acida exuperat. Quinetiam ex dulcibus ea quæ nondum cocta sunt, ac matura, quædam admodum acerba sunt, quædam acida, similiter ac Mora. Sed in Moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in Cerasiis non semper. Ergo quæ dulciora sunt, magis quæ in intestinis sunt, subducunt, sed minus vtilia stomacho sunt: contrà austera. Quæcumque verò acida sunt, ea pituitosis, excrementosisque stomachis conueniunt: siquidem magis quàm austera deficcant, & nonnihil etiam incidunt. Porro arboris ipsius gummi cōmunem omnibus viscosis, & mordacitate carentibus medicamentis facultatem obtinet, quæ & ad arterias exasperatas commoda est. Propriè autem (si verum est quod quidam scribunt) calculis vexatos cum vino potum adiuuat.

Locus.

Li. I. ca. 129.

Virescit

Temper.

Lib. 23. c. 7.

Lib. 7. sim.

P R V N V S,

C A P. I X.



Οκκυμηλέα Græcè, Latinè Prunus dicitur, Gallis *Prunier*, Germanicè *Pflaumenbaum*. Fructus κοκκύμηλα, Latinè Pruna, Arabicè *Anas*, *Auas*, seu *Hagias*, Italicè *Prune*, & *Succine*, Germanicè *Praumen*, & *Pflaumen*, & *Pflaumenboen*, Hispanicè *Prunas*, *Andrinas*, & *Amexeas*, Gallicè *Prunes*, Belg. *Pruymboon*: Angl. *Plumtree*. Ingens turba Prunorum, inquit Plinius, versicolor, nigra, candicans. Hordearia appellata à comitatu frugis eius. Alia eodem colore, seriora, maioræque, Asinina cognominata à vilitate. Sunt & nigra, & laudatiora Cerina, atque purpurea. Nec non ab externa gente Armeniaca, quæ sola & odore commendantur. Peculiaris impudentia est nucibus in-sitorum, quæ faciem parentis, succumque adoptionis exhibent, appellata ab utroque Nucipruna. Nuper in Belgica Melina appellari cæperunt Malis insita, & Amygdalina Amygdalis. His intus in ligno nucleus Amygdalæ est: nec aliud Pomum ingeniosius geminatum est. In peregrinis arboribus dicta sunt Damascena, à Syriæ Damasco cognominata, iam pridem in Italia nascentia, quamquàm grandiore ligno, & exiliore carne, nec vnquam in rugas siccata, quoniam soles sui defunt. Sed Pruna omnia post Catonem cœpisse manifestum est. Hæc Plinius. Est & sua Prunus Ægypto, vt Theophr. placet. Ἄλλο δὲ τι δένδρον, inquit, ἡ κοκκυμηλέα μέγα δὲ τῷ μεγέθει: ἄρπον φέρει ὅμοιον τοῖς μεσπίλοις, καὶ τὸ μέγεθος παραπλήσιον, πλὴν ἔχον τὸν πυρῆνα τροχύλον. Ἀρχὴ δ' αὐθιγὴν μηνὸς πυανεψιώνος, τὸν δ' ἄρπον πεπαίνει περὶ τροπὰς χειμερινὰς, ἀείφυλλον δ' ἐστὶ (sic enim legendum esse confirmant Plinius & Gaza, non φύλλον δ' ἐστὶν, vt in vulgatis exemplaribus legitur) οἱ δ' περὶ τὴν θηβαΐδα κατοικοῦντες διὰ τὴν ἀφθονίαν τῶ δένδρου ξηραίνουσι τὸν ἄρπον, καὶ τὸν πυρῆνα ἐξαίρωντες κόπτουσι, καὶ ποιοῦσι παλάθας. Quæ Plinius interpretatus ea aliter quàm in exemplaribus nostris exarata sint, legisse videtur, aliter etiam Gaza. Sic enim Plinius. Ibi & Prunus Ægyptia non dissimilis Spinæ proximè dictæ, Pomo Mespili, maturescens bruma, nec folia dimittens. Lignum in Pomo

Nomina

Lib. 15. c. 13.

Genera.

Li. 13. ca. 5.

Li. 4. Hist. cap. 3.

Lib. 13. c. 10.

grande, sed corpus ipsum natura copiâque messium instar incolis: purgatum enim tundunt, seruântque eius offas. Sic Gaza. Alia quædam arbor Prunus habetur insignis magnitudine, fructum ferens natura & magnitudine Mespilis proximum, nisi quod rotundum nucleum habet. Florere incipit mense Iulio, fructum circa brumam perficit, nec folia dimittit. Qui circa agrum Thebanum colunt, propter arboris copiam fructum siccant, lignoque exempto tundunt, offasque faciunt. Huic Pruno Ægyptiæ nullam similiorem esse arborem censet Cornarius ea quæ Pruna syluestria profert. Alij verò arborem esse putât, quæ Myxa gignit. Prunorum apud Gallos innumeræ ferè differentiæ. Prima laus Damascenis tribuitur, nigra cute, carne suavi, rotundo ligno, exili nucleo. Secundas partes sibi vendicant Perdigona cognomine, Iberica, vt credit Ruellius, vocata, quoniam primum ex Hispania venerunt, vt inquit Ætius, succi dulcioris, duriorisque carnis, suavi gustu. Ea qua parte solem spectant, purpureo nitent colore, aduersa parte candicant, vel leuiter rubet. Vtraque pressa digitis internum os dimittit. Alia coloris ceræ ex candido in luteum pallescens, quæ Cereola, vel Cerea apud nos etiam vocitantur. Alia maiuscula, mollia, purpurea, pedicularia vulgò à vilitate dicta: iis sues rura saginant, Asiniana non ab re fortasse dicenda. Commendantur maximè quoque que Pruni dactyla à longitudine digiti, vt Putat Ruellius, dicta, purpurea, suavi colore, ouata Pomi specie, insitionis mangonio nusquam non nascentia. Alia Noberdiana, item Iuliana, aliquanto seriora, cæruleo colore, cumulatim in parente intorto furculo pendent, dum passa contrahantur in rugas. Cæteras differentias minimè persequi libet, à colore, succi sapore, magnitudine, figura, duritia, mollitie sumptas. Palma datur Damascenis, inquit Matthiolus, quæ sicca ex Syria Venetias importantur. Secundas tenent in Germania quæ ex Pannonia, & Transsylvania conuehuntur, in quorum genere quæ minuscula sunt, maiorem cum palato ineunt gratiam in vino decocta, & saccharo aspersa: hoc enim modo parata, primisque mensis sumpta, & ori grata sunt, & aluum commodissimè citant: nam dulcia sunt, & sine adstrictione. Prunus procera fit arbor, si studiose colatur, radicibus summo cespite latè vagantibus, paucis caudice subrecto, scabro, multis brachiato ramis: folio ex oblongo ferè rotundo, per oras minutim serrato: flore candido, foliato, nempe in quina, senâue foliola diuiso, super fructum insidente: Pomo cute carnèque vestito, ligno intus duro, longiusculo, in quo nucleus includitur amarus. Prunus satiua in omnibus seritur viridariis. Gaudet solo læto & humido: cælo tepido melius adolescit, cum tamen frigidum possit sustinere. Locis glareosis, & arenosis nisi viuatur lætamine, caduca Poma, & vermiculosa non grandescunt. Aprili mense floret, aut citius. Æstate, maximè Augusto mense, fructus sunt maturi. Pruni Pomum estur, inquit Dioscorides, sed stomachum male habet, aluum mollit. Syriaca pruna, & præcipuè quæ Damasci gignuntur, exsiccata stomacho vtilia sunt

P R V N U S.

Forma.

Locus.

Tempus.

Vires.

Li. I. ca. 137.



enim modo parata, primisque mensis sumpta, & ori grata sunt, & aluum commodissimè citant: nam dulcia sunt, & sine adstrictione. Prunus procera fit arbor, si studiose colatur, radicibus summo cespite latè vagantibus, paucis caudice subrecto, scabro, multis brachiato ramis: folio ex oblongo ferè rotundo, per oras minutim serrato: flore candido, foliato, nempe in quina, senâue foliola diuiso, super fructum insidente: Pomo cute carnèque vestito, ligno intus duro, longiusculo, in quo nucleus includitur amarus. Prunus satiua in omnibus seritur viridariis. Gaudet solo læto & humido: cælo tepido melius adolescit, cum tamen frigidum possit sustinere. Locis glareosis, & arenosis nisi viuatur lætamine, caduca Poma, & vermiculosa non grandescunt. Aprili mense floret, aut citius. Æstate, maximè Augusto mense, fructus sunt maturi. Pruni Pomum estur, inquit Dioscorides, sed stomachum male habet, aluum mollit. Syriaca pruna, & præcipuè quæ Damasci gignuntur, exsiccata stomacho vtilia sunt

lia sunt: aluum astringunt. Folia Pruni in vino decocta, & gargarizata vuam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Gummi Prunorum agglutinat, potum in vino calculos comminuit: ex aceto quoque illitum lichenas infantium sanat. Pruni folia decocta, inquit Plinius, tonsillis, gingiuas, vuæ profunt in vino decocta, & subinde ore colluto. Ipsa Pruna aluum molliunt, stomacho verò vtilissima, sed breui momento. Apollonius apud Galenum foliorum Pruni contusorum, decoctum lacte permisto ad aphthas colluere præcipit, pueris nimirum lactis vsum cum foliis contusis præscribens, sicut Dioscorid. & Plinius vini cum foliorum decocto, adultis, & in grauioribus affectionibus. Pruni fructus, ait Galenus, ventrem subducit, recens quidem plus, aridus verò minus. Cæterum Dioscorides, haud scio cur, Pruna Damascena siccata ventrem sistere ait, quum tamen & ipsa palam etiam subducant, minus tamen iis quæ importantur ex Iberia. Damascena quidem magis adstringunt, atquæ Iberia mittit, dulciora sunt. Quin & ipsæ arbores fructibus proportionem respondent: minus enim adstringunt quæ in Iberia nascuntur, magis verò quæ Damasci. Porro vt in summa dicam, quarum in foliis aut germi-nibus adstrictio quædam inesse apparet manifesta, eorum decocto phlegmonæ in columella, aut tonsillis genitæ colluuntur. Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum lapides confringere, cum aceto verò, puerorum sanare impetigines. At si id præstat, clarum est incidendi, tenuandique illi facultatem inesse. Dioscoridi Damascena sicca aluum adstringere scribenti refragatur Galenus, Galeno Brasauolus, quod non animaduernerit Dioscoridem de Prunis Damascenis siccis loqui, quæ præterquam quod sicca sunt, gustu etiam acida, & adstringentia percipiuntur. Qua quidem in re Brasauolus sanè hallucinatur, inquit Matthiolus, non solum enim pruna Damascena sicca, sed plurima alia medicamenta simplicia & adstringendi, & deicienda alui viribus prædita sunt, vt puta Tamarindi, Myrobalanorum genera, Rhabarbarum, quæ primùm aluum laxant, deinde adstrictam relinquunt, quam Prunorum facultatem Galenus etiam agnouit. Quare cum loco citato Pruna Damascena sicca aluum ciere tradiderit, eisdem etiam adstringendi vim inesse alio in loco testatur his verbis. Prunis æquè ac ficubus concessum est, vt vel exsiccata vtilia permaneant. Damascenis prima laus bonitatis magna hominum opinione defertur. Proxima iis quæ in Iberia proueniunt. Probatissima in Damascenis sunt, quæ cum mediocri adstrictione magna laxaque sunt. At parua, dura, acerbæque, & in cibo permolesta, & ventri subducendo minus idonea, cui rei Iberica maximè conueniunt. In melicrato plus mellis habente, abunde ventrem molliunt, etiam si sola comedantur, & multo magis si melicratum ipsum sorbeatur. Ex his constat Brasauolum sine ratione à Galeno dissentire. Quibus accedit quotidiana medicorum experientia. Est enim compertissimum Pruna Damascena laudatissima ventrem soluere non inefficaciter. Quod si Dioscoridem quoque rueri oporteat, nihil aliud dicendum, inquit Matthiolus, quàm Pruna Damascena siccata adstringere, si cum aliis humidis conferantur, quæ minus adstringunt, non tamen illa esse deiectionis facultatis expertia. Porro Pruna, auctore Mesue, aluum subducunt, & alterant: sed alba, flaua, rubra minus sunt medicamentosa quàm nigra: quorum quæ μέσα, idest acido dulcia sunt, alterant magis, dulcia verò soluunt largius: tamen vtraque alterant, & soluunt magis scilicet, & minus. Damascena verò & Armenia vtrumque præter cætera præstant, humida tamen potius quàm sicca, quæ etiam in ventriculo potius quam sicca corrumpuntur. Dulcia in calido & frigido temperata, aut paulo frigidiora, humida ordine secundo: τὰ μέσα, idest acidodulcia frigida principio secundi.

Lib. 23, c. 7.

Lib. 6. cap. phar. par.

Lib. 7. sim.

Li. 1. Diosc. cap. 137.

Li. 2. Alim.

Ibidem.

Lib. 2. sim. pur. ca. 19.

Omnia tamen lauant, leniunt, refrigerant, bilem educunt, propter quæ duo biliosis, tum febribus, tum morbis aliis sunt salubria: stomacho nocent, pauci sunt alimenti. Quia imbecilliter Pruna soluunt, eis adduntur præsertim in infusione, Tamarindi, Cassia fistula, Manna, Violæ conditæ. Ex horum succo fit syrupus, & ex carnibus electarium ad eadem salubre. Armenij truncum Pruni arboris locis duobus vel tribus, palmæ vnus interuallo tenuiter perforant, immissoque Scammonio lutant: Pruna ea ratione valentius purgant. Datur eorum succus seu decoctum cum Saccharo ad libram vnam.

AMYGDALVS, CAP. X.

Nomina



MYGDALVS arbor Græcis ἀμυγδάλη vocatur, Gallis *Amandrier*, Germanis *Mandelbaum*. Fructus ἀμυγδάλη & ἀμυγδάλον, Latinis Amygdala & Amygdalium, Arabibus *lauz*, *Kauz*, *Lauzi*, Italis *Mandole*, Germanis *Mandelkern*, Gallis *Amandes*, Hispanis *Almendras*, Anglis *Almonatree*: Amygdalam ideo Græcis nominari testis est Herodianus Alexandri-

Athen. li. 2.

Li. 15. ca. 22.

Herm. cor.

178. lib. 1.

Libr. 2.

Li. de arb.

Athe. ibid.

Genera.

Li. 17. c. 27.

Lib. 1. cauf.

cap. 21.

Forma

Locus.

Lib. 3. cauf.
cap. 7.

Ibidem.

Li. 16. ca. 25.

Tempus.

nus, quod post viride putamen multos scarificatus ostendat, & in rimulas dehiscat, quas τὰρ ἀμυχὰρ vocant. Amygdalas nucibus adnumerarunt antiqui, quas & Cato Nuces Græcas vocauit. Plinius, cum de nuce Iuglandæ, & nuce Pōtica dixisset, subiicit. Tertia ab his natura Amygdalis, tenuiore, sed simili Iuglandium operimento: item secundo putaminis. Nucleus dissimilis latitudine, & acriore callo. Hæc arbor, an fuerit in Italia Catonis ætate, dubitatur: Græcas enim quas nominat, quidam reponunt in Iuglandium genere. Cloatius Amygdalas easdem esse cum illis putabat quas Græcas, & Thasias vocabant. Nuces vocabant etiam Amygdalas inquit Athenæus. Columella videtur diuersa statuiffe genera Nucis Græcæ, Iuglandis, & Amygdalæ, nisi Nucis Græcæ nomine tantum amaram intellexerit. Naxia Amygdala à Naxo insula veteribus Græcis maximè commendabatur. Secundas partes sibi vendicauerat Cypria, quæ præter morem cæterotum, alibi genitorum repando cacumine prodit. Amygdalarum duo sunt genera: aliæ enim amaræ, aliæ dulces, hæ suauiores, illæ salubriores creduntur. Ex amaris dulces, fiunt, si circum fosso stipite, & ab ima parte circum forato defluens pituita abstergetur, vt scribit Plinius ex Theophrasto, cuius hæ sunt verba. τῆς ὅ ἀμυγδαλῆς εἰάν τις ἐκκόψας τὸν πᾶνταλον, ἐπιχράσῃ τὴν ἐπιρροὴν τῆς ὑγρότης, ἐπὶ ἑτῇ δύο, ἢ τρία, καὶ γλυκίσαν ἐκ πατρὸς γίνεσθαι φασί. Amygdalus singulari plurimùm robustaque radice firmatur, prægrandi altè defixa, caudice procero, crasso, infummo compluribus ramis brachiato, recto, cortice aspero: foliis Salicis, prælongis Persico, prorsus similibus, cui tota quoque hæc arbor similis est: flore foliato, candido, in quibusdam subrufo. Fructus siue nuces edit cordis figura, gemino protectas operimento, quemadmodum nuces Iuglandes, puluinati primum calicis, mox lignei putaminis, cui solidus subest nucleus, acriore etiamnum obductus callo. Arbor succo pingui turgēt, lacrymamque rimosa plorat, statim concrefcentem in gummi. Verum ad nulla remedia vt pote inutilis, expetitur. Amygdalus cælo calidiore gaudet: quapropter in Apulia, Sicilia, & insulis vberior adolescit. Huic tamen terra tenuis & aprica commodior est, teste Theophrasto, ad castigandam eius attrahendi alimenti auiditatem, & frondescendi, luxuriam, quæ tanta est in hac arbore, vt cum de ea loquitur Theophr. verbum ἐξυβρίσκειν, vsurpet quod iniuriam petulanter facere significat: quippe quæ ob fructum sata, fructui faciat iniuriam. Cum enim largius attrahat, & absumat in frondes, intercipitur pars necessaria fructibus. Eandem, opinor, ob causam tam præcoci partu germinat. Ex his, inquit

AMYGDALVS.



inquit Plinius, quæ hieme aquila exoriente concipiunt, floret prima omnium Amygdala mēse Ianuario: Martio verò Pomum maturat. Perdit etiam fructum facillimè ante maturitatem eodem teste. Locis frigidioribus Iunio & Iulio fructus perficit, qui antequam obdurescant, integri cum putamine comeduntur à grauidis: sunt enim gustui non ingrati. Leguntur Augusto mense, cum extima eorum tunica dehiscit. Amygdalæ amaræ radicem tritarum decoctum vitia cutis in facie corrigit, auctore Dioscoride. Illitæ nuces idem præstant: menses admotæ cient: capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti aut temporibus cum aceto, vel rosaceo: epinyctidas sanât ex vino: item putrescentia vlcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur: aluum molliunt somnum faciunt, vrinam cient: contra sanguinis reiectiones cum amylo & mentha assumuntur: renum vitiis, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur: calculosis

Li. 16. c. 26.

Vires & tempera.

Lib. 1. c. 193.

difficilique vrinæ in passo auxiliantur, & in linctu cum melle, ac lacte, hepaticis, & tussi inflationibus coli, nucis auellanæ magnitudine. Quinis septenisue præsumptis, ebrietatem non sentiunt potores. Vulpes si cum quadam esca eas vorauerint, moriuntur. Gummi eius exalfacit, & adstringit: reiicientibus sanguinem potum auxilio est: impetigines quæ summum corpus occupauerunt, illitum cum aceto tollit: tussi vetustæ cum diluto vino medetur: calculosis cum passo bibere prodest. Amygdalæ gummi vt & Pruni ad renum calculos minuēdos & pellendos valet, sed præterea in vsu multo est ad pannos sericeos, oblinendos (vulgo artifices id aiunt *donner l'eau*) firmiores vt sint, ac minus corrugati laciniatique minus obterantur. Dulces Amygdalæ & cibo idoneæ multo minus valent in remediis quàm amaræ, attamen extenuant, & vrinam cient. Quæ cum suo putamine eduntur virides Amygdalæ, humida stomachi vitia emendant. Vsus & effectus iidem habentur etiam apud Plinium, nisi quod diuersa quadam habet, quæ vel de suo, velex aliis auctoribus attexit. Amygdalæ amaræ radicem decoctum, inquit, cutem in facie corrigit, colorémque hilariorē facit. Nuces ipsæ somnum faciunt, & auiditatem. Vrinam & menses cient. Capitis dolori illinuntur, maximè que in Febri: si ab ebrietate, ex aceto cum rosaceo, & aquæ sextario. Sanguinem sistunt cum amylo, & mentha lethargicis comitialibusque profunt capite peruncto: epinyctidas sanant è vino vetere vlcera putrescentia & canum morsus cum melle: & furfures in facie ante fotu præparata. Item iocinoris, & renum dolores ex aqua potæ: & tussim ex eclegmate cum resina terebinthina. Calculosis & difficili vrinæ in passo, & ad purgandam cutem in aqua mulsâ tritæ, sunt efficaces. Profunt eclegmate iocinori, tussi, & colo, cum Elelisphaco modicè addito. In melle sumitur nucis auellanæ magnitudo. Aiunt quinis fere præsumptis ebrietatem non sentire potores: vulpēsque, si ederint eas, nec contingat è vicino aquam lambere, mori. Minus valent in remediis dulces, & hæ tamen purgant, & vrinam cient. Recen-

Li. 23. ca. 8.

tes stomachum implent. quarum rerum causas Galenus declarat de iisdem hæc
 scribens. Amygdalæ nihil prorsus habent facultatis adstringentis: sola enim te-
 nuandi facultas, ac detergendi in eis præpollet, qua tum viscera purgant, tum
 humores è pulmonibus ac thoracis spatiis educunt. Quædam autem ipsarum
 facultatem habent succos crassos ac lentos incidendi adeo exuperantem, vt
 mandi præ amarore nequeant. Oleosæ tamen ac pinguis qualitatibus, vt nuces,
 sunt participes: cuius causa & ipsæ, procedente tempore fiunt, vt illæ, oleosæ
 minor tamen eis inest hæc qualitas quàm in Nucibus: quò fit vt tardius quàm
 nuces, oleosæ fieri cernantur. Ex iis sanè intelligi potest, quod neque ventri
 subducendo conferunt, neque corpus multum nutriunt. Quæ verò qualitatem
 amaram habent præpollentem, eæ ad pus, & ad succos crassos ac lentos ex tho-
 race & pulmonibus expuēdos plurimū idē alibi cōferūt: Amygdalæ quæ palā
 amaræ sunt, omnino extenuandi vim habent, quod & qualitas ipsa indicat, &
 experientia comprobatur: siquidem ephelin expurgant, & excreationibus ex
 pectore pulmonēque crassorum lentorumque humorum plurimū conferunt.
 Quin & quod per accidens facultatem habeāt ab obstructione liberandi, id su-
 præ demonstratum est. Nam in iecore crassorum viscosorumque humorum ex-
 tremis vasis impactorum obstructiones abūde expurgant, expediuntque. Quin
 & laterum dolores ab huiusmodi causa natos, & lienis, & coli, & renum sanant.
 Porro & ipsa arbor similem vim sortita est. Nam huius radices coctæ atque il-
 litæ ephellidas purgant. Quot Amygdalæ vero dulces leuiculam & ipsæ ama-
 ritudinem habent, quæ tamen dulcedine superante occultatur: cæterum tem-
 poris spatio id clarum fit. Demonstratum est autem qualitatem dulcem modi-
 cè esse calidam. Hæc Galenus. Quod autem præsumptæ Amygdalæ ebrietatem
 prohibeant, meminit etiam Plutarchus, qui apud Drusum Tiberij Cæsaris fi-
 lium, quemdam medicum comessari solitum retulit, omnes bibendi certa-
 mine prouocantem, neminīque cedentem, vini potu:is tandē deprehensus est
 antequā biberet, quina, senāue amara comesse Amygdala, quominus temulētia
 tētaretur. Porro cū deuorare vetuissent, ne paucillū quidē potū huiusmodi tole-
 rare potuit. Hoc idē Athenæus retulit: Plutarch. hæc vim amaritudini adscripsit,
 quæ persiccet, & humores absumit. Oleū ex Amygdalis asperitatē gutturis, pul-
 monis, & partium cæterarum, etiam exteriorum, lenit: duritiemque omnem &
 siccitatem articulorum, & partium aliarum emendat: ob id pingues facit, he-
 cticis confert, semen quoque auget, ardori vuluæ & vrinæ iniectum commo-
 dat. Oleum ex amygdalis amaris obstructa aperit, flatus resoluit & dissipat, etiā
 in aurium tinnitu, & sono auditum afficiente obtusum: asperitates lenit, ner-
 uorum dolorem mulcet, duritiem mollit, ephellidas & macullas faciei delet. Fit
 autem vtrūque hoc modo. Amygdalæ cortice lignoso, & cute membranosa
 purgatæ, plurimum teruntur, in offas coguntur: horis circiter quinque loco
 calido continentur, vel in vase duplici hora vna coquuntur. Postea rursus te-
 runtur, & sacculo conclusæ torculari premuntur: vel delibratæ tusaq; & po-
 sitæ in vitreo vase vel stanneo merguntur in balneo calentis aquæ: tribus per-
 actis horis eximuntur, & statim prælo calentes subiiciuntur.

Li. 2. Alim.

Lib. 6. sim.

 Lib. 2.
 Mesu. lib. 3.
 Antid.

CORYLVS SATIVA.

CAP. XII.

DE Corylo sylvestri diximus in Sylva. Satiua de qua hîc agimus, etiam καρύα ποντική, & λεπτοκαρύα, id est, Nux Pontica dicitur, & Nux tenuis, siue parua, & Auellana, & Prenestina, & Heracleotica. Fructus iisdem nominibus appellatur, Arabicè *Agileuz*, seu *Bundurh*, Italicè *Nociuole*, *Auellane*, & *Nocelle*, Germanicè *Haselnusz*, Hispanicè *Auellanas*, Gallicè *Noisettes*, *Noisilles*, & *Auellaines*, Boemicè *Uoredi Lijs kouny*, Anglicè *Hassel tree*. Plinius Auellanas Nuces, quas antea Abellinas patrio nomine vocabant, in Asiam, Græciâque è Ponto venisse tradit, & ideo Ponticas Nuces vocatas. Tenues eadem seu parvæ Nuces dictæ sunt ad Regias videlicet collatæ: Heracleoticæ Theophr. quod ex Heraclea Ponti translatae sint. Satiuarum alias oblongas, alias rotundas esse tradit Matthiolus. Oblongæ præstantiores, & gustui

Cap. 34.
Nomina

Lib. 15. c. 22.

Genera
Lib. 1. Dio-
scor. c. 142.CORYLVS SATIVA,
siue Nux Auellana.

gratiores sunt, illæ præsertim quæ nuclei cortice vehemèter rubent, & fractu minimè sunt contumaces, quales sunt Vincentinæ, tam suaues, vt Pistaciis vix cedant. Neque enim omnibus Auellanis idem sapor, eadem pulpæ gratia. Oblongæ seriùs maturescunt, celerius rotundæ: quapropter vegetiore sunt nucleo, diùque perdurant Auellana Nux, seu Corylus radice est tenui, altissima, viuaci, & robusta, caudice multis internodiis stolonibus frutescente, superne ramis brachiato, virgis breuibus, sine alarum sinu enodibus, crassissq; nonnullis: foliis Alui, sed latioribus, per ambitum serratis materia admodum lenta, cortice extimo tenui, pingui, maculis albis vario: medulla tenui & flaua, quæ demi possit. Satiua differt à sylvestri, quod satiuae folium maius sit, caudex procerior, melior fructus, rubra in altero genere membrana inclusus. Seritur in hortis, & viridariis, locis vliginosis. Eius iuli hyeme emergunt, vere dehiscunt, & cum deciderint folia sese ostendant. Nuces Augusto mense sunt maturæ, quas mollis protegit

Forma.

Locus.

Tempus.

Lib. 15. c. 22.
Lib. 23. c. 8.
Vires.Plin. lib. 16.
cap. 18.
Lib. 2.

In Syl. c. 34.

barba, inquit Plinius, sed putamini nucleis que solida rotunditas inest. Umbilicus illis intus in ventre medio. Nuces Auellanae, vt idem scripsit, capitis dolorem faciunt, inflationem stomachi: & pinguedini corporis conferunt plusquàm sit verisimile. Tostæ & destillationi medentur. Tussi quoque veteri trita, & in aqua mulsa potæ. Quidam adiiciunt grana Piperis, alij è passo bibunt. Corylus nuptialibus facibus olim familiarissima fuit. Diocles apud Athenæum, inquit, Auellana Nucem minus Amygdalis alere, cibus supernatare, si largius estur, caput tentare innocentiorē esse viridem arida. Addidit vero Diphilus, Nucem Ponticam ciere capitis dolores, minus verò iuglande cibus innatare, si tamen ignem experiatur, innocentiorē reddi, quoniam in tosta quæ noxia est pinguitudo, tollitur. De earum virtutibus & temperamento plura diximus in Corylo sylvestri.

Nomina



VE MADMODVM τῆς βαλάνυ, id est Glandis, ita τῆς καρύς, id est, Nucis nomine permulta fructuum genera comprehenduntur. Ac primum Attici, ut refert Athenæus, atque alij auctores in vniuersum quidem fructus omnes cortice lignoso conclusos *κάρυα* nominant.

Quare Nux Amygdala dicitur, & Castanea Nux Euboica, Nux Heracleotica Auellana, Nux Myrepica, Nux Indica, Nux Syriaca, Nux Moschata, Nux Pineae, Nux Cupressi, atque alia huiusmodi. Hic de Nuce agitur quæ Persica, atque Basilica nuncupatur, quod è Perside à Regibus sit translata, & Iuglans: sunt enim, inquit Plinius qui honoris nomen interpretentur, & Iouis Glandem esse dicunt. Cloatius referente Macrobio, Diuglādem primo vocatam scribit, quasi

Διὸς Βάλανον, postea detractōne primæ literæ, Iuglandem. Nux simpliciter vulgo & Officinis dicitur tam arbor, quàm fructus. *Καρύα* arbor Græcis, fructus *κάρυον*, quod caput, nempe τὸ ἄκρα, id est, τὴν κεφαλὴν, offendat propter odoris graui-

tatem, ut Plinius ait. Idem alibi. Nuces Iuglandes Græci à capitis grauedine sub

vocarunt. Etenim arborū ipsarū foliorumq; virus in cerebrū penetrat. Idē rursum Iuglandis vmbra grauis & noxia etiā humano capiti, omnibsq; iuxta sa-

tis. Plutarchus sic dictam censet, quod spiritu graui quem exhalat capiti noxia sit, ac soporem sub ea recumbentibus conciliet. Arabibus *Ieuiz*, *Leuz*, aut *Gianzi*,

Nomina

Genera.

Italīs *Noci*, Germanis *Nussen*, *Nuß*, *Vuolschnusz*, & *Vuelschnußbaum*, Hispanis *Nuezes*, Belgis *Noeten*, *Ockernoetenboon*, & *Nottelaere*, Anglis *Vualnut tre*, Gallis *Noix*, arbor

Noyer Sola differentia generum, inquit Plinius, in putamine duro, fragiliue, & tenui, crasso, loculoso, ac simplici. Quæ tenero fragiliq; est putamine, Mollusca

dicitur, & Persica à Sueuio Poëta vetere, ac doctissimo apud Macrobiū, Iuglandis omnino genus, inquit Scaliger, aut cum Tarentino idem, aut proxima & congenerē natura, testa fragili, ac liberali. Nostri namque populares durius

illud, quod inuitum amittit à se nucleum, Auaras nuncupant. Hermolaus à quibusdam à frangendi mora Moracias, & Moracillas appellari tradit. Macrobius

Moluscam & Persicam. Malum Persicum interpretatus apertè hallucinatus est: diuersa enim sunt Malum Persicum, Nux Persica, Persæa: Tarentina autem hæc

Nux, vocatur, quod Tarentum Iuglandes Nuces, & Pineas molles habeat, ac similiter oues, vnde etiam quidam Tarentum appellatum putant, quod Sabino-

rum lingua molle significat, ad quod alludens Horatius Tarentum molle vocauit. Qua verò arte cultūque Nux Tarentina fieri possit docet Columella. Huiusmodi Nuces in Germania nasci, ait Gesnerus, tum saporis præstantissimi,

tum corticis adeo tenuis, ut leuissimo digitorum compressu frangantur. Eadem ferè de hac re literis mandauit Matthiolus. Genera Iuglandium plura, quæ tum

forma, tum putaminis duritia, fragilitatēque dignoscuntur. Præstant oblonga, putamine albicante ac fragili, albo intus nucleo, putamini haud hærente, & gustu dulci. Nam & aliud Nucum genus est earum quæ à magnitudine Caballinae nominantur. Hæ Malis sunt æquales, ex quarum cuppis marsupia pueris gestanda fiunt. In Hedueorum oppidulo quod Solis Lucum vocant, vulgo *Solien*,

manicarij opifices manicas ex aluta sic tenui conficiunt, ut eiusmodi Nucis lacunato putamine integro duas vtrāque manum vestituras, adstrictas, & conuolutas ingeniosa plicatura, mirabili subtilitate includant, & recondant. His biferarum Iuglandium genus addit Hermolaus, quas in Syluaciano Patauini agri

viculo prouenire satis constat, ut ait, & ante ipsum Plinius, Nuper consularem virum audiui, inquit, biferas Iuglandes Nuces habere se profitentē. His addam

Tragum prodidisse Vasoniæ, qui locus ad Rhenum situs est, Iuglandem reper-

tam

ram esse, quæ ante diem D. Ioannis natiuitatis, neque folia, neque Nuces ostenderet: cum vero id tempus adesset, par reliquis nucibus erat, quod ad fructum & folia attinebat: id quod singulari naturæ miraculo fieri credit, addita margini sui voluminis hac scriptura, eiusmodi arbores Gengébachi binas hodie etiamnum extare. Eiusmodi Iuglandes Io. Bauhinus Medicus perdoctus, & rei herbariæ peritissimus circa Tigurum etiam se vidisse affirmat. Dalechampius Nuces quæ antea velut aridæ, ac mortuæ, pridie D. Ioannis festum diem repente germinant, & folia mittunt, in agro Lugdunensi per quam multas reperiri asserit. Eas vulgus appellat, *Noix de la Saint Iean*. Sero fructum illæ perficiunt, nempe Octobri mense, & cum aliæ defecerunt, recentes mensis adhibentur. Earum putamen admodum durum est, nucleus verò tenacius affixus vix eximitur, gustu quàm in reliquis Nucibus magis fatuo & diluto. Indubitatum est sideris vi adeo celeriter germinationem elici, sole à statione sua iam ad æquinoctium descendente, quo tempore, vt ait Columella ingens calor fit, æstuosiusque cælum frigidior, & tardior naturam arboris stimulat. Nux arbor est prægrandis, multis prælongisque nixa radicibus, procero caudice, multis in summo ramis

NUX IUGLANS.



ingentibus brachiato, ad binum ternumue cubitorum amplexus sæpius crassescere: cortice hiulco, cinereo, & senescente arbore in rimas altas dehiscere: materia ampla, nigricante, vndatim crispa: foliis primum teneris, rubescentibus, odoratis, cum adoleuerint, latis oblongisque, vtrinque ab eodem petiolo emergentibus, iucundè, sed grauiusculè subolentibus, patulam iactantibus umbram, & insalubrem, Autumno deciduis. Veris initio veluti quodam gestiente foliorum conceptu iulos seu paniculas edit, Salignis ferè similes, longiores, callos squamatim compactili protractos, ordine Nucis Pineæ, qui dehiscunt flauescentsque, ac flaccescentes, statim atque oriri cæperint folia decidunt. Tum super horum iulorum petiolis flores erumpunt, totidemque caliculata tegumenta occlusa petiolis nixa gignuntur, quot flores, singulisque his singulæ Nuces includuntur, gemino protectæ operimento, puluinati primum & callosi calycis, mox lignei putami-

nis. Quæ causa, vt scribit Plinius, eas nuptiis fecit religiosas, tot modis foetumunito, quod est verisimilius, quam quod cadendo tripudium sonumue, aut, quemadmodum alij legunt, tripudium soniuium faciant. Sic igitur Nuces inter folia proueniunt, multis occultæ inuolucris: calloso primum herbaceoque cortice, quam Guliocæ dicunt, Festus, culeolū, hinc compactili carinarum loculo, mox tenui tunica, quæ nauci, vt quidam volunt, nominatur. Crispi intus nuclei quadripartito digeruntur, lignea intercedente membrana. Sed Scaliger testatur fructuum multiplicem rationem explicans Plinium erroris insinuat, quod scripserit solam hanc Nucem à natura compactili operimento clausam fuisse, esseque bifidas putaminum carinas, quæ quamuis manifestæ sint Iuglandæ, & faciles aperiri, tamen in Persico altera tantum ex parte manifestissima, sed difficiliores ad separationem: in Pineis obscuriores: obscurissima in Auellanis: mediocres

Lib. 15. c. 22.

In lib. 1. de plan.

lib. 15. c. 22.

diotres in Amygdalo: in Pistaciis, quæ per se ipsa hiant aliquando vetustate, earum tanquam vestigia. Aquas odere Iuglandes, frigoris sunt cupidae, montibus quoque latantur. Nux Iuglans, ut scribit Palladius, amat loca montana, humida ac frigida, plerumque lapidosa. Potest tamen & locis temperatis iuvante humore nutrir. In Gallia & Italia frequentissima, & notissima secus vias, & in viridariis. Passim in omnibus ferè Germaniæ hortis provenit. Nuces in agro Tigurino abundant, hortis inutiles, tum quod sua magnitudine inumbrant cætera, tum quod profundissimæ radices exhauriunt, & emaciant solum, omni pinguiore succo ad se attracto. Germinat post afflatum Fauonij, non cacumine, ut maxima pars arborum, sed lateribus, impulso priore pullulo. Quæ forma & caudex totus, & prægrandes ramicrescunt. Fructificat Autumno. Paniculæ proveniunt mense Martio, tardissimè Aprili. Nuces maturæ sunt fine Augusti. Arborem, si bene defloruerit, rustici putant vinearum fecunditatem polliceri, nucum semper & vuarum pari ferè proventu. Leguntur Iuglandes, inquit Matthiolus, inchoante Autumno, pecticis excussæ, & siccantur in umbra exuto exteriori operimento. Virides Nuces Fuschio, primo ordine siccæ, secundo verò calidæ censentur: Dodonæo verò, Nux viridis, & recens adhuc, frigida est & humida. Nux sicca calida est & sicca, partesque tenues habet. Cortex multum desiccatur adstringitque. Folia eiusdem fere sunt temperamenti. Curtio recentes primo ordine excalfaciunt, aridæ secundo ordine, tenuiûmque sunt partium, & exsiccantium. Nuces Iuglandes, inquit Dioscor. difficiles sunt concoctu, stomacho inutiles, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ: vomituris tamen ieiunis in cibo aptæ. Cum ruta & caricis præsumptæ, summo cibo, venenis resistunt, nec minus si à veneni haustu comedantur: largius esitata tænias latas pellunt: illinuntur mamarum inflammationi, abscessibus, luxatisq; cū mellis exiguo & ruta: cum cepa autè, sale, & melle, canis hominisque mor sui proficiunt: tormina cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ sedant. Picramè combustum tritumque in oleo, & vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, & alopecias replet. Sistunt menses nuclei vsti, si triti ex vino admoveantur, iidem è nucibus veteribus illiti, carbunculis, gangrænis, & ægilopiis medentur: alopeciis commanducati & impositi præsentis sunt remedio. Nucibus tufis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, utpote suaviores: itaque allio mixtæ eximunt acrimoniam. Liores in corpore illitu tollunt. Quorum postrema paulo aliter vertenda esse censet Andr. Lacu. Recentes stomacho innocentiores sunt, dulciores quum sint: quapropter etiam alliis miscentur, ut eorum acrimoniam exoluant. Sic enim habent Græca: γλυκύτερα ὄντα, διὰ καὶ τοῖς σκορόδοις μίγνεται πρὸς τὴν δλεμύτην πειλαρεῖν. Eadem Plinius cum perscripsisset, hæc post addidit: Nuces Iuglandes vomituris ieiunis aptæ in tenebro solo: trahunt enim pituitam: anginam cum ruta & oleo hebetant. Item aduersantur capis, leniuntque eorum saporem. Aurium inflammationi imponuntur cum mellis exiguo. Putamine dens cauus inuritur. Cortex lichenum vitio, & disentericis prodest. Folia trita cum aceto aurium dolori. In sanctuariis Mithridatis maximi Regis deuieti, Cn. Pompeius inuenit in peculiari cōmentario ipsius manu compositionem antidoti è duabus Nucibus siccis, item Ficis totidem, & rutæ foliis viginti simul tritis, addito salis grano: qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturū illo die. Contra rabiosi quoque canis morsus, nuclei à ieiuno homine commanducati, illitique præsentis remedio esse dicuntur. Hæc antidotus cum verè sit Mithridatis Regis, tamen Galenus Apollonio Muri attribuit, & Aetius eandem penitus ex Struthone describit. Quod idem auctor alibi docet, tinguntur cortice earum lanæ, & rufatur capillus primum

prodeunt

Locus.
Cap. 16. Ianu.Gefne. in
Hort. Ger.

Tempus.

Ibidem.

Temper.
& Vires.In Annot.
in Diosco.

Lib. 23. c. 8.

Lib. 2. Antid.

Lib. 15. c. 22.

prodeuntibus nuculis. Id compertum infectis tractatu manibus. Pinguescunt vetustate. Nux arbor, inquit Galenus, tum in foliis, tum in germinibus adstrictio-
 nem quandam habet, cæterum euidentem, multamq; in Nucis putamine, re-
 centi pariter, & sicco. Proinde eo tinctores quoque vtuntur. At nos eius expres-
 si succo, similiter vt Mororum & Ruborum in melle decocto vice stomatici
 medicaminis vtimur, & ad omnia reliqua adhibemus, ad quæ modo dicti succi
 conuenire censentur. Porro Nucis ipsius, id quod edendo est, oleosum est, ac te-
 nue: itaque ob id etiam facile exprimitur, & quo diutius recoditum fuerit, ma-
 gis tale efficitur. Quamobrem si oleum ex eo inueterato exprimere liceat, id
 sanè admodum potenter per halitum euaporat. Itaque quidam eo gangrænas,
 & carbunculos, & ægilopas sanant, & nonnulli ad neruorum vulnera vtuntur.
 Habet Iuglans, quod idem alibi tradit, & adstringentis qualitatibus non parum,
 quæ temporis processu marcescit, degenerante tota eius substantia in pinguem
 succum, adeo vt cibo prorsus fiat parum idonea, quia veteri oleo sua pinguidi-
 ne similis apparet. Viridis autem, atque etiamnum humida, neque adstringen-
 tis qualitatibus, neque oleosæ cõspiciuè est particeps, sed magis quodammodo est
 ἀποια, id est qualitatibus expers. Iuglans facilius quam Auellana concoquitur, &
 stomacho vtilior est, ac multo magis, si vnà cum caricis edatur. Proditum autem
 est à plerisque medicis, si ambo hæc cum ruta ante alios cibos sumantur, homi-
 nem non magnopere à letalibus pharmacis ledi posse. Constat præterea humi-
 das deiectioni magis, aridas verò minùs conuenire. Non pauci quoque cum
 garo Iuglandes præsumunt ventris subdurendi gratia. Ad hoc autem virides
 aptiores sunt, vt pote adstringentis facultatis minus participes. Quin & arida-
 darum quoque vbi prius in aqua fuerint maceratae (vt nonnulli faciunt) similis
 ac viridium facultas censetur. Idem alibi fusius explicat medicamentum sto-
 maticum, summa cum ratione à se inuentum, & experientia longa comproba-
 tum, id est medicamentum ex corticum exteriorum Iuglandium virentium ac
 videntium succo & melle ad oris phlegmonas efficacissimum ob essentia te-
 nuitatem, suaue, paratu facillimum. Diphilus ita apud Athenæum proditum re-
 liquit Noces Iuglandes capitis dolorem ciere, & reliquis cibis emergentes in-
 natate: recentes sic suis membranis exutas, vt candicent, suauioris esse succi, &
 meliores: furno torrefactas parum suppeditare alimèti. Nux viridis Plinio Va-
 leriano, vt pote aquatioris humoris, styptica & frigida virtute censetur. Potest
 tamen stomacho aliquid vigoris acquirere, & ventrem cum garo sumpta molli-
 re. Inter calendas & Idus Iulij centum numero Noces statim, vt arbori demptæ
 sunt, cortice adherente quassantur: his admiscuntur Aluminis scissi libræ tres,
 & in nouo fictili vase ponuntur: super hæc infunduntur olei boni libræ tres, &
 diligenter in loco, neque humido, neque nimium sicco obruantur: post nona-
 ginta dies dabunt oleum, quod fluentium capillorum damna restituit. Virides
 Noces Simeoni Sethi ventrem mouent, quamobrem quidam ante cibum cum
 sapa comedunt. Facilius etiam quàm Amygdalæ concoquuntur. Arida in ore
 inflammationes & plagas efficiunt. Stomacho meliores fiunt, si cum caricis edan-
 tur. Concoquuntur faciliè Noces in frigidis ventriculis, calidis verò in bilem
 magis mutant. Ad dentium pruritum vtilis sunt. Expertum tradunt, si virides
 Noces tantum putaminibus suis, id est carnosæ & callosæ exteriori cortice, li-
 beræ demergantur melle, post annum virides inueniri: ipsumq; mel ita medi-
 cabile fieri, vt ex eo facta potio faucibus & arteriis medeatur, inserique Iuglan-
 dem, vt pleriq; asserunt, mense Februario in Arbuto, sed melius in trunco, &
 suo, & alieno, vt Pruni: sic enim legendum. Iuglandes virides decerpæ mense
 Maio, vel Iunio appetente, antequam earum putamina obduruerint Saccharo
 vel

Li. 7. simpl.

Li. 2. Alim.

Li. 6. c. ph.
par. c. 1.

Athen. li. 2.

Pallad. Ia-
nu. cap. 16.

Matthi. ibi.

vel melle asseruatæ, stomacho sunt vtilis, & ori non ingrata. Iuglandium iuli
 qui prima germinatione Martio erumpunt, sicci & in puluerem contriti, ac in
 vino albo poti drachmæ pondere, scæminis strangulatu vuluæ affectis mirificè
 profunt. Quidam guliocam arefaciunt, atque in puluerem redactam Piperis
 loco in condiendis cibis vsurpant. Quod si huic pulueri folia Saluæ siccata, ac
 tusa admisceas, sanè non contemnendi saporis condimentum habebis. Pari ra-
 tione prima ac tenera rubraq; foliola siccata, ac tusa vsurpari possunt. Iuglans,
 quod scribit Plinius, facilè pandatur, fiunt enim, & ex ea trabes: frangi q; se præ-
 nuntiat strepitu, quod in Antandro accidit, cum è balneis, territi sono profu-
 gerunt. Tamen hæc postrema Theophrastus: τῇ ἐν βουκκῇ καρύα, id est Castano attri-
 buit. Plinio Iuglans cariem vetustatè que tardissimè sentit. Quare mensis &
 vtenilibus lautis dicatur, vsusque ad testæ. Hic non omittam quod & in Quer-
 cum Historia explicari poterat, quid scilicet sit in Nuce arbore. Isca. Quā rem
 sic declarat Paul. Ἐγιν. Sunt Ἴσκα, Iscæ, spongiosa quædam corpora in Quer-
 cubus & Nucum regiarum arboribus nascentia, quæ Barbari magis in vsu ha-
 bent. His inter cætera cauteriorum genera vsos fuisse antiquos, idem Paul. te-
 statur de stomachi vstione hæc scribens. In longis stomachi defluxionibus re-
 centiores vsi sunt vstione. Alij ferramentis candentibus mucronatis tres cru-
 stas inurunt, vnam iuxta cartilaginem, quæ xiphoides vocatur, alias duas infe-
 rius, trianguli figura, tam altas vt cutem totam penetrent. Alij vnam duntaxat
 adhibent ampliorem, supra os ventriculi. Sunt qui ne ferro quidem vrunt, sed
 Iscis appellatis. Idem de hydropicorum adustione, Iam verò, inquit, vstione su-
 per stomachum, iecur, lienem, imum ventrem, & vmbilicum vsi sunt, quinque
 crustas adhibentes. Alij ferro tenui candente, alij Iscis nuncupatis. Quomodo
 autem Iscis ad vstionem vterentur sic demonstrat Cæl. Aurelianus. Alij fungos
 ligneos inferius ac superius angustos formantes, patientibus apponunt locis,
 quos summitate accensos sinunt concremari, donec cinerescant, atque sponte
 decidant. Id hodie imitantes Turcæ sarmentum vitis bene aridum parti malè
 affectæ applicant, & summitatè eius accendunt. Cornarius Iscas medullam Nu-
 cis arboris non satis rectè videtur vertisse, verba tamen hæc Aetij expressisse,
 τῇ ἐν τετραγώνῃ τῶν καρυίνων ξύλων, ἃ καλεῖσιν Ἴσκας, quæ sic Cornarius interpretatus est,
 medulla lignorum Nucis Iuglandis, quam Iscas appellant. Hermolaus quoque
 Iscam medullam esse ait, scribit enim: medulla Nucis quæ in ligno ipso conti-
 netur, Isca dicitur Aetio. Forte, vt alia quoque multa, deprauatè à Latinis id ac-
 ceptum, quasi esca, quoniam igniario & cauterio quoque sit medicis. Iscas Hip-
 pocrates, vel auctor lib. de internarum part. affectib. fungos fortè appellat: καὶ οὕτως
 αὐτὸν, τὰ μὲν ὅτ' ὥδεα μυκῆσι, τὰ δὲ σαρκώδεα σιδηρείοισι, πολλὰς ἐχάρας καὶ βαθείας.
 Ipsum vrito. Osseas quidem partes fungis, carnosas verò ferramentis, & cætera.
 Sic verò vetus interpres. Fungulis cantharidibusue ossea, carnea verò ferramen-
 tis multis ligneis altè perurito, hæsitans opinor in τῶν μυκῆτων vocabulo, quod
 pro Cantharidibus vsurpatum nusquam legi, sed pro terræ arborumque fungis,
 ac lucernarum. Item pro vermiculo, seu animalculo, quod ita depingit Aristo-
 phanis Scholiastes. Minutissimum est, inquit, Vespæ simillimum, quod ob mi-
 nimam exilitatem cum à frigore facilè afficiatur, circa lucernas ignis appetens,
 volitat, & in eas impingens scintillas excitat, futuræ pluuiæ signum. Fit ex Nu-
 cibus iuglandibus tuis, & expressis, aut post contusionem feruefactis, oleum
 quod Carynium vocatur. Eandem vim habet quam Balaninum, inquit Diosco-
 rides, de quo hæc Matthiolus. Oleum quod è iuglandibus Nucibus elicetur nul-
 lius in medicina vsus esse reperio, etsi lucernis qui parsimonix student, maxi-
 mè expetant, quòd ignis funiculo non tam cito consumatur, quam id quod ex
 oliuis

oliuis paratur. Præfertur etiam à pictoribus ei quod è lini semine exprimitur. Siquidem hoc cerussæ admixtum tempore colorem mutat, illud verò incorruptum perpetuò seruat. Horum velut immemor comment.in cap.de Nuce Iuglande hæc tradit: Fit è Nucibus oleum quo ad lucernas vtuntur Insuores, præterea pictores & fabri lignarij, cum splendorem operibus suis addere volunt. Haustum hoc quinque, aut sex vnciarum pondere flatus potenter dissipat: quare in coli affectibus à flatu genitis plurimùm confert. Illitū tumores discutit, & contractos neruos emollit, addita præsertim calce lota: antiquam scabiem sanat, quæ doctè ex Galeni & Mesues sententia scripta sunt. Id autem peculiare habet hoc oleum auctore Aetio, quod inaurantibus, & inurentibus conducit: siccatur enim, & ad multum tempus inaurationes, & inustiones continet, & adseruat. Nucum Iuglandium immaturarum aqua, circa diem D. Ioanni sacrum parata, & foris imposita vulneribus, & vlceribus calidis prodest, & anthraci pestilenti. Pota etiam ad duas aut tres vncias refrigerat, & pestilentia resistit. Ex corticibus exterioribus Iuglandium (siue maturis, vt iam à Nuce soluantur, siue nondum omnino) mense Septembri aqua destillatur, nec refert nigra fuerint, nec ne, modo ne putredinem senserint, imo nigra præferuntur. Huius aquæ mediocris potio, cum tertia parte aceti, si cum calore morbus inuadat, vena prius secta aduersus pestem tanquam certum experimentum propinatur. Laudatur & ad aurium tinnitus, & audiendi difficultatem, & ad anginas gargarizata. Foliorum Iuglandis aqua circa finem Maij destillata, mirè commendatur ad siccanda & adstringenda vlcera, & inducendam eis cicatricem, si ea mane & vespere lauentur, madidumque inde linteolum imponatur. Æstate feruidissima quod Æromeli ruffum è cælo stillat, foliis & frõdibus Nucis Iuglandis magis insidere, quam vicinarum arborum, obseruauit Dalechampius, eoque melle irrorata Iuglandis folia, ori indita sitim sedare, foliis propinquarum arborum exuccis, & aridis, quasi maior sit huius arboris cum cælo concordia, & cognatio.

Lib. I. Dios. cap. 14.

Enuony. Thef.

Brunsvi. cens.

MORVS, CAP. XIIII.

QVÆ arbor *μωρέα*, & *συχάμνος* Græcis, Latinis Morus dicitur, Italis *Moro*, Gallis *Meurier*, Germanis *Maulberbaum*. Fructus *μώρον* & *συχάμνον*, Latinis Morum, Arabibus *Tut*, siue *Thut*, Italis *Moro*, Gallis *Meure*, Germanis *Maulbeer*, & *Maulberbaum*, Hispanis *Moras del Moral*, Anglis *Mulberry tree*, Belgis *Moerbessenboom*. Mori duo sunt genera, nigra, & alba, à fructuū colore, ita nuncupata. Sunt enim & alba & nigra Mora, quæ non solum colore & magnitudine, sed etiam sapore differunt. Minimum in hac arbore ingenia profecerunt, inquit Plinius, nec nominibus, nec insitis. Nec alio modo quam Pomi magnitudine differunt Mora Ostiensis, & Tusculana. Morus nigra, procera est arbor, ramos crassos in latum & longum protendens, caudice sæpius contorto, gibberoque, ac nodoso, cortice crasso, lento, & flexili, cui materia subest robusta, & medullitus flaua. Radicibus nititur magnis, ac robustis, non tamen altè descendentes, sed summo cespite longissimè diuagantibus. Eæ flauescunt, præsertim cortices, qui & gustu sunt amaro. Folia rotunda forent, nisi in summo essent acuminata, in ambitu serrata, latiora, crassioraque: nonnulla vitiginea quandoque spectantur. Flos paruus, lanuginosus: fructus, veluti ex granulis congestus, Mororum Rubi modo, sed maior & longior. Ei trini colores, candidus primò, mox rubens, maturis niger: tunc succus in carne vinosus, qui ex acerbo, inquit Theophr. fit acidus, ex acido dulcis. Tinguunt manus succo matura, eluunt acerba. Albæ minora sunt folia, imbecilliora,

Nomina

Genera.

Li. 15. ca. 24.

Forma.

Plin. lib. 15. cap. 24. Li. 6. causs. cap. 7.



Plin. ibid. tenuiora, sinuata, albæ Populi, aut Sambuci montanæ, albida, flaccida, fructus minores, ante maturitatem subuirides, austeriusculo sapore, perfectè maturi mellea prorsus sunt dulcedine, ad nauseam potius quàm ad alendum nati, tota arbore minore, quam pluris faciunt ad velleris sericei opus. Morus in hortis & viridariis crescit. Abundat albis Italia ad alendos bombyces sericeos. Amat imprimis loca plana, culta, amœna, calida, & sabulosa. Gaudet fossione & stercore.

Locus. Nouissimè germinat, Plinio cum primis folia dimittit, Morus, vt idem ait, nouissima vrbanae germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Sed cum cœpit, in tantum vniuersa germinatio erumpit, vt nocte peragat, etiam cum strepitu. Idem alibi: Cùm germinare videris Morum, iniuriam postea frigoris timere nolito. Diuersarum Mori partium, eiusque maturæ & immaturæ has virtutes refert Dioscorides. Fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facillè corrumpitur. Hoc idem præstat eius succus: decoctus autem æreo vase, atque insolatus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed augetur vis eius addito scissilli Alumine, Galla, Croco, & Myrrha: item Myricæ semine, Iri, & Thure. Immatura Mori Poma siccantur, tusaque acinorum Rhois vice, obsoniis miscentur, vt coeliacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit: latas ventris tænias excutit: his quoque auxiliatur qui Aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur: tinguntque capillum, Vitis, & Fici nigræ frondibus simul coctis in aqua cælesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorum iure dentes aptissimè in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat.

Tempus. Lib. 16. c. 22. **Vires & Temper.** Lib. 18. c. 27. Lib. 1. c. 14. Lib. 23. c. 7.

Pli-
nius cum de Ægyptia Moro dixisset, subiungit. Nec apud nos succo vsus minor. Aduersatur Aconito & Araneis in vino potus. Aluum soluit, pituitasque, ac tænias, & similia ventris animalia extrahit. Hoc idem præstat & cortex tritus.

Folia

Folia tingunt capillum cum Fici nigræ, & Vitis corticibus, simul coctis in aqua cælesti. Pomi ipsius succus aluum soluit protinus. Ipsa Poma ad præsens stomacho vtilia, refrigerant, sitim faciunt. Si non superueniat alius cibus, intumescunt. Ex immaturis succus sistit aluum corticis, qui veluti animalium cutis est, in hac arbore obseruandis miraculis, quæ in natura eius diximus. Fit è Pomo panchrestos stomatice, aut arteriace appellata, hoc modo. Sextarij tres succi ex Pomo, leni vapore ad crassitudinem mellis rediguntur. Post additur Omphacij aridi pondus x. duorum, aut Myrrhæ x. vnus, Croci x. vnus. Hæc simul trita miscentur decocto. Neque est aliud oris, arteriæ, vuæ, stomachi iucundius remedium, quem locum aperte corruptum Cornarius ex vetustissimo exemplari sic emendauit. Post Omphacij aridi pondus denariorum duorum, Myrrhæ denarij vnus, Croci vnus, simul trita, &c. Huic apud Galenum Heræ similis est ex Moris compositio. Succu Mororum heminas sex ad strigmentitiam spissitudinem coquito. Deinde tritas Croci drach. j. Myrrhæ drach. ij. Omphacij drach. j. Aluminis scissi obolos iij. Mellis heminam vnam addito. Hæc ad vuas, tonsillas, ac omnes quæ repente oriuntur in ore inflammationes conueniunt. Aliam ex Moro stomatice Galenus ex Andromacho recenset. Mira sunt præterea quæ produntur, inquit Plinius. Mori germinatione, priusquam folia exeant, sinistra decerpi iubentur futura Poma, Ricinos Græci vocant (Hermolaus Cytinos legit: quamuis enim Cytini propriè sint Mali Punici flores, solet tamen appellatio hæc in alia quoque competere: nam Dioscorides Hyoscyami flores Cytinos vocat.) Hi terram si non attigere, sanguinem sistunt adalligati, siue ex vulnere fluat, siue ore, siue naribus, siue hæmorrhoidibus. Idem præstare & ramus dicitur, Luna plena defractus, incipiens fructum habere, si terram non attigerit: priuatim mulieribus, adalligatus lacerto, contra abundantiam mensium. Folia Mori trita, aut arida decocta, serpentium ictibus imponuntur. Ad idemque potu proficitur. Scorpionibus aduersatur è radice corticis succus ex vino, aut posca potus. Succum expressum maturi pomi immaturi quæ, mistum, coquebant antiqui in vase æreo ad mellis crassitudinem. Aliqui Myrrha adiecta & Cupresso, vel, ut alij legunt, Passo, prædurantes, vas sole torrebant, permiscentes spatha ter die. Hæc erat stomatice, qua & vulnera ad cicatricem perducebant. Alia ratio: immaturi succum exprimebant, siccato Pomo multum saporis obsoniorum conferente. In medicina verò contra nomas, & pectoris pituitas, & vbicunque opus esset adstringi viscera. Dentes quoque colluebant eo. Tertium genus succi, foliis & radice decoctis, ad ambusta ex oleo illinenda: imponuntur & per se folia. Radix per messes incisa succum dat aptissimum dentium dolori, collectionibusque & suppurationibus. Aluum purgat. Folia Mori in vrina madefacta, pilum coriis detrahunt. In his Plinius quædam à Dioscoride diuersa refert, quædam etiam superstitiosa. Cætera si quis cum Dioscoride conferat, eadem esse cõperiet, maximè id verò, quod de radicis per messes incisæ succo rectè scribitur, quod cum aliis in locis repeteret Plinius, oscitanter de Mori succo scripsit, quod de Sycomori succo scribere debuisset. Pro cute in animalibus, inquit, in arboribus cortex est. Mirum, hic in Moro medicis succum quærentibus, fere (alij, vere,) hora diei secunda, lapide incusso manat: altius fractus siccus videtur. Alibi non de nostratibus Moris, sed de Ægyptiis idem dixit. Mora in Ægypto & Cypro sui generis. Largo succo abundant, summo cortice desquamato: altiore plaga siccantur mirabili natura. At de Sycomoro hæc accipiendâ esse, idoneo loco dicemus ex Dioscoride. Eundem radicis circumfossæ & incisæ liquorem, Galenus γάλα, id est, lac vocat. ἡ συκαμίνε τρεῖς μορέας γάλα εἰς οἶνον ἐγχέας ὁμοῦ οἶου πηρὰ ἕρμα ἐναπόθλυβε χλαίνων, καὶ δι' ἐρίων ῥυπηρῶν ἐγχέῃ τῇ μύλῃ ἀνασπᾶ καὶ φλέγμα, καὶ

In lib. 6. ca. ph. par.

Ibidem.

Ibidem. Lib. 23. c. 7.

Lib. 16. c. 3.

Lib. 23. c. 7.

Lib. 5. c. ph. par. ca. de dent. dolo.

ἀπὸνυς ποιεῖ. Id est, aut Sycamini, id est, Mori arboris lac in vinum infunde, si-
múlque lanas succidas in ipsum exprime, tepefac, & per lanas sordidas denti
molari infunde. Extrahit pituitam, & dolorem tollit. Sycomori verò arboris
succum, etsi συκάμυνον etiam vocari testetur Dioscorides, hic non debere intelli-
gi ex eo declaratur, quod συκάμυνος, τέτρετος μορέας ipse Galenus exponit, Celsus
hunc Mori succum, quem lacrymam vocat, ignorasse videtur: sic enim de som-

Lib. 3. ca. 18.

no in phrenetide cōciliando loquitur. Si nihilominus vigilant phrenitici, qui-
dam somnū moliuntur potui dando aquam, in qua Papauer, vel Hyoscyamus
decocta sit: alij Mandragoræ Mala puluino subiiciunt, alij vel Amomum, vel
Sycamini lacrymam fronti inducunt. Hoc nomen apud medicos reperio. Sed
cum Græci Morum Sycaminum appellent, Mori nulla lacryma est. Sic verò si-
gnificatur lacryma arboris in Ægypto nascentis, quā ibi Morosycon appellāt,
quæ postremā verba supposititia vidētur, ex cuiusdam glossemate qui Celsum
vellet liberare, ab ea dubitatione, qua hæsitabat, incerta contextui. Mori fructus

Li. 7. simpl.

Galeno maturus quidem ventrem subducit, immaturus verò vbi aruerit, admo-
dum restringit. Itaque ad dysenterias accommodus est, & affectiones cæliacas,
& quasunque alias fluxiones. Contunditur autem & obsoniis commiscetur,
veluti Rhois fructus, aut si cui ita videatur, ex aqua, aut vino bibat. Porro quod
maturorū succus ad stomatica multum sit utilis, propter eam quæ illi inest ad-
strictionem, neminem latet. Præterea ad plura alia quæ mediocrem poscūt ad-
strictionem competit. At immatura Mora præter acerbitatē, etiam aciditatem
fortita sunt, & tota adeo arbor in omnibus suis partibus mistam aliquam vim
obtinere videtur ex adstringente & purgante compositam. Attamen in radicis
cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo vt & latum lum-
bricum interficiat. In aliis autem partibus adstringens vincit: in foliis tamen &

Li. 2. Alim.

germinibus quodammodo media vtriusque temperies est. Idem alibi, Mora ce-
lerrimè pertranseunt, inquit, cibis que aliis præeunt, si in ventriculū purū inci-
derint, & sumpta primis epulis fuerint. At sumpta post alios cibos, vel si etiā pra-
uum succum in ventriculo offenderint, celerrimè vna cum aliis cibis corrup-
puntur, nouo quodam corruptionis genere, & quod verbis explicari nequeat,
vt in cucurbitis accidit. Tempus eis vtendi vt Peponibus, cum corpus ventri-
culi squalore estuat, quo tempore necesse quodammodo est, hepatis quoque
idem accidere. Cucurbitæ quidem, & Cucumeri tum maturo, tum ante maturi-
tatem, adhæc & Melo peponi nulla adstringens qualitas inest, Moris verò, &
potissimum cum nondum admodum maturuerint, qualitas eiusmodi conspi-
cuè inest, immaturioribus autem, simul & acida. Proinde nonnulli ab arbore
ipsa detrahentes ac siccantes reponunt, medicamentum ad dysenterię ac
diurnæ diarrhę curationem vtile futurum. Quod celeriter subducantur
accidit propter solam substantiæ lubricantem humiditatem, fortè etiam pro-
pter admistam qualitatem quandam acriorem, quæ deiectioni excitandæ
satis esse possit: quia qualitas adstringens non modò ad subductionem ni-
hil confert, verum etiam suapte natura ventrem moratur. Coniecto igitur
mora exiguam in seipsis habere facultatem eiusmodi, qualis magna me-
dicamentis purgantibus inest, cuius beneficio non modò facilè secedunt,
sed corrumpuntur etiam, si diu in ventre manserint. Quod si corrupta non
fuerint, omnino quidem humectant, non tamen omnino refrigerant,
nisi sumpta fuerint frigida. Alimentum autem corpori præbent minimum,
quomodo Pepones, non tamen vt ij vomitum excitant, neque stoma-
chum lædunt.

CORNVS MAS, CAP. XV.



VÆ Latinis Cornus, Græcis κρανία vocatur, Gallis Cornouillier, Italis Corniolo, Germanis Cornelbaum, Kurberbaum, Thierlinbaum, & Dierlem, Belgis Cornoeliebaon, Hispanis Cerezo siluestre, Anglis Cornel tree, Boemis Drinkouuy. Fructus Corna, Gallis Cornouilles, Italis Corniole, Germanis Vuelschkirschen, & Cornelein, Hispanis Cornizolos. Eius duo genera Theophrasto: alia enim mas, alia fœmina. De Corno fœmina iam diximus, nunc de mare, siue sativa. Cornus mas arbor est sæpe procera satis, vulgarium arborum modo, interdum humilis & fruticosa, virgis numerosis, ex breui caudice nascentibus, nodosis, firmis, robustisque. Tota arbor scabro contegitur cortice, adstringenti admodum gustu: folia illi sunt virgæ sanguineæ, lævia, mediocriter crassa, ac venosa. Flores edit muscosos, aurei coloris, ex quibus baccæ oriuntur, rubentes, oblongæ, oliuæ figura, præduro intus ossiculo. Cornus, inquit Dioscor. dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primum virent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem referunt, interprete Ruellio vulgares Codices secuto. Vetus autem Codex sic habet, κρανία δένδρον ἐστὶν ἄδρὸν, καρπὸν φέρον ὡς ἐλαίας, ἐπιμήκη, χλωρὸν μὲν πρῶτον, ἔπειτα δὲ κηροῦδῃ, καὶ τελευταίως πεπαινώμενον ἐρυθρὸν. Id est, Cornus arbor grandis & valida est, fructum ferens oblongum instar oliuæ, primò quidem viridem, deinde verò cæreo colore suffusum: denique cum perfectè maturus fuerit, rubentem. Cornus alia mas est Theophrasto, alia fœmina. Vtrique folium Malo (aut

Nomina

Lib. 3. Hist. cap. 12.
In Dumer cap. 34.
Matth. lib. Diosc. c. 35.

CORNVS MAS.



vulgari, aut Cydoniæ,) simile, nisi pinguius, crassiusque esset, cortex neruosus, tenuis, caudex, non valde crassus. Virgas vtræq; vt vitex profert: fœmina quamuis fruticosior, minores. Nodos habet vtræque Viticis modo geminos, ex aduerso collocatos. Materies maris excors, totaque solida, cornibus spissitate firmitatēque similis: fœminæ verò materies medullam continet, molliorque est, & cauatur, ad iacula ob id inutilis. Maris longitudo duodecim maxima cubitorum est, quanta sarissarum longissimarum. Nunquam enim totus caudex altius assurgit. Qui Idam Troianam incolunt, marem sterilem dicunt, fœminam fructiferam. Nucleum fructus habet similem Oliuæ, gustu dulcis, & gratus odoratu: flos Oleæ similis est. Floret fructumque fert simili modo, ex vno pediculo multa Corna præbens, & eodem sæpe tempore quo Oleæ. At Macedones fructiferas ambas affirmant, sed fœminæ fructum esculentum non esse. Radices, Viticis modo, validæ & incorruptæ. Nascitur in locis humidis, & non in siccis. Prouenit semine, atque auulsione. Hæc Theophrastus, in quibus non ab re miratur Matthiolus, Theophrastum Corni folia cum Amygdalæ foliis, vt vulgo legitur, multum diuersis conferre. Quapropter mendosos hoc loco Theophrasti Codices esse suspicatur. Cornus circa solstitia reddit fructum primo candidum, postea sanguineum, inquit Plinius. Ex eo genere fœmina post Autūnum fert baccas acerbæ, & ingustabiles cunctis animantibus: ligno quoque fungosa & inutilis, cum mas è fortissimis quoque sit: tanta differentia ab eodem genere

Lib. 3. Hist. cap. 12.

Locus.

Tempus.
Li. 16. c. 26.

Locus.

Lib.16. c.25.

Tempus.**Vires &****Temper.**

Lib.1. c.135.

Lib.23. c.8.

Li.7. simpl.

Matthi. libi.

Plin. lib.21.

cap.12.

Lib.16. c.25.

Nomina**Genera.**

Lib.3. Hist.

cap.12.

Forma

fit. Cornus satiua in hortis & viridariis colitur, cito floret: primo enim fauonio germinat, vel teste Plinio, mense Augusto fructus maturus est. Corna in cibo valde adstringunt, vt rectè scribit Dioscorides, pro fluuio alui, atque dysenteria salutaria, siue in edulo, siue in defruto exhibeantur. Muria vt diuæ condiuntur. Sanies quam virentia folia torrendo desudarunt, impetigini conuenienter illinitur. Sudor virgæ Corni arboris lamina ferrea candente exceptus, inquit Plinius, non contingente ligno, illitâque inde ferrugo incipientes lichenas faciat, in quo certè medicamento maior vis ferruginis videri potest, quam vel faniæ ex foliis, vel sudoris ex virgis, & ligno. Corni arboris fructus, inquit Galenus, admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet, ipsum valenter ventrem adstringere, sicut & Mespila. Folia quoque & germina gustu acerba sunt, valentèrque desiccant. Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimum durorum corporum. At paruis vulneribus, & mollioribus corporibus magis contraria sunt: nam nimium ea contendunt, ac plus satis desiccant. Fit ex Cornorum pulpa conditum diacydoniti non absimile. Ex eorundem decocto & Saccharo liquor igne concrefcit, qui præter quam quod gustui gratissimus sit, etiam datur vtiliter dysentericis, ac fœminis profluuio mensium laborantibus. Corni arbores prope aluearia non conferendæ: nam Apes flore eius degustato aluo concita moriuntur, cum contrarium in homine effectum præstet. Corni masculæ nulla medulla, inquit Plinius: ac rursus: omnibus quæ diximus spissa firmitas. Ab his proxima est Cornus: quanquam non potest videri materies propter exilitatem, sed lignum non alio pene quàm ad radios rotarum vtile: aut si quid cuneandum sit in ligno, clauis que figendum, ceu ferreis.

S O R B U S . C A P . X V I .



R B O R Sorbus ὄνη, & ὄυν Græcis nuncupatur, Gallis *Cormier*, & *Sorbier*, Germanis *Speruuerbaum*. Fructus ὄνα, & ὄα, Latinis *Sorba*, Italis *Sorbe*, Gallis *Cormes*, & *Sorbes*, Germanis *Spererling*, *Sporoeppfel*, & *Sperbieren*, Hispanis *Sorbas*, Boemis *Kzerbiny*. Sorborum differentias aliquot nouit

S O R B U S .



Theophrastus, qui scripserit, Sorborum duo esse genera, fœminam fructiferam, marem sterilem. Cæterum fructu differunt, quod aliæ orbiculatum, aliæ oblongum, aliæ ouatum ferunt. Distant etiâ succis. Nam magna ex parte orbiculati odoratiores sunt & dulciores: ouati sæpe acidi, & minùs odorati. In vtraque folij totius pediculus longus, ac neruosus est: singula verò foliola ordine digesta pinnis similia, è lateribus exeunt, perinde ac si id vnicum folium sit, ad neruosum vsque pediculum, tanquam in lacinias diuisum. Cæterum ea, quamuis densa, à sese tamen inuicem distant, deciduntq; non singillatim, sed simul tota illa pinnata congeries, minor, quidem in arbore vetustiore, & asperiore. (Gaza tamen pro τὰ παλαιότερα, id est, in vetustioribus) omnibus in summo petiolo folium est impar, vt etiam omnia sint imparia, figura Lauro tenuifoliae similia, verum ferrata, quamuis haud multum, nec in extremo tam acutè mucronata, sed rotundiora.

Florem

Florem habet racemosum ex vna veluti claua, (id est, fastigiato in thyrsum cacumine,) ex multis paruis, & albis constantem. Fructus quoque, cum magnus est eius prouectus, racematim coit: multis Sorbis eodem vertice pendulis, ita vt faui quodammodo speciem gerat. Eroditur à vermibus in arbore fructus immaturus adhuc, magis quam Mespila, pira, & Pirastris fructus, quamuis sit omnium acerbissimus (nam sic emendandi vulgati codices, σκωλικόβροτος ἐπὶ τῷ δένδρῳ ὁ καρπὸς ἀπεπλος ὧν ἔτι, γίνεσθαι μᾶλλον τῶν μεσπίλων, καὶ ἀπίων, καὶ ἀχράδων & cætera.) Ipsa quoque arbor vermibus infestatur, atque ita senescens arefcit. Vermis ei peculiaris rubor est, & pilosus. Noua mediocriter fructificat: nam trima cōtinuo parit. Autumno cum folia deciderint protinus cachryos figuram ostēdit, pinguis, ac turgidæ quasi iam parturiat, & hieme perdurantis: caret aculeis Sorbus, nec vt Mespilus spinosa est: cortice leui & subpingui nouæ vestiuntur, colore in flauum albicante (reponendum enim, ἄπερ μὴ τὰ γεράνδρνα, pro ὥσπερ τὰ γεράνδρνα) in annosis scabro & nigro. Arbor ipsa procera est, recta, decora coma: quæ magna ex parte Nucis pineæ figuram propemodum æmulatur, si nihil impediat: materies solida, spissâ, colorata, robusta. Radices non multas habet, neque altè descendentes, validas tamē, crassas & incorruptas. Nascitur radice, auulsione, semine. Solum frigidum amat & humidum, in quo etsi viuacior sit, & difficile corrumpatur tamen etiam in montibus nascitur. Hactenus Theophrastus de Sorborum generibus, & forma. Sorbis Plinio quadruplex differentia. Alijs enim eorum rotunditas Mali, alijs turbinatio Piri, alijs ouata species, ceu malorum aliquibus. Hæc obnoxia acori. Odore, & suauitate, rotunda præcellunt: cæteris vini sapor. Generosissima quibus circa pediculos tenera folia. Quartum genus torminale appellant. Matthiolus Sorba alia satiua esse tradit, alia siluestria. Satiuorum duo esse genera, marem, & fœminam. Vtraque, inquit, caudice est longo, recto, ramis in altum assurgentibus: folio Fraxini, sed angustiore, auersa parte albicante, per ambitum serrato. Album edit florem, racematim prodeuntem, è quo fructus exeunt in racemi modum, ab vno tantum exortu pediculos ducentes, in altera quidem orbiculati, & succo odoratiore, ac mitiore, in altera verò ouati Piri faciem referentes, & gustu asperiores, insuauioresque, ac minùs odorati, colore sub pallido, & in latere rufescente. Decerpuntur immatura Autumno, & in manipulos colligata suspenduntur, vel reponuntur substratis straminibus, vt mitescant, aliter præ nimia austeritate nec mandi, nec deglutiri possunt. Ligni materies solidissima, & valdè compacta. Cortice vestitur satis scabro, colore ex flauo albicante. Radix illi rara, crassa, solida. Siluestris Sorbus, siue Torminalis à satiua facie ferè non differt, præterquam fructu, qui umbellatim vt in Sambuco prodit, crocantibus in rufum baccis, Oxyacanthæ similibus, magnitudine ferè paribus, sapore tamen à satiuis non parum diuerso, quæ per hiemem à rusticis ad aucupia asseruantur sunt enim turdis gratissima. Huius descriptionem in Silua tradidimus, simul & Cratægi capitibus 32. & 33. cui folium Viti aut Platano simile, læue, firmū, bacçe oblongæ, teretes, asperiusculæ, racematim cohærentes, longo pediculo subnixæ, coloris ferruginei, acidæ, & austæræ: arboris satis procæræ, cortice læui, materia dura, & minimè fragili: libuit tamen hac narratiuncula velut: refricare memoriam lectoris, & vtriusque figuram accuratius expressam, ac venustius, hîc addere. Sorbus satiua in hortis & viridariis colitur. Martio mense floret, Septembri fructum maturat. Sorba, inquit Dioscorides, dum luteus color est, priusquam maturescant dissecta, & sole siccata manduntur, vt aluum sistant. Eadem est vis farinæ molitorum, si polentæ loco sumatur, quod & decoctum eorum in potu præstat. Sistūt aluum Sorba sicca, Plinio: nam recentia

Locus.

Lib. 15. c. 21.

L. 1. Diosc.
cap. 136.Forma.
satiu. Sor.In syl. c. 32.
Ibidem.

Locus.

Tempus.

vires &

Temper.

Lib. 23. c. 7.



Lib. 8. sim. stomacho, & aluo citæ profunt. Sorbi fructus, autore Galeno adstringentem obtinet qua'itatem, sed multo imbecilliolem quàm Mespilus, quare etiam esui iucundus est, minúsque quàm Mespilus ventrem constringit.

MESPILVS,

CAP. XVII.

Nomina

Lib. . Hist.
ca. . 12.

Li. . 5. ca. 20.



R BOR quæ Gæcis μέπιλος & μεσπίλη dicitur, Latinis *Mespilus*, Gal-
lis *Nefflier*, *Mespplier*, *Meslier*, Arabibus *Zarar*, seu *Zarur*, & *Alzarur*,
Ital. *Nespoli*, Germanis *Nesfelbaum*, Boëmis, *Nysspule*: Angl. *Meder-*
re: & *Medeler*, fructus μέσπιλον, Latinis similiter *Mespilum*, Gallis
Nesfle, *Mesple*, *Mesle*, Germanis *Nesfel*, Hispanis *Nesperas*. Mespili genera hæc
sunt ex Theophrasto, Anthedon, Satanios (Plinius Setanios legit) Anthede-
nœides, vt diuidunt Idæi. Satanios fructum fert maiorem, candidiorem, la-
xiolem, & qui nucleos habet molliores. Reliquis minor est fructus, odoratio-
r, ac & acerbior, vt diutius asseruari possit. Spissior etiam his materies, & flauior,
cætera similis. Flos omnibus Amygdalæ, sed non rubens, vt illi, sed vtrumque
pallidus. Anthedon haud procera est arbor (legendum enim videtur, μέγες &
μέγα τὸ δένδρον, quamuis scripserit Plinius, vt mox dicemus, arborem de amplif-
simis esse, & Gaza verterit, magnitudine arbor ista excellit) in orbem comosa:
folio valde fisso (Gaza perperam legit ἀχιντον, & vertit infissum: exemplaria
nostra habent ἐπιλυχιδές, legendum verò πολυχιδές) Apio in extrema parte simi-
li, maioribus incisuris (non vt Gaza cum vulgaris exemplaribus legit, μείζοσι
χήμασι, idest ampliore figura, cum legendum sit μείζοσι χίσμασι) rigido, neruo-
so, Apij foliis asperiore, longiore (τέλειον, ἰσῶδες, λεπρότερον σελίνυ. Gaza, pro-
missum

missum, neruosum, Apio tenuius, quia λεπτότερον σελίνυς legit) atque vndique fissuris laciniato: fructu ex longo ac tenui pediculo pendulo, qui antequam folia decidant, vehementer rubet (quæ enim in libris excusis habentur, καὶ τὸ ὅλον καλαχίσματα περιεχόμενον ὃ ὅλον. μίχρον δὲ ἔχει λεπτόν, μακρόν, videntur sic emendanda, καὶ τὸ ὅλον κατὰ χίσματα, vel καλαχίσμασι περιεχεσθαι μένον, μίχρον ὃ ὁ καρπὸς ἔχει λεπτόν, & cætera, quæ Gaza interpretatus est, totumque circumtunsum est, & pediculo tenui ac longo dependet, antequam decidat vehementer rubet, & Plinius, folia antequam decidant rubescunt) Arbor hæc radice numerosa & alta nititur, ideoque longæua, & mori contumax. Ligno est denso, solido, putredini minimè obnoxio. Seritur semine & auulsione. Morbus earum arborum in senecta, vt à vermibus erodantur, qui prægrandes eis & diuersi quàm in cæteris arboribus cernuntur. Hæc Theophrastus, ex quo Plinius sua mutuatus Mespilis inquit, tria genera, Anthedon, Setania: tertium degenerat, tametsi Anthedoni similis est, quod Gallicum vocant. Setaniæ Maius Pomum, candidiusque, acini molliore ligno: cæteris minus Pomum, sed odore præstantius, & quod diutius seruetur. Arbor ipsa de amplissimis. Folia antequam decidant, rubescunt: radices multæ, atque altæ, & ideo inextirpabiles. Non fuit hæc arbor in Italia Catonis æuo. Dioscorides duo tantum constituit genera. Μέσπιλον τὸ δένδρον, inquit, ὁ παρ' ἐνίοις ἀρωνία καλεῖται, & cætera, Mespilus arbor quæ à nonnullis, Aronia vocatur: ac rursus, Μεσπίλη δὲ καὶ ἕτερον ἔστιν εἶδος, ἐν ἰταλίᾳ γεννώμενον, ὅντινι ἐπιμηλίδι καλεῖται, οἱ δὲ σιτάνιον ὀνομάζουσι. Alterum Mespili genus in Italia nascitur quod aliqui Epimelida, alij Setanion vocant. Quamquam in quibusdam manuscriptis exemplaribus legatur. Μεσπίλη δὲ ἕτερον ἔστιν εἶδος ἐν ἰταλίᾳ γεννώμενον, ὅντινι ἐπιμηλίδι καλεῖται, καὶ ἕτερον δὲ σιτάνιον ὀνομάζουσιν, idest, Alterum genus Mespili in Italia nascitur, quod nonnulli Epimelida vocant, atque alterum quod Sitanion, vt tria sint etiam Dioscoridi Mespili genera. Aronia quæ Anthedon est Theophrasti, Epimelis quæ Anthenoides, & Setanios. At Mespilum Italicam

Li. 15. c. 20.

Lib. 15. c. 20.

Li. 1. ca. 133.

MESPILVS
Aronia.



à Dioscoride Epimelida nuncupatam omnes fere herbarij Mespilum nostratem esse autumant, id quod etiam Matthiolus existimat, sed Galenum Epimelidis appellatione aliam arborem à Mespilo nostrate diuersam intellexisse. Quibus refragatur Dalechampius, ex cuius sententia Epimelidem longe aliam, siue Anthedonocidem Theophr. iam descripsimus. Mespilus Aronia siue Tricoccus, siue Anthedon Theophrasti, plurimum etiam à Mespilo nostrate differt, estque arbor Dodon. Cordi, Matthioli sententia quæ Azarolo, à Neapolitanis Arabes secutis vocatur, qui Mespilum Zaror, & Zarur, & Alzarur, nuncupant. Est enim arbor mediocris, proceritatis cortice ac materia Pruno non absimili, spinis horrida, non tamen admodum acutis: foliis laciniatis, Apij æmulis, floribus albicantibus, racematim coherentibus: fructu rotundo, rubente, vulgaribus Mespilis æquali, sed minore umbilico, tribus tantum intus ossiculis, adeo graphice depicta à Theophrasto, vt fusius explicare nihil sit opus. Eius quoque præcipuas notas sic Dioscori

Lib. 1. Diosc.
cap. 133.In Dume.
cap. 35.Nomina
Forma.
Aronia.

Lib. 4. c. 133. Dioscorides literis mandavit. Mespilus Aronia spinosa arbor, foliis Oxyacanthæ (sic enim legendum, non Pyracanthæ, nec Pyxacanthæ) fert Pomum suave, exiguo Malo non dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli Tricoccum appellauere. Mespilus Setania, siue Setanios nostras est vulgaris Mespilus, quæ in syluis, dumetis, sepibus nata spinosa est, Malo inferior: folio Lauri, longiore, per ambitum nonnihil serrato: flore Amygdalæ, pallido, Pomo

MESPILVS

Setania.



Locus.

Tempus.

Ibidem.

Vires.

Lib. 23. c. 7.

Lib. 6. c. 43.

Lib. 7. sim.

Li. 2. Alim.

Li. 1. Diosc.
cap. 133.

non exquisitè rotundo, sed ferè turbinato, incano, initio tam acerbo, vt edendo non sit priusquam hiemis frigoribus mollescat, superiore parte cristato, & circumextantibus herbaceis apicibus vmbilicato, grandiore quàm in aliis Mespilorum generibus vmbilico, laxiore, candidiore, quin intus ossiculis. Arbor hæc frequenti insitione in viridariis & hortis mitescens, feritate deposita Pomū edit magnitudine par ceteris Malis, nec spinis horret. Mespilus Aronia Neapoli copiosa feritur in viridariis, hortis, & vineis. Fructus Septembri tantum mense maturescit. Setania Aprili & Maio mensibus floret, fructum Septembri etiam perficit. Mespilus Aronia, inquit Dioscor. tardè maturescit, esu adstringit, stomacho grata est, aluūque suppressit. Mespila Plinio, exceptis Setaniis, quæ Malo propiore vim habent, reliqua adstringunt stomachū, sistuntque aluū. Mespilorū nostrarū inquit Dodonæus, fructus & folia refrigerāt, siccant, & astringunt. Mespili fructus, Galeo teste, admodū acerbus est, vixque edi potest, strennuè ventrem coercens. Quin & in

germinibus, & foliis acerba hæc qualitas non pauca reperitur. Idem alibi, Ambo adstringunt, inquit, sed multo fortius Mespila quàm Sorba. Quamobrem aluo fluenti in cibo accommodatissimè exhibentur: Sorba tamen ipsis sunt suauiora. Prorsus namque nihil acerbi, vt Mespila obtinent, sed succus eorum citra acerbitem austerus est. Illud porrò neminem puto latere hæc omnia parcè nō affatim, vt ficus, vuāsque esse comedenda: nequaquam enim eis vt cibis, sed vt medicamentis potius indigemus. Mespila Aronia siue Azarola gustui placent, & Neapoli pro delitiis non solū cruda expetuntur in cibis teste Matthiolo, sed etiam saccharo melléque condita eduntur, grauidis mulieribus gratissima, non solū quod sapore placeant, sed earum etiam malaciæ subueniant. Vulgaria nostra Mespila eodem auctore deuorata cœliacos, & diarrhæa laborantes iuuant: sistunt faucium, gutturis, dentium, & gingiuarum fluxiones, si eorum decocto os colluatur. In eo si insideant fœminæ, mensium abundantia sistitur, fit è siccis Mespilis Rosarum succo exceptis, additis Caryophyllis, & Coralli rubri, & Nucis muscatæ tantillo cataplasma ori ventriculi admouendum, ad compescendas vomitiones, in quibus præsertim cibus reiicitur. Sicca folia in puluillum trita, & aspersa, recentia vulnera glutinant, & sanguinis profluuium sistunt. Dantur quoque vtiliter ad cruentas reiectiones, denique ad ea quæ adstrictionem corroboracionemque desiderant, tum folia, tum fructus plurimū valent. Mespilorum ossicula in puluillum redacta, calculos ex renibus pellunt, si cochlea

fi cochlearis mensura ex vino in quo vulgaris Petroselini radices decoctæ fuerint, bibantur.

FICVS, CAP. XVIII.

FICVS arbor, συκή Græcis est, Gallis *Figuier*, Germanis *Feighenbaum*, Belg. *Friguenbaum*, Angl. *Figge tree*, Boemis *Fikštepei*. Fici fructus σύκα, Latinis Fici, & Ficus, appellantur, Arabibus *Sin*, *fin*, seu *Tin*, Italis *Fichi*, Germanis *Feighen*, Hispanis *Higos*, Gallis *Figues*. Fici genera duo: est enim Ficus sylvestris, & satiuæ sylvestris συκή ἀγρία, & ἐρινεὸς à Galeno appellatur, à Latinis Capri ficus. Caprificus vocatur è sylvestris genere Ficus inquit Plinius, numquam maturescēs. Fructus eius σύκον ἐρινεοῦ: Satiuæ συκή, ἡμερος. Fructus σύκον, vt dictum est. Tam sylvestris fructus nunquam maturescens, quàm satiuæ nondum maturus ὄλιωθος, nominatur, Latine Grossus. Dioscorides olynthos etiam erineos vocari scripsit, Macrobius, Grossos, Ficos quæ numquam maturescunt. Sed Grossi propriè Olynthi sunt, hoc est primitiuæ Ficus vtriusque generis. Sicca ἰχάδες, Latine Caricæ, non autem καρικὴ Græcè, vt quidam putant, quòd Carica peculiaris sit Ficus in Syria prouenientis species. Syria peculiare habet arbores inquit Plinius. In Nucum genere Pistacia nota, in Ficorum autem, Caricas, & minores eius generis, quæ cottana vocant. Paulus tamē καρικὴν pro Ficu arida videtur vsurpasse, cum scribit, aut καρικῆς drach. octo, Sampsuchi drachma, tritis cum oleo, donec cerati fiat spissitudo vtitor. Hic καρικὴ nihil aliud esse videtur, quàm quæ ἰχὰς quoque Græcis dicitur. In auctione vitarum Luciani, de Epicuro quærit licitator, quibus eduliis delectetur, respondet Mercurius, dulcibus vescitur, & mellitis, καὶ μέλιτα, inquit, τὰς ἰχάδας. Subiicit licitator, χαλεπὸν μὲν ἔδην, ὠνήσομαι καὶ αὐτὸς παλῶθας τῶν καρικῶν. Siue itaque à loco, siue aliunde nomen habet Carica, Græcis & Latinis vsurpatur. Habetur etiam apud Hippocratem Caricum medicamentum duplex, aridum, & liquidū, sed neutrum Caricas recipit, neque à Caricis nomen habet, sed à Carum gente, quibus erat in multo vsu, appellatum fuisse videtur. Ficus nostræ satiuæ fructum figura coloréque differunt. Alij enim Piri speciem referunt, alij sessiles sunt, alij inter hos medij. Aliæ Ficus albæ, aliæ nigrae, aliæ purpureæ, aliæ virides, aliæ subrufæ, aliæ pallidæ, aliæ vario colore spectantur. Ad nos, inquit Plinius, ex aliis transiere gentibus, Chalcide, Chio, quarum plura genera. Siquidem & Lydiæ quæ sunt purpureæ, & Mamillanæ similitudinem earum habent: & Callistruthiæ parum sapore præstantiores, Ficorum omnium frigidissimæ. Alexandrina è nigris est, candicante, rima, cognomine delicatæ, vel vt in vetusto codice Parmensi legitur, Candicat Therina cognomine delicatæ. Nigra & Rhodia est, & Tiburtina de præcocius. Sunt & auctorum nomina iis, Liviæ, Pompeiæ. Siccandæ hæ sole, in annuos vsus aptissimæ, cum mariscis, quas harundinum folij macula variat. Est & Herculanea, & Albicerata, & Aratia vel Aritia, alba, pediculo minimo, latissima. Primo autem prouentu Porphyritis, longissimo pediculo. Comitatur eam è minimis, & vilissimis popularis dicta. Contra nouissima sub hieme maturatur Chelidonia. Sunt præterea eedem, quæ tamen dictio in manuscripto non extat, serotinæ & præcoces, biferæ, alba & nigra, cum messe vindemiæque maturescences. Serotinæ, & Duracinæ à corio appellatæ duro: ex Chalcidicis quarundam trifero prouentu. Tarenti tantum prædulces nascuntur, quas vocant Omas (in manuscripto Oenas, quidam Oenas à vini sapore.) Præterea Ficus Cypriæ meminit Theophrastus, item Indicæ, cuius etiam historia est apud Strabonem, & Plinium, quæ à nostratribus ficis diuersissimæ sunt. De ficu Ægyptia Plinij suo loco dicemus. De Ficu Idæa, iam diximus. Nunc de nostrate Fico satiuæ dicemus. Ficus arbor est caudice sapius

Nomina

Genera.
Lib. 8. sim.
Li. 15. ca. 19.

Li. 1. c. 145.

Hermol.
coro. cap.
185. libr. 1.
Dodo. libr.
6. cap. 46.
Li. 13. ca. 5.

Lib. 4. c. 13.

Lib. de vlc.

Genera.
Matth lib.
1. Dioscor.
cap. 145.
Li. 15. ca. 18.

Li. 4. Hist.
cap. 2. & 5.
Li. 15. Geol.
Lib. 12. c. 5.
In Du. c. 37.
In Sil. c. 43.
Matt. lbi.

FICVS.

Forma



Li. 15. ca. 19.

Maturefcunt autumnno, Augufto, & Septembri mense. Sed Groffi æftate perficiuntur. Decerpuntur maturi, & in fole ficcantur cratibus, non folum ad ciborũ, fed etiam ad medicamentorum vſum. Sicci in cadis ligneis aſſeruantur. Ficus arbor in Hispania, Italia, & Gallia Narbonenſi copioſe prouenit: in frigidioribus regionibus, non niſi in hortis & viridariis, locis apricis, & à Septentrione

Locus.

CHAMAESTYCE

Arbor.



Lib. 1. c. 145.
Vires &
Temper.

ſæpius contorto & breui, ſubalbicante libro, lacteoque ſucco madente, guſtu adſtringente, acri & amaro, ita vt vlcerare poſſit. Ramos quos priuatim Cradas vocant plurimos emit- tit, medulla plenos, ramulorũ Sambuci mo- do, læui cortice conſectos: folia vitiginea, am- pla, nigricantia, aſpera, firma, rotundis ac ro- buſtis pediculis nixa. Hæc arbor non floret, à foliorum exortu extremis tantũ ramis fru- ctus edit turbinatos, & varios, vt dictum eſt. Materies illi alba, & fungoſa, vt viti, tenax ta- men, & ad ſcuta paranda peridonea. Radices multæ, ſed ſumma tellure vagantes, quam ob cauſam frigoris eſt impatiens. Fructibus im- maturis ſuccus lacteus, maturis & percoctis melleus eſt. Molli præterea iis pulpa eſt, cibo gratiſſima, granis multis referta, quæ ficaria grana, Græci κερχεας vocant, Plinius fru- menta. Ficis mollis omnibus tactus, maturis frumenta intus. Cæteris præferuntur qui ma- turi rimofa ſunt cute, & qui pulpæ pinguedi- ne, dulcedine, atque ſapore alios antecellunt.

auerſis. Ficum ſic inuerſo ramo ſerere, vt quod cœlum aſpicit in arbore ſua humi deſigatur, nuper excogitarunt ſolertium hominũ curio- ſa ingenia: qua ratione factum eſt, vt in vaſis fictilibus depacta planta huc illuc transferri queat, & ſemper humilis atque pumila ſit, cu- bito vix vnquam maior, nec tamen fructuum minus præbens, quàm ſi arboreſceret: ſpecta- culo quidem in viridariis & hortis iucũdiſſi- mo, cũ eo modo conſitæ multæ virent in am- bulationũ marginib⁹, quarum pomũ inclina- to corpore legatur, aut in cœnaculorum fene- ſtris, vestibuliſque palatiorum diſpoſitis vr- ceis nitent, & per aſperam hyemem in ſubter- raneis tepidiſque locis abdite, citius reliquis germinant, & fructũ edunt. Ficus maturæ re- centes, inquit Dioſcor. ſtomachum lædunt, aluum ſoluunt, ſed facile contracta ab eis flu- xio ſiſtitur: ſudorem euocant, papulâſque, ſi- tim ſedant, calorem reſtingunt. Siccis natura excaſciendi, vires alunt, ſed ſitim magis ſtimulant, aluo vtiles, rheumatismis ventris, & ſtomachi contrariæ: gutturi autem, arteriæ, renibus,

renibus, vesicæ, & iis quos longa valetudo decolorauit, anthelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissimæ. Feruefactæ cum hyssopo, & potæ, thoracem purgant: tussi veteri, diuturnisque pulmonum vitiis conueniunt: aluum molliunt tussæ cum Nitro, & Cnico, deinde manducatæ. Decoctum arteriæ, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum Hordeacea farina cataplasmatibus miscentur, & in muliebres fœtus cum fœnogræco, & ptisana. Cæterum cum Ruta coctæ torminibus infunduntur: coctæ illitæque duritias discutunt: parotidas & furunculos emolliunt: panos ad maturitatem perducunt, maximè Nitro, Iri, aut Calce addita. Crudæ si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt: cum Malicorio pterygia purgant: cum Atramento sutorio, deploratis ferè tibiæ fluxionibus, & cacoëthis vlceribus medentur: quin & cum vino decoctæ addito Absinthio, & Hordeacea farina, vtilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanant perniones: prurigines, sonitusque, si crudæ terantur, & Sinapi, liquoréque aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam syluestris quàm satiuæ Fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumque dissoluit, vt acetum: exulcerat corpora, meatus aperit, soluit aluum, vuluam recludit cum trito Amygdalo potus: menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorum cataplasmatibus cum farina fœnigræci & aceto utilis: lepras, lichenas, vitilignes, vitia cutis in facie, psoras, vlcera in capite manantia, cum polenta ex purgat: instillatus plagæ percussis à scorpione, venenatorum ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, & cauis eorum inditus: verrucarum formationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis syluestris Fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tussi exprimuntur. Is siccatus in vmbra reponitur. Et lac & succus adduntur exulceratoriis medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulnei faciem afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo, spathæ loco moueatur. Grossi, quæ Erinei à nonnullis vocantur, coctæ, & illitæ, strumas nodosque omnes emolliunt. Crudæ formicas, verrucas, & thymia, nitro, farinæque additis tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale & aceto, vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanant: iis ficosæ extuberationes, & palpebrarum scabritiæ, perfricantur. Nigræ Ficus foliis, cauliculisque candidæ vitilignes perunguntur, faciunt ad canum morsus, & vlcera quæ Ceria, idest fauos vocant. Grossi cum syluestris papaueris foliis, ossa extrahunt: furunculos cum cera discutunt: contra muris aranæ morsus, & scolopendræ venena, cum Eruo & vino illitæ auxiliantur. Fit ex cinere Ficus tam syluestris quàm satiuæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est, & inueterascere: siquidem inter caustica intelligitur. Gangrenis prodest: expurgat, & consumit quæ excrecant: eo verò sic vtendum. Spongia hoc lixiuium assiduè imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones vetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosque, instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet: & oras committit non secus atque emplastra quæ cruentis vulneribus admoventur. Bibitur ad discutendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa cum Cyatho aquæ recentior colatum, addito olei exiguo: cœliacis, dysentericis per se Cyathus prodest: neruorum vitiis, conuulsionibus commodè illinitur ex oleo, vt pote quod sudores moueat: aduersus gypsi potum, & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum: omnia tamen adstringunt. Fici succus lacteus aceti naturam habet, inquit Plinius, itaque coaguli modo lac contrahit. Dioscorides id aliter scribit, ni-

Ibidem.

mirū Fici tam sylvestris quàm sativæ succū lac coagulare, quemadmodum coagulum, & dissolvere coagulatum, quemadmodum acetum. Redeamus ad Plinium. Excipitur ante maturitatem Pomi, & siccatur in vmbra ad aperienda vlcera, cienda menstrua appositus cum luteo oui, aut potus cum amylo. Dioscorides. Exulcerat corpora, meatus aperit, aluum soluit, vuluam recludit cum amygdalo potus: menstrua ciet cum luteo oui, & cætera. Quod Dioscorides dixit, panos ad maturationem perducunt, maximè Nitro, Iri, aut Calce addita, vulgata Plinij exemplaria habent, efficacius Calce, aut Nitro addito. Vetus Cornarij manuscriptum, efficacius Calce, aut Nitro, aut Sinapi addito. Quod in Plinio legitur, Tibiarum vlceribus cum æris flore, pterygiis cum punico malo, vetus codex habet, Tibiarum vlceribus cum æris flore, & parotidi, ac pterygiis cum Punico malo. Quod igitur cum malicorio à Dioscoride dictum, cum malo punico Plinius legit, & quod Dioscorides ait μετὰ χαλκάνθη, idest cum Atramento sutorio, Plinius videtur legisse μετὰ χαλκὸς ἀνθῆς, idest cum æris flore, vicinitate vocum deceptus. Quod autem sequitur in Plinio, aluum sistunt manducata, legendum, cient. Quod verò Dioscorides dixit, pruriges, sonitusque, si crudæ terantur, & sinapi, liquoréque aliquo exceptæ auribus instillantur, id Plinius non habet, & interpretes Ruellius legit σὴν νέπτει καὶ ὕψω τινι, non item Cornarius, qui sic conuertit: At crudæ tritæ sinapiliquido exceptæ, & auribus inditæ, sonitus, & pruritus curant: rectè enim dici censet, σὴν νέπτει ὕψω excipiendas esse ficus, nec alio opus esse humore, quasi σὴν νέπτει καὶ ὕψω τινι legendum minimè sit, aut etiam pro voce ὕψω supponenda vox ὑψω, veluti quibusdam visum est. Quod deinde Plinius scripsit, cinis non ex alia arbore acrior, vlcera purgat, & cætera, cinerem hîc lixiuum intelligit, quod Dioscorides κονίαν appellat. Postremo quod omnia lixiuiorum genera adstringendi vim habere Dioscorides dixit, hoc reprehendit Galenus. Omne enim lixiuium eius cineris per quem excolatur, naturam adipiscitur. Quum autem non idem temperamentum omnes cineres habeant, neque etiam lixiuium quod per illos perstillauit, habebit. Ficus tametsi minus prauis succi gignant, Galeno teste, quàm ceteri omnes non modò fugaces, sed etiam autumnales fructus, non tamen id vitium prorsus effugere potuerunt. Ceterum hæc ipsis insunt bona, nempe quod permeabiles sunt, & facîle in totum corpus peruadunt, penetrantque. Nam & abstergendi vi pollent haud obscura, cuius gratia post ipsarum esum nephritici multas arenulas excernunt. Cum porrò autumnales fructus exiguum corpori alimentum præbeant, minimè omnium ficibus id vsu venit. Carnem tamen non compactam, neque firmam generant ceu panis, & suilla caro, sed turgidulam, & subinam, veluti fabæ. Quin ventrem flatibus implent & ipsæ, & non mediocrem huic profecto molestiam inferrent, ni etiam celerem descensum essent adeptæ, cuius beneficio cum celeriter peruadant, flatum quem excitant, non diu manet, atque ob id minùs cæteris fructibus autumnalibus lādere consueuerunt. Ceterum maturæ ficus immaturas non mediocriter antecellunt, quod & in aliis quidem omnibus cernitur fructibus: quamquam non tantum in illis discrimen est. Siquidem perfectè maturæ ficus paulo minus omni prorsus noxa vacant. Idem sequenti capite Vuarum facultates recensens, sic scribit. Ficus & Vuæ quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimūque prauis succi habent, præsertim cum perfectam maturitatem fuerint adeptæ. Quod autem ipsæ nutrant, maximo argumento sunt ij qui vinearum fructum custodiunt: siquidem cum duos menses solis Vuīs ac ficibus, quarum custodia

Embl. 142.
Li. 1. Diof.

Lib. 8. sim.
de Cine.
Li. 2. Alim.

stodij præsumunt, vescantur (nisi fortè panis quidpiam cum illis edant) obesi ac pingues fiunt. At caro quæ ex ipsis gignitur, haud quaquam est firma ac densa, quemadmodum ea quæ ex carnibus fit, sed laxa, ac præhumida. Ob id celeriter etiam, cum vesci iis desierint, contrahitur, ac confidet. Idem etiam de ficibus siccis differens sic scripsit. Caricæ multiplicem quidem habent utilitatem, si quis tamen largius esitauerit, ab eis offendetur: non admodum enim probum sanguinem gignunt: quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi, extenuandique vim habent, qua & ventrem ad excretionem irritant, & renes expurgant. Iecori autem lienique inflammatione obsessis sunt noxiæ, quemadmodum & ficus, non peculiari quadam eximia facultate, sed communi dulcium omnium ciborum, ac potuum. Obstructis autem illis, aut scirrho tentatis, ipsæ ex sese nihil profunt, aut obsunt, sed medicamentis incidentibus, ac extenuantibus, & abstergentibus mixtæ non mediocriter auxiliantur. Itaque nonnulli medicorum in his hiemis ac hepatis affectibus exhibent ipsas longe ante cibum cum Thymo, aut Pipere, aut Zingibere, aut Pulegio, aut Satureia, aut Calamintha, aut Origano, aut Hyssopo. Ad eundem etiam modum si Caricæ cum alio quopiam eorum quæ facultatem habent acrem, aut omnino incidendi, ac extenuandi assumantur, non solum sic affectis, sed sanis quoque utiles erunt. Siquidem iecoris meatus per quos fertur alimentum, apertos esse non ægrorantibus modo, sed benevalentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto Ficus cum sale extenuante, aceto, & Garo præparatas vulgo comedunt, quod id utile esse experientia didicerint. Qui verò cum cibo aliquo incrassante Ficus ac Caricæ edunt, non mediocriter offenduntur. Earumdem temperamenta & vires, idem alibi sic tradit. Ficus aridæ vim habent excalfaciendi ordine primo, etiam completo, aut secundo incipiente. Habent verò etiam partium tenuitatem quandam. Ex istis duobus idoneæ sunt, quæ tumores duros concoquant: statim verò etiam discutiunt. Atque ipsæ per se illitæ eiusmodi vim obtinent. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: ubi verò plus discutere hordeacea. Panis horum in medio est. Porro scire oportet, quæ pinguiore sunt, eas magis posse concoquere: quæ verò gustu acriores, magis tum extergere, tum discutere. Cæterum quod ex iis plurimum in aqua coctis efficitur, simile est meli, non solum consistentia, sed & facultate. Præterea Ficus virides comestæ propter admixtam humiditatem facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen alium utraq; tum humidæ, tum siccæ. Ficus arbor calidæ tenuiumque partium temperaturæ est, ut indicant, tum liquor eius, tum foliorum succus: valenter enim eorum uterque calidus est. Itaque non mordet tantum, aut abstergit vehementer, sed & ulcerat, & ora vasorum reserat, & Myrmecias eiicit: quinetiam purgare potest. Porro Ficus agrestis, quam Erineum Græci, Latini Caprificum vocant, tum liquor, tum succus ad omnia valentior quàm fatiæ. Sed & Cradæ, hoc est rami earum, adeo sunt calido temperamento, tenuiumque partium, ut carnes bubulas duras, si coquendis adiiciantur, teneras, & laxas efficiant. Caricæ duæ aut tres nocte una in aqua vitæ maceratæ, Matthiolus scribit asthmaticos iuuare, qui mane eas deuorauerint. Ficulneo lacte vermiculosæ sanantur aures. Ficulneorum foliorum affricu facile citantur hæmorrhoides. Pani optimè maturantur illitis Caricis decoctis, additis Lilij, aut Iridis, aut Althææ radicibus. Democritus præcoces fieri pollicetur, si oleo & columbino fimo arbor il-

Libr.8.sim.

Ibidem.

linatur: contra serotinas, si primæ Grossi cùm fabæ magnitudinem excesse-
re detrahantur. Ficus, vt parvæ admodum sint, & in vasculis super fenestris
spectentur, ita docuere Mangones. Vere Fici surculum abscindito, paulo
ante germinationem, prominente iam oculo, & manibus contorto cacu-
mine in vase terra pleno ipsum serito, cacumine inuerso: circa Hordei Mi-
liique nonnihil aspergito, terraque obruito, extra eam relicta resecta parte,
fit hac arte, vt ramuli enascantur paruuli, qui circum vas sese fundentes
breui Ficus edunt, pumila perpetuo manente arbore. Ficumarborem vt lau-
rum è cælo fulminibus non ici compertum est.

SYCOMORVS,

(AP. XIX.

Nomina

Lib. 4. Hist.

cap. 2.

Lib. 23. c. 7.

& 13. cap. 7.



ARBOR Græcis συκόμορος, Latinis Sycomorus, & Ficus Ægyptia no-
minatur, & Morus Ægyptia Theoph. & Plinio. Arabibus *Mumeiz*,
Aliumeiz, seu *Giumeizi*, Italis *Sycomoro*, & *Fico d' Egitto*, Gallis *Sycomore*,
Boëmis *Moruse*. Aliqui, teste Dioscoride, συκάμινον, etiam appellât.

Vocatur & fructus ipsius Sycomorum. Sycomorum eam esse arborem quam hîc
depinximus, iudicant peritissimi herbarij, notis eius insignibus à veteribus au-

ctoribus traditis huic prorsus consentienti-
bus. Est enim arbor magna, inquit Diosco-
rides, Fico similis, fródosa, multo lacte abun-
dans, foliis Mori. Pomum ter aut quater an-
no fert, non ramis, vt Ficus, sed caudice ipso,
Caprifico non dissimile, dulcius Grossis, sine
granis interioribus, quod non maturefcit, ni-
si vngue, aut ferro scalpatur. Gignitur & in
Cypro, quod idem scriptor tradit, arbor
genere distans, quæ cum sit Vlmus: folium
tamen habet Sycomori, fructu Pruni magni-
tudine, multò dulciore, supradictis cætera
similis. Theophrastus Morū Ægyptiæ vocat.
Ἐν αἰγύπτῳ ἐστὶν ἓν ἰα δένδρα πλείω (ἴδια δένδρα
ex Plinio,) ἢ τε συκάμινος, καὶ περσέα, & cætera.
Ἔστι δὲ ἡ μὲν συκάμινος παραπλησίως τῇ ἐν
ταῦθα συκαμίνῳ, καὶ καὶ τὸ φύλλον ὁμοιον ἔχει, καὶ τὸ
μέγεθος, καὶ τὴν ὅλην πρόσοψιν. τὸν δὲ καρπὸν ἰδίως φέ-
ρει παρὰ τὰ ἄλλα, καθάπερ ἐλέχθη καὶ ἐν τοῖς ἐξ ἀρ-
χῆς, & καὶ ἀπὸ τῶν βλαστῶν, οὐδ' ἀπὸ τῶν ἀκρεμόνων,
ἀλλ' ἐκ τῆς στελέχους, μέγεθος μὲν ἡλίκον σῦκον, καὶ
τῇ ὁψεί τῇ παραπλήσιον: τὰ χυλὰ δὲ καὶ τῇ γλυκύ-
τησι τοῖς ὀλυνθοῖς, πλεον γλυκύτερον πολὺ, καὶ κενχρεα



μίδας ὅλως σὺν ἔχοντα, πλείθει δὲ πολὺ. Καὶ πέτεται ἐν διωσίαι, ἀν μὴ ἐπικνιδοῖ. ἀλλ' ἔχοντες
ὄνυχας σιδηρὰς ἐπικνίζουσιν. ἂν ἐπικνιδοῖ, τελαρλαῖα πέτεται. τούτων δὲ ἀφαιρεθέντων, πάλιν
ἄλλα φύεται, καὶ ἐκ τῆς αὐτοῦ τῆς φύσεως, μὴ δὲ παραλλάσσοντα, καὶ τοῦθ' ὁμιλῶντες, οἷον πλεονάκεις
φασὶ γίνεσθαι. πολὺ σπον δὲ τὸ δένδρον σφόδρα ἐστὶ, καὶ τὸ ξυλὸν ἀνῆς εἰς πολλὰ χρήσιμον.
ἴδιον δὲ ἔχειν δοκεῖ παρὰ τὰ ἄλλα. μὴ δὲ καὶ τι χλωρόν, sic enim legendū, εὐθὺς καταβαί-
νει εἰς βυθὸν, εἰς βοθρίους καὶ ἐμδάλλασσι, καὶ εἰς τὰς λίμνας ἐν τῷ, καὶ τὰρι χέουσιν. βρεχόμενον δὲ ἐν
τῷ βυθῷ, ξηραίνεται. Καὶ ὅταν τελέως ξηρὸν γένηται, τότε ἀναφέρειται, καὶ ἐπικνιδοῖ, καὶ δο-
κεῖ καλῶς τότε τεταρίχευσθαι γίνεσθαι καὶ κοῦφον, καὶ μανόν, ἢ μὲν οὐκ συκάμινος ἔχει ταύ-

τας τὰς ιδιότητας. ἔοικε ὃ παραπλησία τις ἢ φύσις εἶναι καὶ τῆς ἐν κρήτῃ καλεμένης κυπρίας συκῆς. Καὶ ὅτι ἐκείνη φέρει τὸν καρπὸν ἐκ τοῦ τελέχους, καὶ ἐκ τῶν παχυλάτων ἀκρεμόνων, πλὴν ὅτι βλαστὸν τινα ἀφίησι, μικρὸν, ἀφυλλον, ὥσπερ ῥίζιον, πρὸς ᾧ, vel πρὸς ᾧ ὁ καρπὸς: (non πρὸς ᾧ ὁ καρπὸς, vt in vulgatis legitur) τὸ δὲ τέλεχος μέγα, καὶ παρῶμοιον τῇ λευκῇ, φύλλον δὲ τῇ ψιλλῇ. πεπαίνει δὲ τέτταρας καρπὸς, ὅσαι πρὸς αὐτοῦ καὶ αἱ βλαστήσεις. ὕδενά δὲ πεπαίνει, μὴ ἐπιτμηθέντος τῷ ἔρινθῳ, καὶ ἐκρυέντος τῷ ὀπῷ. ἢ ὃ γλυκύτης καὶ τὰ ἔσθθεν πρὸς εὐμερεῖ τοῖς συκῆς ἐρινοῖς, μέγεθος δὲ ἡλίκον ὅης μήλων. Sic enim legen-

dum ē Plinio: μέγεθος ἡλίκον κοκκυμήλων: Quæ omnia ad verbum transtulit Plinius. Et in Ægypto multa genera quæ non alibi. Ante omnia Ficus, ob id Ægyptia cognominata. Arbor Moro similis folio, magnitudine, aspectu. Pomum fert non ramis, sed caudice ipso. Idque ipsum Ficus est prædulcis, sine granis interioribus, per quam sæcundo prouentu, scalpando tantum ferreis vnguibus: aliter non maturescit. Id cum factum est, quarto die demetitur, alio subnascente: septeno ita numerosa partu, per singulas æstates multo lacte abundat. Subnascitur, etiam si non scalpatur, fœtus quater æstate, priorēque expellit immaturum. Materies proprii generis inter vtilissimas. Cæsa statim stagnis mergitur, hoc est ei siccari: & primo fidit, postea fluitare incipit, certoque fugit eam alienus humor, qui aliam omnem rigat. Cum innatare cæpit, tempestiuæ habet signum. Huic similis quadantenus quæ vocatur Cypria Ficus in Creta. Nam & illa in caudice ipso fert Pomum, & ramis, cum in crassitudinem adoleuere. Sed hæc germina emittit sine vllis foliis radicis (nempe exilis radiculæ,) similia. Caudex arboris similis Populo, folium Vlmo. Fructus quaternos fundit: toties & germinat. Sed grossus eius non maturescit, nisi incisura emissio lacte. Suauitas, & interiora Fici, magnitudo Sorbi. Hæc Plinius. In eo verò quod Dioscorides dixit Sycomori fructum, Sycomorum etiam διὰ τὸ ἄτονον τῆς γένσεως appellari, idest, propter fatuum gustum, siue ob saporis ignauiam, in quo nulla acrimonia est, perspicuum est à Galeno notari, scribente ridiculos esse eos qui Sycomora aiunt nominata, quod τοῖς μωροῖς σύκοις, idest fatuis ficibus similia sint, cum à similitudine quam cum Moro & Ficu habent, nomen eis sit inditum. Quod idem de Sycomoro ait, πολύκομον σφόδρα, idest admodum frondosam esse, dubitandi occasionem multis præbuit, sit ne legendum, vt Theophrastus habet, πολύκονον δὲ τὸ δένδρον σφόδρα ἐστὶ, vt multo liquore ac lacte abundare accipiamus. Ruellius in conuersione sua vtrumque posuit, frondosa, multo lacte abundans, etiam si illud postremum in omnibus exemplaribus desit. Præterea quod Dioscorides scripsit fructum Sycomori non maturescere διὲχα τῷ ἐπικνιασθῆναι ὄνυχι, ἢ σιδηρᾷ, nisi vngue aut ferro scalpatur, hoc Theophrastus, & Plinius vnguibus ferreis fieri aiunt. Causam reddit idem Theophrastus. Morus Ægyptia fructum caudice fert, quia vegeta est, & sæcunda. Cuius rei argumentum illud est, quod sæpius ex eodem loco ferat, fructu priore dempto. Rectè autem non percoquit, nisi scalpatur, perungaturque oleo, propter alimoniam, & influentis succi copiam. Scalptu enim aliquid detrahatur, & oleum vna cum sole calefaciens apertum pomum celeriter coquit. Idem alibi. Morus Ægyptia propter alimenti vbertatem, & humoris copiam fructus concoquere non potest, nisi iis scalptis, & oleo delibutis. Iam verò in hoc etiam à Theophrasto dissidet Dioscorides, cum scribit, γίνεται δὲ καὶ ἐν κύπρῳ εἶδος διὰφορον, ψιλλῇ καὶ ὕδατι, συκαμίνῳ τὰ φύλλα ἔοικε, & cætera. Theophrastus verò, Huic similis quæ vocatur Cypria Ficus in Creta, &c. Deinde: caudex arboris similis Populo, folium Vlmo: at Sorbi magnitudinem Plinius

Lib. 13. c. 7.

Li. 2. Alim.

Lib. 5. caus. cap. 2.

Lib. 1. caus. cap. 21.

Ibidem.

tribuit. Est & apud Theophrastum μέγεθος ἡλίκον κοκκύμηλον, & apud Dioscoridem, fructus pruni magnitudine. Ex tam grauium scriptorum testimoniis perspicuum est, errare eos, qui Sycomorum putant esse arborem, quæ plerumque visitur in cœnobiis, templorum plateis, & Sepulchretis, ex cuius baccis monachi spherulas faciunt, quibus mulierculæ suas numerant preces. Eius historia post hæc fusè tradetur cap. 24. nomine Zizyphi albæ. Sycomorus

Locus.

Tempus.

Li. 1. c. 144.

Vires &

tempera.

Li. 23. ca. 7.

Li. 16. c. 28

Cap. de

Moro.

Li. 2. Alim.

Ægypti peculiaris est arbor, teste Theophrasto. Nascitur etiam plurima in Caria & Rhodo, locisque nonnullis tritici multi non feracibus: ubi prouentu fecundo restibique iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Perpetuò viret, & sæpius æstate fructus fert. Sycomori pomum, auctore Dioscoride, aluo vtile est, sed per quam exilem præbet alimoniam: stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructum ferat eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluit. Spongia aut vellere lacryma excipitur, quæ siccata, & in pastillos coacta fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vulnera conglutinat, discutit collectiones coctioni repugnantes: bibitur etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes stomachi, dolores, & perfrictiones, celerrimè teredinem sentit. Plinius. Mora in Ægypto & Cypro quod ait Plinius sui generis sunt, largo succo abundant summo cortice desquamato, altiore plaga siccantur, mirabili natura. Succus aduersatur venenis serpentium, prodest dysentericis, discutit panos, omnesque collectiones, vulnera conglutinat, capitis dolores sedat, item aurium: spleneticis bibitur. Illinitur & contra perfrictiones. Celerrime teredinem sentit. Hæc eadem Plinius alio in loco non de Sycomoro, sed de Moro nostrate perperam scripsit, ut iam annotauimus. Galenus plantam Sycomori vidisse se ait in Alexandria vnà cum fructu, parua ficui albæ adsimili. Is fructus, inquit, nullam habet acrimoniam, exigua tamen dulcedinis est particeps, est que facultate, ut Mora, humidior quodammodo ac frigidior. Quin potius in medio Mororum ac Ficuum iure quis ipsum collocarit, indeque nomen ipsi arbitror esse positum, ridiculi enim sunt, qui fructum hunc ob id aiunt Sycomora fuisse nominatum, quod fatuis Ficubus sit adsimilis. Ipsius autem generatio ab aliis arborum fructibus quodammodo est diuersa: non enim ex furculis ac germinibus, sed ex ipsis ramis magnis, ac caudice nascitur. Hoc enim loco ad finem ἀκρεμόνων vox pro πρέμυων falsò legitur.

OLEA SATIVA,

CAP. XX.

Nomina



OLEA satiua ἐλαια ἡμερος Græcis est, Arabicè Zaiton, seu Caiton, Italicè *Oliuo domestico*, Germanicè *Oelbaum*, & *Oliuebaum*: Hispanicè *Oliuo*, & *Azeytuno*, Gallicè *Oliuier*, Belg. *Oliueboom*: Anglicè *Oliuetre*, De syluestri Olea iam diximus, nunc de satiua. Olea satiua arbor est magna, procera, ramosa: foliis longis, ferè saligneis, sed angustioribus, & minoribus, in acutum desinentibus, crassis, pinguibus, breui admodum pediculo subnixis, supernè virentibus, infernè albicantibus, nunquam decidentibus, sapore amaro, & acriusculo: floribus albis, racematim congestis, ex quibus baccae prodeunt, primùm virides, deinde pallecentes, tum purpureæ, postremò saturatæ nigredinis. Arboris nomine ἐλαιαι vocantur, Latine Oliuæ, Gallicè *Oliues*, cum incipiunt nigrescere, nostri vocant Drupas, inquit Plinius. Græci verò Drypetas. Idem alibi. Druppa vocatur priusquam cibo matura sit, iam tamen colorem mutans. Ligni materies pulchra, solida, venosa, crispa, quæ ardet viridis perinde ac sicca. Genera Oliuarum tria recenset Virgilius, Orchites, Rhadios, & Pausias.

In Dume.

cap. 12.

Forma.

Lib. 15. c. 1.

Li. 12. c. 27.

Genera.


*Nec pingues unam in faciem vertuntur Oliuæ,
Orchites, & Radij, & amara Pausia bacca.*

Georg. 2.

Præterea, non desiderare rastros, aut falcem, vllâmue curam.

*Non vlla est Oleis cultura, neque illæ
Procuruam expectant falcem, rastrosque tenaces,
Cum semel haerunt aruis, aurâsque tulerunt.*

OLEA SATIVA.



Nec plura genera hodie agnoscit Hetruria, inquit Matthiolus. Primum genus est earum, quas minores quidem Oleæ proferunt, sed spectatæ formæ, & Bononiensibus magnitudine non inferiores. His muria conditis in cibis vtuntur tantum: fundendo enim oleo minus aptæ sunt, quod multo plus amurcæ quâ olei contineant. Proximæ, tum calore, tum magnitudine præstantes, superioribus tamen minores ad conficiendum Oleum optimæ, quod non modò flauum, dulce, pellucidum, ac ceteris præstantius, sed etiam copiosum ex iis exprimitur. Has ferunt valde procerae, & prægrandes Iuglandium Nucum modo arbores, quas Oliuastræ rura Senensia vocant. Tertij generis eæ sunt, quæ passim nascuntur, & omnium sunt maximè vulgares. Hodie omnium laudatissimæ, & crassissimæ Muria conditæ ex Hispania afferuntur. Plinius multò plura recenset genera, Licinianam, siue Liciniam (hæc optimum fundit Oleum, maximè agri Venafrani parte. Est autè Venafrum

In li. 1. Dioscor. c. 118.

Lib. 15. ca. 3.

Minturnis, & Fregellis, & Liri fluuiio vicinum, in Campaniæ litore situm: ὀθειν, inquit Strabo, κάλλιτον ἔλαιον) Cominiam, Contiam, Sergiam. Sunt & purpureæ, & Superbæ, Regiæ, quæ & Maiorinæ, & Phanliæ, Picenæ, Sidicinæ. Sunt & prædulces per se tantum siccata, vuisq; passis dulciores, admodum raræ in Africa, & circa Emeritam Lusitaniæ. Non alia maior in Betica arbor quàm Olea, vt scribit idè Plinius. In Africa verò (fides penes auctores erit) Miliarias vocatas multas narrant à pondere olei, quòd ferant annuo prouentu. Olearū sicut Vitium, inquit Columella, plura genera esse arbitror, sed in meam notitiam decem modo peruenerūt. Pausia, Algiana, Liciniana, Sergia, Neuia, Culminia, Orchis, Regia, Circites, Murtea: ex quibus bacca iucundissima est Pausiæ, speciosissima Regiæ, quæ potius escæ, quàm oleo est idonea. Pausiæ tamen oleum saporis egregij dum viride est, vetustate corrumpitur. Orchis quoque & Radius melius ad escam quàm in liquorem stringitur. Oleum optimū Licinia dat, plurimum Sergia: omnisque Olea maior fere ad escam, minor oleo est aptior. Hactenus Columella. Orchites & Radij à figura nomen habent. Orchites quidem à testiculis quasi testiculares Oliuæ. Radij à longitudine radiorum metaphoricè dicuntur. Pausiæ quorundam sententia à sapore appellantur, quod fiat πᾶσι: sunt enim bacca amara, ideo eas comedere cessant: Aliorum sententia, inter quos est Seruius, à pauendo dicuntur, id est tontendo, quod nisi tundantur, oleum non reddunt. Priori etymo repugnat Columella, qui Pausiæ iucundissimam esse baccam, & eius oleum egregij esse saporis dum viride est, contra Virgilium scribit: posterius omnibus oliuis competit. Nulla Olea ex tot generibus,

Lib. 17. c. 12.

Lib. 5. ca. 8.

Ibidem.

- Locus.** auctore eodem Columella, aut per frigidum, aut gelidum statum cæli patitur. Ibidem. Itaque æstuosis locis Septentrionali colle, frigidis Meridiano gaudet. Sed neq; depressis locis gaudet, magisq; mediocres cliuos amat. In iis enim excellens solis ardor ventorum perflatu refrigeratur, quare optimum exhibent oleum. Plani verò & campestribus locis Oleæ minus impetu ventorum agitatæ, atque torrentis æstu solis ambustæ crassius oleum mittunt. Amat, inquit Matthiol. apricos tractus, & colles, calidâsque regiones, nec in frigidis provenit, quare oleis Hispania, Italia, Gallia Narbonensis abundant. Oleam Theophrastus è celeberrimis Græcorum auctoribus, inquit Plinius, Urbis Romæ anno circiter quadringentesimo quadagesimo, negavit nisi intra XL. millia passuum à mari nasci. Idem alibi: Tunc Oleam non putabant gigni nisi intra ccc. stadia à mari. Hanc arborem plerique existimant, inquit Columella, ultra milliarium sexagesimum à mari, aut non vivere, aut non esse feracem. Tradit idem, Quercu excisa radices noxias Oliueto relinqui, quarum virus enecat Oleam: Lib. 24. c. 1. Quercus & Olea tam pertinaci odio dissident, auctore Plinio, vt altera in alterius scrobe depactæ moriantur. Idē alibi: Olea vbi Quercus effosa sit malè ponitur, quoniam vermes qui Raucae vocantur (Erucae, apud Theophrastum, κάρπαι pro κάμπαι,) in radice Quercus nascuntur, & transeunt. Florent omnes
- Tempus.** Oleæ mense Iulio. Fructus mense Nouembri & Decembri decerpuntur. Prima ergo, sic enim legendum, ab Autumni colligitur initio, operæ pretio, non natura, Pausia, (quoniam tum cōditur,) cui plurimum carnis: mox Orchites, cui olei: post Radius. Has enim ocysimè occupat æstas, quia sunt teneberrimæ, & amurca cogit decidere, sic enim legendum. Differuntur verò etiam in Martium mensem callosæ, contra humorem pugnaces, ob idque minimæ, Licinia, Cominia, Contia, Sergia, quam Sabini Regiam vocant, non ante Fauonij afflatum nigrescentes, hoc est vsque ad v. Idus Februarias. Omnino in vita error est publicus, tumore Oliuæ crescere oleum existimantium, præsertim cum magnitudine copiam olei non constare, indicio sint quæ Regiæ vocantur, ab aliis Maiorinæ, ab aliis Phauliæ, grandissimæ alioqui, minimo succo. Est & in Ægypto carnosissimis olei exiguum. Decapoli verò Syriæ perquam parvæ, nec cappari maiores carne, oleo tamen commendantur. Quam ob causam Italicis transmarinæ præferuntur in cibis, cum oleo vincantur. Fiunt & præcoces feruenti aqua perfusæ, quamlibet immaturæ. Oliuæ constant nucleo, oleo, carne, amurca. Sanies hæc est eius amara. Fit ex aquis, ideo siccitatibus minima, riguis copiosa. Oliua
- Vires & Temper.** flaua & recens stomacho utilior est, ventri difficilis: nigra autem & matura corruptioni oportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascentia vlcera sistit, & carbunculos emarginat. Diof. lib. 1. cap. 118. Oliuæ sale condiuntur, vnde Colymbades appellatæ, quasi natatrices, eo quod Lib. 15. ca. 3. Muria veluti innatant. A Muria verò eadem Halmades dictæ sunt. Plinius. Sale illæ priuatim condiuntur, inquit Plinius, & vt reliquæ Muria, sapæue (perperâ in publicis libris legitur, amurca sapæue.) Nec non aliquæ oleo suo, sine accersita commendatione, Muria innatant Colymbades. Franguntur eadem, herbarumque viridum sapore condiuntur. Quia verò etiam incisæ in Muriâ mittebantur, succum ipsarum ex Muria collectum vtendum præscribit his verbis Dioscorides. Colymbades tritæ, & ambustæ, illitæ pustulas gigni prohibent, sordida vlcera purgant, succus ipsarum ex Muria gingiuas cōtrahit, & motus dentium firmat. Nunc de Oliuæ partibus dicendum, ac primùm de Oleo. Suus quidem Oliuæ succus oleum est, ex Oliuis primum in pauimēto relictis, quoad rugosæ factæ fuerint, deinde molæ suppositis, postremo torculari expressis, vel immaturis, quod Omphacinum ob id, & Omotribes, id est acerbum & crudum est

est appellatum, idemque refrigerans & adstringens: vel maturis, quod oleum commune dicitur: ac vtrūque vel insulsum, vel falsum, & illotum, vel lotum, idque ad salem tollendum, vel vt fiat candidius, aut morsus expers. Vtrūque rursus, vel recens est, vel antiquatum, & ex hoc, vel illo agro, quæ olei communis differentiæ diligenter sunt obseruandæ, vt medicamentorum ex iis iustior fiat compositio. Nam facultatibus secundum has differentias multum variant, ac composita quibus miscentur plurimum immutant. Oleum Galeno ex oliuis confectum, quod sane verissimo & maxime proprio nomine oleum appellatur, humectat, & modice calfacit, cuiusmodi est dulcissimum, factū potissimū ex oliuis, quas Græci *δρυπετέϊς* vocant, nos Drupas. Omotribes & Omphacinū, quantum in se habet adstrictionis, tantū etiā illi inest frigiditatis. Porro oleum vetus, quod quidē ex dulci inueterato efficitur, calidius est, & potentioribus ad discutiendū viribus. Quod verò crudum, inueterascit, id dum adstrictionis reliquum quippiam seruat, miste permanet facultatis: vbi vero illam prorsus abiecerit, reliquo fit simile. Quinetiam quicumque in preparando ramos iniiciunt, ij & ipsi Omphacino simile oleum efficiunt. Ceterum rogandum non est quomodo sit preparatum, sed gustādum potius, ac si præ se ferat adstrictionis quippiam, catenus etiam frigidum est existimandum, ceu illud quod ex Hispania defertur. Quod si nequaquam gustantibus adstringere appareat, sed perfectè videatur dulce, id modicè esse calidum putandum. Præterea si tenue quoque cernatur (tale est quod purum est, quodque intuenti translucidum videatur) modicum eius latissimè percutem extensum sibi maneat continuum, celeriterque à cute combibatur, id vtique pro optimo ducendum, ac virtute quam maximè pollere, quale est Sabinum. Porro oleum lotum minimè omnium mordacitatem continet. Oleum Omphacinum ad multos vsus rectè valentibus accommodatissimum Dioscoridi. Præstat recens, odoratū) quod non mordeat: stomacho vtile est, quod adstringat gingiuas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore: sudores cohibet. Oleum cōmune quo vetustius ac pinguius, eo ad medicamenta magis est idoneū. Omne oleum calfacit, emollit ventrem (alij legunt *μαλακτικὸν τῆς σάρκος*, id est mollit carnes) à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq; promptius ad munera obeunda reddit, aluum emollit vlcerantium venenorum vires permistum hebetat, contra venena datur assidue potum, redditūque vomitionibus, soluit aluū hemina mensura cum pari ptisanæ succo, aut aqua potum: ad tormina calidum, simul decocta ruta, tribus sextariis in potu datur: ventris animalia pellit: idem maximè ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit, & vehementius discutit, oculorū claritati subditum confert. Si vetusti non sit copia, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, & vetustatē repræsentet. Hæc sic Græcè cum legantur, *εἰ δὲ μὴ παρὲν παλαιὸν ἔλαιον οὕτω, κατακέραισας εἰς ἀγρεῖον τοῦ παρόντος τὸ κρεῖσσον, ἔψε, ἕως ἔχῃ μέλιτος πᾶχος, καὶ χρῶ. Τὴν δὲ αὐτὴν τῷ προσημνύῳ εἰσφέρει*) *δύναμιν*, ita videntur Latine reddenda. Si verò adeo antiquū oleum non adsit, ex eo quod suppetit, præstantissimum in vas coniicito, coquitóque ad mellis crassitudinem, eoq; vttere: nam eandem cum supradicto obtinet facultatē. Scribit & idē auctor foliorum fatiux Oleæ vim adstringentem esse, sed aliquāto inferiorē quàm in Oleastro, ideóque ocularibus medicamentis ob suam mitiorē vim magis conuenire. Sudorem ligno viridi accēso manantē, illitu sanare lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginū semē (Græca τὸν καρπὸν habent, id est fructū ipsarū Olearū) illitū mederi furfuribus, & vlceribus quæ vorāt & depascunt: quod autem intra nucleū est, ex adipe & farina scabros vngues excutere. Hippocrates nuclei quoque huius vsu ad ocularia medicamenta adhibere videtur, neque de alio nucleo intelli-

Lib. 6. simpl

Lib. I. c. 28.

Lib. I. c. 18.

Li.2. Epid.
Sect.5.

gere, cum scribit: ὀφθαλμῶν. σποδὶς δωδέκατον, κρόκος πέμπτον, πυρῆνος ἐν, ψιμυθὶς ἐν, σμύρνης ἐν τὸ ὕδωρ, κατὰ τῆς κεφαλῆς καταχεῖν, καὶ διδόναι σκόρδα σὺν μάσῃ. Quæ sic interpretatur Cornarius. Ad oculos Spodij partem duodecimam, Croci quintam, Nuclei Oliuæ vnam, Cerussæ vnam, Myrrhæ vnam. Aquam frigidam super caput fundito, & Allia cum Maxa edenda dato. Quidam tamen Punici Mali τὸν πυρῆνα, id est, nucleū intelligi non absurdè posse arbitrantur. De Oliua, ipsius

Lib.1. c.20.

succo, & nucleo dictum est, nunc de amurca. Hæc, ut affirmat Dioscorides, decocta in cupreo vase ad mellis crassitudinem adstringit, cæteros præbens Lycij effectus. Insuper dentium dolori, & vulneribus cū aceto, vino, aut mulso commodè illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus obstruentia inductu suo. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si verò cū Omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumetorum scabiem cū decocto Lupini, & Chamæleone illitu sanat. Cruda, & recente Amurca podagras, articulariosque dolores foueri vtilissimū: peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat. Eundem Amurcæ in medicina vsum Plinius similiter fere tradidit, nisi quod vbi Græca exemplaria quæ habent ἐκβάλλει δὲ καὶ τὰς ἐφθαρμύδας ὀδόντας σὺν ὀμφακίνῳ, & cætera, secutus Ruellius vertit, si verò cū Omphacino recoquatur, & cætera, Plinius legit, si verò cū Omphacio decoquatur ad mellis crassitudinem casuros dentes extrahit, quam Plinij lectionē magis probans

Lib.23. ca.3.

Cornarius, locum Dioscoridis sic interpretatus est. Eiicit etiam corruptas dentes cum Omphacio ad mellis spissitudinē cocta, & oblita. Nam Omphacinum gingiuas constringit, & dentes corroborat, ut modò diximus, non eiicit. Sed & illum ipsum Plinij locum deprauatū ex manuscripto Codice sic integritati restituit. Si vero decoquatur ad mellis crassitudinem, causarios dentes extrahit, non casuros, ut habent vulgata exemplaria: casuri enim extractione nihil opus habent, inquit Cornarius. Causarij verò dentes sunt ex causa aliqua affecti, & ut

Embl. 113.
lib.1. Diosc.

Dioscorides ait, ἐφθαρμύδοι, id est corrupti. Eadē voce vsus est Plinius, vbi veratrū dari vetat causariis, vel latere, vel faucibus, id est iis qui locis istis male affecti sunt. Super omnia celebrauit Amurcam laudibus Cato, quas apud eum, & Plinium legere potes. Illud tantum dicam eam Apothecarum, & Officinarum fabricis, in quibus lanei, sericeique panni reconduntur, per vtilem esse: si enim ex ea calci permista parietes incrustentur, item laquearia, & pauimenta, non modò parietes aliunde contractum humorem non resudabunt, neque situm contrahent, sed nec blattas, nec teredines, nec araneas, nec alia noxia animalia gignēt.

Lib.25. ca.5.

Super omnia celebrauit Amurcam laudibus Cato, quas apud eum, & Plinium legere potes. Illud tantum dicam eam Apothecarum, & Officinarum fabricis, in quibus lanei, sericeique panni reconduntur, per vtilem esse: si enim ex ea calci permista parietes incrustentur, item laquearia, & pauimenta, non modò parietes aliunde contractum humorem non resudabunt, neque situm contrahent, sed nec blattas, nec teredines, nec araneas, nec alia noxia animalia gignēt.

Lib.15. ca.8.

Super omnia celebrauit Amurcam laudibus Cato, quas apud eum, & Plinium legere potes. Illud tantum dicam eam Apothecarum, & Officinarum fabricis, in quibus lanei, sericeique panni reconduntur, per vtilem esse: si enim ex ea calci permista parietes incrustentur, item laquearia, & pauimenta, non modò parietes aliunde contractum humorem non resudabunt, neque situm contrahent, sed nec blattas, nec teredines, nec araneas, nec alia noxia animalia gignēt.

LOTUS ARBOR, CAP. XXI.

Nomina



ΟΤΙ nomen multis stirpibus commune est, sed de Loto arbore hic agimus, quæ ut λωτὸς δένδρον Græcis, ita Latinis Lotus arbor dicitur, Arabibus *Sadar*, *Sedar*, siue *Alfadar*, Italis *Lotò albero*, In Tridentino & Goritienſi agro *Bagolaro*, in Veronenſi *Perlaro*, Hispanis *Almez*, Gallis *Micocoulier*, qui & fructum *Micocoules* appellant, nomine proculdubio ex Loto deflexo, quasi μικρὸν λωτὸς καρπὸν. Loti arboris genera tria apud auctores reperiuntur. Est enim Lotus Celtis à Plinio appellata, in Africa, & Lotophagia insula frequens, cuius historiam ille ex Theophrasto literis mandauit: eaq; duplex: altera nucleum habens, altera sine nucleo interiore. Secunda Lotus eiusdem Theophrasti, à Lotophagorum Loto differt. Tertia, Lotos etiam à Plinio dicta (etsi improprie) à fructus suauitate superioribus simili, & Faba Græca, quæ & διόστυρος est Theophrasti. Primi generis Lotus Dioscoridis, siue Celtis, ea est, quam primam hic depinximus, Gallorum *Micocoulier*, Italarū *Bagolaro*, Matthi

Genera.

Lib.13. c.17.
Lib.4. Hist.
cap.4.

Lotus eiusdem Theophrasti, à Lotophagorum Loto differt. Tertia, Lotos etiam à Plinio dicta (etsi improprie) à fructus suauitate superioribus simili, & Faba Græca, quæ & διόστυρος est Theophrasti. Primi generis Lotus Dioscoridis, siue Celtis, ea est, quam primam hic depinximus, Gallorum *Micocoulier*, Italarū *Bagolaro*, Matthi

Lib.3. Hist.
cap.13.

Matthioli, Dodonæi, Dalechampij, aliorumque doctissimorum herbariorum sententia. Loti apud Theophrastum historia est eiusmodi: ἔστι δὲ τῶ λωλοῦ τὸ μὲν ἴδιον γένος, ὁ μὲν γέθες, ἡλικὸν ἄπιος, ἡ μικρὸν ἔλαττον. φύλλον δὲ ἐντομας ἔχον, καὶ περὶ ὧδες. τὸ μὲν ξύλον μέλαν. γένη δὲ αὐτοῦ πλείω, διαφοράς ἔχοντα τοῖς καρποῖς. ὁ δὲ καρπὸς ἡλικὸς κύαμος. πεπαίνε) δὲ ὥστερ' οἱ βότρυες, μεταβάλλων τὰς χροιάς. φύεται δὲ καθάπερ τὰ μύρτα, παράλληλα. πυκνὸς ἔστι τῶν βλαστῶν. ἐσθιόμηνος δὲ ἐν τοῖς λωτοφάγοις καλαμμοῖς, γλυκὺς, ἡδύς, καὶ ἀσινής, καὶ ἔτι πρὸς τὴν κοιλίαν ἀγαθὸν. ἡδίων δὲ ὁ ἀπυρηνος (sic enim ex Plinio legendum, non ut in vulgatis exemplaribus scriptum reperitur, ἡδίων δὲ ὁ πύρηνος) ἔστι καὶ τοῖς τὸν γένος. ποῖσι δὲ καὶ οἶνον ἐξ αὐτοῦ. πολὺ δὲ τὸ δένδρον, καὶ πολύκαρπον. τὸ αὖν ὠφέλως τραϊόπεδον, ἡνίκα ἐβάδιζεν εἰς καρχηδόνα, καὶ τῷ φασι πλείους ἡμέρας ἀπολεπόντων τῶν ἐπιηδεῖων κεχρησθῆ. ἔστι μὲν οὖν ἐν τῇ νήσῳ τῇ λωλοφάγῳ, φαριδι καλαμμοῦ πολὺς. ἀντὶ δὲ ἀπόκη) καὶ ἀπέχε) μικρὸν. ἔμην ἐν ταῦθα μόνον, ἀλλὰ πολλῶν πλείων ἐν τῇ ἡπείρῳ: πλείονος καὶ ὅλως ἐν τῇ λιβύῃ, καθάπερ εἴρηται τῷ το, καὶ ὁ वालिरोस ἔστιν. Id est, Est autem Loti proprium genus, procerum, magnitudine Piri, aut

LOTVS CELTIS

Arbor.



paulo minus: folio inciso, Illicis specie (Cornarius non περὶ ὧδες, sed πικρῶδες, id est, serrato legendum suspicatur) ligno nigro. Genera eius plura, fructibus distincta. Fructui magnitudo Fabæ, qui velut vuarum botri maturescit, colores mutans. Nascitur alternatim, exaduerso, veluti Myrtorum bacca, super germinibus spissus. In cibo est Lotophagis dictis, dulcis, iucundus, & innoxius, atque etiam aluo ciendæ utilis. Suauior autem qui nucleo caret: ex quo etiam vinum conficiunt. Copiosa illic est hæc arbor, multumque fructifera. Quare Ophelli exercitum cum Carthaginem proficisceretur, in com meatu penuria, eo fructu multos dies victitasse ferunt. Est igitur in Insula Lotophagite, quam Pharidem vocant, (ea nunc Gerbi dicitur,) Lotus frequens. Ea verò à continente parum dissita est, dissinctaque insula. Cæterum non illic tantum, sed etiam in continente multo copiosior prouenit. Nam in Africa, quod diximus, Loti, ut & Paliuri, maxima copia est. Hæc dum transcribit Plinius, quedam etiam de suo adiecit. Eadem Africa qua vergit ad

Embl. 131.
li. 1. Diosc.

Supra ca. 3.

Lib. 13. c. 17.

nos, insignem arborem Loton gignit, quam vocant Celtin, & ipsam Italiæ familiarem, sed terra mutatam. Præcipua est circa Syrtes (vulgo hodie Les Baxes, ou Secagnes de Barbarie,) atque Nasanconas. Magnitudo quæ Piro: quamquam Nepos Cornelius breuem tradat. Incisuræ folio crebriores: alioquin Illicis viderentur. Differentiæ plures, eaque maximè fructibus fiunt. Magnitudo huic Fabæ, color croci, sed ante maturitatem alius, atque alius, sicut in vuis. Nascitur densus in ramis, Myrti modo, non ut in Italia, Cerasi: tam dulci ibi cibo, ut nomen etiam genti terræque dederit, nimis hospitali aduenarum obliuione patriæ. Ferunt ventris non sentire morbos, qui eum mandant. Melior sine interiore nucleo, qui in altero genere osseus videtur. Vinum quoque exprimitur illo, simile mulso, quod ultra denos dies durare negat idem Nepos: baccasque contusas cum alica ad cibos doliis condi. Quin & exercitus pastos eo accepimus, vltro

ultro citróque commeantes per Africam. Ligno color niger. Ad tibiæ cantus expetitur. E radice cultellis capulos, breuésque alios vsus excogitant. Hæc ibi natura arboris. In his Plinius vinum ex Loto exosse expressum denos dies durare negat, Theophrastus ex quo totam historiam exscripsit, id omittit, sed vinum ex Loto secundi generis confectum post biduum, triduúque corrumpi

Lib. 14. tradidit. Polybio verò apud Athenæum Plinius assentitur, ait enim Polybius ex Loto sua vinum simile esse mulso, nec ultra denos dies perdurare. Plinius eiusdem Loti lignum ad tibiæ cantus expeti, è radice cultellis capullos, breuésque alios vsus excogitari scripsit, quæ Theophrastus de ligno & radice Loti secunda prodidit, vt dicetur. Eandem Loton Plinius arborem Syrticâ rectè appellat,

Lib. 24. c. 2. sed mox velut immemor eius historiæ à seipso descriptæ, Fabam Græcam vocat,

Lib. 13. c. 17. eiúsque vires eas tribuit, quas Loto suæ Dioscorides, qui Loton arborem esse tradit,

Li. 1. Diosc. vastæ magnitudinis, bacca Pipere maiore, dulci, cibus grata, stomacho facili. cap. 134. Hæc Loto nostræ bellè conuenire facilè is rectè iudicabit, qui eam diligenter

Forma contemplatus fuerit. Est enim procera, magnâque arbor, Piro quidem sæpe ma-

Loti 1. gnitudine par, nōnunquam etiam procerior, caudice crassissimo, cortice leui,

colore in cæruleum nigrescente, ramis vastis, latè protensis: cui folia lata, aspera,

crenata: fructus rotundi, Pipere maiores, ex longis petiolis penduli, primum vi-

rides, deinde flauī, postremò nigri, grati saporis. Apud Lotophagos fructus Lo-

Li. 9. Odyf. ti si tanta fuit dulcedo, vt eo gustato socij Vlyssis, narrante Homero, ad naues

redire noluerint, nisi verberibus adaçti, atque inde orto prouerbio Loton gu-

stasse dicantur ij, qui delitiis quibusdam deliniti, diutius in iis herent, neque

ab iis ad solita studia reuocari possunt, si, inquam, ob tantam fructus suauitatem,

quæ in nostra Loto desideratur, neget quis nos veram Loton hîc representasse,

meminerit Plinium dixisse, in Africa insignem arborem Loton gigni, & ipsam

Italiae familiarem, sed terra mutatam, quod mutato solo, cæloque à grata illa fru-

ctuū dulcedine degenerauerit. Lotus hæc nostra in multis etiam Galliae Nar-

Locus. bonensis locis nascitur, sed præcipuè in agro Monspelienfi, tam vasta & pro-

cera, vt alias quasuis arbores illic magnitudine superet, vel saltè æquet. Fructus

Tempus. eius Septembri mense sunt maturi: quo tempore folia decidere incipiunt, vère

vna cum floribus renascentia. Secundū Loti speciem Theophrastus scribit esse.

Ibidem. Δένδρον γαμνῶδες, καὶ πολὺ κλαδόν, τῷ στελέχει δὲ ὕψαθες. Τὸν δὲ καρπὸν μετὰ τὸ κάρυον

ἔχον, τὰ δὲ ἐκτὸς ἑσάρκῳδες, ἀλλὰ δερματοδέρσον. ἐσθιόμενον δὲ ἔχει ἕτω γλυκὺ, ὥς

ὄσμον, καὶ τὸν οἶνον ὃν ἐξ αὐτοῦ ποιεῖσιν, ἔστι μύρην, ἀλλὰ ἢ διῡο, ἢ τρεῖς ἡμέρας, εἴτ' ὀξυφν.

ἢ διῡ μὲν οὐκ τὸν καρπὸν ἐν τοῖς λωτοφάγοις, ξύλον δὲ κάλλιστον τὸ ἐν κυρηναίᾳ. θερμολέραν

δὲ εἶναι τὴν χώραν τῶν λωτοφάγων. τὸ δὲ ξύλον τὴν ῥίζαν εἶναι μελανιέραν μὲν πολλὴν, πύκνην

δὲ ἥτιον, καὶ εἰς ἐλάτῳ χρησίμην: εἰς γὰρ τὰ ἐγγχεῖδια, καὶ τὰ ἐπικολλήματα χρῆται. τῷ ξύ-

λῳ δὲ εἰς τετὺς αὐλὰς (non vt in excusis legitur, αὐτὺς) καὶ εἰς ἄλλα πλείω. Id est, Lo-

tus secunda, arbor est fruticosa, ramosa, caudice firmo, semine incluso nucleo,

extrinsecus non carnosio operimento, sed veluti cute cōtectō, in cibo non tam

dulci, quā ori grato, & suauī, ex quo vinum fit non perdurans, sed duos trēsue

dies tantum, dein acescens. Fructus apud Lotophagos iucundior est: materies

optima in Cyrenæa regione, feruidiore Lotophagorum tractu. Radix arboris,

multo ligno nigrior, minus densa, & ad pauca commoda, nimirum ad pugio-

nes, & ad glutinandas affulas, ligno ad tibias, & ad alia plerâque vtili. Hanc se-

cundam Loton Theophrasti eam esse iudicauit Dalechampius, cuius ramulus

hic depictus exhibetur. Nonnulli doçti Herbarij Laurocerasum, à foliis Lauro,

& nucleis Ceraso similibus nominant. In hortis Principis Doriæ Genuæ luxu-

Forma riat, aduecta ex Africa, fruticosa, ramosa, caudice firmo: semine nucleo abdi-

Loti 2. to, qui valde tener est: pulpa non carnosâ extrinsecus, vt in Amygdala, sed

potius



potius cutis instar molli, vt in Ceraso: fructu oblongo, è cæruleo rubescente, minùs dulci quam superioris, sed gratiore & suauiore gustu. Hæc Lotus Plinio, & Matthiolo incognita fuit. Sed quænam sit Lotus illa, quam apud Athenæum memorat Polybius, inter Herbarios controuersia est. Dalechampius primæ Loti Theophrasti secundam speciem esse existimat, cuius fructus nucleo caret, aut quam minimum complectitur, vt fere nullus esse videri queat. Demōstrat id descriptio. Arbor est, inquit, haud procera, aspera, non spinosa (legendum enim *ὅτι ἀκανθώδης*) foliis virentibus, ilici similibus (ex Theophrasto enim legendum *παρὰ πλείσιον τῇ πείνῳ*, non *ράμνῳ*) paulo spissioribus, & latioribus: fructu per initia colore & magnitudine Myrti baccis candidis simili, cum iam perfectæ sunt. Augescens colore phœniceus est, rotundus, Oliuæ magnitudine (Theophrastus Fabæ magnitudine) nucleo perquam exiguo. Maturus colligitur, & seruis alendis cum Alica in vasis stipatis reconditur. Ingenuis autem ac liberis domesticis exemptis nucleis asseruant, & in cibo dant. Gustus est Ficuum, & Palmularum, sed odor præstantior. Ex eo in aqua macerato & trito vinum fit, grati iucundique saporis, optimo

Lib. 14.

DIOSPYROS, SIVE

*Faba Græca, Latifolia, Pseudo
 Lotus Matthioli.*



DIOSPYROS, SIVE

*Faba Græca, angustifolia,
 seu Lotus Africana.*



Li. 16. ca. 30.

Forma
Loti 3.Lib. 3. Hist.
cap. 13.Lib. 1. Diosc.
cap. 134.

Lib. 24. c. 2.

Lib. 1. ca. 95.

Lib. 3. Hist.
cap. 13.Lib. 1. Diosc.
cap. 134.

Vires.

Lib. 1. c. 134.

Lib. 24. c. 2.

mulso simile, quod merum bibunt. Verum non longius quàm decem dies durat. Quamobrem ad vsum quotidianum paulatim conficitur: Acetum quoque ex eo conficitur. Hactenus Polybius. Aspera Loti folia sunt tangenti, aculeata esse nullus vnquam scripsit. Folium Ilici proximum esse, fructus colorem mutari dum maturescit, Myrtorum modo nasci, ex eo vinum exprimi, dixit Theophrastus, quæ in Loto supradicta comperiuntur: cætera omnia congruunt. Tertia Loti species hîc exhibetur, quæ etsi Lotus non esset, ramen in Loti generibus numerata est, eoque nomine celebrata, à Plinio Lotus, & Faba Græca dicta, quam Romæ, inquit, à suauitate fructus syluestris quidem, sed Cerasorum pene natura, Loton appellant. In Italia frequens est arbor, & ab Hetruscis hodie vocatur *Uua d' India*, præsertim Florentiæ, vnde aduehendam curauit Dalechampsius. In quibusdam etiam hortis Lugduni visitur, breui caudice, ramis plurimis, longissimis, validissimis, vt totidem arbores dicere liceat, petulanter vmbra latissima ex patiantibus, in vicinas domos sæpe transilientibus opacitate breuissima: foliis Corno ferè similibus, longioribus, angustioribus, pallidioribus, venosis: flore in medio purpurascens, quatuor foliolis distincto, herbaceis, ramis sic incumbens, vt petiolo carere videatur: fructu Cerasorum figura, antequam maturuerit cædido, cum maturuit, rufo, prominente è medio tenui quodam velut aculeo, ramis & furculis sine pediculo adhærente, gustu dulci, palato non insuauis. Hanc esse quam dixi Fabam Græcam Plinij notæ omnes demonstrant. Nam, vt ille scribit, cacumine ramosa est, caudice breui, ramis pro arboris magnitudine prælongis, validis, multis, & cum hyeme folia deciderint, ob furculorum paucitatem solem non auferentibus: fructu Cerasis non absimili, nucleo duro, qui in Ceraso tener est, ac fragilis, quod Theophrastus adnotauit, cortice diluto, rubore iucundo, blandissimè oculos excipiente, & quo verisimile est pelles tingi posse, radice lanas, vt mirum sit Matthiolum suæ Loti cortici tristissimo tribuisse, quod Plinius de huius corticeliteris prodiderat, cuius tinctura colorem rufum fieri ipsemet alibi scripsit. Ramenta ligni decocta in vino profunt dysentericis, & cætera: deinde, Rufant & capillum, defluentemque cohibent. Sic enim locum hunc in nostris exemplaribus mutilum ope melioris Codicis integrum & restitutum citauit Ruellius. Sunt qui nec vana quidem ducti coniectura hanc arborem Theophrasti *δουράρον* esse censent, fructu Ceraso simili, duro intus & solido nucleo, non, vt in Ceraso fragili: maxime cum Plinius Theophrasti verba singula Latine exprimere solitus, Faba Græca descripta, nusquam alibi Diospyrimeminerit. Guaiacum Patauinum Fallopius, Pena & Lobellius, vera Lotus Theophrasti, nominarunt. Hæc est Faba Græca quam Bellonius à Constantinopolitanis Cerasum Trapezuntiam vocari scribit. Ea etiam cuius figuram Augerius de Busbecke ad Matthiolum misit, cui subscriptum erat, Dactyli ex Trapezonda dulces, & gustu delectabiles. Huius Pseudo Loti, siue Fabæ Græcæ, picturas duas Matthiolum exhibet, foliorum tantum longitudine breuitate, angustia, latitudine distantes, quæ pro ætate & proprietate loci in quo stirpes aluntur, varietas facile contingit. Loti suæ baccas aluum adstringere scripsit Dioscorides Ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericis, ac scæminis fluxione vuluæ laborantibus auxilio esse, rufare capillos, citam aluum cohibere. Plinius Fabam Græcam cum Loto primi generis confundens, quod indicauimus, eadem & quæ Dioscorides, Loto suæ tribuit. Hæc Lotos, inquit, quæ Faba Græca appellatur à nostris, aluum baccis sistit. Ramenta ligni decocta in vino (hoc Dioscorides tacet) profunt dysentericis, menstruis (*γυναιξὶ πόικαῖς* Dioscorides, id est mulieribus fluxione vuluæ vexatis) vertigini, comitialibus (hæc Dioscorides non habet) Cohibent & capillum. Quæ

verò

verò sequuntur, nec in Dioscoride extant. Mirum his ramentis nihil esse amarum, fructuq; dulcius. Fit & è scobe eius medicamentū, ex aqua Myrti decocta, subacta, & diuisa in pastillos, dysentericis vtilissimū, pondere victoriati, cum aquę cyathis tribus. Galenus dilucidius Loti vires explicat his verbis. Lotus arbor non multæ adstrictoriæ facultatis est particeps, sed & tenuium est partium, & exsiccatoria. Itaque lignorum assulæ derafæ muliebri accommodantur profluuiο, & dysenteriis, & cæliacis affectibus. Decoquuntur verò interdum in aqua, interdum in vino, nimirum prout vsus poposcerit, nec infunduntur tantum, sed & bibuntur. Quinetiam quod pilos defluentes cohibeat, non mediocre signum est ipsam adstringentis esse cuiusdam, ac mediocriter desiccantis facultatis. In his cum Plinius & Galenus ramentorum Loti decocto cohiberi capillos dicant, locus Dioscoridis in quo legitur, ξανθίζει δὲ καὶ τὰς τεύχας, καὶ ἐπέχῃ γαστέρα πέσους, id est, flauos facit capillos, & citam aluum cohibet, corruptus esse videtur, & ita legendus. ξανθίζει δὲ καὶ τὰς τεύχας, καὶ ἐπέχῃ πέσους, id est, flauos efficit capillos, & defluentes cohibet. Nam cum baccis ventrem sisti antea dixerit, & ramentorum decoctum dysentericis prodesse, quid attinebat quod de ventre sistendo dictum iam fuit, statim repetere?

Li. 7. simpl.

L A V R V S, CAP. XXII.

QVÆ Latine Laurus dicitur, Græcè δάφνη, Arabibus Gaur, vel Gar, Gallis *Laurier*, Italis *Lauro*, Germanis *Lorbeerbaum*, & *Loorbeeren*, Hispanis *Laurel*, seu *Laureiro*, Boemis *Bobek*, Anglis *Laureorbay tree*, Belgis *Laurusboon*, Lusitanis *Laureizo*. Baccæ eius δάφνιδες. Laurus duūm est generum. Vna tenui folio constat, altera latiore. Vtraque odoratissima, omnibus, præsertim in Italia cognita, quod nō solum in hortis, viridariis, vineisq; sata virescat, sed etiam in syluis, maximè locis maritimis, ac etiam in

Nomina

Genera.

L A V R V S.



montibus & collibus apricis, qui lacus & maria respiciunt, sponte nascatur. Folia habet oblonga, in exortu lata, in acutum desinentia, crassa, solida, odorata, in vno genere latiora, in altero angustiora & tenuiora, ex qua foliorum differentia alteram marem, alteram fœminam esse iudicant. Flores emittit paruos, muscosos, Oleæ fere similes, in luteo albicantes, ex quibus baccæ prodeunt Oleis similes, primum virides, cū maturuerunt nigrae, crasso intus nucleo, qualis est in Rusci baccis. Laurus frequentissima in Italia, vt dictum est prouenit, in Hispania, in Gallia Narbonensi, aliisque calidioribus regionibus, in quibus in proceram arborem assurgit, cortice crasso duroque. Frigidioribus locis in hortis ferunt, & summa adhibita diligentia curaque à frigoris iniuria vix tuentur: Lauro enim inimicum frigus in Olympo tamen copiosiore nullam esse tradit Plinius: quin & in Lexobiis, ac Bellocasiis Neustriæ, hortos maris afflatu tepentes non dedignatur. Folia Lauri perpetuò virent. Mensibus Martio &

Forma

Locus,

Lib. ic. c. 32.

Lib.1. c.90.
Vires.

Cap.8.23.

Li.6.simpl.

Aprili germinat. Baccæ Autumni fine decerpuntur, vel hyemis initio, ut Oliuæ, Laurus vtraque, ut docet Dioscorides, excafactoriam naturam habet, & emollientem. Quamobrem decoctum earum in muliebres infessus additum vuluæ & vesicæ vitiis conuenit. Virentia folia (alii τὰ χλωρὰ τῶν ξύλων legunt, id est, virentia ligna) sensim substringunt: illita quoque ac trita vesparum, & apum ictibus auxiliantur: eadem cum polenta, & pane illita inflammationem omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & vomitus mouent. Græcè habetur, ποθένει δὲ πρᾶνδι τὸν τῶμαχον, καὶ ἐμελὲς κινεῖ. Cornarius autem pro πρᾶνδι, id est mitigant βαρύνει legit, id est, grauant. Plinius priore membro omisso, simpliciter dixit, folia pota vomitiones mouent. Lauri baccæ magis quàm folia calfaciunt. Ergo in eclegmate tritæ cum melle, vel passo, profunt tibi, orthopnœæ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra ictus scorpionum ex vino bibuntur: vitiligines emaculant. Succus baccarum vitilissimè aurium dolori & grauitati (Δυσσηκολαίς, sic etiam Plinius habet, Codex antiquus ἦχοις, id est sonis) instillatur cum vino vetere & rosaceo. In medicamenta autem adiiciuntur, quæ neruorum lassitudines reficiunt, & ad vnguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radice calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodest tribus obolis in vino odorato potus. Eadem Plinius tradidit. Hæc autem adiunxit. Profunt folia fœminarum mensibus cum oleo cocta. Cum polenta, quæ tenera sunt trita, ad inflammationes, vel, ut in manuscripto legitur inflationes oculorum, cum ruta, testium, cum rosaceo, ad capitis dolores, aut cum irino. Quin & commanducata, atque deuorata per triduum terna, liberant à tussi. Eadem profunt suspiriis, trita cum melle. Cortex radice cauendus grauidis. Ipsa radix calculos rumpit: iocinori prodest, tribus obolis in vino odorato pota. Baccæ menses trahunt appositæ, tritæ, vel potæ. Aduersus scorpiones quaternæ ex vino bibuntur. Perunctos succo baccarum fugiunt venenata omnia. Prodest contra ictus & potus, maximè autem eius Laurus quæ tenuia habet folia. Baccæ cum vino serpentibus, scorpionibus & araneis resistunt. Ex oleo & aceto illinuntur & lienī, & iocinori: gangrænis cum melle. Et in fatigatione etiam, aut perfrictione succo perungi, nitro adiecto, prodest. Sunt qui celeritati partus multum conferre putent radicem, acetabuli mensura in aqua potam: efficacius recentem, quam aridam. Item & in remedio vuæ iacentis, quadrantem pondo baccarum foliorumque decoqui in aquæ sextariis tribus ad tertias, eamque calidam gargarizare: & in capitis dolore impari numero baccas cum oleo conterere, & calefacere. Lauri arboris, folia & cortex, Galeno teste, desiccant & calefaciunt vehementer, magis etiam fructus quàm folia. At radice cortex minus quidem acris est, & calidus, magis tamen amarus: habet etiam adstrictionis non nihil: quamobrem & calculos confringit, & iecori prodest. Bibitur ex vino fragrante trium obolorum pondere. Lauri tenerrimas summitates cum nardo in vino decoctas aurium grauitati & sonis mederi, scribit Matthiolus, si eius decocti calentis vapor infundibulo in aures recipiatur. Lauri baccis laxatam Columellam ad locum reduci, si cum æquali pondere Cymini, Hyssopi, Origani, Euphorbij, melle excipiantur, & summo capiti calidæ applicentur. Easdem cum tritici furfure, Iuniperi baccis & Allio contritas, & vino sæpius super calente tegula asperfas, pubique admotas suppressam vrinam citare. Septem Lauri baccas à prægnantibus, quibus instat partus, cum dormitum eunt deuoratas, ut facilem fœlicemque partum edant efficere. Tenerrimas Lauri cymas cum Calamintha & sale contritas, ex tepida aqua sumptas aluum ciere, pituitamque & lumbricos

bricos celeriter expellere. Ex iisdem baccis cum maturæ sunt, in aqua decoctis fit oleum Laurinum Dioscoridi: siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus distracta concha excipitur. Mesuæ vero baccae Lauri maturæ, & recentes teruntur in pila, ex aqua in lebate coquantur, post torculari plano exprimuntur in vas subiectum, in quo aqua supernatans oleum colligitur. Simplex vtilius, & quo recentius & viridius colore: amarissimum est & acre. Ex Gallia Narbonensi vtribus, vt commune, aduehitur, vnguento similis quàm oleo. Id calidum est, essentia tenuis, aperit, mollit, discutit. Ob hæc intemperantiam omnem frigidam solam, & cum pituita, vel flatibus sanat, & ab his colo dolenti clystere infusum mirè prodest, vt partibus omnibus cerebri illitum, articulis, ventriculo, spinæ dorsi, paralyti, horrore febrili: denique omnibus neruorum vitiis, algoribus, lassitudinibus, catarrhis, aurium doloribus, hepatis, lienis, renum, vteri frigidis affectibus. Ex iisdem conficitur emplastrum, quod de baccis Lauri cognominatur, Mesuæ auctore. Recipit autem Thuris, Mastiches, Myrrhæ, singulorum vnciam vnam, baccarum Lauri vncias duas, Cyperi, Costi, singulorum semunciam: mellis colati quantum ad ea comprehendenda sufficit. Si autem Cyperi fescunciam misceas, & sterus capræ, aut vaccæ siccum ad pondus omnium, ad hydropem fit mirabile. Alioqui ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem, à flatibus, aut intemperie frigida ortum placat. Quare in colico dolore, à flatu & pituita salubriter calidum ventri imponitur, vacuata plenitudine: in clystere quoque iniicitur vncia vna, vel fescuncia, cum cæteris eodem pertinentibus. Inflationem quamuis, id est à flatu tensionem, & tumorem, eadem ratione iuuat. Diuersum ab hoc emplastro Malagma *ἡ δὲ δαφνίδων* apud Galenum, id est, ex baccis Lauri, Nitro rubro, Ammoniaco, Cera, Resina Picea, Pice Brutia. Quidam seniles, pulchros, & valde leues baculos ex Lauro parant. Fabulantur Poëtæ Daphnem formosissimam Ladonis filiam fuisse, quam cum deperiret Apollo, & vt potiretur, celeri cursu instaret fugienti, ab eo tandem capta matrem precatur tellurem, vt in sinum se suum reciperet. Votis ac precibus excitata tellus, confestim arborem edidit. Re conspecta deterritus Apollo, cum arborem gentili virginis nomine donasset, vulso ramo sese coronauit: quo verborum inuolucro nonnihil veri significatur: nempe Laurum vaticinij symbolum, Apollini sacrum esse, vaticinij Deo. Puellam quidem sapientiam appellant: at vaticinandi facultas à sapientia proficiscitur. Tum etiam plena ignis arbor, Apollini, siue Soli qui ignis est, placet. Lemures & Larnas Sol odit, itaque si Laurus adest, statim abiguntur, & fugantur. Est igitur Laurus *μαντικὸν φυτόν*, vt veteres dixerunt, id est diuinatrix arbor, Apollini sacra, vnde Delphica nominatur. Quin & vates responsa daturi Laurum edebant, eaque sese coronabant, vt Apollo cui gratissima est hæc arbor, eorum habitu aspectuque delectatus, libentius diuino afflatu moueret eorum animos. Tibullus.

Vera cano, sic vsque sacras innoxia Lauros

Vescar, & æternum sit mihi Virginitas. Claudianus. *Venturi præscia Laurus.*

Eandem ob causam vates à Lycophrone *δαφνοφάγος* dicitur. Musas Hesiodo Laurum gustandam dedisse ferunt, quod eius vis esset, vt qui eam manderent, vaticinarentur. Eadem victores Delphis coronabantur, vt triumphantes Romæ, inquit Plinius. Laurus triumphis propriè dicatur, vel gratissima ianitrix Cæsarum, Pontificumque: quæ sola & domos exornat, & ante limina excubat. Ipsa pacifera, vt quæ prætendi etiam inter armatos hostes quietis sit indicium. Romanis præcipuè latitiæ victoriarumque nuntia, additur literis, & militum

*Oleum
Laurinum.*

Lib. 15. c. 30.

Laureis, pilis que: fasces Imperatorum decorat. Hac corona gremio Iouis Optimi Max. deponitur, quoties lætitiā noua victoriā attulit. Ouidius:

*Arbos eris certe, dixit, mea, semper habebunt
Te Coma, te Cythara, te nostra Laure pharetra.
Tu ducibus latis aderis, cum lata triumphum
Vox canet, & longas visent Capitolia pompas.
Postibus augustis eadem fidiſſima custos
Ante fores stabis, mediamque tuebere Quercum.
Vtque meum intonsis caput est iuuenile capillis,
Tu quoque perpetua semper gere frondis honorem.*

Quia spectatissima in monte Parnasso Laurus esset, ideo grata fuit Apollini, magis quā, vel quia esset pacifera, aut perpetuò vireret, assuetis iam eo dona mittere etiam Romanis regibus, teste L. Bruto. Sunt & circa D. Augustum euēta Lauri digna memoratu. Namque Liuiæ Drusillæ, quæ postea Augustæ matrimonij nomē accepit, cum pacta esset illa Cæsari, gallinam conspicui candoris, sedenti Aquila ex alto abiecit in gremium illæsam: intrepidēque miranti accessit miraculum, quoniam teneret rostro Laureum ramum onustum suis bacis. Conseruari alitem & sobolem iussere Aruspices, ramūque eum feri, ac ritè custodiri. Quod factum est in Villa Cæsarum, fluuio Tiberi imposita, iuxta nonum lapidem, Flaminia via, quæ ob id vocatur, Ad Gallinas, mirēque sylua prouenit. Ex ea triumphans postea Cæsar Laurum in manu tenuit, coronamq; capite gessit: ac deinde Cæsares Imperatores cuncti. Traditūque mos est ramos quos tenuerunt, ferendi. Manu satarum arborum, receptarumq; in domos fulmine sola Laurus nō icitur, nisi futuræ calamitatis prodigio, ac ne domus quidem in quibus sint eius rami, de cælo tanguntur. Quare Tiberium Principem, tonante cælo coronari ea solitum ferunt contra fulminum metus. Laurus, vt ait Plinius, manifesto abdicat ignes crepitu: quapropter fortasse dixit Maro:

Et fragiles incende bitumine Lauros.

Id est, inter vrendum fragores & crepitū edentes. Nihil enim æque magno sonitu crematur, ac Laurus. In ea verò significatione fragilis interdum vsurpatur, vt à Lucretio.

Et fragiles sonitus chartarum comeditatur.

Nam quoniam crepant quæ franguntur, fit vt fragor interdū sit sonus, & fragilis, sonans. Laurus ex sese ignē emittit: nam si exsiccata ramus ramo frequentius confricetur, asperso sulphuris puluere, ignis exiliet. Teritur lignū ligno, inquit Plinius, excipiente materia aridi fomitis, fungi vel foliorū facillimè cōci-pientium, vel, vt legitur in manuscripto, facillimo conceptu. Sed nihil Hedera præstantius, quæ teratur, Lauro quæ terat, vel, vt est in manuscripto, quæ teratur Lauro, Laurumq; terat. Ex quibus hæc Theophr. de eadem re verba sic explicāda & legenda videntur: Δεῖ ὅτι τὴν ἐχάραν ἐν τέτρων ποιεῖν, τὸ ὅτι τεῖλανον ἐν δάφνης, non τρύπανον, vt habent exemplaria. Id est, materiam aridi sonitus ex hac, id quod teritur ex Lauro, facere oportet, vt τεῖλανον sit à τεῖλαν, id est à terendo. Eliditur enim ignis atterendo, & collidendo, non terebrando: ἐχάρα verò materia est aridi fomitis ex Plinio, non conceptaculū, vt Gaza reddidit. Rubigo maxima segetum pestis Lauri ramis in aruo defixis, transit in earū folia ex aruis, vel, vt alij legūt, ex herbis, vt scribit Plinius, Palumbes, gracculi, merulæ, perdices Lauri folio annuum fastidiū purgāt eodē teste. Coruus occiso Chamæleonte, qui etiā victori nocet, Lauro infestum virus extinguit. Narret Theophrastus in sinu Heroo, ad quem descendunt Ægyptij, Laurum esse & Oleam, & Thymū, non viridia, sed lapidea, parte à mari eminente, similia tamen viridibus, tum foliis, tum germi-nibus, longitudinēque earum arbuscularum esse ternū cubitorum.

SYRIN



VLTIUS nunc in hortis Italiæ, præsertim Florentiæ ac Pisarum, frequens hæc arbor, quæ vulgo *Syringa*, nuncupatur, Africo fortasse vocabulo. Mediocris est arbor magnitudinis, cortice rufescente, furculosa, folio Tiliæ, acutiore & interdum angustiore, per ambitum valde dissecto, nisi admodum tenellum sit: flore candido, suauiter olente, cuius rei gratia in hortis colitur, pallidis intus apicibus, semine paruulo, nigro in loculis oblongis, Ordei grano similibus, superne denticulatis. Ostryon Theophrasti multi esse volunt, & reliqua historia cōsentiente, & ea nota præcipue quæ peculiaris est, nempe quod Ordei grano fructus similis sit. An veteribus cognita fuerit nec nec, nōdum statuere possumus, inquit Clusius: passim verò ab Herbariis & frutex coronarius, quoniam eius flos odoratus in coronas interdum addatur, & *Syringa* appellatur, fortasse à virgarum rectitudine longitudinéque, & fungosæ interioris medullæ copia. Est aliàs planta quam Belgæ etiam *Syringam* vocant, à superiori tamen dissimilem. Nam quamvis à radice virgas multas edat, nodosas, multo tamen breviores sunt, & Fraxini tenellis virgis similiores, quàm *Syringæ* superioris: rariores in eis ramuli, in quibus bina ad singulos nodos aduerso situ nascuntur folia, latiora quàm in præcedente, ex longiore pediculo prodeūtia, crassiora, duriora, nigriora, & ad Populi nigre siue potius *Hederæ* foliorum formam accedentia. Summis ramis oblongos veluti furculos fert, ex quibus multi flores dependent, minores quàm in superiore, colore cæruleo obsoleto, odorati quidem, sed minùs quàm candidè. Subsequitur fructus oblongus, duabus veluti valuis constans, quo bina oblonga, & compressa semina continentur, colore ex atro rufescēte. Alitur etiam in hortis, florétque simul cum alia, tum etiam citius. Lilac nomine hunc fruticem monstrauit Matthiolus, & Glandem vnguentariam existimauit: verùm huius fructus à Pistaciis multum differt. Folio Tiliæ, acutiore, & interdum angustiore, per ambitum valde dissecto, nisi admodum tenellum sit: flore candido, suauiter olente, cuius rei gratia in hortis & viridariis colitur, pallidis intus apicibus: semine paruulo, nigro, hordei grano simili, in filiquis oblongis, superne denticulatis.

Nomen

Forma

SYRINGA flore albo Clusij.

SYRINGA CAERVLEO
flore, Lilac Matthioli.

ambitum valde dissecto, nisi admodum tenellum sit: flore candido, suauiter olente, cuius rei gratia in hortis colitur, pallidis intus apicibus, semine paruulo, nigro in loculis oblongis, Ordei grano similibus, superne denticulatis. Ostryon Theophrasti multi esse volunt, & reliqua historia cōsentiente, & ea nota præcipue quæ peculiaris est, nempe quod Ordei grano fructus similis sit. An veteribus cognita fuerit nec nec, nōdum statuere possumus, inquit Clusius: passim verò ab Herbariis & frutex coronarius, quoniam eius flos odoratus in coronas interdum addatur, & *Syringa* appellatur, fortasse à virgarum rectitudine longitudinéque, & fungosæ interioris medullæ copia. Est aliàs planta quam Belgæ etiam *Syringam* vocant, à superiori tamen dissimilem. Nam quamvis à radice virgas multas edat, nodosas, multo tamen breviores sunt, & Fraxini tenellis virgis similiores, quàm *Syringæ* superioris: rariores in eis ramuli, in quibus bina ad singulos nodos aduerso situ nascuntur folia, latiora quàm in præcedente, ex longiore pediculo prodeūtia, crassiora, duriora, nigriora, & ad Populi nigre siue potius *Hederæ* foliorum formam accedentia. Summis ramis oblongos veluti furculos fert, ex quibus multi flores dependent, minores quàm in superiore, colore cæruleo obsoleto, odorati quidem, sed minùs quàm candidè. Subsequitur fructus oblongus, duabus veluti valuis constans, quo bina oblonga, & compressa semina continentur, colore ex atro rufescēte. Alitur etiam in hortis, florétque simul cum alia, tum etiam citius. Lilac nomine hunc fruticem monstrauit Matthiolus, & Glandem vnguentariam existimauit: verùm huius fructus à Pistaciis multum differt. Folio Tiliæ, acutiore, & interdum angustiore, per ambitum valde dissecto, nisi admodum tenellum sit: flore candido, suauiter olente, cuius rei gratia in hortis & viridariis colitur, pallidis intus apicibus: semine paruulo, nigro, hordei grano simili, in filiquis oblongis, superne denticulatis.

Sunt qui Ostryam Theophrasti esse volunt, tum eius historia consentiente, tum ea præsertim peculiari nota, quod scilicet hordei grano fructus eius similis sit. Theophrastus. Est Ostrys, quam nonnulli Ostryam vocant, vnica species, Oxyæ (Plinius τῆ μελίτζ, idest fraxino, legit,) tum satum, tum cortice similis: folio Piri, non multo oblongiore, in acutum contractiore, & maiore, fibris multis & crassis à medio dorsi in modum costarum recta secundum magnam fibram porrectis, in Fibris ipsis rugato, & in ambitu leuiter serrato: materie dura, decolor, albida: fructu paruo, oblongo, hordeo simili, flauo. Radices sublimes habet. Amat aquosa loca, & prærupta. Domos eam inferri infaustum esse volunt: acerbis enim inuehere mortes, & partus, vbicumque fuerit difficiles reddere. Hæc Theophrastus, quæ sic exscripsit Plinius. Gignit Græcia arborem Ostryon, quam & Ostryam vocant, solitariam circa saxa aquosa, similem Fraxino cortice & ramis, foliis Piri, paulo tamen longioribus, crassioribusque, ac rugosis incisuris, quæ per tota discurrunt: semine hordeo figura simili, & colore. Materies est dura atque firma. Hæc sub Ostrya, in domum illata, difficiles partus fieri produnt, mortésque miseras.

ZIZYPHVS PVNICEA, CAP. XXIIII.

Lib. 9. c. 4.
Nomina

Genera.
Ibidem.
Forma.

Matth lib.
1. Dioscor.
cap. 17.

ARBOR Zizyphus Columellæ dicitur, Gallis *Iuubier*. Fructus Græcis ζίζυφα, ζιβζίφα, & ζιτζυφα, Latinis similiter Zizypha, Arabibus *Hunen*, *Zufalze*, seu *Hanab*, Officinis *Iuuba*, Gallis *Iuibes*, Italis *Giuggiole*, Hispanis, *Azufecifa*, & *Acofeiso*, Germanis *Rotbustbeerle*, *Brustbeerlin*. Zizyphi genera duo statuit Columella, rutilam, & albam. Zizyphus rutila, siue phœnicea, siue punicea, arbor est, Pruno humilior, caudice contorto, cortice scabro, vitis viniferæ fere simili: materie Oxyacanthæ proxima, radicibus firmis, ac solidis. Spinis tota fere riget, longis, firmis acutissimis, colore ex nigro rufescente. Ex ramis iuncea, & tenues quidam processus exeunt, colore pallido, lenti, spithama longiores, ex quibus vtrinque per interualla folia exeunt, vt in Fraxino & Sorbo, impari tamen exortu oblonga, non magna, firma, vt in Vincaperuinca, leuissimè per ambitum serrata. Flores ex foliorum exortu prodeunt, pallidi, ac muscosi, ex quibus baccæ oriuntur Oliuarū instar, primùm virides, deinde subalbicantes, postea, aureo colore, & cum ad perfectam maturitatem peruenierint rufescentes, siue phœniceæ, in quibus osseus est nucleus, Oliuæ nucleo similis. Pulpa ante maturitatem viret, sapore austriusculo, post maturitatem dulcis, & gustui non ingrata flauescit. Zizyphus in calidis regionibus, & in Italia, & Gallia Narbonensi prouenit. Leguntur Zizypha Septembris fine vnà cum iuncea ramusculis, & in manipulos colligata laquearibus suspenduntur, prius diebus aliquot insolata. Postremo decerpuntur, & in capsulis asseruantur ad medicos vsus. Sūt etiam qui decerpta, & cratibus tegetibusque instrata, tam diu insolant, quousque rugosa ibidem fiant. Zizypha in humiditate & calidi-

ZIZYPHVS Punicea.



Locus.

tate tem

rate temperata habentur, inquit Matthiolus, de quibus hæc apud Auicennam leguntur. De Iuiubis, id est, Sericis. Iuiubæ meliores sunt quæ maiores. Frigida quidem hæc in siccitate & humiditate temperata sunt, parum ad humiditatem declinantes. Aduersus sanguinem acrem, & calidum conferunt, quia, ut opinor, ipsum incrassant, & viscidum reddunt. Qui verò ab ipsis sanguinem expurgari & detergeri aiunt, non rectè illi quidem sentiunt, nec illis assentior. Parum illa nutriunt, & difficilè concoquuntur. Serica quid ad tuendam sanitatem, morbosue profligandos valeant, testis esse non possum, inquit Galenus. Exiguum præbent alimentum, difficilè concoquuntur, ideo stomacho non sunt utilia, conferunt pectori & pulmone. Existimant quidam dolori renum, & vesicæ conferre. Actuarius meminit Zulapij è Zizyphis ad ardentem Febrem, quod purgat sanguinem, & tussi, ac ex calore destillationi succurrit. Simeon Sethi Zizypha, inquit, humido, calidoque esse temperata, iisque propriam vim inesse sanguinis acrimoniam reprimendi: bonum succum creare: & sanguinis serum vacuare. Horum decoctum tussi, & spirandi difficultati conferre, item pectori, renibus, & vesicæ. Præstantiora esse maiora, qualia Edefsina. Vomitionem acri humore concitatam sedare. Verum ægrè concoqui, & lienem lædere. Quare eorum decoctum salubrius propinari. Hæc sunt variae auctorum de Zizyphis sententiæ. Auicenna, frigida esse, sed in sicco humidoque temperata, Simeon in humido calidoque temperata esse tradit. Auicenna ab ipsis sanguinem purum reddi, & abstergeri negat, Actuarius Zulapio ex sericis scribit sanguinem expurgari, Simeon sanguinis serum euacuari, bonumque succum gigni omnes difficile concoqui, ad tussim, pectoris, pulmonum vitia, valere, sanguinem acrem domare consentiunt. Galenus nonnullorum sententia Zizypha Serica vocat, nullamque in iis se inuenisse facultatem scripsit ad valetudinis conseruationem, aut ad morborum curationem, sed ab effrenatis tantum pueris, & à mulierculis in cibo expeti: unde capta occasione Fuchsius Auicennam, atque ceteros omnes Arabicæ familiæ auctores reprehendit, asserens omnia quæ de Zizyphorum viribus literis mandarunt, falsa esse, in quo non Arabas scriptores solum, sed Græcos recentiores damnat. Nam Actuarius, ut dictum est, Zizypha ad pectoris morbos ex calidis humoribus natos, compositis medicamentis admiscuit: item iis quæ bilem deiciunt, quibus adstipulantur ea quæ ex Simeone Sethi supra memorauimus. Eadem per sæpe in suis compositis medicamentis Nicolaus Alexandrinus vsurpat. Præterea hæc ita experientia comprobata sunt, ut iam rectè Auicennam scripsisse constet, à Zizyphis sanguinis feruorem, & acrimoniam reprimi, atque ideo pectoris & pulmonum vitiis prodesse, à calidis humoribus ortis, quod sanguinem incrassent. Quod si quis eos damnauerit, qui temerè & sine diorismo Zizyphi ad tussim, aliaque pectoris vitia, ex quauis causa etiam frigida, suborta, rectè ille quidem, & cum Mauritanis auctoribus senserit. Sed Galeni Serica an Zizypha sint dubitant etiam docti medici, cum Plinius diuersa esse statuere videatur. Æquè peregrina sunt, inquit, Zizypha & Tuberes, quæ & ipsa non pridem venere in Italiam. Hæc ex Africa, illa ex Syria. Sextus Papinius quem consulem vidimus, primus utique attulit, Diui Angusti nouissimis temporibus, in castrorum aggeribus sata, baccis similia quàm Malis: sed aggeribus præcipuè decora, quoniam & recta iam syluæ scandunt. Tuberum duo genera, candidum, & à colore sericum dictum. Idem rursum: ab Amygdala proximè florent Armeniacæ, dein Tuberes, & præcoces: illæ peregrinæ, hæc coactæ: Zizypha grano seruntur, mense Aprili. Tuberes melius inferuntur in Pruno syluestri, & Malo Coto-nea, & in Calabrice. At Columella Tuberum nusquam meminit, sed Zizyphorum

Temper.
 Et Vires
 Ibidem.
 Li. 2. c. 369.

Li. 2. Alim.

Serap. c. 77.
 Li. 5. meth.

Li. 2. Alim.

Matt. Ibid.
 Li. 15. ca. 14.

Li. 16. ca. 25.
 Li. 17. ca. 10.

rum duo tradidit genera vt diximus. Quare Plinij codices deprauatos esse suspicatur Matthiolus, in quibus Zizyphis adscribendum esset, quod de tuberibus deprauatè legitur, maximè cum non solùm Columella, sed inter Arabas Auicenna, inter recentiores Græcos Simeon Sethi, duas Zizyphi species fecerint, Plinius vnam duntaxat. Denique cum Auicennæ & Serapioni Galeni Serica eadem sint quæ Zizypha, Matthiolus eadem quoque esse statuit. Cui sententiæ aduersatur Cornarius, qui Plinio referente tuberum duo genera esse credit, alterum candidum, alterum Serieum à colore dictum, idest, inquit, sub flauum qui serici natiui puri, & adhuc crudi color est. Ab hoc colore Serica non alia esse quàm quæ Galen. *σῆπις* dixit, quæ à Zizyphis perspicuè Plinius distinxit. Tuberum, quos Nucipersica vulgus appellat, duo genera cunctis fere nota sunt: alterum, etiam cum maturuit, ex albo subuirescens, eodem in toto pomo colore: alterū, toto fructu rubro, vel qua parte solè spectat, rubescente, altera sub flauo, quem esse credunt suauioris ac delicatioris gustus. Hoc videlicet esse putatur Sericū Plinij. Tuberis huius meminit Petronius his lepidissimis versiculis:

*Infelix modo crinibus nitebas,
Phæbo pulchrior & sorore Phæbi,
At nunc lauior ære, vel rotundo
Horti Tubere, quam rigauit vnda,
Ridentes fugis, & times puellas.*

ZIZYPHVS ALBA NOSTRA, CAP. XXV.

Nomina



ZIZYPHVS alba, ab Arabibus auctore Andrea Bellunensi in expositionibus nominum Arabicorum Auicennæ, nuncupatur *Azadaracht*, à Damascenis *Zaizalacht*, ab Italis quibusdam sine vlla ratione *Sycomorus*, à mulierculis *Albero da le patenostri*, à Turcis *Theppic*.

Forma

Arbor est iustæ magnitudinis, foliis ferè Fraxini, minoribus, obscuriùs viren-

ZIZYPHVS

Alba Dalech.



ZIZYPHVS ALBA

Matth. siue Pseudosycomorus.



tibus:

tibus: flore cæruleo, quinque foliolis constante, è cuius medio eminet apex niger, purpurascens, Caryophyllis nostris valde similis. Fructum fert rotundum, Cerasi figura, gustanti initio dulcem, tandem amarissimi, ingratisimique saporis, nucleis natura eleganter striatis, & quos adacta acicula facilè perfores. Quamobrem mulierculæ & monachi precarios globulos ex iis conficiunt. Reperitur, inquit Bellunensis, Venetiis, & Patauij in claustris monachorū. Colitur in quibusdam etiam hortis ciuitatis Monspeliensis. Auicennas Sectione sexta, libr. 4. fructum ac lignum huius arboris occidere tradit ea ipsa animalia quæ Rhododendro necantur, remedióque esse tum quod in vniuersum traditur de venenis omnibus, tum etiam priuatim, quod Rhododendri maleficæ vi resistit.

MYXOS ARBOR, CAP. XXVI.

Vivs arboris à Dioscoride & Galeno nulla, à posterioribus Græcis Li. 15. ca. 13. Paulo, Aetio, Psello, Actuário frequens fit mentio, quæ Plinij ætate nasci Romæ cœpta est, insita Sorbis. Μύξος nuncupatur, fructus **Nomina** Μύξαι, Μύξα, Μυξάρια, Plinio Myxæ, ab aliis Myxa, & Myxaria, à mucoso pomi lentore: Μύξον enim Græci mucum vocant, Officinis Arabas secutis *Sebesten*, qui etiam *Motheica*, *Mukeita*, & *Mokaita* vocant, Galli *Sebestes*. Syros coniiicit Ruellius ab Augusti honore Myxa Sebastas appellasse, vnde Arabum, Li. 1. ca. 121. & Officinarum *Sebesten*, nomen deductum. Myxos arbor est Pruno non dissimilis, sed minor. Caudici cortex candidus: ramos fundit viridi colore nitentes: **Forma.** folia in rotundum circinata, rotundioraque quàm Pruni, ac firmiora: flores albicant, racematim prodeuntes, ex quibus fructus oriuntur paruis Prunis similes, caliculo orbiculato, vt glandes, ima parte adnexi, nucleo intus triquetro, qui satis baccae suæ proportionem respondet. Li fructus maturi in atrum vi-

PRUNVS
Sebestena Matth.



MYXOS ARBOR,
sive Sebestena nostra.



rescunt,

Li. 13. c. 5. &
lib. 15. ca. 13.

Locus.

Temper.

& Vires

Matt. Ibid.

In parad.

Libr. 7.

Lib. 7. sim.

rescunt, gustu prædulci, ac lenta, viscidâque pulpa. Maturi leguntur insolan-
tûrque vt passî, & in rugas contracti recondantur. Myxa, Plinio auctore, in
Damasco Syriæ, & in Ægypto primum nascentia, deinde Italiæ familiaria fue-
re. Nunc in locis calidis, & in Italiæ viridariis quibusdam virent. Temperamē-
to sunt æquali, neque frigida, neque calida. Deiectoria vis inest, vt & Prunis,
tam Græcorum scriptorum quam Arabum testimonio, tametsi aliter senserit
Fuchsius, qui ea potius adstringendi vi prædita esse ait, à quo tum veteres, re-
centiorésque medici, tum quotidiana experientia dissentiunt. Myxa Paulo, fru-
ctus arboris est, minor quidem Prunis, facultate verò consimilis. Vêtre[m] mol-
liunt Myxa vt & Pruna, de quibus Galenus dixit, Pruni fructus ventrem subdu-
cit, recens quidem magis, aridus verò minùs. Actuarius Myxa medicamentis
multis commiscet quæ bilem deiciunt. Myxorum pulpa drachmarum decem,
aut summum duodecim pondere sumpta, eosdem fere prebet effectus, quos
Ægyptia Siliqua, improbanda Fuchsi sententia, qui Electarium è Myxis, quod
Officinæ Diasbesten vocant, non Myxorum, sed aliorum medicamentorum
deiectoria vi, quæ Myxis adduntur, aluum purgare arbitratur. Nam si id per se
præstant, vt ostendimus, idem etiam aliis admista præstabunt. Myxa etiam vti-
liter dantur ex bile febricitantibus, atque Paulo, Aetio, Psello, Actuario aucto-
ribus, linguæ asperitatem mirificè leniunt. Adhæc pectori & tussi opitulantur,
ventris ténias pellunt: vrinæ ardoribus à bile ortis aut salsa pituita, maximam
opem præstant, deuorata triginta, aut quadraginta. Ex iure carniū macerata,
prima statim mensa sumpta, aluum commodissimè citant. Præstantiora sunt
plena, pingua, carnosâ, quæque situm non redolent, teredine non arrosæ.

PISTACIORVM ARBOR. CAP. XXVII.

Nomina



ISTACIORVM arboris fructus *πιστάκια* Græcis vocantur, Nicandro
πιστάκια, Posidonio *βιστάκια*, Latinis etiam Pistacia, & Pistacea, &
Pistaciæ fœminino genere, Arabibus *Pustech*, aut *Festich*, Officinis &
Barbaris *Fistici* dicuntur, Italis *Pistacchi*, Hispanis *Albocigos*, Germanis
Vuelfch Bimpermuslin, Gallis *Pistaches*, Boëmis *Pistacya*: Anglis *Pistakes*; & *Fistikes*.

Forma

Tota arbor Terebintho similis est, foliis ex viridi colore in luteum inclinanti-
bus, vtrunque è ramusculis, velut in Terebintho emergentibus. Nuces racema-
tim prodeunt ex ramorum summitatibus Amygdalinis fructibus minores, Pi-
neis nucleis paulo maiores, duplici cortice & nucleo constantes, figura oblon-
gæ, acuminatæ supra, infra pediculi, cui adhæserunt vestigiū seruantes, ab
vna parte tumidiore, & in angulum desinente ventre protuberantes, vna com-
missura per mediam anguli longitudinem transeunte, cum maturuerunt dehi-
scente. Exterior cortex carnosus, modicè rugosus est, supremo Amygdalæ pu-
tamini substantia, & colore similis, qui facilè à maturis fructibus recedens, in-
teriolem ostendit corticem, colore candidum, superficie glabrum, substantia
durum, lentum, fractu contumacem, & veluti osseum, qui intus barbata, ru-
fæque Auellanæ nucleo, similem, & æqualem nucleum continet, substantia te-
nerum, pinguem, colore in flauo virescentem, rubente cuticula velatum, gu-
stu dulcem, valde suauem, tenuem, oris que halitum commendantem. Eligito
maximas nuces, ponderosissimas, candidissimas, sponte sua modicè dehi-
scente commissura plenum, recentem, neque raucidum, neque rugosum, neque
situ obsitum nucleum ostendentes. Quæ autem ab his notis, vel ab aliquibus
earum recedunt & discrepant, inutiles sunt, neque medicamentis intra cor-
pus sumendis miscendæ: sed Liures ex ictu suggillatæ curantibus cōfectio-
nibus

PISTACIORVM

Arbor.



nibus relinquendæ. Ex his tam perspicuis notis colligit Matthiolus, Indicam Terebinthum Theophrasti proculdubio esse Pistaciorum arborem. Sic enim eam descripsit ille. Ferunt & in India Terebinthum esse, arborem alteri similem Terebintho, cui folia & rami, & reliqua omnia Terebintho similia, fructus autem diuersus, similis enim Amygdalis. Nam & in Bactris Terebinthum hanc esse, ferræque nuges Amygdalarum magnitudine, non enim magnas, sed aspectu similes, & suauitate Amygdalis præstantiores, ideoque loci illius homines his potius vesci. His accedit Athenæi testimonium. Popsidonius Stoicus tertio historiarum libro sic scripsit. Fert & Persion Arabia, atque Syria, & quod Bistacium vocatur, cui fructus racematim congestus albo cortice, longus, nucibus similis, τοῖς ἀμυγδαλοῖς non ὁμοῖοις, quæ Vuarum modo aliæ aliis incumbunt. Inferior pulpa viret, & miuùs boni succi est, quàm Strobili, sed odoratior. Fratres qui Georgica conscripserunt, libro tertio sic habent, & Fraxinum, & Terebinthum: Syri

In li. 1. Dioscori. ca. 140.

Libr. 14.

nunc Pistacia vocant. Hæc ex Athenæo. Syria, inquit Plinius peculiare habet arbores. In Nucum genere Pistacia nota. L. Vitellius qui censor fuit, & hæc in Italiam primus intulit ex Syria, cum legatus in ea prouincia fuisset, nouissimis Tiberij Cæsaris temporibus. Mox & in Hispaniam qui cum eo militauerat Flaccus Pompeius Eques Romanus. Venetiis hæc, inquit Hermolaus, Iudaico vicino situ seminis enata vidi. Nunc etiam Caietæ, Neapoli, & in aliis Italiæ viridariis visuntur. Iam in Parisiensi agro in ædibus sacris Diuæ Mariæ ex semine nata vidit Ruellius. Adoleuit fructumque tulit & hæc arbor Lugduni. Ea quorum communis est in Officinis vsus, ex Syria adferuntur. Pistacia, quæ constat in Syria gigni autore Dioscoride Pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica. Trita cum vino contra serpentium morsus prosunt, siue edantur, siue bibantur. Pistacia prodesse aduersus serpentium morsus tradit Plinius, & potu & cibo, eosdemque vsus & effectus habere, quos Pinei nuclei, prætereaque ad serpentium ictus, siue edantur, siue bibantur. Galenus in magna Alexandrina nasci tradidit, sed multo vberius in Berrhœa, vrbe Syriæ, parum quidem nutrientia, verum ad hepar roborandum, & succos in ipsius viis infarctos purgandos, utilia: qualitatem enim habent aromaticam, subamaram, & subadstringentem. Porro an stomacho noxia sint, an utilia, an aluum molliant, an adstringant, non ausim affirmare. Et alio in loco. Pistacrum in Syria copiose prouenire idem rursum scribit, fructumque eius esse quodammodo tenuioris essentia, & subamarum quidpiam ac odoratum habere: obstructions itaque liberare, sed maximè iecoris, verumtamen etiam thoracis pulmonisque. Auicennæ Pistacium calidum est in fine ordinis secundi, & humidum. Qui frigidum esse putant, vehementer errant. Aperit obstructions hepatis qualitate amara & aromatica, inest & in eo vis adstringens: parum admodum nutrit, stomacho vtile est, id propriè quod in Syria prouenit, Pineo nucleo simile, ob amaritudinem cum

Lib. 13. ca. 5.

Cor. c. 179. libr. 1.

Locus.

Lib. 1. c. 116.

Li. 1. c. 140.

Vires &

Temper.

Lib. 13. ca. 5.

Lib. 23 c. 8.

Li. 2. Alim.

Libr. 8. sim.

Li. 2. c. 276.

quadam adstringendi facultate. Scribit quidam sese non comperisse, stomacho ne multum noceat, an profit. Ego verò eo corroborari os ventriculi, prohiberi que nauseam ac vomitionem censeo. Neque lenit ventrem, neque adstringit. Decoctum eius cum vino optimo moribus venenatorum vermium confert. In quibus Auicenna cum nominatim Galenum vellet reprehendere scribit quidam, inquit, & cætera: neque id sine ratione: nam ori ventriculi robur addi à subamara, sub adstringentéque facultate, quæ in pistaciis deprehenditur, nullus est qui negare possit. Qua ratione freti medicorum nonnulli non modo ad iocinoris infarctus Galenum secuti, sed ad iecur ipsum ventriculúmque roborandum, ea tam cibis quàm medicamentis commiscent. Quin & ad excitandam venerem, & ad restituendum bonum corporis habitum maciæ, & marcore affectis commendant.

PALMA, CAP. XXVIII.

Nomina



ARBOR quæ φοινίξ Græcis, Latinis Palma dicitur, Arabibus *Machla*, aut *Nachal*, Gallis *Palme* & *Palmier*, & *Dactier*, Italis *Palma*, Germanis *Dattelbaum*, Hispanis *Palmeira*, Anglis *Daets tre*, Belg. *Dayeboom*: Boëmis *Dakyle*: fructus δάκλυδοι, & φοίνικες Græcis, Latinis *Palmule*, & *Dactyli*, Arabibus *Tamar*, Italis *Dattoli*, Gallis *Dactes*, Hispanis *Tamaras*,

Forma.

& *Dattiles*. Palma arbor aspectu pulchra, & procera, recto ac terete quidem trunco, verum densis gradatísque corticum pollicibus salebroso potius, quàm scabro, quibus, vt gradibus facilem se ad scandendum Orientis populis præ-

PALMA

Arbor.



Lib. I. c. 126.

Ibidem.

Lib. 8. sim.

bet. Ramos cacumine tantum in orbem spargit, suo vertice terram spectantes, foliis longissimis, duplicibus, gladij figura, siue arundinaceis quæ, vt ait Plinius, vt primum nouellas ostendere gemmas, tunc ad funes, vitiliúmque nexus, & capitum leuia vmbracula finduntur. Sic enim legendum. Nascitur inter primos fere ramos ex ipso caudice corticosus locus, duarum spithamarum longitudine, latiusculus, gladij videlicet latioris specie, quod palmam totius stirpis nomine, & Elaten, & Spathen appellari Dioscorides tradidit, inuolucrum floris & fructus Palmarum. Non enim solum fructus tegumentum, Elate nominatur à Græcis, sed etiam fructus qui sub ipsa continetur, inquit Dioscorides, ab aliquibus autem Borassus. Quare Galenus cum scripsit, ὃ ὃ χαλῶσιν ἐλάτην, τὸ ἀπαλὸν ἐκβλέψημα τῶ φοίνικος, τὴν αὐτὴν τῶ χαλῶ αὐτὴν ἐγκεφαλῶ δυνάμιν ἔχει. τὸ ὃ οἶον ἀμφίεσμα αὐτῶ, συντήκην μὲν ἔχει, & cætera, Elaten fructus Palmæ germen vocat, ipsum verò tegumentum quod Dioscorides περιχύλισμα dixit, ἀμφίεσμα, nominat, ita enim legendum, non vt

exemplaria nostra habent ἀφέψημα. Ex Elate floris ac fructus inuolucro dehiscente, atque in longum sese pandente, flores prodeunt numerosi, tenuibus villis

PALMA

Elate.



villis appensi, instar racemi magni coaceruati, facie Crocinis similes, sed multo minores, & candidi. Ex his enascuntur Dactyli, fructus teretes, & oblongi, nucleo intus durissimo, oblongo, & canaliculato. In trunci superna parte cerebrum includitur, ἐγκέφαλον Theophrast. Galenus, atque alij Græci vocāt, quod Dioscorides ἐγκάρδιον τῷ πρεμνῷ, idest medullam trunci appellat improprie, cum ἐγκάρδιον Theophrastus vbique pro medulla vsurpet, quam & καρδίαν, & μήτραν, & μύελον, appellari tradit, & quod medium est in ligno, tertium à cortice, exponit. At cerebrum Galenus etiam verticem & summitatem Palmæ dixit, καθάπερ ἐνιοί, inquit, ἐὰν ἴδῃσι τὴν κορυφὴν τῷ φοίνικος, ἣν ὀνομάζουσιν ἐγκέφαλον ἅλλοι. Plinius idem, & medullam & cerebrum vocauit. Dulcis medullæ earum, inquit, in cacumine, quod cerebrum appellant, exemptæque ea viuunt, quod non aliæ. Palmarum multa sunt genera Theophrasto. Aliæ enim fructiferæ, aliæ steriles: & fructiferarum aliæ mares, aliæ fœminæ. Sed hoc inter eas interest, quod mas pri-

Lib. 1. Hist. cap. 4.

Li. 2. Alim.

Li. 13. ca. 4.

Lib. 2. Hist. cap. 8.

Genera.

um florem in spatha profert, fœmina fructum ilico longum. Fructuum differentia multæ. Alij enim nucleo carent, alij nucleum habent: quidam durum, nonnulli mollem (sic enim Gaza legit. οἱ μὲν ἄπιρρηνοι, οἱ δὲ πύρρηνα ἔχοντες, καὶ τινὲς σκληροπύρρηνοι, οἱ δὲ μαλακοπύρρηνοι. Plinius vero, οἱ μὲν ἄβραχυπύρρηνοι, οἱ δὲ μακροπύρρηνοι, & cætera: sic enim conuertisse videtur. Fructiferarum aliis breuius lignum in pomo, aliis longius, his mollius, illis durius) Præterea colore à sese fructus differunt. Alij enim candidi sunt, alij nigri, alij flauī. Denique non pauciores quàm in ficis traduntur esse colores, neque plura genera. Discrepant etiam magnitudine, figuræque. Quidam enim rotundi sunt, veluti. Mala, & magnitudine tanti, vt quatuor in spica vna sint, alij parui Cicerum magnitudine. Succis quoque à sese distant, sed optimum tam inter nigros, quàm inter candidos genus esse aiunt, quod Regium vocant, tum magnitudine, tum viribus, rarum autem id esse, fere enim in solo horto Bati (βάτης habent nostra exemplaria, Gaza βάτων, legit, Plinius βαγώου, alij βήλας) apud Babylonem reperiri. In Cypro peculiare est Palmarum genus, cuius fructus non maturefcit, crudus tamen valde suavis, dulcisque est, peculiarémque dulcedinem sortitur. Palmæ quædam non fructu tantum, sed & arbore ipsa à sese distant, nimirum proceritate, reliquæque forma. Sunt enim quædam nec magnæ, nec longæ, sed breues, etiam fœcundiores aliis, & in trimatu statim feraces. Cuiusmodi multæ sunt in Cypro. In Syria & Ægypto Palmæ proueniunt, hominis altitudine quæ quadrimæ, & quinquennes fructum edunt. Cuidam in Cypro generi folium latius est, & fructus multò maior, peculiarisque formæ, magnitudine Mali Punici figura oblongus, succo minus grato quàm in cæteris sed Punico simili: ὁμοίως τοῖς ποαῖς, non ῥιζαῖς, itaque non deuoratur, sed commanducatus expuitur. Palmæ genera vnde quinquaginta sunt Plinio. Clarissimæ omnium, quas Regias appellauère ab honore, quoniam Regibus tantum Persidis seruabantur,

Li. 13. ca. 4.

Li. 13. ca. 4.

Lib. 13. c. 4.

Babylone natæ, vno tantum in horto *Bagou*. Ita enim vocant Spadones: qui apud eos etiam regnauere. Hortus ille nunquam nisi dominantis in aula fuit. At in meridiano orbe præcipuam obtinent nobilitatem Syagri, proximamque *Margarides*. Eæ breues, candidæ, rotundæ, acinis quàm balanis similiores. Quare & nomen à margaritis accepere. Vna earum arbor in Chora esse traditur, vna & Syagrorum. Mirumque de ea accepimus, inquit Plinius, eam cum Phœnice aue, quæ putatur ex huiusce Palmæ argumento nomen accepisse, emori, ac renasci ex seipsa: eratque cum hæc proderem, fertilis. Ipsum pomum grande, durum, horridum, & à cæteris generibus distans sapore ferino, quem ferme in apris nouimus, quæ euentissima causa est nominis. Quarta auctoritas Sandalidum, à similitudine appellatarum. Iam in Æthiopiæ fine quinque earum, nec plures arbores tradunt, non raritate magis, quàm suauitate mirabiles. Ab his Caryotæ maximè celebrantur, & in cibo quidem, sed & succo vberimæ, ex quibus præcipua vina Orienti, iniqua capiti, vnde pomo nomen. Sed vt copia ibi atque fertilitas, ita nobilitas in Iudæa, nec in tota, sed in Hiericunthe maximè. Quamquam laudatæ, & ex Archelaide, & Phaselide, atque Liuiade, gentis eiusdem conuallibus. Dos his præcipua succo pingui lactentibus, quodamque vini sapore, vt in melle prædulci. Sicciores in hoc genere Nicolai, sed amplitudinis præcipuæ: quaterni cubitorum longitudinem efficiunt. (Quidam legunt quaternum cubitorum lōgitudinem efficiunt, ad miraculum vsque Nicolaos euehentes) Minus speciosæ, sed sapore Caryotarum Sorores, ob hoc Adelphides dictæ, proximam suauitatem habent, non tamen eandem. Tertium ex his genus Pareton, nimio liquore abundat: rumpitque se pomi ipsius, etiam in sua matre ebrietas, calcato simile (nempe ruptum & velut obritum calcatu.) Suum genus è sicciore turba Dactylis, prælonga gracilitate, curuatis interim. In totum arentes Thebaides, atque Arabicæ, macrøque corpore exiles, & assiduo vapore torrente, crustam verius quàm cutem obducunt. In ipsa quidem Æthiopia friatur (tanta est siccitas) & farinæ modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice ramis cubitalibus, folio latiore, pomo rotundo, sed maiore quàm Mali, amplitudine, Cycas vocant. (Coicas Theophrastus, cap. 16. lib. 1. historiæ: hodie Coccus, qui in Æthiopiam nauigant: officinæ, Nucem Indicam, de qua post hac seorsim tractabimus.) Triennio maturescunt. Sempërque frutici pomum est, subnascente alio. Thebaidis fructus ex templo in cados conditur, cum sui ardoris anima: ni ita fiat, celeriter expirat, marcescitque non refoctus furnis. Ex reliquo genere Plebeia videntur. Syri & Iuba tragemata appellant. Nam in aliqua parte Phœnices, Ciliciæque, populari etiam nomine à nobis appellantur Balani. Earum quoque plura genera. Differunt figura proceritate, ac fructus, rotunditate. Differunt & colore, nigriores ac rubentes. Nec pauciores ficu traduntur colores. Maxime tamen placent candidi. Distant & magnitudine, pro vt multi cubitum effecere. Quidam sunt non ampliores Faba. Quas Plinius in Caryotorum genere Nicolaos vocat insigni amplitudinis, ab Augusto ita primum nominatas fuisse, in honorem Nicolai, Peripatetici Philosophi, crebro eas ad illum misitantis auctor est Athenæus. Plutarchus Augustum tradit Nicolaum Peripateticæ familiæ Philosophū amore singulari prosecutū fuisse, claris moribus, & egregia indole præditū quidē, sed strigosa corporis proceritate, rubicundo vultu, à quo maximas, pulcherri-
māsque Phœnico balanos siue Palmulas Nicolaos appellauit. Eorundem Paulus meminit, quo loco in epithema ex vinaceis *πολινχας νικολάους δλέα* conicere iubet. Visuntur Palmæ arbores in multis Italiæ, & Galliæ Narbonensis hortis,
& viri

Cor. Emb.
122. libr. 1.
Dioscor.

Lib. 14.
in questio.
Conuiual.

Libr. 7.
Locus.

& viridariis, eximia magnitudine, ac speciosa proceritate, sed vel steriles, vel fructum non percoquentes. Non enim nisi in calida regione proueniunt, quæ vero fructum maturent, nusquam nisi in feruida. Ferunt in Hispaniæ maritimis fructum, vt ait Plinius, verum immitem: dulcem in Africa, sed statim euanescentem. Nascuntur & in Creta, Cypro, Africa, Ægypto, Phœnice, Syria. Iudæa verò inclyta est Palmis. Venetias Palmarum fructus ex Syria, & Alexandria Ægypti aduehuntur, atque etiam ex Neapoli, illuc prius ex Numidia importati. Arbor hæc, vt scribit Theophrastus, solum arenosum amat, & falsum (ἀλμυρὸν, vox deest in nostris exemplaribus) Quare vbi tale non sit agricolæ salem aspergunt. Quod autem tali loco delectentur, illud argumento est, quod vbicumque Palmarum copia sit, arenosa est terra. Huiusmodi enim in Babylone esse dicitur, in qua Palmæ proueniunt, in Libya, Ægypto, Phœnice, & Syria Caua, quaque regionis suæ parte Indi plurimas habent, in arenosis tantum locis nascuntur quæ conseruari possunt, in aliis seruari non possunt, sed putrescunt (Nam sic emendanda Græca exemplaria, καὶ φοινίκη καὶ τῇ σὺρτα τῇ κοίλῃ, καὶ καθ' ὅν τῶν ἰνδοὶ πλεῖστας τυγχάνουσιν ἔχουσιν, ἐν μόνοις τόποις ἀμμώδεσιν εἶναι, τὰς διναμένους θησαυρίζουσι. τὰς δ' ἐν τοῖς ἄλλοις δ' διαμένειν, ἀλλὰ σῆπε οὐδ' : quorum nonnulla Gaza omisit, qui sic conuertit, Syriæ quoque Cauæ cognominatæ, tribus tantum in locis arenaceis eas gigni, quæ condi reseruarique possunt: reliquas autem quæ cæteris in locis proueniunt, minimè durare, sed protinus putrescere) virides autem suaves esse, atque ita consumi. Amant etiam maximè rigationem. Palma perpetuò viret, florétque vèrè, autumno vnà cum Ficubus fructus maturescit. Decerpitur maturus, & immaturus, Dioscoride auctore. Medio, inquit, maturitatis vigore autumno decerpi solet, Arabicæ Myrobalani similis, Pomaris cognomine, colore viridi, & odore Mali cotonei, quod si ad maturitatem peruenire sinatur, Phœnicobalanus fiet. Sed quod Palmæ fructum medio maturitatis vigore decerpi Ruellius in sua versione dixit, in Græcis ita habetur. Τρυγᾶται ὅ μὲς ἡς τῆς καλὰ τὴν ὁ πῶραν ἀκμῆς sic enim legendum, & id vidit Lacuna, cum scriberet, iudicent eruditi, an sic potius sint vertenda, Decerpitur autem in medio vigore autumnii. Cornarius sic interpretatus est. Decerpitur ex Palma fructus in medio vigore, sub, caniculæ. Est enim ὁ πῶρα, inquit, exortus Canis principium, secunda videlicet pars æstatis, vt Galenus in Apho. Hippocratis scripsit, quo tempore immaturus adhuc ille Palmæ fructus decerpitur. De hoc immaturo & maturo Palmæ fructus, eadem quæ Dioscorides, Plinius tradit his verbis. Myrobalano in vnguentis similem proximūque vsum habet Palma in Ægypto, quæ vocatur Adipfos, viridis, odore Mali Cotonei, nullo intus ligno. Nam quod idem alibi scripsit, in huius arboris fructu prima nascitur Pomis caro, postea lignum intus, hoc est semen eius: Argumentum quod parua sine hoc reperiuntur in eodem palmite.) Colligitur autem paulo antequam incipiat maturescere. Quod relinquitur Phœnicobalanus vocatur, & nigrescit, vescentésque inebriat. Dixit autem præcedenti capite Troglodytis, & Thebaidi, & Arabiæ, quæ Iudæam Ab Ægypto determinat, communis est, nascens vnguento, vt ipso nomine apparet. Quo item indicatur, & glandem esse arboris, Heliotropio, quam dicemus inter herbas, simili folio, fructus magnitudine Auellanæ nucis. Hæc cum de Myrobalano quæ Dioscoridi est βάλανος μυροβαλάνη, idest glans vnguentaria, & μυροβάλανον ἀραβικὴν, Myrobalanum Arabicam, dici inter omnes constet, ipsam tamen Plinium vix nouisse ex eo perspicuum esse potest, quod Myrobalano in vnguentis similem proximūque vsum habere Palmam quæ in Ægypto vocatur Adipfos, & cætera, scripserit. Non

Li. 13. ca. 4.

Li. 2. H. R. cap. 8.

Tempus.

Lib. 1. c. 125.

Embl. 122. Li. 1. Diosc.

Li. 3. aph. 14

Li. 12. ca. 22.

Li. 4. ca. 154.

enim ille Palmæ fructus Myrobalano similem in vnguentis vsum habet, sed similis est, vt Dioscorides ait, Arabicæ Myrobalano, figura videlicet, & magnitudine, quæ nucem Ponticam refert, velut etiam Plinius testatur, & Dioscorides libro quarto asserit, vbi Balanum Myrepficam vocat, quam hoc loco Arabicam Mirobalanum. Gulielmus tamen Rondeletius olim præceptor meus, in examinandis his rebus perspicacissimus Arabicam Myrobalanum cum qua immaturum Palmæ fructum Dioscorides comparat, vnguentariam esse non arbitrabatur, sed flauam catharticam, citrinam officinarum, in iis Ægypti locis frequentem, in quibus gignuntur Phœnicobalani. Qui Plinium à calumnia defendere conantur aiunt, cum scripsit Ægyptiæ Palmæ similem Myrobalano & proximum vsum esse in vnguentis, de Elate Palmarum hoc intellexisse, qua in spissamenta vtuntur vnguentarij. Nisi codex mendosus esset, in quo pro Phœnicobalano Myrobalanum legimus, vehementer errasse Plinius videretur, libro vigesimotertio cap. quinto, ac fructus illos confudisse, quo loco scribit, Palma, quæ fert Myrobalanum, probatissima in Ægypto. Ossa non habet reliquarum modo in balanis (colliguntur enim immaturæ priusquam nucleus intus gignatur.) Aluum & menses sistit in vino austero, & vulnera conglutinat. Non enim Palma fert Myrobalanum, sed alia arbor quam Dioscorides Myricæ similem dixit, Theophrastus Myrto, Plinius folio simili. Heliotropio, & medicas vires hoc loco Myrobalano à Plinio attributas, Dioscorides palam immaturo Palmæ fructui adscribit, vt dicemus. Palmæ fructus immaturus, à Dioscoride vocatur *πῶμα*, quæ vox potionem significat, Plinio Adipfos dicitur, quod sitim eximat. Quum autem sint qui peculiare quoddam Palmæ genus Adipson vocatum, à Plinio Myrobalanum officinarum esse volunt, hi perspicuè refelluntur à Dioscoride, qui eidem Palmæ & Poma immaturum, & Phœnicobalanum maturum fructum tribuit: & ab ipso etiam Plinio, qui quæ Dioscorides de Pomate immaturo, eadem aperte de Adipso transscripsit, idque quod Adipso maturum succedit Phœnicobalanum vocari scripsit. Quare in his Plinij verbis, Palma in Ægypto quæ vocatur Adipfos, & cætera. Palma pro fructu, non pro arbore vsurpatur. Palmæ Ægyptiæ viridem ac immaturum fructum Plinius nullo intus ligno esse dicit, quod tamen de eodem scribens Dioscorides omisit. At Aristoteles etiam in libris de plantis, citante Athenæo *φοίνικας ἀνδρόχους* habet, quos quidem *εὐνέχους* vocant, alij *ἀπυρήνους*. Meminit & *ἀπυρήνων* Theophrastus, vt diximus, atque etiā Aëtius, *θηβαϊκὴ ὁ φοίνιξ*, inquit, *καρυωτὸς, ὁ μὴ ἔχων ὀστέον, εἴτε φύσῃ τοῖς ὅσιν, εἴτε ἐπιτεχνήσῃ τινὶ γεγονώς*. Quibus verbis indicat non omnes id genus Palmas natura esse carere, sed arte sic parari. *Καρυώλον* autem dixit, Caryotam Varro-
Vires & Temper.
 lib. 1. ca. 125. ni, itémque Plinio appellatam. Nondum maturus Palmæ fructus auctore Dioscoride, acerbus est, & adstringens: contra alui fœminarumque profluvia in vino austero bibitur: hæmorrhoidas sistit: vulnera glutinat illitu. Phœnicobalani recentes plus siccis adstringunt: capitis dolorem afferunt: copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis & dysentericis vtilis in cibo: illinuntur cum cotoneo, & cerato cœnanthino vesicæ vitiis. Caryotæ præsertim esu, faucium asperitati medentur. Thebaicarum decoctum potu æstuationem sedat (sic Ruellius, sed cum Græcè legatur *παύει καύσωνα*, rectius interpretari videtur Lacuna, Sedat febrem causonem, & Cornarius sedat febrem ardentem) vires recreat cum hydromelite veteri sumptum: cibo idem faciunt, fit ex eis vinum ad eadem conueniens. Decoctum per se potu, & gargarizatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei Palmarum
 cætero

cæterorum more cremati in crudo fictili, & vino restincti, cinere loto spodij vicem efficiunt, miscenturque in Calliblephara. Vim adstringendi habent, spiracula cutis obductu suo claudunt: contra oculorum vnam, & pustulas, palpebrarumque defluuia, cum nardo effectum præbent: corporis excrecentias cum vino reprimunt: vlcera ad cicatricem perducunt. A vitibus oleis que proxima nobilitas palmis, inquit Plinius, inebriant recentes: capitis dolorem afferunt, minus sicca, nec, quantum videtur, vtilis stomacho: tussim exasperant: corpus augent. Succum decoctarum antiqui pro hydromelite dabant ægris ad vires recreandas, sitim sedandam, in quem vsum præferebant Thebaicas. Sanguinem quoque excreantibus vtilis, in cibo maximè. Illinuntur Caryotæ stomacho, vesicæ, ventri, intestinis. Cum cotoneis, cera, & croco suggillata emendant. Nuclei Palmarum cremati in fictili nouo, cinere loto, spodij vicem efficiunt, miscenturque collyriis, & Calliblephara faciunt addito Nardo. Idem mox de Palma Ægyptia. Aluū & menses (Dioscorides *ῥοῦν γυναικείον* habet, id est profluuium muliebri) sistit in vino austero, & vulnera conglutinat. Elate siue Spatha, inquit Dioscorides, in spissa menta vnguentarij vtuntur. Vis ei adstrictoria, sistit vlcera quæ depascunt: laxatos artus committit: tota miscetur cataplasmatibus, & malagmatis: prodest præcordiis, imbecilli stomacho, & iocinori affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum denigrat capillos, si assiduè affricetur: datur bibendum congruè renum, vesicæ, & viscerum vitiis: vuluæ ac ventris fluxiones sistit: scabiem cum Resina & Cera sanat, si viginti diebus recens apponatur. Inuolutus in Elate fructus Elate etiam appellatus, ab aliquibus Borassus, adstringit, & Spathæ effectus præbet, non sic vnguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit quæ Borassus. Hac in re Plinius valde hallucinatus est. Cum enim Elaten, siue Spathen etiam Palmam totius arboris nomine appellatam legisset, ea re fortasse deceptus, peculiarem arborem Palmam Elaten, siue Spathen constituit, ipsamque medicinæ conferre germina, folia, corticem scripsit: quum tamen omnem medicinam ab ipso traditam vnica pars quæ fructus Palmarum inuolucrum est, præstet, vt ex Dioscoride diximus. Quidam tamen Plinij causam tuentur, rectèque ab eo dictum volunt, Palmæ Elaten, siue Spathen, sic enim legunt, conferre medicinæ, germina, nempe surculos quibus inhaerent flores, & fructus: Folia, nimirum florum quos obtegit, & corticem suum, extimum, qui floris ac fructus inuolucrum est. Plinij hæc verba sunt. Palma, siue Elate, siue Spathæ medicinæ confert germina, folia, corticem. Folia imponuntur præcordiis, stomacho, iocinori, vlceribus quæ serpunt, cicatrici repugnantia: Psoras cortex eius tener cum Resina & Cera sanat diebus viginti. Decoquitur & ad testium vitia. Capillum denigrat suffitu, partus extrahit. Datur bibendus renum vitiis & vesicæ, & præcordiorum, & capiti, & neruis inimicus. Vuluæ ac ventris fluxionem sistit decoctum eius. Item cinis ad tormina potus in vino albo, in vuluarum vitiis, vel, vt aliqui legunt, in Vuarum vitiis, efficacissimus. Vuas enim iacentes, & laxiores insigni vi siccandi quam habet, reprimat, & adstringit. Idem antea de ipsa arbore longè grauiore errore dixit, Elaten cum Abiete, quæ etiam Elate Græcis dicitur, confundens. Est præterea arbor ad eadem vnguenta pertinens, quam alij Elaten vocant, quod nos Abietem, alij Palmæ Spathen: sic enim legendum. Non parua est Galeno in Palmis differentia. Quædam enim sunt sicca, & adstringentes, vt Ægyptiæ, aliæ molles, humidae & dulces, vt quæ Caryote appellantur. Præstantissimæ autem hæc in Syria & Palestina nascuntur, in Hierichunte. Reliquæ omnes Palmulæ inter hæc duo

Lib. 24. c. 4.

Cap. 5.

Lib. 1. c. 126.

Cornar.
Embl. 123,
li. 1. Diosc.

Lib. 23. c. 5.

Cap. ult. 12.

Li. 2. Alim.

genera sunt mediæ. Difficiles autem sunt concoctu, capitiq[ue] dolorem inferunt: verum ex his aliæ magis, aliæ minus sunt humidæ ac dulces, siccæ atque adstringentes. Verum constitutis extremis iam omne quod in medio est, facillimè cognoscet. Nulla certe ex ipsis est, quæ non dulcedinem quandam & adstrictionem habeat. Siquidem Caryotæ exiguæ adstrictionis, Thebaicæ obscuræ dulcedinis sunt participes. At succum quidem dulcem nutrire, austerum autem gratum esse stomacho, & ventrem sistere ostensum est. Palmulæ si largiùs sumantur, omnes concoctu sunt difficiles, & capiti dolorem afferunt: quædam autem & morsus cuiusdam sensum ori ventriculi inducunt. Succus autem qui ab ipsis in corpus distribuitur, crassus quidem omnino est, habet autem & lentoris copiam, cum Palmula ipsa pinguis fuerit, sicut Caryotæ. Quum autem dulcedo tali succo mista fuerit, celerrimè quidem hepar ab ipsa obstruitur. Læditur autem maximè ab ipsarum esu, quod aut inflammetur, aut scirrhus obsideatur: post hepar autem & lien obstruitur, ac læditur. Multò autem maximè Palmulæ virides, si paulo largiùs sumantur, ad omnia sunt noxiæ, ac dulces quidem succum habent calidiorem, adstringentes frigidior. Quin & Palmulæ virides sicut Ficus flatus gignunt. In regionibus autem non admodum calidis Palmulæ haud perfectè maturescunt, adeo ut reponi queant: quo fit ut cum homines cogantur ipsis viridibus vesci, crudis succis impleantur, & rigoribus qui ægrè calefiant, & hepatis obstructionibus prehendantur. Declarat hoc Historia cuiusdam Galeno Coartanei, qui Alexandriæ Palmulis immaturis per complures dies ante & post balneum satiatus, absque febre sæpius horruit, ac riguit. Phœnix arbor, eodem auctore, adstrictoriæ facultatibus omnibus suis partibus est particeps. Igitur ramorum succus austerus est, ex aquea substantia tepida, & terrea frigida constans. Similis facultatis est Encephalos, hoc est cerebrum esui aptum. (Serapio Bdelij secundum genus id esse tradit.) At fructus eius & maximè dulcis non paucam habet caliditatem. Cæterum cum edendo sit, multo est vsui, non tantum foris impositus, ubi quid roborare & desiccare, contrahere, stipare densareque consilium est, sed etiam tanquam cibus sumptus & simul cum aliis, & per se. Porro quod Elaten vocant, tenerum illud Palmæ germen, eandem cum cerebro eius facultatem obtinet. Quod verò velut integumentum eius est, adstringentem etiam qualitatem habet. Verum plus quam dicta omnia exsiccat, utpote quod essentiæ consistentia illis siccius est, & minimum habet humiditatis. Itaque iure utuntur illo ad vlcerum putrescentia, miscētque medicamentis articulos plus iustò laxatos contrahentibus, Ad hæc medicamentis hepaticis & stomachicis, seu intro sumantur, seu foris admoueantur. Sed & radix plantæ desiccatoriæ citra morsum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam. Peruenerant iam ad eos vicos, inquit Xenophon, è quibus iussu ducum suorum commeatus capsandi erant. Plurimum illic & frumentum, & vinum è Palmulis erat, potu quidem suaue, sed graue capiti, acutumque ex elixis Palmulis paratum. Palmarum fructus quales in Græcia videre non licet, famulis apponebantur: Seligebantur, quas seruarent dominis, magnitudine & pulchritudine admirabiles, aspectu prorsus electro similes. Eas quidem arefactas in bellariorum vsum reponebant. Milites eo primum in loco Palmarum cerebrum esitarunt, omnibus cui detractum id fuisset, exarescentibus, admirantibus multis eius cibi speciem, ac suauitatem quandam peculiarem, quæ tamen valde caput tentat. Nicander in Georgico. Pullulantes in Palma stolonas excindunt, Cerebrumque afferunt expetitur cibum adolescenti

Li. 8. suppl.

Athenæus
lib. 14.

ſcentibus. Diphilus Siphnius tradit Palmæ cerebrum implere, alimentiq; mul-
 tum præbere, grauare, difficile in corpus distribui, ſiti excruſiare, ventrem
 ſiſtere. Alexandri milites, ait Plinius, Palmis viridibus ſtrangulati ſunt. In
 Gedroſis id factum eſt Pomi genere: alibi copia euenit. Eſt enim tanta mu-
 ſteis ſuauiſſas, vt ſinis mandendi non niſi periculo fiat. Palma victoriæ ſym-
 bolum eſt, quod vt Ariſtoteles & Plutarchus explicant, non cedit oneri quam-
 libet ingenti, nec infra ſectitur, pandaturæ, ſed contra pondus reſurgit.
 Ideoque ferè in coronariis certaminibus aliud præmium quàm Palma non
 dabatur, vt refert Pauſanias. In Oriente funes validos è Palmæ foliis fieri
 ſcripſit Plinius, eoſque in humore vtiliores eſſe. Inter permulta Palmarum
 genera idem Plinius Chamæropas recenſet, eas Theophrastus χαμαιρίπες
 vocat, copioſas in Creta, ſed magis in Sicilia, folio latiore ac molli, ad vi-
 tilia vtiliſſimo, dulci medulla in cacumine, quod cerebrum vocant: exem-
 pta illa viuunt, quod non aliæ: cædua illarum ſylua, germinat rurfus, etiam
 ſi ab radice ſuccifæ ſint. Eius generis putat illam eſſe Dalechampius, quæ
 hîc appicta eſt. Nascitur in maritimis, cubiti ferè altitudine, aliquando
 etiam grandior, in teneri germinis conceptu abdito, veluti cerebri globo,
 ſuauiſſimi guſtus, multis tunicarum inuolucris operto, quæ partim ſunt
 corticoſa & coriacea, partim capillacea, quædam ruſa, alia aliis ſuperpoſita,
 & denſius ſtipata. Ex horum medio contextu folia erumpunt cubitum lon-
 ga, anguſta, dura & coriacea. Cerebrum id Tuberibus, & Carduis, Cinaræq;
 echinis, & aliis id genus delitiis ſaporis ſuauiſſas præfertur. Cerebrum id
 Græci vocant ἐγκέφαλον, vt diximus, Serapio corrupta voce Ceſilionem, Itali
 Ceſaglione. Ex foliis colligatis ſcopæ ſunt, excutiendo pulueri qui menſis, &
 ſcamnis inſidet. Texuntur & ex iis ſportæ & caniſtra. Matthiolus etiam hoc

Athen. lib.
 14.
 Lib. 13. c. 4.

Li. 16. c. 24.

Lib. 12. c. 4.
 Cap. 8. 2.
 Hiſt.

Forma

PALMA CHA-
 marops Plinij.

CHAMAERIPHES, SEV
 Palma humilis Matthioli.



Palmæ

Palmarum genus humile pumilumque depinxit, quod in Silicia copiosissimum
 prouenit, & in maritimis Senensibus, cubiti altitudinem parum excedens, fo-
 lio cæteris simili, sed minore, breuioreque: flores edit ex obliquo, è capillacea
 quadam coma emergentes, è quibus bacca racematim prodeunt. Pars
 radici propinquior in globosum extuberat germen, quod cere-
 brum vocant, innumeris ferè inuolucris circumseptum,
 tenerimum, sapidum, & ori gratissimum. Estur id se-
 cundis mensis cum pipere & salis momento Ci-
 naræ modo, & maximè gustui arridet.

Fiunt ex hoc Palmæ genere
 sportulæ, tegetes, &
 scopæ.





HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER QVARTVS,



*Quo describuntur, atque picta ostenduntur segetes, & legumina,
ac quæ cum iis in Agris nascuntur.*

TRITICVM, CAP. I.



PACA viridarij iam satis vmbra delectati, fructumq; pulcherrimorum & suauissimorum aspectu gustuque satiati, & recreati, hinc in Agrum trāseamus, & in eo liberiùs diuagemur, nō minora in eo quàm quouis alio in loco naturæ rerum miracula contemplaturi. Agrum quod in eo aliquid agatur Varro dictum putat, vel, vt Donatus, inquit, quòd in eo multa sint agenda. Contra Quintilianus ex Græco nomine *ἀγρός* deductum esse scribit.

Lib.1.ca.10.

Agrum hīc intelligimus, qui hominū opera, atque industria ad permagnas in vita vtilitates colitur, quique plerūque compendium, vt ait Columella, nunquam nisi si cæli maior vis, aut prædonis incessit, detrimentum adfert. In eo igitur potissimū natura indicabitur frugum, quæ sunt Segetes & Legumina: de quorum vitiiis quoque dicetur: sunt enim nimis multa, in quæ fruges degenerant. Sunt & quamplurimæ plantæ, quæ in agris sponte nascuntur, de quibus etiam hīc agetur: quibus nonnullas adiunximus, quæ etiam in incultis & cessantibus Agris proueniūt. Horum omnium, siue ad hominum cæterarūque animantium alimenta, & voluptates, siue ad salutem & morborum remedia procreata sint, natura diligenter hīc explicabitur. Ac primū de frumentaceis dicemus. Sunt autem frumentacea quæcunque geniculato culmo, & arundinaceis constant foliis, semēque panificio & panibus aptum in spicis, aut iubis producant. A Tritico ordiemur omnibus notissimo atque vtilissimo. Græcis *τῦρος*, Latinis Triticum dicitur, quod tritum ex spicis sit, auctore Varrone, Arabibus *Henta*, *Henchā*, *Hantha*, Italis *Fourmento*, & *Grano*, Germanis *Vueyssen*, Hispanis *Trigo*, Anglis *Vueet*, Belgis *Teruue*, Gallis *Froument*: voce ex frumento Latino deflexa. Sed frumentum apud Latinos Tritico, & frugis nomen frumento latiùs patet, quod his verbis docet Plinius. Sunt autem duo, prima earum (Frugum) genera, Frumēta, vt Triticum, Hordeum, & Legumina, vt Faba, Cicer. Est enim Fruges quicquid ex fructu terræ sato in alimōniam nostram vertimus. Frumentum à fruendo, id est vescendo dictum, quod culmus

Nomina

Lib.18. c.7.

Dere rust.
cap.48.
Genera
Lib.8.Hist.
cap.4.

culmus extulit, inquit Varro, vel quicquid ex se aristas emittit, auctore Seruio, Græcè σῖτος. Theophrastus differentias multas à regionibus, viribus, satus temporibus, ex eo quod largiùs, aut parciùs fructificent, ex diuersarum partium varietate, & diuerso habitu, ex crescēdi celeritate, & tarditate, atque ex aliis sumptas enumerat his verbis: Πολλὰ δὲ γένη καὶ τῶν πυρῶν ὁθὺς ἔστιν, ἀπὸ τῶν χωρῶν ἔχοντα τὰς ἐπωνυμίας: ὅιον λιβυκοὶ, πόντιοι, θράκες, ἀσύριοι, αἰγύπτιοι, σικελοὶ. Διαφέροντες δὲ καὶ ταῖς χροιαῖς, καὶ τοῖς μεγέθεσι, καὶ τοῖς εἶδεσι, καὶ ταῖς ἰδιότησιν. ἔχουσι δὲ ἐν ταῖς δυναμέσιν, ταῖς τε ἀλλαῖς, καὶ μάλιστα ταῖς πρὸς τὴν σίτησιν, τινες καὶ ἀπ' ἄλλων τὰς προσηγορίας, ὅιον καγχρυδίας, γλεψὺς, ἀλεξάνδρως ὧν ἀπάντων ἐν τοῖς εἰρημηδαῖς τὰς διαφορὰς ληπνέον. ἔχ' ἡκηστὰ δὲ οἰκίστον, εἴ τις λαμβάνοι τὰς τοιαύτας οἶον εἴσιν οἱ μὲν πρῶτοι, οἱ δὲ ὀφιοί. Καὶ δαξεῖς, καὶ πολύχοι. οἱ δὲ καὶ ὀλίγοχοι (qui locus, cum apertè mendosus sit & mutilus, ex ipso contextu, & Gazæ interpretatione sic planè restituendus est. Καὶ δαξεῖς καὶ πολύχοι. οἱ δὲ ἀναξεῖς καὶ ὀλιγόχοι) καὶ μεγαλοτάχυες, οἱ δὲ μικροτάχυες. Καὶ οἱ μὲν ἐν κάλυκι παλλήν χρόνον, οἱ δὲ ὀλίγον ἐχόμενοι, ὥπερ ὀλιβυκός. Καὶ κάλυμον οἱ μὲν λεπτόν, οἱ δὲ παχυν. Καὶ λεπτόν ὁ λιβυκός ἔχει, παχυν δὲ ὁ καγχρυδίας. ἔτι δὲ, χιτώνας οἱ μὲν ὀλίγους ἔχουσιν, οἱ δὲ πολλὰς, ὥπερ ὁ θράκιος. Καὶ ὁ μὲν μονοκάλεμος, ὁ δὲ πολυκάλεμος, καὶ μᾶλλον δὲ καὶ ἥτιον. ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τι παρὰ πλῆσιν τέτοις, ἢ τοῖς πρότερον εἰρημηδαῖς, καὶ τὰς δυναμῖς. αἱ γὰρ τοιαῦται φυσικώτεραι διόξαιεν ἂν εἶναι τῶν διαφορῶν. ἐν αἷς καὶ τὸ τῶν τεμνῶν, καὶ τῶν διμνῶν, καὶ εἰτιγένος ἐν ἐλάτῃσιν ἡμέραις τελεῖται, καθάπερ φασὶν εἶναι περὶ τὴν Ἑβόαν, οἱ τετταράκοντα ἡμέραις ἀπὸ τῆς σπορᾶς ἀδρυμόνοι, καὶ τέλος ἴχουσι. εἶναι δὲ ἰχυρὸν τέτον καὶ βαρυν, ἔχ' ὥπερ τὸν τεμνὸν κέρον. Διὸ καὶ τοῖς οἰκίσταις παρέχον. Καὶ γὰρ ἐδὲ πῖτυρον ἔχον πολὺ. παυσιώλιος μὲν οὖν καὶ τάχις εἰς τελείωσιν ἔτος. εἴσι δὲ διμνῶν τινες, οἱ περ, καὶ ἐκ σικελίας ἐκομίσθησαν εἰς ἀχαΐαν, ὀλιγόχοι δὲ, καὶ ὀλιγόγονοι, καὶ κοῦφοι κατὰ τὴν προσφορὰν, καὶ ἡδεῖς. Καὶ ἄλλοι δὲ τινες οἱ περὶ Ἑβόαν εἴσι, καὶ μάλιστα ἐν τῇ καρυσίᾳ τεμνῶν δὲ πολλοί, καὶ πανταχῶς. κέφοι γοι καὶ ὀλιγόχοι, καὶ μονοκάλεμοι καὶ τὴν ἔκφυσιν, καὶ τὸ ὅλον ἀσθενεῖς. κουφώλιος μὲν οὖν, ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν, πυρὸς ὁ πονηικός. Βαρύτερος δὲ τῶν εἰς τὴν ἐλλάδα παρὰ γινομένων, ὁ σικελός. τέλει δὲ ἔτι βαρύτερος ὁ βαυλός. σημείον δὲ λέγουσιν, ὅτι οἱ μὲν ἀθληταὶ ἐν τῇ βοιωτίᾳ τεμνιχοίνικα μάλιστα ἀναλίσκουσιν: ἀθωάζει δὲ ὅτον ἔλθωσι, πενθημιχοίνικα ῥαδίως. κοῦφος δὲ καὶ ἐν τῇ λακωνικῇ. τέλει μὲν οὖν ἔτι ταῖς χώραις, καὶ τῷ ἄερα τὸ αἶλιον. ἐπεὶ καὶ περὶ τὴν ἀσίαν πόρρω βάκλων, ἐν μὲν τινὶ τόπῳ ἔτις ἀδρὸν εἶναι φασὶ τὸν σῖτον, ὥστε πυρῆνος ἐλαίας μέγεθος λαμβάνειν, ἐν ᾧ τοῖς πτωσώλοις, καλεσμένοις ἔτις ἰχυρὸν, ὥσ' ἔτις πλεῖστον προσενέγκοιτο διαρρήγωνας. Id est, Tritici quoque genera sunt multa quæ à regionibus cognominantur, vt Libycum, Ponticum, Thracium, Assyrium, Ægyptium, Siculum, quæ & colore, & magnitudine, & specie, & proprietate à sese differunt. Quibusdam etiam ex viribus tum aliis, tum iis maximè quæ ad cibum pertinent, quibusdam, & ab aliis differentiis nomina sunt indita: vt Cachrydiæ, Stelengydi, Alexandreo, quorum omnium differentiæ ex supradictis accipiendæ. Nec absurdum fuerit, si hinc differentiæ sumantur, vt aliud precox sit, aliud serum: & aliud quod multum augetur, largèque fructificat: aliud quod parum augetur, parcèque fructificat: aliud spicam magnam, aliud paruam emittat: aliud in folliculo diu, aliud breui maneat, vt Libycum: aliud Calamo tenui, vt Libycum, aliud crasso constet, vt Canchrydiæ. Præterea aliud tunicis paucis, aliud multis vestiatur, vt Thracium. Item aliud vnicalamum sit, aliud multi calamum, & hoc quod plures paucioresue calamos edat. Similiter si quid aliud his, aut illis quæ prius diximus simile sit. Etenim eæ magis esse naturæ consentaneæ videntur, quàm vllæ aliæ. In quibus est & trimestrium & bimestrium genus, & si quod aliud paucioribus diebus perficitur: quemadmodum genus quoddam esse aiunt in Eubœa, quod quadraginta diebus à sato augefcit, & perficitur, esseq; id firmum ac graue, nec trimestris modo leue: quare seruis id præberi, & furfuris multum non habere. Id quidem rarissimum est, & celerrimè maturatur.

Sunt

Sunt quædam bimestria, quæ ex Sicilia in Achaïam aduecta sunt, quæ parum fructificant, parumque fœcunda sunt, sed in cibo leuia & iucunda. Alia quædam sunt in Eubœa, & maximè in Carysto. Trimestria verò multa, & vbique. Leuia hæc, & parum fœcunda, & vnicalama sunt in ipso exortu, atque in totum infirma. Leuissimum igitur, vt semel dicam, Triticum Ponticum. Grauiissimum eorum quæ in Græciam transfuehantur, Siculum. Sed eo grauius est Bœoticum. Indicum esse asserunt, quod Athletæ, qui in Bœotia ternos semisextarios vix consumunt, cum Athenis fuerint, facile quinos consumunt. Leue etiam est, quod in agro Laconico prouenit. Horum caussa, & regionibus, & aëri adscribenda. Nam & in Asia trans Bactra quodam in loco, adeò grande frumentum esse aiunt, vt nuclei Oliuæ magnitudine granum sit. In Pissotis adeo firmum, vt si quis plurimum comederit, disrumpatur. Hæc Theophrastus: quorum multa transcripsit Plinius, rectèque dixit Tritici plura esse genera quæ fecere gentes: nullumque Italico comparandum esse candore, ac pondere, citata etiam & ad verbum translata Sophoclis Poëtæ sententia in fabula Triptolemo, Frumentum Italicum ante cuncta laudante.

Lib.18. c.7.

Et fortunatam Italiam Frumento canere candido.

Montanis modo, inquit Plinius, comparetur Italiæ Agris externum, in quo principatum tenuit Bœotia, deinde Sicilia, mox Africa. Tertium pondus erat Thracio, Syrioque, deinde Ægyptio. Græcia & Ponticum laudauit. Plurimis tunicis Thracium Triticum vestitur, ob nimia frigora illi plagæ exquisitum. Quod verò dixit, Est & bimestre circa Thracium sinum, quod quadragesimo die quàm satum est maturescit: mirumque nulli frumento plus esse ponderis, & furfuribus carere. Vtitur eo & Sicilia, & Achaia, montosis vtrâque partibus. Eubœa quoque circa Carystum, Theophrastus aliter habet. Scribit enim, vt diximus, esse Tritici genus bimestri celerius maturescens, vt in Eubœa, quod intra quadraginta dies perficitur. Esse & Bimestria, quæ ex Sicilia in Achaïam transportantur. Esse & eiusmodi in Eubœa, maximè in Carysto. Præterea à Theophrasto dissidet, cum ait. Tradunt in Bactris grana tanta magnitudine fieri, vt singula spicas nostras æquent, cum scribat Theophrastus *περὶ τὴν ἀσίαν τὸ ῥῆμα Βάκλων ἔτιος εἶναι ἄδρον τὸν σῖτον, ὥς τε πυρρῆνος ἐλαίας μέγεθος λαμβάνειν*. Id est, in Asia trans Bactra adeo grande gigni frumentum, vt nucleo Oliuæ par sit magnitudine. Dioscorides duo duntaxat Tritici genera proponit: alterum recens, perfectè maturum, & colore luteo: alterum *τεμνηναῖον*, id est Trimestre, quod ab aliquibus *σηλάνιον* appellari dixit: hac voce etiam Trimestre significante. *Τῆλες* enim significat *ἐν τῷδε τῷ ἔτει*, id est, hoc ipso anno, quod Dores *σηλές* dicunt, vnde *σηλάνιος* *πυρρὸς* est, vt exponit Galenus, *ὅ ἐκ τῆς ἐνεστηκῆτος ἑλῆς, τῆς ἑστῆς, ὁ κατὰ τὸ ἔαρ ἐπαρμυγνός*, hoc est Triticum huius præsentis anni, nempe vère satum. Plinius à Græcis Trimenon vocari scripsit. Hoc igitur vt vère satum æstate colligitur, ita prius illud superiore anno in Autumno seminatum, sequentis æstate demetitur: quod quidà cæteris præfert Columella, cum ait. Si verò locorū & cæli conditio patietur, quāto maturius seuerimus, tanto cōmodius proueniet. Neque enim est vllum, sicut multi crediderunt, natura Trimestre semen: quippe idem iactum Autumno melius respondet. Hoc autem reprehendit Plinius his verbis. Est & Bimestre circa Thracium sinum, quod quadragesimo die quàm satum est maturescit, mirumque nulli frumento plus esse ponderis, & furfuribus carere. Vtitur eo & Sicilia, & Achaia, montosis vtraque partibus. Eubœa quoque circa Carystum. In tantum fallitur Columella, qui ne Trimestris quidem proprium genus existimauerit esse, cum sit antiquissimum. Verum non satis id videtur Plinius expendisse, quod mox subiungit Columella. Sed sunt nihilominus

Ibidem.

Lib.2.c.78.

In Glos. in Hipp.

Lib.18. c.7.

Lib.2. c.9.

Lib.18. c.7.

quædam, inquit, aliis potiora, quæ sustinent veris tepores, vt Siligo, & Hordeum Galaticum, & Halicastrum, granumque Fabæ Marficæ. Nam cætera robusta frumenta semper ante hyemem feri debent in regionibus temperatis, nec quod antea tertium Tritici genus Trimestre appellauit, & Siliginis genus esse dixit.

Cap. 6. li. 1.

Verba eius hæc sunt. Tritici genera complura cognouimus. Verum ex his maximè ferendum est, quod Robus dicitur, quoniam & pondere & nitore præstet. Secunda conditio est habenda Siliginis, cuius species in pane præcipua, pondere deficitur. Tertium erit Trimestre, cuius vsus agricolis gratissimus. Nam vbi propter aquas, aliâque causam matura satio est omissa, præsidium ab hoc petitur. Id genus est Siliginis. Triticum aliter ex Dalechampi sententia diuidemus, vt eius duo summa sint genera vsu frequentiora. Vnum candidum, vulgo

Lib. 2. ca. 6.

nostro *Blé blanc* nuncupatum, alterum rufum, veterum *ωυρὸς*, quasi *ωυρρὸς*, vulgo *Blé rouge*, Columellæ Robus à flauo colore quem Rubeum prima syllaba producta & Robeum veteres appellarunt, Græci *ξανθὸν*, vnde Seruio Nitela, mus agrestis, robeus, & in illud Vergilij, *Sanguineis frontem moris*, &c. Robeus color Diis attributus, & in veteri inscriptione, Vt Prætor cui hæc regio sorti obuenit, litaturum se sciat, aliûsue quis magistratus, Volcanalibus. x. Cal. Septemb. omnibus annis, vitulo robeo, & verre. Rursus Tritici candidi rufiq; duæ sunt nobis notæ species. Vna cuius spica aristas habet, altera cuius spica mutica est,

De rer. rust.
cap. 48.

id est aristis caret, auctore Varrone. Priorem nulla peculiari appellatione nostri designarunt: posteriorem *Blé motet* vocant, quasi Triticum muticum. Quod autem spica aristis vallata sit, vel iisdem careat, quidam frugis & naturæ proprietati, quidam agri conditioni macri, pinguis, tenuis, crassi, stercoreati, minimè lætificati tribuunt. Triticum enim candidum aiunt in pingui, crasso, & stercoreato agro spicam muticam ferre, in macro, tenui, & non lætificato aristis horridam. Adiciunt quidam cæli statum quo seges adolescit: humidior enim spicam aristis carere, sicciore aristis muniri. Addunt alij & ventorum flatus, quoniam si vehementiores irruant, aristas decutiunt: si leniores spirauerint, aristas spicarum collisu non frangunt. Sunt & qui segetis densitatem raritatemq; non nihil ad id valere putant. Nam densiore segete, spicas muticas, rariore, cum aristis prodire. Ex candido Tritico panem lautiorum, quàm ex rufo pistores fieri asserunt, sed leuiorem, & qui minùs alat: atque in hoc genere muticum aristato præferunt, etiam si mutici granum gracilius sit, & minus: plus enim farinæ à mutico reddi, & furfuris parû: farinæ verò minus ab aristato, & furfuris plurimum. Præterea mutici farinam candidissimam esse, ac niueam, aristati nigriorem, ac sordidiorem. Candidum Triticum. Latinorum Siliginem frugem esse, ve-

Siligo Tri-
tici species

Lib. 18. c. 8.

terum scriptorum testimoniis confirmari potest, qui Siliginem Tritici genus faciunt, &, vt Triticum nostrum candidum, candore ac leuitate cæteris generibus præstare literis prodiderunt. Plinius frumenti genera esse tradit, non eadem vbique: neque vbi eadem sunt iisdem nominibus non appellari. Vulgarissima, Far quod Adoreum veteres appellauere, Siligo, Triticum. Siliginem propriè dixerim, inquit, Tritici delicias: candor est, & sine virtute, & sine pondere, conueniens humidis tractibus, quales Italiæ sunt, & Galliæ comatæ.

Ibidem.

Cap. 9.

E Siligine laudatissimus panis, pistinarumq; opera laudatissima: (quanquam hîc Siligo tam pro candidissima Tritici farina, quàm pro Tritici genere accipi possit.) Siligo nunquam maturescit pariter, & cætera. Columella Tritici genera complura cognouimus. Verum ex his maximè ferendum est quod Robus dicitur, quoniam & pondere & nitore præstat. Secunda conditio est habenda Siliginis, cuius species in pane præcipua, pondere deficitur, &c. Sed sunt nihilo-

Cap. 10.

Lib. 1. ca. 6.

Cap. 9.

minus quædam aliis potiora, quæ sustinent veris tepores, vt Siligo, & Hordeum,

deum, & cætera. Cato è Siligine Amylum fieri docuit. Plinius Amylum ex omni Tritico, ac Siligine, sed optimum è Trimestri. Cæterum Siligo non solum frugem Italianam, hoc est Triticum delicatissimum, & candidissimum, leuissimumque, sed etiam medullam grani, id est farinam puriorem à furfure secretam, ac castratam significat. Iustum est, inquit Plinius, è grano Campanæ quam vocant castratam, è modio redire sextarios quatuor Siliginis, & mox: è Pisana autem Siliginis sextarios quinque. Clusina Aretinæque etiânum sextarios Siliginis assumunt. Idem fortasse Celsus his verbis significat. Ex Tritico firmissima Siligo, deinde Simila, deinde cui nihil ademptum est, quod *ἀντόπυρον* Græci vocant: infirmior est ex polline, infirmissimus cibarius panis. Iuuenalis.

De re rust.
cap. 73.
Lib. 18. c. 7.

Lib. 18. c. 9.

Lib. 2. ca. 18.

Satyr. 5.

Sed tener & niueus, mollique Siligine factus

Seruatur domino.

Præterea Siligo pro Tritici vitio à veteribus videtur vsurpari, ut à Columella, cum scribit. Nec nos tanquam optabilis agricolis fallat Siligo. Nam hoc Tritici vitium est, & quamuis candore præstet, pondere tamen vincitur. Et mox. Nec tamen ea longè nobis, aut magna difficultate requirenda est. Nam omne Triticum solo vliginoso post tertiam sationem conuertitur in Siliginem. Olyram Græcorum Siliginem Latinorum esse, Plinio auctore, scripserunt Hermolaus, Budæus, Ruellius. Sed id apud Plinium non reperio: scribit enim. Vulgarissima Far, quod Adoreum veteres appellauere, Siligo, Triticum. Hæc plurimis terris communia. Arinca Galliarum propria, copiosa, & Italis est. Ægypto autem ac Syriæ, Ciliciæq; & Asiæ, ac Græciæ peculiaris Zea, Olyra, Tiphe. Et paulo post. Ex Arinca dulcissimus panis, ipsa spissior quàm Far, & maiore spica, eadem & ponderosior. Raro modius grani non xv l. libras implet. Exteritur in Græcia difficulter: ob id iumentis dari ab Homero dicta. Hæc enim est quam Olyram vocat. Et satis multo post. Olyram Arincam diximus vocari. Ex quibus perspicuum est Plinio Arincam Gallorum, & Græcorum Olyram eandem esse, à quibus Siliginem semper disiunxit. Hæc de candido Tritico, ac Siligine. Nunc de Tritico rufo dicamus. Huius præter Aristatum & muticum multa alia sunt genera, pro diuersa locorum natura, sitique. Haud procul Lugduno in pagis monti alto, siue Aureo propinquis, Tritici genus colitur, quod incolæ vocant *Blé rûne*, & *Gros Blé*. Spicam fert muticam, granum maximum, & amplissimum, sed ad conficiendum panem minùs vtile. Ex eo decorticato puls fit cum lacte, in cibo rusticis gratissima: quamobrem illud ad eas delicias non segniter colunt. Sunt qui Far, siue Adoreum veterum esse putant, ex cuius pulte Romanos diu victitasse Plinius literis sic prodidit. Ex omni genere durissimum Far, & contra hyemes firmissimum. Patitur frigidissimos locos, & minùs subactos, vel æstuosos, sitientesque. Primus antiquis Latio cibus, magno argumento in Adoreæ donis, sicuti diximus. Pulte autem, non pane vixisse longo tempore Romanos manifestum, quoniam inde & pulmentaria hodièque dicuntur. Far Clusinum aduectum ex Italia, & in agro pingui satum, creuit ad hominis altitudinem, vel etiam procerius: caule sex geniculis distincto: foliis totidem radiculis quinque vel sex, fibrosis: spica palmum longa, prælongis aristis horrida, folliculis amplis, densis, multiplicibus, granum ambientibus longum, exile, profundius lacunatum, aridum, quod vix exculpitur, ac euoluitur, ut non immerito dixerit Plinius in Area non exeri, ut Triticum, Hordeum, Siliginem, sed tostum purgari ut Panicum, Milium, quæ cum folliculis cruda seruntur: ac ideo Far minimè tostum cum vaginulis ad satum seruari. Sed & Far pro omni Frumenti genere à veteribus vsupatum fuit. Hinc Far Triticeum pro Tritico, & Far Hordeaceum pro Hordeo, & Far Adoreum, Columellæ. Post hæc cauea

Lib. 2. ca. 9.


Corol. 101.
lib. 2. Diof.
li. 5. de Aff.
Lib. 2. c. 21.
Lib. 18. c. 8.
Cap. 10.

Li. 22. c. 25.

Lib. 18. c. 8.

Lib. 8. ca. 5.

FAR CLVSIVM

Dalechampij.

Lib. 18. c. 7.

Lib. 2. c. 83.
& 84.

Lib. 18. c. 10.

Lib. 2. ca. 9.

cum matre claudendi sunt, inquit hic scriptor, & farre Hordeaceo cum aqua incocto, vel ad oreo farre vino asperso modicè alendi. Et paulo post. Vualabrusca de vepribus immatura lecta, cum farre Triticeo minuto cocto obiicitur esurientibus. Videtur & Plinius Far pro farris farina, siue pulte, siue grano decorticato accepisse, cum scribit. Populum Romanum farre tantum è Frumento ccc. annis vsum Verrius tradidit. Porrò decorticati farris grani crassior farina ex qua pultes fiunt, Græcis *κείμων* dicitur, Latinis Simila. Gallis *Froumentee*, quibusdam Italico nomine vsurpato *Semoule*, quasi Simila. Dioscorides tamè ex Zea, sicut ex Tritico Crimnon fieri testatur, atque etiam ex Olyra. Aliud Tritici rufi genus est *ἐξέστικον*, Galli vocant, *Froument à six quarres*. Quidam, vt circa pagum Erium in Allobrogibus, *Blé rignet*, quasi rigidum Triticum, quòd rigidissima firmissimèque spica sit, sex ordinibus distincta, cum in aliis quatuor tantum reperiantur. Item aliud Tritici rufi genus est, quod Lugdunen-

ses rustici appellant *Blé qui truche*, quoniam eius spica in alias finditur, & spicas minores adnatas veluti ramos spargit: *trucher* enim in ramos diuidi Lugdunenses Coloni dicunt. Plinius ramosum Triticum vocat. Fertilissima, inquit, Tritici genera, Ramosum, aut quod Centigranum vocant. Contrà circa Matisconem in humidissimis Sebusianorum tractibus deterrimum & strigosissimum Tritici genus prouenit, grano longo, exili, subatro, multis glumis vestito. Rustici vocant *Long gran*, id est longum granum, famèque vel egestate compulsi panem ex eo conficiunt. Alij suis & gallinis edendum obiiciunt. Ad Brizam Thraciam fruges hæc videtur accedere, de qua suo loco dicetur. Quare rectè scripsit Columella Triticum solo vliginoso conuerti in Siliginem: maximè si idem solum macrum sit & exile. Triticum enim candidum nostras idoneis locis genitum rufo præfertur: humida & macra terra satum granum reddit exile, ex quo panis sit niueus, ad delicias quàm ad corporis firmitatem aptior: quoniam parum admodum nutrit. Idem granum pinguioribus agris redditum pristinam naturam recuperat. Nec in hoc solum Tritico, sed etiam in rufo siue Robo, mutatio huiusmodi deprehenditur. Nam in humido, nebuloso, tenuique solo, quale est in montibus Segusianorum, vulgo *De Forestz*, Robus nascitur deterior, subater, in panificio minùs gratus, adeo vt panem ex Secale ibidem genito, pani ex eo Tritico parato multi anteponant. Idem in Allobrogibus euenit, cum Robi præstantissimum genus, quod *Toufelle* vocant, in montanis agris ferunt. In Sebusianis, vulgo *Bugey*, (Allobrogum Sabaudianorum gens est, nunc Oeno ac Rhodano fluminibus clausa, olim longiùs patens) Tragus frequentissimus est: incolæ seruatis prisca nominis vestigiis *Blé Turquet* vocant. In montosis aridis, & ventosis locis nascitur, & absque noxa nebulas, pruinas, gelicidia, aliasque cæli iniurias in montosis locis frequentes tolerat, ventisque agitato firmè granum retinet. Spica cum maturuit, aristis densis horret, & cæruleo colore nitet, contrà quàm in aliis frugum generibus, quarum spicæ fluescunt.

genus Spica carulea.



T R I T I C V M.



uescunt. Haud multum alimenti præbet. Est apud varias gentes multiplex varietas frugum, quarum numerum, nominumque anticipem significationem persequi difficile foret. Triticum omne radicibus multis, ac prætenuibus exit, Ex his virescens herba elicitur, quæ suis nixa fibris sensim adolefcit, culmosque ex vna stirpe rotundos, sæpe plures erigit, in quibusdam generibus ternis, in aliis quaternis, in farre senis, ut ait Plinius, geniculis distinctos, qui primum vaginis iam quasi pubescentes includuntur, ex quibus cum emerferint, fundunt frugem in spica, quæ si mutica non est, in Hordeo ac Tritico, tria habet continentia, granum, glumam, aristam. Spica quam rustici antiquitus vocabant Specam, à spe videtur nominata, auctore Varrone: eam enim quod sperant, ferè serunt. Granum dictum, quod est intimum solidum à gerendo: id enim seritur, ut spica gerat Frumentum, non ut glumam, aut aristam. Gluma folliculus est grani, à glubendo, quod eo folliculo deglubitur granum. Aristam, quæ ut acus tenuis, longa, eminet è gluma, quoniam arefcit prima, tanquam grani theca sit gluma, & apex arista. Sed est Triticum tum candidum, tum rufum, quod aristas nullas habet. Candidum Triticum crassiore, firmiore, ac solidiore culmo semper assurgit, spicamque rectam, nec pendulam gerit: quare rubigini minùs obnoxium est, quod & de Siligine tradit Plinius. Sed minùs Siligo quàm cætera Frumenta, in stipula periclitatur, quoniam semper rectam habet spicam: nec rorem continet qui rubiginem faciat. Candidum Triticum gaudet solo crasso, pingui, humido, stagnis vicino, ut eorum nebuloso vapore perpetuò humescat. Gaudet & conuallibus montium, in quas imbribus aucti torrentes pinguiorem terræ partem ex montibus deuehant: macrum, frigidum, & perflatum solum respuit. Triticum rufum, pingue, crassum, non humidum solum desiderat.

Forma.

Lib. 18. c. 7.

Lib. 1. c. 48.


Tempus.

Varro quindecim diebus Frumentum in vagina esse scribit, quindecim florere, quindecim arefcere. Post florem crassescit, inquit Theophrastus, maturaturque intra quadagesimum diem: cum tardidissimè octauo à satumense plurima parte metitur, Ægyptiis, ut scribunt, septimo. Nobis hybernum Triticum Septembri, aut Octobri mense

TRITICVM SPICA

*Mutica.*Vfus.
Lib.2.c.78.

Li.1. Alim.



feritur, trimestre Martio. Florent Maio & Iunio: Iulio demetuntur. Sed trimestre dictum, quod tertio fere à fatu mense maturascit, nostro in orbe, quinto tandem, hoc est Iulio mense legitur. Quare illa citius, vel serius pro varia regionum temperie maturari necesse est. Nunc de frequentissimo Tritici, tum in alimentis, tum in medicina vsu differendum. E Tritici generibus ad secundæ valetudinis vsum optima Dioscoridi sunt recentia, & perfectè matura, colore luteo, deinde trimestria. Galenus inter Tritica plurimum habere alimenti scripsit, quæ densa sunt, totamque substantiam habent adeo compactam, vt dentibus vix diuidi queant. Talia enim exigua mole, corpora plurimum nutriunt. Quæ verò dentibus faciliè franguntur, fractaque rara & laxa apparent, magna mole, exiguum reddunt alimentum. Quod si utrorumq; parem modum pendere libuerit, quæ densa sunt, multo grauiora esse comperies. Hæc autem sunt, colore etiam, laxis flauiora. Explorare autem horum naturam non simpliciter oportet, superficiem exter-

nam duntaxat contemplando, sed diuidendo quoque, vt dictum est, ac frangendo: multa enim quæ extrinsecus flaua ac densa videntur, rara intus, laxa, albæque spectantur. Ex horum similitudine confectus panis, inquit Dioscorides, plus alit quàm cibarius. E trimestrium farina panis leuiorem cibum præbet, & qui faciliè in membra digeratur. In hac Dioscoridis oratione Ruellius τὸν συγκομιστὸν panem non rectè cibarium conuertit. Est enim panis συγκομιστὸς, idem qui αὐτόπυρος, cui nihil furfuris decessit, quem ex toto comportatum expressit ad verbum Cornarius. Id declarat Galenus cum ait. Est autem & alia panum species, inter has planè media, quos αὐτοπύρους appellant, medici autem veteres ipsos nominabant συγκομιστὸς. Cæterum quòd hi fiant ex farina à furfure non separata, furfurèque à pura farina non separato, omnibus est perspicuum: hinc enim nomina ipsis indiderunt: αὐτόπυρος quidem, quod αὐτὸς ὁ πυρὸς, id est totum ipsum Triticum in panificium cedat: συγκομιστὸς autem, quòd ad ipsos cōficiendos tota farina nusquam à furfure seiuncta συγκομίζεται, id est comportatur. Cibarium verò panem Celsus quasi plebeium in quinto genere firmitudinis alimentorum ponit, αὐτόπυρον autem in tertio, vt ex loco ante à nobis citato intelligere licet. Apuleius sordidum panem & cibarium pro eodem posuit, de descensu Psyche ad inferos loquens. Panis purissimus Galeno silignites, id est siligineus dicitur. Huic proximus est semidalites, id est, similaceus. Verùm σεμδαλὶς Græcum nomen est, & antiquum, σιλήνης verò, neque Græcum est, neque ipsum aliter possum exprimere. Inter panes igitur siligineus plurimum alimentum præstat, post ipsum autem similaceus. Tertio loco medius, qui & συγκομιστὸς, & αὐτόπυρος dicitur. Quartum post hunc est sordidorū genus: in quibus furfuraceus est postremus: minimūque omnium nutrit, & omnium maximè per aluum sub-

det.

det. Quinque igitur panis genera Galenus facit. Primum Siligniten, idest Siligineum, ex siligine: Secundum semidalitem, idest Similagineum, ex similagine tritici farina, expositis que mox vocabulis, *σεμίδαλιν* quidem vocem esse Græcam asserit, ex qua similago à Latinis accepta, quæ & simila dicitur, *σιλίγγιν* verò non item, sed Romanam vt & ipse alibi testatur. Tertium genus est medium syncomistum siue autopyrum. Quartū sordidum magna ex parte ex furfuribus constans. Quintū furfuraceū. Quantum autem ad alimenti rationem attinet, idem planè Celsus his verbis exposuit. Ex tritico firmissima siligo, deinde simila, deinde cui nihil ademptum est, quod autopyrum Græci vocant. Infirmior est ex polline, velut alij legunt, deinde, simila: infirmior est ex polline: deinde cui nihil ademptum est, quem Græci *αὐτόπυρον* vocant, infirmissimus cibarius panis. Celsus igitur, nisi mendosus locus est, quartum panis genus infirmius in alimenti ratione esse tradit, ex polline confecti, quod Galenus τὸ τῶν *ρυπαρῶν* εἶδος, appellat, crassiolem, opinor, siue secundarium pollinem intelligens, siligine iam ab eo, tenuissimo cribro secreta. Hesychius *γυρύτην ἄρτον*, idest ex polline, quod *γύρυσ* dicitur, *αὐτόπυρον* interpretatus est. Sed quid sit pollen tritici siue pollin ex Plinio intelligere licet sic scribente. Similago ex Tritico fit laudatissima. Ex Africo iustum est ex modis redire semodios, & pollinis (primarij) sextarios quinque. Ita autem appellant in Tritico, quod florem in siligine. Præterea secundarii (sub. pollinis,) sextarios quatuor, furfurumque tantundem. Panes verò è modio similaginis cxxii. è floris (pollinis) modio cxviii. Pretium huic (sub. Africano Tritico,) annona media in modios farinæ (à furfure non purgata) xl. asses, similaginis castrata, (ab omni forde puræ) octonis assibus amplius, siliginis castrata duplum. Est & alia distinctio. Similago Tritici xvi. pondo panis reddere visa, (sub. eius modius,) pollin autem xxx. cum triente, & secundarij panis quinas selibras, totidem cibarij, & furfurum sextarios sex. Ex quibus Plinij verbis colligit Budæus Africum Triticum præstantissimum fuisse, ex cuius farina primum similago, quæ & simila dicitur, cribro tenuissimo à polline cernebatur, ita vt ex polline restante secundariam rursus veluti simillam separarent, & crassiolem rursus pollinem à furfuribus laxiore incerniculo succernerent, quem vt diximus, Celsus intellexit, quartum genus panis ex polline statuens. Turnebus cap. 18. lib. 30. Animaduers. in exemplari manuscripto illa Plinij verba sic legi docet. Est & alia distinctio semel tempore L. Pauli nata, Pondo panis reddere visa xviii. tertia xix. cum triente: quam lectionem & in meo codice manu exarato reperi, sed, vt arbitror, vitiosam. Simillam quidem, siue Similaginem, id esse si nos credimus, quod vulgus nuncupat *Simoule*, nimirum Triticum mola versatili decoratum, & in minutula grana confractum, vt fieri solet in æstuosis prouinciis, Aphrica, Sardinia, Balearibus insulis, & eiusmodi reliquis, non minus frequenter aut libenter eo cibo cum iusculis parato quàm pane victitantibus regionum illarum populis, à farina certè differt Simila, rectèque Plinius expendit, quantum pollinis siue farinæ, quantum Similæ Triticum reddat, & quot primarij aut secundarij panes è Simila pollinéue fiant. Est autem pollen, siue pollin, interdum à furfure purgata farina, cuius tenuiorem partem pollinem primum vocant: crassiusculam autem Pollinem secundarium, & cibarium. Aliquādo vero pollen dicitur leuissima farina è pistrinis ac moletrinis ob suam leuitatem tanquam euolans, & parietibus adhærescens, è qua fit tenacissimum gluten. Galli vocant *Fole farine*, quasi *vole*, à volando. Ex hoc polline fieri panem nusquam meminime legisse. Harum dictionum τῶν πολυσήμων intellectus multiplex valde profecto moratur lectorem, vt & siliginis nomen, quod nunc

Libr. 7. ph.
loc. ca. 1.

Lib. 2. ca. 8.

Li. 8. ca. 10.

Li. 5. de AE.

Li. I. Alim.

Li. I. Alim.

frumenti genus significat leuissimi, ac delicatissimi, nunc farinam purissimam, & tenuissimam, excussorio lineo spississimo transmissam. Similam siue similaginem cum siligine farina videtur confudisse Budæus, Galliæ nostræ decus, & clarissimum lumen, quod inter eas differentiam non didicisset, similaginis vsu fere Gallis Celtis ignoto. Nostri pistorum panificium venale in tria fere genera diuidunt: in primarium panem, qui candidus dicitur, Gallicè *Pain blanc*, & *Pain de bouche*, Lugdunensibus *De la miche*, in secundæ notæ panem, qui Ciuilis dicitur, *Pain bourgeois*, & *Pain de mesnage*, Lugdunensibus *Pain farin*, fit is è farina, pura quidem, & quæ nihil furfuris habeat, sed crassiore quàm Primarius: Tertium genus panis cibarius est, nostris, postremæ notæ Græcis Syncomistos, vel Autopycos, Plinio militaris, Lugdunensibus *Pain à tout*, in quo nihil furfuris, nihil farinæ detractum est. Farina ad Panificium præstantissima ea est, quæ non nimis molita, neque recens, neque vetus, neque crassi furfuris fuerit. Nam, quæ nimis molita est, furfuraceos Panes facit: quæ recentior, adscititiam molæ caliditatem retinet: vetus puluere, situ, carie, aut viroso aliquo odore labefactatur. Hæc deinde optimæ aquæ permiscenda, quæ ex laudatissimo fonte fluxerit, quæ pellucida sit, quæ neque cœnum, neque limum redoleat. Præterea fermentum triticeum addendum, non vetus, mediocris quantitatis, ne ex eius copia Panis ace scat. Iniiciendum & salis albi parum, vt Panis gustui gravior reddatur. Concoctu inter Panes sunt facillimi, inquit Galenus, qui plurimum sunt fermentati, & pulcherrimè subacti, quique in clibano igne moderato fuerint assati. Nam ignis ardentior primo statim occursum superficiem externam circumurens in testæ modum indurat: acciditque duplici nomine prauum panem fieri, priore quidem quod partem internam habeat crudam atque illaboratam, posteriore verò quod externam siccam habeat, ac præassatam, & testaceâ. Porro ignis moderato remissior panem minùs bene elaborat, sed ipsum crudiorum relinquit, & maximè partem omnem eius internam. Qui autem igne moderato longiore spatio per totos se ipsos æquabiliter assati fuerint, ij tū bellissimè in ventriculo concoquuntur, tum ad cæteras actiones quæ coctionem consequuntur, erunt aptissimi. Pessimi autem ij Panes sunt habendi, quibus nihil adest ante memoratorum. Puri panes fermento copiosiore indigent, omniumque maximè subigere eos oportet, nec statim post fermentum & subactum assare: diuturniorem iidem assationem postulant. Contrà furfuraceis paucum fermentum, leuis subactio, breue interuallum, breuiorque assatio sufficit. His adiiciendæ aliæ ex coquendi ratione panum differentiæ. Omnium optimi sunt, inquit Galenus, panes Clibanitæ, siue Cribanitæ, ad eum quem præscripsi modum, tum assati, tum ad assationem præparati. Cocturæ id genus Galli vocant *Cuire en laterrasse*, proximi ipsis sunt Ipnitæ, Furnacei, Gallis, *Cuicts au four*, eodem quo prædicti modo præparati. Sed quia in profundo panis hîc non æquabiliter assatur, ob id à Clibanite bonitate vincitur. At qui in craticula, aut sub cinere calido, aut in foci pavimento super pruna assantur, prauis omnes sunt, quoniam inæqualiter cocti sunt, partibus ipsorum extimis supramodum assatis, intimis autem crudis. Cæterum quoniam subcinericis cineres prauitatem aliquam aspergunt, hos panum omnium (si ipsis etiam cætera omnia ante pariter adfuerint) quod ad cocturæ saltem modum attinet, propemodum dixerim esse deterrimos. Panes *κλιβανίται* siue *κριβανίται* dicuntur Galeno, & aliis veteribus, qui in clibano coquuntur. Est enim Græcis *κλιβανος*, vel Atticè *κρίβανος*, Latinis Clibanus & Testus, tegmen testaceum nobis hodie æneum, sub quo calidi panes, placentæ, spiræ, & huiusmodi cætera prunis suppositis coquuntur. Panes *ἰπνίται*, furnacei, aut in furno cocti. Quare non recte Linacer panem

panem clibaniten apud Galenum in furno coctum interpretatus est, qui ipnites est, & clibanite deterior. Ante omnia panis bene fermentatus, & probe coctus erit inquit rursus Galenus cribanites, non ipnites. Hanc differentiam Plinius observauit de scilla loquens. Coquitur pluribus modis in olla, quæ coniciatur in clibanum aut furnum. Qui in craticula assatur panis, ἐσχάρτης Græcis nominatur nobis, seruata propemodum Græca voce, *Eschalete*, & *Gauffre*, Parisiensibus. Est autem Eschara ferreum instrumentum duabus veluti plagulis constans, craticulæ figura latius & altius incisus, quæ disparari, & rursus adduci proximè possunt, ut se contingant. Hæ cum igne propemodum candent, inferiori panis materia statim iniicitur, & admota appressaque superiore coquitur quod satis est, utramque sæpius ad ignem obuersando. Eo cocturæ modo fit & panis Obelias, quem vulgus eodem fere nomine vocat, *des Oblies*. Qui in foci pauimento super Prunis, ἐπ'ἀνθραξ, Athenæo. Qui sub cinere calido ἐγκρυφίας siue ἐγκρυπιός. Triticum Galeno primi est ordinis excalfacientium, sed neque humectare, neque siccare euidenter potest: habet etiam quiddam lentoris obstruentisque naturæ. Quod ex pane fit cataplasma vim habet magis digerentem, quàm quod ex tritico: nimirum cum & salem & fermentum panis adiuncta habeat. Fermentum enim vim habet attrahendi & digerendi ea quæ in alto resident. Plinius tamen historia citata triticum siccare ostendit. Sextus Pompeius, inquit, Hispaniæ citerioris princeps, Prætorij viri pater, cum horreis suis ventilandis præsideret, correptus dolore podagræ, misit in Triticum sese super genua: leuatúsque siccatis pedibus mirabilem in modum, hoc postea remedio usus est. Vis tanta est, ut cados plenos siccet. Scribit idem Plinius grana tritici ferro combusta, iis quæ frigus visserit præsentaneo esse remedio. Farinam ex aceto coctam neruorum contractionibus auxiliari: cum rosa verò & fico sicca, myxíque decoctos furfures tonsillis faucibusque gargarizatione prodesse. Paleam quoque tritici vel hordei calidam imponi ramicum incommodis experti iubent, quaque decoctæ sunt aqua foueri. Refert Galenus Crispi ad recentes in mento, siue alia faciei parte lichenas ex tritico medicamentum his verbis. Tritici grana multa in incudem imposito, deinde laminam æris igne candefactam tritico superposito, & resolutum ab eo liquorem calidum adhuc auferto, ac super lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus. Fit & auctore Matthiolo è tritici granis inter ferri laminas igne calefacti compressis oleum, quod ad vlcera sinus commendant. Sunt etiam qui eo vtantur ad pedum & manuum rimas, quas frigus excitauerit: item ad asperam cutim læuigandam. Sed de tritici viribus fusiùs hæc Dioscorides. Tritici genera cruda, inquit, in cibis teretes tineas gignunt: canum morsibus profunt mansa & imposita. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones. Item contra interaneorum inflationes: lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant. Græcè legitur, Τὸ ὃ πῖτυρον σινδὼς εἰ δριμύτι, λέπτρας ἀφίστησι καὶ ἀπλοσώμῃνον θερμὸν, καὶ πάσης φλεγμονῆς ἐν ἀρχῇ καὶ ἀπλοσώμα σύμφορον. μετὰ πηγάνυ ἀφεψήματος ἐψηθὲν, μάτους σπαργώντας πάντι. Id est, furfures autem cum acri aceto calidi admoti lepras eximunt. Incipientes etiam omnes inflammationes illiti leniunt. In rutæ verò decocto elixi, mammas turgentes sedant. Quo loco vetus codex habet non σπαργώντας, ut omnes vulgares, quod significat turgentes & luxuriantes, sed χονδριώντας, id est, instar cartilaginis induratas) viperarum ictibus auxiliantur, & torminosi profunt. Farinaceum fermentum calfaciendi extrahendique vim habet. Priuatim callos pedum, clauosque extenuat, & cætera tubercula furunculósque ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorum farina contra venenatos ictus cum aceto aut vino com-

modifsi

Lib.4.fani.
tuen. &
Li.8.meth.
Li.1.Antid.

Lib.20.c.9.

Lib.8. sim.
Vires &
tempera.

Li.22.ca.25.

Ibidem.

Li.5.ph.lo.

In libr. 2.
c. 78. Dios.

Li.2.ca.78.

Lacu.

modissimè illinitur : eadem si decocta in glutinis modum delingatur, cruentis excreationibus proderit : contra tussim & exasperatas arterias cum mentha & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydrelæo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & crudus & coctus cum aqua mulsa inflammationes omnes illitu mulcet, quoniam emollit, & quadantenus refrigerat, sed herbis succisue huic rei accommodatis admiscendus. Vetus panis aridus per se, & adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus illitu vetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & poline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidum ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum. Satis de tritico dixisse videri poteramus, nisi eius genera aliquot peregrina superioribus adiungenda essent.

TRITICVM INDICVM, CAP. II.

Histor. pla.
ca. 318.

In ca. 78. li.
2. Dioscor.

Forma
Indici.

TRITICVM Triticum hodie appellatur perperam, quod Indicum appellari debet. Nam ex Occidentis Indiis primum ad nos translatum est, non ex Turcia & Asia, vt credidit Fuchsius. Huius Matthiolo quatuor sunt genera, quæ granorum & spicarum duntaxat colore differunt. Aut enim rufescunt grana, aut nigricant, aut crocea sunt, aut subalbicant. In quibus hoc permirum videri debet, quod alia parte florem, alia fructum proferunt, cum stirpes omnes ibi fructum producant, vnde flos emicat. Triticum hoc radicibus firmatur multis, duris ac nervosis, sed minimè crassis, ex quibus calamus assurgit arundinaceus, inferiore parte crassus, ac purpureus, superiore paulatim extenuatus, rotundus, procerus, geniculatus, alba & fungosa medulla farctus. Folia sunt longa, lata, venosa, arundinacea. In calami summitate spicas fundit dodrantaes, iubæ ferè modo multiplices, procumbentes, muticas, & granis vacuas, flores tantum gerentes secales modo, nunc

TRITICVM INDICVM,
Fuchsioturcicum.



TRITICVM INDICVM
Matthioli.



luteo

luteo, nunc candido, nunc purpureo colore, ut fructus quem profert, siue frugiferæ spicæ coloratæ sunt. Culmi geniculis prægrandes veluti spicæ exeunt, multis foliaceis & membranosis tunicis velut vagina quadam obuolutæ, ex qua longi tenuēsque capilli prominent. Spicæ iam adultæ Piceæ arboris conum tum longitudine, tum crassitudine æquant, circa quas totas coaceruantur grana nuda, arctissimè sese stipantia, læuia, subrotunda, Pisi magnitudine, & in octonos aut denos versus ordine digesta. Hoc triticum Dodonæus Milium Indicum à Plinio appellari scribit. Indi hodie *Maliiz* vocant, feruntque hoc modo. In Agrum eunt aliquot simul recta linea dispositi, æqualitèrque distantes, acuto palo terram perforant dextra manu, & quatuor quinquèue grana, sinistra manu in vnumquodque foramen iniiciunt, pede altero foramina occludentes, ne psittaci semen depascantur. Atque ita ordinum passu distantias metientes, Agrum totum serunt retrocedentes. Verum ante sationem semen biduo aqua macerant, nec serunt nisi prius terra pluuia maduerit. Citò nascitur, & quarto in India mense demetitur. Est etiam huiusce frumenti peculiare genus, quod duobus tantum mensibus & feritur, & metitur. Quinetiam aliud est quod quadraginta tantum diebus à satione maturescit. Sed id minutius est, & infirmius, nec feritur nisi cum futuræ caritatis annonæ suspitio est. Triticum Indicum temperamento Tritico nostro simile esse videtur, nisi paulò calidius sit, id quod indicat panis ex ipso confecti dulcedo. Farinam reddit candidam, ex qua panes fiunt, crassiore tamen substantia ac magis viscida quàm nostri. Quare crassum succum gignunt, quique faciliè obstruere possit. Eius farina iis cataplasmatibus commodè miscetur, quibus pus mouendi facultas inest: nam suo lentore meatus obstruens apostematibus suppurandis peridonea est.

Li. 4. ca. 10.
Li. 18. ca. 7.

Genera.

Usus et
Temper.

FRUMENTVM SARACENICVM,

Erysimum Theophr. & Irio Plinij, CAP. III.



LIVD frumentum Saracenicum, vocatur, quoniam ex Africa primum delatum sit, à Gallis *Blé Sarrazin*, ab Italis quibusdam *Saracino*, ab aliis *Formentone*, quasi vile frumentum. Germani superiores *Heydenkorn*, inferiores *Bockvueydt*, siue *Buckvueydt*, id est hirci aut fagi triticum appellant, Græcè *τραγόπυρον* & *φηγόπυρον* dixeris, Latine *Hircotriticum*, & *fagotriticum*, quod faginam glâdem forma triquetra & colore sordido quodammodo referat, licet multo minus sit. Peritiores ac diligentiores herbarij frugem hanc *Erysimum* esse volunt Theophrasti, Plinij vero, Latinorumque, *Irionem*. Erisimi semen Theophrasto cap. 17. 2. histor. feracissimum est, ut & Milij, Papaueris Cymini, quamuis minutum. Eodem libr. capit. 19. *Erysimum* & *Sesamum*, nullum animal, dum virent, attingit, propter amarorem, qui in siccis deponitur, & sic evanescit, ut tum ve-

Matth. in
cap. 78.
lib. 2. Dios.

sca sint. *Erysimum* frugi, nam oleris genus est alterum *Erysimum*, ac *Sesamo*, calamus ferulaceus est Theophrasto, lib. 9. hist. Plinio vero cap. 7. 18. *Sesamo* tantum.

tum. Eodem loco Plinius Irionis & Sefami sanguineum esse folium tradit. Huius quidem plantæ caules & surculi rubent, non folia. Erysimum fruges folio primum est subrotundo, quod tempore hederaceum euadit, verum acutius & mollius. Caulem edit fragilem, rotundum, inanem, bicubitalem, rubentem, foliosum. Florem edit paruum, candidum, racemosum, è quo semen triangulum, fordido colore nigricans, alba intus medulla. Seritur Aprili mense, Iulio metitur in calidioribus locis, adeo ut in iis bis anno proueniat. Id quod in multis Italiæ locis euenit. Rustici ex eius farina non solum panes conficiunt, sed etiam pulmenta, quibus hyeme victitant. Pinsunt quoque idem in pila, & prisanam inde conficiunt, qua nonnulli vescuntur è carniū iure decocta: est enim cibus non ingratus, si rectè coquatur, nec adeo ut grana dissiliant in pultem, sed integra remaneant. Rustici qui circa Italiæ & Germaniæ fines degunt, pultem ex eo quam vulgari idiomate appellant *Polenta*, conficiunt: deinde massam in laticas & tenues portiones secant, & caseo butyróque conspersas in cibum sumunt. qui nec ingratus est, nec adeo ventriculum grauat, ut puls illa quæ ex Milij farina à siluiculis paratur, & quamuis flatus expers non sit, tamen non tam inflat quàm Phaselus, Faba, atque Pisum. Ex his perspicuum est eos valde hallucinari, qui id frumenti genus Ocymum vel Ocynum antiquorum esse putauerunt, pabulum iumentis purgandis aptissimum. In quibus est Tragus, qui non solum id Ocymum esse credit, quod seri consuevit pabulis pecorum, quia eo ita nutriantur, ut breui tempore hoc pastu mirum in modum saginentur, sed etiam huic frumento omnes tribuat vires, quas in Ocymo odorato inesse veteres tradiderunt.

Z E A,

CAP. IIII.

Li. i. Alim.
Nomina
Li. 18. ca. 8.



E A & Ζεΐα Græcis, auctore Galeno, Zea & semen Latinis, vulgo & Italis *Spelta*, & *Pirra*, dicitur. Zea, inquit Plinius, est Zea Italiæ copiosa in Campania maximè Semenque appellatur. Hoc habet nomen res præclara, propter quam Homerus Ζεΐδωρος ἄρουρα, dixit, non ut arbitrantur aliqui, quoniam vitæ donaret: quibus verbis Plin. vult Seminis appellationem ob excellentiam frugis datam esse, & Homerum Ζεΐδωρον ἄρουραν dixisse, quod Zeam ferret, non quod τὸ ζῆν donaret. Arabes *Hais*, Galli *Espeaute*, Hispani *Spelta*, Germani *Speltz*, nonnulli *Tinkel*, & *Dinckelkern*, nominant. Zea duum est generum auctore Dioscoride. Vna simplex: altera δίκοκος καλεῖται ἐν διυσὶν ἐλύτροις ἔχουσα συνεζευγμένον τὸ σπέρμα, idest, quæ dicoccos appellatur, quod in duobus folliculis coniunctum semen habeat, vel, ut vertit Ruellius, quæ in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit; ob id dicoccos appellatur. Ex quo perspicuum est falli eos, qui dicoccon interpretantur, cuius grana in singulis tunicis seu glumis gemina sunt, simplicem quæ in singulis tunicis singula grana habet. Zea veterum, inquit Matthiolus, illud est frugis genus, quod vulgo Italis *Spelta*, & *Pirra* dicitur. *Spelta* enim quod de Zea traditur, duum generum est: vna spicas profert simplicibus granorum versibus: altera duplicibus: Præterea quidam, ut Foroiulienses, *Speltam Pirra farra* vulgo appellant, quod ex ipsius deglubitis granis, ut veteres, ex Farre, halicam conficiant. Sunt & apud Insuæres qui *Speltam Algam* nominant, quasi Alicam, sicut & veteres decorticatam Zeam alicam vocauerunt. Adhæc Plinius Zeam Italiæ esse copiosam tradit, in Campania maximè, & Semen vocari. Cuius tempore cum fruges hæc copiosa in Italia fuerit, eius quoque prouentus ad hunc usque diem perdurare potuit. Hetrusci, veteres imitati, *Speltam* vulgo *Biada*, appellant. Nam ut ab antiquis Semen omnibus est feminibus commune nomen,

Lib. 2. c. 82.
Genera.

Fuc. c. 108.
Ruell. lib. 2.
cap. 19.
Dodo. libr.
4. cap. 2.

Lib. 18. c. 8.

men, ita apud Hetruscos *Biada* segetum omnium nomen, Zeæ ob frugis præstantiam inditum est. Zea itaque quæ vulgo *Spelta* dicitur, *Tritico* haud absimilis provenit, tenuiore tamen stipula, firmioréque. Verùm spica à *Tritico* differt, quod compressa planaque sit, granis tantum ex utroque latere prodeuntibus, aristis longis, ac tenuibus vallata. Maior Zea siue dicoccos, firmiore grandioréque culmo, & altiore spica provenit, gignitque bina duobus folliculis simul iunctis grana. Minor altera & monococcos, minore tum culmo, tum spica spectatur, in qua grana singula singulis includuntur folliculis. Zea in multis Italiae, Galliae, & Germaniae locis provenit. Nascitur qualicumque solo, etiam humidioré, quoniam folliculum, ut ait Columella, quo continetur firmum ac durabilem, aduersus longioris temporis humorem habet. Læto tamen pinguique melius proficit. Seritur, ut *Triticum*, Septembri vel Octobri mense: Iulio demetitur. Tradunt Zeam, inquit Plinius, cum sit degener, redire ad frumentum, nec protinus, sed tertio anno. Zea, inquit Dioscorides, plus quam *hordeum* alit, ori grata, digeritur in panificia, & minus quam *Triticum* nutrit, in quibus verbis pro *ευσταμος*, idest ori grata, ex fide veteris & inculpatissimi codicis *ευσταμαχος*, idest stomacho utilis, siue commoda, legendum, sicuti etiam legit Galenus hunc Dioscoridis locum citans, qui & de Zea hæc scripsit. Zea vniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici, & hordei. Itaque ex illis cognosci debet. Olim ut ex *Tritico* *Crimnon*, ita ex Zea *Chōdrus* siue *Alica* fiebat. Græcorum *χόνδρον*. Latinorum *alicam* esse declarant tum viri docti, qui conuertendis in Latinam linguam Græcis medicis *χόνδρον* Latinè *alicam* semper reddiderunt, tum posteriores Græci qui Latina voce *άλιξ* vsurpata, sæpe cōiūctim *χόνδρον* *άλικος*, dicunt. Aetius. τροφήν ὃ δίδοναι χόνδρον ἀλικος μετ' ὄινος λευκοῦ, & cæt. ac rursum: ἐνθρύνειν ὃ ἐν αὐτῷ ψίχας, ἢ χόνδρον ἀλικος ἐν αὐτῷ ἐμβλεψέον. Item alibi: τακῆναι ὃ χόνδρον ἀλικος μετ' ὕδατος θερμῷ ἐψημένον, & cætera. Sed id postea ex rei ipsius natura certius ostendemus. Videtur autem *alicam* Latinis ab alendo appellata esse, sicut *χόνδρος* Græcis ob excellentiam, idest granum dicitur. Deinde *χόνδρος* & *alicam* tum pro frugis specie, tum pro re factita, siue cibo, *Alica* ex Zea, *chondrus* è *tritico* composito à veteribus vsurpatur. Paulus. *Chondrus* *tritico* persimilis est, nisi quod glutinosior. Suidas. *χόνδρος* πυρῶ παραπλήσιος: γλίσχρος ὃ πλεον ἐκείνῃ. Galenus, *χόνδρος* ἐστὶ μὲν δὴ πρὸς τροφήν βελίσιον, καὶ θάπερ καὶ πυρὸς. Et mox, καὶ διὰ τοῦτο τινὲς ἐκ τῶν ἰσχυρῶς ξηρανόντων ἐνόμισαν εἶναι καὶ τοῦτο τὸ σπέρμα. Plinius de frugum generibus. Aliqui verna, milium, panicum, lentem, cicer, *alicam* appellant. Et paullo post, *Tunica* frumento plures, *hordeum* maximè nudum & *alicam*, *arinca*, *vetustus* codex habet, sed præcipuè *auena*. Nunc ex quibus frugibus, & quomodo fieret *chondrus* siue *alicam* explicandum. *Alica* fit ex Zea quæ dicoccos appellatur, inquit Dioscorides. Plus alit quam *Oryza*, aluum magis cohibet, stomacho longè utilior. *Alica* ex genere est *Tritici*, inquit Galenus, valenter nutrit,

Forma.
Matt. in c.
8. li. 2. Diosc.

Locus.

Tempus.

Li. 18. c. 10.

Lib. 2. c. 82.

Vires &
Temper.

Li. 1. Alim.

Lib. 6. sim.

Chōdrus
& alica.

Lib. 9. c. 10.

Ibid. ca. 12.

Ibid. ca. 29.

Libr. 7.

Libr. 8. sim.

Li. 18. ca. 7.

Lib. 2. c. 89.

Li. 1. Alim.

succumque lentum habet, siue in aqua duntaxat coctam cum mulso, aut vino dulci, aut etiam adstringente (nam singulis horum suo proprio tempore utimur) siue oleo saléque conditam sumas. Nonnumquam autem illi & acetum iniicitur. Præparatam eodem modo alicam medici chondroptissanæ cōfectionem appellant: quidam autem dicunt ex *χόνδρον πτισάνης*, idest ex alicæ ptissana ægrotum fuisse cibatum. Veterum nonnulli, ut Diocles & Philotimus, *πτισάνην πυρίνην*, idest ptissanam triticeam, alicam è Tritico confectam nominant. Qua propter eius nomen apud antiquos est rarum. Sunt autem & alia permulta semina prædictis quidem similia, non tamen eadem protinus specie, quæ partim in Hordei ac Zyphæ, partim in Zyphæ, olyræque, aut Olyræ & Tritici medio sunt loco: quædam vero ad Olyræ, alia ad Hordei aut Zyphæ, alia ad Tritici, ceu alia ad Panici, alia ad Milij naturam proximè accedunt, quæ nomina habent alia simplicia, ὥσπερ ἐν ἰταλίᾳ ἐξ οὗ τὸν χόνδρον ποιεῖσι, idest, ut in Italia ex quo Alicam faciunt. Quibus verbis nihil aliud quam simpliciter Zeam appellatam indicat, ex qua chondrum in Italia faciebant. Sed inter prima dicitur & alicæ ratio inquit Plinius, præstantissimæ saluberrimæque: quæ palma frugum indubitanter Italiam contingit vel, ut alij legunt, Italiæ contigit. Fit sine dubio & in Ægypto, sed admodum spernenda. In Italia verò pluribus locis, sicut Veronensi Pisanóque agro, in Campania tamen laudatissima, idem rursum. *Alica fit ex Zea, quam Semen appellauimus. Et alibi. Alica res Romana est, non pridem excogitata. Ex his intelligere licet alicam latinorum, χόνδρον, esse Græcorum, & eam non ex vno frugum genere paratam fuisse, sed quæ ex Zea & tritico fieret, peculiariter chondrum siue alicam appellatam. Cum enim chondrum, chondroptissanam, & ptissanam pyrinen, idest triticeam à veteribus dictam fuisse scribit Galenus, nihil aliud intelligit, quam quod chondrus instar ptissanæ decorticaretur, & comminueretur, atque postea eodem quo ptissana modo condiretur. Est autem ptissana propriè hordei decorticati appellatio, ut suo loco dicemus, qua cum aliis frugum generibus copulata, alia atque alia ptissanæ genera significantur: velut χόνδρον πτισάνην significat ex Zea decorticata ptissanam: πτισάνην πυρίνην, ptissanam ex tritico decorticato, ita ut tum chondrus, tum ptissana generalia nomina esse videantur frugum omnium siccatarum, & decorticatarum, quo sane modo alica quoque apud Plinium generale vocabulum videtur esse, quemadmodum apud Græcos chondrus, quo loco ille alicæ conficiendæ modum ostendit. Alica fit ex Zea, quam semen appellauimus, inquit. Tunditur granum eius in pila lignea: nam lapidis duritia conteritur. Nobilius, ut notum est, pilo victorum pœnali opera. Primori inest Pyxis ferrea: excussis inde tunicis, iterum iisdem armamentis nudata conciditur medulla. Ita fiunt alicæ tria genera, minimum, ac secundarium: grandissimum verò aphærema appellant. His Plinius alicæ parandæ modum docet, & tria eius ex Zea factæ genera ex contusionis magnitudine distinguit, minimum idque primarium, in minutissima grana tusum. Secundarium quod crassiusculè contusum est: grandissimum, maximæ inter ea molis, grano fere tantum exuto sua tunica, nec minutius trito, vnde etiam ἀφαίρεμα à cortice videlicet, siue tunicis ablatis est appellatum, vel quod tertium hoc genus sit tanquam reiectum purgamentum superiorum, quæ longe præstantiora sunt. Alia alicæ genera materiæ ex qua fit, diuersitate Plinius statuit his verbis. Alica adulterina maximè quidem fit ex Zea, quæ in Africa degenerat. Latiores eius spicæ nigrioresque, & brevis stipula. Et paullo post: Alia ratio ubique adulterandi. Ex tritico candidissima & grandissima eligunt grana, ac*

Li. 18. ca. 11.

Li. 22. c. 25.

Li. 18. ca. 11.

Ibidem.

na, ac semicocta in ollis postea arefaciunt sole ad initium, vel, ut alij legunt, ad indicium, rursusque leuiter aspersa molis frangunt. Ex quibus apparet alicam ex Zea tum vera, tum degenerante itemque ex tritico fieri, sicuti de chondron prius diximus. Ex his etiam Paulum Aegin. cum cæteris Græcis ac Latinis scriptoribus conciliare licet, qui chondrum ab alica ut diuersum aperte distinguit. Id quod nullam aliam ob causam fecit, opinor, quam ut ex frugum diuersitate, ex quibus frumentaceus hic cibus paratur, diuersas eius species constitueret, ac eum quidem qui ex tritico, ab eo qui ex Zea fit, diuideret, chondrum ex tritico factum appellans, quem Galenus chondroptissanam, & ptissanam triticeam dixit, alicam verò ex Zea paratam, usurpato nomine Latino, sic enim scribit. *Τῶν σιτωδῶν ὀνομαζομένων ὁ μὴν χούδρος τρόφιμος τε, καὶ γλίσχρου χυμῷ γεννητικός. ἀλλ' ὁ μὴν πλυσὸς μοχθηρὸς, ἐπεὶ περ ἐλοίμην παχυρόμηνος ἀνεφθός μὲν εἶ. Κρεῖττων ὁ χυλὸς αὐτοῦ ὅθεν χαλῶς ἐψηθεῖτος παραπλησίως ὡσιώσάνη ὁ δ' ἄλιξ τὰ μὴν ἄλλα χούδρῳ παρέοικεν, μᾶλλον δ' γαστρὸς ἔστιν ἐφεελικός.* Idest. Ex his quæ frumentacea nominantur, chondrus bene nutrit, & glutinosum humorem parit. Verum elotus prauus habetur, quoniam promptè crassescens inconcoctus manet. Probatur magis cremor chondri, si totus probe ptissanæ modo fuerit decoctus. Alica cætera quidem chondro similis est, sed aluum magis adstringit. Eadem de Chondro siue alica Galenus scripsit. Nempe bene nutrire, succum lentum habere, chondrum lentum instar glutinis, concreescere, ac densari & incoctum manere: meliorem succum eius esse, si probe coquatur ptissanæ modo. Veteres alicæ, ut tenerior & candidior esse, tum gypsum, tum cretam puteolanam miscebant. Eam ob sulphuris metall'a illic plerisque in locis conflagentia, sulphureæ qualitatis non expertem esse arbitrabantur: quare eius mistura alicæ candorem conciliare sese putabant, (sulphur enim vapore suo dealbat,) quod glutinosum in ea extenuare, humorem superuacaneum ex haurire, ut alica & sapore iucundior, & resiccata tenerior, coquibilior in ventriculo concoctu facilior, denique ad valetudinem commodior, ut quæ lentore detracto viscera minus obstrueret, Plinius cum alicæ ex Zea faciendæ rationem ostendisset, ut iam diximus, subiicit. Nondum habent candorem suum quo præcellunt, iam tamen Alexandrinæ præferuntur. Postea (mirum dictu) admiscetur creta, quæ transit in corpus, colorémque & teneritatem adfert. Inuenitur hæc inter Puteolos & Neapolim in colle Leucogæo appellato. Extatque D. Augusti decretum, quo annua vicena millia Neapolitanis pro eo numerari iussit è fisco suo, coloniam deducens Capuam. Adiecitque causam afferendi, vel ut alij legunt, præbendi, quoniam negassent Campani alicam confici sine eo metallo posse. In eodem reperitur & sulphur: emicantque fontes Oraxi, oculorum claritati, & vulnerum medicinæ, dentiúmque firmitati. Et mox de alica adulterina, de qua supra diximus. Pinsunt cum arena, & sic quoque difficulter deterunt vtriculos, fitque dimidia nudi mensura, (dimidio maior, quam si nudatum omnino granum esset,) Posteaque gypsi quarta pars inspargitur, atque ut cohæsit, farinario cribro subcernunt. Quæ in eo remansit, exceptitia appellatur, & grandissima est. Rursus quæ transit, arctiore cernitur, & secundaria vocatur. Item cribraria, quæ simili modo in tertio remansit, cribro angustissimo, & tantum arenas transmittente. In Geoponicis casiani Constantino attributis legimus alicæ arenam & gypsum miscere solitos fuisse veteres: sic enim illic scribitur. *χόνδρον πόησις. ζέας ὡσιώσον, καὶ ἐμβληθέν εἰς ζέον ὕδωρ, καὶ σιυεκπιασέον. ἐπειτα γύψον λευκὸν κοπλέον, καὶ εἰς λεπτὸν σιγέον, ἀμμου τε τῆς λευκολάτης καὶ λεπιολάτης τὸ τέταρτον, σὺν γύψῳ*

Lib. I. c. 78.

Li. I. Alim.

Lib. 18. c. 11.

Lib. 3. ca. 7.

μέρβι χ' α' ὀλίγον μινλίον, ἐπιπλίσσομένη τῇ ζείᾳ αὐθις. σκευαζέσθω ὃ ἐν ταῖς ὑπὸ κνώα ἢ μέραις, ἵνα μὴ ὀξύση. ἐπὶ αὐτῇ ὅσπας ἐπιπλίσσῃ, κοσκίνῳ κοσκινεύεσθω ἀδροτέρῳ. χέλλιστος ὃ ὁ πρῶτος σηοθεὶς γίνεται χόνδρος, δεύτερος ὃ ὁ ἐπὶ τοῦ τῷ, καὶ ἐλῳτῶν ὁ τρίτος. Idest, Chondri confectio. Zea tundenda, & in feruentem aquam iniicienda, atque exprimenda. Deinde tundendum gypsum album, & in tenuem pollinem redigendum, atque arenæ albissimæ & tenuissimæ quarta pars cum gypsi portione paulatim miscenda Zeæ, quæ iterum tunditur. Præparetur autem canicularibus diebus ne acefcat. Tusa autem tota Zea cribro incernatur densiore. Chondrus is optimus qui primo succretus fuerit, secundus qui post hunc, deterior tertius. Cum verò creta gypsumque citra periculum ac noxam in corpus assumi non possent, vt ea ab alica separarent, diligentissimè priusquam coquerent, lauabant, baculo variè in aqua agitantes, deinde quod in aqua supernatauerat residere sinentes, coquebant, vt apertè declarat Galenus in lib. Hippoc. De articulis, fracturæ narium curationem docentis. Idem innuit & Galenus, cum ait. Cæterum diligentissimè dum ex alica elota sorbitiones parantur, animaduertere oportet, & cætera. De Alicæ verò vtilitate hæc Plinius tradidit. Alicæ res Romana est, & non pridem excogitata, alioqui non ptissanæ potius laudes scripsissent Græci. Nondum arbitror Pompeij Magni ætate in vsu fuisse, & ideo vix quicquam de ea re scriptum ab Asclepiadis schola. Esse quidem eximiè vtilem nemo dubitat, siue eluta detur ex aqua mulsa, siue in sorbitiones decocta, siue in pultem. Et paullo post. Ptissanæ quæ ex hordeo fit laudes vno volumine edidit Hippocrates, quæ nunc omnes in alicam transeunt. Nec ab iis discrepant, quæ suprâ ex Galeno protulimus, vbi & variè ipsam per cocturam parari tradit, ex aqua sola nonnunquam coqui, ac ex vino mulso sumi. Id quod etiam testatur Martialis his versibus.

Li. 1. Alim.

Li. 22. c. 25.

In Xen.

Nos alicam, mulsum poterit tibi mittere diues.

Si tibi noluerit mittere diues, eme.

Lib. 8. sim.

Aut vino dulci, siue adstringente, aliquando oleo & sale condiri, aceto insuper affuso, quod etiam alio in loco declarat his verbis. Alicæ est alimentum optimum, quemadmodum etiam triticum. Sed non est huius loci de alimento distinguere. Verum vt medicamentum, obstruendi meatus vim habet. In temperamento verò similis est tritico, plus viscosi quàm illud habens, quo etiam magis quam illud alit. Est & velut materia quædam idonea ad suscipiendum acetum, aquam marinam, & muriam, & alia huiusmodi quæ vehementer siccant. Quæ propter quidam ex his quæ multum siccant, ipsam esse putauerunt. Est autem ex his quæ magis concoquere possunt, & minus siccant, quemadmodum & triticum. Verum ob siccantium pharmacorum mixturam, id quod ex ipsis est compositum, siccandi vi præditum, multos medicos fallit, vt ad ipsam alicam referant siccandi causam, omisis iis quæ sunt admixta. Scribit Dioscorides decoctam in aceto alicam, illitâque lepras tollere vnguium scabritias extricare: incipientibus ægilopiis mederi: decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum esse. Fit hodie in Italia ac Sicilia alicæ ex Zea, quam tam ad sanorum quam ægrorum vsus valde commendant, eamque non alicam, sed farro, idest Far falso appellant. Hac appellatione moti quidam Zeam nihil aliud quàm Far esse putauerunt. Faris nomine Zeam ab antiquissimis Latinorum nuncupatam fuisse testis est Dionys. Halicarnass. Nominabant, inquit prisci Romani sacras nuptias vocabulo suo φαῖρακία, quia coniuges vescerentur eodem φαῖρῳ, quod nos Græci ζέαν dicimus. Item Asclepiades apud Galenum, φαῖρῳ, ὁ χαλδοὶ ζέαν. Idest, Farris quod

Vires &

Temper.

Alicæ.

Lib. 2. c. 89.

Lib. 9. ph
loc. cap. 3.

quod Zeam vocant. alibi nos fufius expofuimus, quæ matrimonia fierent vfu, coemptione, confarratione. Sed his refragatur Plinius, qui vt diximus, capite de tritico, Far aliud à Zea tritici genus effe perfpicuè fcribit, Adoreum dictum & eodem in loco, Qui Zea vtuntur, inquit, Far non habent. Ex eo frumenti genere factitiam rem Far etiam nuncupatam, diuerfam effe à chondro fiue alicadem Plinius aperte declarat, cum ait, Populum Romanum Farre tantum è frumento trecentis annis vsum Verrius tradidit: quo tempore Romanis nullus fuit alicæ vſus, id quod ipſe alio in loco teſtatur ſcribens Pompeij magni ætate alicam Romanis in vſu non fuiſſe. His ſubſcribit Archigenes apud Aetium. Quod verò Latine, inquit, in regionibus Romæ vicinis Far appellatur, hoc modo paratur. Frumentum modico tempore aqua madefacito, indeque extractum, ac in pilam coniectum veluti ptiffanam à cortice expurgato. Vbi vero corticem exuerit, tollito, atque in ſole ſiccato: deinde manibus tritum, donec penitus à cortice fuerit mundatum, craſſiſſimè molito, ita vt granum vnum in quatuor aut quinque partes redigatur, & ſiccum aſſeruato. Vſus autem tempore alicæ modo coquitur, & à ſanis in cibo ſumitur. Pro ægris verò variè apparatur, & epithematis quoque admiscetur. Quidam ſpicas frumenti adhuc virides tollunt, ex ipſiſque Far concinnant, quo modo, & ſuauius & iucundius redditur. Ex iis conſtat Far pro re factitia, ſiue pulte farracea, & ab antiquis pro alio atque alio frumento vſurpatum, quod etiam de Zea dicere poſſumus, vel auctore Galeno, apud quem Mneſitheus panem ex Zea neminem affatim comefſe citra ſanitatis diſpendium poſſe tradit. Quod ſi quis, ait, ei pani non aſſueuerit, etiam ſi minimum ſumpſerit, ægrotabit. Eſt enim grauis, & concoctu difficilis. Qui verò regionem incolunt vehementer frigidam, eo ſemine coguntur nutriri, ipſumque ſerere, quòd frigoriſ perſtrennuè reſiſtat. Hæc Zea de qua ex Dio ſcoride & Plinio diximus, conuenire non poſſunt, neque Zea Theophrasti, qui eandem quam Dioſcorides Zeam intellexiſſe videtur: ſic enim ſcribit. Inter ea quæ Tritico hordeoque ſunt ſimilia, vt Zea, Olyra, Tiphæ, Auena, & Aegilops, Zea eſt firmiſſima, copioſiſſimèque fructificat, multiplicem altamque radicem effundit, calamo multiplici craſſoque aſſurgens. Fructus autem eſt leuiſſimus, & cunctis animalibus admodum iucundus. Deinde ſubiungit. Sunt autem hæc duo, Zea ſcilicet, & Tiphæ Tritico ſimillima. Herodotus verò, alius Zea meminiffe videtur, cum ſcribit: Tritico hordeoque plerique victitant. Apud Aegyptios autem his in victu vti ſummum dedecus putatur. Vtuntur autem Olyris, quas alij Zeias cum, Z. nominant.

Lib. 18. c. 8.

Li. 18. ca. 7.

Lib. 22. c. 25.

Lib. 9. c. 45.

Li. 1. Alim.

Li. 8. Hiſt. cap. 9.

Lib. 2.

OLYRA. CAP. V.

VT Græcis ολύρα, ita Latinis Olyra dicitur, & Gallis *Arincæ*, Plinio auctore, vt iam diximus. Olyra, inquit Dioſcorides ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἐστὶ τῆς ζείας, id eſt, ex eodem eſt Zea genere: quod ita docti viri accipiendum eſſe cenſent, non vt Olyra Zea ſpecies ſit, cuius duo tantum à veteribus poſita ſunt genera, nempe monococcos & dicoccos, ſed eiufdem eſſe generis, id eſt naturæ, & facultatis cum Zea. Verum Olyra minus aliquanto nutrit: in panes tamen, vt Zea, cogitur. Fit quoque ex Olyra craſſior farina quàm Græci κρίνον vocant. Mneſitheus, auctore Galeno, vno ſemine duo nomina ſcribit contineri, his verbis. Ex ſeminibus ad

Nomina

Lib. 18. ca.

10. & 22.

cap. 25.

Lib. 2. c. 84.

Li. 1. Alim.


Ibidem.
Lib. 8. Hist.
cap. 9.

Li. 18. ca. 8.

Lib. 10.

nutritionem sunt appositissima Triticum, & Hordeum. Quod autem hæc deinceps sequitur, duplici quidem nomine nuncupatur, eadem tamen res est: alij enim Tipham, alij Olyram nominant. Diocles autem apud eundem Galenum, Tiphas ab Olyris distinguit, ut & Theophrastus. Quorum sententiam approbat Galenus, Mnesitheum verò reprehendit his verbis. Mnesitheum iure quis demiretur, quod inter Olyram & Tipham discrimen non nouerit. Vtrumque enim in Asia frequens est, & potissimum in regione quæ est supra Pergamum, adeo ut rustici ipsi panibus ex ipsis factis semper vtantur: propterea quod triticum omne in oppida comportent. Olyrini quidem pans, si modo ex bona Olyra fiant, post triticeos sunt præstantissimi: secundi autem ab his sunt Tiphini. Quod si Olyrini ex vitioso semine sint facti, Tiphini non erunt inferiores. Plinius Olyram inter frumenti genera recenset, & à Tiphâ discernit. Arinca, inquit Galliarum propria, copiosa & Italiæ est. Aegypto autem, ac Syriæ, Ciliciæque, & Asiæ, ac Græciæ peculiare Zea, Olyra, typhæ. Et aliquando post: Ex Arinca dulcissimus panis: ipsa spissior quàm Far, & maiore spica, eadem & ponderosior. Rarò modius grani non sexdecim libras implet. Exeritur in Græcia difficulter, ob id iumentis dari ab Homero

OLYRA DODON.



Li. 4. ca. 3.
Nomina

Forma

Locus.
Tempus.
Usus &
Temper.

Ibidem.

In ca. 101. li.
2. Dioscor.

Li. 18. c. 16.

Li. 1. Alim.

dicta. Hæc enim est quam Olyram vocat. Eadem in Aegypto facilis fertilisque. Hanc Olyram non scri in Italia scripsit Matthiolus, in capitul. octuagesimo quarto libr. secundo Dioscorid. eamque nec descripsit, nec depinxit. Dodonæus pro Olyra exhibet frugis genus hîc appictum, quod vocari ait in Germania, *Amelkorn*, Zeæque esse speciem, calamo, geniculis, magnitudine Tritico similem, spica non mutica sed aristis multis vallata, ut hordeum, grano folliculis concluso, Zeæ modo quod spoliatum Tritici granis est simile. Multis Germaniæ locis prouenit, & ante æstatem feritur, metiturque Iulio mense. Ut Zeæ speciem esse, ita temperamento viribusque illi respondere scribit Dodonæus, & inter triticum & hordeum mediam, eadem omnia præstare quæ Zea: panes ex eadem confectos quodammodo triticeis esse similes. Quæ Theophrastus & Plinius de Olyra scripserunt Marcelus, Virgilius, putat indicare frugem quam nostra tempora Secale vocant, non tamen id pro comperto affirmat. At omnem dubitandi occasionem sustulit Plinius, qui multum diuersam Olyram à Secale facit.

Cum enim de Olyra quæ citauimus, scripsisset, alio loco de Secale hæc tradit. Id autem quod Secale, & farrago appellatur, occari tantum desiderat. Secale Taurini sub Alpibus Asiam vocant, deterrimum, & tantum ad arcendam famem vtile, fœcunda, sed gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum. Admiscetur huic Far, ut mitiget amaritudinem eius, attamen sic quoque ingratissimum ventri est: Contra ex Olyra dulcissimus panis, ut ex eodem Plinio diximus. Præterea Galenus, quod nuper citauimus, olyrinos panes,

panes, si ex bona Olyra fiant, post Triticeos esse præstantissimos scripsit. Quod verò Hermolaus, Manardus, Ruellius Olyram Latinorum Siliginem esse dixerunt Plinio auctore, id iam capite de Tritico falsum esse ex ipso met Plinio demonstrauius. Caterum quemadmodum chondrus, & chondroptissana, & ptissana Triticea ex Zea & Tritico fiebant, ita ex Olyra Tragus parabatur. Tragum quidem pro frumenti specie vsurpari diximus cap.de Tritico, sicut & vsurpare videtur Galenus, lib.i. Aliment. Dioscoridem citans his verbis: ὁ δὲ τράγος τὸ σπέρμα μὴ παραπλήσιον χόνδρῳ, ἀτροφώτερος μὲν πολὺ ζεᾶς, διὰ τὸ πολὺ ἔχει τὸ ἀχυρῶδες. διὸ ἔδυσκατέργαστος ἐστὶ, καὶ κοιλίας μαλακτικώτερος. Id est, Tragi semen chondro est simile, nutrit tamen multo minus quàm Zea, quod multum aceris habeat: ob id concoctu est difficilior, & aluum magis mollit. In nostris tamen Dioscoridis exemplaribus hæc aliter leguntur: Τράγος τὸ σπέρμα μὲν παραπλήσιον τῷ χόνδρῳ ὅκειν. ἀτροφώτερος δὲ παραπολύ ζεᾶς, διὰ τὸ πολὺ ἔχει τὸ ἀχυρῶδες, & cætera. Id est, Tragus figura quidem Alicæ similis est, sed multo minus nutrit quàm Zea, quod multum aceris habeat: quare ægrius conficitur, & cætera, quibus verbis Tragi nomine rem facticiam Alicæ similem significari quidam malunt, quàm frugis speciem. Quod autem ex Olyra Tragus fieret, testis est Galenus, lib.i. Alim. cum scribit. Ex nobilissima autem Olyra, cum, vt decet fuerit decorticata, Tragum conficiunt quo plerique vtuntur, primum in aqua decoquentes, deinde ea effusa sapam, aut vinum dulce, aut mulsum infundentes superiniiciunt, & pineas nuces aqua præmaceratas, donec plurimum intumuerint. Idem in libro primo Hipp.de rat.vict.in morb.acut. ex Zea Tragum fieri dixit. Ptissanam igitur rectè præferri ait Frumentaceis eduliis, pani scilicet, chondro, & Zeæ, ex qua fit Tragus. Ex Tritico ptissanæ conficiendæ, vulgata ratio est, inquit Plinius, lib.18.cap.7. Simili modo ex Tritici semine Tragus fit, in Campania duntaxat, & Ægypto. In Geoponicis Cassianus Bassus, cap.13. lib.3. Tragum ex frumento Alexandrino conficit: Τράγος ποιήσεις τὸν ἀλεξάνδρινον λεγόμενον σῖτον βρεχλέον, ἔψιςτον, καὶ ξηρανθέν ἐν ἡλίῳ θερμῷ. εἴτα αὐτὸς τὰ αὐτὰ ποιητέον, ἄχρις ὅς οἱ τε ὑμένης τῷ σίτῳ, ἔτὸ ἰσώδες ἀποπέσῃ. ὅτω τε ξηρανθέν, ἔσ' ἀποθετέον τὸν τράγον ἐκ τῆς εὐγενὸς ὀλύρας. Id est, Frumentum Alexandrinum maceratur, decorticaturque & in sole calido siccatur. Deinde rursus eadem facienda, donec & folliculi, & quicquid fibrosum est delabatur. Sic & siccandus & reponendus Tragus ex probata Olyra. Ex quibus perspicitur omnia Frumentorum genera ptissanæ modo decorticari & præparari solita, eorūque atque rerum quæ ex ipsis conficiuntur ad alendum corpus nomina inter sese confundi.


Nomina

Lil. Alim.

TIPHA Latinè etiam Tiphe, seu Tipha dicitur à Ruellio Tipha ce-
realis: quoniam planta alia inter arundines locis humidis proue-
nit, quæ Tipha nominatur. Theophrastus inter ea quæ Triticum &
Hordeo similia sunt numerat Zeam, Tipham, Olyram, &c. mox
subiungit Tipham omnium leuissimam esse, simplici culmo assurgere, solo te-
nui contentam, nec, vt Zeam, pingue & lätum desiderare. Mnesitheus, auctore
Galeno Tiphas tertio loco post Triticum & Hordeum numerat. Diocles post

TIPHA DODONÆI.

TIPHA FVSCHII.



Hordeum, ac Triticum facultatibus sequi omnium maximè Olyras, ac Tiphas dixit. Sed Mnesitheus Olyram & Tiphame eandem rem esse putat, quem ob id reprehendit Galenus, vt capite superiore declarauimus. Galeni hac de Tiphinis panibus & Tipha oratio est, aliquoties repetita. Olyrini panes si modo ex bona Olyra fiant, post Triticeos saltem sunt præstantissimi. Secundi autem ab his sunt Tiphini. Quod si Olyrini ex vitioso semine sint facti, Tiphini non erunt eis inferiores. Calidi verò panes ex laudatissima Tipha facti, Olyrinis longe sunt præstantiores, asseruati verò deteriores seipsis euadunt. Cum enim massa illorum sit tenax, ac ductilis, densatur maiorem in modum, & maximè cum negligenter parati fuerint, adeo vt qui panem huiusmodi post vnum, aut duos dies, ac multo magis sequentes aliquot comederit, putaturus sit lutum ventriculo suo inesse: at cum verò calidus adhuc est, ab ipsis etiam vrbaniis expetitur, ipsumq; cum caseo quodam mandunt, quem vernaculo nomine *Oxygalaoion* vocant. Porro hunc quoque tenerum esse oportet, & ipsum panem calorem clibani adhuc retinere. Qui certe in hunc modum est assatus, non rusticis modò, sed vrbaniis quoq; hominibus in deliciis habetur. Qui verò trium quatuorue dierum est, vel ipsis rusticis qui mandunt, in suavis est. Præterea concoctu est difficilior, ac tardius per aluum subducitur, quæ calido minimè accidunt, qui tametsi Hordeaceo, quod ad deiectiones pertinet, multum vincitur,

non

non tamen propter id, adeo ut miliaceus, est vituperandus. Quinetiam corpus admodum nutrit, dum calidus est, ut pene Triticeo syncomisto par sit. Habet autem Tiphæ semen extrinsecus corticem velut Olyra, & Hordeum: verum decorticatum in panes congeritur, vsuiq; omnino est accommodatum. Nam & ex aqua manditur elixum, haud aliter ac vocatus à rusticis apothermus, sapa iniecta: nonnunquam etiam cum sale esitatur. Hæc de Tiphæ Galenus, quæ quàmnam nostrarum frugum speciem referat, ignorant plerique docti Herbarij. Dodonæus Tipham appellat eam frugem quam Gallis *Meteil*, vocari putat, Germanis *U-velschè v-vyssen*, & *Roomscheteruue*, id est Triticum Italicum, aut Romanum. Fuschius eam pro tertio Tritici genere depinxit. Sed fallitur Dodon. neque enim Gallorum *Meteil*, non ubique noti, seu peregrini Tritici species est, sed partim ex Tritico, partim ex secale miscellanea seges, quam Lugdunenses vocant *De la Mescla*. Calamo, geniculis, spica aristis vallata Olyram ea refert, nisi quod Tiphæ spicas habet longiores & asperiores, rotundioresque & in unum magis coactas. Semen folliculo unico includitur, grano Tritici simile. Fruges hæc cortice & aceribus purgata Zeæ modo in triticum redit, quod & de Tiphæ Plinius his verbis scripsit. Tradunt Zeam, ac Tipham cum sint degeneres redire ad Frumentum, si pistæ serantur, nec protinus, sed tertio anno. Seritur frequentius, inquit Tragus, in Alsatia, rarius in aliis Germaniæ regionibus, idq; locis potissimum montosis, præsertim ubi apri fruges depascuntur. Nam ab hoc vno ferè abstinēt, quod durioribus eius aristis offendantur. Ad Olyræ temperamentum & vires Tiphæ accedit, sed Olyra deterior est, ut ex Galeno diximus.

Lib. 4. ca. 4.

Nomina

In hist. Pl.
cap. 150.

Forma

Lib. 18. c. 10.

Locus.

Vires.

TRITICVM TIPHINVM,

CAP. VII.



TRITICVM TIPHINVM, Tritico nostrati Calamis & grano utcumque simile, tenuiores ac breviores stipulas habet, spicam horridam duris & longis aristis, instar Hordei, granum durum, densum, fulvum, quod facile glumis suis exteritur. Reperitur huius frugis granum cum semine Phalaridis aduecti ex Hispania, & insulis fortunatis. Huic Frumento cum Tiphæ conuenit, quod Calamo surgit tenui ac simplici: quod semen gignit leuissimum, exile, paruum, densum tamen, & coactum, Tritico magis rufum: quod aristæ duræ, ac longæ spicam muniant: differt autem, quod Tiphæ granum inclusum multiplici folliculo difficulter decorticetur, huius autem minus tectum semen eximatur facilius. Triticum in Tiphæ mutatum soli vitio, quidam esse putant.

Li. i. Alim.
Nomina



EOPYRON in frugum generibus recenset Galenus his verbis. Est in frigidissimis Bithyniæ locis semen quoddam, quod Zeopyrum nominant, prima syllaba, i. non habente, vt apud Homerum habet cum ait, Et Zeia, & Triticum, cum fecundo Hordeo & albo. Ex eo autem panis fit præstantior, quam qui in Macedonia, aut Thracia ex Briza conficitur. Ac ferè quæadmodum nomen ipsum Zeopyrū ex vtroq; nomine, Zea scilicet & pyro, idest tritico componitur, sic & substantia eadem inter vtrumque media quodammodo est, vt si ex vtraque esset commista. Proinde quando tritico est deterius, tanto Thracia Briza est præstantius: Porro vrbium nomina in quibus semen id prouenit, sunt Nicea, Prusa, Crassopolis, Claudiopolis, Heliopolis, & Dorile, quod quidem extremum est Phrygiæ Asiaticæ oppidum. Habet autem & Phrygia ipsa semen eiusmodi in agro proueniens, quemadmodum & aliæ quædam vrbes finitimæ. Videre autem est panem qui ex hoc semine conficitur, tanto eo qui ex Briza in Thracia & Macedonia fit, esse meliorem, quanto triticeo est deterior.


Lib. 4. ca. 5.
& Hist. fru-
ment. ca. 3.

Forma.

Locus.

Dodonæus Zeopyrum id esse putat, quod Germanis Kern, & Drinkelkern, & Kernsamen, vocatur. Zeæ culmo, geniculis, & spica proximum: semen eius naturæ Tritici non absimile, sed non tamen perinde ac Zeæ, glumis, siue folliculis inuolutum, in area facile exteritur, sublutei coloris, vt Triticum. In quibusdam Germaniæ locis seritur ad pistrinarum & culinarum opera, in quibus Hordei vsum præbet. Huius frumenti figura Dodonæo eadem prorsus est quæ Zeæ, vt inde suspicemur Dodonæum existimasse à Zea, vel nihil, vel parum admodum differe. Huic congener esset, non solum cognatum, Frumentum quod Ruellius Scourgeon vocat, tanquam, vt interpretatur, Succursum, vel Subsidiū gentium, grano tristi, & macro, Hordeo simili, quod premente annonæ penuria serunt agricolæ, cum aliis frumentaceis Autumno, si granum quod Zeæ modo vix deglubitur, folliculo suo facile absolueretur, vt in Tritico.

ZEOPYRON GYMNOCRITHON, CAP. IX.



EOPYRON GYMNOCRITHON, nudum Hordeum vocat Lobelius, frugis speciem nomine solo indicatam, non autem priuatim dicata historia explicatam. Exutum cortice Hordeum si seritur, tale prouenit, vt ad ptisanam conficiendam non sit præterea tundendum. Seminis gustus non minus suavis est ad omnia cibariorum genera, quàm Hordei spoliati. Facies tota Hordei vulgaris: nihilque diuersum aliud quam quod granum nullo cortice amictum in folliculis aristatæ spicæ nascitur, quod ipsum & in aliis Frumentorum generibus fieri aiunt si detracto pariter cortice terræ mandentur. Ad auxilia cuncta medicinæ, vis eadem quæ Ptisanæ Hordeaceæ.

BRIZA

BRIZA, CAP. X.

BRIZA Græcis, similiter Latinis Briza dicitur segetis species, de qua Galenus cum de Mnesitheï Zea satis differuisset, hæc subiunxit. Credere, inquit, possum, fieri potuisse, ut Græci semen id Zeiam appellarint, Barbari autem indiderint ipsi proprium nomen. Conspicatus autem in multis Thraciæ & Macedoniæ Agris non aristam modo, sed & plantam totam nostræ Tiphæ in Asia simillimam, interrogavi quodnam apud illos haberet nomen, qui mihi omnes responderunt plantam totam, & eius semen Brizā appellari. Ex hoc porro semine panis fit grauis odoris, & ater, membranosa, ut inquit Mnesitheus, substantia. Quod si panem qui ex Zea fit, nigrum quoque esse adscripsisset, facilius crederem id esse semen, quod ab eo Zeia nominatur. Nomina Li.1. Alim.

BRIZA DODONÆI.



Dodonæus pro Briza depinxit segetem quæ hodie à Germanis vocatur *Blicken*, *Santpeters Korn*, & *Einkorn*, id est simplex granum, unde Monoccos nominatur. Culmos habet, quàm Zea breuiore, & tenuiore, spicas in ordines quosdam veluti Hordeum, digestas, aristas asperas, semina parua, Zeæ granis minora, singula singulis vtriculis conclusa. Nascitur in asperis, & montosis plerisque Germaniæ locis. Autumno cum reliquis frugibus seritur, verum tardius, Septēbri, videlicet mense maturefcit. Totam plantam, culmis, scilicet, glumis, aristis, semineq, nigri ex rubore coloris esse Tragus prodidit. Hanc Frumentum rubrum, siue locale Ruellij esse Dodonæus suspicatur, Gallicè *Froument rouge*, & *Froument Locar*, quod pluribus tunicis, perinde quasi loculis inuolutum condatur, appellatur & genus hoc frugis pullare, à pulligine, quia ex Lib.4.ca.6.

rubro in pullum degenerat colorem. At hic apertissimè fallitur Dodonæus: nam *Blé Locar* Gallis, Triticum est rubeus, siue ad Robns, quasi Locale, quod multis tunicis tanquam loculis inuoluatur. Id barbati Frumenti genus Farris speciem Ruellius esse vult. In concauis, inquit tractibus Galli ferunt, & qui facile sentiunt rubiginem: nam, ut credunt, nec pruinas, nec æruginem extimefcit. In perflatis & excelsis quamuis bene conualescat, sationem tamen ibi damnant. Farris speciem esse negat Dodonæus in stirpium Historia, quòd Farris spicas muticas esse putet. In Frumenti Historia similitudinem quandam fortasse habere ait, cum Farre venniculo rutilo. Verum in tanta breuitate Columellæ difficile esse diuinare. Idem Zeæ genus esse negat in Historia stirpium, quod ex Zeæ generibus panis Triticeo valde similis & probatus conficitur, ex Briza ater, & ingrati saporis. At in Frumentorum historia scribit non temerè scriptores nostri temporis ad Zeam referre, neque perperam ἀπλὴν, id est, simplicem Zeam Dioscoridis existimare. Ruellius Brizam quoque non longe disside-re credit ab ea fruge quæ Gallis *Secale* vocatur, ex quo panis fit ater quidem, sed recens non insuauis, ab eaque nomen Bizi panis in vulgus nostrum manasse putatur extrita litera: Bizum enim panem nigrum vocamus. Sed de Secale mox fusiùs differemus. Lib.2. c.17.

Nomina



Farrago.

Lib.18.c.16.

Lib.1.c.31.

Lib.2.c.11

Lib.18.c.16.

Lib.2.c.23.

Genera

Forma

SECALE Gallis extrita vna tantum litera ad hoc vsque tempus *Secle*, vel potius *Segle* nominatur, Germanis *Rocken*, Belgis *Rogghe*, Italis *Segala*, Hispanis *Centeno*, nōnullis Asia, à Plinio etiam Farrago eadem ratione qua Far, Hordeum, Avena, Triticum Farragines nominantur, quando videlicet iumentorum pecudumq; pabulo seruntur, vt Farrago, quam Græci *ῥάδιον*, & *κράδιον* vocant, generale nomen sit, omnem viridem segetum herbam comprehendens, quæ pabuli causa feminatur. Plinius. Seritur ea ex recremento Farris prædensa, admixta aliquando & Vicia. Eadem in Africa fit ex Hordeo. Quod Far ferro cæsum, Farrago dicta est, aut quod primum è Farris segete Farrago seri cepta, inquit Varro. Farraginem ex Hordeo facere docet Columella. Plinius ex Tritico Farraginem fieri testatur his verbis. Et in Tritici genere pars aliqua pabuli est, quadrupedum causa sati, vt Farrago. Absyrtus etiam *συρίων ῥάδιον*, id est triticeam Farraginem equulis maximè probat, & ea si non adsit, *κεράδιον*, quam Eumelus iis refert post trimatum dari solitam. Sic Secale Farraginis genus est. quando videlicet pecudum iumentorumque in herba pabulum est: quod & declarat Ruellius. Duobus modis, inquit, Secale apud nos seritur, nunc solum & simplex, nunc Tritico, aut Farre mixto, æquis fere partibus. Miscellaneam hanc segetem Galli *Meteil*, quasi Miscellam vocant: conditionem eandem, excussis etiam granis, Farraginem rustici nostrates appellant, quemadmodum & fasces, & manipulos inde compositos Farreum, *Fouarre*. Ea per hyemem iumentorum, pecudumque pabulo cedit, quibus etiam pro Stramine est. Id causæ fuit cur Secale Plinio Farraginis genus fuerit. Vt Triticum, ita Secale duplex est, vnum enim Autumno satum per hyemem in terra nutritur: alterum vèrè seritur. Secale folio quum primum prodit rubescit, dein, vt reliqua Frumenta, viret: ex vna radice senos,

SECALE.



Lib.18.c.16.

septenósue, aliquando etiam plures calamos gignit, longos, graciles, quaternis aut quinis geniculis distinctos, Triticeis similes, graciliores tamen, & proceriores. In horum fastigiis spicæ, quum florent erectæ, semine gravidæ procumbunt, ac deorsum nutant, ideo rubigini, quoniam imbres retineant, oportunæ, breuib; & innocentioribus aristis cinctæ. Granum oblongum, triste, strigosius & nigrius Tritico, glumis non opertum, atq; ideo caducum, & sæpenumero sponte exili ens. Calami lenti, flexiles, quibus aqua madefactis vitilium vice vtuntur. Hybernium lætius, æstiuum gracilius, paucioribus culmis, spica brevior ac tenuiore, granoque leuiore. Id est Plinij Secale de quo sic scribit. Rarum dictu esse aliquid cui prosit negligentia. Id autem quod Secale, atque Farrago appellatur, occari tantum desiderat. Secale Taurini sub Alpibus Asiam vocant, deterrimum (alij aterrimum legunt) & tantum ad arcendam famem utile, fœcunda, sed gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum. Admiscetur huic Far, vt mitiget amaritudinem eius: & tamen sic quoque ingratisimum ventri est. Nascitur qualicumque solo cum centesi

centesimo grano, ipsumq; pro lætamine est. Ex quibus illud etiam perspicuum est Secale à Siligine plurimum differre. Nam vt ex Plinio diximus, E siligine lautissimus panis, pistorum opera lautissima: ac rursus Siliginem propriè dixerim Tritici delicias. Candor est, &c. at Secale nigrum est, & ex eo panis ater, pauperumque non lautiorum mensis, ac cibis dicatus. Præterea Siligo eodem Plinio auctore, semper rectam habet spicam, nec rorem continet qui rubiginem facit: contra Secale inclinatum, & deorsum vergentem spicam habet, atque ob id rubiginis obnoxiam, vt diximus. In Germaniæ & Galliæ, aliarumq; regionum locis plurimis, præsertim Septentrioni subiectis nascitur, qualicunque solo, etiam gracili, macro, & arido, in fœcundiore tamen, & lætiore melius, præstantiusque. Secale proximum inter Frumenta à Tritico Triticeisque seminibus locum habet. Panis ex eo factus lentoris atque obstruentis naturæ non nihil habet: difficile concoquitur; ventriculo grauis est, præsertim si furfurum expers fuerit. Nam Secalinus syncomistos, si probe coctus, benèque fermentatus fuerit, minùs lentus est, non admodum agrè conficitur, citòque per aluum labitur, nondum tamen Triticeo syncomisto par, quia eo grauior, & cōcoctu difficilior est. Alimentum corpori solidum, ac firmum præbet, nec mali succi, si ex bono Frumento coctus fueit: ex malo verò Frumento & corrupto paratus, prauos & corruptos succos generat. Admiscetur huic non rarò Triticum, vt leuiorem gratiorèque panem efficiat, qui Secalino puro minus grauis est, ac lentus, & teneritudinem suam Triticeo diutius seruat. Porro Secale vt medicamentum, Tritico in calefaciendo ac digerendo potentius est. Panis ex hoc ac fermentum, promptius ac citius abscessus maturant ac rumpunt, quam ex Tritico facta. Farina illius confusanea diuturnos capitis dolores lenit, in linteo capiti circumligata. Secalis peregrini genera duò sunt Nachani, & Mugo. Nachani mentionem facit Garcias ab horto Capite de Lycio. Frumentaceum id granum est, Sinapi simile, nigrum, minutum, sapore Secalis. Conficiuntur ex huius farina rotundi panes, quibus vescuntur Æthiopes oræ maritimæ accolæ, quæ inter fluuios diui Christophori, & diuæ Lucie sita est. Ex eadem farima permixta cum ramis tuis Lycij, & scobe nigri cuiusdam Indici ligni, fortassis Ebeni, paratur medicamentum siccans & adstringens, vtile doloribus oculorum leniendis, confirmandis gingiuis laxioribus, & alui pro fluuiio sistendo. Quidam Pollucis cap. II. lib. 6. *δελνδιον* esse putant, vernaculum semen Æthiopibus, Sefamo simile, è quo factus panis, *δελνδης* nomine, iis cibis familiaris est. Mungo Frumentaceum quoque granum est, Coriandri magnitudine, ante maturitatem viride, nigrum postquam maturuit. Auicennas, cap. 489. lib. 2. & cap. 7. Sectionis 3. lib. 1. *Mex*, sic Arabes pronuntiant, vocat. Integrum, paululum siccatur, cortice detracto in siccitate humiditateq; temperatū, cætera proximū naturæ Fabæ. Minus inflat & deterget quàm Faba: citius per aluū descendit: minus refrigerat quàm Lenticula: & addito Cardamo in cibo salubrius est. Bonum succum gignit, præcipuè decorticatum, & coctum cum oleo Amygdalarum dulcium. Abiecto priore decocto iterum elixum aluum cohibet, & valentius, adiecto Rhoe, cum acidi Punici succo. Iusculum ex eo paratum cum Oryza incolæ Guzarate & Decan regionum Indiæ, sorbendum ægris dant in febribus, post longam inedia, priusquam vsum Triticei panis concedant, quemadmodum nos Hordei ptisanam. Cum vino, aut Sapa & croco leuat cruciatus articulorum, & tuis vulsis ruptisque auxiliatur.

Lib. 18. c. 9.
Cap. 8.

Lib. 18. c. 10.

Locus.

Vfus.

Vires &
Temper.

Nomina
Genera
Theoph. c.
4. li. 8. Hist.



PIΘH Græcis, Latinis Hordeum dicitur, Arabibus *Xahaer*, aut *Shair*, Italis *Orzo*, Germanis *Gersten*, Hispanis *Cenada*, Gallis *Orge*. Hordei multa esse genera Theophrastus prodidit. Ex Hordei generibus quoddam binos, quoddam ternos, aliud quaternos, aliud quinos, aliud etiā cū plurimū senos habet versus: est enim huiusmodi quoddā genus. Quæ pluribus constant versibus, omnino arctiora densioraque posita sunt. Magna est Indici ab aliis differentia, quod in ramos brachietur. Spicæ aliis magnæ & rariores, aliis minores & densiores: & in quibusdam à foliis distantes magis, in aliis minùs. Hordei ipsius aliud rotundius & minus, aliud oblongius maiusque, & in spica rarius. Præterea aliud candicat, aliud vergit in purpuram, copiosius farina, & contra hyemem flatūsque, ac omnino aërem candido validius. Spicæ Hordei quædam binos ordines habent, inquit Plinius, quædam plures vsque ad senos. Grano ipsi aliquot differentia, longius, leuiusque aut breuius, aut rotundius, candidius, nigrius, vel cui purpura est. Vltimo ad polentam, contra tempestates candido maxima infirmitas. Hordeum Columella scribit esse, quod rustici hexasticum, quidam etiam Cantherinum appellant, quoniam & alia animalia, quæ ruri sunt, melius quàm Triticum, & hominem salubrius quàm malum Triticum pascit. Hoc nullum aliud in egenis rebus magis inopiam defendit. Alterum genus esse, idem scribit, quod alij distichum, Galaticum nonnulli vocant, ponderis & candoris eximij, adeo vt Tritico mistum egregia cibaria familiæ præbeat. Duo nobis hodie nota sunt Hordei genera. Polystichum quod ante hyemem seritur, *Gros Orge* Galli nominant, Germani *Grosz Gersten*. Distichum quod vèrè, nunc *Orge* simpliciter Galli vocant, nunc *Pomole*. Ruellius Cantherinum Hordeum dici putat, quod folliculo castratum enascitur. Galli qui serunt, mundum vocant Hordeum. Huius sponte granum gluma excidit, in reliquis verò generibus non nisi ægrè deglubitur, alioquin

Lib. 8. c. 7.

Lib. 2. ca. 9.

Lib. 2. c. 16.

Li. 1. Alim.

HORDEVM

Distichum.

Forma.

Locus.

Lib. 2. ca. 9.

Tempus.

Li. 1. Alim.

Vsus &

Vires.



hoc illis simile est. A Galeno Gymnocrithon hoc nuncupatum fuisse, id est nudum Hordeum, quidā arbitrantur. Prodit Hordeum folio in stipula simplici, quàm Triticum latiore, scabrioreque; culmo humiliore, ac fragiliore: pluribus articulis, senis, scilicet, aliquando etiā octonis, geniculato: spica variè in versus striata, vt dictum est: grana oblonga tenuiq; gluma inclusa ei firmitus inhaerent: è glumæ fastigio arista eminet, ita vt tota spica longioribus, firmioribus, mordacioribusque aristis quàm Triticum rigeat. Radice fibrata firmatur. Nascitur passim in vniuersa ferè Europa. Seritur Polystichum soluta, siccaq; terra, auctore Columella, & vel præualida, vel exili, quia constat arua segetibus eius macescere: ideoq; vel pinguisimo agro mandant, cuius nimiis viribus noceri non possit, aut macro, cui nihil aliud committitur. Distichum seritur quàm pinguisimis, sed frigidis locis, circa Martium mensem. Melius tamen respōdet, si clementia hyemis permittit, cum seminatur circa Idus Ianuarias. Polystichum ante hyemem ferendum. Hordeū Galeno, non eandem cum Tritico facultatem habet. Siquidem hoc palam calefacit, illud verò non modò non calefacit, sed quoquo modo ipso vtare, siue panes ex ipso feceris, siue

HORDEVM

Polystichum.

ris, siue ptissanam coxeris, siue polentam, vim quandam refrigerandi habere videtur. Dissidet præterea à Tritici natura succi specie, quem vtrumque ipsorum gignere consuevit. Siquidem Triticum crassum ac lentum, Hordeum tenuë, & nonnihil detergentem succum in nobis creat. Panes omnes Hordeacei Triticeis minùs alunt: qui tamen ex præstantissimo Hordeo conficiuntur, minus à Triticeis in eo superantur, qui verò ex laxo ac leui, panibus furfuraceis respondent. Panes quidem ex Hordeo sic laxo citissimè per aluum subeunt, quod reliquis etiam manifestum est, si cum Triticeis eos contuleris. Sunt autem non modò Triticeis, verum etiam Olyrinis, & multo adhuc magis Tiphinis friabiliore, nihil in se lentoris, vt illi, habentes. Ex quo perspicuum est, exiguum corpori præbere alimentum, & potissimum si facti ex peiore Hordeo fuerint. Idem rursum: Hordeum primi est ordinis in refrigerando & exsiccando: habet etiã paululum absterisionis. Hordeum quod ait Dioscorides minus quam Triticum alit, absterget, vrinam ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur: œdemata cõcoquit. Farina Hordeacea decoquitur in mulsâ aqua cum fico, vt in-

Li.7. simpl.

Lib.2. c.79.

flammationes, œdematâque discutiat: duricias cum pice, recina, & fimo columbarum concoquit: cum meliloto autem & Papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intestinorũ inflationes cum Lini semine, Fœnogræco, & Ruta imposita iuuat: strumas cum Pice liquida, Cera, Oleo, & impubis pueri vrina, ad coctionem perducit: & cum Myrto aut vino, aut malicorio, aut sylvestribus Piris, aut rubo alui profluuia sistit: podagricis inflammationibus cum cotoneis, aut aceto prodest: decocta in acri aceto, quo modo Hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor verò farinæ ex aqua, cum pice & oleo decoctus, puri mouendo est: cum aceto subactus & cum pice, contra articulorum fluxiones prodest. Hæc de Hordeo, & eius farina Dioscorides. Fuit & ptissanæ ex Hordeo & polentæ vsus celeberrimus, ac frequentissimus apud veteres, de quibus nunc differendum. Ptissana à verbo Græco πτῖσάνη nomen accepit, quod tundere & decorticare significat. Hoc primũ quidem generale nomen est frugum omnium decorticatarum, tufarumq; & cum diuersarũ frugum generibus copulatũ, alia atque alia ptissanæ genera significat, id quod iam monuimus, vt χονδροπτῖσάνη ex Zea decorticata ptissanam, & πτῖσάνη πνεύνη Triticeã ptissanam. Hippocr. εὖν δὲ τὶ δίδοναι γέλης κομίδης ἕνεκα, δίδοναι χόνδρον, ἢ πτῖσάνην πνεύνην. Dioscorides: πρὸς ἅς καὶ ἡ πνεύνη πτῖσάνη ἀρμόζει. Plinius. Italia maximè quidem Oryza gaudet, ex qua ptissanam conficiunt, quam reliqui mortales ex Hordeo. At ptissana simpliciter, & sine adiectione posita, Hordeum excortictum, ob eius præstantiam tantum significat. Hæc autem, vt ex variis Galeni locis, quorum nonnullos ponemus, colligi potest, hoc modo fiebat, Hordeum in aqua maceratum dum extumescat, in sole siccatur: mox in pila ligneo pistillo tantisper tunditur, dum corticem exuat. Hoc in aqua lento igne coquitur, donec succulentum reddatur. Galenus, quod sciam, aquæ & Hordei mensuram non exprimit. Oribasius vni parti Hordei decem partes aquæ miscet. Paulus vni parti ptissanæ quindecim partes aquæ. Eius parandæ modum tradit Didymus

Ptissana.

Lib. de Affectib.

Lib.2. c.79.

Lib.18. c.7.

Lib.1. c.78.

Lib.3. ca.9.

in Geoponicis Calsiani: *πρωσάνης ποίησις. κριθή βραχείᾳ (πρωσέ), ἢ ἡλίῳ ξηραίνεῖ, εἴτ' ἀπολίθειαι ἕτω. παρεμπάττειται δὲ αὐτῇ τὸ λεπτόν αὐτῆς. τηρεῖ δὲ αὐτὴν. ἐτι ἡ πρωσάνη ὑγροτέρα λαμβανομένη, τροφικωτάτη ἐστίν. ἔτω δὲ τὸ ὕδωρ δεξαπλάσιον τῷ τῶν κριθῶν μέρῳ. κόπτεται δὲ ἁλῶν ἀτριπλῶν εἰς αὐτὴν ἐμπατισόμενων. γίνεται δὲ ὅτι σίτος πρωσάνη ὁμοίως.*

Id est, Ptissana cōfectio. Hordeum maceratum tunditur, & in sole ficcatur, sicq; reponitur: inspergitur deinde quod ex ipsa est tenuius, quoniam eam conferuat. Ea humidior sumpta maximè nutrit. Vni parti Hordei decem partes aquæ iniiciuntur, & sal friatus ipsi inspergitur. Fit etiam ex Tritico ptissana eodem modo, de qua pauca hæc Plinius. Ptissana ex Hordeo vsus vtilissimus saluberrimūque tantopere probatur. Vnum laudibus eius volumen dicauit Hippocrates clarissimus medicinæ scientia. Ptissana bonitas præcipua Vticensi. Eius conficiendæ vulgata ratio est. Multo plura Hippocrates, quem citat Plinius in libro de ratione victus in morbis acutis, qui liber etiam de Ptissana inscribitur, velut ipse Hippocrates in libello de Veratri vsu citat, ac testatur, prodidit his verbis. Ptissana igitur recte omnibus frumentaceis eduleis præfertur in morbis acutis. Laudo sane eos qui ipsam prætulerunt. Nam lentor ipsius lenis est, & continuus, & iucundus, & lubricus: ea verò moderatè humida sitim adimit, & faciliè eluitur, si forte & hoc opus sit: & neque adstrictionem habet, neque malam turbationem, neq; in ventre intumescit. Intumuit enim in coctura, quam maximè tumescere solet. Quicumque igitur Ptissana in his morbis vtuntur, nulla die vasa vacua fieri permittant, vt ita dicam, sed vtantur, & intermittant, si non ob medicamenti, aut infusi per Clysterem vsu, intermittere oporteat. Et qui bis quidem in die cibum capere soliti sunt, eis bis danda est: qui verò semel edere consueuerunt, his semel primo die danda est. Verum sensim progressu facto, si fieri poterit etiam his bis detur, si sanè opus habere visum fuerit. Ptissanam porro ex optimo Hordeo factam esse oportet, & quàm optimè coctam, & præsertim, si non solo succo vti velis. Nam vna cum reliqua ptissana virtute, lubricus lentor facit vt Hordeum decorticatum non lædat. Nusquā enim adheret, neque secundum thoracis rectitudinem moram trahit. Lubrica vero maximè est, promptissime sitim eximit, facillimè concoquitur: & debilissima est optimè cocta, quibus omnibus opus est. Hæc Hippocrates. Quòquomodo Hordeum paraueris, inquit Galenus, nunquam corpus calefacit, sed variè pro modo præparationis humectat, ac siccat quandoquidem olenta ex frixo Hordeo facta, siccare perspicuè cernitur, Ptissana verò humectat præcipuè quum, vt decet, parata fuerit, hoc est, cum in coctione quamplurimum intumuerit: postea igne lento per multum otium in Chylum, siue cremorem fuerit redacta. Acetum ei tum admiscetur, cum plane intumuerit. Cum verò cocta exactè fuerit, sub edendi tempus salem tenuem iniicere oportet. Oleum autem si initio statim inieceris, coctioni nihil nocueris. Aliud tamen nihil est miscendum, nisi velis anethi, aut porri quippiam, idq; initio statim immiscere. Video autem Ptissanam à coccis omnibus pessimè præparari: In mortario namque crudam ipsam tundentes, non ad ignem coquentes dissoluunt. Sunt qui Amylum etiam iniiciunt, vt per coctionem in cremorem copiosum videatur esse redacta. Talis certè Ptissana meritò maximè est flatuosa, & concoctu admodum difficilis. Quæ verò in ptissana rectè præparanda prætermisi, ea nunc adiciere oportet. Crudam ptissanam aliquandiu in aqua præmaceratam, deinde in mortarium iniectam, manibus, terere conuenit, asperum quidpiam manu tenentibus. Vsque eo autem terenda, dum qui in superficie est cortex, sit abiectus: is enim quo vestitur, ceu tenui tunica, non totus inter pinsendum abiicitur. Quapropter & præmaceratur, & in mortario tunditur. Quod si nō quicquid est aceris deciderit, elixa ptissana

magis

Lib. 18. c. 7.

Li. 1. Alim.

magis quidem deterget, nullam autem aliam noxam accipit. Pessima est ptissanæ præparatio, cum ubi coci crudam ipsam in mortario cum aqua contuderint, deinde parū coxerint, sapā iniiciunt. Quidam cum his mel quoq; & cuminum iniiciunt, cinnum quendam veriùs quam ptissanam parantes. Verùm quæ rectè præparata est, vtilitates quas memorat Hippocrates tum sanis, tum ægrotis præstabit. Hæc Galenus de ptissanæ facultate tradidit. Ptissana Dioscoridi, ob cremorem in decoctione redditum plus alimenti præbet, quàm polenta ex Hordeo facta contra acrimonias, & gutturis scabritias, exulcerationesq; pollet, Hodie medici Hippocratis Galenique ptissana non vtuntur, sed eius vice Hordeum integrum suspenso mola decorticatum, quod Hordeum mundum vocant, tantisper in aqua decoquunt, dum pultis speciem referat: deinde tundunt, & tenui in cerniculo percolant saccharum addentes, & modo cum saccharo Amygdalarum dulcium cremorem, aut seminis Melopeponum, aut seminis Papaueris, modo aquam ex rosis stillatitiam pro variis scopis, & varia morborum ratione. Fit & hodie à pharmacopæis potio, quam ptissanam *καλαχρητικὴς* vocant, Galli *Tisane*, cum nec ptissana sit, nec ptissanæ cremor, sed eius tantum tenuius decoctum, ipsius substantiæ parum, aut nihil retinens. Fit enim ex Hordeo mūdato, Glycyrrhiza, & vuis pæsis. Qua ratione parata potio utilis est iis qui inflammatione pulmonis, partiūque respirationi seruientium, vel renum vesicæq; exulceratione laborant. Nunc de polenta dicendum. Eam propriè Græci *ἀλφίλον* vocant; quanquam *ἀλφίλον* etiam de omni alia præsertim rudiori farina impropriè dicatur. Quid autem sit, & quomodo fiat, Plinius declarat his verbis. Antiquissimum in cibis Hordeum, sicut Atheniensium ritu Menandro auctore apparet, & gladiatorum cognomine, qui Hordearij vocabantur. Polentam quoque Græci nō aliunde præferunt. Pluribus fit hæc modis. Græci perfusum aqua Hordeum siccant nocte vna, ac postero die frigunt, deinde molis frangunt. Sunt qui vehementius tostum rursus exigua aqua aspergunt, siccantque prius quàm molant. Alij verò virentibus spicis decussum Hordeum recens purgant, madidūque in pila tundunt, atque in corbibus eluunt, ac siccatum sole rursus tundunt, & purgatum molunt. Galenus ex recenti Hordeo mediocriter frixo laudatissimam fieri polentam scripsit, cuius si copia non sit, & ex alio ipsam confici. Cum autem polenta omnis rectè facta boni sit odoris, eam esse suaue olentissimam, quæ ex optimo ac recenti Hordeo, & quod aristam non admodum siccam habeat, est confecta. Compluribus autē per sanitatē morem esse eam sapa & vino dulci mulsōque commistis, nonnunquam sola etiam aqua conspersam, æstate duabus, tribusue ante balneum horis bibere, dicerēque sentire se hoc potu siti liberari: si autem cum vino austero fuerit pota, ventrem desiccare. Polenta gentes quasdam pro pane vti, idque rusticos in Cipro facere, tametsi frumenti plurimum metant. Veteres militibus polentam præbuisse. Romanos tamen milites ipsius imbecillitatem damnantes, ea non amplius nunc vti. Exiguū enim corpori alimentum dare, priuatis quidem, & omni exercitatione abstinentibus, satis multum: iis autem qui quoquo modo exercentur, minùs quam satis est. Cæterum cum polenta Hordei frixi farina sit, vt ex Plinio & Galeno diximus, Aetius non dissimilem huic rem descripsit, sed *βιώνη* appellari ait, quod nomen à nullo alio vsurpatum fuisse memini: τῶν τελλόντων, inquit, τὰ οἰ δῆμια τὰ ἔστι καὶ τὸ λεγόμενον βιώνη. ἔστι δὲ κελεύθῳ βεβρεγμένη καὶ βλεφθήσασα, καὶ πεφρυγμένη μετὰ τῶν γλωσσίδιον, ἃ καὶ ἀπλοῦς καλεῖται. Id est, ex eorum quæ tumores cohibent numero, est & id quod Byne appellatur. Est autem Hordeum madefactum quod germinet, vna cum enatis ligulis tostum, si tritum pro cataplasmate imponatur. Hoc nomine Aetius indicat Hordeum ad

Polenta.

Li. I. Alim.

Li. IO. c. 29.

Ceruisiam conficiendam præparatum, quod Maltum vulgo appellant, Germani *Maltz*. Ceruisia autem ad cuius decoctionem illud conficitur, Germanis *Byre*, Gallis *Biere* dicta, parum à Byne distat. Laudatissimum fit Maltum mense Martio, & Aprili. Qualitate sicca præditum est, maiore quàm in Hordeo, frigida multò remissiore. Nam empyreuma quod illi ab assatione diutinâque coctione accedit, siccitatem eius auget, frigiditatem verò non solum minuit, sed & caliditatem quandam ei imprimit. Quare Galenus cum scribit Hordeum, quoquo modo quis eo vtatur, siue ptissanam coxerit, siue polentam fecerit, vim quãdam refrigerantem retinere, id de Malto intelligere non potuit, quod partim ipsa germinatione, partim longiore tostione magis à natura sua recessit quàm polenta, quæ vel ex crudo nondumque maturo Hordeo, vel in aqua macerato tantum conficitur. Absterget præterea Maltum Hordeo vehementius, tum quia farinæ minus, glumarum plus habeat, tum ob empyreuma, quod abstersionem coniunctam habet. Ventris torminibus, aliisque similibus ex frigida causa doloribus Maltum subuenit, tostum, feruensque in sacculo appositum. Polenta multo plus Hordeo desiccatur, inquit Galenus, aluum etiam cohibet auctore Dioscoride, & inflammationes mitigat. Tamen in vulgatis Dioscoridis exemplaribus legimus, τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἄλευρον κοιλίας φιλτικόν, & φλεγμονῶν πραιντικόν. Id est, farina ex his aluum sistit, inflammationes mitigat, vt de farina Hordei de qua multa prius dixerat, hæc etiam intelligantur. Sed exemplaria falsò ἄλευρον pro ἄλφιτον habere contendit Cornarius, vt ex Plinio intelligere licet sic scribente. De polentæ generibus in frugum loco satis diximus, locorum ratione, quæ à farina Hordei distat, eo quod torretur. Ad stomachũ utilis, aluum sistit, impetúsque rubicundi tumoris, (nempe erysipelatis. Galenus quoque scribit polentam multo magis quàm Hordeum siccare. Sed quoniam ad τὴν ἄλφιν, id est, polentæ discrimen ὡμὴ λύσις, & composita voce ὡμήλυσις dicta esse videtur, quid ea sit etiam hîc explicandum. Polenta igitur Hordei tosti farina est. ὡμὴ λύσις Galeno, & reliquis medicis Græcis, cruda Hordeacea farina est: ideoque Plinius ait, Polentam à farina Hordei distare, quia torretur. ὡμήλυσις cruda Hordeacea farina est nulla alia re admixta. Id ex eo perspicuum fit, quod ubique in eius usu res & liquores exprimuntur, quibus ea farina excipi, & cum quibus subigi, parari, & coqui debeat. Quare falsum est ὡμήλυσιν semper significare crudam Hordeaceam farinam aqua & oleo subactam, quod in εἰσγωγῇ libello Galeno falsò attributo legitur. Neque solum cruda Hordeacea farina per ὡμήλυσιν significatur, sed etiam Triticea. Quapropter nonnunquam ei vocem adiiciunt, quæ certam farinæ speciem indicet. Galenus: καταπλάσμασι δὲ χρῶ κεθίνῃ ὡμὴ λύσφι. In Cataplasmate verò vtere Hordeacea cruda farina. Quin & sola hæc vox ὡμὴ λύσις Hordeaceam crudam farinam significat, vt paulo post, ἢ τῇ ὡμὴ λύσφι δὲ ὀξύμελιος γενομένη. Aut cruda Hordeacea farina cum Oxymelite apparatus. Idem alibi ἢ τῇ ὡμὴ λύσφι κεθίνῃ, ἢ πυρενῇ ἐν γλυκεῖ ἐφομένη. Aut cruda Hordeacea farina, aut Triticea, in passo cocta. Neque solum ὡμήλυσιν de cruda Hordeacea farina, aut Triticea vsurpatur, sed vniuersè de omni cruda farina. Galenus. Καὶ ὡμὴν λύσιν ἐπιθεθὲν, τὴν διὰ κεθίνῃς ἀλεύρε, ἢ διὰ λινοσπέρμου, ἢ τήλεος, ἢ καὶ μέγματος ἐκτέτων. Quin & omelysis ex cruda Hordeacea farina imponenda, aut ex farina seminis lini, aut fænigraci.

* *

AVENA

BΡΩΜΟΣ & βρόμος Græcis, Auena Latinis dicitur, Arabibus *Chur-* *Nomina*
tal, Italis *Vena*, Germanis *Habern*, Hispanis *Auena* & *Auea*, Gallis
Auoine, Angl. *Oetes*, *Etes*, & *Hauer*. De Auena satiua hîc agimus. Est *Genera.*
 & sponte proueniens, ex hordeo degenerante, *Ægilops* nuncu- *Forma*
 pata, de qua postea dicemus. Est etiam βρόμος herba. Auena culmo est genicu-
 lato, folio Tritico ac Zeæ simili, in cacuminibus pendulas veluti paruas bipe-
 des locustas gerit, quibus semen oblongum, superiore parte exiguis capillis
 hirsutum, ac glumis inuolutum continetur. Radices habet copiosas, ex quibus

A V E N A



multi enascuntur culmi. Passim nascitur Aue- *Locus.*
 na & vère fata, æstatis fine demetitur. Dio- *Tempus.*
 scorides de Bromo hæc scripsit. Bromus cul-
 mus est Tritico similis etiam foliis, sed geni-
 culis distinctis. Fructum autem habet in sum-
 mo, velut paruas locustas bipedes, in quibus
 semen est vtile ad cataplasmata, quæadmodû
 hordeum. Sed & pultem ex ipso faciunt, quæ
 aluum sistit. Cremor autem ex ipso à tussien-
 tibus commodè sorbetur. Quæ herbarij, opi-
 nor, omnes de Auena nostra satiua scripta es-
 se intelligunt. Verûm Plinius de Bromo quâ-
 uis ita scribat, vt & ipsum inter vitia segetis
 ponat, & cum *Ægilope* confundat, tamen
 eadem quæ Dioscorides de ipso tradit. Sic
 enim ait: Nascitur inter vitia segetis, Auenæ
 genus: folio & stipula triticum imitatur. In
 cacuminibus dependentes paruulas veluti lo-
 custas habet. Semen vtile ad cataplasmata,
 æquè vt hordeum, & similia. Prodest tussien-
 tibus succus. Theophrastus Bromû & *Ægi-*
lopa velut syluestria & immitia eo loco pro-
 ponit, quo rē hanc frumentaceā multum illu-

Corn. Em-
 bl. 82. lib. 1.
 Li. 22. fine.

strat. Τῶν ὁμοιοπύρων καὶ ὁμοιοκρίθων, ὅιον ῥεῖας τίφης, ὀλύρας, βρόμος, αἰγίλωπος, ἰχυρό- *Lib. 8. Hist.*
 τερον καὶ μάλιτα καρπιζόμενον ἢ ῥεῖα, καὶ πολλύρριζον, καὶ βαθύρριζον, καὶ πολυκάλαμον. ὁ ὅ- *cap. 9.*
 καρπὸς κουφότατος καὶ προσφιλέσσι πᾶσι τοῖς ζώοις. τῶν ὁ ἄλλων ὁ βρόμος πολύρριζος. καὶ πολλύρριζος. ἢ ὁ ὀλύρα μαλακότερον καὶ ἀσθενέστερον τούτων. ἢ ὁ τίφη πάντων κουφότατος, καὶ
 καὶ μονοκάλαμος. διὸ καὶ χώραν ζητεῖ λεπτήν, ὅχι ὥσπερ ἡ ῥεῖα πίπτει καὶ ἀγαθὴν. ἔστι ὁ δὲ
 ταύτα καὶ ὁμοιώτατα τοῖς πυροῖς: ὁ τ' αἰγίλωψ καὶ ὁ βρόμος, ὥσπερ ἀγρίαι ἀτὰρ καὶ ἀνήμεραι ἐπιχαρ-
 πίζονται καὶ ὁ αἰγίλωψ σφόδρα τὴν γῆν. καὶ ἔστι πολύρριζον καὶ πολυκάλαμος. ἢ ὁ αἶρα παυσελῶς
 ἀπιχρῖόμενον. Id est, inter ea que Tritico & Hordeo similia sunt, velut est Zea, Ti-
 pha, Olyra, Bromus, *Ægilops*, robustissima est Zea, & maximè terram ex-
 haurit: nam & multas & profundas radices habet, & culmum, multum verum
 fructus leuissimus est, & omnibus animalibus gratus. Inter reliqua verò Bromus
 multas radices agit: etenim multos etiam hic culmos habet. At Olyra mollior
 & imbecillior his est. Tiphæ verò omniū leuissima est: vnūque tantū calamū
 habet. Quare etiam terram desiderat tenuem, non quemadmodum Zea pin-
 guem, & bonam. Sunt autem duo hæc etiam Tritico similia *Ægilops* & Bro-
 mus, veluti syluestria quædam, & immitia. Exhaurit autem *Ægilops* vehemen-
 ter terram, multasque radices, & multos culmos habet. Lolium verò penitus
 syluestre est. Hæc Theophrastus. Cæterum quemadmodum χῶνδρος & χῶνδροπλισ-


σάνη, & πυρίνη πλιωσάνη ex Zea & tritico fiebant, & πλιωσάνη ex hordeo, & τράγος ex olbyra, sic βρόμος ex Avena paratum edulium, veteribus videtur fuisse, id quod Paulus ostendit. Cum enim ptissanæ coquendæ modum declarasset, subiungit, παραπλησίως ὅ τῇ πλιωσάνῃ τὸ ὁ βρόμος τὸ ὁ χόνδρος ἐΨείλαι. Idest, eodem autem modo quo ptissana Bromus & Chondrus decoquuntur. Quare βρόμος vt alia segetum genera quæ diximus, & frugis speciem quam Auenam nominamus, & rem ex ipsa factitiam significabit. Galenus Bromum iumentorum alimentum & pabulum esse scripsit, non hominum, nisi aliquando extrema fame ad panes ex eo quoque semine conficiendos compellantur. Citra famem autem coctus Bromus ex aqua manditur cum vino dulci, aut sapa, aut mulso; non aliter quam Typha. Caliditatis autem satis particeps est vt illa, quamquam non æquè est durum: ex quo minùs quoque corpus nutrit. Panis qui ex Avena fit alioqui est insuauis, non tamen aluum aut sistit, aut proritat, sed quod ad id saltem attinet, medium locum obtinet. De eodem vt medicamento hæc etiam Galenus. Bromus vnum est ex leguminibus, quod vt medicamentum, similem hordeo vim obtinet: nam illitum desiccatur, & digerit mediocriter, & sine morfu. Temperiem autem habet paulò frigidior, non nihil etiam adstrictionis obtinet, vt ventris profluua iuuet. Quo Galeni loco, legitur, βρόμος ἐστὶ μὲν ἐν τῶν ὀσπρίων, cum σιτηρῶν pro ὀσπρίων legendum videatur. Idest, Bromus est quidem vnum ex frumentaceis, vt frumentaceorum à leguminibus distinctio obseruetur, nisi quis dicat Galenum aliquando sine discrimine his vocibus vsus fuisse, cum & Panicum legumen appellet, & Alicam, & ptissanam. Quod Dioscori. pultem è Bromo fieri tradit, idem Plinius scripsit. Primum omnium, inquit, frumenti vitium auena est, & hordeum in eam degenerat, sicut ipsa frumenti fit instar, quippe cum Germaniæ populi edant eam, neque alia pulte viuant. Quod Plinius ait Germanos auenaceam pultem edere, etiam hodie verum est, sed quod non alia pulte viuant falsum. Nam & crassiore tum Zea, tum tritici farina quam crimnon vocant, Germani vtuntur, & ex ea pultem modo crassiorem, modo tenuiorem ac sorbilem faciunt. Sic etiam ex Avena crassiorem farinam instar crimni faciunt, quam cum aqua coctam addito butyro edunt, aut sorbēt, & ex eiusdem farina tenui pultem parant. Quin & in Saxonia magna, farina auenæ crassior, quam ipsi *Gorte* vocant omnibus fere obsoniis aspergitur vnà cum sale, & sic simul coquitur. Auenæ farina, vt Plinius ait, decocta in aceto næuos tollit.

BROMVS,

CAP. XIII.



B Avena fatiua vsu tantum Bromus differt, quæ inculta est & neglecta, non genere, nec figura, nec nomine: dicitur enim etiā βρώμος, & βρόμος. Herba Dodo. Histor. stirp. lib. 4. cap. 46. & in frument. ca. 63. Sed vt ab Avena discernatur, βρώμος πῶς vocatur, id est Bromus herba, siue Avena herba, Gallis *Aueron*, vel *Aueneron*, Italis *Vena vana*, id est *Avena cassa*. Tota natura habitūque ipso syluestris quædam Avena est, multiplicibus, & geniculatis culmis, foliisque eam referens, vtrisque tamen tenuioribus: spicæ à sese magis dissitæ aristas asperiores longioresque habent: semen euanidum in tuniculis fermè vacuis, quare steriles Auenas dixit Virgilius. Radix copiosa est, ac tenuis. Aestate secus vias & agrorum margines reperitur. Huic valde affinem Bromum sterilem alteram Lobellius facit, quam Dodonæus Aegilopem, seu festucam alteram, Germani *Dort*, & *Lulch*, Belgæ *Draich* appellant. Culmis foliisque Secale refert: ex culmorum vertice pendulæ conspiciuntur spicæ, Auenæ propemodum similitudine, sed breuiores, & arctius coniunctæ. Semina oblonga sunt



ga sunt, longitudine graui secalini, sed angustiora, tenuiora, leuiorâque multo, quæ vtriculis paruis continentur. Propriè secalis est vitium: neque enim cum aliis frugibus, aut rarissimè reperitur. Crescit, veluti alia eius generis per imbres frequentes, hiemis annique constitutionem clementem, & tepidam. In Secali & agrorum marginibus reperitur apud Belgas. Matthiolus Aegylopis primæ nomine depinxit. Bromus herba, auctore Dioscoride, exiccatoriam vim habet: decoquitur cum sua radice ad tertias, & iuri colato par modus mellis adiicitur: rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum ex eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam vlceraum efficax est. Aliqui tritam Aloen addunt, & eo modo vtuntur. Cum siccis rosis cocta in vino grauem oris halitum emendat.

Li. 4. c. 129.

ÆGILOPS,

CAP. XV.



ΑΓΙΛΩΨ Græcè, & Latinè Aegilops dicitur, à Plinio festuca, Arabicè *Dausir*, *Dalifit*, *Desana*, *Daufer*, siue *Dasser*, Italicè *Egilopo* Aegilops inquit Dodon. folio est tritici, sed culmo tenui spicaque siue iuba Auenæ similis est: grana eius oblonga sunt, hirsuta, subrubra, folliculo inclusa, ac tenuem capillaceam, longamque aristam habent. Brabanti *Ghebaerde euene* vocant, quasi dicas auenam aristis aut barbula donatam, quæ cum Dioscoridis descriptioni consentire videntur, sic enim ille. Aegilops herbula est folia tritici similia habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternâue rubra, in quibus aristæ veluti capilli exeunt. Lobellio non Aegilops, simpliciter, sed Aegilops Bromoides Belgarum dicitur inter Aegilopem & Bromum media, priori Bromo aut Aegilopi similis. In Anglia, Belgio & Gallia inter Hordeum & Secale frequēs occurrit. Num eadem quæ Aegilops præstet, hactenus incompertum. Aegilopem aliam Narbonensem pictam ostendunt

Nomina

Forma

Li. 4. c. 134.

Lobel

ÆGILOPS Dodon.

L. 18. ca. 17.



Li. 1. Alim.

tico frequens lolium inueniri scribit, in hordeo vero reperiri sed parum, Ægilopem autem in hordeo frequentem esse, cum prima generatio vel incrementum ipsis non rectè successerit. Porro patrem suum ætate iam declinante cum agricultura delectaretur, Triticum ac Hordeum aliquando seminasse omnibus diuersi generis feminibus, quæ ipsi erant admista, diligenter selectis, quò certò

Lobellius & Matthiolus, quæ nascitur inter triticum & hordeum agri Narbonensis & Galloprouinciæ, æstuosis & glareosis marginibus qualem Dioscorides delineat, herbulam sesquipalmum aut duos palmos altam, foliis triticeis, exilibus, spica exigua, breui, duo plurimum, interdum tria grana ferente, glumis conclusa striatis, & aristis ex singulorum granorum apice, non ex spica emergentibus: grana hordeacea sunt, radix triticea, pusilla. Adicit Pena se nō semel expertum ægilopi morbo potius cœpto quàm iam longius progresso profuisse. Exicat enim adstringendo citra calorem multum. Semina potui cereali indita temulentos homines faciunt. Est autē veterū Aegilops auena quæ sua sponte prouenit & ex hordeo in eam degenerante fit, atque ob id frumenti vitium à Plinio dicitur, vbi etiam non aliter hordeū à festuca quæ vocatur Ægilops enecari dicit, quàm triticum ab Aera, id est lolio, & cicer & eruum ab herba quæ inde orabanche appellatur. Galenus quoque in Tri-

*ÆGILOPS LOBELLII,**& Pena.**ÆGILOPS SECUNDA**Matth. radice & foliis diuersa.*

cogno

cognosceret, num ex ipsorum mutatione lolium & Ægilops nascerentur, an propriam hæc quoque semina naturam haberent. Cum autem fortè vna cum puris seminibus in Tritico quidem frequens Lolium, in hordeo autem parum, sed magnam Ægilopsis vim natam conspiceret, in aliis quoque seminibus idem experiri esse aggressum. Ægilops discutiendi vim habet auctore Galeno, id quod ex gustu cognoscitur: leuiter enim acris est. Verùm & ex eo liquet, phlegmonas induratas & Ægilopas eam sanare. Est autem Ægilops abscessus inter magnum oculi angulum & nasum, qui si neglectus fuerit in fistulam abit, vsque ad os progredientem. Archigenes apud Galenum, ad ægilopa succum herbæ Ægilopsis cum melle illinit. Item Dioscorides illitam cum farina herbam Ægilopiis mederi scripsit, duritiâsque discutere. Succum farinae admistum siccari, & eorundem gratia reponi. Ægilopas, inquit Plinius, sanat herba eodem nomine, quæ in hordeo nascitur Tritici folio, semine contrito cum farina permixto impositoque, vel succo. Exprimitur hic è caule, foliisque prægnantibus, dempta spica, & cum trimestris farina digeritur in pastillos.

Lib. 6. sim.
Vires &
Temper.

Li. 5. ph. lo.
cap. 2.

Li. 25. c. 13.

O R I Z A ,

CAP. XVI.

ORYZAM τῶν σιτηρῶν εἶδος εἶναι, id est frumentaceorum generis esse scribit Dioscorides. Galenus inter legumina recenset. Legumina, inquit, appellant ea cerealia semina ex quibus panis non fit, ut puta, fabas, pisa, cicera, lentes, lupinos, Oryzam, & cætera. Ut ὀρυζα Græcis, ita Latinis Oryza nominatur, Theophrasto ὀρυζον neutro genere, Arabibus *Arz*, seu *Arzi*, Gallis *Rys*, Italis *Rizo*, Germanis *Rheisz*, Hispanis *Arroz*, Anglis *Rist*. Oryza foliū profert arūdinaceū, carnosum, porraceo haud absimile: culmum cubitalem & sæpe maiorem, geniculatum, Tritico crassiorē, firmio-

Lib. 2. c. 88.
Li. 1. Alim.

Nomina
Lib. 4. Hist.
cap. 5.

Forma
Matthi. in
c. 88. lib. 2.
Diosc.

O R Y Z A .



remque, in cuius fastigio iuba oritur, siue spica in ramulos diuisa, in quibus semen vtrunque impari exortu prouenit, cortice subflauo, tectum, aspero, veluti striato, oui figura, quod gluma excussa candidum est. Plinius similiter Oryzam describit. Oryzæ quidem folia carnosâ, Porro similia, sed latiora: altitudo cubitalis: flos purpureus: radix gemmea rotunditatis. In palustribus riguisque nascitur, inquit Dioscorides. Peregrinum initio semen, ex Indiâque allatum. In Bactrianis quoque ac Babylonia & Suside, atque Syria inferiore nascitur. Nunc in Italiæ & Pedemontanæ provinciae multis, & in quibusdam Galliæ locis gignitur, sed copiosissima in Asia, Syria, & Ægypto. Oryza auctore Dioscoride, medio-criter alit, sed aluum suppressit. Semine hoc, inquit Galen. omnes in sistenda aluo vtuntur, ipsum eodem modo quo Alicam coquentes: difficilius tamen quàm alicâ conficitur, & minus alit, & utique in edendi suauitate ab ea quamplurimum vincitur. Idem alibi. Oryza habet adstrictorium quidpiam: quare medio-

Lib. 8. c. 7.

Locus.

Lib. 2. c. 88.
Vsus &
Vires.
Li. 1. Alim.

Lib. 8. sim.
Lib. 8. c. 7.

criter ventrem sistit. Italici maximè Oryza gaudent, inquit Plinius, ex qua ptis-
sanam

Lib. 2. Ser.
sat. 3.

sanam conficiunt, quam reliqui mortales ex hordeo. Vnde apud Horatium medicus ait, Agedum sume hoc ptisanarium Oryzæ, quod videlicet ptissana modo præpararetur. Hodie verò ex Oryza puls fit, in qua solidæ ipsius partes manent, eaque datur in cibum, non autem eius succus, cuiusmodi hodie fieri consuevit hordeacea ptissana in qua nihil inest præter aquam, & hordei cremorem. Theophrastus hæc de Oryza tradidit. μάλλον ὃ σπείρουσι τὸ καλὸν ὄρυζον, ἐξ ὃ τὸ ἐΨημελ. τοῦτο ὃ ὁμοιον τῇ ζεία, καὶ περιπληθύνει ὄιον χόνδρος, εὐπεπτον δὲ, τὴν ὄψιν πεφυκὸς ὁμοιον ταῖς αἰραις. καὶ μένει τὸν πολὺν χρόνον ἐν ὕδατι. ἀποχρεῖται ὃ οὐκ εἰς τὰ χυμ, ἀλλ' ὄιον φόβην, ὥσπερ ὁ κέγχρος, καὶ ὁ ἔλυμος. Idest, serunt potissimum Oryzon ex quo iuscula parant. Hæc Zeæ similis est, tusæque veluti Alica facilè concoquitur, aspectu lolio similis. Diu in aqua manet, effunditur non in spicam, sed veluti in iubam, Milij, aut panici modo. Oryza in lacte bubulo, aut amygdalarum cremore, aut carniū pingui iure decocta, concoctu facilior est, & ori gratior. Vtilis cibus est dysentericis, celiacis, & diarrhœa affectis, præsertim si prius torrefacta, lacti in quo igniti calculi fuerint extincti, incoquatur. Sunt qui Oryzam quoque dicant genitale semen augere, in bubulo lacte decoctam, addito saccharo, & cinnamomo. Oryzæ decoctum vtiliter dysentericis infunditur, ac etiam potandum datur. Farina cataplasmatibus repellentibus rectè admiscetur: mammarum incipientes inflammationes arcet.

Li. 4. Hist.
cap. 5.

Matt. in c.
88. l. 2. Dio.

MILIVM, CAP. XVII.

Nomina

ΚΕΓΧΡΟΣ Græcis, & Straboni κέγχρος, Hippocrati πασπάλη, ut vult Hermolaus, Galeno πάσπαλος non πασπάλη, nam in Glossis Hippo. πασπαλέτης exponit κέγχραλέτης, & addit, πάσπαλος ὃ κέγχρος. Latinè Milium dicitur, Arabicè leuers, Geguers, siue Giauvers, Italicè Miglio, Germanicè Hirsz, Hispanicè Milho, & Miyo, Gallicè, Mil, & Millet, Milium à Miliaria summa deriuatum Festus existimat, non à Græcis. Contra Varro à Græco deducit, nam id Melinen, inquit vocant: cum tamen Dioscorides & Galenus Melinen Panicum intelligant. Farinam miliaceam, seu fractum Milium, inquit Hermolaus, sunt qui scrutū vocari putent in Horatij versu illo.

Corol. 107.
libr. 2.
Libr. 1. Epi.
7. Epist.

Vilia vendentem tunicato scruta popello.

In Perfa.
Scenater-
tia, quo in
loco plerique
omnes legunt: Cō-
misce mul-
sum: stru-
thea, colli-
biæque
appara.
Li. 3. ca. 14.

Sunt quibus vasis appellatio ea potius esse videatur, ex scroto idest corio confuti, vel esculenti quoddam genus lecytho contrarium, ut Plautus quoque scrutea & Collubia in hunc fortè sensum appellauerit: vel in Horatio fortè non scruta, sed scuta legas pro vasculo rustico, vnde Scutrisum Catoni sæpe numero dictum. Sed nihil horum scruti nomine significari, imo vetera & fracta feramenta, pannos veteres, vasa dimidiata, & cætera Lucillius apud Gellium demonstrat his verbis. Quidni? & scruta quidem, ut vendat scrutarium laudat. Præfractam strigilem, soleam improbum dimidiatam, γούτη & γούτριάρι nominant Græci. Vnde γούπωλης qui vasa fracta & similia vendit. A Milio quoque miliaria aues dictæ, ut Varroni placet, quòd ad hanc frugem turmatim se conferant, eaque vescentes saginantur. Vulgus nostrum Hortulanos appellat, obiecto Milio in caueis sic pinguescentes, ut vel obesiore corpore suffocatae moriantur, vel in necatis nihil aliud spectetur quam adipis moles. Lugduni aucupes ad epularum delitias alunt, magnòque vendunt: & quamvis cenchridi aui nomen videatur Milium indidisse, eam tamen miliariam non esse certum est, cum cenchridem, ut refert Plinius, accipitrum generis Græci faciant, quàm Latini Tinnunculum à voce & sono, vocant: Galli vero. *Quercerelle*, vulgo bene cognitam, quòd in altis vrbium turribus nidificet. Sed ad rem redeamus. Milij nostratis historiam primùm ponemus: deinde Milij Indici, cuius genera duo.

Milium

MILIVM nostras.



Milium nostras in frumentaceis, iisque frugibus ex quibus panes fiunt, à Galeno & Dioscoride numeratur. Radicem numerosam habet, altam & duram: multiplici culmo fruticat, cubitali, crasso, geniculato, lanuginoso. Folia gerit ampla ac arundinacea. E summis caulibus non spicas, sed effusas pmit iubas, seu paniculas longas, diuulsasque, & in terram pronas, ac reflexas. Milij comæ, inquit Plinius, granum complexæ fimbriato capillo curuantur. Theophrastus iubam siue comam *φοβὴν* appellat. ἡ δὲ καλεῖται ἀπόφους, inquit, φοβὴ. In iubis illis copiosum gignitur semen, paruum, rotundum, durum, splendens, & subflauum, tenui tunica vestitum. Milium leuē solutāque terram desiderat, nec in sabuloso solum, sed & in arenoso quoque prouenit, modo vel humido cœlo, vel riguo solo: nam siccum cretosumque reformidat, vt ait Columella. Ante ver commodè feri non potest: quoniam temporibus maximè lætatur. Vltima tamen partem mensis Martij commodissimè terræ commit-

Forma.

Li. 18. ca. 7.
Lib. 8. Hist.
cap. 3.

Locus.

Li. 2. ca. 9.
Tempus.

Li. 18. ca. 7.

lib. 1. ca. 57.
Li. 1. Alim.

Vsus.

Li. 18. ca. 10.

Li. 18. ca. 7.

Lib. 2. ca. 9.

In ca. 90. li.
2. Dioscor.

Lib. 2. c. 90.

Vires &
tempera.
Lib. 7. sim.

titur. Plinius Miliū inter frumenti quoque genera verna connumerat. Milium Theophrastus refert siccitate sua diuturnum esse: idem plus annos centum durare, si quò ventus & aër non perueniant, condatur, auctor est Varro. Milio numquam in pane vtuntur, vrgente frugum penuria, inquit Galenus, panis tamen ex eo exigui est alimenti, & refrigerans. Constat insuper præaridum, & instar arenæ friabilem esse: nihil enim in se habet pinguitudinis, & lentoris. Iure ergo aluum humidiores exiccat. Agricola, huius farina cocta, admisto adipe suillo, & oleo vescuntur. Panem etiam & pultem ex Milio fieri testatur Plinius, cum scribit. Milio Campania præcipuè gaudet, pulcramque candidam ex eo facit. Fit & panis prædulcis. Sarmatarum quoque gætes hac maximè pulte aluntur: & cruda etiam farina equino lacte, vel sanguine è cruris venis admixto. Hæc puls etiam Germanis hodie in vsu est, cum lacte cocta butyro addito, & saccharo plerumque asperso. Alibi Plinius panis, inquit, multifariè & è Milio fit, è panico rariùs. Sed nullum frumentum ponderosius est, aut quod coquendo magis crescat. L x. pondo panis è modio redeunt, modiusque pulvis ex tribus sextariis madidis. Panis ex Milio conficitur, inquit Columella, qui antequam refrigeret, sine fastidio absumi potest. Sed quamuis panis ex Milio nisi in magna reliqui frumenti penuria non fiat, ait Galenus, tamen is dum recens est, vt scribit Matthiolus, & à pistore recte paratus, vt Veronæ fit, & ita calidus vt è furno excipitur, deuoratus sua quadam suauitate placet, & à multis expeditur. Cum verò obduruit, planè ingratus est. Siluicolæ Tridentini sola pulte miliacea quam vulgò polenta vocant, aluntur, eam cum lacte edentes. Milium inquit Dioscor. in panes coctum minus ceteris frugibus alit: sistit pulte sua aluum: vrinam cit. Torretur Milium, feruensque in sacco ponitur, vt torminibus reliquisque doloribus, si ægra pars foueatur, auxilio sit. Milium Galeno primo ordine refrigerat, exsiccat verò tertio exoluto, aut certè secundo intenso: habet etiam paullulum tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura instar edulij comestum, plane inter omnia frumentacea minimū confert nutri-

Li. 2. ph. 10.

Libr. 2. de
victus rat.
morb. acu.

Li. 22. c. 25.


menti, sed & ventrem siccat. Porro foris impositum in sacculis, idoneum est fomentum iis quæ citra morsum exsiccare postulant & cataplasmatibus modo illitum exsiccare potest. Attamen admodum friabile est. Proinde difficilis est eius in cataplasmatibus usus. Idem alio in loco fomēta ex Milio in capitis dolore laudat, quod ut ait Hippocrates, leue ac lene sit Milium. Sic enim ille scribit: Πυρίη ὀξυρῆ, ἄλες, κέγχροι πεφυγμένοι ἐν ἐριόῃς μαρσυππίοισιν ἐπιηδεδότατοι: καὶ ὁ κοῦρον καὶ ὁ προσηνὲς ὁ κέγχρος. Id est, fomentum siccum ex sale ac Milio torrefactis, ac laneo marsuppio exceptis accommodatissimum. Etenim leue ac lene Milium est, quod Plinius leuissimum ac mollissimum esse dixit. Milio sistitur aluus, discutuntur tormina, in quem usum torretur ante. Neruorum doloribus, & aliis feruens in sacco imponitur, neque aliud vtilius, quoniam leuissimum mollissimumque est, & caloris capacissimum. Itaque talis usus eius est ad omnia quibus calor profuturus est, farina eius cum pice liquida serpentium, & millepedæ plagis imponitur. Hæc Plinius. Milium igitur ad flatus repellendos fomentum est optimum, præsertim si cum sale commixtum fuerit. Quin & præstantius redditur additis chamæmeli floribus. Milium medicamenta & carnes, si in eius aceruo sepeliantur, à carie & putredine diutius vindicat.

MILIVM INDICVM, siue MELICA. (AP. XVIII.

In c. 91. lib.
2. Dioscor.

SUNT alia quoque Milij genera peregrina. Indici meminit Plinius his verbis. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam inuentum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolefcit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis, Phobas vocant, omnium frugum fertilissimum. Matthiolus Milium istud frugis genus esse existimat quod vulgo Melica dicitur, Insubribus *Melega*, Hetruscis *Sagina* aliis Italiæ populis *Sorgo*, apertèque hallucinatum fuisse Ruellium, cum scri-

*MILIVM INDICVM,
siue Melica Matthio.*



*MILIVM INDICVM,
siue Melica Dodon.*



bit Panicum in Italia Melicam appellari, cùm hæc appellatio nusquam in Italia panico sit indita. Ei fortasse errandi occasionem præbuit nominis Melicæ & μελίνης siue μελίνος vicinitas, quæ fecit vt Panicum cum *Sorgo*, & huius descriptionem cum illius descriptione confuderit. Germani *Sorgsamem*, vocant, Lusitani *Milium Saburum*, Dodonæus Panicum Indicum, alij Panicum peregrinum, id ex Panici genere esse existimantes, quorum certè probabilior est opinio, quàm Fuchsi, qui Farris genus facit, cum quo similitudinem nullam habet, cum Panico verò aliquam: sed illi cum Milio magis conuenit: quam ob causam Milium Indicum Plinij Matthiolus esse putat, vt diximus. Est autem Melica, vt vulgari vtar nomine, frugis genus tribus, quatuor, aut pluribus asurgens culmis, arundinaceis, præaltis, septem octo nonnumquam decem pedum altitudine, vel maiore, nouem articulis plurimum distinctis, medulla candida farctis. Folia è singulis geniculis exeunt cubito longiora, tres quatuorve digitos lata. Paniculas in summis culmis profert, dodrantaes aut longiores, rectas, non inclinatis, granis multis confertas, Milio maioribus, ac Lenti ferè paribus, alias minus, alias magis in rufo nigricantibus. Radicibus firmatur multis, validis ac fibratis. Tota planta arundinem prorsus refert, adeo vt agri in quibus ad maturitatem vsque Melica adoleuit arundineta procul esse videantur. Culmi & spicæ semine maturescente rubescunt. Solum amat pingue & humidum. Gignitur in Italia, Hispania, & aliis calidioribus regionibus. Ex æstiuis sementibus est: Autumno maturescit. Legitur granum à rusticis, moliturque in farinam, ex qua panem faciunt. Hetruria tamen potius ad columbarum gallinarumque saginam ferit, quàm ad hominum alimentum. Ex huius Milij Indici culmorum medulla fit medicamentum adstrumas præstantissimum hoc modo. Ex decem culmorum huius internodiis extrahitur medulla, quæ cum spongia noua, integra, rubentéque comburitur. Hæc in puluerem teruntur additis piperis nigri granis duodecim. Huic pulueri admiscetur triticæ farinæ vncia. Deinde omnia ouo recente excepta in placentam conformantur, quæ sub feruentibus cineribus coquitur. Ea in sex partes diuiditur, quæ Luna decrescente alternis diebus strumoso dormitum ituro edendæ præbentur, nullo addito potu. Idem altera & tertia Luna repetitur. Hoc medicamento multos curatos esse scripsit Matthiolus. Idem auctor est flores qui ex rubris huius milij Indici paniculis excutiuntur, drachmæ pondere ex rubro vino haustros rubra fœminarum profluuia sistere, quemadmodum albos flores ex paniculis albis exceptos albos vteri fluores cohibere. Item dari vtiliter dysentericis, & aliis fluxionibus alui affectis. Idem quoque præstare granorum putamen, oui vitello probè decocto exceptum, & à ieiunis deuoratum. Aliud Milij Indici genus à Iacobo Antonio Cortuso nobili Patauino ad se missum scribit Matth. quod culmis, foliis, paniculis superiori simile est, sed eo pulchrius, & præstantius, glumâ facilè exuit, meliorq; ex eo fit panis. Milij generibus Dodonæus adscribit plantam quam recentiores Lacrymam Iob seu Christi nominât, de qua cum Lithospermis dicemus.

Lib. 2. c. 28.

Nomina

Lib. 4. c. 12.
In Histo.
plant. 295.Forma
Melica.

Locus.

Tempus.

Vsus &
Vires.

Ibidem.

In ca. 91. li.
2. Dioscor.
Histo. fru.
cap. 24.

PANICVM, CAP. XIX.

PANICVM Græcis, Latinis Panicum appellatur, Arabibus *Dochon*, Italis *Panico*, Germanis *Pfenich*, & *Heydelpfenich*, Hispanis *Panizo*, & *Paniso*, Gallis *Panis*, & Panic. Dicitur etiam μελίνη testibus Dioscoride & Galeno, μέλιτος Diocli, Plinio Melfrugum, quæ vox è Meline sumpta melleum quidpiam significat non autem, nigrum ἀπὸ τοῦ μέλιτος, quidam enim Melinen Panteum nigrum esse volūt, ab aliis generibus colore distinctum. Elymum certè ac Melinen tanquam diuersa, Theophr. locis aliquot memorat.

Nomina

Lib. 22. c. 25.

Lib. 18. c. 7.

*PANICVM Sativum.*Lib. 2. ca. 9.
Lib. 6. sim.Genera.
Lib. 18. ca. 7.

Forma

*PANICVM SYLVESTR.*
Matthiol.

Locus.

Tempus.

Lib. 2. c. 9.
In capi. 91.
li 2. Diosc.Forma
Sylvestr.

Lib. 18. ca. 17.

separatim, Panicum Latinis à paniculis dictū esse scribit idem Plin. qui inter æstiva frumēta panicum recenset, non vt quidam, inter verna Diosc. τῶν σιτηρῶν εἶναι σπερμάτων ait, idest frumētaceis seminibus annumerari. Colum. inter frumēta Panicum & Miliū reponit. Gal. ἐκ τῶν ὀσπρίων, idest ex leguminib⁹ esse tradit, vt citra discriminē Galen. τὰ σιτηρὰ etiā ὀσπρία vocet, cū tamē ὀσπρία sint cerealia illa ex quib⁹ panis nō fit. Sūt & Panico genera, inquit Plin. māmoso, pano è paruis racemato paniculis, & cacumine gemino. Quin & colore distinguuntur, candido, nigro, rufo, etiā purpureo. Sunt etiā Panici genera satiuū & sylvestre. Panicū satiuū quod ex Matth. hic appinxim⁹, radice, culmo, folio, Milio simile est. Culmis enim multis prodit intus farctis, geniculatis, ac sensim extenuatis. Folia ei arundinacea sunt, multo quàm in Tritico latiora. Paniculis differt: sunt enim in Panico oblōgē & pedales, crassē, prædensā, nō vt in Milio diuulsā, sed racemi instar ex numerosis granis cōpactā, hirsutis, rotundis, duris, splēdentibus folliculis quibusdam intectis, colore subluteis, Milio similibus, sed minoribus. Radice nititur valida & fibrata. Eamdē quam Miliū terrā, idēmq; solum desiderat, eodēmq; tempore seritur, auctore Colu. Reperitur & Panicū sylvestre, inquit Matth. sed cibus inutile, & alendis solū aubus idoneū, satiuo longē minus gracili admodum stipula, cubitali longitudine, aut maiore, foliis angustioribus, breuioribus, asperisque panicullæ in cacumine hirsutæ, subrubentes, pertinaciter vestibis inhaerent, sed multò minores quàm in Panico satiuo. Vis illi Panico adsimilis, nisi quod magis adstringit ac refrigerat.

Aliud sylvestre Panicū ex Dalechampsio hīc proponimus, quod radice est breui, cādida, in multas particulas scissa, fibrata: culmis multis, cubitalibus, geniculatis foliis graminis, longioribus, latioribus, ex singulis geniculorū nodis exeūtibus. In summis culmis veluti spicē sunt, rotūdæ, villosæ, asperæ, vestibis prætereuntiū adhærentes tam firmiter, vt vix reuellantur. In

areis hortorū, maceriis, & incultis locis nascitur. Hæc fortasse fuerit herba alba Plinij, de qua hæc scribit. Nascitur & herba alba Panico similis, occupans arua, pecori quoq; mortifera. Quidā esse volunt eiusdem scriptoris cap. 25. lib. 2. Miliariam herbam, quæ Miliū necat, & trita cornūque infusā podagras iumentorum sanare dicitur. Magis placet eorū sententia qui Albam herbā esse putant. Panicū inquit Diosc. Milio simile est, eodēque modo in panes subigitur. Eosdem

habet

Lib. 2. c. 91.

PANICVM SYLVEST.

Aliud Dalechamp.



excalfactū imponitur. Sistit aluum in lacte caprino decoctū, & bis die haustum: sic prodest & ad tormina. Colum. Panicum pinsitū, & euolutū fursure, sed & Milium quoq;, pultem panis inopia, maximè cum lacte non fastidiendam præbet. Nullus hodie eius vsus nec Officinis, nec Panificio, quia cum siccū admodum & macilentum sit semen, parū admodū præbet alimēti: quare auiculis obiicitur.

PANICVM INDICVM, CAP. XX.



mineas apices florum ostēdunt, coloris cærulei, diluti: semina dēse elegātēque stipata, oblōga, teretia, cærulea, auenę nudatę quadantenus similia, minora, copiosissima. Folia arūdinacea, medio secundū longitudinem neruo percurrente, lata, medio tenus internodia obuoluunt. Gustus miliaceus, vsus nullus.

habet vsus: minùs tamē & nutrit, & adstringit. *Ufus & vires.* Milium ad omnia Panico esse præstantius Galenus tradit, suauiusque edi, facile concoqui, ventrem minùs sistere, magis nutrire. Nonnūquam autem, inquit, Rustici farinam, ipsorum lacti incoctā mandunt, nō aliter quàm Tritici. Vnde liquet id edulium tanto esse præstantius quā si per se sumatur, quāto lac vtriusq; seminis naturæ ad boni succi pcreationē, aliāq; omnia excellit. Nihil enim suauitatis seminibus iis inest, præsertim Panico, quod saltē in nostra Asia nascitur. Nam apud aliasgētes, vt in Italia, multo melius prouenit. Idē alibi Panicū Milio specie simile, facultate certē pauci est nutrimentū, & exsiccatoria. Sistit quoq; nonnihil vētris fluxus, vt & ipsum etiā Milium. Si verò foris illinatur, exsiccatur, atque refrigeratur. Panicum, inquit Plin. effectus habet quos Miliū. In vino potū pdest dysentericis. Similiter his quę vaporāda sunt,

Lib. 6. sim.

Li. 22. c. 25.

Lib. 2. ca. 9.



Is addendū Panicū Indicū aliud, siue Peregrinū, à Dodonæo depictū, & descriptum. Culmo prouenit crasso, octo aut nouē pedes alto, crebris nodis geniculato, foliis ex singulis articulis prodeūtib; arūdinaceis magnis, lōgis, latis: spicas profert seu verius paniculas crassas, dēse cōpactas, aliquantū hirsutas, breuiores quidē quā Panici nostri satiui, quę nō ex vertice tātū culmorū, sed & ex sinu foliorū, breuioribus ac tenuioribus veluti culmis insidentes exeūt. Semē oblōgū capillaceis glumis implicatur. Radices validę ac fibrosę. Panici speciem esse ipsę dēse cōpactę paniculę demōstrāt. Eiusdē panici semē recēs ex Indiis delatū Pena se in hortis Monsp. seuisse ait, Martio mēse, ante augustū arūdinaceos culmos hominis proceritate erexisse digito crassiores, medulla fungosa pallēte farctos, rectos, geniculatos, qui proxime radicē colore cæruleo, elegāti & nitido purpurascētes: in summo spicę specie Cylindri, seu coni, cui fastigiū retusum est, sta-



Li. 27. ca. 8.

GRAMEN MANNAE

prius Matthioli.

GRAMEN MANNAE

prius Dodonai.

II generibus quidam, alij Panici, adscribunt plantam quam Germani vocant Gramen Mannæ. Huius duæ sunt species. Alteram priuatim capriolam, & Sanguinellâ nominant, quidam Ischæmon Plinij esse volunt, de quo postea nos agemus. Gignitur sponte in plerisque Italiæ, Germaniæ, Boëmiæ locis incultis. Goritienses tamen & Carinthij serunt. Fibrosa radix est, crassa, in transuersum porrecta, stipulæ cubitales, ac nonnunquam proceriores: crebro geniculatæ, cum maturuerint, subrubentes: Arundinacea sunt, aut Gramini similia, & villosa folia, præsertim quæ culmos ambiunt, & amplectuntur. Iuba, vt Milij, effusa, minus tamen densa, nigricâs, in spicas dissecta, longas, & tenues, semen ferentes ab vna tantû parte, Milio minus, oblôgum, quod in pilis à glumarum & vtricolorû inuolucro purgatum, candidû est Oryzæ modo. Eo Bohemicocto cum iure pinguis carnis vescitur, & sic paratum, suaue gratumque edulium esse prædicant. Sclauj vocant Cornicis pedê, qua nomenclatura deceptus Leonicemus Coronopû Dioscoridis esse credidit. Alterum Mannæ gramen in agrorum aggeribus, Germaniæ, Belgij, Galliæ, cæterarumque regionum Europæ, nullo satû gignitur: quidam tamen & in hortis colunt. Arundinacea huic quoque natura est. Radix multas fibras spargit. Arun-

GRAMEN MANNAE

secundum Dodonai.

dinifo

dini folium simile. Culmi plures: & hi partim recti, partim in latus, & terram versus inclinati: pro coma iuba non est, sicuti superiori, sed veluti spica, asperiuscula, panicula quidem Panici breuior, rarior, tenuior, aliquando singularis, & simplex: interdum multiplex, ac velut ex pluribus composita: nonnunquam herbacei coloris, aliquando ex rubro nigricans. Semine gallinas, columbos, & auiculas: sicut & superioris, alunt.

PHALARIS, CAP. XXII.

VT Græcis & Latinis Phalaris dicitur, Galeno φαλῆις, Germanis *Spenschaet*, & *Canariensaet*, hoc est Hispaniense semen, & Canariense, à Canaria Insula. Melitenses apud quos ut diligenter feritur, *Cuneno* vocant, & ad conficiendum panem cum Tritico miscent. Phalaris, ut describit Dioscorides, cauliculos emittit ex radicibus tenuibus & inutilibus multos, duum palmorum altitudine, geniculatos, Arundini similes, culmis Zeæ similes. Semen in iis est Milij magnitudine, subalbum, oblongum.

Nomina

Lib. 3. c. 142.

Forma.

PHALARIS.



Ex qua historia veram Phalarim esse colligunt docti Herbarij, Matthiolus, Dodonæus, Cordus, quæ hîc expressa est. Nam tres aut quatuor culmos erigit, cubitales, & nonnunquam proceriores, geniculatos, Zeæ aut Tritici culmis non dissimiles. Folia ex geniculis singula exeunt, acuminata, parvæ Arundini, aut Tritico similia. Ex iisdem geniculis quidam etiam culmi ramulorum vice emergunt, quos folia circum amplectuntur. Spicas in summis culmis, & ramulis illis fert rectas, digitali crassitudine, teretes, in summo turbinatas, exiguis squamis candicantibus compactas, è quibus flores candiduli, exigui à breuibus staminibus dependent. Semen deinde inter squamas gignitur, Milio non dissimile, splendidum, candicans, aut subnigrum, oblongum, in mucrone acuminatum, gustu Milio simile. Radix eius est multifida & fibrata. Herbarum tussæ succus, cum vino, aut aqua expressus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum ad eadem efficax est. Non adeo his à

In cap. 142.
lib. 3. Diosc.
Lib. 4. ca. 11.
Lib. 1. plan.
cap. 45.
Dodon. de
frug. ca. 29.

Ibidem,
Vires.

Dioscoride traditis consentiunt quæ de eadem stirpe prodidit Plinius his verbis. Phalaris thyrsus habet longum, tenuem, ceu Arundo, in summo florem inclinatum, semen simile Sefamæ. Et hoc calculos frangit potum ex vino, vel aceto, & melle, & lacte. Idem & vesicæ vitia sanat. Galeno Phalaridis herbarum tum semen, tum succus, tum folia potu auxiliari creduntur vesicæ doloribus, seu in se habeant quidpiam tenuium partium, seu calidum. Pharmacopœi quidam in Milij penuria eo in fomentis non infeliciter utuntur: in siccis enim fomentis Milij usum præbet. Peregrinum est semen hoc: adfertur autem ex Hispania, & Canariis insulis: Malsiliæ frumentum Canariense dicitur, quia eius copiam institores ex Canariis secum deferunt, & unâ cum passerculis Canariensibus vendunt, quod eo maximè delectentur, sitq; eis cibus saluberrimus. At non solum hic, ut ait Pena, sed etiam Narbonensi agro, via ad Magalonem, prope segetes,

Li. 27. c. 12.

Li. 8. simpl.

ad Pontem Phalaridem veram reperiri, eiúsque enatum semen foeliciter in Belgio & Anglia habuisse.

PHŒNIX, CAP. XXIII.

Nomina
Li.22.ca.25.

PHŒNIX Græcis, Phœnix similiter Latinis dicitur, à Phœniceo colore. Plinius Hordeum murinum appellari scripsit, si eadem sit illi herba Phœnicea, quæ Dioscoridi & Galeno Phœnix. Latini recentiores Lolium rubrum, & Lolium murinum vocant, Hetrusci Lolium sylvestre, Gioglio saluatico. Galli *Iuraye sauvage*, Germani *Bintzen helmer*, & *Mald trohor*, Belgi *Muyse koren*, quod spicas profert Lolio similes. Planta hæc culmis, foliis, spica, Lolio similis est, singula tamen minora habet: culmos enim multos profert, breues, geniculatos, folia Hordei, minora, angustioraq̃, spicas Lolio similes, sed minores, tenuiores, breviores, ac rariores. Nascitur in aruis secus vias, & in ædificiorum tectis, in Italia & Gallia frequens, & vbique fere obuia. Quæ omnia nulla repugnante nota Dioscoridis Historiæ adstipulantur: scribit enim, Phœnix, inquit, folia habet Hordei, sed breviora & angustiora, spicam Lolio similem, calamos senûm digitorum, per ambitû radice, septenas, octonâsue spicas. In aruis tectisque recens illitis nascitur. Illius hæ vires sunt. In vino austero pota, alui profluuium, & ex vulua sanguinem sistit, urinæ impetus infrenat. Sunt qui adalligatam in puniceo vellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant. Herbam Phœniceam appellatam à Græcis & à nostris Hordeum murinum, Plinius scribit, tritam, ex vino potam, præclarè ciere menses. Id quod etiam Pena affirmat. Ambiguum verò est, an de hac Herba, an de illa intelligat, quæ Phœnix Dioscoridi dicitur. Galenus de Phœnice nihil scripsit. Phœnix, inquit, Paulus, quam alij Rhun vocant, Herba est Lolio similis. Vim habet adstringentem. Pota in vino austero omnes fluidos affectus sistit.

Forma

PHŒNIX.


Locus.

Lib.4.c.39.

Vires.

Lib.22.c.25.

Lib.7.



lus, quam alij Rhun vocant, Herba est Lolio similis. Vim habet adstringentem. Pota in vino austero omnes fluidos affectus sistit.

LOLIUM, CAP. XXIV.

Nomina

Forma

Locus.

Lib.8.Hist.
cap.7.

Li.1. Alim.

Lib.18.c.17.

LOLIUM Græcis αἶλα & ῥύαρος, Latinis Lolium dicitur, Arabibus *Sceylem*, seu *Zeuen*, Italis *Loglio*, & *Gioglio*, Germanis *Tunalch*, *Kueuueysen*, & *Lulch*, Hispanis *Toio*, & *Zizania*, Gallis *Iuraye*, ab inebriando, quod admixtum pani, vini modo temulentiam concitet. Lolium folio est longo, pingui, hirsuto: culmo Tritici, graciliore, in cuius summo spica est, longa veluti ex multis paruulis alterno ordine digestis composita: in singulis terna quaternâue grana continentur, Triticeis minora. Nascitur in aruis, è Tritico & Hordeo, corruptis vligine feminibus, aut per hyemem imbre nimio madefactis. Negât vernam esse frugem, inquit, Theophrastus, quamuis id nonnulli conentur asserere. Nam hyeme statim ineunte profilit è terra, folio angusto, pingui, hirsuto. In Tritico quidem frequens Lolium, inquit Galenus, sæpe inuenitur, in Hordeo verò paucum. Plinius Lolium inter frugum morbos potius,



potius, quàm inter ipsius terræ pestes numerat. Fuschius Pseudomelanthium quod non solum in Triticea & Hordeacea, sed in omni ferè alia segete per se prouenit, Lolium esse putat: quod non solum peritissimorum huius temporis Herbariorum sententiæ refragatur, ait Matthiolus, sed & veterum scriptis, qui Lolium in spica, non in calyce, nec in capitulis Melanthij, vel Papaueris modo, inclusum semen proferre tradiderunt. Dioscorides Phœnicem herbam Lolio similem spicam ferre prodidit. Is etiam error ex vulgata Lolij facultate, vt mox dicemus, facile apprehendi potest. Lolium teste Dioscoride, molitum nomas, putrescentia vlcera, gangrænasque emarginat, cum raphanis & sale illitum: ex aceto & sulphure viuo feros lichenas, & lepras sanat: strumas quoque discutit cum fimo columbino, & lini semine, decoctum in vino: rumpit quæ ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsâ vtilissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta,

In Hist. pl. cap. 44.

In ca. 93. li. 2. Dioscor.

Lib. 4. c. 39.

Lib. 2. c. 93.
Vires & Temper.

thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat. Quæ postrema Cornarius aliter distinxit, vt ischiadicis cum aqua mulsâ coctum, & addita polenta, aut myrrha, aut croco, aut thure impositum Lolium multum prodesse velit: deinde ipsum solum suffiri, & non cum aliquo ex præcedentibus, quæ concoquendæ coxendicum affectionis gratia commodè in cataplasma Loliaceum admiscuntur, ineptè verò ad suffitus adhibeantur. Sic enim vertit. Cum aqua mulsâ coctum & impositum, coxendicum morbo laborantibus prodest, addita polenta, aut myrrha, aut croco, aut thuræ. Idem suffitum conceptus adiuuat. Plinius de Aera & Lolio diuersis locis, tanquam de diuersis rebus agit: si quis tamen quæ de Aera & Lolio tradidit, cum Dioscoride conferat, comperiet ipsum de eadem re loqui. Lolium, inquit, & Tribulum, & carduum, Lappamque non minùs quàm Rubum, inter frugum morbos potius, quàm inter ipsius terræ pestes numerauerim: Et paulo post. Aera granum minimum est in cortice aculeato. Quum est in pane, celerrimè vertigines facit. Aiuntque in Græcia & Asia balneatores, cum velint turbam pellere, carbonibus id semen iniicere. Idem alibi. Aerina farina magis cæteris purgat vlcera vetera, & gangrænas: cum raphano & sale & aceto lichenas: lepras cum sulphure viuo: & capitis dolores, cum adipe anserino imposita fronti. Strumas & panos concoquit cum fimo columbino, & lini semine decocta in vino. Et paulo post. Quin & ipsæ frugum pestes in aliquo sunt vsu. Infœlix dictum est à Vergilio Lolium. Hoc tamen molitum, ex aceto coctum impositumque sanat impetigines, celerius quo sæpius mutatum est. Medetur & podagræ, aliisque doloribus cum Oxymelite (quæ sequuntur mendosa sunt in vulgatis codicibus.) Curatio hæc à cæteris differt. Aceti sextario vno dilui mellis vncias duas iustum est: ita temperatis sextariis tribus, decocta farina Loliis sextariis duobus vsque ad crassitudinem, calidumque ipsum imponi dolentibus membris. Eadem farina extrahit ossa fracta: quæ sic emendat Cornarius ex vetere Codice. Ratio hæc. Aceti sextario vno diluuntur mellis vnciæ duæ. Iustum est ita temperatis sextariis tribus, decoctæ farinæ Lolij addere vsque

Lib. 18. c. 17.

Li. 22. c. 25.

vsque ad crassitudinem, calidumque ipsum imponi dolentibus mēbris, & cætera. Ex his perspicuum est Plinium Æræ & Lolio eadem tribuere, quæ Dioscorides Lolio, quamvis Plinius neque integrè, neque distinctè medicamenta à Dioscoride præscripta expresserit. Galeno Lolium desiccatur & calfacit efficaciter, ut propinquum sit acris magis quàm Iris, sed non est perinde ut illa subtilis essentia. Verum in hoc multum deficit. Hoc statuto ponat quispiam ipsum in principio tertij ordinis excalfacientium, secundo verò extremo desiccantium. Panis in quo Lolium fuerit, stuporem quendam, & veluti temulentiam esitantibus parit cum inexpugnabili ferè somno. Quare incerniculis diligenter à Tritico, aliisque cerealibus seminibus separandum esse præcepit Galenus iis qui aliis seminibus salubriter uti volunt. Etenim, inquit, cum anni constitutio prava aliquando fuisset, Lolium Tritico affatim innascebat, quod neque agricolæ accommodatis ad eam rem cribris, accuratè purgassent, neque pistores, quod paucus esset Tritici proventus, statim quidem multis caput dolere cœpit: ineunte verò æstate, in cute multorum qui comederant, vlcera, aut aliud quoddam symptoma quod succorum prauitatem indicaret, est subsecutum. Dicitur & Lolium oculis officere. Vnde enigmate prouerbiali Lolio victitare dicuntur lusciosi, & cæcutientes, quos Græci, teste Nonio, Myopas vocant. Plautus. A. Mirum est Lolio victitare te, tam vili Tritico (cum tam vile sit Triticum.) B. Quid iam? A. Quia lusciosus. Item Ouidius,

Et careant Loliis oculos vitiantibus agri.

VSTILAGO. CAP. XXV.

Nomina

Lib.4. c.17.
Lib.2. c.37.



RECENTIORIBVS Herbariis, ut Dodonæo, & Trago, vocatur Vstilago quæ ab agricolis Gallis *Brulure* dicitur, Germanis *Brant*. *ἔρυσσις* Theophrasto, lib.8. Hist. cap.10. rubigo. Alij Carbunculati-
nem vocant ex Plinio lib.17. cap.24. Est autem Vstilago frugū præsertim spicatarum, morbus, & vitium, seu potius pestis, præsertim Auenæ. Hæc

VSTILAGO.



antequam spicam proferat, Auenæ maximè similis est, sed cum spica prodire incipit, frugiferæ loco spica nigra, retorrida, & veluti tota puluere obsita apparet. Sæpius in Avena reperitur, nonnunquam etiam in Tritico, Aprili maximè & Maio mensibus, quando solem ardentem improvisa & subita excipiunt pluviæ, sole continuo ardentes radios spargente, cæliq; tempestas incostans, modò nimbofa, modò serena feruensq; fuerit, qua cæli mutatione teneræ & lactentes adhuc spicæ humore madidæ à solis feruore corripuntur, & ita aduruntur, ut nigrescant, ac inarescant, nec ad frugem peruenire possint. Eius frugum vitij, inquit Tragus, Plinius meminisse videtur his verbis. Est & aliud ex vicino Auenæ vitium, cum amplitudine inchoata granum, sed nondum matura, priusquam roboretur corpus, afflatu noxio cassum, vel, ut Turnebus legit, cascum, & inane in spica evanescit quodam abortu. Alij putant hoc segetum vitium nomine Rubiginis potius explicari. Cæleste frugum vinearumque malum, nullo minus noxium, est Rubigo, inquit Plinius. Frequentissima hæc in roscido tractu, conuallibus, ac perflatum non habentibus. Contra carent ea ventosa, & excelsa. Gignit plenilunio. Theophrastus scribit,

qui

Ibidem.
Cap.17. lib.
18.

qui eundem morbum in Cicere peculiari vocabulo Sphacelismum nominat. Nullius est in medicina vsus, ad nocendum tantum nata.

TRITICVM VACCINVM, SIVE MELAMPYRVM,
CAP. XXVI.

PLANTA hæc hodie Triticum Vaccinum, & Triticum Bouinum vocatur, quia Vaccis pabulo grata & innoxia, Gallis *Blé de Vache*, ou *Blé de Beuf*, Germanis similiter *Knueysen*, à nonnullis *Braunfleischblumen*. Id videtur esse quod Galenus Melampyrum vocari ait, id est nigrum Triticum, *Blé noir*, quod ex Tritici quoque mutatione generatur, sed prauitate quamplurimum à Lolio relinquitur. Theophrastus Siculo Frumento Melampyrum proprium esse tradit, sed id esse innoxium, nec sicut Lolium graue, neque caput tentare. A Melampyro vero Dioscoridis, quod etiā Myagrum appellatur, multum differt. Quibusdam Stelephuros Plinij videtur esse Melampyrum de quo hîc agimus. Aliud rursus spicatarū genus, inquit, ex quo est Cynops, Alopecuros, Stelephuros, & Plantago quā quidā Ortyga vocant, sic enim legendum. Hæc Plinius ex Theophrasto transtulit, cuius locus in publicis exemplaribus mendosus, sic corrigendus est: *σαχυώδη μὲν οὖν ἔστιν ὃ, τε κυύωψ καλέρμυρος, καὶ ἀλωπέκυρος, καὶ στελεφῆρος, καὶ ἀρνόγλωσσον, ὑπ' ἐνίων καλέρμυρον ὀρτυς πλείους ἔχων ἰδέας αὐτῶν*. Id est, Spicatae igitur sunt, ea quam Cynopa nominant Alopecurus, Stelephurus, Plantago, quam Ortyga quidam vocant. Eius multæ sunt species. Istud

Nomina

Li. 1. Alim.

Lib. 8. Hist. cap. 5.

Stelephuros. Lib. 21. c. 17.

Cap. 10. lib. 7. Hist.

TRITICVM
Vaccinum.



Tritici vitium caulem gerit cubitalem, aut minorem, tres aut quatuor ramulos è lateribus prodeuntes, in quibus folia oblonga, angusta, acuminata, nigricantia, spicas in summis caulibus latas, crassas, aspectu pulchras, florum & foliorum profundius incisurum plenas, quæ ab imo paulatim ad summum flores emittunt, antequam dehiscant, vna cum foliolis purpureo colore, eoque venusto nitentes, qui cum emerferint & aperti fuerint, coloris fiunt lutei, purpureo variati: iisdem dilapsis foliola colorē purpureum in viridem mutant, & florum loco folliculi proueniunt lati, in quibus plurimum semina Triticeis similia, sed minora, nigrioraque. Exit in aruis vna cum Tritico & Secale, læto potissimum, pingui, ac restibili agro. Vna cum frugibus floret, & ad maturitatem peruenit. Theophrasto, Stelephuros similis est Alopecuro, nempe similiter spicata: verum particulatim floret, non vt Alopecuros, & Triticum, tota simul spica. Vtrique, sicut & Tritico, flos lanuginosus. Melampyri species alia hîc addenda ex Pena, quod perpusillum luteum vocat, familiare Gallo prouinciæ segetibus. Dodrantem, aut sesquiunciam vix

Locus.

Tempus.

superat: tota facies superius refert, sed flos illi luteus, foliaque altius diuisa, Coronopo similia. Nec absurdà hic appingemus plantam quam recētiore Melampyrum alterum vocant propter similitudinem. Pena & Lobellius Cratæogonon (Herbam cerealem Melampyro affinem hîc intelligimus, non arborem, quæ Cratægos, Cratægon, & Cratæogonon, siue Cratægonum dicitur, de qua in

Sylua



Sylua tractauimus) quod in syluosis collibus, decliuibus & vmbrosis Narbonæ, Angliæ, Sabaudia, Pedemontij passim occurrit, ramis aliquot cubitū & sesquicubitum altis, geniculatis, in alas multas diuisis, Euphrasie modo, sed crassioribus & maioribus, quas totas ab imo ambiunt folia Melampyri, aut Linariae. Flores in cacumine ex luteo herbacei, florum Melampyri figura, similiter vt in lutea Digitali digesti. Semen folliculo exiguo continetur, Milio simile, gustu acre, vt & folia siccata. Nulli quam huic conueniunt magis notæ Cratægoni à Dioscoride scriptæ. Traditum est à quibusdam, inquit, hoc si bibat, ieiuno ore, ter die, post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus, & vir similiter totidem diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum. Cratægoni herbæ fructus, inquit Galenus, & acris est gustanti, & vtenti, admodum similis Milio.

GRAMEN, CAP. XXVII.

Nomina



Ἰ Π Ω Σ Τ Ι Σ Græcis, Gramen Latinis appellatur: ἀγρωσις ab agris qui Græcis ἀγροί nominantur. Gramen quod geniculatis internodiis mirificè serpat, à gradiendo, vel à gignendi fœcunditate. Si quidem crebro ab iis nouas spargit radices. Arabes *Vagem*, *Negen*, seu *Negien*, & *Negil* vocât, Itali *Gramigna*, Galli *Grame*, & *Dent de chien*. Dioscorides tria Graminis genera facit. Gramen quod ἀγρωσις dicitur: id pro vulgari omnes accipiunt: Gramen arundinaceū: χαλαράγρωσις ille vocat, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, præsertim circa Babylonem, id que iuxta vias nascens, tertium, Gramen Parnasiacum. Ad finem eius capitis addit nasci in Cilicia Gramen, quod incolæ Cinnam appellant. Plinius primum Gramē inter herbas vulgarissimum ponit: secundum Gramen Parnasi: deinde aculeatum Gramē, trium generum. Primum cuius in cacumine aculei sunt plurimū quini, Pantedactylon vocant. Alterum quod est Aizoo simile. Tertium genus, quod tenuius est, nascitur

Lib. 4. c. 28.

Genera

Li. 24. c. 19.

GRAMEN VVLGARE
Matthioli.



GRAMEN VVLGARE
Dalechampiij.



nascitur in parietinis, & tegulis. Tandem addit. Camelos autem necare traditur in Babylonis regione, id quod iuxta vias nascitur. Hoc autem est quod *καλαμάριον* Dioscorides vocavit. Gramen inquit Dioscorides, geniculatis serpit ramulis, à quibus radices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata, du-

Lib. 4. c. 28.
Forma.

GRAMEN VVLGARE
Dodonæi.



ra, & vt arundinis parvæ lata, eaque iumenta & boues pascunt. Id Gramen esse putat Matthiolus, cuius picturam hîc damus. Periti tamen herbarij, aliud atque aliud Gramen pro vulgari exhibent. Primo igitur loco, vt dixi, Gramen Matthioli hîc positum est. Secundo Gramen Dalechampiij, quod per terram serpit viticulis gracilibus, longis, geniculatis, ex articulorum nodis radículas quæ terræ inherent protrudentibus: folio herbaceo, longo, angusto: caulibus multis, dodrâte non altioribus, internodiis distinctis: spicato flore, rotundo, nigricante, quinque aut quatuor spicarum torulis constante. Dodonæi Gramen, Gallis *Dent de chien*, foliis, culmis, ac iuba parvæ Arundini haud multû absimile est. Folia ei sunt angusta, in acumen fastigiata, Arundinis quidem foliis longe minora, pratensis tamen Graminis duriora, ac maiora: culmi rotundi, sesquipedales, aut paulò longiores, quatuor aut quinque geniculis intercepti: iubam potius quàm spicam fert Milij, aut Arundinis similitudine, minorem tamen, ac

Lib. 4. ca. 44.

rariorem. Radicibus serpit longis, candidis, geniculatis, nodosis, gustu non ingrata dulcedinis, sibi inuicem implicatis, quæ plurimis locis emicantes progerminant, foliaq; & caules proferunt. Nascitur potissimum in aruis & agris frumentariis, tam frugum quàm agrorum vitium, ac pestis, agricolis ingratum:

Locus.

GRAMEN LEUCANTHEMUM.

Tempus.
3. Gram.
Fusch.
In Hist. pl.
cap. 48.



Locus.
Tempus.

GRAMEN PRATENSE VULGATIUS.

Lib. 4. c. 47.
De frug. c.
83.



nam agro profcisso radices rastris eruunt, ac collectas exurunt: facile enim, licet semari dæ, terra obruta reuiuiscunt, adeo pertinacis sunt vitæ. Floret id Gramen æstate cum frugibus: Autumno radices leguntur. Aliud vulgaris Graminis genus depinxit Fuschius, quod cauliculos è radicibus multos emittit, tenues, teretes, crebris geniculis cinctos, facile in terram, nisi vicinis fruticibus fulciantur, procumbentes: folia ex singulis geniculis bina, ex aduerso sita, angusta, oblonga, duriuscula, Graminis tamen breuiora. Flosculi è summis caulibus emicant plurimi, singuli suis pediculis insidentes, candidi, ex aliquot exiguis & angustis foliolis congesti, Leucoij floribus minores, quibus folliculi succedunt oblongi, in quibus semen paruum, Milio simile: radices tenues, & geniculatæ, veluti Agrosteos serpunt. Dodonæus in frumentorû Historia Gramen Leucanthemum appellat. Holostium est Ruellij, & Lutetianorum, fortasse etiam Lacunæ, Eufrasia Gramen, Tragi, Gramen alterû Matthioli, Chamæcissos Orbasij Italici. Passim nascitur in vmbrosis locis, & dumetis, secus scrobes, & agrorum aggeres. Floret Maio, Iunio mensibus, interdû serius. Plantam istam Dodonæus in Hist. Stirp. Cratægonum, siue Cratæonum, siue Cratæum esse suspicatur, quod illi sit cum Cratæogono similitudo quædã, & à Germanis *Augentrost gras* vocari ait, id est Gramen corroborans oculos.

VULGATVM GRAMEN
Pratense, CAP. XXVIII.

GRAMEN peruulgatum, & vbiuis obuiû, Gramen Pratense vocat, *Herbe des Prés*, & absolute *De l'herbe*, quasi omnium herbarum vulgarissima, exilioribus radicum cirris, seu capillamentis & creberrimis cespitem summum tegens, & per humum perreptans, numerofo & densissimo foliorum Triticeorum stipatu, culmos pedem & cubitum altos erigens, tenues, geniculatos, læues, & spicas lanosas, sparsas, Arundinem vallatoriam imitantes. Eius semine vtuntur medici multi ad obstructions

etiones viscerum, & calculum, potu, admouent ad discutionem pertinacium tumorum & flatuum. Gramen Arundinaceum, siue Calamagrostis, inquit Dioscorides, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylone, iuxta vias nascitur. Gramen istud fortasse nobis incognitum est: verum tamen de Calamagrosti inter palustres plantas dicitur.

Gramen
Arund.

GRAMEN PARNASI, CAP. XXXIX.

GRAMEN quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: foliis Hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutili: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, cãdidis, mollibus, & admodum dulcibus. Hanc Graminis speciem à Iacobo Antonio Cortuso ad se missam sic expressit Matthiolus. Sed de eodem Gramine Parnasi etiam vna cum palustribus aliis agemus. Cæterum primùm trium aculeati Graminis generum, cuius in cacumine aculei sunt plurimùm quini, quos conuolutos naribus inferunt, extrahuntque sanguinis ciendi gratia, Pentedaëtylon herbarij vocat, Matthiolus esse putat Capriolam, supra descriptam, vel Sanguinellam, sic dictam, quod eam pueri ludentes æstate in nares immittant, vt sanguinem eliciant. Nunc Graminis vulgaris vires haud vulgares explicemus. Trita radix illitu vulnera cõglutinat, inquit Dioscorides. Decoctum eius in potu torminibus medetur, & vrinæ difficultatibus, & dysenterix: calculosa etiam vesicæ excrementa comminuit. Radix Graminis Galeno modicè est tum frigida, tum sicca, ac proinde cruenta vlcera conglutinat. At herba ipsa primo excessu refrigerat, in humiditate verò & siccitate moderata. Porro mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua quidem est, sed interdum tamen lapides frangere solet, si quis eam decoctam bibat. Semen imbecillum quidem est, eius verò quod in Parnaso nascitur, vrinam ciet, & fluxus ventris ac stomachi resiccat: vis enim eius est exsiccatoria, tenuium partiũ, & subacerba. Idem Paulus scribit Gramẽ Parnasi, teste Paulo, admodum vtile est. Siccat & modice refrigerat, estq; tenuium partium, & subacerbum: ideoq; cruenta vulnera glutinat. Decoctum eius calculos confringit. Succus radicis Graminis Parnasi, autore Dioscoride, si in vino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adiicianturque piperis & thuristertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in ærea pixide reconditur. Decoctum radicis idem quod herba præstat. Semen vehementius vrinam impellit: aluum vomitionesque sistit. Eadem propemodũ omnia Plinius tradit, in quibusdam dissentiens, Gramine Parnasi iumentis herba non alia gratior, inquit, siue viridis, siue in fœnum siccata, cum datur aspersa aqua, vel, vt in manuscripto legimus, tunditur aspersa aqua. Succum quoque eius in Parnaso excipi tradunt propter ybertatem. Dulcis enim hic est. In vicem eius in reliqua parte terrarum succedit decoctum ad vulnera conglutinanda, quod & ipsa herba tusa præstat, tueturque ab inflammationibus plagas. Decocto

Gramen
Parnaf.

In ca. 28. li.
4. Dioscor.

GRAMEN
Parnasi.



Vires &
Temper.
Graminis
Vulgaris.
Lib. 4. c. 28.

Li. 6. simpl.

Lib. 7.
Vires
Gram.
Parnaf.

Li. 24. c. 19.

adiicitur vinum ac mel : ab aliquibus & thuris & piperis, myrrhaeque tertiae portiones. Rursusque coquitur in æreo vase ad dentium dolores, & epiphoras. Radix decocta in vino torminibus medetur, & vrinae difficultatibus, ac vlceribus vesicae. Calculos frangit. Semen vehementius vrinam impellit. Aluum vomitionesque sistit. Priuatim autem draconum moribus auxiliatur. Quod est graminum genere septem internodia habet, efficacissime capiti contra dolores adalligatur. Quidam propter vesicae cruciatus decoctum ex vino gramen ad dimidias, à balneis bibi iubent. Adiicit in fine Dioscorides, natum in Cilicia Gramen, quod incolae Cinnam appellant, Boues inflammat, si eo virente saepe pascantur: quæ aliter leguntur in vetusto quodam Codice: γεννᾶται δὲ ἐν κιλικίᾳ εἶδος ἕτερον, ἣν κίνναν ἐπιχωρίως καλεῖσιν, ἥτις ὕδα βρωθεῖται πολλάκις τῶν ἀμπλησι τὰς βόας. Id est, Gignitur in Cilicia etiam species alia, quam vernaculo sermone appellant Cinnā, quæque vorata crebro, atque viridis Boues replet: nato alterutris errore, quod illi ἀμπλησιν, id est, inflammat, hi ἀμπλησι legant sensu longe diuerso. In Sebusianorum lacunis, stagnis, & pigris aquis Gramen nascitur, longissimis foliis, subrubris, innatantibus aquæ, quorum tam auidi sunt Boues, ut dum ea persequuntur, ad ventrem usque se immergant, & toto capite sub aquam deiecto, ea depascantur: quo pabulo eximie saginantur Boues, Vacca vero, lacte multo foecundiores sunt, quam in finitimis locis, extra regionis illius palustrem situm. Gramen id Ciliciam Cinnam esse quidam putant.

GRAMINA ALIA, CAP. XXX.

DERMULTA sunt & alia Graminum genera, quæ foliis angustis, longis, & gracilibus inter sese similia sunt, sed spicis siue iubis differunt. Radices omnibus fere tenues, plurimis fibratae, capillamentis similes, paucissimis longæ, & serpentes. Nec omnia locis iisdem proueniunt. Quare nec eodem tractatu describi possunt. Quædam igitur aliis magis idoneis locis explicabuntur. Hic multa tamen potissimum ex Dalechampi sententia, & obseruatione describentur, quæ etsi non omnia in Agris inter segetes nascantur, cognatione tamen quadam inter sese coniuncta, aptè disiungi non possunt.

GRAMEN MINIMUM Dalechampi.

Forma
Graminis
minimi.



Forma Gr.
Lanati.

Tempus. eam ob causam lanatus appellatur. In montium editorum & asperorum vdis & riguis pratis gignitur. Floret Maio mense.

Locus.

Forma Gr. Iuncci. Gramen Iunceum radice est candida, dodrantali, ex innumeris tenuissimisque fibris contexta, reticulum implicatum esse dixeris: foliis quamplurimis virentibus, rotundis Iunci modo quæ nominis imponendi causa fuit: culmis seu caulibus

Primum erit Gramen minimum, quod est veluti gleba ampliuscula, rotunda, radiculis plurimis, breuibis, candidis: foliis digito non longioribus, teretibus, spica valde gracili, parua: flosculis rubris, Februario statim ad primam aëris temperiem exorientibus, sapore initio dulci, deinde amaro. Nascitur in aruis.

Gramen Lanatum radiculis est fatis multis, albis, superuacuis, gracilibus, breuibis: foliis quoque multis, herbaceis, culmo cubitali, sapore subdulci: flore Panico simili, rubente. Tota planta molli lanugine pubescit: quare manibus contrectantium blanditur, atque

GRAMEN LANATVM

Dalechampij.

GRAMEN IVNCEVM

Dalechampij.



caulibus multis, tenuibus, geniculatis, pauca folia emittentibus: flore Arundinaceo in paniculis purpurascens, gustu subdulci. In frigidis & aridis provenit. Floret Maio.

Locus.

Tempus.

GRAMEN PRATENSE Dalechampij.



Gramen Pratense radiculis abundat candidis, in vnum veluti cespitem coeuntibus, culmis multis, dodrantalibus, binis ternisue geniculis distinctis, folio graminis, angustiore, molliore, viridiore: spica crassiuscula purpureis floribus eleganter ornata: folio quod ex ultimo geniculo prodit sic caulē obvolvēte, ut nō aperiatur, & vesicę speciē ostēdat. In humidis Pratis nascitur. Totius plātę sapor dulcis est, & aquosus. Ad eadē valere aiunt, ad quā Gramē officinarū cōmēdatur, sed inefficacius.

Forma Gr. Pratens.

Locus.

Vires.

Gramini Anthoxantho eadem foliorum radicūque species, quæ Gramini Pratensi, idem sapor, eadem facultas, ut non sine ratione quidam censuerint alterum mare esse, alterū fœminam. Sed his differūt, quod in hoc flos ex pallido flavescit, in altero rubet: in hoc flos glisceus nō obvolvitur folliculo vesicę simili, ut in Gramine Pratensi, sed nudus emicat: huius spica gracilior est & longior, in illo brevior, crassior, magis compressa. Cum gramine Pratensi in humidis pratis nascitur.

Forma Antho.

Locus.

Gramen Leucæthemum: radicibus multis nititur, valde exilibus, brevissimis, nigris: foliis multis, longis herbaceis, hispidis, latiusculis: caulibus cubitalibus:

Forma Gr. Leucæth.

GRAMEN Anthoxanthoni
Dalechampij.GRAMEN Leucanthemum
Dalechampij.

flore albo, copioso, aceruatim congesto, in paniculis tremulo, gustu subdulci:

Locus. Dumetis ac montosis locis familiare, in muscoso solo crescit.

GRAMEN Ischamoni
Plinij, siue Daëtylon.

Forma
Ischam.
Lib. 25. c. 8.



Locus.
Vires.

Lib. 25. c. 8.

Gramē Ischamō à sistēdo sanguine nomen inuenit: radicibus multis prodit tenuibus, cādicantibus, in orbem reptatu sese diffundentibus: foliis Milij, vt scripsit Plinius, asperis, nonnihil lanuginosis: caulibus multis, rotundis, geniculatis: flore in longis spicis, colore herbaceis, plerumq; quinis, aut septenis, raro quaternis. Vbiuis gignitur, præsertim in hortorum areis cū aliis plerisq; inutilibus herbis. Herba trita & admota efficacissimè profluentem sanguinē sistit, siue farciatur in nares, siue imponatur vulneribus. Floris asperas spicas & in globū cōuolutas pueri naribus indentes, & circūagentes, aliquāto post vellicatis naribus sanguinē eliciūt, vt pro diuerso vtendi modo herba hæc sanguinē cohibeat & euocet. Id Gramen Plinij Ischamōnē esse, tū forma, tū vires ipsius indicare videntur. Sic enim scribit Plinius. Ischamōnē Thracia inuenit, qua ferunt sanguinē sisti, non aperta modò vena, sed etiā præcisa. Serpit è terra Milio similis, foliis asperis & lanuginosis, farcitur in nares. Quæ in Italia nascitur, & sanguinē eadē adalligata sistit. Hæc Plinius. Anguillare, Canaria est Plinij. Galli crus Apuleio, cuius cacumen instar pedis galli diuiditur.

GRAM

GRAMEN Bulbosum
Dalechampij.GRAMEN Spicatum
Dalechampij.GRAMEN Hordeaceum,
Holcus Plinij.

Gramē Bulbosum nascitur ex radice plurimis bulbis coagmētata, subrubro cortice oper-
tis, Ascaloniæ cepæ bulbis exiguis non dissi-
milibus, gustu dulci & suavi, ex quibus in-
numera radiculæ valde tenues dependent re-
ticulato penè textu. Folia huic sunt Graminis,
cauliculi dodrātales: flores subrubri, valde par-
ui, in densis, & tanquam villosis spicis. In pa-
rietum superciliis, & aridorum locorum mu-
scosis cespitibus prouenit. Eisdē viribus præ-
ditum esse aiunt, quibus & gramen quotidia-
nis medicorum remediis notum.

Forma bul-
bosi.

Locus.

Vires.

Gramini spicato radix est parua, tenuibus fi-
bris capillata, candicans: folia graminis, lon-
giora, tactu duriuscula, & quod mirum est, ac
in aliis id genus plantis haud sæpe reperitur,
sic nonnunquam articulata, vt alterum alteri
insertum esse videatur. Hæc quoque lineis in
longum ductis virgata sunt. In summo caule
spicarum densius quàm in vlllo alio graminis
genere congestarum magnus numerus con-
spicitur, quæ flosculos subrubros edunt. Quā-
ob causam spicatum Gramen appellauerunt.


Forma spi-
cati.

Locus.

In frigidorum montium pratis prouenit.

Hordeaceum Gramen dictū fuit, quod spicam gerat hordei spicæ similem: est enim tanquam hordeū sylvestre, radice parua, cādida, fibrata, foliis graminis, corū etiam articulado coalitu, qualem in spicato Gramine suprà declarauimus,

Forma hor-
deacei.

GRAMEN Murorum,
Dalechamp.GRAMEN Polyanthes,
Aegilops Plinij.Li. 27. c. 10.
Locus.GRAMEN Filiceum,
seu Polyanthes.

Vires.

Forma
Gra. muro.

Locus.

Forma
Gra. Polya.

Locus.

Forma
Gra. Filic.

insigne. Holcum esse Plinij quidem censent. Holcus, inquit, aristas habet in cacumine tenues, culmo, quale hordeum restibile. In agris sponte provenit: Plinio vero Holcus in faxis nascitur siccis. Hæc, inquit Plinius, circa caput alligata, vel circa lacertum, elicit è corpore aristas. Quidam ob id Aristidiam vocant. Lobellius Hordei spontanei spurij nomine pictum dedit.

Rustici Gramen Murorum pro vitio segetum agnoscunt, quod circa Lugdunum Rue vocant, alibi verò ut in agro Segusianorum Gurguet. Reliquis supra descriptis simile est radice ac foliis, spicis diuersum, quas hordeo similes profert, multas, breues, ac velut in angustum contractas, aristisque brevissimis munitas, subflauas, florem pallidum. Gramen hoc in parietinis, murorum superciliis, ac tegulis nascitur, plerumque in segetibus.

Gramen Polyantes radice est sub nigra, breui, fibrata, foliis Graminis: flore in cacumine caulis copiosissimo, unde ei nomen inditum, in iubam expanso, quæ plurimis laminulis lenticulæ similibus, squamatis, & tenui filo appendis coagmentatur: tam eleganti specie, ut ob eam pendulam & stridulam, cum agitur, flosculorum congeriem, puellæ, adolescentulique libenter decerpant, & in fectorum delicias cogant, ac nectant. In siccaneis montium pratis gignitur. Gramen sequens in asperis nascitur, radicularum fibris multis, tenuibus, candidis

candidis: caulibus ex vno cespite plurimis, nodosis, angulosis, pede non altioribus folio Graminis: flore in summis caulibus densissimo, imparibus spatiis prodeunte, herbaceo, oblongo, acuminato, foliolis maris filicis omnino simili, vt si quis seorsum à planta videat, foliola filicis nuper nata esse putet. Quam ob

GRAMEN

Nodosum.



causam alij filiceū, alij à florum copia Polyāthes secundum vocauerunt.

Diuersum ab hoc est, tametsi cognatū videatur Gramen nodosum, in vliginosis & pinguibus agris nascens, radice geniculatis flagellis latè dispersa, radiculis multis fibrata: foliis Graminis vulgaris: Caulibus multis, flore in panicula comosa. Caules quā è radice prodeunt, nodis sunt multis tuberosi, aliis super alios positos, hiemis initio grandioribus postquam flos emarcuit, & incipiunt arescere folia: carnosā pulpa bulbosis, rotundis, cōpressis, stipatis. Aratro proscissa terra in agris ea iacent, vel rostro suffossa terra, à porcis eruuntur, & manduntur, illis mirificè expetita: saporis amari, & acerbi, qualis est in glandibus. Valentius obstructions expedire, & vrinam ciere aiunt, quàm vulgare.

Gramen nodosum.

Gramen nemorū radice est innumeris fibris contexta, candicantibus, tenuissimis: foliis graminis circa radicem multis, in caulibus, paucis, & qua ex caulibus oriūtur densius villosis. Caules multi eriguntur dodrātales: flos

Forma Graminis nemorum.

GRAMEN Nemorum
Dalechamp.GRAMEN Glumosum
Dalechamp.

paruus

Locus. parvus est, copiosus, è flauo nigrescens, & ex longiusculis pediculis dependens. Holostio Matthioli planta hæc absimilis non est. In aridis, perflatis, & apricis nemoribus nascitur.

Forma Glumosi. Gramen Glumosum radice, foliisque multis graminum generibus non est dissimile: sed hac peculiari nota discrepat, quod spicas densissimis glumarum grandium ordinibus stipatas edat, quã ob causam glumosum nominatum est. In agris latis nascitur.

GRAMEN Aureum
Dalechamp.

Locus.

Forma Gramin. Aurei.

Locus.

Forma Gram. Toment.

Alopecur.



Lagopyrus
In li. de vlc.

GRAMEN Tomentosum,
Alopecuros, vera Plinij,
& Theophr.

In Histor. Frugum.

Locus.

Forma graminis Trigloc.



Gramen Aureum radicibus multis nititur, nigricantibus, huc illuc vagis. Folia huic sunt plurima, Gramini similia, valde longa: caulis cubitalis, geniculatis: flos in spicis pendulus, planè aureus, vnde aureum cognominarunt. In siccis & squallidis locis prouenit.

Gramen Tomentosum radice nititur brachiali, candida, fibratâque. Culmus huic est pedalis, geniculatus: folium Graminis, longius aliquantulo, & latius: spica densa in cacumine, oblonga, coloris candidissimi, tomento lanuginosa, ad contactum mollissimo, suauissimâque, rufis punctis maculosa. Alopecuros vera Plinij esse videtur, quæ ex spicatarum, inquit, est genere: habet enim spicam mollem & lanugine densam, non dissimilem vulpium caudis, vnde ei nomen: quæ cui plantæ aptius quàm isti possunt competere. Quod si & λαγώπυρος Hippocratis esse dicatur? Sic enim scribit. Πληροὶ ὁ μάλιστα τὰ κοίλα τὰ καθαρά, ποτὴ ἢ λαγώπυρος ὄνομα. ἔστι ὃ πύροισιν ὁμοίη ὅταν ἀναίνηται. μικρὸν τὸ φύλλον ὥσπερ καὶ τὸ τῆς ἐλαίας, καὶ μακρότερον. Idest maxime autem replet caua pura herba Lagopyrus nomine. Est autem Tritico similis cum arefcit, folio paruo velut olea, sed longiore. In vulgaris tamen codicibus πύροισιν ὁμοίη; idest fufuribus similis legitur.

Alopecuros Alia à Dodon. ponitur, geniculatis culmis, foliisque, frumentaceis similis, nisi quod culmos breuiiores habet, foliaque minora & angustiora. Spicæ eius nec acutæ, nec aristatæ sunt, sed molles, hirsutæ, lanugine obductæ, haud dissimiles vulpium caudis. Nascitur in aruis vnâ cum frugibus.

Gramen Triglochin hîc depictum in aridis prouenit: radiculis tenuibus fibratum, multis, breuib: folio graminis numerofo, palmum longo, angusto, gracili: caule pedali, nonnunquam proceriore, virgato, enodi, minimè folioso: flore subluteo, inæqualiter per superiorem caulis partem disposito: fructu telum figura imitante, inuersis & deorsum spectantibus cuspidi

ALOPECVROS

Dodonai.

GRAMEN Triglochin, seu Vermiculatum Dalech.



GRAMEN Pinnatum Dalechampij.



cuspidibus duabus, tertia sursum erecta minax. Qua de causa Triglochina cognominarunt.

Gramen Pinnatum radices multas habet, tenues, candidas, folia graminis, longa, tenuia, in acutum desinentia, numerosa: caules quoque multos, nullum edentes florem, sed cum ad iustam magnitudinem creuerint, & solis ardore exarescere cœperint, in Pinnae sese illi diuidunt longas, subtilissimis hinc inde villis capillatas plumarum instar, quas ex ardeolis vulsas ornatus gratia, galeis suis cristacum vice milites affigunt, durante etiam per hiemem totam ea venustate, vt propterea quidam compositos ex iis fasciculos reponant, domique seruent. In aridissimis tumulis, apricis, lapidosisque prouenit.

Form. gra. Pinnati.

Locus.

Est & Graminibus & Alopecuro Dodonæi nuper descriptæ affinis herba hîc depicta Alopecuros graminea, radice tenui, exiles fibras huc illuc mittente, subalba: cauliculis multis, dodrantalibus: folio graminis longiusculo, acuminato: spica caudæ vulpis simili in summis cauliculis emicante, turbinata: flore pusil-

Alopecu. Graminea.

Locus.


lo, rubro, copioso: sapor qualis graminis. In maritimis nascitur.

Gramen Echinatum radicibus multis nititur, gracilibus candicantibus cauliculis ex vno cespite multis, huc illuc diffusis: folio arundinaceo, minore: capitulis in summo caule oblongis, tactu sic asperis vt echinati videantur: semine minutu

Form. gra. Echinati.

A LO P E C V R O S
Graminea Dalech.

GRAMEN Echinatum
Dalechampij.



Locus. minutulo, candido, gluma obuoluto. Sapor totius plantæ ex fatuo subdulcis. Nascitur ad ripas Arares. Omnia hæc graminum genera iisdem fere viribus pollere videntur. Hoc gustus in omnibus idem indicare videri potest. Tamen vnus tantum quod Dentem caninum vocant, superiore capite descripti, in officinis vsus est.

GRAMEN Exile.



Tot Graminibus quædam alia adnumerabimus à Lobellio & Pena obseruata, & picta. Primum est vulgatius Pratense, de quo diximus capite superiore. Alterum exile durius, foliolis iuncea vnciam & sesquunciam altis, ex pusilla radice, capillamentis crebris compacta, panicula & semine acerosis, durioribus, pecori minus gratis. Oritur in sabuletis, ericetis, & squallido aridiorique agro Galliæ, Angliæ, Germaniæ & Belgij. Aliud minimum quod in sabuletis squallidis, & vinetis glareosis Narbonæ sæpius visitur, perpusilla radice, capillacea, alba: calamis paruis, etiam capillamento similibus, eleganti purpura nitentibus, vt in Ischæmo, sed spica molliore, latiore, sericea, speciosa. Est & aliud Typhinum: iisdem quibus exile durius, natalibus gaudet, sed maritimis: radix pusilla, capillacea: caulis dodrantalis, & pedalis. Aliud etiam Cyperoides sic cognominatum à radice mutuo cohesu sibi ipsi implicata, & longius protensa, cyperi longi modo, vt ab aliis seceratur. Folia habet pedem longa, Algæ marinæ quadam



quadantenus similia, in cauliculo dodrantali aut pedali, fastigia exigua, vnciam & sesquiunciam longa, acerosa Graminis Typhini ritu. Addit his Lobellius perelegans Graminis genus Clusij quod is in nonnullis Hispaniæ locis aridis & sabulosis Mompelii que vidit, atque etiam in Lutetiano agro, vbi à rusticis non *Dent de Chien*, vt vulgatum Gramen, sed *Amourettes*, nominatur, fortasse ob pa-

GRAMEN Cyperoides.



nicularum elegantiam: Lobellius Panniculo-
sum Phalarioides appellat. Id supra descripsi-
mus ex Dalechampio, qui Gramen Filiceum
seu Polyanthes secundum nuncupauit. Gramen
caninum medicatum quod vocant, ex Dodo-
næo descripsimus, cum aliquot aliorum Gra-
minibus vulgatoribus. Id quod in magna Eu-
ropæ parte vlitatum, præsertim per Hispanias,
& Gallias, ex Clusio depinxit Lobellius, supe-
riore capite expressimus, suntque elapsi decem
& plures anni, ex quo à Dalechampio Grami-
nis vulgaris nomine pictum, latius serpendo
propagatum, representauimus. Hoc Gramine
nihil vulgatius per Hispaniam & Galliam, in
agris, vinetis, atque etiâ in maritimis, vbi mul-
to lætius atque vegetius prouenit, adeò vt ma-
ximo Gramini marino arūdinaceo planta con-
gener esse videatur. Itaque perappositè dixit
Lobellius Gramen hoc medium quiddam esse
& cognatum cum Ischamo vulgari, & canino
Gramine. Hoc enim effigie & forma cum radi-
ce, tum foliis refert, illud comosa digitatim
sparsa florū iuba. Eiusdem cū canino Gramine

generis, facultatis, & vsus, Hispanis, Gallis, Narbonensibus, & cæteris francigenis, à quibus *Dent de Chien* appellatur. Semen acerosum, scabrum. In Narbonæ maritimis radicum forma & magnitudine adeo ad Harundinem vallatoriam accedit, vt eadem videatur. Canino gramini in omnibus prorsus simile est Gramen bullosum, nodosum, nisi quod rotunda tubercula, veluti Glandulas teretes, gustu dulces, radicum anfractibus hærentes habet, quibus illud caret. Eisdem temperamento & viribus, quibus Caninum officinarum, pollet. Rarius est, & plerisque Europæ regionibus minus vsitatum, in Lusitaniæ finitimis aruïs & segetibus, atque etiam in Sabaudia & Anglia copiosissimum, vbi idem efficacissimum experiuntur medici. Id ex Pena hîc appinximus. Idem Calamagrostim descripsit, idest Harundinaceum Gramen, sic dictum quod mediæ sit inter Harundinem & Gramen figuræ, & nature, Lobellius verò pinxit. Canino gramine Maius idest, calamis & foliis rigidiorib⁹, scabris, quibus ad Harundinem vallatoriam non parum accedit, radice geniculata, alba, prolixiore, & longius serpente, compressiore tamē, & crassiore, Canino Gramini simili, sed vallatoriæ radicem æquante: spicata Melicæ & comosa lanugine: à nobis *Leche* dicitur. Aptè Babylonio quadrare videtur Penæ: neque enim veterina,

*GRAMEN Bullosum,
nodosum.*



*CALAMAGROSTIS
Lobellij, vulgo. Leche.*




*GRAMEN
Sulcatum.*



neque

neque greges aliæ eo vescuntur, nisi multū esuriant, & magna melioris alimēti penuria laborēt, non solum quod ingratissimum sit & aridum, sed etiam quod sitim, tabem & maciem inuehere credatur, linguam & œsophagum vulneret, & constringat, sanguinem in ventriculum eliciat, vnde tumor, inflammatio, & mors plerumque. Quod si Babylone fuit enatum, vbi hanc perniciem adferre creditur, siccius ac rigidius, grex verò imbecillior, & aluo duriore, nihil mirum illius esu pecora enecari. Sic enim videas nonnunquam animalium labra, & fauces cruore manantia, & sauciata, quæ cum alio pabulo per fœnifecia, huius aut similis harundinacea folia esitarint. Aliud præterea Gramen exhibuit Pena, quod sulcatum vel striatum album nuncupat. In syluosis & montosis Sabaudia

GRAMEN Aculeatum
Matthioli.



& Allobrogum sponte nascitur, colitur aut in Belgio & Anglia, Milij potius foliis, sed vt Arūdinis vallatoriae, rigidis, mucronatis: longitudinē mediam glaucā multæ candidæ venæ, vel lineæ argenteæ insigniunt: culmos panici sylvestris, vel canini graminis erigit. Radix pusilla est, fibrata, alba, Pratensis graminis.

Inter palustres de Gramine Aculeato nos agemus, cuius historia Plinij verbis apprimè cōuenit: hoc autem loco Graminis historiam, quod aculeatum esse putat vir dignus omni laude Matthiolus, explicabimus. Eius radix obliquè progreditur, crassiuscula, villosa fibris, non altè defixa: caules multi, virgati, dodrantes, aliquando proceriores, è quibus furculi multi nascuntur, in dextram ac sinistram protensi, folio, tanquam glumo quodam obuoluti vsque ad aculeorum exortum vbi à pediculo diuaricantur. In summis furculis extant aculei tres, instar foliorum Trifolij diuisi, ima parte crassiusculi, acuminati summa quorum in medio flosculi emergunt, numerosi, velut in globulum stipati.

Form. gra.
Aculeati.

BUPLEVRON,

CAP. XXXI.

PRo Bupleuro plantam istam depinxit Dodoneus, foliis longis, angustis, maioribus & latioribus folio graminis, cæterum haud absimilibus. Caules ternos, quaternosue pedes alti sunt, aut maiores, rotundi, recti, spissi, frequētibus geniculis distincti, furculosi multis ramulis, in quorum fastigio muscaria luteis floribus ornantur: his semen oblongum succrescit. Floret, & semen profert Iulio & Augusto mēsis. Olim in herbarum sponte nascentium numero habebatur, nunc in hortis colitur ab herbariis Bupleuron inquit Plinius, in sponte nascentium Olerum numero Græci habent, caule cubitali, foliis multis, longisque, capite anethi, laudatum in cibis ab Hippocrate, in medicina à Glaucone, & Nicandro. Semen contra serpentes valet. Folia ad secundas fœminarum, vel succum ex vino illinunt, & strumis folia cum sale ex vino. Radix contra serpentes datur in vino, & vrinæ ciendæ. Bupleuri semen ad ictus serpentium dari reperio, fouerique plagas decocta ea herba adiectis foliis Mori, aut Origani. Quidam ammi vulgare Bu-


Lib. 4. c. 48.

Forma.

Locus &
Temper.

Li. 22. c. 22.

Usus
& Vires



pleuron esse volunt Officinæ Monspelienses Auriculam leporis vocant hanc, vel eam quæ non procul Gramuntia silua prope Monspelum frequentior reperitur, planèque eadem est cum superiore natalibus, figura, viribus, umbellis & floribus: folio alioqui latiore, rigidior, latiusculo in medio, & supernè in angustum desinente, nonnihil concauo aut inflexo. Vnde auriculam leporinam vocarunt: Lutetiæ nunc Gratiam Dei, nunc Elaphobosum. Quidam Buprestin Plinij.

CYANVS, CAP. XXXII.

Nomina

Lib. 21. cap.

8. & 11.

Ibidem.

Li. 22. c. 125.

Genera.

Forma

CYANVS Plinio dicitur, qui à recentioribus Baptifecula, vel Blaptifecula, vel Batisfocle. Cyanus à flore cæruleo. In nomine est Cyani color, inquit Plinius, qui honorem, noménque dederit Cœruleo. Blaptifecula, inquit Ruellius, quoniam secantibus & metentibus officiat, retusa in occurfu eius falce: nam & Seculam veteres falcem dixerunt. Galli *Aubifoin* appellant, *Blauet* & *Bluet*, à summa cærulei coloris gratia quem *Bleu*, appellant, Itali *Fior Campese*, Germani *kornblumen*. Cyani duo reperiuntur genera, Maius & minus. Cyanus minor caules edit bicubitales, lanuginosos, angulosos, in quibus folia angusta, villosa, in cinereo albicantia, rarioribus incisuris veluti dentibus, siue barbulis quibusdam diuisa. Caules in cacumine calices siue capitula quædam rotunda, scabra, & squamosa proferunt, ex quibus venusti flores cærulei emicant, quinis senisue foliolis in ambitu crenatis constantes, quibus pereuntibus semen oblongum veluti lana obuolutum prouenit, radicem vnicam habet, sed fibratam. Cyanus maior latioribus prouenit foliis, candidioribus, villosioribus, non insectis. Vegetiores quoque caules edit, ac candidiores sed minores: in vertice flores quoque ex scabris calicibus, sed maiores



iores, & patentiores: semen etiam simile. Cyanus minor in campis inter segetes Maio & Iunio mensibus copiosè prouenit. Aliquando tamen in hortis colitur ob coloris venustatem. Florèque interdum niueo, & in rubro purpureo reperitur: fortasse cultus adulterio colorem permutante, alioqui flos cæruleo semper nitet conspectu. Cyanus maior in montibus frequentius nascitur quàm in

Locus.

CYANVS SUPINVS.

CYANVS REPENS.



campestribus. In hortis etiam feritur, & in cæruleo rubros, nonnunquam purpureos fert flores. Cyani vires nullus veterum literis mandavit. Tamen Placentinus ex quorundam opinione, qui Cyanum propria facultate pestilentibus morbis aduersari prodiderunt, suo de Cichorea serapio, quod ad febres pestilentes maximè commendavit, Cyanum admiscuit. Maioris Cyani pulvis datur vtiliter ab alto deuolutis, & sanguinem reiicientibus, ex aqua plantaginis, aut equiseti, aut maioris synphyti. Succus illitus recētia vulnera glutinat, & oris ulcera sanat, vtriusque folia, siue semē ex vino decocta & hausta auxiliātur à scorpione phalangiōq; iētis, quinetiā venenis omnibus resistūt. Succus illitus oculorum inflammationes tollit. Idem præstat aqua ex herba destillata. Est enim Cyanus auctore Dodonæo, temperamento frigido ac sicco. Flos rusticorum coronis quamquam inodorus inseritur, tum ob speciei formam, tum ob coloris gratiā. Ad Cyanū plantas duas refert Lobellius hīc appictas. Prior sub Seseleos pratēsis ramulis ad Sellā nouā, & in aliis agri Monspeliensis locis reptando latitat, foliolis oblongis, angustis, Lauandulæ, rigidis, in cauliculis gracilibus, sarmentosis, palmaribus, pedalibus & sesquipedalibus, quorum singulis fastigiis singuli flores laceæ, obsoleta purpura, ex capitulis squamosis. Radix digitum paruum æquat. Tota planta gustu est amarissimo, & ingrato. Hæc ex Pena. Alter est Cyanus repens, superiori non absimilis, sed exilioribus multo foliolis, & candicantibus capitulis argentei nitoris.

PSEUDOMELANTIVM,

CAP. XXXIII.

Nomina

Lib. 2. c. 121.

Lib. 7. Hist.

cap. 9.

Forma



PLANTA hīc depicta quæ sponte inter segetes passim nascitur, Ruellio ἀνθεμον φυλλώδες dicitur, idest Anthemum foliosum Theophr. Theodorus foliosam Nigellam vocat. A quibusdā Gitthago, & Nigellastrum nominatur, ab aliis Pseudomelantium, ab Italis Gittone, à Gallis Nielle vulgaire, à Germanis Raden, & Grafraden. Caules emittit rectos, graciles, villosos: folia longa, angusta, hirsuta, cinerea: flores è rubro purpurascētes, in quinque foliola diuisos, quibus in coronamentis vtimur: deinde siliquas, in quibus semen. Æstate floret. Alij plantam istam Melanthium sylvestre, alij sylvestrem Lychnidem coronariam esse putant, quibus assentiendum non est, vt suis locis dicetur: multo minus Fuchsio, qui pro Lolio eādam depinxit, ac descripsit. Quare vehementer errant qui Lolij vice ea vtuntur. Recentiores, vt testatur Fuchsius, Pseudomelanthium mirificè in sanandis impetiginibus, aliisq; scabiei generibus commendant. Item in vulneribus glutinandis, ac fistulis curandis compescendōque sanguine eius vsum esse tradunt.

PAPAVER RHOEAS, CAP. XXXIIII.



RÆCIS *μῆκων ποιάς*, id est, fluidum Papauer, à flore qui protinus ei decidit, Plinio erraticum dicitur, Officinis Papauer rubrum, Gallis

Nomina

Confanons, *Ponceau*, & *Coqueliquoc*, Germanis *Klappenrosen*, Hispanis *Amapolas*, *Rosella*, *Papolas*, Italis *Papauero saluatico rosso*. Folia habet, au-

PAPAVER

Rhoeas prius.

Forma



PAPAVER

Rhoeas minus.



ctore Dioscoride, Erucæ aut Cichorio similia, incisa, sed longiora & aspera: caulem lanuginosum, rectum, asperum, cubitalem: florem Puniceum, quandoque etiam album, sylvestris Anemones, caput oblongum, minus tamen quàm Anemone: semen rufum, radicem oblongam, subalbam, minoris digiti crassitudine, amaram. Nasctur in aruis & segetibus passim. Vere & æstate dum frumentorū messis appetit, floret, quo etiam tempore decerpitur. Tertiū Papaueris genus Rhoeam Græci vocant, inquit Plinius, id nostri erraticum. Sponte quidem, sed in aruis cum Hordeo nascitur, Erucæ simile, cubitali altitudine, flore rufo & protinus deciduo, vnde & nomen à Græcis accepit. Idem rursus, inter sativa (Papauera, sub.) & sylvestria mediū genus, quoniam in aruis, sed sponte nasceretur, Rhoeam vocauimus, & erraticum. Hic pro Rhoeada Rhoeam dixit. Dodonæus & Fuschius duplex huius pinxerunt genus. Vnum maius, foliis Erucæ, aut Bursæ pastoris, alterum minus, foliis Cichorij, toto ambitu crenatis, alioqui caulibus, floribus & cauliculis priori simillimis. Nihil istis frequentius in segetibus. Papaueris Rhoeadis quinque, sexue capita, inquit Dioscorides, cum tribus vini cyathis decocta, donec ad duos reducantur, potui dabis quibus somnum accersere volueris. Semen acetabuli mensura cum aqua mulsā potum aluum leniter emollit. Ad idem præstandum mellitis & dulciariis immiscetur. Folia cum calicibus illita inflammationes sanant. Eorundem perfusione & fotu somnus allicitur. Aluum, inquit Plinius, exinaniunt capita quinque, decocta in vini tribus heminis, pota, & somnum faciunt. Galenus semen validius refrigerare scribit, ita vt nequaquam eo quis innoxie solo vti possit, veluti satiuo, melli admiscens. Admodum vero si ita sumptum sit, somnum conciliat. Sed & pusillum eius inspergunt iis, quæ ex melle conficiuntur bellariis, placentis, & panibus. His addunt recentiores sacro igni mederi, mulierum menstrua profluvia compescere,

Locus.

Tempus.

Lib. 19. c. 8.

Lib. 20. c. 19

Lib. 3. ca. 81.

Cap. 194.

Vires.

Lib. 4. c. 59.

Li. 7. simpl.

sanguinem è naribus fluentem vlceri impositum sistere : lingua ex decocta eius lota ardorem faucium sanari : pudendorum tumores eodem detumescere : temporibus illitum phreniticis somnum conciliare : dolores oculorum à caliditate, linteo impositum mitigare.

ARGEMONE,

CAP. XXXV.

Argemone Tragi.

Nomina

Lib.2.c.173.
Forma.

Locus.

Li.6.simpl.
Vires.
Lib.1.c.38.ARGEMONE
Capitulo longiore.

VÆ Græcis ἀργεμὼν, Latinis Argemone, & Plinio Argemonia dicitur, quòd argema & nubes oculos dissipet, planta, auctore Dioscoride, in totum Papaveri sylvestri similis. Folia habet Anemones, diuisa, florem puniceum, caput simile Papaveri Rhoead, sed oblongius, & latum summis partibus, radicem rotundam. Succum emittit crocei coloris, acrem, & acutum. Nascitur in aruis apud nos. Nostri tria genera eius faciunt, & id demum probant, cuius radix thus redolet. Galenus huius herbae facultatem absterforiam esse tradit, & digentem. Tragus pro Argemone pinxit, quod Papaver Rhoead minus, Fuschius & Dodonæus vocarunt, & maiorē Argemonem nuncupauit ille, minorem verò maiori consimilem esse ait, sed caule, radice, herba, flore, capitulo per omnia exilioribus, foliolis admodū laciniatis. Flos illius exiguus

ARGEMONE MINOR
Capitulis breuioribus.

quaternis

quaternis quoque foliolis constat, capitulum habet longius quàm prior. Principio Maij semper floret, nec facile vbiuis locorum inuenitur. Gaudet segetibus Triticeis, Siligineis & Hordeaceis. Hanc Hypecoum esse Matthioli non sine ratione quidam suspicantur. Argemones sane duplex est ex capitulis differentia. Vtrâque Papaueris Rhoeadis primo intuitu figuram præ se fert: in Angliæ Sommerfeti & Gallobelgij segetibus radicem, florem, & folia hirsuta in caule pedali & sesquipedali gignit: flores punicei sunt, flore Papaueris Rhoeadis minores, decidui. Sed minori, quæ perperam Anemone minor à Pena dicitur, capitula Rhoeadis angustiora, longiora & hispida, sine codio. Maiori verò echinata & hispida, sed glomerata, & torulis canulata, in cuius vertice specimen quoddam capituli aut codij relinquit. Vtriq; semen Papaueris Rhoeadis minus.

LAGOPVS, CAP. XXXVI.

LAGOPVS Historiam tam paucis perstrinxit Dioscorides, vt ex eius verbis quisnam verus sit veterum Lagopus intelligere vix quisquam possit. Tamen Dodonæus, Fuschius, Germanorum vulgus, & tota propemodum herbariorum familia plantam hîc depictam pro Lagopo proponunt, ab hirsuta spica Leporino pedi, haud absimili sic nuncupatam. Latine Pes Leporis dicitur, à nonnullis Leporis cuminum, & Trifoliū humile, Gallicè *Pied de Lieure*, Germanicè *Hasensichsz*, siue *Katzenkler*. Lagopyron vocauit Hippocrates, vt diximus cap. de Gramine, quod inter Triticeas se-

Lib. 4. c. 42.
In Hist. pl.
cap. 187.

LAGOPVS VVL-
garis Matthioli.LAGOPVS VVL-
garis Fuschij.

getes nasceretur, quasi Leporinum Triticum. Lagopus iste caules habet rotundos, hirsutos: folia Trifolio vulgari similia, oblonga: semen in Paniculis paruis, muscosis lanuginosisq;, Leporino pedi similibus admodum, cui non obscura adstringendi vis inest. Nas citur Lagopus in segetibus, etiam Plinio auctore, *Forma.*
ἐν ὁπλοῖς, inquit Dioscorides, id est, in Hortorū areis, vt quidā interpretantur, *Locus.*
Lib. 26. c. 8.
Corna

Cornarius vertit in sulcis. Nec dissensio in eo est, inquit, quod hic in sulcis, ille in segetibus nasci dixit, cum sint sulci, id est *ωπαρια* ipsius segetis. Iulio & Augusto mensibus potissimum apparet. Ex his facile est coniectari plantam istam in aruis inter segetes frequentem vniuersæ Europæ vulgatam, esse genuinū Lagopum antiquorum. Huic opinioni suffragatur & facultas. Lagopus herba, vt scribit Dioscorides, sistit aluum in vino pota: aut in febre ex aqua. Eadem inguini alligatur in inflammatione: ita fere ad verbum. Lagopus Plinio sistit aluum è vino pota, aut in febre ex aqua. Eadem inguini alligatur in tumore: quæ ex Dioscoride ad verbum ferè citantur. Galenus Lagopum facultatis esse desiccantis tradit, adeo vt fluxus alui probè exsiccet. Ex his constat, inquit Fuschius, herbam hîc depictam esse Lagopum, siquidem, & nomen & forma aptissimè illi respondent. Locus etiam conuenit, nec facultas abhorret, quod illi est adstrictoria, & exsiccans. His omnibus accedunt vires: vulgo enim omnes hac planta in dysenteria & alui profluuiio vtuntur. Eadem de herbæ huius viribus prædicat etiam Matthiolus. Dantur, inquit, Lagopi huiusce folia, quinetiam Paniculæ & semen in farinam trita contra disenteriam, & cæteras alui fluxiones, contra biliosas reiectiones, & cœliacos affectus ex vino austero, aut succo Punici mali. Totius plantæ decoctū additis Maluæ foliis, è dulci vino paratum, datur vtiliter ad vesicæ morbos, præsertim ad vrinæ ardores. Semen auxiliatur cruenta expuentibus: Panicularum cinis illitus hæmorrhoidas fluentes sistit. Sunt qui iisdem vtantur ad abstergendam dysentericorum sedem, putantes inde fluxionem cohiberi. Hanc tamen herbam legitimum esse Dioscoridis Lagopū Matth. non affirmat. Pena non parū adstrictionis semini inesse ait, siccitatis verò tantum, vt mirū seminis profluuiio laborantibus præstet præsidium. Quare in vlceribus cauis, sed iam deterfis & mundatis, non dubium quin carnem gignat, & cicatricem acceleret, vt vult Hippocrates: tumoribus verò inguinum, & laxis herniis cohibendis peropportuna hæc planta est. Idem Pena non perinde fre-

LAGOPVS

Maxima.

LAGOPVS ALTERA

Angusti folia.

quentem,

quentem, sed tamen inter easdem segetes nascentem geminam huius differentiam observavit. Vnam cuius folia planè eadem quæ superioris, minùs tamen acuta, & Trifolij Pratenfis foliis propiora, caules ambiunt simpliciores, enodes, ferè rectos, cubitales, spicas in vertice proferentes, binos pollices longas, crassiores, pilis & lanugine hispidiore, villosis floribus Trifolij Pratenfis in purpura rubentibus, Fuscis phœniceis, pallentibus. Hanc Veganij se in pratis, & ad fontem publicum elegantissimo aspectu florentem collegisse ait Iunio & Iulio mensibus. Alteram idem Lagopum Angustifoliam vocat, iuxta agrorum & viarum margines Sellenouæ Monspelij exorientem, in Delphinatu, & non procul à Rhodano, & ponte quem S. Spiritus dicunt, alibiq; passim, angustioribus & longioribus multo foliis, ternis, inter Peucedanum & Trifolium ambigentibus, virentibus, pedali caule, aliquot geniculis distincto, ex quibus nonnullæ alæ in summo itidem caudatas spicas edunt, isti proximè descripto pares: quarum flores purpurascens per messes caduci, relinquunt aristas horrentes, & spicas aridiores, acutis glumis pungentes, quibus exiguum continetur & rotundum semen, Sefamo simile. Omnium horum partes, spicæ præsertim, desiccant & adstringunt, sed prioris potissimum. Lobellius Lagopum etiam folio pinnato appellat, quem Tragus Cytisum, Cordus Trifolium magnum. Huius perspicua in folio varietas, quod Marcescens in calidioribus potissimum & Pedemontanis regionibus nitore, læuore & striis elegantissimis avium pennas imitatur, filicis Osmundæ par, terno positu è petiolo pendente. Flos item sanguineus Lagopo maximo persimilis. Hanc plantam pictam dedimus in Dume-to cap. de Cytiso.

LADANVM SEGETVM, CAP. XXXVII.



Æc herba à foliorum cum Ladanum similitudine & natalibus à Plinio Ladanum Segetum dicitur, ab aliis Tetrahit Angustifolium. Plinius duplex hoc Ladanum esse ait, quod Herbarij sic interpretantur, vt aliud sit album, aliud rubrum. Vtrumque foliis est Ledii, angustis, oblongis, per intervalla geminis: caule vnico, pedali, ima parte rubente, ramulis surculisque multis fruticante: flore Marrubij modo verticillatim caulem ambiente, eisdem simili, nunc rubro, nunc albo, gustus subausteri: radice multiplici. Vtrumque nascitur in aruis lapidosis, & inter segetes. Ladanum, inquit Plinius, sistitur aluus utroque, quod in segetibus nascitur, contuso & cribrato: bibitur ex aqua mulsa: item ad bilem, (id est choleram) è vino. idem alibi febres frigidas leuiiores facit Ladanum quod in segetibus nascitur contusum.

Nomina
Lib. 26. c. 8.

Forma.

Lib. 29. c. 3.
Vires.

Lib. 26. c. 11.

POLYC

Locus.
Nomen.
Forma



Lib. I. ca. 65.

NASCITVR etiam sponte in agris, & in agrorum marginibus, humida præsertim anni tēpestare hæc planta à seminum magna copia Polycarpum nominata. Palmum vnū alta est, cauliculos multos profert teneros, geniculatos, inter sese implicatos: folia parua, angusta, Iuniperi minoris foliis satis similia, nisi quod minora sunt, & minimè pungentia, inter quæ flosculi exoriuntur stellati, eiusdem quo caules foliaq; coloris, id est cinerei. Radix digitulōga est, & fibrata. Dodonaus tertiā Polygoni speciem esse putat, eisdemque ferè quibus Polygonum viribus præstare ait. Polyspori mentio fit in Geoponicis Calsiani. Quidam in Pliniani Polygoni primo genere fœminam esse putant, minorem, minúsque nigram, geniculis densiorem, femine sub singulis foliis turgescens.

HEDYSARVM CAP. XXXIX.

Nomina
Genera.

In cap. 129.
lib. 3. Dios.
In hist. fru.
cap. 70.


Lib. 3. c. 129.

Forma.

Li. 27. ca. 12.

RÆCΙ ἡδύσαρον & πελεκίνον vocant, quam Latini à feminis figura Securidacam, vel, vt Turnebus legendum censet, Securiclatā. Vnius tantum Hedysari meminit Dioscorides. Matthiolus duo facit eius genera, Hedysarū maius, & minus, duo itē Dodonaus. His Dalechampiustertiū adiecit. Hedysarū, inquit Dioscorides, frutex est foliis Ciceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorū modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur, vnde nomē accepit, amarū gustu: stomacho vtile in potu: additur in antidota. Idem ferè Plinius habet. Pelecinū in segetibus diximus nasci, fruticosum cauliculis, foliis Ciceris. Semen in siliquis fert corniculorum modo aduncis, ternis, quaternisue, quale Gith nouimus, amarum, stomacho vtile. Additur in antidotis.

*HEDYSARVM maius,
siue Securidaca Matthioli.*



Forma.


Hedysarum Matthioli maius, cauliculos à radice profert multos, tenues, rotundos, lentos, cubitales: folia oblonga, Ciceri proxima: flores diluto purpuræ colore rufescentes, vt in piso, sed minores: siliquas compressas, corniculatas, adunco cacumine, in quibus rufum semen, amarum, securis effigie. Radix est vnica, albāque, non sine adnatis fibris.

Hedysarum minus maiori ferè simile est, nisi quod folia minora habet, in cacumine retusa: & numerosiora: præterea caules & ramos atque adeo partes omnes minores. Flores edit superiori haud absimiles, sed pusillos, ex quibus cornicula oriuntur rotunda, incurua, acuminato cacumine, quæ per maturitatem rufescunt

fescunt, in quibus semen alteri simile, sed minus ac tenuius. Radix est gracilis, alba, longa, altè descendens.

Dodonæus aliud Hedy sarum primum depinxit & descripsit. Caules promit à radice multos, cubitales, rotundos, folia oblonga ex multis, Lentis foliolis, ro- In hist. fru. cap. 70.

HEDYSARUM
minus Matthioli.



HEDYSARUM
Dodonai I.



HEDYSARUM
alterum Dodonai.



HEDYSARUM
Dodonai III.



tundioribus, vt Araci, Viciæ, & similium cōgesta: flores in corymbis luteos: siliquas deinde oblongas, planas nonnihil recuruas, in quibus semina complura, angulosa, rufa & amara securis effigie. Est huius & alterū genus, superiori caule foliisq; simile, vtrisque tantū minoribus: siliquæ huic breuiiores sunt & magis recuruæ, in quibus & semina quadrangularia, ancipitē quoq; securim æmulantia.

HEDYSARVM

minimum.

Forma Hedysari minimi.



Cap. 17. lib. 18.


Li. Hist. & cap. 8.

HEDYSARVM alterum, *Clypeatum Lobellij.*

Li. 1. Alim.

Li. 6. simpl.
Vires &
Temper.

In cap. 129.
li. 3. Diosc.



Hedysarum minimum hoc dicitur, quod si cum reliquis comparetur, minimas omnium siliquas edit. Radice est tenui, breui, candida, caulibus fere pedalis, per humum sparsis: foliis Trifolij pratensis, in vno pediculo multis, sed in extremo semper ternis: flore luteo, circa caulem copioso: semine rufo, bipenni simili, in siliquis falcatis, transuersim virgatis, breuib. In agro Monspelienfi, & nemore Gramuntio crescit. Aliud superioribus multo speciosius acceptum referimus Lobellio, quod in Hortis Belgicis alitur. Ægyptium Helenium, eiusue speciem quidam dixere, alij verò apposite Hedysarum censuere: foliis enim, & procumbentibus cauliculis est Securidacæ simile floribus venustis, Genistæ, sed rubentibus in cauliculis summis: è quibus postea siliquæ compressæ, spectantur complures, hirsutæ, ternis, quaternis, & quinis orbiculatis clypeoli effigie loculis, semine intus Genistæ, minore. Hedysarum nasci in segetibus & Hordeis, scribit Dioscorides, itémque Plinius, loco iam citato. Sed antea dixit. Est herba quæ Cicer enecat, & Eruum circunligando se: vocatur Orobanche: Triticum simili modo Æra: Hordeū festuca quæ vocatur Ægilops: Lentem herba Securidaca, quam Græci à similitudine Pelecinon vocant. Theophrastus tamen Securidacam in

Aphaca gigni, & Aphacam à Securidaca strangulari prodidit, vt Plinius perperam apud Theophrastum φαρδόν, id est Lentem pro ἀφάκην, quæ Viciæ genus est, legerit. Quin & Theophrastus etiam hac in re Plinio refragatur, qui Aracum rem duram & scabram in Lente nasci tradidit, non Securidacam. Galenus in Lente ex mutatione ipsius, durum rotundumque Aracum, & Securidacam, semina non vesca gigni dixit. Hedysari semen, quod idem ait, colore rufum, vtrinque anceps, vt securis, amarū & subacerbum apparet: quambrem potum gratum est stomacho, & viscerum obstructions expurgat. Idem præstant totius fructus ramuli. Bibitur vtriusque semen auctore Matthiolo contra venenatorum animalium morsum. Eiusdem farina vulnera & putrida vlcera absterget, quemadmodum & Lentigines, & Alphos cutisque maculas omnes, si frequenter melle optimo excepta illinatur. Pectus quoque expurgat à crasis, pituitosisq; excrementis, ex melle aut de fructu delincta

delineta. Necat eadem intestinorum vermes ex dulci lixiuio pota, aut ex vino, aut ex muliebri lacte, addito croci momento.

ONONIS, CAP. XL.

ΑΝΩΝΙΣ & ὄνωις Græcis, similiter Anonis & Ononis Latinis appellatur, vt Binominis antiquis sit hæc planta, vna tantum litera mutata, rem tamen eandem semper intuentibus. Ononida Theophrastus & Galenus vocant, Anonida Dioscorides & Plinius. Anonis à non iuuando, quod nullam vtilitatem præbeat, dici videtur. Siquidem aratoribus inimica est, viuaxque nimis fruges opprimit, & suis aculeis nocet, nisi quis ex aduerso nomen inditum putauerit: Ononis quod ὄνως, id est asinos sese terētes ad illam scabientesq; iuuēt, vel quod in ea se volutantes spinis eius dorsum libenter affricent, & scabant. Vulgus Herbariorum Arrestam Bouis, vel Restam Bouis, quod in opere arantes Boues sistat, nominare solet. Nonnulli Remoram aratri, quod altis & duris radicibus in agris aratrum remoretur, appellant. Sunt qui Acutellam, quod suis spinis ingredientium pedes pungat. Galli Arrestebeuf, Germani Hauuheckel, & Ochsenbrech, quia crebris inter folia aculeis, haud secus quam instrumentum hoc quo mulieres linum carminant, & à crassiore purgant stuppa, horreat: vel quod ligone ad aculeatam hanc herbā eruen- dam & extirpandā cum in altum acta, sese propagauit, opus sit. Equites Germani Stalkraut, quod decoctum eius meiere nequeuntibus equis offeratur. Ononis, inquit Dioscorides, ramos fruticosos habet, dodrantes, aut maiores frequen- tibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis: foliis Lenticulæ, tenuibus, pusillis, ad Rutæ aut Pratenfis Loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, nō iniucūdē olentibus. Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis fir- mioribus horrent. Radicem mittit candidam. Spinoforum etiānum aliud ge- nus Ononis, inquit Plinius. In ramis enim spinas habet appositas: folio Rutæ si- mili: toto caule foliato in modū coronæ. Secatur aratro, frugibus inimica: vel, vt legendū censet Turnebus, sequitur arata, frugibus inimica: viuaxq; præcipuē: Idē multo post. Anonin quidā Ononida malunt vocare, ramosam, similē scenogra- co, nisi fruticosior hirsutiorq; esset, odore iucūdo, post ver spinosa. Hæc Plinius, cuius postremā sententiam reprehēdit Matthiolus. Etenim non post ver Ano- nis spinosa redditur, sed in Autumno, id quod experientia ipsa comprobāt, cui etiam Theophrasti auctoritas adstipulatur, de Ononide sic scribentis: ἡ δὲ ὄνωις ἐστὶ πορθακάνθον, ἐπέτρεον δὲ φύλλον ἔχει πηγανῶδες, παραπεφυκὸς παρ' ὅλον τὸν χαυλὸν, διαλαμβανόμενον ὑπαλλήλως, ὡς εἰς εἴδη τὴν ὅλην εἶναι μορφήν. Καλλισβοάνθης δὲ, ἡ ἐλλοβοάνθης ἀδιαφράκτως. Φύεται δὲ ἐν τῇ γλίσχρῃ, ἡ γανῶδι ἡ μάλισα ἐν τῇ ποσειμῳ, ἡ γεωργυμένῃ. διὸ καὶ πολέμιον τοῖς γεωργοῖς. ἡ ἐτι δι' οὐδὲν λειπόμενος. ὅταν γὰρ λαβὴ χώρας βάθος, ὠθεῖ τὰ κάτω ἔσθον, ἡ χαρὶ ἔσθον ἔτος ἀποφύσκει ἀφεμένη εἰς τὰ πλάγια, πάλιν εἰς τὸ ἕτερον ὠθεῖται κάτω, χαθεῖται μὲν ὅπως ὅλη, τὸ δὲ βραχείως γίνεται τῆς γῆς, καὶ ἀπολλυται ῥᾶν. εἰάν δὲ μικρὸν ἀπολεφθῇ, ἀπὸ τούτου πάλιν βλαστάνει. ἀρχεται δὲ τῆς βλαστήσεως γέρως, τε- λιοῦται δὲ μεσοπώρου. Id est, Anonis ramis aculeata est, annuo folio, Rutæ simili, iuxta totum caulem, alternato foliorum exortu interceptum, vt veluti coronam ea tota figura repræsentet: flore tanquā mutilo, qui siliquis insidet, & nullo interstitio disceperit: Nascitur in glutinoso pinguiq; solo, & præcipuē in segeti- bus atque cultis: quare agricolis inimica est. Præterea viuax admodum est. Cum enim altam tellurem occupauerit, recta deorsum sese impellit, singulis annis furculos è lateribus fundens, rursus sequente anno in profundum agitur. Effo- dienda ideo tota est, quod madefacta terra faciendum: sic enim facilius interit. Nam si paruum quid relinquitur, ex eo rursus succrescere potest. Æstate autem

Nomina

Ruel. lib. I. cap. 20.

Lib. 3. c. 18.

Forma.

Lib. 21. c. 16.

Lib. 17. c. 4.


In ca. 18. li. 3. Dioscor.

Lib. 6. Hist. cap. 5.

Locus.

germinare incipit, perficitur autem Autumno. Hæc Theophrast. Ex quibus perspicuum est Plinium, quæ de Anonide scripsit, partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto transcripsisse, si hoc excipias, quod ille Anonida post ver spinosam esse dixerit, hic æstate tantum germinare, & Autumno perfici. Quidam eum locum Plinij sic legunt, ac distinguunt, conueniente sensu. Anonim quidam Ononida malunt vocare, ramosam, similem Fœnogræco, nisi fruticosior hirsutiorque esset, ac spinosa, odore iucundo. Estur etiam, muria post ver condita, nimirum æstatis initio, quo tempore tenella germina conditura apta sunt. Præterea hæ

O N O N I S.



Locus.
Tempus.

Lib. 3. ca. 18.
Vires &
Temper.

historiæ apertè indicant, Anonida eam esse plantam quam hîc depinximus. Ramos enim spargit graciles, lentos, foliis vestitos, in viridi nigricantibus, rotundis, Rutæ vel Loti Prætenfis foliis similibus, inter quæ nocentiores, & mucronatæ spinæ, quasi spicula subriguntur. Flos ferè Pisi dilutiore micat purpura, interdum niueo colore nitet: siliquæ parvæ lato semine refertæ. Radix in nigro candicat, valde lenta, ramis longè lateque expatiâtibus, ob id rusticis notissima, quod non modò ramorum radicumque implexu aratra in mediis sulcis sæpius remoretur, sed etiam quod mesforibus acutis spinis sit infesta. Nascitur præcipuè in segetibus. Floret Iulio mense & Augusto, Autumno sui incrementi finem faciens. Muria conditur, inquit Dioscorides, antequam spinosa fiat, cibus gratissima. Radix excalfacit & extenuat. Eius cortex è vino potus vrinam ciet, calculos comminuit, margines vlcærum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius in potu, hæmorrhoidas sanare creditur.

Quæ postrema, decoctum eius & cætera Oribasius non habet, neque Plinius, qui ex Dioscoride hæc apertè transcripsit. Estur etiam muria condita. Recens verò margines vlcærum erodit. Radix decoquitur in posca dolori dentiũ. Eadem cum melle pota calculos pellit. Comitibus datur in Oxymelite decocta ad dimidias. Ononis, auctore Galeno, radicem habet quadamtenus, tertio ordine excalfacientem. Ea est maximè utilis, habens quippiam & absterforiũ & incisoriũ. Itaque non tantum vrinam prouocat, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas detrahit. Vtuntur porro ea quoque & ad dentium dolores, collui videlicet eam in Oxycrato coctam præcipientes. Tradit Matthiolus Anonidis radici vim maximam inesse ad renum calculos comminuendos, expellendosque, præsertim obstructis vrinæ meatibus, multorum testimonio iam comprobatum esse, qui calculo laborantes, cum corticem radicis puluerem tantum è vino diutius bibissent, pristinam sanitatem recuperarunt: nouisseque sese ait, qui huiusce radicis puluere duntaxat multis mēsis sumpto, carnosum ramice absumpsit, & sanatus est, cum à medicis sola sectione vitioneque curari posse decretum esset. Eroduntur huius radicis puluere callosi ac indurati vlcærum margines. Decocta in posca dentium dolores mulcet, si decocto os colluatur, præsertim cum pituita redundat. Eiusdem decocto solo, putant quidam sanari hæmorrhoidas. Id verò certum est idem decoctum potum summopere ad iocinoris & vasorum infarctus valere

In ca. 18. li.
3. Dioscor.

Vires.

valere. Corticum recentium eiusdem radicis libræ quatuor minutim cōcisa in vini Cretici libris octo macerantur: deinde in vitreā metam cōiiciuntur, ex qua

ONONIS LVTEA

non spinosa, Natrix Plinij
Herbariorum.



in calentis aquæ balneo collocata elicitur aqua, quæ epota semilibræ pondere non solum renes à calculis liberat, & vrinam provocat, sed etiam vesicam, & eius ceruicem à glutinosis excrementis obsessam expedit. Quidam herbam aliam hîc depictam Ononida non spinosam vocant, alij Melilotum maiorem, alij Melilotum sylvestrem pingue. Sunt qui Natricē Plinij esse arbitrētur, quod non solum radix euulsa, sed & herba tota virus hirci, aut, vt aliqui exponunt, bituminosum, & grauem fœtorem redoleat. Radice est nigra, crassa, in multos lignosos surculos diuisa: caulibus multis fruticat, cortice subrubro amictis: foliis Pratenſe Triphyllū æmulatur, si quis digitis terat, ingratum & iniucundum odorem spirantibus: florem edit luteum, lineis subrubris virgatū, Pīso similem. Semen siliquis includitur. Gignitur in aridis, glareolis, & sabulosis. Aduersus omnia venena prodesse & admotam & sumptā experientia compertū est. Natrice in Piceno à fœminis abigunt, quos mira persuasione Fatuos, (Faunos) vocant, inquit Plinius, ego species

Li. 27. ca. 12.

Forma

Locus.

limphantiū hoc modo animorū esse crediderim, qui tali medicamēto iuuentur.

P I S V M,

C A P. X L I.

DE FRUGIBVS, earum vitiis siue morbis, aliisque herbis quæ inter has nascuntur diximus, nunc de Leguminibus tractandum. Legumina quidem dicta putat Varro à legendo, quoniā ea nō secantur, sed vellendo leguntur. Legumenta etiam Gellius appellat. Græci ὀσπρία vocant, Theophrastus χέδροπα. Inter ea notissimum omnibus est Pisum, à quo exordiemur. Græcis ὀπίσος vocatur, plerique etiam λέκυθον dici putant, sed improprie. Nam ex farina Leguminum pulmentarium λέκυθον à Græcis dici testatur Galenus his verbis: ἔτνος ὃ ὀνομάζω τὸ ἐκ τῶν ἐρεχθέντων ὀσπρίων τε καὶ χεδρόπων σκεναζόμενον. λέκυθον δὲ τὸ ἐκ τῶν ἀλεαθέντων ἀλευρον ἐψόμενον ἐν ὕδατι, προσεμβαλλόμενος τῷ λίπυς. Id est, Et nos appello pulticulam quæ ex decorticatis & fressis Leguminibus fit. Lecythum verò, ex molitorum farina, in aqua cum aliquo pingui decocta. Vnde λεκυθοπῶλα Græcis dicuntur, qui eiusmodi pulmentaria, farinas videlicet Leguminū elixatas, & pinguedine aliqua conditas vendunt. Tamen λέκυθος alia sunt apud Græcos significata, hoc loco non declaranda. Pisum à Pisa loco in quo olim copiosissimè nascebatur nominatum dicunt. Galli *Pois* appellant, Germani *Erbſz*. Eius duo apud nos reperiuntur genera. Vnum in aruis caducum, humi serpens, alterum in altum scandens, arboris ramis quibus accubet adfixis, & sese, capreolis vinciens, illiget. Ramulare solemus appellare, *Pois ramé*. Caulibus exit fistulosis, ramosis, per terrā sparsis, nisi ramulos inueniat quibus fulciatur, rotundis, fragilibus: folio frequente, amplo, & longo, crassiusculo ac sub pingui: capreolis multis, quibus admotis adminiculis sese implicat: flos est

Lib. 1. ca. 23. & 22.

Nomina

In lib. de bc. no & mal. sue.

Genera.

Marth. in cap. 101. lib. 2. Dioscor. Ruel. lib. 2. cap. 34.

Forma.

P I S V M.

Locus.

Lib.2. c.10.
Lib.18. c.16.

Tempus.

Lib.8. Hist.
cap.3.

Vires.

Li.1. Alim.

Lib.1. c.79.
Matth in
cap.101. lib.
2. Dioscor.

καθάπερ ὡχρὸς, πίσις, λάθυρος. Id est, Alia autem humi procumbentē caulē habent, vt Ochrus, Pisum, Lathyrus. Pisa Hippocrati minus inflant, sed magis per aluū secedunt. Pisa Galeno tota substantia cum Fabis quandā habent similitudinem, eodemq; cum Fabis modo sumuntur, His duabus tamen rebus ab eis discrepāt, tum quod non æquē ac Fabæ sunt flatuosa, tum etiam quod detergendi facultatem non habent, ideoq; segnius quā illæ per aluum secedunt. Pisum Paulo, laxum quidem est, non tamē adeo flatuosum, ac Faba. Ex quibus perspicitur permultum falli eos qui scribunt Pisorum iure hausto purgari puerperas, lactis copiam augeri, ictericos sanari, & aquæ intercuti succurri. Quo enim pacto præstare ea possit medicamentum quod refrigerat, & siccāt? Sed his errandi occasionem præbuit Tragus, qui perperam putarit Pisum Cicer esse Arietinum, cui supradictæ insint facultates. At quantum Cicer à PISO distet, suo loco dicetur. Quare cum nulla Pisis abstergendi vis insit, Galeno auctore, nec puerperis Pisorum ius propinandum, nec eorum decoctorum cremore aluum cieri verum est. Recentia Pisa quæ cum siliquis manduntur ructus mouent. Rura nostra nullum Legumen magis nouere, quæ ad anni totius vsum diligenter siccata, & siliquis suis explicita recondunt: ita enim exhausto solibus humore diutius à putredine vindicantur. Diuites quoque cum pernis falsis, aut suillis succidiis incoquant, non ingrato cibo, qui in oppiparis cœnis sese offerre sæpius audeat.

P I S V M Americum.



Hic non omittendum Pisum coccineum Americum ex Legumine PISO simili vel Eruo natum: folliculo PISO sylvestri ferè pari semina clauduntur: medullosa, durissima, teretia, oblonga, Præoniæ æmula, sed minora rubro miniata, rutila, ad basim vbi germen, ornata nigris maculis, rotundis, conspicuis, gustu amaro, vt in quibusdam Leguminibus.

FABA

F A B A,


CAP. XLII.

FABAM Græcis à feracitate dicta Faba Latinis vocatur, & κύαμος *Nomina*
 ἑλληνικὸς, id est, Faba Græca, ad differentiam Ægyptiæ. Eadem nomi-
 natur & Fabulum auctoribus Gellio & Festo, Arabibus *Hachille*, *Ha-*
balte, siue *Buchale*, Italis *Faua*, Germanis *Bonen*, Gallis *Feue*. Fabarum *Genera.*
 genera duo nobis sunt coloribus distantia. Sunt enim Fabæ candidæ, siue in
 candido pallentes: sunt & aliæ nigrae, aut in nigro purpurascens. Nascitur
 quoque Faba sua sponte, plerisque in locis, inquit Plinius, sicut Septentriona- *Li. 18. c. 12.*
 lis Oceani insulis, quas ob id nostri Fabarias appellant. Item in Mauritania syl-
 uestris passim, sed prædura, & quæ percoqui non possit. Faba caulem profert *Forma*
 longum, quadrangulum, rectum, glabrum, ex quo ramuli exeunt inæquali exor-
 tu: in quibus folia sub pingua, glabra, sub rotunda, portulacæ similia. Ex ra-
 mulorum cacuminibus capreoli exoriuntur singulares, sed adeo tenues, ut faci-
 lè depereant: at ex caulium alis flores multi ex vno pediculo racematim exeunt,
 vno duntaxat latere, ordine appensi, versicolores, hirti, & cristati. Siliquæ gi-
 gnuntur primùm iis è floribus qui in inferiore caulis parte sunt, aliorum legu-
 minum siliquis maiores, crassiores, carnosioresque, apice in acutum desinen-
 te, in quibus Fabæ concluduntur, forma & magnitudine differentes: nam aliæ
 magnæ, aliæ parvæ, aliæ subrotundæ, aliæ compressæ, aliæ albicantes, aliæ sub
 nigrae, aliæ subrutilæ. Radix est singularis, lignosa, capillata fibris. Fabam sylue-
 stem scribit Matthiolus passim in campestribus humi repere, caulibus qua-
 drangulis, sese inuicem implicantibus, folio Fabæ sativæ, floribus in purpura
 albicantibus, è quibus siliquæ oriuntur, compressæ, Fabarum siliquis longè
 minores, in quibus semen continetur rotundum, Fabarum sapore. Sunt, inquit,
 qui hanc plantam velint Galeni Aracum esse, μόνος ὃ, inquit Theophrastus,
 μάλιστα τῶν χεδρόπων ὀρθόχυλος ὁ κύαμος. Id est, ex leguminibus sola maximè Faba, *Lib. 8. Hist.*
 recto caule surgit: & paulo post ἔχει ὃ τὰ ἄνθη διαφορὰν, καὶ τῇ φύσει, καὶ τῇ θέσει. *cap. 3. Ibidem.*

F A B A sativa.



F A B A sylvestris.



Id est, est & florum eius à reliquis differentia, tum natura, tum positu. Idem,

- Ibid. cap. 1. τῶν ὃ χεδρόπων μάλιστα κύαμος, καὶ κέγχρος πρῶτισπορα, ταῦτα δὲ διὰ τὴν ἀσθενεῖαν πρῶτα βεῖν τῇ ῥιζώσῃ βούλεται τοῦ χειμῶνος. Id est, ex leguminibus Faba & Milium mature ferenda. Ea enim propter imbecillitatem, radicatione hiemem anticipare volunt. Faba seritur Plinio ante vergiliarum occasum, leguminum prima, ut antecedit hiemem: & paulo post: Vergilius eam per ver feri iubet, circumpadanæ Italiæ ritu: sed maior pars malunt Fabalia (purgamenta, siue stipulas & culmos Fabarum) maturæ sationis, quàm trimestrem fructum eius. Idem scribit
- Cap. 2. libr. 8. Histor. Theophrastus. Τὰ μὲν χέδροπα μονόριζα εἰσὶ πολλὰς ἀνωθεν ἀπὸ τῶν καυλῶν ἀποφύσεις ἔχοντα, πλὴν κυάμου. Τὰ δὲ σιτηρὰ πολύριζα. Id est, legumina singulas habent radices
- Ibid. cap. 7. & furculos multos superne ex caulibus mittunt, dempta Faba. Frumenta multis radicanter fibris. Leguminum vnicaulis Faba sola inquit Plinius: vnus & lupinis: cæteris ramosus, prætenui furculo: omnibus verò fistulosus. Idem rursus: Fabæ in folia exeunt, ac deinde caulē emittunt, nullis distinctū internodiis. Reliqua legumina furculosa sunt. Βλαστάνει τὰ μὲν θάττον, inquit Theophrastus, τὰ δὲ βραδύτερον. καὶ κριθὴ μὲν, καὶ πυρὸς ἐβδομαῖα μάλιστα. πρῶτεραι δὲ ἡ κριθὴ μᾶλλον. τὰ δὲ ὄσπρια τέταρτα, ἢ πεμπταῖα πλὴν κυάμου. κύαμος δὲ καὶ τῶν σιτωδῶν ἐν πλείωσιν. ἐνιαχθὲς δὲ
- Lib. 8. Hist. cap. 1. πέντε καὶ δεκαταῖος, ὅτε δὲ καὶ εἰκοσάτος: at Plinius: Erumpunt à primo satū, Hordeum die septimo, legumina quarto, vel cum tardissimè septimo: Faba à xv. ad xx. Quot verò diebus floreat, sic declarat Theophrastus. Ἀλλὰ τῶν χεδρόπων χρόνιος ἡ ἀνθesis. χρονιάτη δὲ τῶν μὲν ἄλλων, ὀρόβου, καὶ ἐρεβίνθου, τούτων δὲ ἀπάντων τοῦ κυάμου, καὶ ἐν μεγάλῃ διαφορᾷ: τετραράκουσα δὲ ἡ μερῶν ἀνθεῖν λέγουσι. πλὴν οἱ μὲν αἰεὶ οἱ μὲν αἰεὶ παρὰνθεῖν, ἕτερον καὶ ἕτερον λέγουσι: κατὰ μέρος δὲ ἀνθεῖν, οἱ δὲ ἀπλῶς. ἡ δὲ ἀνthesis τῶν μὲν φαχυρῶν, ἀθρόα, τῶν δὲ ἐλλοβωδῶν, καὶ χεδρόπων πάντα κατὰ μέρος. πρῶτα δὲ ἀνθεῖ τὰ κατὰ. καὶ ὅταν πάντα ἀπανθήσῃ, τὰ ἐχόμενα. καὶ οὕτως αἰεὶ βαδίζει πρὸς τὰ ἄνω, quæ Plinius expressit his verbis. Legumina diutius florent, & ex his Bruum ac Cicer, sed diutissime Fabæ xl. diebus, non autem singuli scapi tamdiu, quoniam alio desinente alius incipit: nec tota seges sicut frumenti, pariter. Siliquantur verò omnia diuersis diebus, & ab ima primum parte, paulatim flore subeunte. Præterea scribit idem Theophrastus. Κύαμος δὲ ἀνθῶν μάλιστα φύσει βρέχεσθαι. διὸ καὶ οὐκ ἐθέλουσιν ὀφισπορεῖν, ὥσπερ εἰπομεν, ὅτι πολὺ ἀνθεῖ, μετὰ δὲ τὴν ἀπάνθησιν ὀλίγον πάμπαν ὑδατος δέεται σωέγγυς δὲ ἡ τελείωσις. Quæ Plin. sic interpretat⁹ est. Faba aquas in flore maxime concupiscit: cum verò defloruit, exiguas desiderat. Et, ὁ δὲ κύαμος, ὥσπερ ἐλέχθη, καὶ ἄλλως οὐβαρὺς, καὶ ἔτι κοπρίζειν διοχεῖ τὴν γῆν διὰ μανότητα, καὶ εὐσηψίαν. διὸ καὶ οἱ περὶ μακεδονίαν καὶ θετταλίαν, ὅταν ἀνθῶσιν, ἀνατρέπτουσι τὰς ἀρούρας. Id est, eodem Plinio interprete, Solum in quo nata est, lætificat, stercoreis vice. Ideo circa Macedoniam Thessaliāmque cum florere incipit, vertunt arua. Hæc & plura alia, quæ περὶ κυάμου tradidit Theophrastus, Fabæ Plinium attribuisse quivis intelligere potest, atque nostræ vulgari Fabæ ita convenire, ut eorum plane reiicienda sit opinio, qui Fabam vulgarem veterum Fabam non esse, sed alterius nominis legumen, nimirum Phaselum esse prodiderunt. Dicat mihi quæso aliquis, paruum, illud nigrum, quod summæ Fabæ adhæret, & quod hilum dicitur, in quo alio legumine, quàm in Faba nostra reperitur? Nam quod in Americo Piso Indicouæ nigrum spectatur circa germinis exituri cauum, atra nota est impressa cortici, non verò laciniosum Hilum, quod integro cortice auelli queat, ut in Faba. Quæ verò de Fabarum forma, & magnitudine sparsim apud auctores leguntur, & quibus illæ à Fabis nostris differunt, tanti non sunt momenti, ut sententiam nostram possint conuellere. Nam diuersis in terris maiores & minores producuntur, & alia atque alia forma, & magnitudine etiam in iisdem siliquis reperiuntur, & cum crescere incipiunt, & cum perfectæ sunt. Præterea veterum

Faba pusilla tantum fuit, & veluti par, Loto ac Terebintho comparatur, Taxique bacca maior Faba asseritur, nostras verò cultu maior, pinguior, grandiorque facta, illa contempta nomen retinuit, non specie diuersa, sed potius fructus magnitudine & figura, quam plantæ natura, temperamento, aut lineamentis distans. Faba hæc minor Italis, Sebusianis, Alpinisque gentibus Belgio frequentissima est, ad veterina alenda, sed nusquam vsus frequentior quàm in Anglia, vbi panes fabaceos veterinis dant, non triticeos. Sed est & syluestris Faba, vtraque etiam minor. Sebusiani quidem rustici non alio pane vescuntur, quam confecto ex paululo tritici, Secale, & rotunda minutulæque Faba. Iam verò præter notas, etiam facultates quas fabæ veteres tribuerunt nostris optimè competere, siue illas vt cibum, siue vt medicamentum consideres, longa experientia comprobauit. Faba pro cibo sumpta inflationem excitat, Dioscoridi, agrè cōcoquitur, tumultuosa somnia facit, tussi confert, carnem gignit, media calidi frigidique natura. Decocta in posca, & cum cortice suo esitata, dysenterias, & cæliacorum profluvia sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior sequitur, si aqua prior, inter coquendum abiiciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremque flatum parit. Inflat is cibus, Galeno, etiam si coctus diutissimè fuerit, ac quouis modo paratus, cum tamen ptissana tempore quo coquitur flatum omnem deponat. Qui autem animum attendunt, eosque affectus qui cibos singulos manent, animo adsequuntur, sentiunt in toto corpore velut à spiritu flatulento tensionem quandam: potissimum si quis huic cibo non est assuetus, aut ipsum non bellè percoctum sumpserit. Habent autem Fabæ substantiam non densam, nec grauem, sed fungosam, ac leuem, quæ vim quandam, quomodo ptissana, habet detergendi. Apparet enim perspicuè ipsarum farina sordes à cute detergere: quod mangones ac mulieres intelligentes, in balneis quotidie Fabarum farina vtuntur, quemadmodum alij nitro, atque aphronitro, & in summa detergentibus. Hac præterea & faciem inungunt: tollit enim lentes quæ in summa cute apparent: ob quam facultatem ventrem non cunctanter permeat, vt quæ crassi sunt succi & lenti, quæque nullam detergendi habent facultatem. Cum autem Fabarum puls sit flatulenta, multo adhuc magis erunt flatulentæ, si quis integris ipsis coctis vtatur. Si tamen frixæ fuerint, flatum quidem deponunt, sed concoctu sunt difficillimæ, tardèque prætereunt, & crassi succi alimentum corpori exhibent. Quod si virides priusquam maturæ sint, atque exsiccata edantur, idem eis accidet quod fructibus omnibus, quos ante perfectam maturitatem mandimus: humidius scilicet alimentum corpori præbent, ob idque excrementosius, non in intestinis modò, sed in toto etiam habitu. Merito igitur Fabæ eiusmodi, minùs quidem nutriunt, sed promptius deiiciuntur. Plerique autem hominum non crudas modò Fabas virides comedunt, verum etiam cum suilla eas coquunt, veluti olera, ruri verò cum caprina, & ouilla. Alij Fabas inflare sentientes cepas admiscunt, cum pultem in patinis ex ipsis struunt. Sunt qui cepas crudas, nec simul elixas cum ipsa comedunt. Pultem siue edulium ex leguminibus fractis, siue fressis Græci, auctore Galeno, ἔτνος vocant, vt capite de Piso diximus. Sic ἔτμος κυάμινον puls erit ex Fabis fressis, quæ variè paratur, vt ait idem Galenus, siue liquida in ollis, siue spissior in patinis. Tertius est Fabæ præparandæ modus qui fit cum ptissana. Vt autem κυάμινον ἔτμος nihil aliud est quàm Faba fresa elixata, ita κυάμινον λευθός nihil aliud est quàm Fabæ lomentum elixatum. Paulus Æg. ad clauos & callos. ποιεῖ καὶ ἡ λευθός κυάμινον μετ' ὀξὺς ἐψυθῆσα. Id est, facit & Fabæ lomentum cum aceto coctum. Inter legumina maximus honos Fabæ, inquit Plinius, quippe ex qua tentatus sit etiam panis. Lomentum appellatur farina eius, aggrauaturque Tritici pondus illa, ex

Lib. 2. c. 98.

Usus

& Vires

Li. 1. Alim.

Li. 1. Alim.

Cornar. in
lib. 1. spha.

Li. 8. ca. 11.

omni

omni legumine. Iumentorum verò & pabulo venalis. Fabæ multiplex vsus omnium quadrupedum generi, præcipuè homini. Frumento etiam miscetur apud plerâsque gentes, & maximè panico, solida, aut delicatius fracta. Quin & prisco ritu Fabacia puls, (Fabata puls Turnebo,) religione Diis in sacro est, prævalens pulmentari cibo, & hebetare sensus existimata, in somnia quoque facere. Ob hæc Pythagorica sententia damnata: vt alij tradidêre, quoniam mortuorum animæ sint in ea. Qua de causa parentando vtique assumitur. Varro & ob hæc Flaminem ea non vesci tradit, & quoniam in flore eius literæ lugubres reperiuntur. Plutarchus in problematis aliam causam affert, cur Pythagoras à Fabis abstinendum iusserit nempe quod omnia legumina spiritum & humorem impurum ingenerent corporibus, atque hanc ob causam ad venerem incitent. In eadem sententia Cicero fuisse videtur, cum scribit adhunc modum. Iubet igitur Plato sic ad somnum proficisci corporibus affectis, vt nihil sit quod errorē animis perturbationemque adferat. Ex quo etiam Pythagoreis interdictum putatur, ne Faba vescerentur, quod habet inflationem magnam in cibis, tranquillitati mentis quærenti vera contrariam. Aristoxenus tamen apud Gellium refellit hanc opinionem, affirmans Pythagoram nullo legumine sæpius vsum quàm Faba, quod is cibus sensim aluum subduceret, & læuigaret. Porro Gellius quod in cibis Cyamos repudiaretur, causam erroris fuisse putat, Empedoclis carmina qui disciplinas Pythagoricas sectatus est, inter quæ versus hic inuenitur.

Δειλοί πως δειλοί κυάμων ἀπὸ χεῖρας ἔλεον.

Ah miseri à Cyamo miseri subducite dextras.

Opinati enim sunt plerique κύαμον legumentum vulgo dici. Sed qui diligentius scitiúsque carmina Empedoclis arbitrati sunt, vtar enim Gellij verbis, κύαμος hoc in loco testiculos significare aiunt, eosque more Pythagoræ opertè atque symbolicè κύαμος, appellatos, quia sint εἰς τὸ κύειν δεινοί, καὶ ἄλλοι τῶν κύειν, id est, ad conceptum efficaces, causæque grauiditatis, & genituræ humanæ vim præbentes. Idcirco Empedoclem versu isto non à Fabulo edendo, sed à rei veneræ proluvio voluisse homines deducere. Empedoclis carmini similes eodémque sensu Orphei versus hos Calsianus in Geoponicis recitat: δειλοί πῶς, δειλοί, κυάμων ἀπὸ χεῖρας ἔχῃτε, ἴσον δὲ κύαμος φαγέειν κεφαλῆς τε τοκῆων. Sed de his satis. Nūc de Fabæ in medicamentis vsu dicendum κύαμινον ἄλευρον, id est lomentum Fabaceum (quod & ἄλευρον ἐρέγγμινον dicitur) & per se & cum polenta illitum, inflammationes quas vulnus excitauit, mitigat, autore Dioscoride: cicatrices concolores facit: turgentes grumoso lacte mammas, etiamsi inflammatione tententur, adiuuat: lac restinguit: furunculos, sugillata, parotidâsque cum fanigræci farina & melle discutit: cum Rosâ autem, thure, & oui candido procidentes oculos, tumores, vuâsque reprimat: subactum vino suffusiones, & ictus oculorum recreat: manducata sine cortice Faba, ad auertendas fluxiones fronti illinitur: decocta in vino testium collectiones sanat: quo tardiùs pubes erumpat pueris, imo ventri illinitur: vitiliginem purgat: Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescent, & minùs alimenti capeffunt: cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas discutiunt. Decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: namque eas supprimit, si semisecta apprimatur: quæ postrema sic Græcè leguntur. Ἐπιθεταῖς καὶ πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν βδελλῶν ἀιμορραγίας λελετισμέναις, εἰς δύο διαμεθεῖς, καθ' ὃ πρὸς πέρυκειν, ἐπέχει δὲ πρὸς τυπέρυκον καὶ τὸ ἡμισόμιον. Quorum verborum hunc sensum esse Lacuna existimat. Excorticatæ autem Fabæ, atque in duas partes diuisæ (in tot enim singulæ natura diuidi consueuerunt)

applicari

applicari solet dimidia pars contra effusiones sanguinis ab hirudinibus excitatas: eas siquidem supprimit, appressa qua parte alteri cohærebat. Sed breuius & melius, opinor sic Cornarius vertit. Faba decorticata in duas partes diuisa, qua parte ex natura coaluit, ad sanguinis ab hirudinibus eruptiones imponitur, ipsasque cohibet, si secundum semisectam partem apponatur. Auxiliatur & morbis Faba, inquit Plinius, Namque solida fracta feruensque in acre acetum coniecta torminibus medetur. In cibo fresa, & cum allio cocta contra deploratas tusses suppurationesque pectorum quotidiano cibo sumitur: commanducata ieiuno ore, etiam ad furunculos maturandos discutiendosue imponitur: in vino decocta, ad testium tumores & genitalium lomento quoque ex aceto decocto tumores maturat, atque aperit. Item liuoribus, & combustis medetur. Voci eam prodesse auctor est M. Varro. Fabalium etiam sili quarumque cinis ad coxendices, & ad neruorum veteres dolores, cum adipis suilli vetustate prodest, per se cortices decocti ad tertias sistunt aluum. Hæc Plinius, quibus assentitur Galenus his verbis. Faba medio temperamento proxima est, in exsiccando, & refrigerando. Caro eius paulum quoque abstergentis facultatis continet, sicut putamen nonnihil adstringentis. Idcirco medicorum nonnulli totam Fabam cum Oxycrato decoctam dysentericis, cæliacis, vomentibus exhibuerunt. Porro vt edulium, flatuosa est, ac coctu difficilis, si quid aliud, sed excreationibus ex pectore & pulmone idonea: eadem, vt medicamentum, foris imposita, desiccet innoxie. In podagricis ea sæpenumero vsi sumus ex aqua decocta, & ita adipi suillo admista. Ad neruorum tum cõusiones, tum vulnerationes farinam eius cum Oxymelite imposuimus ad eos quos ex ictu iam phlegmone occupauerat cum polenta. Sed & testium & vberum aptum est cataplasma. Nam hæ partes cum phlegmone tenentur, moderate refrigerari volunt, maximè cum vbera ex lacte in ipsis concreto phlegmonen patiantur. Quin lac quoque ab ipso cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina Fabacea illita, plurimo tempore glabra permanet. Quod Dioscorides dicit, *Κύαμος μέσος θερμὸς καὶ ψυχρὸς*, id est Faba medium inter caliditatem & frigiditatem obtinet, Galenus habet *Κύαμος καὶ ἐκ τῆς μέσης κράσεως ἐστὶν ἐγγυιάτω καὶ τὸ θερμαίνειν, καὶ καὶ τὸ ψύχειν*. Ita & Paulus qui ex Galeno transcripsit. *Κύαμος οὐ πολὺ τῆς μέσης ἀφέστηκεν κράσεως καὶ τὸ ψύχειν καὶ θερμαίνειν*. Id est, Faba non multum à medio temperamento abest, tum refrigerando, tum siccando. Similiter etiam Ætius. *Κύαμος καὶ τὸ ψύχειν καὶ θερμαίνειν τῆς μέσης ἐστὶν ἐγγυιάτω κράσεως*. Id est, Faba frigefaciendo ac siccando ad medium temperamentum propinquissimè accedit. Merito igitur dubitari potest, quod sit medium temperamentum Fabæ tum refrigerando, tum siccando, cum medium inter opposita ac contraria intercedere videatur, & id sit quod ab extremis æqualiter distet. Cum verò frigidum & siccum non sint opposita, quæ inter ipsa medium erit temperamentum? Quare pro *ξηραίνειν* in tribus supra citatis auctoribus *θερμαίνειν* legendum esse censet Cornarius, vt inter calefaciendi & refrigerandi vim Faba medio sit temperamento, quemadmodum dixit Dioscorides Fabam inter calidum & frigidum media esse natura. Archigenes apud Galenum inter reliqua auxilia ad sugillatos, Fabæ fresæ aliquoties meminit. *καὶ ἀπὸ λαοῦ καὶ ἐρεγγμοῦ λείψ, ἀψινθίου, & cætera*. Id est cataplasmate autem vtere. Faba fresa contrita, absinthio, & cætera: ac rursus, *ἐρεγγμὸν μαοσησάμηνος ἐπιθεῖς σὺν μέλιτι, καὶ χωρὶς τοῦ μαοσησάμηνος κυάμινον ἄλευρον*. Id est, Fabam fresam commanducatam imposito cum melle. Quin & Fabæ lomentum etiam non mansam. Item Appollonius, *ἀψινθίου λείψ μετὰ μέλιτος, ἐρεγγμὸς παραπλησίως*. Id est, absinthio trito cum melle, & Faba fresa eodem modo. In quibus & omnibus aliis huiusmodi, Faba fresa quæ etiam à Plinio fracta dicitur, ea est quam Græci *ἐρεγγμὸν*

Li. 22. c. 25.

Lib. 7. sim.

Lib. 7. ca. 3.

Emb. 93. li. 2.


Li. 5. ph. 10.

Ibidem.

Corn. Ibid.

ἐρεγγμὸν simpliciter vocant, ἀπὸ τοῦ ἐρεχθῆναι, quod videlicet in minutas partes sit fracta, vt sit ἐρεγγμὸς in Faba, quod χόνδρος & πλισάνη in frumentis. Quæ verò molita est, & in farinam redacta, lomentum Fabaceum dicitur, vt ex Plinio iam diximus, Græcis κυάμινον ἄλευρον, & ἄλευρον ἐρέγγμινον, quod etiam cum melle subactum hoc loco commodè sugillatis imponitur. At ἐρεγγμὸς pro lomento & farina Fabarum etiam nonnumquam vsurpatur, sicut hoc loco sumi videtur. ψιμυθίς, & λυθαργύρον ἴσα μετὰ μέλιτος λεάνας ἐρεγγμὸν, μίσγε. ὥς ἐκ κρητῶδες γενέσθαι. Id est, Cerusæ & spumæ argenti æquales partes cum melle terito, & admixta Faba fresca, ad cerati formam reducito. Non possit enim ἐρεγγμὸς in cerati formam commodè admisceri, nisi in farinam redactus. Præterea ἐρεγγμὸς non de Faba solùm dicitur, sed & de aliis leguminibus, itémque radicibus eodem modo fractis. Paulus. ἵρεως & πλισάνης ἐρεγγμὸς ἀνὰ ξ. α. σ. Hoc est, iridis & ptissanæ fractæ, seu fresæ vtriusque sesquifextarium. Hippocrates, & κριθὰς πεφωσμένας & ἐρηλεγμένας, Id est, hordeum tostum ac fresum Galenus Cicer fractum non valde in cibo familiare esse scribit, sed magis farinam ipsius in lacte coctam, cùm non possit eodem modo quo Fabæ & Pise frangi, vt ex ipso ἐρεγγμὸς fiat. Sed Pauli locum supra positum cum Cornarius citasset, vt ἐρεγγμὸν non solùm de Faba, sed de aliis etiam fractis dici ostenderet, idem alio in loco Græcos Pauli codices falso habere tradit, ἵρεως, πλισάνης, ἐρεγγμοῦ ἀνὰ ξ. α. σ. vt ἐρεγγμὸς ptissanæ non attribuitur, sed tria distincta sint medicamenta, iris, ptissana, Faba fresca, siue lomentum Fabaceum. Id quod ex Ætîo probat, qui idem medicamentum his verbis habet. ἵρεως λεῖπας, πλισάνης ἄλευρον, κυάμινος ἄλευρον. Ex quo loco id etiam intelligatur ἐρεγγμὸν, Paulo

FAGABO BELGARVM,
siue Peplus Parisiensium.



significare, id quod Æti⁹ dixit κυάμινον ἄλευρον, vt non solùm pro Faba fresca, sed etiam pro lomento Fabaceo ἐρεγγμὸς accipiatur, quemadmodum iam diximus. Sicut Plinius ex Fabâ tentatum fuisse panem scribit, & eam frumēto misceri, ita hodie quidam eius farinam secali miscent, ac panem cōficiunt solidum, & multi nutrimenti. Phrysiæ etiam hodie magna ex parte Fabarum farina hordei farinæ aut auenæ admixta panes faciunt in illis præsertim insulis, quas ex Plinio Fabarias appellatas fuisse memorauimus. His subiungemus Fabaginem Belgarum, quam alij Leguminosam Capparim vocant, Parisienses Peplum: folia Capparis habet, longiora, & gemina, Fabæ similitudine, ex atro virentia, minora tamen & ad Rutam accedentia: flores geminos, Capparibus conditis similes, expansi candidi, foris herbidi, è quorum medio fibræ croceæ stamina educuntur. Vniuersa planta gustu est amaro, Salicis, aut Capparis. Gallis & Belgis, nisi rarò in hortis occurrit. Hæc Lobellius.

FABAMΟΣ αἰγυπῖος, Latine Faba Ægyptia, Gallicè *Fève d'Egypte*. Quidam, inquit Diosc. Ponticam vocant, Herodotus Liliū Ægyptium. Appellatur etiam à Plinio Colocasía. In Ægypto nobilissima est, inquit, Colocasía, quam Cyamum vocant aliqui, & cætera. Sed Dioscorides radicem Fabæ Ægyptiæ Colocasiam appellari ait, Athenæus neutro genere Colocasion. *ρίζας λέγει Νίκανδρος, τὰ ὑπ' ἀλεξανδρέων κολοχάσια χαλάρηνα.* Et paulo post, *ἡ τῷ κυάμῳ τοῦ αἰγυπῖος ῥίζα, ἥ τις λέγεται κολοχάσιον.* Id est, Fabæ Ægyptiæ radix, quæ Colocasion dicitur. Et Virgilius.

Eclog. 4.

Mixtaque ridenti Colocasía fundit acantho.

Ætius Colocasion Manzizanion etiam appellat. Faba Ægyptia Dioscoridi, folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur (Græcè legitur *ἔχει φύλλον μέγα, ὡς πέντασον*: id est, folium habet magnū instar galeri. Ruellius autem Plinij verbis hîc vsus est, qui melius personatæ foliis Fabæ Ægyptiæ folia comparasset, quod etiam Plinius fecit, vt dicetur) caulem cubitalem, digiti crassitudine: florem roseum, dupla papaueris amplitudine: vbi flore exuitur, fert

Lib. 1.

Lib. 2. c. 99.

Forma.

FABA AEGYPTIA



folliculos vesparū fauis similes, in quibus Faba supra operculum bullatis ampullæ modo prominet. Ciborium, aut Cibotium idest arculam ideo nominant, quoniam seratur ipsa humenti glebæ mandata, & in aquam demissa. Radice firmatur arundinis, crassiore. Fabā Ægyptiam Tridenti sibi ab Odoardo Polono demonstratam scribit Matthiolus, qui alias quoque plantas, & eas quidem raras ex Syria, & Ægypto detulerat. Eius Fabæ imaginem hîc ad viuum expressam habetis quam plerique suspectam habent. Clusius pro Colocasía pinxit plantam quam Matthiolus & Dodonæus Arum Ægyptium esse putant. Illa quaterna aut quina folia habet, carnosâ nymphææ foliorum modo, sed neruosa admodum, & multis venis, seu fibris eminentioribus exteriore parte contexta, incanâque, & amplissima, vt interdū personatæ folia magnitudine superet, nunquam maden-

Lib. 2. stirp.

Hisp. ca. 19.

In c. 99. li. 2.

Li. 1. purga.

cap. 5.


tia, etiam si aquis immergantur, oblongis, crassis, firmisque pediculis enascētia, radice crassa, magna, duplici plerumque, & ad lagenæ modum efformata, eduli, qua aliis ad latera adnatis se propagat: fibris aliquot nititur. Frequentem esse multis Lusitaniæ locis ait Clusius circa riuos, ex Africa delatam: se vidisse omnium maximam, & amplissimis foliis Hispali, in horto arcis Regiæ: vbi que tamen & florem & fructum ferre negabant, Lusitanis Mauritanos secutis Igname dicitur, Bæticis Alcolcaz, quæ vox à Colocasía proculdubio deducta est. Cum verò hæc planta plerâsque notas cum veterum Colocasía communes habeat, ferè sibi persuadet Clusius hîc depictam eam ipsam esse quæ Græcis: *κολοχάσια*, ἡ αἰγυπῖος κυάμος, ἡ πόνικος dicitur. Expetitur hæc admodum mancipiis Æthiopibus per Lusitaniam, à quibus & cruda & cocta estur. Bellonius lib. Obseruationum refert Colocasiam Alexandriæ, vrbibusque & pagis vicinis frequentissimam in foris venalem reperiri, Ægyptiôsq; vix cibum sumere, quin Colocasía apponatur cum carnibus cocta: & aliquanto post negat florem aut fructum ferre. Eius verba subiicienda, quoniam veterum de Faba Ægyptia sententiam

Capi. 19.

Cap. 28.

COLOCASIA Clusij.

Arum Ægyptium Matth.



suspectam habet. Agri, inquit, plerisque locis consiterant Oryza, Papiro, Mucis, & nonnulli Colocasia. Quoniã verò huius Colocasie, quæ etiam Lotus, & Faba Ægyptia appellatur, fructum magna diligentia frustra perquisivimus, illiusque inquisitione Cairi incolis ridendos vos præbuimus, occasionem sumpsimus inquirendi cur veteres eam Fabam Ægyptiam nominarint, cum Fabis careat: tandem erroris originemprehendimus. Herodotus auctor vetustissimus duarum in Nilo nascetium meminit, quarum altera rotunda esset radice, quæ Colocasia est, altera quiddam Oliuarum nucleis simile quodam capite ferret. Reliqui post eum auctores alter alterius vestigia secuti, ad arbitrium deinde descripserunt. Nam quod Theophrastus radicem illi spinosam tribuit, rem aliter se habere experientia ipsa docet. Dioscorides Fabam Ægyptiam, describens Theophrastum fere secutus est, & utrumque interpretatus Plinius. Addit Bellonius sylvestrem & sponte nascentem iuxta riuulos in Creta se inuenisse, Ægyptios verò magna diligen-

Locus.

tia colere. Sed quæ veteres illi de ea literis mandarunt persequamur. In Ægypto copiosissima nascitur, teste Dioscoride. In Asia etiam Ciliciæque lacubus in-

Lib. 4. Hist.
cap. 10.

uenitur. Theophrastus eandem sic descripsit: ὁ ὅ κύαμος φύεται μὲν ἐν τοῖς ἔλεσι καὶ ταῖς λίμναις. χαυλὸς ὁ αὐτοῦ μήκος μὲν ὁ μακρότατος εἰς τέσσαρας πῆχεις. πᾶχος ὁ διακυλῖαιος, ὁμοῖος ὁ χαλᾶμω, μαλακὸς μακρὸς. Athen. ἀγόνατος διαφύσσει ὁ ἐνδοθεν ἔχει διόλου διειλημμένος, ὁμοίως ὁμοίως. Athen. τοῖς κρήναις, κηρίοις. Athen. ἐπὶ τοῦτῳ ὁ ἡ κωδία παρομοία σφηκίῳ περιφέρει, ὅ ἐν ἐκάστῳ τῶν κυττάρων κύαμος, μικρὸν ὑπεραίρων αὐτῶ. πλῆθος ὁ ὅι πλείστοι τριάκοντα. τὸ δὲ ἄνθος διπλάσιον ἢ μήκωνος. χρώμα δὲ ὁμοίον ῥοδῶ, χαλικορῆς. ἐπάνω δὲ τῶ ὕδατος ἡ κωδία παραφύεται δὲ φύλλα μεγάλα παρ' ἑχαστον τῶν κυάμων, ὧν τὰ μεγέθη πῶς θεοσαλῆς, τὸν αὐτὸν ἔχουσα χαυλὸν τῶ τῶν κυάμων. σωτήριφανι δὲ ἑχαστον τῶν κυάμων, φανερόν ἐστι τὸ πικρὸν σιωετραμμένον, ἐξ ὧ γίνεαι ὀχαυλὸς. τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν χαυλὸν τοιαῦτα. ἡ δὲ ῥίζα παχυτέρα τοῦ χαλᾶμω τῶ παχυλάτῳ, ὅ διαφύσσει ὁμοίως ἔχουσα τῶ χαυλῶ. ἐσθίει δὲ αὐτὴν ὅ ὤμην, ὅ ἐφθῆν, ὅ πρῆν. καὶ οἱ περὶ, τὰ ἔλη τοῦτῳ σίτω χρωταῖ. φύεται μὲν οὖν καὶ πολὺς αὐτόματος. οὐ μὲν ἀλλὰ χαλαβάλλουσιν ἐν πηλῶ, ἀχυρώσαντες εὖ μάλα, πρὸς τὸ χαλενεχθῆναι γὰρ, καὶ μείναι, καὶ μὴ διαφθαρῆναι, καὶ οὕτω χαλασκευάζουσι τὰς κυάμονας. ἀν δὲ ἀπαξ ἀνιλάσθῃ, μὲν εἰς διὰ τέλως. ἰσχυρὰ γὰρ ἡ ῥίζα, καὶ οὐ πόρρω τῆς τῶν χαλᾶμων, πλὴν ἐπαχύνουσα. διὸ καὶ ὁ κροκόδειλος φέυγει, μὴ προσκόψῃ τῶ ὀφθαλμῶ, τῶ μὴ ὀξὺ χαθοράν. γίνεαι ὁ οὐλὸς καὶ ἐν συρία, καὶ χαλὰ κιλικίαν. ἀλλ' ἐκ ἐκπέπλουσιν αἱ χῶραι. καὶ περὶ τορώνην τῆς χαλκιδικῆς, ἐν λίμνῃ τινὶ μερία τῶ μεγέθει. καὶ αὐτὴ πέπειται, καὶ τελεστοῖ, ὅ τελεοχαρπῆς: Latine hæc sic vertenda. Faba in paludibus stagnisque exit. Caulis eius qui longissimus, ad quatuor cubitos erigitur, crassitudine digitali, similis calamo molli. (Athenæus qui hunc Theophrasti locum excipit, sed non integrum, legit μακρὸς, id est longo) non geniculatus. Totus rimis intrinsecus distinctus est, Lilij modo (Hermolaus vertit, rimæ intus per totum ut Lilio: Athenæus legit κηρίοις, id est Fauis modo, non Lilij.) Huic insidet caput, rotundis fauis vesparum simile. In singulis veluti Loculis, ac pertusis cauis singulæ Fabæ continentur, & parum super eminent, multitudine plurimum triginta. In

Cor. c. 116.
lib. 2. Diosc.

his

his pro σφοκίῳ corrupta in exemplaribus voce, legit Theodorus σφηκίῳ, Fauum vesparū orbiculatum interpretatus, deinde pro κηλάρων legit κυτάρων, & ἐν ἐκάστῳ τῶν κυτάρων reddidit in singulis cellis: Sunt enim κύτλαροι, τῶν σφηκίων χηλιδρήσεις, καὶ τῶν κηρίων κοιλότητες, id est fauorum vesparum foramina, & fauorum cauitates. Sunt qui pro κηλάρων legant κισσώριων. Theodorum secutus Hermolaus vertit, calix in cacumine rotūdus, vesparum Fauo similis: triginta plurimum loculis, qui singulas singuli continēt, non quidem omnino rectas, sed paulo extantes. Hos imitati Dioscoridis interpretes, quod dixit, ὅπερ ἀπανθήσαν φέρει φυσκία παραπλήσια θυλακίσκοις, ἐνοῖς κύαμος μικρὸν ὑπεραίρων τὸ πῶμα, ὡς πομφόλυξ, interpretati sunt, vbi flore exuitur, fert folliculos vesparum fauis similes, cū non σφηκία, sed φυσκία habeat, id est, folliculos capsulis similes, in quibus Faba supra operculum veluti bulla parum prominet. Hic operculum πῶμα dictum, ἡ κωδία est Theophrasti quam, caput & calicem illi verterunt. Flos duplo maior quàm Papaueris, rosei coloris, saturi: caput extra aquam attollitur: Plantis huius Fabæ singulis adnascūtur folia. Hermolaus sic reddidit. Ipse quoque calices aquis extant, latissimis circa foliis, quæ singulas Fabas obire videantur. Ea verò quæ sequuntur prætermisit Theodorus. ὣν καὶ τὰ μεγέθη πῖλον θέρστικῃ, & cætera, Id est magnitudine paria pileis Thessalicis: eorum pediculus cauli similis est, qui Fabas profert: Hermolaus aliter expressit, magnitudo iis, inquit, ad similitudinem eorum, quæ vt Plinius ait, personatæ in nostris fluminibus vocantur. Prosequitur Theodorus, ob tritis sigillatim Fabis amarum illud ex quo caulis prodit, χαυλός, non πῖλος, intortum spectatur. Eiusmodi caulis ac fructus est. In his mirū cur Theodorus πῖλον pilulam verterit, qua de re hæc est Cornarij sententia. Si verò quis contriuerit singulas Fabas, inquit, manifestum fit amarum illud compactum, ex quo pileus prodit: πῖλον enim nunc folia dicit, quæ pilei magnitudinem habent. Id quod cum Theodorus in suo codice Græco non haberet, in eam hæsitatiōem delapsus est, vt quod pro πῖλῳ verteret non habens, pilulam ex pileo faceret. Quod Theophrastus πῖλον dixit, πέτασον appellat Dioscor. his verbis: ἔχει δὲ φύλλον μέγα ὡς πέτασον, id est folium habet magnum velut galerum. Hermolaus πῖλον, hīc caulem siue thyrsū interpretatur. Eius hæc sunt verba. Thyrsus inter folia emicat spectabilis, à Theophrasto πῖλος vt arbitrantur, vocatus: quamquam Theodorus pilulas interpretari videtur. Alij calicem rotundum eo vocabulo significari voluerunt. Hæc Hermolaus: ex quibus intelligimus, viros alioqui doctissimos, eius loci vitio hæsitasse, multum anxios cum res intellectu facilis esset, ex illo amaro quod in medio Fabæ abstrusum, loco germinis est, nasci primum caulem deinde illo gliscente per ambitum folia. Sed id peritis accuratius disquirendum relinquatur. Persequamur iam cætera. Radix quauis arundine crassior: caulis modò etiam rimosa manditur & cruda, & elixa, & assa: eo cibo qui accolunt stagna vescuntur. Nascitur sponte multa, tum etiam in lutum deiecto semine, diligenter palea stipato, vt fidat, maneátque in vado, nec corrumpatur. Sic instituuntur Fabalia. Semen vbi semel comprehenderit, planta nunquam interit: radix enim valida est, nec dissimilis arundini, verum spinosa: quamobrem Crocodilus eam refugit, ne impingat, & oculos lædat, quoniam eius visus sit obtusior. Nascitur hæc etiam in Syria, Ciliciáque, sed tractus ij non perficiunt. Circa Toronen agri Chalcidici quodam in lacu modico etiam gignitur, magnitudine mediocri, vbi & percoquitur, & perficitur, καὶ τελεῖται, quod verbum otiosum ac superuacuum esse multi arbitrantur, & fructum absoluit. His Fabam Ægyptiam graphicè depinxit Theophrastus, & eandem planè quam Dioscorides. Plinius seorsum de Faba, seorsum de Colocasia agit, ex oratione Theophrasti, quibusdam mutatis, qui-

Emble. 94.
li. 2. Diosc.

Li. 8. ca. 12.

busdam etiam omisissis. Ac de Faba quidem sic. Nascitur & in Ægypto spinoso caule : qua de causa crocodili oculis timentes refugiunt. Longitudo scapo quatuor cubitorum est amplissima : digiti crassitudo : in genicula abessent, molli Calamo similis, sic legit Turnebus: Caput Papaueri, colore roseo. In eo Fabæ non supra tricenæ (triginta.) folia ampla, fructus ipse amarus & inodorus. Sed radix perquam lauta incolarum cibis, cruda, & omnino decocta, harundinum radicibus similis. Nascitur & in Syria, Ciliciâque, & in Torone Chalcidis lacu. De

Li. 21. ca. 15.

Colocasias verò scribit, sed verbis deprauatis, quæ legenda sic quidam putant. In Ægypto nobilissima est Colocasia, quam Cyamon vocant aliqui. Hanc è Nilo metunt : nos nusquam ex nostris amnibus : caule araneoso, qui coctus mandendo est. Thyrsus autem qui inter folia emicat spectabili, foliis latissimis, etiamsi arboreis comparentur, ad similitudinem eorû quæ personatæ vocamus. Adeoque Nili sui dotibus gaudent Ægyptij, vt implexis Colocasiæ foliis in variam speciem vasorum, potare gratissimum habeant. Seritur iam hæc in Italia. De

Li. 17. c. Ge.

iisdem vasis idem habet Strabo, & testatur adeo magna esse illa, vt poculorum, & catinorum vsum præbeant, aptam ad id habentia cavitatem, vt Alexandrinæ officinæ his plenæ sint, & non aliter quàm vasis vtantur. Appellantur autem hæc vasa κιβώρια, & κιβώτια, auctore eodem Strabone, ἴδιος ἀργυπλίων ἐστὶ κύαμος ἀργυπλίου, ἐξ ἧς κιβώριον γίνεται. Id Athenæus confirmat his verbis. τῶν κώωνος ἐν μάλα προβεβηκός, λαβὼν ἐν τῶν κιβωρίων, ὡς ἐξ οἰνῶν καὶ μεθύων ἐνέρησε. διδύμος ὃ φασι ποιητὴς εἶδος εἶναι, καὶ τὰ χαλὰν εἶναι τὰ λεγομένα σκυφία, διὰ τὸ χεῖρωθεν εἶς τενὸν σιωήχθαι, ὡς τὰ ἀργυπλίου κιβώρια. Id est, cum potus liberalior quem Græci κώωνα appellant, procederet, ille capto poculo quodam, quod Ciborium nominant Græci, eo imminxit,

Libr. II.

tanquam baccans & ebrius. Didymus ait hoc esse poculi genus. Et fortasse sunt ea quæ Scyphia appellantur, propterea quod in angustum pars infima contracta est, vt ciboria Ægyptia. In eo significato vsurpauit Horatius, obliuioſo læuia malsico ciboria exple. Dioscorides tamen Fabam ipsam, κιβώριον, & κιβώλιον nominari tradit : item Galen. διδοῖαι ὃ ἐπὶ τούτων διὰ γλυκίος ἢ μελικράτους προεφεφηνόμην διελόμενος ἢ πηγάνος, κύαμος ἀργυπλίου τὸ μέγεθος, ὅτινες ἐπιχωρίως κιβώτιον ἢ κιβώριον καλεῖται. Id est, Datur his ex passo, aut aqua mulsæ, in quibus Dictamnium aut Ruta incocta sint, Fabæ Ægyptiæ magnitudine, quam quidam vernacula lingua cibotium & ciborium appellant. Ætius etiam viridem Fabarum Ægyptiarum fructum ciborium appellari ait. Dioscorides Fabæ Ægyptiæ vsum tum in cibis tum in medicamentis declarat his verbis. Radix cruda coctæue estur. Fab

Lib. 2. od. 7.
Lib. de Th.
ad Pam.

ba vires manditur, & exsiccata nigrescit : vulgarem magnitudine superat. Adstringendi facultatem habet, & stomacho vtilem : dysentericis, coeliacisque prodest, in parso polentæ vice lomento, datur quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur. Galenus tradit Fabam Ægyptiam sicut nostram magnitudine superare, ita & naturam habere humidiores, magisque excrementitiam. Alio in loco aurium doloribus prodesse Fabam Ægyptiam viridem, internam amaram, hoc est, quod in medio eius viride & amarum est, quod Dioscorides declarauit his verbis. Καὶ πρὸς ὠταλγίαν ὃ ποιεῖ τὸ ἐν μέσῳ χλωρὸν αἰσῶν, πικρὸν ὃ κατὰ τὴν γεῦσιν. Hoc ipsum modo pul-

Libr. I.
Lib. 2. c. 99.Usus
& Vires

pam, modo interiora Fabæ Marcellus appellat. Et Corn. Celsus Ægyptiæ Fabæ amarum cum rosis contritum, oculorum cum dolore inflammationibus adhibet. Colocasij radicis similis vis est, inquit Ætius, rapis ac cepis, viscosum autem corpus ipsius est. Vnde exterforiæ facultatis particeps est, & ventri in cibo sumpta commodat. Plinius scribit Colocasiæ caulem araneosum

Li. 1. Alim.

si tritum & cum rosaceo coctum instilletur. Galenus tradit Fabam Ægyptiam sicut nostram magnitudine superare, ita & naturam habere humidiores,

Li. 3. comp.
ph. local.

magisque excrementitiam. Alio in loco aurium doloribus prodesse Fabam Ægyptiam viridem, internam amaram, hoc est, quod in medio eius viride & amarum est, quod Dioscorides declarauit his verbis. Καὶ πρὸς ὠταλγίαν ὃ ποιεῖ τὸ ἐν μέσῳ χλωρὸν αἰσῶν, πικρὸν ὃ κατὰ τὴν γεῦσιν. Hoc ipsum modo pul-

Libr. 6. c. 6.

pam, modo interiora Fabæ Marcellus appellat. Et Corn. Celsus Ægyptiæ Fabæ amarum cum rosis contritum, oculorum cum dolore inflammationibus adhibet. Colocasij radicis similis vis est, inquit Ætius, rapis ac cepis,

Libr. I.

viscosum autem corpus ipsius est. Vnde exterforiæ facultatis particeps est, & ventri in cibo sumpta commodat. Plinius scribit Colocasiæ caulem araneosum

neofum

neofum esse in mandendo, vt diximus, quod & testatur Martialis his versibus.

Niliacum ridebis olus lanâsque sequaces,

Improba cum morsu filia manûque trahes.

Colocasia Glaucias, inquit idem Plinius, acria corpora leniri putauit, & stomachum iuuari. Fabæ Ægyptiæ radix quæ Colocasion dicitur, vt ait apud Athenæum Diphilus, stomacho utilis est, & corpus alit, sed difficile excernitur, quia constringit, melius autem in ea fuerit, quod minimè lanosam refert naturam. Fabæ quæ ex ciboriis nascuntur virides quidem, difficile coquuntur, parum nutriunt, difficile excernuntur, maximè sunt flatulentæ, siccatae minùs flatuum mouent. Prouenit etiam ex ciboriis flos coronamentis dicatus.

Li. 21. ca. 28.

Libr. 3.

CICER, CAP. XLIIII.

CICERINTHOS Græcis, Cicer Latinis dicitur, Arabibus *Chemps*, *Hamos*, seu *Athamos*, Italis *Ceci*, Germanis *Kichem*, *Kicherebs*, Hispanis *Grauancos*, Gallis *Ciche*, & *Poix ciche*, & *Pois bechu*. Ciceris genera duo sunt Dioscoridi, Galeno, Plinio, satium scilicet, & sylvestre. Satiui differentia aliquot. Dioscorides satiui alterum genus esse dicit, quod Arietinum nominat. Theophrastus aliter distinxit his verbis, *οἱ δὲ ἐρεβινθοὶ, ἔ τοῖς μεγέθεσι, καὶ τοῖς χυλοῖς, ἔ τοῖς χρώμασι, ἔ ταῖς μορφαῖς διαφέρουσιν, οἷον κρίσις, ὀροβιᾶσις, καὶ οἱ ἀνὰ μέσον. ἐπὶ πᾶσι δὲ τὰ λευκὰ γλυκύτερα.* Quæ sic conuertit Theodorus. Ergo Cicer & magnitudine, & sapore, & colore, & forma plerâsque differentias ostendit, vt Arietinum & Columbinum, candida inter omnia dulcedine præstant. Sed hæc sane exprimere voluit Plinius his verbis. Differentia Ciceris plures, magnitudine, figura, colore, sapore. Est enim arietino capiti simile, vnde ita appellatur, album nigrumque. Est & columbinum, quod alij venereum vocant, candidum, leue, arietino minus, quod religio peruigiliis adhibet. Est & Cicercula minuti Ciceris, inæqualis, angulosi, velut Pisum. Dulcissimum autem id quod Eruo simillimum est: firmiusque quod nigrum, & rufum, quam quod album. Plinius duo hîc facit Ciceris genera, Arietinum, & alterum columbinum, quod & Venereum dicitur: *ὀροβιᾶσις*, id, nempe Eruinum Theophrastus vocat, quod mox declarat, cum ait, dulcissimum autem id quod Eruo simillimum. Columella hoc Punicum appellauit, qui & duo Ciceris genera tradit. Cicer, inquit, quod Arietinum vocatur, itémque alterius generis quod Punicum, feri mense Martio toto potest. Galenus quoque duorum generum meminit, eius videlicet quod Arietinum, & eius quod *ὀροβιᾶσις*, id est Eruinum appellari ait. Quod verò Plinius de Cicercula, velut de tertia Ciceris specie inseruit, id non ex Theophrasto mutuatus est, sed de suo adiecit: Cicercula enim,

Nomina

Genera.

Lib. 2. c. 97.

Lib. 6. sim.

Li. 18. ca. 12.

Lib. 8. Hist. cap. 5.

Lib. 18. c. 12.

CICER SATIVM.



arietino capiti simile, vnde ita appellatur, album nigrumque. Est & columbinum, quod alij venereum vocant, candidum, leue, arietino minus, quod religio peruigiliis adhibet. Est & Cicercula minuti Ciceris, inæqualis, angulosi, velut Pisum. Dulcissimum autem id quod Eruo simillimum est: firmiusque quod nigrum, & rufum, quam quod album. Plinius duo hîc facit Ciceris genera, Arietinum, & alterum columbinum, quod & Venereum dicitur: *ὀροβιᾶσις*, id, nempe Eruinum Theophrastus vocat, quod mox declarat, cum ait, dulcissimum autem id quod Eruo simillimum. Columella hoc Punicum appellauit, qui & duo Ciceris genera tradit. Cicer, inquit, quod Arietinum vocatur, itémque alterius generis quod Punicum, feri mense Martio toto potest. Galenus quoque duorum generum meminit, eius videlicet quod Arietinum, & eius quod *ὀροβιᾶσις*, id est Eruinum appellari ait. Quod verò Plinius de Cicercula, velut de tertia Ciceris specie inseruit, id non ex Theophrasto mutuatus est, sed de suo adiecit: Cicercula enim,

Li. 2. ca. 10.

Lib. 6. sim.

Forma
Matt. Ibid.

Li. 18. c. 12.

Forma
Cicer. Erv.

Li. 4. ca. 10.

& re & nomine à Cicere differt, de qua suo loco dicetur. Matthiolus Ciceris genera scribit esse candidum, quod & Columbinum vocatur, & rubrum venerem appellatum, quod ad incitandam venerem mirificè valeat, postremum nigrum cæteris minus, Arietinum dictum. Ciceris satiui planta in cubitalem altitudinem adolefcit, paulo proceriorem, foliis oblongis, denticulatis, albicantibus, pilosis: caule lignoso, modicè hirsuto, in latus declinante, ramis multis brachiato: floribus subpurpureis, ex quibus siliquæ prodeunt breues, farræ, in mucronem tenuem desinentes, in quibus ad summum Ciceræ duo, vel tria, angulosa, turbinata, vnóque angulo acuto donata includuntur, ex subrubente purpura nigra: radix est lignosa & fibrata, altè descendit. Hoc est verum Cicer satiuum, quod hîc depictum datur, vel Plinio teste, cum scribit. Siliquæ rotundæ Ciceri, cæteris leguminum longæ, & ad figuram seminis latæ. Dodonæus pro Cicere satiui & vulgari depinxit verum orobum officinis Omnibus iam receptum.

Cicer Ervum id quibusdam esse videtur, quod hîc pictum ostenditur, cauliculis latis, siue compressis, foliis longis, in extremo capreolos emittentibus ad imam plantam integris, per summos caules in bina ternæ foliola angusta diuisis. Flores candicant, ex quibus tandem nascuntur siliquæ rotundæ, Pisi siliquis minores, in quibus semina rotunda, Pisis similia, sed minora, gustu amaro, cum viridia sunt. Hanc plantam Erviliæ sylvestris nomine exhibuit Dodonæus, Matthiolus, nomine Araci nigri.

CICER ERVINVM

quorumdam.



CICER ORO-

bium.



Cicer aliud Ervum siue Orobiaum Theophr, Pena exhibuit, quod tanto-
pere Narbonensi Orobo, siliqua præsertim simile est, vt certū sit illud esse, quod
dulcissi

dulcissimum, & Eruo simillimum à Plinio dicitur. Narbonæ ac Galloprouinciæ plerisque locis per messes flauescit, culmo assurgens sesquipedali, geniculato, in latus quasi in obliquum flexo, leuiter striato, fistuloso, foliis in longiusculis neruulo ordine digestis, Lentis, aut Araci. E calami variis locis hi ramuli prodeunt: iuxta summos geniculorum nodos cōplures siliquæ, vno ferè exortu sese

CICER SYLVESTRE*Matthioli.***CICER SYLVESTRE***Pena.*

contingētes emicant, cylindri figura, vnciam longæ, rectæ, teretes, paruis interuallis articulatim distinctæ in exigua tubercula, tria vel quatuor: clausa intus semina nulla membrula diuisa Pisum Arietinu ferme æquant, obtusè triangula, Orobo duplo maiora, colore albido pallentia, aut subfulua, non ingrati saporis, Ciceris, aut Pisi.

Cicer sylvestre auctore Dioscoride, foliis satiuo simile est, odore acri, sed semine discrepat. Cicer sylvestre Plinio, foliis est satiuo simile, odore graui. Matthioli Cicer sylvestre, & Herbariorū hīc pictum damus. Huic aliud dissimile nescio an verius, proferunt Pena & Lobellius ex Sabaudia & Heluetia finibus, latius sparsis, ramosis caulibus, cubitalibus & sesquicubitalibus, foliis Loto sylvestri ferme æqualibus, Ciceris Arietini, maioribus, crassioribus, rotundioribus, & modice crenatis: flores purpurascunt: siliqua Ciceris Arietini, breuis, foliosa, compressior paulo, imam eius partem vestientibus, quibusdam veluti foliolis: semina multo minora, compressa, & potius Cicerculae similia. Quare non absurde quis coniiciat, inquit Pena, istud Dioscoridis sylvestre esse Cicer. Alia duo Ciceris sylvestris genera hīc ex Dalechāpio proponimus. Primum radicibus longis huc & illuc euagatur, lignosis, multiplicibus, nodosis, subrubris. Fruticosa planta est, ramis fere pedalibus, humi propemodum iacentibus: foliis satiui Ciceris, minimè per ambitū insectis, quamplurimis vno in pediculo, rotundioribus: flore pallido, paruo, veluti in spicam coaceruato: siliquis multis, satiuo similibus, aceruatim cohærentibus: semine paruo, nigro, compresso, nec ita caluam arietis exprimente, satiui modo. Gignitur hoc Cicer in saltuoso salictō, quod Rhodanus alluit prope Lugdunum.

Cicer sylvestre alterum in aridis crescit, radice crassa, longa, ramosa, cortice nigro tecta, intus candida, scapis multis, surculosis: foliis Ciceris, ternis simul vt in Loto: flore Pisi, rubro: siliquis Ciceri similibus, hirsutis, rubris maculis punctis. Ciceris natura est,

Ibidem.
Forma Ci-
cer. sylue.
Li. 22. ca. 25.

Lib.18.c.12.

Locus.

Lib.2. c.10.

Tempus.

CICER SYLVESTRE*I. Dalechampij.*

Li.1. Alim.

Vires &

Temper.

Li.6.simpl.

CICER SYLVESTRE,*II. Dalechampij.*

Lib.2.c.97.

inquit Plin.gigni cum Salsilagine:ideo solum vrit. Nec nisi madefactum pridie feri debet. Cicer feri mense Martio toto prodest, (vel potest,) inquit Columella, cælo humido, loco quàm latissimo: nam etiam id terram lædit:atq; etiam improbat à callidioribus agricolis:quod tamē si feri debeat, pridie macerandū erit, vt celerius nascatur. Iunio & Iulio mensibus floret, deinde semen in siliquis profert.Cicer tum vt edulium,tum vt medicamentum consideramus. Eduliū est, inquit Galen. non minùs quàm Faba flatulentū, sed valentius nutrit quàm illa:ad venerem autem incitat,creditūmque etiam est semen generare: vnde quidam equis admissariis ipsum exhibent.Inest præterea Ciceribus facultas adstringendi maior quàm Fabis, adeo vt quēdā Cicera calculos in renibus concretos manifestè comminuāt. Nigra autem sunt ea, ac exigua, in Bithynia maximè prouenientia, quæ Arietina nuncupant. Satius tamen est cremorē ipsorum in aqua coctum bibere.Vtūtur homines & Ciceribus adhuc virentibus,antequā sint matura, quomodo & Fabis.Idem alibi. Cicer Legumen est flatulentū, copiosi nutrimenti,aluo mouendæ idoneū,citadē

vrinę efficac, lacti & semini generando aptum: prolicit verò & menses.Porro Arietinū cæteris efficacius vrinam impellit.Decoctum eius calculos renum confringit.Alterum Ciceris genus Orobixum, eadem vi pollet, puta attrahendi, digerendi,incidendi, abstergendi:est enim calidū & moderatè humidum, ac particeps amaritudinis:cuius vi & lienē, & iecur, & renes expurgat, pforasq; & lepras, & lichenes exterget, parotidas, & testes induratos discutit. Tum etiam vlcera quæ cacoethe vocant, cum melle sanat.Cicer sylvestre ad omnia efficacius satiuo est,hoc est tum calidius, tum siccius, quanto & acrius,& amarius.Cicer satiuū Dioscoridi aluo idoneum est,vrinam ciet,inflationē parit,colorem commendat, menses ac partus expellit, lac auget. Cum Eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium, verrucosas informicationes: ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginésque; item contra carcinomata, & vlcera quæ cacoethe vocantur, cum melle &

Hordeo prodest. Alterum genus Arietinum nominatur:vtrumque cit vrinas, dato cum Roremario hydropicis, aut regio morbo laborantibus eorum decocto. Lædunt ea vlceratam vesicam, & renes. In verrucarum formicantium pensiliūmque genere, prima Luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana linteolo deligata abiici post se præcipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre Cicer idem quod satiuum præstat. Plinius qui cum Cicere Cicerculam

lam oscitanter confundit, hæc de Ciceris facultatibus prodidit. Cicer sylvestre si largius sumatur, alius soluitur, & inflatio contrahitur & tormina. Tostum salubrius habetur. Cicercula etiânum magis in aluo proficit. Farina vtriusque vlcera manâtia capitis sanat, efficacius sylvestris. Item comitiales, & iocinorum tumores, & serpentium ictus. Ciet menses, & vrinas, grano maximè. Emendat & lichenas, & testium inflammationes, regium morbum, hydropicos. Lædunt omnia hæc genera exulceratam vesicam & renes. Gangrænis vttiliora cum melle, & his quæ cacoethe vocantur. Verrucarum in omni genere prima Luna singulis granis singulas tangunt, eaq; grana in linteolo deligata post se abiiciunt, ita fugari vitium arbitantes. Nostri præcipiunt Arietinum in aqua, cum sale, (in manuscripto hæc duo verba non leguntur,) discoquere, ex eo bibere cyathos binos in difficultatibus vrinæ. Sic & calculos pellit, morbumq; regium. Eiusdem foliis sarmentisq; decoctis, aqua quàm maximè calida morbos pedum tollit, (alij mollit,) & ipsum calidum tritumq; illitum. Columbini decocti aqua, horrorem tertianæ & quartanæ minuere creditur. Nigrum cum gallæ dimidio tritum oculorum vlceribus ex passo medetur. Ciceris farina auctore Matthiolo, ex intubi stillatitia aqua decocta, & iocinori illita, tumores illius resoluit, & serpentium moribus medetur, præsertim si cum Hyperici decocto misceatur. Columbinum aqua maceratum, contusum & illitum putrescentes gingiuas sanat. Ex Cicerum rubrorum decocto remedium præstans ad vrinæ ardores, conficitur hoc modo. Eorum sesquilibrium in libris decem aquæ die vna maceratam ad tertias decoquito. Excolato decocto addito Glycyrrhizæ vnciam, Maluæ & radice eiusdem, Althææ, Graminis, Agrimonizæ, & Cassuthæ manipulum, Myxa & Zizypha decem: præterea seminis Melopeponis delibrati vncias duas, baccarum Halicacabi, Solani hortensis, Lithospermi, singulorum drachmas quatuor, osium dactylorum contritorum drachmas tres, quæ omnia simul ferueant ad tertias. Propinato quotidie mane vncias quatuor.

ERVILIA, siue OCHRVS, CAP. XLV.



VÆ Plinio & aliis Latinis scriptoribus Ervilia, ὠχρὸς Græcis nominatur, à luteo videlicet Ochra colore, quem interior medulla fructus refert, recentioribus & Officinis Pisum minus, Italis *Rouiglione*, Tridentinis *Arabeia*, Germanis *Erueyssen* ea dicitur. Ervilia caule est inani, foliis, capreolis, siliquisque Pisi similis, singulis tamen minoribus. Flores fert plurimum candidos, aliquando tamen ex purpura obscuros, siliquas rotundas ac longas, in quibus semina rotunda, Pisis minora, colore sæpius luteo, aliquando virente. In agris & hortis prouenit: vberius loco aprico, & cæli statu calido siccoque ac scelicius prouenit: vliginosis parum proficit, & frigoribus vt Pisi facile offenditur. Seritur vère, Iulio mense ad maturitatem peruenit. Ervilia auctore Gale-
no, medium quodammodo locum obtinet inter ea quæ succum bonum & prauum generât,
flatus

Nomina

Forma

Locus.

Tempus.

Li. Alim.

Vires &

Temper.

flatus expertia, parum & multum nutrientia: nullam enim effectricem habent qualitatem, instar quorundam quæ acres, & austeros, acerbos, salso, amaro, vel dulces habent sâpores. Aliam Eruiliam sylvestrem, siue Ochrum, statuit Dodonæus in frument. Historia, quam antea Eruinum Cicer appellauimus.

LUPINVS,

CAP. XLVI.

Nomina

Li. 18, ca. 14.

Ibidem.

QU I ῥέπος Græcis, Latinis Lupinus, Mauritanis *Tarinus*, seu *Tormus* dicitur, Italis *Lupino*, Germanis *Feighonen*, Hispanis *Entramocos*, Gallis *Lupin*. Lupinorum appellatio non aliunde ducta videtur, quàm quod sicut Lupus terram appetit, & in fame terra vescitur, ita Lupinus tellurem, vt Plinius ait, adeo amat, vt quamuis frutetoso solo coniectum inter folia veprêsq; ad terram tamen radice perueniat. Lupinus etiam, velut Lupis expositus & relictus, dictus videri potest, ex eo quod, vt idem Plinius ait, impune iacet, vel derelictus, si non protinus secuti obruant imbres, ab omnibus animalibus amaritudine sua tutus. Duo sunt Lupini genera Dioscoridi, Galeno, Plinio. Est enim Lupinus satiuus, & Lupinus sylvestris. Lupinus satiuus vnico assurgit caule, rotundo, intus cauo, firmo, qui sine adminiculo rectus consistit, & parum lanuginosus est. Folia ex quinis, senis, septenîsue foliolis cohærentibus constant, vitici similia, superiore parte virentia, inferiore candicantia, hirsutaq;: quæ sub vesperam, solis occasum veluti præsentientia, flaccida facta deorsum vergunt. Flores in summis caulibus candidi sunt: siliquæ compressæ, crassæ, in ambitu crenatæ, duræ, foris leuiter hirsutæ, intus glabræ, in quibus semina quina, senaue membranis dissepta, orbiculata, compressa, qua parte siliquæ adhærent cavitatem quandam veluti vmbilicum exiguum habentia, foris alba, intus lutea, sapore amarissima. Radix eius est singularis, sublutea, lignosa, fibrata. Lupinus sylvestris satiuo similis est, inquit Dioscorides, sed omnino minor. Huius innumeræ plantæ, inquit Matthiolus, in Hetruriæ campestribus

Lib. 2, c. 103.
Ibidem.

LUPINVS SATIVS

Matthioli.



LUPINVS SYLVESTRIS

Dodonai.



Maio

Maio mense visuntur, floribus roseo colore rufescentibus. Lupinus solum arenosum & vitiosum potius desiderat, inquit Theophrastus, atque omnino in cultis prouenire non vult. In solo rubricoso, vel pullo, vel arenoso, si non sit aquosum Lupinum ferendum ex Catonis sententia tradit Plinius. Idem ter Lupinum florere scribit. Primum quidem sub finem Maij, deinde Iunio, aut initio Iulij, tertio Iulio, aut Augusto mensibus, si anni tempestas calida siccaq; fuerit. Fructus duo priores sæpe ad maturitatem perueniunt, tertius rarò non nisi in regione calida. Lupini semen *πολύχρυσον* est, inquit Galenus, id est, frequentis ac multiplicis vsus. Elixus enim, deinde in aqua dulci maceratus, tantisper dum in ea omnem sibi ingenitam exuerit insuauitatem ita demum manditur cum Garo, ac Oxygaro, vel etiã sine his, sale mediocri cõditus, non quomodo Hordeum, & alia quæ variè apparantur. Lupini dura ac terrestris est substantia: quocirca ipse concoctu difficilis est, succumque crassum gignit, ex quo non probè in venis cõfecto succus quem crudum vocant, procreatur. Cæterum cum interparandum quicquid habeat amaritudinis deponat, *τοῖς ἀπολοις*, id est, qualitatis quæ sensu deprehendatur, expertibus similis euadit. Par igitur est ipsum neque ad deiectionem, neque vt adstringentia ad fluxum ventris cohibendum esse accommodum, sed tardè descendere, & difficilè deiici, ac pertransire. Idem alibi. Lupinus edi potest coctus, multis ante diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita, sitq; tunc nutrimentum succi crassi. Cæterum vt medicamentum ita præparatus, ex genere est emplasticorum. At vbi natiua etiamdum manet amaritudo, extergendi digerendiq; vim obtinet: interficit lumbricos tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex posca potus. Quin & decoctum eius lumbricos eiicere potest: tum etiam foris idemtidem perfusum, vitilignes, achoras, pustulas, pforas, gangrænas, vlcera maligna iuuat, partim extergendo, partim citra mordacitatem digerendo, siccandoq; expurgat iecur & lienem, cum Ruta & Pipere suauitatis gratia, assumptum. Elicit menses, ac foetum cum myrrha & melle impositum. Porro Lupinorum farina sine mordicatione digerit. Nec enim liuida tantum, sed & choeradas & phymata curat: sed tunc in aceto, aut Oxymelite, aut posca coquatur oportet, idq; pro ægrorum temperamento, & affectus diuersitate, quod ex vsu est eligendo. Digerit item quæ liuida sunt: & quæcumque modo diximus præstare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt verò etiam qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt. Lupinus agrestis amarior est, & ad omnia valentior satiuo, eiusdemq; facultatis, sed valentioris. Commune quadrupedum hominumq; vsui Lupinum esse, Plinius tradit, & maceratum calida aqua homini quoque in cibo esse: impositum etiam puerorum ventribus esse pro remedio. Lupini farina, Dioscoridi, cum melle delincta, aut cum aceto pota ventris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esitati eadem efficiunt. Decoctum eorum idem præstat cum Ruta & Pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem vlcera tetra theriomata appellata, gangrænas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, vlcera in capite manantia, vitilignes, maculasque fouere vtilissimum. Menses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditum in vellere. Eorum farina cutem liuorésque corrigit: inflammationes cum polenta & aqua mitigat: tubercula & coxendicum cruciatus ex aceto lenit: strumas in aceto cocta, illitaq; dissipat: carbunculos rumpit. Decocti in cælesti aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medentur pecorum scabiei decocti cum radice nigri Chamaeleontis, ita vt repente decocto abluantur. Ciet vrinam radix cum aqua cocta, & pota. Lupini triti vbi maceratu dulcescere cœperint, cum aceto poti fastidium detrahunt, & cibi aueritatē faciunt. Sylvestris Lupinus eadem quæ satiuus præstat

Locus.

Lib.8.Hist.
cap.11.

Lib.18.c.17.

Ibid.ca.14.

Tempus.

Li.1. Alim.

Vires &

Temper.

Li.6.simpl.

Li.18.ca.14.

Li.2.c.103.

præstat. Galenus dixit Lupinum syluestrem esse μικρότερον, id est amariorem. Dioscorides omnino μικρότερον, id est minorem. Plinius hanc rem declarat his verbis. Lupini syluestres omni modo minores satiuis, præterquàm amaritudine. Idem medicamenta ex Dioscoride multa recitat, & præcipuè ad expellendos lumbricos. Succus decoctorum, inquit, cum Ruta & Pipere, vel in febre datur ad ventris animalia pellenda, minoribus triginta annorum: pueris verò impositi in ventrem ieiunis profunt. Si verò caelesti aqua decoquantur, succus ille smegma fit, quo fouere gangrænas, eruptiones pituitæ, vlcera manantia vtilissimum: smegma hic dixit quod Dioscorides ἐπ' ἀντ' ἡμῶν. Sequuntur reliqua à Dioscoride tradita, & quædam alia. Sed quod Dioscorides de ouium scabie sananda tradit, ipse aliter refert: nempe sic. Medetur pecori, cum Chamaeleonte herba decocti, aqua in potum collata. Sanant & scabiem quadrupedum omnium in Amurca decocti, vel vtroque liquore, postea misto. Fumus crematorum culices necat. Horatius virum bonum & sapientem opponens stulto, ostendit stultum & prodigum dare indignis, virum bonum probatos nummos reseruare dignis hominibus, & sui similibus: versus hic est:

Nec tamen ignorat quid distent æra Lupinis.

Id est, non nescit quid intersit inter bonos & malos nummos: quod natum est à consuetudine Comicorum, qui in scena Lupinis, seu nummis ex Lupino factis utebatur pro veris & aureis, seu æreis. Idcirco Plautus Lupinos aurum Comicum appellat. Quinetiam hodie pueri in Italia ex Lupinis nummos imitari solent.

ERUUM, CAP. XLVII.

Nomina
Genera.



POBOΣ Græcis, Eruum Latinis nominatur, Arabibus *Erbum*, *Keisene*, siue *kersene*, Italis *Eruo*, Germanis *Eruen*, Hispanis *Ieruos*, Gallis *Ers*. Duo Erui genera reperiuntur, satium & syluestre. Satium duum est generum, candidum & rufum auctore Matthiolo. Gale-

OROBVS.

In cap. 102.
li. 2. Diosc.
li. 1. Al m.
Ibidem.

Forma.

Lib. 8. Hist.
cap. 3.

Ibidem.



nus tertium addidit, nempe pallidum, inter priora medium. Aliud quoque vidisse sese ait Matthiolus Erui genus, quod Creticum vocant, nostrati fere simile, sed minutiore semine, & siliquis gracilioribus. Eruum satiuum planta est foliosa, cauliculis ac ramis multis, in latus expansis, vt ait Theophrastus, sese implicantibus: foliis paruis, longiusculis, lente minoribus, plurimis ex vno pediculo, vtrimq; pari exortu per interualla prodeuntibus, vnico in cacumine permanente. Flores edit paruos subpurpurascens, aliquando candicantes: siliquam Piso ferè similem, sed breuiorem, & graciliorem, pressis constrictisue inter semina rotunda spatii. Hoc est Dioscoridis Eruum, paruus frutex, vt inquit, angusto folio, tenuis, semina in valuulis habens. Non ita pridem, inquit Matthiolus, legitimum Eruum in Italia feri cœptum est, hîc depictum, ex secunda eiusdem in Dioscoridem commentariorum editione: priore etenim Lathyrum satium nomine Erui depinxit

OROBVS Creticus.



depinxerat. Dodonæus Eruum nomine Ciceris fatiui descripsit, vt diximus. Fuchsius Cicerulam nomine Erui. Brasauolus credidit Eruiam quæ Theophrasto, Galeno, Paulo Ochros dicitur, verum esse Eruum nominis affinitate deceptus. Eruum sylvestre Dodonæo, Lobellio, & Herbariis dicitur ea planta, quæ à nobis descripta est libro de Maritimis nomine Catanauces. Eruum auctore Columella lætatur loco macro nec humido, quia luxuria plerumque corrumpitur. Potest & autumno feri, nec minùs post brumam Ianuarij parte nouissima, vel toto Februario, dum ante Calendas Martias, quem mensem vniuersum negant agricolæ huic Legumini conuenire, quod eo tempore satum, pecori sit noxium, & præcipuè bubus, quos pabulo fixo crebrosos reddat. Eruum feritur in agris. Quod sponte nascitur, inter segetes frequēs oritur: verùm cum à paucis cognoscatur, illud inter Viciæ species numerant. Eruum Plinius cum Vicia cōiunxit: mox enim cum de Vicia egisset, subiunxit. Nec Erui operosa cura est: hoc amplius quàm Vicia runcatur, & ipsum medicaminis vim obtinens: quippe per Eruum D. Augustum curatum, in epistolis ipsius memoria extat. Boues apud nos, inquit Galenus, tum apud alias pleràsque gentes Eruo priùs in aqua dulcorata pascuntur: homines verò ab hoc semine prorsus abstinere: est enim insuauissimum & prauis succi. In magna tamen fame quemadmodum Hippocrates quoque scripsit, necessitate coacti ad ipsum nonnunquam accedunt. Nos verò ad eundem modum quo Lupinos præparantes, Eruo cum melle vtimur, ceu medicamēto crassos thoracis ac pulmonis humores expurgante. Porro inter Erui genera album minùs est medicamentosum eo quod ad flauitiem aut pallorem recedit. Si verò coctum bis fuerit, & in aqua idem talem edulcatum, insuauitatem quidem deponunt, sed vna etiam cum ea abstergendi & incidendi facultatem, vt sola in eo relinquatur terrestris substantia, quæ in alimentum vertitur citra insignem amarorem desiccandi facultate præditum. Idem alibi Eruum desiccatur quidem excessu secundo intenso, calfacit verò primo. Porro quatenus amaritudinis est particeps, eatenus incidit, extergit, atque obstructions expedit. Cæterum si sumatur copiosè, sanguinem per vrinas euocat. Eruum teste Dioscoride, capiti onerosum est: aluum esu turbat, sanguinem per vrinas extrahit: elixo boues saginantur. Paranda farina ratio hæc est. Vberiora grana candidaq; deliguntur, ac permiscendo resperguntur aqua, donec quod satis est combibant: postea torrentur, vsque dum hians cortex disrumpatur, molitaq; farinario cribro incernuntur: postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est, vrinam ciet, meliorem colorem efficit: sanguinem per vesicam, aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera cum melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie, & maculas totumq; corpus emendat: nomas, gangrænas, duritiàsque serpere non patitur: mammarum duritias emollit: tetra vlcera quæ theriomata vocant, fauòsque emarginat: carbunculos rumpit: cum vino subacta illitu moribus viperarum, canum, hominùmque medetur: vrinæ difficultates, tenesimòsque ex

Lib. 4. c. 22.
In Hist. pl.
cap. 215.

Lib. 2. ca. 11.
Locus.

Lib. 18. c. 15.

Li. 1. Alim.
Vfus.

Li. 8. simpl.
Vires &
Temper.

Li. 2. c. 102.

Li. 22. c. 25.

aceto mitigat. Eruum tabidis qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum sumptumque conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore sanat fouendo. Hic animaduertendum ad Erui nam farinam conficiendam candidius Erui semen à Dioscoride eligi: à Galeno verò id minùs medicamentosum haberi. De Eruo quidem in mentione eius diximus, inquit Plinius, nec potentiam ei minorem veteres quàm Brassicæ tribuere, contra serpentium ictus, ex aceto, & ad crocodilorum hominùmque morsum. Si quis Eruum quotidie ieiunus edat, lienem eius absumi certissimi auctores affirmant. Farina eius varos, & maculas cutis toto corpore emendat, (sic enim legendum, non vt vulgata habent exemplaria, farina eius, vt ait Varro, maculas toto, & cætera.) Serpere vlcera non patitur: in mammis efficacissimum. Carbunculos rumpit ex vino: vrinæ difficultates, inflationem, vitia iocinoris, tenesmus, & quæ cibum non sentiunt, atrophæ appellata, tostum, & in nucis auellanæ magnitudinem melle collectum deuoratumque corrigit: item impetigines ex aceto coctum, & quarto die solutum. Panos in melle suppurare prohibet impositum. Aqua decocti perniones & pruritus sanat fouendo. Quin & vniuerso corporis, si quis quotidie ieiunus bibat, meliorem fieri colorem existimant. Cibus idem hominis alienum. Vomitiones mouet, aluum turbat, capiti & stomacho onerosum. Genua quoque degrauat. Sed madefactum pluribus diebus mitescit, bubus iumentisq; vtilissimum. Siliquæ eius virides priusquam indurescant, cū suo caule foliisq; cōtritæ, capillos nigro colore inficiunt.

LATHYRVS, CAP. XLVIII.

Nomina
Genera.
Forma.



VOB Legumen Græci λάρυρον appellant, à Latinis vt Columella & Palladio Cicercula dicitur: à Gallis *des Gesses*. Eius duo sunt genera: nempe Lathyrus satiuus, & sylvestris. Lathyrus satiuus caules habet angulosos, compressos: folia oblonga, angusta, acuminata, bina

LATHYRVS SATIVS

Angustifolius.

LATHYRVS SATIVS


Latifolius: Clymenum Matth.

semper


semper eidem apta pediculo, inter quæ medius prominet capreolus, quo adnucula & cauliculos propinquos apprehendit: flores candidi, Pisi floribus similes: siliquæ non Cylindri figura, sed latæ & compressæ, quibus semen includitur

LATHYRVS Sylvestris Dodon.

Eruum satium Fuchsj.



CICERA.



album, latum, compressum, ac inæqualiter angulosum, sapore ferè Pisi: radix tenuis est, ac fibrata: Hunc Erui nomine depinxerat Matthiolus priore commentariorum in Dioscoridæ editione, vt diximus, id est, in hoc genere quod latioribus est foliis Matthiolus Clymenum esse vult. Cordus satium Eruum: Tragus, Pisum Græcorum. Lathyrus sylvestris superiori caulibus, foliis, siliquis proximus est, sed flores rubescunt: semen tamen vt in supradicto compressum, inæquales angulos habet, verum minus est, durius, & colore in atrum degenerante. Hunc Lathyrû Fuchsius nomine Erui satiui depinxit. Cicercula vt scribit Columella, feri debet lato solo, cæloque humido. Lathyrus, inquit Galenus, substantia quidem Eruiiis & Phaselis est adsimilis. Vtuntur eo plurimum in nostra Asia rustici, & potissimum in Mysia, & Phrygia, non solum quemadmodum Phaselis & Eruiiis in Alexandria, & plerisque aliis vrribus, sed etiam vt phacoptissanum ipsum parantes. Succum porro habet facultatibus quidem Eruiiis & Phaselis consimilem, sed consistentia crassiorem: ac ideo magis quam illa nutrit. Lathyro similis est Cicera caule & foliis. Flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinâtes, siliquas paulo minores, atque in his grana angulosa quæque & Lathyro similia, sed minora durioraque & minus compressa, colore nigro proxima. Rarum est hoc Legumen, nec nisi à rei herbariæ studiosis feritur. Latini Ciceram vocant, quod Cicercula similis sit, atque solo potissimum colore ab eo dissideat. Cicera, inquit Columella, sapore nihil à Cicercula differt, colore tantum discernitur: nam est obsoletior & nigro proprior. Palladius in Martio. Nunc Cicera feritur. Ea distat à Cicercula solo colore, qui sordet, & nigrior est. Vfus autem Ciceræ & facultas, inquit Galenus, Lathyri facultati est similis, nisi quod Ciceræ semina sunt duriora, minusque facilè elixantur: quæ causa est cur Cicerculis sint concoctu difficiliora.

Lib. 4. c. 21.

*Forma
Sylvest.*

Cap. 215.
Lib. 2. c. 10.

Locus.
Lib. 1. Alim.

Vfus.

Nomina



ANC Leguminis speciem Græci pariter ac Latini Phasiolos vocant, Itali *Fagiuoli*, Galli *Phasiols*. Galeno vox Phasiolus quatuor syllabis prolata, diuersa est à Phaselo tribus syllabis pronuntiato, de quo cum Eruiilis simul tractauit. De Phasiolo ex ipsius sententia isto capite nos agemus. Phasioli genera tria hîc exhibemus, Phasiolum satium

Genera

sive candidum, Phasiolum sylvestrem, & Phasiolum sylvarum. Phasiolus satiuus,

Forma

sive albus, & vulgaris, foliis est Hederaceis, maioribus tamen, & mollioribus, ve-

PHASIOLVS ALBVS.



PHASIOLVS Sylvestris.



PHASIOLVS Sylvarum.

Forma
Sylvest.

nos, ternis ex vno pediculo prodeuntibus: flores edit cãdidos, Píso minores, è quibus tãdem palmum longa cornicula exoriuntur, rotunda, in acutũ desinentia, primũ quidem viridia, deinde per maturitatẽ candicãtia, quibus semina, quos Phasiolos appellamus, continentur, figura renibus quadrupedũ similia, alba, dẽpto vmbilicò, qui tatũ in his nigricat. Phasiolus agrestis est, quem hîc appinximus, cauliculis latis, inanibus: foliis superiori similibus, nõ ita tamen ad Hederaceorũ formã accedentibus, quorũ pediculi in capreolos exeũt: florib' purpureis: siliq's cõpressis, semine intus rotũdo, nigro, vulgaris Písi magnitudine, saporis ingratißimi. Phasioli tertiuũ hoc genus in Syluis, môtosis saltibus, & desertis nasci cõperit Dalech. radice nigra, lõga, crassa, in radicula innumeras densasq;

denſaſq; fiſſa. Caules hæc planta multos profert, pede altiores, folia Phaſioli, aut Smilacis hortenſis, in ſingulis pediculis ferè ſena: florem Piſi, ex puniceo purpureſcentem: ſemen Lentis, paruulum, nigrum, in ſiliquis rufis. Phaſioli albi, ſeu vulgares, in aruiſ ſeruntur, & ſine adminiculis conſiſtunt quidem, ſed in latum ſeſe diffundunt. Phaſioli auctore Dioſcoride, inflant, flatuſ mouent, agrè coquantur. Virideſ cocti ſi edantur, aluum emolliunt, ad vomitioneſ idonei. Pauluſ in medicamentum nephriticum ex cicadiſ nominatum, Phaſioluſ album recipit. Excalfaciunt Phaſioli, inquit Matthioluſ, & humectant ordine primo. In cibum ſumpti non ſolùm inflant, ſed & ventriculuſ grauunt. Præterea ſemen generant, & venerem excitant, præſertim ſi Pipere longo, Galanga, & ſaccharo aſpergantur. Sed id efficaciuſ præſtant, ſi lacte bubulo pingui decoquantur, quoad diſſiliant. Redduntur in cibis innocentiores, ſi cum ſinapi, vel Cari ſemine edantur. Tumultuoſa ac terribilia ſomnia inducunt, vt Lentēſ. Cornicula cum tenerriſ ſunt elixantur, & in acetariis eduntur, addito Pipere, guſtu non ingrato. Eadem elixa, farina oblita, ac in oleo feruente, aut butyro frixa, Pipere, ſuccoque vix acerba condita, ab Italiſ expetuntur in cibum. Peculiari naturæ vi ſanant equorum morſuſ, ſi crudi dentibuſ atterantur, imponanturque vulneri. Ex iſſdem muliebris fucuſ paratur hoc modo. Phaſioloruſ alboruſ, mica panis Triticeï albiſſimi ſinguloruſ libram, cucurbitam vnam longam, teneram, virentēque ac diſſectam nocte vna in lacte caprino macerant. Hiſ addunt ſeminuſ Melopeponuſ vncias quinque, nucleoruſ perſicoruſ mundatoruſ vncias treſ, nucleoruſ pineoruſ delibratoruſ ſelibram. Conterunt ſeorſum omnia in lapideo mortario, adiiciuntque pulluſ columbinuſ domeſticuſ vna cum plumiſ in particulaſ diſſectuſ, abiectiſ tantuſ inteſtiniſ: omniaque ſimul mixta in vitreuſ vaſ ad id paratuſ coniiiciunt, ex quo in vaſe alio feruente aqua pleno collocato aquaſ eliciunt, diligentēque cuſtodiunt. Ea enim nitoreſ faciei conciliat, & cuti molliſſimuſ addit læuoreſ.

Locus.

Lib. 2. c. 101.

Vires &

Temper.

Lib. 7. ca. 11.

In cap. 101.

li. 2. Dioſc.

SMILAX HORTENSIS, ſeu DOLICHVS,

CAP. L.

PLANTA quæ *σμίλαξ κηπάδα* à Dioſcoride dicitur, quòd Smilacis modo conſcendat, in propinqua, & vicina adminiculaprehendat, ab Hippocrate, Diocle, Theophraſto, & pleriſque aliis *δολιχός* vocatur, à nonnulliſ propter ſiliquaruſ magnitudinem *λόφος*, & *λόβιον*, id eſt ſiliqua, ab aliis *Φασιόλος*, Phaſioluſ, quem à Phaſelo triſyllabo differre diximuſ, Arabibuſ *Lubia*, Italiſ *Smilace de gli horti*, & *Faginolo Turcheſco*, Germaniſ *Vvelchbaonen*, quaſi dicant Fabas Italicāſ, Hiſpaniſ *Feyones*, Galliſ *Phaſiols*, & *Feues peintes*. Huiuſ genera ſeminuſ coloribuſ diſtinguntur. Alia enim lutea ſunt, alia rubent, alia varij ſunt coloribuſ picta. Smilax hortenſiſ, folia habet Hederæ, molliora tamen: tenueſ cauleſ cum capreoloſ viciniſ fruticibuſ ſe circumuolueſteſ, qui eouſque adoleſcunt, vt topiariāſ ſcenaſ contexant: ſiliqueſ *Fœnograeco* ſimileſ, longiores, toroſiores, quibuſ abduntur ſemina, renuſ figura, ſed in æquali colore, quadam ex parte fulueſcentia. Hiſ notiſ omniſ ita Phaſioloruſ genuſ hîc depictuſ expreſſit Dioſcorideſ, vt nulla proruſ repugnet: cauleſ enim ei ſunt tenueſ, longi, ramoſi, capreoliſ ſuiſ pedamentis viciniſ non modo ſeſe circumuolueſteſ, ſed etiam pergulaſ & attegiaſ in hortiſ opacanteſ: folia Hederacea, fructuſ renuſ figura, in ſiliquiſ longiſ, modo rubenteſ, modo verſicoloreſ. Id genuſ Phaſioloſ dolichoſ eſſe Galenuſ perſpicuè declarat, atque etiam Theophraſti auctoriſtate confirmat hiſ verbis. Dolichoruſ nomen

Nomina

Genera

Forma.

Li. 2. c. 140.

Li. 1. Alim.

*SMILAX Hortensis,
sive Dolichus.*



Lib. 8. Hist.
cap. 3.

Lib. 1.

Lib. 1. c. 79.

*Vires &
Temper.*
Lib. dedi-
ta.
Li. 1. Alim.

à Diocle quidem scriptum est, vna cum aliorum quoque seminum nos alentium nominibus. Scriptum etiam est in libro Hippocratis de ratione victus. Existimo autem ipsos sic appellare semen plantæ hortensis, quam nunc vulgo bifariam nominant: quidam λέγεις, id est siliquas, alij φασιόλεις. Hos Dolichos esse hortenses coniecere quis possit, vel ex his quæ Theophrastus scripsit his verbis: Καὶ τὰ μὲν ἔστιν ὀρθόκτυλα, καθάπερ πυρὸς, καὶ κριθῆ, καὶ ὅλως τὰ σιτώδη, καὶ θερινὰ: τὰ δὲ πλεονόκτυλα πᾶλλον, οἷον ἐρέβινθος, ὀροβος, φακὸς. τὰ δὲ ἐπιγυθόκτυλα, καθάπερ ὠχρὸς, πισὸς, λάθυρος. ὁ δὲ δολιχὸς εἰάν ποαραματαπήξῃ τις ξυλὰ μακρὰ, ἀναβαίνει, ἔγινεται χάρις. εἰ δὲ μὴ, φαῦλος ἔρυσσιβώδης. Id est, Aliis quidem caulis est rectus, vt Tritico, Hordeo, & omnibus frumentaceis, atque æstiuis: aliis verò in latus potius inclinatur, vt Ciceri, Eruo, Lenti: aliis humi procubens, vt Eruiliæ, Piso, Cicerculæ. Dolichus verò si ligna longa affixeris, in ea conscendet, & fructum feret: alioqui rubiginis vitio corrumpitur. Ex eo certe, inquit Galenus, quod ligna

longa Theophrastus iubet affigi, affirmatque nisi id fiat Dolichos rubigine vitari, potest quivis coniecere ipsum verba facere de iis quos nunc Phasiolos, seu λέγεις, id est siliquas appellamus. Smilacem hortensem Dolichos esse & Phasioli genus Aetius aperte docet. Qui nunc, inquit, ab omnibus Lobi nominantur, apud omnes veteres Dolichi & Phasioli appellabantur, à nonnullis Smilax hortensis. Nutriunt quidem non minùs quàm Pifa, similiterque flatus expertes sunt: verum iucunditate & alui deiectione illis cedunt. Appellantur autem Lobi, id est, Siliquæ præcipue, quoniam ex omni genere Leguminum quorum semen tegitur siliqua hoc solum vna cum siliquarum operimento vt plurimùm estur. Hæc Aetius. At Phasioli, qui etiam Dolichi appellantur, inquit Paulus, integri cum siliquis viridibus comesti, excrementorum plus gignunt. Sed cur Dioscorides de Phasiolo primùm tractavit, deinde aliquanto post de Smilace hortensi seorsum, si Smilax hortensis etiam Phasiolus est? Quia Phasioli diuersa sunt genera, candidum, & vulgare quod in aruis nascitur: aliud sub fuluum, & variis coloribus pictum, quod in hortis colitur, de quo posteriore loco sermonem fecit. De Dolichis hæc scripsit Hippocrates. Pifa minus quidem inflant, sed magis per aluum secedunt. Eruiliæ autem & Dolichi iis quidem secedunt celerius, verùm minus sunt flatulenti, & nutriunt copiosius. Diocles in Leguminum catalogo vt

Fabas primas recensuit, inquit Galenus, mox Pifa, deinceps ad verbum sic scribit. Dolichi verò non minùs quàm Pifa nutriunt: præterea flatu similiter carent: quod verò ad suauitatem pertinet ac deiectionem, vincuntur.

Siliqua cocta, inquit Dioscorides, cum semine, inter olera Asparagi modo estur: vrinam ciet, & tumultuosa somnia facit.

LENS, CAP. LI.

LAKOΞ & φακή Græcis legumen dicitur, Latinis Lens, & Lenticula, *Nomina*
 Arabibus Hades, Italis Lenticchia, Germanis Linsen, Hispanis Lenteias,
 Gallis Lentille. Inuenio apud auctores, inquit Plinius, æquanimitem *Li. 18. ca. 12.*
 fieri vescentibus ea quod ex Etymi videtur esse videtur, vt Lens quasi lenis
 dicta sit, lenitatisque significationem habeat. Genera lentis sunt duo. Album *Genera.*
 minus, & in cibis gratius: alterum cinereum, paulo maius. Plinius etiam duo *Marth. in c.*
 Lentis genera in Ægypto esse dicit, alterum rotundius, nigriusque, alterum sua *100. libr. 2.*
 figura, vnde vario vsu translatum esse in lenticulas nomen. Lens tenuibus exit *Li. 18. ca. 12.*
 cauliculis, cubitalibus: foliis ab vtraque pediculi parte multis & angustis, Vi- *Forma*

LENS MAIOR.



LENS MINOR.



ciæ similibus, sed angustioribus, & minoribus: flores item Viciæ haud dissimi-
 les, minores, cinereo generi purpurascens, albo, candidi: siliquæ parua com-
 pressæ, molliter in latitudinem planæ, quibus semina terna quaternæue cōdun-
 tur, parua, rotunda, lata, compressa, amictæque læui cuticula. Est & Lens minor,
 in qua flos siliqua, seminis figura, omniæque similia priori, sed minora. A rei
 herbariæ studiosis seritur in hortis. Lens amat solum tenue, inquit Plinius, ma-
 gis quàm pingue: cælum vtique siccum. Lentis, ait Galenus, contrariæ sunt fa-
 cultates. Cortex eius adstringit, corpus siue ipsius veluti caro, desiccatur, & sistit
 ventrem, austera sua qualitate, cuius cortex multæ est particeps. Decoctum
 siue cremor ipsius adstringenti facultatem contrariam obtinet: aliu enim pro-
 uocat: quare prior aqua abiicitur cum ea sistenda est. Hac de re Galeni verba sunt
 accuratius expendenda, vt an Dioscoridi repugnet, perspiciatur. Lentis in-
 quit Galenus, valenter astringunt (Ætius tamen & Paulus, qui ex Galeno trans-
 scripsere, legisse videntur, *εὐπερίως ἀνὰ ἰσχυρῶς*, id est, non valenter astringunt)
 medium tenent caliditatis & frigiditatis, desiccant tamen in secundo ordine.
 Ipsum itaque eorum corpus desiccatur, & sistit ventrem, ceterum decoctum mo-
 uet: proinde etiam prior aqua abiicitur, vbi retinendæ alui causa adhibetur. *Li. 1. Alim.*

Locus.
Lib. 18. c. 12.
Vires &
tempera.

Lib. 8. sim.

Idem rursus: Nemo ex Lentibus panem facit: aridæ enim sunt, ac friabiles, corticemque habent adstringentem, & quæ ipsorum est veluti caro crassi est succi ac terrei, austeram qualitatem habens exiguam, cuius cortex multæ est participes. Succus porro in ipsis est adstringenti contrarius. Quocirca si quis in aqua Lentas coxerit, deinde aquam sale, aut garo, aut cum ipsis oleo conditam sumperit, potus is aluum deiicit. At ex his coctis Lentibus, ad eum modum quem diximus paratus cibus facultatem habet succo contrariam, ut quæ ventris fluxus siccat, stomachum, intestina, & totum denique ventrem corroboret. Quamobrem celiacis & dysentericis cibus est accommodus. Lens vero decorticata, ut illam adstringendi vehementiam, & ea quæ ipsam consequuntur, amittit, ita magis nutrit, quam quæ cortice spoliata non est: verum succum crassum ac prauum gignit, tardèque comeat, non tamen alui fluxus desiccat, uti ea cui cortex non est ademptus. Lentas Æginetæ, secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamento, sed adstrictionis quoque non nihil habent. Totum verò Lentis corpus siccat, aluumque sistit, quam decoctum ipsius prurit, ideoque prior aqua abiicitur, cum ventris sistendi gratia Lentas assuntur. Lentas Aetio teste, non valide adstringunt, in caliditatis autem & frigiditatis medio consistunt. Siccant ordine secundo. Itaque corpus ipsarum siccat, ac sistit ventrem: decoctum autem promouet. Quapropter ubi sistendi ventris gratia sumuntur, prima aqua effunditur. Consideremus nunc num his aliqua ex parte Dioscorides, refragetur. Lens, inquit, frequenti cibo aciem oculorum obtundit, ægrè concoquitur, stomachum vexat, eumque & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. (Galenus quidem ait corticem eius adstringere, ut pote multæ austere qualitatis participem) præstat in cibo, quæ facillimè coquitur, & nihil atri in maceratione reddit. Vim habet adstringendi: (sic Galenus, Lentas valenter adstringunt:) quapropter aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primæque aqua inter coquendum effundatur. Id enim primum decoctum aluum ducit. In hoc quidem nihil Dioscorides à Galeno dissentit, quoniam Lens decorticata Galeno, illam adstringendi vehementiam, eam quæ ipsam consequuntur, amittit. Nam quod Dioscorides dixit Κοιλίαν ἱγῆσι προ ἀπολεπιδεῖς, καὶ ἐψῆθεῖς ἐπιμέλως, idem est quod Galenus habet, δὴς ὃ ἐψῆθέντων τῶν φακῶν, & cætera. Id est, ex his coctis lentibus facultatem cibus habet succo contrariam, ut qui ventris fluxus siccat. Hoc tantum interest, quod Galenus corticem non detrahit, Dioscorides detrahit, qui paulo antedixerat Lentem cum cortice coctam aluum sistere. Galeni verò sententiæ consentaneum esse, Lentem etiam detracto cortice bis coctam, siue, ut ait Dioscorides, diligenter & accuratè discoctam, ventrem cohibere, ex ipsomet Galeno licet intelligere, cum scribit. Non Lens sola, sed & Brassica, atque adeo omnia ostracoderma, compositam ex pugnantibus facultatibus naturam sortita sunt: Nam solidum cuiusque corpus tardè permeat, aliuumque sistit: humor verò stimulat ad excretionem. Huius porro rei ex coctione manifesta sumitur demonstratio. Nam aqua in qua dictorum quodque fuerit decoctum, aluum subducit, ipsa verò corpora retinent. Hinc nonnullos audias dicentes. Si Brassica leuiter cocta, & vniuersim ac repente ex lebe in vas aliquod, in quo sit oleum & garum, transfusa ante alios cibos sumatur, aluum subducere: alios autem sentias Brassicam quæ δίσσепθος, id est biscocta dicitur, ad ventrem moradum, hoc modo præparare, cum ipsam aquæ prius incoxerint, aquam quidem totam è lebe effundunt, aliam autem affundunt puram & calidam, in qua rursus Brassicam secundo coquant. Idem de Lente biscocta censendum. Pergit Galenus Lenticulæ in cibus facultates explicare. Iure igitur qui largius hoc edulio vtuntur

elephan

elephātiāsi & cancris sunt obnoxij. Si quidem crassa siccaque cibaria succo melancholico generando sunt idonea. Quare iis duntaxat quibus aquea in carnibus est *καχεξία*, Lenticula in cibo vtiliter præbetur, ceu aridis & squallentibus admodum damnosè. Eandem ob causam visum integrum & inculpatum hebetat, ipsum immoderatè exsiccans ei verò qui contrario modo se habet confert. Menstruis autem purgationibus non est accommoda: crassum enim & tardius fluentem sanguinem reddit: at muliebri profluuiò est vtilissima. Cum autem Ptissana in eo saltem contrariam ipsi habeat facultatem, ex amborum mitione præstantissimum componitur eduliũ, quod Phacoptissanam appellant: vtrumque haud æquali portione miscentes, sed Ptissanæ minus iniicientes, vt quæ in cremorem vertatur, & in magnam molem attollatur: Lens autem cocta parum quidem extumescit. Hoc autem edulium eodem quo Ptissana modo præparatur, præterquam quod satureia, aut pulegium adiicitur: quo fit vt suavius simul & concoctu facilius reddatur, cum Ptissana illis minimè gaudeat, sed solo anetho porróque sit contenta. Pessimè autem cocci diuitibus lentè parant cum sapa, quandoquidem Lens haud quaquam eorumquæ incrassant mitionem postulat, sed humidorum potius, & quæ suam ipsius crassitiem incidant. Cum verò sapa commiscetur, hepatis obstructions solet gignere, viscerisquæ huius ac lienis inflammationes auget, nisi melle addito melior fiat. Hæc & alia plura Galenus tradit. Dioscorides alias etiam facultates Lentis exponit. Somnia tumultuosa, inquit, excitat: capiti, nervis, pulmone inutiles: valentior eius facultas contra alui fluxiones, addito cum aceto Intybo, aut Portulaca, aut Beta nigra, aut baccis Myrti, aut putamine Punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbifue, Piri Thebanis (Cornarius vocem vnam hîc excidisse putat, ἢ ῥών, ἢ ἀπρίων, ἢ ποινικῶν θηβαϊκῶν, id est, aut sorbis, aut piri, aut palmulis thebaicis, cum nulla sint pira Thebaica ab auctoribus memorata, sed palmulæ Thebaicæ ab aliis, & ab ipso Dioscoride nominatæ, quarum decoctum magnopere adstringit, & re-
 Lib. I. c. 125.

primit,) aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut Punici granis integris, quæ post decoctionem abiiciuntur, vel Rhoe quæ obsoniis aspergitur. Verum acetum cum ea diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi triginta grana Lētis adempto cortice deuorari proderit. Decocta cum polenta & illita podagras lenit: sinus cum melle glutinat: crustas rumpit: vlcera purgat. Decocta in aceto duritias & strumas discutit: cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisquæ, addito rosaceo: sed in amplosinu, aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici & siccis rosis, adiecto melle decoquitur: nomis quæ in gangrænā euaserunt, adiuncta maris aqua: pustulis, & iis quæ serpunt, igni sacro, pernionibusquæ, vt ante dictum est: (cum aceto) contra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur. Lens optima Plinio, quæ facillimè coquitur, eaque, quæ maximè aquam absorbet. Aciem quidē oculorum obtundit, & stomachum inflat: sed aluum sistit in cibo, magisquæ discocta cælesti aqua: eadem soluit minùs percocta. Crustulas vlcerum rumpit, eaque quæ intra os sunt purgat, & adstringit. Collectiones omnes imposita sedat, maximèquæ exulceratas, & rimosas. Oculorum autem epiphoras cum meliloto aut cotoneo, contra suppurantia cum polenta imponitur. Decoctæ succus ad oris exulcerationes, & genitaliũ adhibetur: ad sedem cum Rosaceo & cotoneo. In his quæ acrius remedium exigunt cum putamine Punici, melle modico adiecto. Ad id demũ ne celeriter inarescat, adiiciunt & Betæ folia. Imponitur & strumis, panisque vel maturis vel maturefcentibus, ex aceto discocta. Rimis ex aqua mulla, & gangrēnis cū Punici
 Li. 22. c. 25.

tegmine.

regmine. Item podagris cum polenta, & vuluis, & renibus, pernionibus, vlceribus difficile cicatricem contrahentibus. Propter dissolutionem stomachi triginta grana lentis deuorantur. In choleris quoque & dysenteria efficacior est in tribus aquis cocta: in quo vsu melius semper eam torrere, aut tundere, vt quàm tenuissima detur, vel per se, vel cum cotoneo malo, aut piris, aut myrto, aut intubo erratico, aut beta nigra, aut plantagine. Pulmoni est inutilis, & capitis dolori, neruosisque omnibus, & felli: nec somno facilis: ad pustulas utilis, ignique sacro, & mammis in aqua marina decocta, in aceto autem duritias & strumas discutit. Stomachi quidem causa, polentæ modo potionibus inspergitur. Quæ sunt ambusta aqua semicocta curat, postea trita, & per cribrum effuso furfure, mox procedente curatione addito melle. Ex posca coquitur ad guttura. Est Lens etiam hodie notum legumen, & editur parata ex ipsa pulticula, quæ Græcis φακή dicitur, & Lens integra cocta, quam ὀλίσφακον dicunt. Nouerat & Martialis Ægyptiam Lentem, scribit enim.

*Accipe Niliacam pelusia munera Lentem,
Viliore est Alica, carior illa Faba.*

VICIA, APHACA, CAP. LII.

Li. 1. Alum.

Nomina

Genera.


Forma



B Asianis suis Galenus ait βίκιον, dici legumen, eoque solo nomine id vocari: Atticis verò σάφακον, aut κύαμον. Latinis Vicia id nominatur à vinciendo, vt Varroni placet, quod item capreolos habet vt Vitis, quibus sursum versum serpit ad scapum lupini, aliūmue calamum, ad quem, vt hæreat, eum vincire solet, Gallis *Vesce*, Germanis *Vueicken*, Anglis *Fiche*. Est vicia quæ sponte nascitur, est & quæ cæterorum leguminum modo in aruis seritur. Hæc caules habet tenues, quadrangulares, ternūm fere

*VICIA VERA,
Aphaca Matth.*

*APHACA VERA,
Vicia Matthiolo.*



pedum

pedum altitudine : folia longa, Lenti similia , ex pluribus vni pediculo adnexis composita : quorum singula maiora , latiora , crassioraque sunt quam Lentis : flores subrubri , siue in purpura nigricantes : siliquæ latæ , quarum singulis grana includuntur quina senaue , non globosa , sed Lentis instar propemodū compressa , nigra , gustu insuauia. Seritur quocumque solo , culta facillimo , & solum in quo satum fuerit lætificans. Hic veram Viciam expressimus , Matthiolus nomine aphaces depinxit , quam Galenus cum Vicia coniunxit. Dioscorid. Aphacam , quæ ἀράχη Græcis nominatur in aruis nasci dixit , altiore Lente , tenuibus foliis , siliquis Lente maioribus , in quibus terna quaternaque semina nigra , Lente minora. Theophrastus Aphaces oleris meminit inter intubacea de quo postea nos agemus , & Aphaces leguminis , eam cum Lente & Piso in leguminum genere ponens , quorum sera satio. Idem alio loco scribit quorundam leguminum siliquas esse ἐπιπλάγεις , vel ὑποπλάγεις , vt legisse Gaza videtur , id est , interprete Gaza nonnihil latas , vt Lentis & Aphaces , Aphacesque fructum celeriter perire. Idem frugum & leguminum pestes recensens tradit Aphacen à Securigida strangulari. Plinius Theophrastum secutus , vno loco Aphacen in cichoriaceis numerat , alibi vero Dioscoridis Aphacam ita exprimit , vt ex eo transcripsisse videatur , vel certe ex eo auctore ex quo Dioscorides ipse descripsit. Aphace , inquit , tenuia admodum folia habet : pusillo altior Lenticula est , siliquas maiores fert , in quibus terna aut quaterna semina sunt , nigriora , & madidiora , & minora Lenticula. Nascitur in aruis. Itaque Aphace rectè fortasse dicitur legumen hinc depictum , quod Matthiolus nomine Viciæ exhibuit. Aphaces , & Viciæ semina figura non esse rotunda , veluti Fabarum Galenus scribit , sed aliquanto latiora quomodo lentium. Hac cum siliquis atque integra planta rustici reponunt , vt brutis pecudibus sint pabulo. Per famem tamen quosdam sibi cognitos , qui hæc quoque comederint , potissimum vère , cum adhuc virent , quemadmodum Fabas , & Cicer edere consueuerunt. Sunt autem non insuauia modo , sed concoctu etiam difficilia , aluumque inhibent. Perspicuum ergo est cum sint eiusmodi , alimentum quod ex ipsis distribuitur , esse haud quaquā boni succi , sed crassum , atque ad succum melancholicum gignendum idoneum , vt de Lente diximus. Verum Lenti quidem multa bona insunt , his autem nihil bonorum illius adest. Aphacæ semen , auctore Dioscoride , adstringendi vini habet , quare torrefactum stomachi aluique fluxiones sistit , si fresum lentis modo decoquatur. Natura Aphacæ ad spissandum efficacior inquit Plinius quam Lenti : reliquo vsu eosdem effectus habet. Stomachi aluique fluxiones sistit semen decoctum. Vicia sylvestris caulibus , foliis , siliquis satiuæ similis est , nisi quod omnia hæc minora habet , caules teneri sunt , graciles , angulosi folia in pediculis eodem modo quo in satiuâ disposita , quorum extrema in binos ternosue capreolos desinunt : flores parui in ipso caule : siliquæ item parvæ longiusculæ , angustæ , in quibus sena septenaque grana , nigricantia , dura , viciæ seminibus minora. In agris cum segetibus prouenit. Hanc sylvestrem Viciam Dodonæus Arachum nominat , tertia syllaba per , ch , scripta , & Craccam , Galli *Vesce sauvage* & *vesceron* , Germani *Vuilde Vuicrem* , & *Sant Christoffelskran* , Brabantii *Crok* . Ruellius etiam Craccā appellari refert. Fuchsius Aphacen vocat , Matthiolus , Viciam. Quorum sententiam improbat Dodonæus , quod seminis Craccæ figura exquisitè rotunda est , seminum vero Viciæ & Aphaces , forma rotunda non est , sed aliquanto latior , veluti Lentium , vt ex Galeno modo diximus. Viciæ sylvestris figura qualis sit , ex imagine satiuæ intelligi potest.

Locus.

In cap. 142.

li. 2. Diosc.

li. 2. c. 142.

Locus &

Forma.

Lib. 7. Hist.

cap. 7. & 11.

Ibid. ca. 5.

Cap. 8.

Lib. 27. c. 5.

Li. 1. Alim.

Vfus

Li. 2. ca. 142.

Vires.

Lib. 27. c. 5.

Locus.

ARACHVS, CAP. LIII.

Forma.

Locus.

Li. I. Alim.



O c leguminis sylvestris genus Vicię sylvestri planè simile est cauliculis, foliolis, capreolis: floribus dissimile, nam acervatim in longis pediculis oriuntur, ferè in spicę formam, ex cæruleo purpurei: deinde siliquę compressę, in quibus semina Vicię sylvestri similia, Vellaunij & Aruerni etiamnum hodie vocant *Arousses*, quasi Arachum, corrupto quidem, sed adhuc servato veteri nomine. Inter segetes crescit, & in agrorũ marginibus ἀραχὼν Gręci vocant, Latini similiter Arachum, de quo sic Galenus. Apud nos sylvestre quoddam rotundum ac durum, Eruóque exilius, in fructibus cerealibus reperitur, quod Arachum nominant, non per c, sed per ch, ultimam syllabam proferentes quod selectum proiciunt, vti & semen Securidacę. Hęc Dodonęus in frumentorum Historia.

FOENVM GRÆCVM, CAP. LIIII.

Nomina



ΗΛΙΣ, κεραΐτις, ἀγρόκερος, βόκερος Gręcis, Latinis fœnumgręcum. Maior Gręcarum appellationum pars à siliquarum est similitudine sumpta: hæ enim corniculis similes sunt. Hinc ceraΐτις simpliciter à cornu dicitur: κέρας enim Cornu significat. Aigoceros à caprini cornu similitudine, quemadmodum à bubuli Buceros, quod nomen Theophrastus huic plantę indidit.

Li. 2. ca. II.

FOENVM GRÆCVM
satiuum Matthioli.

Genera.

Forma.

Locus.



Columella simpliciter Siliquam à rusticis vocari scripsit. Varro Siliculam, Plinius. Siliciam, Arabes Olba, Helbe, seu Hebbe, Itali Fiengreco, Germani Bockshorn, Hispani Alfornas, & Alhouas, Galli Fenugrec, & Senegre, Angl. Fenegreck, Belg. Fenigrec. Fœnigręci genera sunt duo, sativum, & sylvestre. Fœnumgręcum sativum caules multos ab vna radice profert teneros, rotundos, nigricantes, inanes, ramosos: folia pratensis Trifolij modo, in ambitu serrata: flores candidos, paruos, ex quibus siliquę prodeunt longę, corniculorum figura, incuruę, & acuminatę, in quibus semen sub fuluum, pingue, grauis odoris. Radice firmatur multiplici, tenuique. Fœnumgręcum sylvestre radice est longa, lignosa, furculosa: caule simplici dodrantali, ima parte corticoso: foliis paucis, satiui foliis similibus: siliquis quàm in satiuo latioribus, quę in tenuē veluti filiū desinūt, & curuorum instar cornuū arcuantur: semine quàm in satiuo minore. In aridis prouenit. Sylvestre aliud fœnumgręcum Tragi & recentiorũ multis rotundis & longis repit caulibus.

Folia



Folia ei oblonga sunt, veluti Viciæ, singula tamen maiora, latiora ac rotundiora, flores ex foliorum sinibus prodeunt, albicantes: siliquæ oblongæ & aliquantum recurvæ, Fœnogræco similes, sed minores, in quibus semen angulosum, sapore Viciæ. Radix longa & sæpè tricubitalis, quæ non facile intermoritur, verum singulis annis primo vère regerminat. Reperitur in vtraque Germania, locis siluosis, opacis & incultis. Nullius in medicina aut cibo, quod sciatur, vsus. Satiuum Septembri mense, vel circa æquinoctium seritur, cum pabuli causa *Tempus.* seritur, & mensis Ianuarij vltimo, vel primo Februarij cum in messem seminatur. Silicia hoc est Fœnumgræcum, inquit Plinius, scarificatione seritur, quatuor *Lib. 18. c. 16.* digitorum sulco, non altiore, quantoque peius tractatur, tanto prouenit melius. Rarum vel, Mirum dictu, esse aliquid cui proſit negligentia. Iunio & Iulio *Tempus.* mensibus floret, dein siliquas producit, Augusto maturum semen legitur. Fœnumgræcum veteres in cibos recipiebant, nec non in medicos vsus. Fænigræci *Li. 1. Alim.* semen Galeno inter manifeste calfacientia censetur, eundemque hominibus in *Vsus &* cibo vsu præstat, quem Lupini. Sumitur enim cum Garo alui subducendæ gratia: est que huic rei multo quàm Lupini accommodatius, cum nihil ex propria *Vires.* substantia habeat, quod transitum remoretur. Manditur autem & cum aceto & Garo sicut Lupini. Multi præterea & Fœnumgræcū & Lupinos ex vino, garo, & oleo sumunt, alij etiam panem addunt, eoque obsonio sunt contenti, quod ventrem minùs subducatur, caput certe non tentat, quod nonnullis Fœnumgræcum ex Garo facere solet. Præterea stomachum non subuertit: nam id quoque Fœnumgræcum in quibusdam efficit. Succus ipsius cum melle sumptus ad omnes prauos humores qui in intestinis habentur subducendos est accommodus: suo quidem lentore leniens, calore autem dolorem mitigans. Quod autem absterforiæ facultatis sit particeps, intestina etiam ad excretionem instigat, sed parcius ei mel est admiscendum, ne mordacitas exuperet. In diuturnis verò

Lib. 1. c. 95.

Li. 24. c. 19.

Lib. 3. sim.

In cap. 95.
li. 2. Diosc.

thoracis citra Febrem affectibus, pingues cum eo palmulas elixare oportet, vbi autem succū ipsum expressum copioso melli miscueris, ac rursum super carbones ad mediocrem crassitiem coxeris, tum demum longe ante cibum vti. Hodie Fœnogræo in cibis non vtimur, sed in medicos vsus sapissimè, præsertim à chirurgis, admittitur. Farina enim eius, vt recte tradit Dioscorides, vim habet molliendi, discutiendique: in aqua mulsa decocta aduersus tam internas quàm externas inflammationes efficaciter illinitur: lienem cum aceto & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit, & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur & insident. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pelsi vice subiiciatur. Viride cum aceto utilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentientibus Decoctum eius prodest aduersus tenesmos, fœtidamque dysentericorum proluuiem. Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos, & genitalium cicatrices absterget. Nec Fœnogræo minor est auctoritas, inquit Plinius, quod Telin vocant, alij Carphos, alij Buceras, alij Ægoceras, quoniam corniculis semen est simile, nos Siliciam. Vis eius siccare, mollire, dissoluere. Succus decocti fœminarum pluribus malis subuenit, siue duritia, siue tumor, siue contractio sit vuluæ, fouentur, & insident: infusum quoque prodest. Furfures in facie extenuat. Spleni addito nitro decoctum & impositum medetur: item ex aceto. Sic & iocinori decoctum. Subiiciuntur & alia plura ad vsum medicū pertinentia, de quibus & iis quæ Dioscorides tradidit, iudicium ferri potest ex iis quæ Galenus scribit: nempe Fœnumgræcum calefacere secundo ordine, desiccare primo: quare feruentes phlegmonas irritare, exacerbarèque, quæ verò minùs sunt calidæ & duræ, eas digerendo curare. Sicci seminis farina, inquit Matthiolus, cum sulphure & nitro lentigines delet. Medetur vlcerosæ scabiei, si cum quarta parte seminis Nasturtij excipiatur aceto, & subinde illinatur. Eadem in hydromelite decocta, addita axungia auxiliatur genitalium tumoribus: parotidas etiam iuuat, chiragram, podagram, & articularum luxationes. Ex vino subacta carcinomata purgat. Datur vtiliter potandum Fœnigræci decoctum diuturna tussi laborantibus, & cum pectus fuerit exulceratum. Seminis decoctum maceratis in eo Linteolis, & fronti adhibitis, oculorum fluxiones auertit.

S E S A M V M

CAP. LV.

Nomina



ἩΣΑΜΟΝ dicitur Græcè, similiter Latinè Sefamum, & Sefama, Arabicè *Semsem*, & *Sensera*, Italicè *Sesamo*, *Sosimano*, & *Ingiolina*, Hispanicè *Iorgilin*, & *Alegria*, Gallicè *Iugioline*. Sefami quidem semen in officinis satis protritum est, ex quo videlicet copiosum exprimitur oleum, ipsa verò Sefami planta non æquè nota, vt pote quæ numquam vel rarissimè in Italia & Gallia seratur. Semen autem quo Officinæ vtuntur, ex Græcia & Peloponneso ad nos conuehitur. Sefamum Theophrasto auctore, caule est ferulaceo, magis quàm arundinaceo, Milio simili, crassiore tamen ac magis multiplici, radice numerosiore: foliis rubentibus: flore viridi, herbaceo: semine vasculis incluso Papaueris modo. Plantā nomine Sefamilis hîc pictā à Luca Ghino ad semisfam fuisse ait Matthiolus, sed legitimum Sefamum esse non affirmat, quod culmum non ferat Milio crassiorē, altiorē, numerosiorēque, nec radices plures, sed scapum Fabacei æmulū, in quo vt in Faba, siliquæ triangulares, aut quadrangulares, in quibus semen. Deinde folia eius non rubent, nec flos herbaceus est. Ex quibus tam leuibus coniecturis statuere aduersus omnium iudicia non debuit Matthiolus postremam plantam non esse Sefamum, vt ait Pena, quantum

Lib. 8. Hist.
cap. 3. & 9.
Forma

SESA M V M *verum.*

tum enim feminis Sefamini ex Alexandria & Creta defertur, huius plantæ est. Sefama, inquit Plinius, ab Indis venit, ex ea & oleum faciunt, color eius candidus. Omnium quæ ex æstivis sementibus ager recipit, Sefamam terræ molestissimam esse scribit Theophrastus, plurimùmque posse eam emaciare, utpote quæ multiplici magis, crassiorèque calamo, & numerosiore radice fit quàm Milium. Sefamo, ut cæteris leguminibus vescebantur antiqui Galeno teste, qui ob id leguminib⁹ subiunxit. Plinius æstivis frumentis annumerat. Sefami semen, inquit Galenus, pingue est, ideòque repositum celerrimè fit oleosum: quamobrem eos qui ipso vescuntur celeriter implet, stomachumque subvertit, ac tardè concoquitur, pingueque corpori præbet alimentum. Liquet ergo quod ventriculi partibus vigorem ac robur addere nequit, quemadmodum neque aliud quoduis pingue. Est autem crassi succi, ideòque non propere pervadit. Ipso autem solo non admodum vescun-

Lib.8.Hist. cap.9.

Li.1. Alim. Lib.18.c.10.

Usus
& Vires

tur, sed cum melle crudo Sefamidas, quas vocant, (nimirum Placentas) effingentes. Panibus etiam inspargitur. Sefamum Dioscoridi stomacho inutilis cibus, halitus gravitatem facit, quoties inter mandendum commissuris dentium inhæsit. Nervorum crassitiem illitu discutit. Medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ morsibus, capitis dolores qui æstuatione concitantur, ex rosaceo lenit. Eadem efficit herba decocta in vino: præsertim inflammationibus oculorum, doloribusque prodest. Ex eo fit oleum quo Ægyptij vtuntur. Quæ verò Ruellius vertit, medetur auribus fractis, & cætera, Græcè sic leguntur. Καὶ τὰ ἐν ὠσὶ θλάσμα, καὶ φλεγμονὰς, καὶ πυρίχαιρα, καὶ κώλων ἀλγῆματα, καὶ κεράτων δῆγμα θεραπεύει, Id est, Aurium contusiones, inflammationes igne ambusta, coli dolores, atque cerastæ morsum sanat. Cornarius tamen κώλων ἀλγῆματα artuum dolores interpretatur, legendumque censet κώλων per ω, non κώλων per ο. quod intestinum crassum significat. Lacuna verò in nonnullis manuscriptis codicibus legi tradit, ἀσκαλαβώτης καὶ κεράτων δῆγμα, id est, stellionis & cerastæ morsus in quibusdam tantum κωνοπῶν δῆγμα θεραπεύει, id est morsibus culicum medetur. Sefama trita in vino sumpta inhibet vomitiones inquit Plinius. Aurium inflammationi illinitur, & ambustis. Eadem efficit & dum in herba est. Hoc amplius oculis imponitur decocta in vino, Stomacho inutilis cibus, & animæ gravitatem facit: stellionum morsibus resistit: item vlcerebus quæ cacoethe vocant. Et auribus oleum quod ex ea fit prodesse diximus. Hæc sic legimus in vulgatis nostris exemplariis, Cornarius verò in vetere suo codice pro vino legit ovo, idque verisimilius. Sefama trita in ovo sumpta inhibet vomitiones. Deinde pro hoc amplius, habet, Hæc amplius, ut de herba accipiamus. Sefamum, Galeno, non parum in se continet viscosum & pingue, quare emplasticum est, & molliens, ac modicè calidum. Eiusdem facultatis est quod ex eo conficitur oleum, herbæ quoque decoctum similem vim obtinet. Oleum Sefaminum, ut tradit Mesues, impinguat, semen auget, asperam arteriam lenit, & vocem ob id claram reddit.

Lib.2.c.92.

Li.22. c.25.

Embl. 87. libr.2.

Lib.8. sim.

Li.3. Antid.

Nomina

Genera.



ΡΥΒΑΓΧΗ Græcè sic & Latinè Orobanche nominatur, & Erui angina, à Theodoro Eruanga. Nam Orobanche ab Erui strangulatu nomen adepta est, nempe quod ὀροβον ἄγχει, id est, quod Orobum siue Eruum strangulat. Duplicem esse Orobanchen ex Theophrasto, Galeno, Dioscoride colligere licet. Vnam quæ legumen sit, aut leguminum Erui præsertim vitium, & pestis: alteram quæ cauliculus tātum sit subruber. Theophrastus de seminibus quæ inter alia nascuntur loquens, vt de Ægilope qui in Hordeo magis oritur, de Aracho qui in Lēte, de Securidaca quæ in Aphaca, subiicit. Ἐνια ὃ ἐφανερῶς ἐστὶ κοινὰ πλεόνων, ἀλλὰ διὰ τὸ μάλιστα ἐν τισιν εὐαθνεῖν (sic enim legendum sensu ita postulante, & Gazæ versione subscribente, non ἀθνεῖν, vt in publicis exemplaribus legitur) ἰδία τούτων φαίνεσθαι. καθάπερ ἡ ὀροβάγχη τῶν ὀρόβων, καὶ ἡ ἀπαρίνη τῶν φακῶν. ἀλλ' ἡ μὲν ἐπικρατεῖ τῶν ὀρόβων διὰ τὴν αὐθνεῖσθαι. ἡ δὲ ἀπαρίνη μάλιστα ἐν τοῖς φακοῖς εὐτροφεῖ. τρόπον ὃ τινὰ παραπλήσιος ἐστὶ τῇ ὀροβάγχῃ, διὰ τὸ ἐπιβάλλειν ἐκτέχειν ὅλον ὥσπερ πλεκλάνη: ἀποπνίγει καὶ ἔτος, ὅθεν καὶ τὸ ὄνομα εἴληφε. Id est, Quædam autē sunt perspicuè multorū communia. Sed quia in quibusdā maiore vim habent, horū propria existimantur, veluti Orobanche Orobi, Aparine Lentis. Sed Orobanche quidem Eruum vincit propter imbecillitatem, Aparine autem inter Lentes bene nutritur: & ea quidē Orobāche quodammodo similis est, quia totam plantam aggreditur, & veluti brachiis amplexatur: sic enim strangulat, vnde ei nomen. Idem alio in loco de iis scribens quæ vicinas plantas interimunt. Καὶ καὶ ἡ ὀροβάγχη καὶ λυμὴ τὸν ὀροβον τὰ περιπλέκεσθαι καὶ καταλαμβάνειν: καὶ τὸ λυμὸν τὸ βέκερας εὐθὺς τῇ ῥίζῃ παραφύομενον. Id est: Etenim Orobanche Eruum necat amplexu compressūque suo, & Limodorum fœnumgræcum interimit protinùs radici adnascens. Orobanches leguminis sic quoque meminit Galenus. Reperit igitur in Lente quoque ex mutatione ipsius enatum durum rotundūq; Arachum, & Pelecynum seu Securidacam semina

Li. 15. causs. cap. 22.

Li. 1. Alim.

OROBANCHE Legumen,
Aphaca Dod.

Li. 18. c. 17.

Lib. 4. c. 18.

Forma

Li. 2. ca. 136.



non vesca: præterea Aparinen, quæ non modò non esculenta est, sed plantæ lentis dum assurgit, vndique implexa, ipsam strangulat, suffocat, & detrahit, non aliter quàm Orobanche Eruum. Plinius & illius mentionem facit his verbis. Est & herba quæ Cicer enecat, & Eruum circumligando se, vocatur Orobanche. Orobanchen legumen putant esse docti herbarij quæ hîc depicta est, indicatā pro Rphace à Dodonæo. Tenuibus, angulosis, geniculatis, longis, Lentèque altioribus cauliculis assurgit. Folia sunt ei parua, tenuia, latiuscula, in acutum desinentia, in singulis geniculis bina, inter sese opposita, circa quæ tenues viticulæ, & graciles pediculi, flores ferunt paruos, ac luteolos, quos siliquæ sequuntur latæ, Lentis siliquis longiores, in quibus semina quaterna quinaue, lata, nigra, dura, Lente minora: radices parvæ sunt & fibratæ. Alteram Orobanchen Dioscorides describit his verbis. Orobanche cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum vergen

vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. In hac historia quæ Ruellius vertit, sine folio, pinguis, Græcè legimus *φύλλων ὑπολίπτερον*, id est, foliis sub pinguibus: neque enim prorsus foliis caret hæc Orobanche, sed in summo foliola habet, inter quæ flores prodeunt. Plinium

Li. 22. c. 25.

OROBANCHE

altera Matthi.



Ruellius quidem secutus est, qui Orobanchen sic descripsit, ita tamē vt cum superiore Orobanche hanc confundat. Orobanchen, inquit, appellauimus necantem Eruum & legumina: alij Cynomorion eam appellant, à similitudine canini genitalis. Cauliculus est sine foliis, pinguis, rubens. Legitimam hanc Orobanchen alteram esse quæ hîc depicta est, quæque notis omnibus historiæ Dioscoridis respondeat, Matthiolus, & plerique docti herbarij existimant. Ananienses, teste eodem Matthiolo Herba lupa vocant, quod vicinas herbas deuoret, nonnulli *Coda dileone*, alij *Herba tora*, quod vaccæ ea deuorata (vt pastores facto periculo testantur) ita tim taurum adeant. Cynomorion etiam appellatam à similitudine canini genitalis Plinius dixit, non inconcinna repræsentatione: nam si quis eam contempletur glabro, singularique caule proflientem, confarctos inter se flores, & quasi in glomum collectos monstrantem, genitalis canini effigiem referre perspiciet, quod in summo crassius, &

In cap. 136. li. 2. Diosc.

veluti galericulo contectum cernitur. Recentioribus Græcis *δοσπριολέων*, & *λεοντοβολάνη* dicitur, hoc est, legumen Leoninum, & Leonina herba. Eiusdem meminit auctor libri de plantis Aristoteli inscripti. Est quæ caulem habeat, inquit, sed absque fructus, & foliis, vt quam appellant Chrysocomen aut Chrysiti. Quibus verbis Orobanchen Dioscoridis, Hæmoderon Theophrasti perspicuè intellexit, Chysitidis nomine conuenientes à fuluo colore Sciolus quidam exposuit Chrysocomen. Dodonæus hanc Dioscoridis Orobanchen, Theophrasti *λιμόδωρον* esse putat, de quo sic Theophrastus. *Τὸ ὅ ὑποφύλλων ἐνθὺς ἐκ τῆς ρίζης τῶ κυμίνω, καὶ τῶ βυκέρω τὸ λιμόδωρον* (non *λιμόδωρον*, sed *ἀιμόδερον* legendum, à cute tanquam cruore infecta, puto, *μονόχυλον, ἔκ ἀπέμπερε τῶ χυλῶ, πλὴν βραχύτερόν τι πολὺ, καὶ ἀνωθεν τί κεφαλῶδες ἔχει, ρίζαν ὅ ὑποφύλλων*. Id est, Quod autem statim ab radice cumino, & Fœnogræco subnascitur Hæmoderon, vnicaule est, nec dissimili caule, verum breuiore multo, & superne quoddam veluti caput habet, radicem autem subrotundam. Idem alibi ait Hæmoderon radici protinus adnascens Fœnumgræcum necare. Interim ex emendato Theophrasto, insigne in Plinio mendum corrigendum. Legimus enim lib. 20. cap. 10. Et necatur cuminum ab imo dorso, cum legendum sit, Et necatur cuminum ab hæmodero, ex Theophrast. lib. 8. histor. cap. 8. Cæterum Dioscoridis Orobanchen à Theophrasti Orobanche prorsus diuersam esse ex vtriusque historia perspicere licet: cum enim Dioscoridis Orobanche vnico constet caule, quæ Eruum, vel quamuis aliam segetem sic apprehendere, & veluti brachiis amplecti possit, vt strangulet, quod de sua Orobanche tradidit Theophrastus, cauliculis repentibus & viticulis suis phantas vicinas complecti, non interimere singulari caule

In hist. fru.

Lib. 8. Hist. cap. 8.

Li. 5. caul. 2.

Ibidem.

Lib. 8. sim.
Vires &
tempera.

diuersum est. Tamen Dioscorides Orobanchen suam inter quædam legumina nasci scribit, & ea strangulare, atque inde Orobanches nomen inditum. Quare dicendum, quod censet Matthiolus, hanc nullo sane amplexu, sed præsentia tantum sua, legumina, segetes, cannabim & linum interimere, quæ iuxta ipsam oriuntur: vel dicendum, Dioscoridem Orobanchen quæ duplex sit, pro vna duntaxat accepisse, quod à Plinio etiam factum, diximus. In agro Cannabe consito effossa multoties est Hemoderos, tam prope nascens sub radice Cannabis, vt eam amplecteretur, ac sustolleret, velut impacta, & agglutinata: qua vicinia, & adhæsu, multum alimenti Cannabi adimebatur, quoniam Hæmoderos planta succosa & per humida multo succo egeret, quo intercepto fraudabatur propinqua Cannabis. Priorem Orobanchen dicit Galenus siccæ frigida: que temperaturæ esse in primo ordine. Alteram Dioscorides tradit oleris modo æsitari crudam, & in patinis Asparagi modo decoctam: legumentis additam concoctionem eorum accelerare.

ORNITHOPODIUM,

CAP. LVII.

Nomina

Forma

PLANTAM istam Ornithopodium, id est auis pedem, Gallicè *Pied d'oiseau*, appellare voluerunt herbarij. Est enim veteribus Græcis & Latinis, quod sciam anonymos, nisi sit Polygalon Dioscoridis, de quo mox dicemus. Ornithopodium autem non sine ratione dicitur, nempe à similitudine pedum parvæ auiculæ, siliquæ vni pediculo nixæ, quaternæ aut quinæ, expansæ, mucronatæ, quasi stylis aduncis, articulatis, curvatis referunt. Paruulis multis, tenuibus, ac gracilibus exit cauliculis per terram stratis, folia in his plurima, rotunda, parua, Lentis foliis minora & tenuiora: flosculi exigui, lutei, in parvis pediculis densè coaceruati: siliquæ parvæ, tenues, quales diximus, in quibus sena, septenæue minuta & rotunda semina, Napi aut Rapi seminibus similia. Nascitur in aruis inter segetes. Reperitur & in locis incultis, veluti in collibus, pratis siccis & apricis, ac secus vias.

ORNITHOPODIUM Dod.

Ornithopodium aliud ex Dalechampsio, pictum damus, quod in aridis & sabulosis nascitur, radice multiplici huc illuc fusa,



ORNITHOPODIUM

tuberosum Dalech.



tenui

PVSILLVM

Ornithopodium Pena.



tenuibus fibris capillata, crebris tuberculis nodosa duris, rotundis: cauliculis multis, humi ferè sparsis, aut paululū extantibus: foliis Viciæ, minoribus, in singulis ramulis ex aduerso dispositis numero imparibus: flore in summis ramulis ex albo rubescente: siliquis exilibus, curuis, ferè ternis, velut articulis quibusdam distinctis: minuto semine. Herniariam quidam vocant, quia omenti & intestini prolapsui mirè auxilietur sumpta & admota. Item experimentis constat totius plantæ decoctum ac puluerem renum calculos frangere ac eiicere. Aliud perpusillum & elegans Ornithopodium pictum monstrat Pena. Oritur in marginibus herbidis Grinuincij Regiæ ad Tamesin flumē, non procul Londino. Vix binos aut ternos superat pollices: ramulis in terram sparsis, exilioribus & crebrioribus, venustius ordine positis quam in superiore: non aliis natalibus gaudet.

GLAVX,

CAP. LVIII.

SUPERIORI similes præsertim foliis plantas aliquot adiungemus, primum eam quæ, si Dodonæo credimus, γλαῦξ Græcis, & γέλαξ, & γλάξ, Latinis similiter GlauX nominatur, Gallicè *Herbe au lait*, Germanicè *Milchkrant*. Cauliculos multos ex eadem radice mittit, teneros, dimidium pedem altos, in quibus vtrimque ordine digesta folia parua, longiuscula, minoribus Lentis foliis proxima, infernè candidiora quàm super-

Lib. I. c. 32.

Nomina

Forma.

GLAVX

Dodonæi.



nè: inter quæ flores prodeunt, Violis similes, minores & purpurei. Radix gracilis & fibrata per terram serpit. Locis falsuginosis & vliginosis maritimis prouenit, in tota Zelandia: quæ satis Glauci à Dioscoride descriptæ conueniunt. GlauX, inquit, Cytiso & Lenticulæ foliis similis, quæ supernè virent, auersaq; candidiora spectantur: ramuli à terra exiliunt quini, seniue, tenues ab radice, dodrantem alti: flores Leucoij, purpurei, minores tamen. Nascitur iuxta mare. GlauX antiquitus Galacton vocabatur, inquit Plinius, Cytiso & Lenticulæ foliis similis: auersa cādidiora. Rami in terrā serpunt, quini seniue, admodum tenues ab radice: flosculi purpurei exeunt. Inuenitur iuxta mare. Coquitur in sorbitione similaginis ad excitādam vbertatem lactis. Eam qui hauserint, balneis vti conuenit. Dioscorides eandem ei vim tribuit. Coquitur, inquit, cum Hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad reuocandam

Li. 4. ca. 136.

Lib. 27. c. 9.

Vfus & Vires.

GLAUX CLVSII.

Li. 6. simpl.



extincti lactis vbertatem. Idem & Galenus habet. Glaux herba & ipsa lactis generandi vim obtinere videtur. Quod si ita sit, calida quodammodo humidaque fuerit temperamento. Glaucem aliam proposuit Clusius qua nullam magis ad amussim Dioscoridis descriptioni quadrare ait. Ternis aut quaternis à radice caudiculis assurgit, dodrantalibus, gracilibus, incanis: foliis ordine vtrinque digestis secundum costæ longitudinē, lentis modo, mollioribus, superne virētibz, inferne cana lanugine obsitis, gustu nonnihil amaro: flos extremis cauliculis confertus, & capituli spicæ uel obtusæ & breuioris modo innascitur; Glycirrhizæ vulgaris forma & colore perquam similis, radice exili, candicāte. Nusquam alibi se vidisse ait quàm ad ripas Thormis fluminis, quod Salamanticam alluit, paulo infra urbem nomine carentem, mense Iunio. Verùm is locus procul à mari distat, iuxta quod Dioscorides nasci tradit.

POLYGALON, CAP. LIX.



Nomina
Lib. 4. c. 37.

Forma

OMEN ab affectu sibi vendicauit πολύγαλον, siue πολύγαλα, quod potum, inquit Dioscorides, lactis abundantiam faciat. Frutex est paruus, palmi altitudine, folio Lentis, gustu subacerbus. Polygala Plinio palmi altitudinem petit, in caule summo foliis Len-

POLYGALON Matthioli,
Astragaloides Lobellij.

POLYGALA multorum:
quibusdam Onobrychis.



ticula

ticulæ, gustu adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit. Polygalon Matthioli hîc appinximus, quod tamen verum esse is non affirmat. Palmarem, inquit, altitudinem non excedit, folia Lenticulæ habet, & gustu est adstricto. Præterea Carzolarius scripsit experientia sibi compertum esse, eius usu lac copiosum in mulieribus prouenire. Lobellius esse vult Astragaloides Herbariorum, quam circa arcem dirutam oppidumq; *Treuon*, Lugdunensis Galliæ in collibus sæpe legit. Quia vero ad Astragalon accederet, Astragaloidem cum Valerando rei herbariæ peritissimo nominauit. Cauliculis est palmum altis, aut pedalibus, foliis Ciceris, aut Galegæ, sed minoribus, in pediculis vtrinque ordine sitis. Flosculi sunt in pallido punicei, aspectu venusti. Radix crassitudine digiti.


Polygalon verum multorum est Dodonæi in Histor. Stirpium Viciæ alterius secunda species, in Frument. Histor. Onobrychis, Lobellio, Caput Gallinaceum Belgarum. Caules profert à radice multos, cubitales, procumbentes, & per terram reptantes: folia Galegæ similia, tenuiora tamen subtus albicantia, ex pluribus angustis in acutum desinentibus coaceruata. Flores in longiusculis spicis rubent. Fructus echinati sunt, asperi, plani ac subrotundi. Diensibus Allobrogibus *Sparsæ* dicitur. Vbi pratorum copia non est, in asperis & lapidosis locis, paucula terra tectis, bidente tantum scalptis, iniecto fimo diligenter comminuto ea gens ferit, humoque ac insperso stercore operit. A satum imber si subsequitur, facilius comprehendit, & optime proficit, disiectis huc illuc cauliculis sic vestiens solum, ut in squallidissimo solo latissimi prati speciem ostendat. Sequatur anno ter cum adoleuit & corroborata est, pecorique gratissimum est pabulum. Gaudet præcipue locis aridis, & sabulosis. Abundare lacte pecudes quæ illa viridi & sicca pascuntur, certissimum est.

Polygalam aliam ex Clusio hîc pictam damus, nusquam alibi quam in Hispaniis ab eo repertam, & obseruatam. Est quidem illa fruticosa, binos palmos alta, multas ferens virgulas lentas, Sparti aut Iunci modo: folia singulis oblongis costis inhærent, impari plerumque numero, quina, septena, aut plura,

POLYGALA Valentina.



POLYGALA repens.



Lenticu

Lenticulæ similia, magis tamen carnosæ, & ad Rutæ colorem accedentia, gustu adstringēte, & ingrato: flores Meliloto similes, colore luteo, coronæ in modum summis virgulis (quæ magna ex parte nudæ sunt, & maturo semine arescunt) insident: incurvæ, longæ & teretes succedunt siliquæ, ternis aut quaternis internodiis distinctæ, quæ semen continent durum, oblongum, nigrum, ingrati saporis: radix longa, dura, lenta, satis crassa. Perpetuò viret, floret Aprili, Maio & Iunio: semen Iulio maturum est. Apes ex eius flore mel plurimum colligere creduntur. Agro Salmaticensi frequens secus vias: inuenitur etiam in Granatensi, Murciano, & Valentino regno, locis arenosis, & collium decliuibus. Salmanticenses *Coronilla de Rey* vulgo appellant, quasi Sertulam Regiam, & istic Officinæ Meliloti vice vtuntur, Granatenses & Murciani *Lenteiuela*, id est Lenticulam, Valentini Poligalam. Ad Ornithopodium Dodonæi accedere videtur.

Apud nonnullos Herbarios etiam Polygalæ nomen adepta est, plantula hæc multis densissimisq; ramulis palmum longis, reptantibus foliolis Herniariæ per intervalla distinctis, è quibus florum, veluti candicantes globuli verticillatim oriuntur. In scrobibus sabulosis, fossarum & agrorum marginibus, Antuerpiæ & Gandauo conterminis luxuriat.

ONOBRYCHIS, CAP. LX.

Nomina
Genera,

ONOBRYCHIS ab Asini ruditu nomen adepta, Latinis similiter Onobrychis dicitur. Eius genera aliquot florum colore distincta. Prima Dodonæi herbula est tenera, palmum vnum, aut duos alta, caulibus gracilibus & teneris, in quibus foliola viridia, ferè Lentis: flores secus cauliculos, & in summo exeunt, cærulei, Violæ purpureæ quadamtenus similes, sed inodori, tintinabuli quinquanguli ferè figura, è cuius medio

ONOBRYCHIS
Prima Dodonæi.



Forma.

Locus,
Lib. 3. c. 152.

Lib. 24. c. 16,

pistillum exeritur, in summo tripartitum. Flores Oriente sole panduntur, Occidente occluduntur. Onobrychis secunda Dodonæi Polygala esse. Cauliculos profert graciles, lentos, lignosos, palmum vnum longos, humi repentes: folia parua, angusta, Lentis foliis similia: flores in summis cauliculis fumarie floribus haud absimiles figura & magnitudine, aliquando rubentes, aliquando niuei candoris: folliculos paruulos, vtraque parte foliolis, veluti alis paruis contextos. Radix tenuis est & lignosa. Prima in fecundis agris inter Triticum prouenit. Secunda in aridis montibus, & secus vias. Maio mense floret: Illa Iunio & Iulio. Onobrychis tertia, purpurea, radice est parua, candida, inutili: caulibus multis, pedalibus, rectis, non vt in aliis Onobrychidis generibus, per humum repentibus: foliis Lentis, per caules nullo ordine dispositis: flore puniceo, in summis caulibus denso & copioso: semine minutulo, in folliculis, seu Vesicis angulosis. In Siccaneis montium pratis profilit. Hanc esse Dioscoridis Onobrychida declarat ipsius Historia, Onobrychis, inquit, folia habet Lentis, longiora paulo, caulem dodrantalem: florem puniceum, radicem paruam. Nascitur in vliginosis & incultis. Quibus subscripsit Plinius his verbis. Onobrychis folia habet Lentis, longiora paulo: florem rubentem: radicem exiguam & gracilem.

Nascitur



ONOBRÏCHIS IIII.
 Lutea Dalechampij.



Nascitur circa fontes. Onobrychis quarta, lutea, in niuosis Iuræ montis cacuminibus profilit, radice crassa, lignosa breui, candicante: cauliculis perquam multis, pedalibus: folio Lini, angustiore, longiore, inæquali positu è cauliculis prodeunte: flore luteo, copioso, paruo, in summis cauliculis nitente. Herba rara, & vix alibi visa. Onobrychis Galeno auctore, rarefaciendi digerendique vim obtinet. Quare folia eius etiânum virentis, illita ad morem cataplasmatidis, tubercula discutunt: arefacta verò si cum vino bibantur, strangurias sanant. Quinetiam sudores elicit cum oleo inuncta. Herba suapte vi si trita illinatur, Dioscoridi, tubercula dissipat, cum vino pota strangurias sanat: illita ex oleo sudores mouet: at Plinio, siccata in farinæ modum, & inspersa vino albo, strangurias finit. Aluum sistit. Succus perunctis cum oleo sudores mouet.

Li.8. simpl.
 Vires &
 Temper.

Lib.3. c.12.

Li.24. c.16.

Forma.



Nomina



Hoc Anthyllidis genus radicem edit nigram, lignosam, fibratam, dimidium pedem longam, superne in multa veluti caulium principia diuisam, crassiuscula, laminulis corticosa, ex quibus folia multa exeunt, humi strata, longa, ex foliolis composita, Lenti similibus, vtrinque ordine ex aduerso digestis. Flores in cacumine nudarum virgularum emicant, oblongi, lutei: deinde siliquæ Lenti similes, nigræ, quarum vertice tenuis villus oritur, capreolo clauiculæue similis. In macris & sabuletis apricis gignitur.

SOLEA EQVINA, CAP. LXII.



SILIQVARVM figura plāta hæc Solea Equina, siue Ferrū Equinum nominatur, ab Italis *Ferro di Cauallo*, à quibusdam *Sferra Ca-*

uallo ab effectu, quod equi, qui diu plantam hanc virentem calcauerint, ferreis soleis exuantur. Chymici inter Lunariæ genera recensent. Securidacam montanam Matthioli appellat, quod non paruam videatur habere cognationem cū minore Securidaca, tū figura, tum viribus. Radix eius est lōgiuscula, candida,

In li. I. Dio-
scor. ca. 135.

SOLEA EQVINA

Dalechampi.



SOLEA EQVINA, siue

Securidaca montana Matth.



modicè

modicè fibrata: cauliculi in orbem multi, tenues, humi procumbētes, furculosi: folia Lentis: flos Genistæ luteus: semen Lunæ crescentis instar excavatum in si- *Forma.*
 liquis, non continuo tractu porrectis, & æqualibus, vt in reliquis filiquatis, sed
 flexuosis crenis per ambitum lunatis, & intercisis, Solearum equi figuram huic
 Legumini peculiarem propemodum referentibus: quam ob causam quidam
 Lunariam filiquatam vocant. In saxosis & macris locis Monspelienſis agri cre- *Locus.*
 scit. Floret Maio mense. Tota amara est, & Hedyſaro natura aſſimilis. Quod *Vires.*
 calcatu Soleas equorum frangat, fabulosum esse Pena aſſerit, seq; sæpius eius rei
 frustra periculum fecisse. Huic aliam idem subiungit, non minus venustam, aut
 raram in Narbonensium segetibus nascentem, quam Scorpioidem Legumino-
 sam vocat. Radice nititur fibrata: cauliculos rectos, graciles, binos aut ternos,
 pedales & sesquipalmares erigit, in quorum fastigio admodum incuruis mu-

SCORPIOIDES

Leguminosa.

STELLA Leguminosa
Lobellij.

cronibus adunca cornicula, Fœnogræco rotundiora, graciliora insunt, quæ in-
 trorsum flexas Scorpionum caudas transuersis articulis, ac pulchris aspectu,
 lineis virgata, imitatur. Flosculi lutei, pusilli. Folia Ornithopodij, au Tribuli exi-
 liora, ab imo statim cespite in neruulis vtrinque sita. Securidacæ esse credunt
 genus. Huic ob similitudinem iungenda. Stella Leguminosa, quam Arturo Cor-
 tusio rarissimam plantam debemus: foliis exit Leguminosæ Scorpioidis, flo-
 sculis Lampsanæ. Semen exile, pullum in corniculis tantilum falcatis, ex vno
 pediculo aptis, & radiatim congestis, Stellam exprimentibus, gustu Legumi-
 noso & glutinoso. Ad amatoria summis laudibus celebratur.

LINVM, CAP. LXIII.

LINON vt Græcis, ita etiam Latinis, & Officinis Linum dicitur, *Nomina*
 Arabibus Bazari chichen, siue Bezerchetan, Italis Lino, Germanis Lein, *Genera.*
 & Flachis, Hispanis Lino, Gallis Lin. Lini genera duo facit Matthio-
 lus, Linum satium, & Linum sylvestre. Linum satium tenuibus, *In ca. 95. li.*
 ac rotundis culmis, seu virgis assurgit. Folia oblonga, angusta, acuminata: flores *2. Dioscor.*
Forma.

LINUM.

In cap. 96.
li. 2. Diosc.



*L I N U M Sylvestre
primum.*



in summis virgis diuisis in breues & paruulos ramulos, venusti, colore cærulei, quibus parua & orbiculata lata capitula succedūt, in quibus semen oblongum, læue, glabrū, splendens, ex fuluo colore puniceum, quod λινὸν σπέρμα, & composita voce λινόσπερμα, & λινόσπερμον vocant. Radix est exilis.

Linum sylvestre vocatur planta secundo loco hîc depicta, non solum quod Linum facie referat, sed quod Lini modo in stamina duci possit.

Hanc Pena Linum marinum vocat, inter prata & littora herbida Narbonensis maris, ac inter stagnum & mare fruticæ, pedalis & sesquipedalis ramulis, rectis, numerosis gracilioribus, lentis, cortice ad nendum comodo, in quibus pauciora quàm in Lino folia: flores non dissimiles, sed aurei, siue lutei, minores, Iunio & Iulio emergentes, semen & Pericarpia multo minora. Hoc reliquæ Galliæ, Germaniæ, Angliæ ignotum est. Est & Linum sylvestre floribus albis, via qua Monspelio

*L I N U M Sylvestre
secundum, flore albo.*



Frontignanum itur, in agrorum siccis marginibus, & cautibus nonnunquam obuium, teretibus, nitidis, dodrantalibus virgultis. Flores albi, quàm in luteo Lino maritimo maiores. Foliola Scopariæ, longe angustiora, exilitate Asparagi aut Fœniculi caules ambiunt.

Huic

Huic quadrare videtur Lini sylvestris tertij apud Clusium Historia. Aliud Linum sylvestre est tenuifolium, dense fruticās, fatiuo simile, nisi totum gracilius multo esset. Flosculi quinque foliolis cæruleis, fugacibus caducis constant, fatiuo pares copiosis pedalibus & cubitalibus virgultis, exilioribûsque Lini, aut Linariæ purpureæ foliolis, è longiuscula radice. Est eiusdem generis Latifolium, foliis Hirsutis Tithymali Helioscopij paribus.

Chamelinum, siue sylvestre Linum perpusillum vix palmum æquat, foliolis pusillis, flosculis ex luteo pallentibus, cauliculis Lini, cæterisque omnibus quadruplo minoribus. In glareosis Gallobelgii, & Louaniensibus pomœriis oritur.

*L I N U M Sylvestre
Tertium, marinum.*

*C H A M A E L I N U M,
siue Linum perpusillum.*



Pingui lætoq; solo, locis humidioribus, non sitientibus Linū fœlicius prouenit. Lini semen, inquit Columella, nisi magnus est eius in ea regione quā colis prouentus, & pretium proritat, serendū non est: Agris enim præcipuè noxium est. Itaque pinguißimum locum, & modicè humidum poscit. Palludius Lini semen pro malitia sui serendū non esse scribit, quoniā terræ vber exhaurit. Sed si velimus, loco pinguißimo, & modicè humido serendum. Plinio feri debet in sabulosis maximè, vnóque sulco. Eo nihil magis festinat: vrit agrum, deteriorémque etiam terrā facit, quod & Vergilius testatur. *Vrit enim campum Lini seges, vrit Avena.* Seritur vère, Maio & Iunio mensibus floret. Post messem Triticeam, virgæ Lini merguntur in aquam solibus tepēfactam, pondere aliquo depressæ. Satis maceratas indicio est membrana laxior. Iterumq; vt prius sole siccantur: mox arefactæ in saxo tunduntur stupario malleo. Lino in cibis vtebantur veteres Galeno teste, qui sic scribit. Nonnulli frixo quidem Lini semine vt obsonio, cum garo, non secus ac factitio sale vtuntur. Vtuntur autem & melli permiscen-
tes: quidam panibus quoque ipsum aspergunt. Stomacho autem noxium est, & coctu difficile, exiguumque alimentum corpori exhibet. Quod verò ad ventris deiectionem attinet, ipsum nec probaueris, nec vituperaris: exiguam tamen vrinæ mouendæ habet facultatem, quæ magis apparet, cum frixum sumitur. Tunc

Locus.
Lib. 2. c. 10.

Lib. 11. ca. 1.

Tempus.
Li. 19. ca. 1.

*Usus &
Vires.*
Li. 1. Alim.

Li.7. simpl. aluum quoque magis sistit. Rustici autem homines eo vtuntur sæpenumero, frixo tusoq; mel admiscentes. Idem alibi. Lini semen flatuosum est, etiamsi frigatur, & multa sanè recrementitia humiditate plenum. Est verò etiam in primo ordine quodammodo calidum, ac humiditatis & siccitatis, velut in medio situm. Sed nunc nullus eius in cibis vsus est, in medicamentis frequens. Lini semen
 Lib.2.c.96. Dioscoridi easdem quas Fœnumgræcum vires habet. Discutit, & emollit omnem intus forisq; inflammationem cum melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie varosque crudum tollit: illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas, duritiâsque discutit: vlcera quæ serpunt, fauosque cum vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis: vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substituatur: tussim lenit, venerem stimulat, si farina Piperis & melle exceptum pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, vuluâq; erosionibus immititur, alui excrementa euocat, ad vuluæ inflammationes in defensionibus perquam vtile. Lini semen inquit Plinius, cum aliis in vsu est, & per se mulierum cutis vitia emendat in facie. Oculorum aciem succo adiuuat. Epiphoras cum thure & aqua, aut cum myrrha ac vino sedat: parotidas cum melle, aut adipe, aut cera: stomachi exsolutiones, vel dissolutiones, inspersum polentæ modo: anginas in aqua & oleo decoctum, & cum aniso illitum. Torretur vt aluum sistat. Cœliacis ac dysentericis imponitur ex aceto. Ad iocinoris dolores estur cum vua passa. At phthisin vtilissimè ex semine fiunt ecligmata. Musculorum, neruorum, articulorum, ceruicis duritias, cerebri membranas mitigat farina seminis, nitro aut sale, aut cinere additis. Eadem cum fico item concoquit & maturat: cum radice verò Cucumeris syluestris extrahit quæcumque corpori inhærent. Sic & fracta ossa. Serpere vlcus in vino decocta prohibet, eruptiones pituitæ cum melle: emendat vngues scabros cum pari modo nasturtij: & testium vitia & ramices cum resina, & myrrha, & gangrænas ex aqua. Stomachi dolores cum Fœnogræco sextariis vtriუსque decoctis in aqua mulsæ. Intestinatorum & thoracis pernicioſa vitia, clystere in oleo & melle. Hactenus Plinius. Exprimi-
 Li.20. c.22. tur è Lini semine oleum multiplicis vsus: neque enim à pictoribus tantum & statuariis, aliisq; artificibus expetitur, nec ad lucernas solum vtile est, sed & ad medicos vsus frequenter vsurpatur. Neruorum conuulsionibus perutile est: duritias omnes mollit, neruorum tensiones cōtractionesque laxat: dolores illitum sedat. Omnibus sedis affectibus commodum est, hæmorrhoidibus, condylomatibus rimis, ac doloribus, fœminarum induratos locos mollit. Nymphææ aut Rosarum stillatitia aqua ablutum, ambustis auxiliatur. Sunt & qui bibendo maximo successu iis exhibeant, qui lateris dolore vexantur, sed recens sit oportet: nam inueteratum contracto rancore non modò excalfacit plusquam par sit, sed etiam nauseam mouet. Linum sylvestre cum floribus decoctum & illitum, tumores resoluit, & inflammationes lenit: præterea induratos articulos mollit, panosque in inguinibus sanat.

CANNABIS, CAP. LXIIII.



Nomina ANNABIS Græcis, & ἀνθεον, & σχοινιόρπον, Cannabis Latinis, Arabibus Schehedenegi, & Canab, Italis Canape, Germanis Zamer Hanff, Belgis Kemp, Anglis Himp, & Hemp, Hispanis Cannamo, Gallis Chanure, & Cheneue dicitur. Cannabis Dioscoridi duum est generum. Est enim
 Genera Cannabis satiuæ, & syluestris. Satiuæ item duplex, mas, & fœmina. Cannabis satiuæ mas caules edit rotundos, rectos, inanes, quinque aut sex pedes altos, ramosos, ita vt aliquando arbusculæ speciem referat, in quorum fastigiis folliculi
 Forma.

parui

CANNABIS Mas.

parui, rotundi oriuntur, nullo præcedente flore conspicuo, in quibus semen rotundum, duriusculum, medulla refertum candida. Folia dura sunt, aspera, subnigra, & si confringuntur graueolentia, ex sex, septemue, aut pluribus aliis simul cohærentibus coaceruata, quorum singula angusta sunt, oblonga, acuminata, & per oras serrata. Radix fibras multas habet. Hanc descripsit Dioscorides foliis Fraxini, graui odore, caulibus proceris & inanibus, semine rotundo. Cannabis sativa femina superiori similis est, sed foliis minoribus, & tenuioribus, caule graciliore, simpliciore, sine ramulis adnatis, sine fructu & semine, flores tantum proferens paruos, albos, sed inutiles & vanescentes. Cannabim sylvestrem hanc agnoscit Dalechampius. Radicem illa habet multis fibris capillatâ, caules multos, cubito proceriores, geniculatos, surculosos: folia sativæ, tactu aspera, quæ ad singula genicula caulis & surculorum bina æqualibus interuallis exeunt: florem puniceum ex hirsutis vaginis prodeuntem, caulem Prasij modo verticillatim amplexentem. Hanc sic Dioscorides delineat. Sylvestris Cannabis virgas fert Althææ similes, mi-

Li. 2. c. 148.

Ibidem.

CANNABIS
Femina.**CANNABIS Sylvestris**
Dalechampi.

niores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio sativæ, nigriore, & asperiore: flore Lychnidis, subrubro: semine & radice Althææ. Cannabis in sylvis primùm nata est, inquit Plinius, nigriore folio & asperiore. Sunt qui sylvestrem Cannabim Alceam Officinarum, siue Herbam Hungaricam

Li. 20. c. 23.

esse cõtendant. Aliam Cannabim syluestrem pictam ostendit Lobellius, & eam scribit esse Alceam maiorem Mutoni, flore Lychnidis, subrubro, semine & radice Althææ, sed Althæa fruticosiorem, de qua nos agemus in Horto, capite

Locus. de Alcea. Satiua mas & fœmina in agris feruntur, & (quod mirum videri debet) tam fœcunda quàm sterilis ex eodem prouenit semine. Syluestris in pinguibus

Lib.2. c.10. & vmbrosis gignitur. Cannabis, teste Columella solum pingue stercoreatumque & riguum, vel planum, humidum, & altè subactum deposcit. Seritur Cannabis

Tempus. vere passim. Fœmina matura Iulio vellitur. Maris semen fine Augusti, vel

Lib.20. c.9. Septembri mense, maturum legitur. Vtilissima, inquit Plinius, funibus Cannabis feritur à Fauonio. Quo densior est, eo tenerior. Semen eius cum est maturū, ab æquinoctio Autumni distringitur, & sole, aut vento, aut fumo siccatur. Ipsa Cannabis vellitur post vindemiam, ac lucubrationibus decorticata purgatur.

Li.1. Alim. Cannabis semen olim in cibo homini fuit, quod Galenus docet his verbis. Non, quemadmodum planta ipsa Cannabis Vitici quodāmodo est similis, ita semen

Vsus & Vires. semini facultate est simile, sed plurimū ab eo dissidet, vt quod concoctu sit difficile, stomachoq; ac capiti noceat, prauiq; sit succi. Sunt tamen qui eo quoq; frixo cum aliis tragematibus vescuntur. Tragemata autem voco ea quę post cœnam voluptatis inter bibendum excitandę gratia manduntur. Multum autem calfacit, ideoq; sumptum paulò largius caput ferit, vaporem sursum ad ipsum mittens calidū simul ac medicamentosum. Nunc ab hoc cibo omnes abstinent.

Sed aliis iisq; magnis hominum vsibus Cannabis peridonea est. Hęc etenim & Linum tundūtur in lanę molliem ad linteorū texturas, & funes intorquendos. Vtraque enim decorticata purgatur, sed prius ex passa. Deinde in pensa cogitur, quę particulatim tracta digeritur in glomos, quibus telas plurimū generi humano commodas ordiuntur, ac texunt. Semen auctore Dioscoride largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente conuenienter aurium doloribus instillatur. Syluestris Cannabis decocta radix illitu inflāmationes mulcet, tumores discutit, tophos articulorum dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatur. Cannabis semen Galeno flatus extinguit, adeoq; dissipat, vt si plusculum edatur, genituram exsiccet. Sunt qui viridem succum exprimentes, ad aurium dolores ab obstruptione, opinor, natos illo vtantur. Semen Cannabis Plinio extinguere genituram virorum dicitur. Succus ex eo vermiculos aurium, & quodcumque animal intrauerit, eiicit, sed cum dolore capitis. Tantaq; vis ei est, vt aquę infusa coagulare eam dicatur, & ideo iumentorum aluo succurrit pota in aqua. Radix contractos articulos emollit in aqua cocta: itē podagras, & similes impetus. Ambustis cruda illinitur, sed sæpius mutatur priusquam arescat. Cannabis semen cōtrarium in gallinis efficere ac in nobis tradit

Li.2. c.148. Matthiolus, si quidem gallinas ouorum feraciores reddit, experientiaq; sese cōperisse ait gallinas quę hyeme sæuiēte, quo tempore oua rariū pariunt, Cannabis semine vescantur, oua frequentius multo ponere. Cānabis recentis decoctum expressa validè herba, terrestriū lumbricorū cauernulis inspersum, statim eos euocare idem affirmat, quod Piscatoribus acceptum referendū est, qui hac arte vermiculos capiunt suis hamis affigendos, vt rectè scripserit Plinius succū eius vermiculos ex auribus eiicere. Ex his etiam colligi potest eius vires ad interaneorū vermes haud imbecilles fore. Equorum etiam sedi hærentes tænias, succus aut decoctū eiicit. Quod vero Plinius dixit Cannabim iumentorū aluo succurrere, id de soluta intelligendū. Sunt etiā qui foliorū puluerem dysentericis propinent. Quod postremo de radice dixit ambustis sæpius admouenda, & amouenda, commodius præstabitur, si recens in mortario tundatur cū recente butyro, & subinde applicetur. Non est silentio prætereundum quod Symeon

Li.7. simpl. Sethi

Li.20. c.23.

In cap.148. li.2. Diosc.

Seti

Sethi prodidit, semen Cannabis comestum idem nocumentum quod Coriandrum afferre: immodicè enim si estur, vt illud delirium facere: folia verò arida in potu sumpta farinae modo, aut potius ad eam potionem illorum exciccatorum, farinam ebrietatem quandam hospitalem & innoxiam facere quæ ab hauriente non sentiatur. Apud Arabas pinsitur subigiturque pro vino, & inebriat. Desiccat verò semen genitale, vt caphura. Rustici Belgæ seminis contusi medullam liquore aliquo expressam ictero laborantibus initio ipsius mali exhibent, & sæpe non sine successu, si quando ex sola obstructione, & citra febrem exoritur. Aperit enim fellis meatum, & bilis per corpus digestionem promouet. Empirici quidam asserunt sanguinem ex quacumque parte corporis fluentem sisti, si qui exit sanguis cum foliis Cannabis minutim concisis, frigatur, & ægro pro cibo detur.

In hist. fru.

ISATIS,

CAP. LXV.

IΣΑΤΙΣ Græcis, Latinis Isatis etiam dicitur, Gallis auctore in Commentariis Cæsare Glastum, nunc Guadam, Guède, & Pastel, Arabibus Dili, Dileg, Vesme, Chate, Chatis, Alchat, Adlen, aut Adhlen, & Nil, Italis Guado, Germanis Uueydt, Anglis Vuode & Vuade, & Belgis Vuetdt & Vvoid, & Vuoid, Hispanis Pastel. Duo eius genera. Ισάρις ἡμερος, Glastum satium, Ισάρις ἀγρία, Glastum sylvestre. Hæc duo genera Plinius tertium & quartum Lactuæ genus facit. Tertium, inquit, genus est in syluis nascens, Isatin vocant. Huius folia trita cum polenta, vulneribus profunt. Quarto infectores lanarum vtuntur, quod Glastum vocant simile erat Lapathio sylvestri foliis, nisi quod plura habet & nigriora. Glastum satium, inquit Dioscorides, folium habet Plantagini simile, verum pinguius nigriusque. Eius caulis duorum cubitorum altitudinem excedit. Sylvestre Glastum satiuo simile est. Vtrūque glastum id est sine vlla controuersia, quod hîc proponitur, omnibus notissimum, quo

Nomina

Genera.

Lib. 20. c. 7.

Forma.

Lib. 2. c. 180.

ISATIS satia.

ISATIS sylvest. Matth.



etiam hodie, vt olim, infectores lanarum vtuntur. Satiuum foliis est primum longis, latis, in viridi nigricantibus, per terram sparsis, foliis Plantagini haud absimilibus, sed nigrioribus, & magis carnosus, è quorum medio caulis exurgit bicubitalis, foliis obductus minoribus, & magis acuminatis, qui ad verticem in multos ramulos finditur, flosculis exiguis, & luteis onustos, deinde, siliquis longiusculis, latiusculisque paruarum linguarum effigiem referentibus, initio viridibus, deinde nigricantibus, in quibus semen includitur: radix est simplex, candida, parum fibrata. Huic proxima est sylvestris foliis, caule, figura: sed

ISATIS SYLVESTRIS

Lobellij: *Vaccaria pallida*.



caule teneriore, minore, nigriore, & angustioribus siliquis. Alia est Isatis à Lobellio depicta, quam Vaccariâ dicunt Narbonenses, & Ocimoides. Folia hæc profert, angustiora quàm superior Isatis sylvestris, Ocimastro, siue Polenio Dodonæi similia, rariora caule cubitali, in alas diuiso, & ornato floribus exiguis, pallidis, Ocimastro, siue Pseudomelanthio similibus, ex alabastris paruis, albidis, & pallentibus, nec semine dispari. Seritur Glaustum in lætis & pinguibus agris, copiosissimum in Gallia Narbonensi, & in Italia, vt in Vmbria, circa Noceram, vbi oppidum est Guadum ideo appellatum, quod ibi Isatis copiosissima seratur sicut, & in Germaniæ agro Erphordiano. Ea permagnum quæstum iis regionibus adfert. Sylvestre Glaustum locis incultis & pinguibus provenit. Maio & Iunio mensibus ambo florent. Vt olim, ita & nunc Glausto satiuo infectores lanarum vtuntur. In Neustria quoque Galliæ, & apud eius provincie Bellocasios Glaustum seritur, & colitur, dilutius quidem in pannistingedis quàm quod provenit apud Tectosages, vulgo, (*en lore-*

gois,) indigenis ramen valde fructuosum, & vtile. Quo anno primum terræ mandatur, præsertim si tempestius sequatur imber, quater excinditur, sarculo duobus sub terra digitis adacto, quo tempore foliis nascitur Plantagini similibus, partim supra terram nonnihil extantibus, partim humi procumbentibus. Excisa folia & in acervos congesta post biduum aut triduum, in rotundo pavimento, quadratis strato lapidibus, dentatæ molæ lignæ subduntur, quam oculis panno tectis versat equus: Sequitur equum circumeuntem villicas, qui pala herbam à mola disiectam in lapides referat, & conuerrat, vt à prætereunte denuo mola frangatur. Vbi satis obtritum Glaustum videtur, rustici manibus comprimentes, sanies succosa vt eliciatur, quæ principio nigra atramenti ferè modo in cœruleum post colorem abit, globos ex herba tusa conficiunt, quantum capere & amplecti vtraque manu possunt, & eos partim insolatu, si cœlum sudum est, siccant, prope molam, & arcam vicinam, partim si pluit, aut obstat tempestas humidior, in perticis sub tecto ædibus rusticorum affixis, & ad Oriëntem vel Septentrionem versis, ordine dispositos, quos duratos & exiccatos cōdunt saccis, & ad vsum eius tincturæ seruant, quæ nigro colore pannos inficit. Anno deinde proximo triticum eidem agro mandatur, qui Glaustum aluit: non enim Glausti prouentu is emaciatur, sed lætificatur potius: & ex radicibus, quas firmas & altius

& altius impactas aratri culter nequit proscindere, ac extirpare, cū segete pululant Glasti caules, qui in alteram sationem semen præbent, maioris quàm triticum pretij, quo manso vel aliàs trito, & salua vel alio liquore madido, apparet statim color è cæruleo purpurascens quo indigenæ manicarū corium nondum sordidum tingunt. Est enim illis vt & olim Britannis, gratissimus eius coloris aspectus. Cæruleam spumam innatantem, quam igni feruescentes eructant cortinæ, Indum nostri vocant infectores, & ad pictorum vsus siccant. Simile, inquit Plin. Glastum in Gallia vocatur, quo Britannorum coniuges nurūsque toto corpore oblitæ, quibusdam in sacris & nudæ incedebant, Æthiopum colorem imitantes. Omnes verò, Cæsar inquit, se Britanni Glasto inficiunt, quod cæruleum efficit colorem, atque hoc horribiliore sunt in pugna aspectu. Illita folia Isatidis, teste Dioscoride, tumores omnes discutiunt, cruenta vulnera glutināt, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, phagedænas, putrescentia vlcera, & quæ serpunt, sanant. Syluestre Glastum eadem præstat: potu & illitu lienosis auxiliatur. Glastum inquit Plinius sanguinem sistit: phagedænas, & putrescentia vlcera quæ serpunt sanat: item tumores ante suppurationem. Contra ignem sacrum radice vel foliis prodest, vel ad lienes potu. Isatis satiua Galeno, qua vtuntur tinctores, facultatis est valenter exsiccantis, nondum tamen mordentis. Est enim simul amara atque adstringens Proinde magna vulnera corporum durorum glutinat, etiamsi in capitibus musculorum fuerint: vel sanguinis profluvio laborantibus partibus vtiliter illinitur: tumores œdematodæ mirificè digerit, simul ac reprimat, & aduersus omnia vlcera maligna, & cacoethe mirabiliter resistit, etiamsi putrescant, etiamsi exedantur ac erodantur. At si nonnunquā pro ægri natura valentior appareat, foliis eius tritis miscere oportet, aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticum, aut polentam, pro vincente nimirū in vnoquoque affectu. At Isatis syluestris manifeste iam acre quiddam tum gustu, tum effectu profert. Valentius enim quàm satiua siccatur, Valentiúsque humidis etiam putredinibus resistit, ad cætera iam dicta deterior, quoniā moderatius & minus mordaciter siccatur. Vlceramque talia irritantur his remediis, & phlegmone inflāntur. Cæterum ob potentiorē facultatē lienosis quoque utilis fuerit, cum altera imbecillior tantum prodesse nō possit.

Li. 22. ca. 1.

Li. 5. Bel. ga.
Li. 2. c. 180.

Vires &
Temper.

Lib. 20. c. 7.

Lib. 6. sim.

HERBA
Lutea.



HERBA LVTEA, CAP. LXVI.

HERBA Lutea & Luteola ab effectu nūcupata, foliis est prælongis, pinguibus, & arctis: cubitali caule, interdum altiore, toroso: flore luteo, frequentibus in cacumine folliculis, decussatis, asperis, sed tā denso stipatu fastigij, vt ij quādam spicarum imaginem monstrent, iis semen includitur: radice nititur longa, singulari, crassa. Multis locis quāuis sponte nascatur, magno tamen compendio ferūt in agris, & nisi fortuna domino decoquat, magnum rusticus ex ea sentit prouentum, quoniam eruta solo radicitus, in fasces magnos cogitur, vsurpaturque ad infectus. Siccata in luteum colorem pallescit, aut certè languet in pallidū. Cortinis infectoriis indita, luteo quoq; colore pannos tingit, cuius apud nos maximus increbuit vsus. Præterea infectores colori cæruleo, quem Glastum excitauit, superinducunt, & viridem efficiunt colorem.

Nomen.
Forma.

Locus.

Vsus.

MEDI

Nomina

Li. 18, c. 16.

Genera

Forma


MΗΔΙΚΗ Græcis, similiter Medica Latinis dicitur, Arabibus *Cot*, & *Alfasat*, Hispanis *Alfalse*, & *Alfafa*, & *Eruaye*, nomine ab Arabibus mutuato, Gallis *Saintfoin*, & *Foin de Bourgongne*. Medica natales suos ipso nomine fatetur, locumque vnde venerit, vocabulum indicat. Externa olim Græciæ, inquit Plinius, à Medis est aduecta, per bella Persarum, quæ Darius intulit. Hinc gentile nomen retinuit. Medica duplex est, satiua, & syluestris. Satiua multos edit cauliculos, teneros, rotundos, in altum nō assurgentes, sed per humum sparsos, vt in Trifolio vulgari: folia trifolio eidem similia: flores parui, purpurei, siliquæ compressæ, instar testæ cochlearum intortæ, in quibus semen. Hæc est Dioscoridis Medica, quæ, vt describit, cum receter prodit, foliis & caule, Trifolio pratensi similis est, augescens verò folia contrahit, & caules edit Trifolij ac siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen Lentis magnitudine dependet. Græca verò ita habent, ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα προσπέφυκε φακὶ τὸ μέγεθος, ἐπετραμμένων ὡς κεράτιον. Id est, in quibus semē adnascitur Lentis magnitudine, corniculi modo intortum. Cornarius *κεράτιον* hic siliquam paruam significare dicit, & siliquulæ modo intortum vertit, suspicaturque hoc loco Dioscoridis lectionem corruptam esse in seminis & siliquæ descriptione. Sed multo verisimilius est Dioscoridē hīc vt sæpe alibi τοῦ σπέρματος nomine abusum fuisse, vt semen pro seminis conceptaculo, siue siliqua vsurpauerit quam corniculi modo intortam esse, ipsius rei inspectio apertè demonstrat. Plinius Dioscoridi de caule ac foliis consentit, semen omittit. Similis est Trifolio, inquit caule, foliisque, geniculata. Ea cum in caulem assurgit, sic enim legendum, folia contrahuntur, id est vt ait Dioscorides, angustiora fiunt. Est & huius Medicæ ē floris colore differentia: caruleo violaceo, & luteo. Medicam folliculo spinoso, Trifolium cochleatum vocant. Galli *L'herbe aux limassons*, Præter has Lunaria syluestris altera est, Lunato folliculo ab aliis diuersa, quam ideo Lunatam seu falcatam vocat. Medica syluestris caule & foliis Trifolio pratensi similis est, foliis in ambitu serratis: flore subluteo, clauiculis exilibus: seminis conceptaculo triplicis differentia. Aut enim Latius est, & cochlearum more flexuosè intortum, aut oblongum, angustum, compressum, & turbinum terrestrium modo, qui cochlearum

MEDICA satiua Dodo.



MEDICA SYLVEST.

*prior, fructu triplici,
& diuerso.*



Li. 2, c. 141.

Emb. 133. li.
2. Diosco.

Li. 18. ca. 16.

generi

MEDICA SYLVEST.

altera Luneta.



generibus adscribuntur, obliquis voluminibus sinuosum, ac tuberculis inæqualibus velut nodosum: aut iisdem volutis tortile, sed veluti festucaceis, superioréque longè crassius & amplius, & in summo obtusius, insigni varietate. Medica sativa in usu plurimo est quibusdam Romanæ provinciæ gentibus, præsertim Secteriensibus, qui rigua prata eius semine conferunt, ter secantes, restibili & inexhausta fertilitate. *Lucerne*, ij vocant, & *Lu-zert*. Medica sylvestris passim in agro Monspeliensi & Turnonio gignitur in cultis, & se-pibus. In Hispaniæ plerisque locis, præsertim in Regno Valentino, ubi seritur quoque dili-genter: ea iumenta saginant. Tanta dos eius est, inquit Plinius, ut vno satum amplius quàm tricenis annis duret. Medica semel sata, au-ctore Palladio, decem annis permanet, ita ut quater, vel sexies possit per annum recidi. Agrum stercoret, maiora animalia reficit, cu-rat ægrotata. Ad maciem mularum, ut Columella prodidit, nulla res tantum, quantum Medica prodest. Ea herba viridis, nec tardè tamē arida

Locus.

Li. 18. ca. 16.

Lib. 5. ca. 10.

Vsus.

Lib. 7. c. 38.

Fœni vice saginat iumenta. Verum modicè danda, ne nimia sagina stranguletur pecus. Semen Medicæ, ut tradit Dioscorides, siccatum iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Viride quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro Gramine utuntur qui pecora alunt.

Li. 2. ca. 141.

TRIFOLIUM,

CAP. LXVIII.

TΡΙΦΥΛΛΟΝ Græci vocant, quod Latini Trifolium, Galli *Treffe*, Itali *Trifoglio*, Germani *Vuysenkle*, Hispani *Treuol*, Anglis *Clauer*. Trifolij non recentiores modò, sed & veteres multa fecerunt genera. Dioscorides enim & si proprio capite Trifolium Asphaltites tantum descripserit, tamen Trifolij alterius, nimirum pratensis aliquoties meminit, cum ait Medicam caule & foliis Trifolio pratensi proximam esse. Plinius tria Trifolij genera memorat. Folio coronat & Trifolium, inquit, Tria eius genera. Menianthes vocant Græci, alij Asphaltion, maiore folio, quo non utuntur coronarij, nimirum propter grauem & foetidum odorem: alterum acuto, Oxytriphyllum cognominatum. Tertium ex omnibus minutissimum. Recentiores multo plura genera numerant, de quibus simul omnibus eodem loco minimè dicendum. Primum igitur de Trifolio Asphaltite Dioscoridis agatur. Id Tripyllon Græci, inquit alij Oxytriphyllum, alij Menyanthes, alij Asphaltion vocant. Frutex supra cubiti altitudinē attollitur, virgas habens tenues, iunceas & nigras: ex his tanquam ramulis enascuntur exiles appendices, in quibus ter-na singulis germinationibus exeunt folia, Loto herbæ similia. His recenter natis Rutæ odor inest, adulta verò, Bitumen olent. Florem edit purpureum: semen quadantenus latum, subhirsutum, extrema parte altera exertum, antennæ modo corniculatū radix tenuis, lōga, valida, ὄξυτριφυλλον plurimum in Sicilia nasci Scribonius tradit, in Italiæ regionib⁹ nusquā sibi visum, nisi in Lunæ portu, Britanniam petenti cum diuo Claudio Cæsare, & copiosissimum super circūdati

Nomina

Genera.

Li. 2. ca. 141.

Li. 21. ca. 9.

Li. 3. c. 106.

Forma

Dodon. in histo. fru.

Cap. 163.

monti

TRIFOLIUM ASPHAL-

tites rotundis foliis.

TRIFOLIUM ASPHAL-

tites longioribus foliis.

montibus: (esse autem foliis specie, ac numero similibus communi Trifolio, nisi quod huius crassiora folia quasi lanuginem quandam super se habent, & in extrema parte velut aculeum eminentem, eumque fruticem bipedalē, aut etiam ampliorem conspici, ac odorem grauem emittere, quorum nihil in pratensi Trifolio inuenitur. Matthiolus Scribonij hoc Oxytriphylon, non Asphaltites esse putat, sed secundum genus à Plinio memoratum & ob acutum-foliū Oxytriphylon cognominatum Officinarum Alleluia. Tragus Cytisum esse credit. Eius figuram inter Cytisos supra nos exhibuimus. Triphyllum, quidam Asphaltion, inquit Galenus, quidam Oxytriphylon, nonnulli Menyanthes, sunt & qui Cnicinum vocant, prima quidem tria ab accidentibus frutici, reliqua duo nomina haud scio vnde (libro de Theriaca ad Pisonem, Trifolium semen habet Cnico sylvestri simile: cognomē inde fortassis Cnicini, *μειάνθες*, non *μειάνθες*, quidam vocatum putant, quod diutissime flos permaneat.) Vis ei calida & sicca vt Bitumini, cui odore quoque simile est, vtrumque tertio ordine. Proinde potum laterum dolores ab obstructione natos iuuat, & vrinam, mensesque prouocat. Hippocrates Trifolium non solum menses prouocare, sed & foetus cum sumptum, tum appositum educere tradit. Mulier, inquit, si ex partu non fuerit purgata, Trifolium in vino albo bibendum dato: hoc etiam menses educit & foetus. Idem alibi. Trifolium appositum menses erumpere facit, & foetum eiicit. Semen & folia, Dioscoridi, in aqua pota pleuriticis, vrinæ difficultati, comitialibus, & iis qui aquæ inter cutem principia sentiunt, foeminis quoque vuluæ vitiis oportunis auxiliantur: menses ciunt ternæ drachmæ seminis dandæ: foliorum quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota præsidio sunt. Tradunt aliqui totius fruticis, radicis, foliorumque decoctum, fotu dolores eorum finire quos serpentes percusserint: quæ autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vlcus habuerit, perinde

In c. 106 li.
2. Dioscor.

Lib. 8. sim.

Vires &
Temper.

Li. 2. c. 106.

perinde afficitur, ut à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum vino potui dēdere, & in quartanis quaterna, ut quæ Febrium circuitus discuterent. Radix antidotis miscetur, ut Dioscorides ait. At veteres alij non radicem modò, sed & semen ipsis admiscuerūt, ut in multis compositionibus apud Galenum videre licet, Theriacis videlicet Ælij Galli, Zenonis, Laodicensis. Claudij Apollonij, Eudemi, Heraclidis, Dorothei, & Heræ. Plinius Dioscoridis sententiæ repugnare videtur, & eum reprehendere, cum hæc scribit. Trifolium scio credi prævalere contra serpentium ictus, & scorpionum, ex vino aut posca, seminis granis viginti potis: vel foliis & tota herba decocta: serpētēsque numquam in Trifolio aspici: Præterea à celebratis auctoribus contra omnia venena pro antidoto sufficere xxv. grana eius quod Menyanthes appellauimus, tradi. Multa alia præterea in remediis eius adscribi. Sed me contra sententias eorum grauißimi viri auctoritas mouet. Sophocles enim Poëta venenatum id dicit. Simus quoque medicus decocti aut contriti succum infusum corpori, easdem vredines facere, quas si percussis à serpente imponatur. Ergo non aliter vtendū eo quàm contra venena censuerim. Fortassis enim & his venenis inter se contraria sit natura, sicut multis aliis. Item animaduerto semen eius cuius minima sunt folia vtile esse ad custodiēdam mulierum cutis gratiam, in facie illitum. Eandem Simi medici sententiam Galenus etiam habet in libro de Theriaca ad Pisonem. Trifolium, inquit, herba quæ Hyacintho similis est, veris tempore prægnans cū semē agresti Cnico simile habet, si quis tunc ipsam validè decoquat, deinde morsum phalangij aut etiam viperæ ea aqua perfundat, sanat ipsum, & statim doloris exortem efficit: Si verò quis in alio non commorso sanum locum eodem fomento perfundat, eundem sensum, & eosdem dolores omnes commorso similes inducet, ut hīc effectus reuera admiratione dignus sit, eandem herbam & morsum sanare, & sanum locum bestiarum venenatarum modo malè afficere. Hæc porro Galeni sententia à Dioscoride dissidere videtur, aut certè, quod parum verecundè quidam dicunt, Dioscoridis sententiam Galenus non intellexit. Alij Galeno patrocinantes librum hunc inter spurios referunt. Dioscoridis hæc sunt verba, ἱεροῦσι ὃ ἐνιοι ὅτι τὸ ἀφελήμα ὄλου τοῦ θάμνου, καὶ τῆς ρίζης, καὶ τῶν φύλλων χαλαντλήμνον ἐπὶ τῶν ἐρπετοδίκλων παρὰ τείται τὸς πόνας. ὃ ὃ ἀνθεραπευθῇ τις ὕδατι, ἀν' ἑτερος ἔλκος ἔχων χαλαντληθῇ, τὰ αὐτὰ πάσχει τοῖς πληθεύσι. Id est, Quidam narrant totum decoctum fruticis, & radicis, & foliorum, si commorsis à serpentibus affundatur, dolores eximere. Verum si ea aqua qua quis curatus fuerit, alij qui vlcus habeat affundatur, ipsum eadem pati quæ illi qui commorsi fuere. At si de eadem numero aqua Dioscoridis verba non accipiantur (nam miri nihil in ea re inesset) verum de ea quæ eadem specie est, quæ contrariam vim in commorsis quos sanat, & non commorsis quos lædit, non sine admiratione ostendit, si etiam negatio quæ apertè deesse videtur, inferatur, ἀν' ἑτερος ἔλκος μὴ ἔχων, & cætera, eadem planè erit Simi Medici, & Galeni, & Dioscoridis sententia. Nam ita sanè Galenus habet, ἐπ' ἄλλα μὴ δεδηγημένους. Trifolio huic bituminoso aliud quoddam simile reperitur peregrinum ex America trifolium Caules hoc profert ab radice complures, rotundos, ramosos, in latus declinantes: folia in singulis pediculis terna, in viridi sub nigra, figura rotundiuscula, primis è radice exeuntibus bituminosi Trifolij forma, colore & odore quoque quadantenus similia, latiora tamen, & per ambitus magis cretata: flores in summo ramulorum exeunt, exigui, subcandidi, spicatum digesti, fructus inde rotundi, aliquantulum plani. Radix in plures diuiditur. Ex America in Belgium delatum semē Iulio & Augusto floret. Trifolij bituminosi speciem esse odor grauis, & illius odori haud multum absimilis, ostendere

Li. 2. Antid.

Li. 21. ca. 21.



Li. 4. ca. 37.
Cap. 314.

Forma

Tempus.

Vires &

tempera.

Li. 4. ca. 37.

Cap. 314.

videtur. His subiungemus aliud Trifolium, quod Lotus urbana Dodonæo Asphaltæū vel Trifolium odoratum alterum dicitur, Gallicè *Treffle odorifera*, Germanicè *Sibengezeil*, propterea quod singulis diebus septies odorem suum habeat, & toties etiam amittat, quamdiu in horto creuerit: decerptum enim & exsiccatum odorem suum perpetuò retinet, qui certe instante pluuiosa temporis constitutione ac tempestate multò vehementior est, vt nonnunquam totas ædes in quibus hæc herba reposita est odore suo compleat. Potest & dici Trifolium satium. Cauliculos habet erectos, rotundos, inanes, cubitales aut longiores, ramulos multos, folia in singulis germinationibus terna, Trifolio similia, leuiter serrata, flores in exiguis veluti spicis, pallidos ex cæruleo albicantes, quos aspera sequuntur capitula, in quibus semen Fœnogræco minus. Radix fibrata est. Semel satum facile prouenit, & ex semine deciduo quotannis reuiuiscit. Iulio mense floret, deinde semen producit. In calido frigidòque temperatum esse scribit Dodonæus, & siccitatis quadantenus particeps: œdemata ad suppurationem perducere appositum: succum eius cum melle mistum, oculorum caligines discutere. Tradūt quidam Oleum in quo huius Trifolij flores maduerint, vulnera recentia conglutinare, item fracturas. Fuchsius perperā Trifolij Asphaltitis vires omnes à Dioscoride assignatas huic Trifolio attribuit.

LOTUS,

CAP. LXIX.

Nomina

Genera.

Li. 4. c. 107.

Lotus arbor de qua diximus: est & Lotus herba de qua nūc agendum post Trifolia. Λωλός hæc Græcis dicitur, Latinisq; pariter Lotus, Arabibus *Handachocha*, *Garch*, *Thus*, Italis *Loto domestico*. Loti genera multa. Dioscoridi duo, Λωλός ἡμερος, Lotus urbana, & Λωλός ἄγριος Lotus sylvestris. Alij plura recensent, vt dicemus. Quæ legitima Lotus sit, siue urbana, siue sylvestris ambigūt adhuc herbarij, & fortasse ignorant. Certè

Matthioli.


altera Matth. Melilotus
 Officinarum.



Certè eas veteres Trifolij generibus adscripsisse videtur. Sed Loti urbanæ histo-
 riam ita prætermisit Dioscorides, ut ne vnam quidem ex illo notā eius colligere
 possimus. Sunt qui Trifolium illud quod in pratis passim atque etiam alibi pro-

Li. 4. c. 106.

LOTVS SYLVESTRIS
 Matthioli.



uenit, Lotum sativam esse putant, ea fortè ra-
 tione ducti, quòd scribat Dioscorides Lotum
 hanc Trifoliū vocari. At eam in hortis nasci
 non in pratis idem Diosc. subiungit. Alij cre-
 dunt Lotū sativam esse eam plantā quam vul-
 gares herbarij, & Officinæ Italicæ Melilotum
 falsò appellant, utpote quæ foliis constet, Tri-
 folij effigie, nascaturque nō in pratis tantum,
 sed etiam in hortis ac viridariis. Verum nihil
 causæ est cur quis huic sententiæ certò assen-
 tiatur, quæ opinione duntaxat, nō rationibus,
 neque auctoritatibus nixa sit. Matthi. prima
 commentariorū Latinorum in Diosc. editio-
 ne Lotum sativam quæ hîc picta est exhibuit.
 Dodon. eandem pri⁹ quidē pro Loto sylvestri
 deinde in frumēt. Historia p Trifolio cornicu-
 lato, siue Trifolio sylvestri luteo, Multos edit
 tenues & infirmos cauliculos, humi procubē-
 tes, folia incana, Trifolij, minora, & angustio-
 ra, flores splendentes auri penè colore in sum-
 mis virgulis, veluti exiguas spicas sequuntur
 siliquæ ternæ aut quaternæ, oblongæ, tenues,
 teretes, & angustæ, in quibus semina parva &

Ibidem.

Ibidem.

Lib. 4. c. 38.

Forma.

rotunda. Radix dura, lignosa. Nascitur multis Germaniæ locis, in Belgio familiarius, ubi secus vias & agrorū margines passim reperitur. Floret æstate. Astringit, refrigerat & siccatur. Incipientibus inflammationibus utiles, & omnibus quæ reprimi ac refrigerari desiderant. Melilotum Coronatā Pena & Lobellius⁹, vocant:

LOTVS SYLVESTRIS

altera Matthioli.



Ibidem.

Locus &
forma loti
sylvest.

Lib. 4. c. 38.
Forma loti
sylv. mino.

LOTVS SYLVESTRIS

minor Dodonæi.



Cap. 35.

Forma
alius syl.

Forma
Lybici.

Melilotum Germanicā Fuchsius Idem Matth. secunda & tertia commentariorum in Diosc. editione Lotum urbanam esse censet, Trifoliū illud odoratū quod aliàs pro Cytiso vsurpauerat. Id Romæ vulgo *Tribolo*, dicitur, & alibi in Italia *Trifoglio Cauallino*, quod eius pabulo maximè delectetur equi, Officinis Melilotus. Est enim omnino Trifolij genus odore eximio ac suavi. Quare vnguentarij, & qui odoratis aquis conficiendis dant operam, ex hac quoque planta stillatitiam aquā eliciunt. Præterea affirmat Matthiolus eius succo oculorum nubeculas deleri De Loto urbana Dodonæi, quæ est hortorū fatiua Lotus, diximus superiore capite. De Loto sylvestri primū nihil certi scripsit Matthiolus, herbam tamen ait, quæ hîc picta ostenditur, sæpius se vidisse ac legisse in incultis ac pratis nascentē, foliis Trifolio æmulis, bicubitali caule, quamplurimis adnatis, luteis floribus, è quibus cornicula prodeunt, semine plena, Fœnogræco simili, odore non ingrato. Sed an sit vera Lotus sylvestris nondum sibi compertum esse fatetur. Aliam Lotum sylvestrē proposuit Dodonæus quæ & minor dici potest. Cauliculos habet valde tenues, rotundos folia Trifolij, flores Luteos in capitulis rotundis, in quibus tandem semen oritur nigrum, incuruum, folliculo nigro contextum, circa capitula ordine dispositum. Fuchsius Trifolij pratensis genus esse putat, & Luteum appellat. Matthiolus pro Loto sylvestri exhibuit secunda & tertia commentariorum in Dioscoridem editione alterum corniculatum Trifolium nuper descriptum, in Bohemia copiosum, foliis Trifolij, caule cubitali, ramoso, alis multis: flore in capitulis cæruleis: semine Fœnigræci, sed paruo & odorato. Aliam Dalechampius Lotum sylvestrem siue Lybicum hîc depingendam curavit, radice crassa, valde fibrata: caule procero, duobus cubitis altiore, ramoso, vastis ramis huc illuc diffusis, foliis Loti pratensis, geminis, caulem & ramos ex intervallis alarum modo vestientibus, & iis proximè adhaerentibus pediculo verò ex alæ cuiusque sinu emergente, longiusculo, cui terna folia insident, simul iuncta,



iūcta, & vt in omnibus Trifoliis disposita: flore in ramorū vertice denso & coaceruato, penè vmbellæ specie, ex albo subrubente. Ad ripam Ladi amnis haud procul Monspelio in stagnum marinum defluentis prouenit. Hæc planta cum Loto syluestri Dioscoridis maximè congruere videtur, ita scribentis. Syluestris Lotus quam aliqui Lybicam appellant, plurima quidem in Lybia gignitur. (Sic enim ex Græco legendum. Λωτός ἄγριος, οἱ ὃ

Locus.

Li. 4. c. 107.

LOTVS PRATENSIS
 purpurea.




λίβυον καλεῖσι, φέρεται μὲν πλεῖστος ἐν λιβύῃ, non vt vertit Ruellius. Lotus syluestris quam Trifolium minus appellant, absurdè quī, enim planta bicubitalis, & sæpè maior, ac ob id Trifolia omnia magnitudine superās, Trifolium min⁹ rectè dici posset: caule bicubitali, & sæpè maiore, alis multisfoliis Loto Trifoliæ pratēsi similibus (non vt Ruellius interpretatur, foliis Trifolij pratensis, sic enim Græcè legitur. Φύλλα ὅμοια λωτῷ τριφύλλῳ τῷ ἐν χορτοκοπέτοις γεννωμύῳ) semine Fœnigræci, multo minore, gustu medicato. Idem Dalech. Lotos alias esse obseruauit, quarum historias subiungo. Lotus Latifolia radice est tenui, modicè fibrata, foliis multis, humi quaquauersum iacētibus, quæ ex multis foliolis constant, inæqualiter dispositis, suprema parte grandioribus & latioribus: caule dodrantali, flores densos sustinente, priusquam aperiantur subrubētes, cum reclusi sunt, luteos. Fert semē paruum in breuibus siliquis. Quidam plantā istam Anthyllidem maiorem

Forma lat.

Locus. LOTVS ENNEAPHYL-
los Dalechampij.



LOTVS ASPERIOR,
fruticosa Lobellij.




habet, ita etiam exsiccandi, in caliditatis frigiditatisque coniugatione media quodammodo, & temperata. Lotus verò agrestis plurima in Lybia provenit. Eius semen secundi est ordinis excalfacientium, habetque nonnihil absterforium.

vocant. In aridis, macris, & sabulosis provenit. Lotus pratensis purpurea radicem gignit gracilem, candicantem, parum capillatam: cauliculos multos, fere pedales, surculosos: folia Loti nunc terna, nunc quaterna, exigua: flores in ramulorum vertice copiosos, purpureos. In pratis & humidis locis nascitur. Lotus Enneaphyllos radice firmatur breui, sub nigra, valde fibrata: cauliculos edit multos, per terram sparsos, vel supra terram paululum extantes: folia Loti in singulis pediculis novena: qua ex causa Enneaphyllum cognominarunt: flores luteos inserta congestos: semen paruum in corniculis longis & gracilibus. In pratis & terrarum aggeribus gignitur. Iisdem in locis altera non dissimilis, foliis eodem ordine collocatis, sed non perpetuo novenis: flore simili, sed purpureo: semine iisdem corniculis incluso. Postrema erit Lotus asperior fruticosa, sine Narbonensis, incana Lotus Lobellij, tota facie Lotis similis: In caulibus rigidis, pallidis. dodrantalibus, folia terna, incana, Loto pratensi Monspeliensi angustiora, Cytiso ferme paria, dorycnio latiora. Cauliculis summis luteoli flosculi exeunt, minores quam in Loto, & aliquantum cani. Nunc de Loti facultatibus dicendum. Loti sativæ succus, inquit Dioscorides, addito melle oculorum argema, nubeculas, cæterasque caligines discutit. Sylvestris Lotus calfaciendi, & leniter adstringendi vim habet, vitia cutis in facie maculasque cum melle peruncta purgat. Trita per se aut cum Malvæ semine, in vino aut passo bibitur aptissimè contra dolores qui vesicam male habent. Plinius. Loto qui arborem putant tantum esse, inquit Plinius, vel Homero auctore coargui possunt. Is enim inter herbas subnascentes deorum voluptati Loto primam nominavit. folia eius cum melle oculorum cicatrices, argema, nubeculas discutiunt. Hæc Plinius cum tradit, de Loto sativa, foliis eius tribuit, quod Dioscorides expresso succo. De sylvestri siue Lybica Loto, quod sciam nihil scripsit. Galenus verò Loti effectuum causas reddidit his verbis. Lotus sativa, quam quidam Trifolium nominant, ut mediocriter abstergendi vim

MELILOTVS, CAP. LXX.

MΕΛΙΛΩΤΟΣ Græcis hæc planta dicitur, Latinis Melilotus, Ca- Nomina
 toni Serta Campana, Celso, & Plinio, Sertula Campana, aliis Coro-
 na Regis. Meliloti nomen Officinæ retinuerunt. Italis *Meliloto*, &
Trifolio Cavalino, Anglis *Melilote*. Sertulam Romani veteres dixerunt,
 quod flos eius coronamentis dicatus sit, & quia ex ea antiquitus coronæ & ser-
 ta factitata sunt. Campanam, quod in Campania Italiæ, laudatissima sit: Coro-
 nam autem regiam, quoniam luteis floribus supernè coronetur. Melilotus vul- Genera
 garis qua pro legitima Officinæ vtuntur, quorundam est Lotus urbana, teste
 Matthiolo, vt diximus paulo antea, Trifolium odoratum Dodonæi, vulgaris Matth. in
cap. 41. lib.
3. Dioscor.
 tres aut quatuor pedes alta est, caule in ramulos statim à radice diuiso: folia ter-
 na, Trifolio similia, per oras lente, ac minutim diuisa: Flores lutei in breuib.
 spicis: deinde semen in exiguis, nigris, ac latiusculis siliquis, paruum, pallidum.
 Radix longa est. Tota herba odorata est, præcipuè flos qui odor siccescentibus
 ipsis intenditur. Melilotus vera, siue Italica, aut Campana, cubitali est altitudi-
 ne, statim à radice fruticosa, ramis multis, exilibus: foliis Trifolio proximis, ex Forma.

*MELILOTVS Vulgaris, siue
Trifolium odoratum Dodonæi.*



*MELILOTVS, siue
Sertula Campana.*



angusta origine in latum sese diffudentibus, & longo appensis pediculo: flo-
 ribus Melinis, paruis: siliquis repandis, numerosis, pluribus ex vno ramusculo
 pendulis, in quibus semen inest minutum, subrufum, odoris non ingrati, quo
 vtendum: radix inutilis, & superuacua. Nascitur laudatissima in Africa, ait Dio- Locus.
 scorides, & Cyzico, & Chalcedone: eius color vicinus est Croco, boni odoris. Ibidem.
 Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum læguescente, odore in-
 firmo. Meliloton Sertulam Campanam vocamus, inquit Plinius est enim in Lib. 21. c. 9.
 Campania Italiæ laudatissima, Græcis in Sunio: mox Chalcidica & Cretica, vbi-
 cumque verò asperis & syluestribus nata. Coronas ex hac antiquitus factitatas,
 indicio est nomen Sertulæ, quod occupauit. Odor eius Croco vicinus est, &

Cap. II.

Li. 7. simpl.

Vires &

Temper.

Lib. 3. ca. 31.

Cap. 20.

Lib. 24.

Ibidem.

flos ipsa cana. Placet maximè foliis breuissimis, atque pinguisimis. Idem paulo post. Melilotos vbiq̃ nascitur, laudatissima tamen in Attica. Vbicumque verò recens, nec candicans, & Croco quàm simillima, quanquam in Italia odorator, & cādida. Igitur Croco simillima dixit, quod Dioscorides *κροκίζων*. Antea odorem & florem Croco vicinum esse dixerat. Hodie probatissima legitimaq̃ Melilotus non modò in multis Campaniæ locis, sed etiam in Gargano Apuliæ monte prouenit. Melilotus, auctore Galeno, mistæ est facultatis. Habet enim quiddam adstringens: sed & digerit, & concoquit: copiosior enim in eo est substantia calida, quàm frigida. Melilotus Dioscoridi vim habet adstrictoriam. Inflammationem emollit, præsertim quæ in oculis, vulua, sede, aut testibus erumpit, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo affato, aut Fœnigræci farina, Lini semine, aut Polline, aut capitulis Papaueris, intyboue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite illita cum Creta Chia, vino, aut galla sanat: stomachi dolores & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto aut rosaceo madefacta capitis dolorem lenit. Meliloto, si Plinio credimus oculis medetur cum lacte, aut cum Lini semine. Maxillarum quoque dolores lenit: & capitis cum rosaceo: item aurium è passo, quæq̃ in manibus intumescunt, vel erumpunt. Stomachi dolores in vino decocta, vel cruda tritaq̃. Idem effectus, & ad vuluas. Testes verò, & sedem prociduum, quæq̃ ibi sunt vitia, recens ex aqua decocta, vel ex passo. Adiecto rosaceo illinitur ad carcinomata. Deferuescit in vino dulci. Peculiariter & contra meliceridas efficax. Sed vulgati Codices falsò habere videntur lacte pro luteo oui: disertè enim in Dioscoride *ωὐ λεκίθς* legitur. Serapio Meliloti siliquis & seminibus vtendum esse censet, cum ex auctoritate Isaac Ebenamram de Meliloto differit his verbis. Melilotus herba est quæ folia fert rotūda, & viridia, ramulos emittit admodum exiles, in quibus folia rara. Semen gerit in siliquis tenuibus, ac rotundis, quæ grana includunt pauca, glauci coloris, rotunda, infra sinapis magnitudinem. Porro in Meliloto vsum sibi vendicarunt siliquæ, & semina quæ in eis continentur. Ex quibus facile est coniecere, inquit Matthiolus, non esse mirum, si emplastrū quod de Meliloto Officinis dicitur, sæpe medicos fallat, cum in id legitimi Meliloti seminis farina nunquam recipiatur.

TRIBVLVS, CAP. LXXI.

Nomina



ΤΡΙΒΟΛΟΣ *χερσαῖος* Græcis, Tribulus terrestris Latinis dicitur, quod siliqua plantaq̃ Muricata sit, Italis *Tribolo terrestre*, Arabibus simpliciter Tribulus *Hafach*, siue *Haferk*, Hispanis *Abroyos*, & *Abrolhos*.

Genera.

Lib. 4. c. 14.

Lib. 6. Hist.

cap. 1.

Dioscorides duo Tribuli genera statuit, alterum terrestre, alterum aquis familiare, de quo alibi dicemus. Theophrastus duo terrestris Tribuli genera descripsit his verbis: *Ὁ δὲ τριβόλος ἴδιον ἔχει, διότι περικαρπίακινθος ἐστὶ. Δύο δ' αὐτοῦ γένη. τὸ μὲν καὶ ἔχει φύλλον ἐρεβινθώδες. ἕτερος δ' φυλλάκινθος. Καὶ ἐπὶ γοῖς ἀμφω, καὶ πολλαχῶς χεδὺν χιζόμενοι. ὁ περιλάτης δὲ μάλλον ὁ φυλλάκινθος, περιφύεται τὰς αὐλὰς. τὸ δὲ ἀπέρμα τὸ μὲν πρῶτον, σηγαμῶδες, τὸ δὲ ὀψὲς τρύφυλον, ἐπιμελὲν ἐν λαβῶ. Quæ rectius fortasse quam à Theodoro sic verti possunt. Tribulo peculiare est, quod in tegumentum fructus aculeatum gignit. Duo eius genera. Vnum folium Ciceris habet nullis spinis aculeatum, alterum foliis est spinosis. Humi iacent ambo, & quaquaversum ferè disperguntur. Serius germinat qui folia spinosa habet, & circa villarum septa prouenit. Semen præcocus Sesamo simile, serotini rotundum, nigricans, siliqua clausum. Quod hoc loco dixit Theophrastus Tribulum *περικαρπίακινθον* esse, paulo ante dixit τὸν τριβόλον καὶ τῇ περικαρπία φυλλάκινθον*

Cap. I. li. 6.

καλον εἶναι. ἔχον γὰρ ἀκανθας ἐν τῷ περὶ καρπῷ: id est Tribulum habere feminis conceptaculum aculeatum, & folia spinosa: etenim in feminis integumento spinas esse. Tribulo proprietas, inquit Plinius, quod & fructum spinosum habet. Idem alibi: Aliqua & secundum spinam habent folium, vt Tribulus & Ononis. Sed rursum idem dilucidius. Tribulus non nisi in palustribus nascitur, dira res alibi. Iuxta Nilum, & Strymonem amnes, recipitur in cibos: inclinatur in vadum, folio ad effigiem Vlmi, pediculo longo. At in reliquo orbe genera duo, vni Cicerulæ folia, alteri aculeata. Hic & seriùs floret, magisque septa obsidet villarum. Semen ei rotundius, nigrum, in siliqua: alteri arenaceum. In Theophrasti vulgaris nostris exemplaribus *σημῶδες* legimus, id est, Sesamo simile, quo loco, vt apparet Plinius *ἀμυῶδες* legit, vtpote qui arenaceum verterit. Alij non arenaceum in Plinio, sed acanaceum legunt. Tribulo sabulosæ planities mari Adriatico, Tyrrheno, & Gallico mediterraneo vicinæ scatent. Monspelij etiam in aridis & oliuetis serpit, forma Ciceris, ramulis permultis, exilibus, gemino foliorum versu refertis, non Portulacæ, vt legitur in vulgaris Codicibus Dioscoridi, sed Aphacæ, vel Lentis, ideóque pro *ἀνδράχνη* suspicatur Pena, legendum *ἀφάκη* *Forma.* *ἑμοία*, id est Aphacæ, siue Viciæ similia, id quod ipsius plantæ inspectio demonstrat. Pusilli flosculi, luteoli, in pediculis, ex alis exeunt, & qua emergunt infesti aculei, rigidiusculi, sexanguli, quinquangulive, tanquam Murices, medullam &

Lib. 21. c. 15.

Lib. 21. c. 16.

TRIBVLVS Terrestris
Matthioli.



TRIBVLVS MINOR
rectus Dalechampij.



semen ambiunt, per maturitatem & ætatem dehiscentes: radix parua, fibrata, nec altè depacta. Nullius hodie fermè vsus, nisi asinis, quibus pabulum illic est. Tribulus terrestris, in aruis Hispaniæ frequēs est, frugibus infestus. Lolium Tribulos, carduos, lappasque non magis quàm rubos, inter frugum morbos potius, quàm inter ipsius terræ pestes numerat Plinius, vt & Vergilius.

Lappaq, Tribulique, interque nitentia culta,
Infelix Lolium, & steriles dominantur Avena.

Hist. frum.
cap. 101.

Locus.

Lib. 18. c. 17.
Lia. Geor.

Forma
Tribul.
recti.

Duo alia Tribuli genera Dalechampius nouit, quæ hîc depinximus. Alter est Tribulus minor rectus, alter Tribulus minor repens. Tribulus minor rectus radicem emittit dodrantalem, tenuissimam, candidam, capillaceis villis parum fibratam: caulem simplicem, rotundum, quatuor digitos altum, in ramulos dispersum: folia parua, Lenti similia, superiore parte latiuscula, qua petiolo adnectuntur angustiora, per ipsa media excurrente ac eminente costa, in singulis petiolis terna, vt in Loti ac Trifolij generibus. Florem fert Pisi, paruum, luteum: semen exiguis ac rotundis pilulis inclusum, quæ in terram deciduæ suam plantam quotannis ferunt, atque in radice plantæ ex ipsis natæ cum terra effoditur, hærere solent. In arenosis & sabulosis locis gignitur: gustus citra mordacitatem & acrimoniam desiccantis. Tribulus minor repens tota plantæ effigie superiori similis est, nisi quod hic longissimis viticulis per terram repit, & quaternas, aut quinas simul echinatas pilulas gignit. Ille autem breuis est & erectus, binasq; tantum, aut ad summum ternas pilulas edit. Tribulus, aquaticus Galeno, ex humida substantia & modicè frigida, terrestris ex sicca non mediocriter, & frigida componitur: (est enim legēdum *τεριστος ενυδρος, εξ υγρας βοιας, μετεως ψυχρας, χερσαίος δὲ ἐκ ξηρας & μετεως, καὶ ταύτης ψυχρας συνέστηκε.*) In terrestri tamen superat terreum frigidum quod adstringens est, in aquatico aqueum. Propter vtrumq; itaque & contra phlegmonarum generationes, & omnino contra omnes humorum affluxus congruit. Porro terrestris ipsius fructus cum tenuium sit partium, potus, lapides in renibus comminuit. Dioscorides has illis vires assignat Tribulus utrūque, refrigerantis, & spissantis est naturæ, inquit Dioscorides, ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat: vlcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasque per sanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum

*TRIBVLVS Terrestris,
minor repens.*




medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum adfert. Drachma terrestris Tribuli pota, illitæue ictos à vipera recreat: contra venena cum vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virente Tribulo equos saginant, & è dulci semine, ac esculento panem quo vescuntur, faciunt. Tribuli vnum genus Plinio, in hortis nascitur, alterum in fluminibus tantum. Succus ex his colligitur ad oculorum

medicinas. Est enim refrigerantis naturæ, & ideo utilis contra inflammationes, collectionesque. Vlcers per se erumpentia, & præcipuè in ore, cum melle sanat, item tonsillas. Potus calculos frangit. Thraces qui ad Strymona habitant, foliis Tribuli equos saginant, ipsi nucleo viuunt, panem facientes prædulcem, & qui contrahit ventrem. Radix castè purèque collecta discutit strumas. Semen adalligatum, varicum dolores sedat: Tritum verò & in aquam sparsum pulices necat.

VACCARIAM plantam vocant Herbarij, quod eam libenter Vacca depascantur, rubram à floris colore. Pallidæ supra meminimus inter Isatidis genera. Quidam Condurdū Plinij esse volunt. Ea certè circa Solstitium, rubrum siue roseum florem mittit, quod de Condurdo suo, herba Solstitiali, Plinius tradit. Gignitur in agris argillosis inter segetes, radice lignosa, candida, breui, modice fibrata: caule singulari, pedem alto, in

Lib. 26. c. 3.

VACCARIA Rubra
 Maior.



VACCARIA Rubra
 Minor.



vertice tantū furculoso: foliis oblongis, læuibus, pallidis, in fastigio acuminatis, binis simul, ex aduerso sitis, cauli sine pediculo adhærentibus: ex foliorum sinu in plantæ vertice exiles pediculi emergunt, & calices sustinent albos, inferne latos, superne fastigiatos, quinque herbaceis costis distinctos, ex quibus flos promitur, aspectu pulcher, puniceus, quinque foliolis constans, media linea sic diuisis, vt in alia quinque rursus diducantur, & sic distracta decem efficiant: semine rotundo, copioso in supradictis calicibus.



HISTORIAE

OMNIVM PLANTARVM

LIBER QVINTVS,



*In quo describuntur & depinguntur Olera, & herba
qua in Hortis nascuntur.*

B R A S S I C A, C A P. I.



IRIDARIO Hortus proximus est, quo nomine apud antiquos omnis villa dicebatur, ut scribit Festus: quod ibi, qui arma capere possent, orirentur. Et Plinius, in XII. tabulis legum nostratum, ait, nusquam nominatur Villa: semper in significatione ea hortus: in horti verò, hæredium. Κῆπος Græcis hortus dicitur, & Κληρος, quamquam propriè hæreditatem significet. Nicander,

Ἦστι καὶ κληροισιν ἐπιβολὰ τοῖά περ ὦραι
Εἰαλεναὶ φορέουσιν ἐνεψήματα κόουρας.

Nomina

Lib. 19. c. 4.

In Alexiph

Quæ sic Gorraus conuertit.

*Quæq; per æstatem nostris nascuntur in Hortis
Mala, quibus ludunt, delectanturque puella.*

Vnde sumptum Latinorum hæredium, quod pro horto, ut ex Plinio dictum est, usurpabatur, quodque paruum prædium Festus interpretatur. Horti sunt in quibus arbores, & olera potissimum oriuntur, quibus antiquitas nihil prius mirata est, veluti Hesperidum hortos, & Regum Adonis, & Alcinoi, itemque pensiles, siue illos Semiramis, siue Assyriæ Rex Cyrus fecit. Romani quidem Reges ipsi hortos coluere. Quippe etiam Superbus Tarquinius nuntium illum sæuum atq; sanguinarium filio remisit ex horto. Iam quidem hortorum nomine, inquit Plinius, in ipsa vrbe delicias, agros, villasque possident. Primus hoc instituit Epicurus otij magister. Usque ad eum moris non fuerat in oppidis habitari rura. Romæ quidem per se hortus Ager pauperis erat. Ex horto plebei macellum, quanto innocentiore victu? Hinc primum agricolæ æstimabantur prisci, & sic statim faciebant iudiciū, nequā esse in domo matrem familias (etenim hæc cura fœminæ dicabatur) ubi indiligens esset hortus. Quippe è carnario aut macello viuendum esse. Nec caules, ut nunc, maximè probabant, damnantes pulmentaria, quæ egerent alio pulmentario. Id erat oleo parcere. Nam gari desideria etiam in exprobratione erant. Horti maximè placebant, quia non egebant igne, parcerentque ligno; expedita res, & parata semper: vnde etiam acetaria appellantur

Plin. lib. 19.
cap. 4.

Ibidem.

(acedaria Tintianus, accetaria legit Hermolaus, non ab aceto, vt credi cœptum est, sed ab accipiendo deflexa. Ideo enim, inquit Plinius, accetaria appellabantur horti, hoc est hortensia, quoniam expedita res & parata semper esset: nam & acceptabulum ab accipiendo dicitur, etiam si Græci Oxybaphon appellent, quasi ab aceto) facilia concoqui, nec oneratura sensum cibo, & quæ minimè accenderent desiderium panis. Horti igitur ab antiquis, vt & à nobis, & ad voluptatem, & ad necessitatem comparabantur. Nos autem hortum hic describere institui-
 mus, qui λαχανα, idest olera potissimùm continet. Olus autem dicebant quam-
 cumque herbam esculentam, inquit Scaliger, claro indicio priscae frugalitatis, quæ
 ad victum nihil obsonij sibi deesse existimaret, modo ne deesset olus: hoc enim
 ὄλον est, sicut & panis πᾶν. Nec iis solū, quæ nobis vsui cibario sunt hortū instrui-
 mus, sed etiā iis ex quibus remedia vulgò parantur, inuētū facilia, ac sine impēdio.

In lib. 1. de
Plant.

Supra nos glandiferas arbores, easque quæ primū victu mortales aluerunt, nutrices inopis, ac feræ sortis exposuimus, deinde pomiferas, quæq; mitioribus succis voluptatem primæ cibus attulerunt. Sequitur natura hortorum, id est eorum quæ præter arbores & frutices benigna tellure proueniunt, maximè ex quibus viuimus, multa etiam quæ salutis, & quædam quæ voluptatis hominum gratia terra gignit.

Nomina

A Brassica verò quæ omnibus notissima est exordiemur. Κράμβη Græci quasi Κοράμβη, inquit Suidas, quod pupillas oculorum, quas Græci Κόρας vocant, hebetet. In qua sententia fuit Columella, cum scribit,

Lib. de
Hort.

Nunc veniat quamuis oculis inimica corambele.

Et melius κράμβη, quasi κοράμβη dicta est, quod τῷ κορῷ ἄμβη, vel rectius ἀνέβη, id est, quod crapulæ satietatiquæ aduerfetur, vt dicitur. Græci veteres etiam ῥάφανον vocarunt, ob mutuam quamdam amicitiam & affinitatem vtriusuis seminis, vetustioris præsertim, vtramuis plantam generandi. Brassica à Latinis appellatur, quasi præseca, inquit Varro, quod huius scapus minutatim præsecatur: siquidem nunc tonsili, nunc cymoso caule spectatur. Sunt qui dictam existiment quasi passicam, quod ex caule minutatim præsecatur vt passa fiat. Vel ἀπὸ τῆς βράξαι, id est à vocando dictam verisimile est. Estur enim tota à plebecula, tum cruda, tum cocta, vel muria seruata. Vulgò Caulis, quoniam præ cæteris grandi, validoque turgescit caule, à Mauritanis *Corumb*, & *Karumb*, ab Italis *Caualo*, & *Verça*, à Germanis *Koel*, ab Hispanis *Colhes*, & *Couues*, à Gallis *Chou*, à Belgis *Koolen*, ab Anglis *keale*, & *Cole*.

Genera.

Lib. 7. hist.
c. 4.

Brassicæ permulta sunt genera, Theophrasto tria. Τῆς δὲ ῥαφάνου, inquit, τριχῆ διαιρημένης, ὑλοφύλλου τε, καὶ λειοφύλλου, καὶ τείτης τῆς ἀγρίας, ἢ τὸ μὲν φύλλον ἔχει λεῖον, μικρὸν δὲ καὶ περριφερές, πολύκλαδος, καὶ πολύφυλλος, ἔτι δὲ χυλὸν ἔχοντα λεμνω καὶ φαρμακώδη. Διὸ καὶ πρὸς τὰς κοιλίας ἀλῶν χρῶνται οἱ ἰατροί. ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ τῶν εἶναι δλοκδοσι διαφορὰι καὶ ἑτέροι. ἔπειτα ἀπερριμὸν τι γένος ἀλῶν ἐστὶ, ἢ χακώπερριμον. τὸ δὲ ὅλον ἢ ἔλη τῆς λείας ὀχυλωτέρα, καὶ μεγαλοφυλλοτέρα. Id est, Brassica trifariam diuiditur: in eam quæ crispa & in eam quæ læuia folia habet, & tertiam agrestem. Huic folium læue est, paruum & rotundum: multis ramis, multisque foliis constat. Huic præterea succus acris inest, & medicatus, quo medici ad purgandas aluos vtuntur. Similiter priorum Brassicarum hæc videtur esse differentia, quod harum quædam nullum, quædam malum semen habent. In vniuersum autem crispa Brassica & meliore succo, & maioribus foliis est quàm læuia. Notandum autem non hîc solū Brassicam τὴν ῥαφανὸν à Theophrasto nominari, & ita à Theodoro conuerti, sed aliis etiam in locis sæpissimè, in quibus eruditissimus philosophus & medicus Scaliger τὴν ῥαφανὸν pro Brassica vsurpat, non pro radice, neque radícula, quam etiam ῥαφανίδα vocant Græci. Et apud Athenæum ἡ ῥαφανὸς Theophrasti κράμβη esse dicitur: illic enim scribitur. Θεόφραστος δὲ ἔτως γράφει, Τῆς δὲ ῥαφάνου (λέγω δὲ τὴν κράμβην)

In comm.
in lib. caus.
Theoph.
Lib. 9. dei-
pnot.

ἢ μὲν

ἢ μὲν ἐστὶν ἐλόφυλλος, & cætera. Aristoteles quoque de erucis scribens. αἱ δὲ κράμβαι γίνονται, inquit, ἐκ τῶν φύλλων τῶν χλωρῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς ῥαφάνος, ἣν καλεῖσιν οἱ τινὲς κράμβην. Id est, nascuntur erucæ ex virentibus foliis, maximè raphani, quam vocant nonnulli cramben, hoc est Brassicam. Quæ cum Plinius negligētius legisset, imò ne animaduertisset quidē quæ Theophrastus & Aristoteles de Brassica scripserunt, ipse raphano, idest radiculae adscripsit. Ac primùm locum Theophrasti suprâ citatum apertè expressit his verbis, Genera raphani Græci fecere tria, foliorum differentia, crispæ atque lævis, & tertium silvestre. Atque huic lævia quidē, sed breviora ac rotunda, copiosaque atque fruticosa: sapor autem asper, & medicamento instar ad eliciendas aluos. Et in prioribus tamen differentia feminis est, quoniam aliqua peius, aliqua admodum exiguum ferunt. Hæc vitia non cadunt nisi in crispæ folia. At hæc non ad raphanum radicem, sed ad raphanum Brassicam pertinent. Id quod ex ipsiusmet Plinij loco alio demonstrari potest, quo quæ raphani genera illic statuerat, eadem ad Brassicam refert, Catonem qui illa ex Theophrasto transscripsit citans his verbis: Sed Cato Brassicæ miras canit laudes, quas in medendi loco reddemus. Genera eius facit tria. Vnam extentis foliis, caule magno, alteram crispæ folio quam Apianam vocat, tertiam minutis caulibus, lenem, teneram minimè probat: Eadem tria genera alio postea loco idem Plinius repetit. In tres species, inquit, diuisere eam (Brassicam) Græci antiquissimi. Crispam quam Selinada vocauerunt à similitudine apij foliorum, stomacho vtilem, alium modice mollientem. Alteram læam, latis foliis à caule exeuntibus. Vnde caulodem quidam vocauere, nullius in medicina momenti. Tertia est propriè appellata crambe, tenuioribus foliis, & simplicibus, densissimisque, amarior, sed efficacissima. Cato crispam maximè probat, deinde læuam grandibus foliis, caule magno. Quo verò Catonis sententiam de tribus generibus à Plinio citatam, ex Theophrasto descriptam esse dilucidius intelligamus, eius verba hîc adscribenda sunt. Nunc uti cognoscas naturam earum, prima est lævis quæ nominatur. Ea est grandis, latis foliis, caule magno: validam habet naturam, & vim magnam habet. Altera est crispæ, quæ à similitudine apij σελινόειδος vocatur. Hæc est natura & aspectu bona ad curationem: validior est quàm, quæ superscripta est. Item est tertia quæ Κράμβη vocatur, minutis caulibus, tenera & acerrima est omnium istarum, tenui succo vehementissima. Et primùm scito, de omnibus Brassicis nulla est illiusmodi medicamentosior, &c. Deinde Plinius erucarum ortum describens ex Aristotele, de raphani folio dixit, quod Aristoteles apertè se dixisse de foliis Brassicæ declarat loco à nobis citato. Plinij autem verba hæc sunt. Multa autem insecta & aliter nascuntur, atque imprimis ex rore. Insidet hic raphani folio primo vere, & spissatus sole in magnitudinem milij cogitur, &c. Sed de hoc Plinij errore quædam alia postea dicemus. Tria Brassicæ genera agnoscit etiam Eudemus Atheniensis, in libro de oleribus, ut legitur apud Athenæum: Κράμβης φησὶν εἶναι τρία γένη, τῆς γὰρ καλεσμένης ἀλμυρίδος, καὶ λευκοφύλλου, καὶ σελινούσης. τῇ τε ἡδονῇ πελάγιον κεκρίσθαι τὴν ἀλμυρίδα. φύεται δὲ ἐν ἐρετρίᾳ, καὶ κύμῳ, καὶ ῥόδῳ: ἔτι δὲ κνίδῳ, καὶ ἐφέσῳ. ἢ δὲ λευκοφύλλος ἀνὰ πᾶσαν (φησὶ) χώραν γίγνεται. ἢ δὲ σελινούσια τὴν ὀνομασίαν ἔχει διὰ τὴν ἐλόφυλλον: ἐμπερὶς γὰρ ἐστὶ σελίνῳ, καὶ ἡ τὴν ἄλλην πύκνωσιν. Idest, Tria sunt Brassicæ genera: Halmyris, Læophyllos, & Selinusia. Halmyris suauitate cæteras antecellit. Nasitur in Eretria, Cumis, Rhodo, Cnido, Epheso. Læophyllos à læuore foliorum sic dicta, ubique nascens nullam respuit regionem. Selinusia à crispitudine foliorum nomen accepit, ideo quod σελίνῳ, idest apio similis sit, atque etiam densitate. Dioscoridi Brassica alia est ἡμερος, idest, fatiua, alia ἀγρία, idest silvestris, alia θαλασσία, id est marina. Sub fatiua tria iam explicata genera, vel quædam horum complectitur. Sub quæ etiam Ægyptiam comprehendit, quæ in Ægypto propter

Lib. 5. hist. an. c. 19.

Lib. 19. c. 5.

Lib. 19. c. 8.

Lib. 20. c. 9.

De re rust. c. 157.

Lib. 11. c. 32.

Lib. 9.

Lib. 2. c. 123.

Lib.20.c.9. amaritudinem non estur, inquit Plinius. Sed multò plura idem Plinius tradit, ex Lib.19.c.8. cultu, locis, & forma nomen adepta. Præcipuus fit caulis, inquit, sapore ac magnitudine, primùm omnium si in repastinato seras: dein si terram fugientes cauliculos feces, à terræque proceritate luxuriosa attollentes se, exaggerando aliam accumules, ita ne plus quam cacumen emineat. Tritianum hoc genus vocatur, bis computabili impendio tædióque. Cætera genera complura sunt. Cumanum sessili folio, capite patulum. Aricinum altitudine non excelsius, folio numerosius quàm tenuius. Hoc vtilissimum existimatur, quia sub omnibus penè foliis fruticat cauliculis peculiaribus, Pompeianum procerius caule ab radice tenui, intra folia crassescit: rariora hæc, angustioraque, sed teneritas in dote, si frigora non toleret: quibus etiam aluntur Brutiani, prægrandes foliis, caule tenues, sapore acuti. Sabellico vsque in admirationem crispa sunt folia, quorum crassitudo caulem ipsum extenuat: sed dulcissimi perhibentur ex omnibus. Nuper subiere Lacuturres ex conualle Aricina, vbi quondam fuit lacus, turrisque quæ remanet, capite prægrandes, folio innumeri. Alij in orbẽ porrecti, alij in latitudinẽ torosi. Nec plus vllis capitis post tritianum, cui pedale aliquando conspicitur, & cyma nullis serior. Hæc Plinius. Nostris etiam in Hortis plurimæ visuntur Brassicarum species, quædam etiam veteribus incognitæ, quas primùm distribuemus in satiuam & agrestem. Satiuam in albam, nigram, & rubram.

j.Brass.sp.

Brassica satiuæ alba vulgaris notitiæ omnibus conspicua, ea est, quæ læuis à Theophrasto, Catone, Plinio dicitur, caule magno, crasso, grandibus & latis foliis, carnosus, ex viridi seu cæsis candicantibus, in latera diffusis, prominulis venarum toris fruticantibus, tonsili cymarum luxuria: flore tum luteo, tum albo: semine in siliquis. Cum gelicidia sensit, gravior est cibus: tenerescit enim frigoribus: iusculis pinguibus incoqui solet. Cymosum eius cacumen acetariis subministrat, prius subferuefactum, mox oleo salæque diffusum.

BRASSICA ALBA

vulgaris, Lævis satiuæ.

BRASSICA ALBA

crispa.

Altera

Altera Brassica alba ea est, quæ brassica Sabaudica cognominatur, *Chou de Sauoye*, 2. spec. Dodon. Lacuturris, Catonis Crispa brassica, Plinij Sabellica. Etenim crispis admodum foliis lactucae modo in sese concluditur, sed non in tam absolutum orbem coit, quàm Brassica capitata, neque vsque adeo conuolutis interioribus pāniculis, Lib. 5. c. 6.

BRASSICA CAPITATA
Albida.



intus albicans, tenera, subdulcis, & quæ hac ætate præstantissima habetur: flores albos, & semen in exiguis filiquis profert. Hyemem & gelicidia non tolerat. Hæc Brassicæ candidæ secundum genus est Dodonæi.

Lib. 5. c. 6.

Tertia albæ Brassicæ species, cuius folia in orbem conglomerantur, exterius callosa, & per ambitum rugata, multis intus carinarum voluminibus, externis semper interiora complectentibus, numquam nisi cum in florem exeunt dehiscuntibus, eximio candore, miranda teneritudine, humili caule, capite prægrandi, nonnumquam sesquipedē crasso. Brassica capitata vulgo nominata est, quoniam in capitis formam extuberat, Gallis *Chou capu*, idest Caulis capitatus. Nonnulli à candore foliorum album vocant, quo nostra fere rura victitant. Huic hyeme præcipua nobilitas. Plinio Lacuturris est Brassica, vt vult Matthiolus, vt Dodonæus. brassica Tritiana. Sed verisimilius est Lacuturrim nostram esse Brassicam capitatam candidam. Tritianam verò nostram esse Brassicā capitatam viridem.

3. spec.

In libr. 2.
Diosc. c. 123.

Ibidem.

BRASSICA CAPITATA
Polycephalos.



Est alia Brassica capitata polycephalos, radice, caule & magnitudine aliis sessilibus & capitatis par & similis, sed hoc differt, quod spectanda quidem & fere prodigiola naturæ lasciuiantis, vt ita dicam, ostentatione, non vt superior, vnicum caput profert, sed plura, alia ab aliis discreta, in vnum tamen tanquam aceruum congesta, è venosis multis foliis conglobata, alia maiora, alia minora, inusitata quadam & rara specie. Quidam id terræ, cui semen creditur, vbertati adscribunt, quæ tam copiosum alimentum præbet, vt gignendis atque nutriendis tot capitibus sufficiat.

4. spec.

Miranda est alius Brassicæ albæ & peregrinæ natura, quam Dodonæus Pompeianam vocat, aut Cypriam, & Brassicam floridam, *Chou de Cypre*, & *Chou fleuri*, Itali *Caulisiori*. Primùm enim folia profert Brassicæ albæ & lævis modo, quadamtenus cinerea: deinde ex ipsorum medio foliorum conglobatorum veluti centro cauliculos multos, crassiusculos, candidos, dulces, multis & breuibz ramulis vestitos, pari proceritate, & in sese conglomeratos. Hos cauliculos huius Brassicæ florem appellant. Nec

5. spec.

*BRASSICA Pompeiana, aut
Cypria, Brassica florida Dodo.*

*BRASSICA Asparagodes
Dalechampij.*



minùs mira est ea Brassica, quam asparagodem esse herbarij censent, cuius mentio fit in Geoponicis Cassiani Constantino attributis.

6. spec.

Caulis & radix eadem quæ in cæteris Brassicæ generibus. Folia nunc sunt laciniata, & frequentissimis diuisuris incisa, qualia Brassicæ crispæ, nunc plana, lata, & expansa. Eadem nonnumquam tota virent, nonnumquam venis per ipsa folia dispersis, & media costa rubent. Huic vero id peculiare est & insigne, quod ex foliis ramuli multi, breues, torosi, foliosi nascuntur, florentes suo tempore, & semen edentes, nō aliter quàm in reliquis plantis, ex caule, vel stipite, quorum ramulorum cum asparagis similitudo fecit, vt hanc Brassicam asparagodē Græci vocauerint. Hi tenelli asparagi in iure aliquo pingui, vt capi, aut veruecinæ eduntur.

BRASSICA RAPOSA.



7. spec.

In lib. 1.
de Plant.

Admiranda verò magis, & veteribus, opinor, incognita ea Brassica (nisi sit rapitius colis Catonis) quæ γορσυδακράμην nominari potest, idest Brassica raposa, Gallice *Chou rane*, quod caulis in magnum, carnosum, & rotundum caput extuberat rapi modo, intus etiam album sicuti rapum, è quo folia nascuntur, reliquis Brassicis similia, laciniata, viridia, longis, crassisque fulta pediculis. Ex eodem cum albis floribus cauliculi prodeunt. Caulorapum vocat Scaliger. Vidimus, inquit, hunc cinnam vtriusque naturæ. Sed Brassicæ radix sub terra condita fuit, rapum supra terram in stipite turgescerebat. Dodonæo est

est

est Brassicæ candidæ quartum genus. Tuber rapi modo in frusta concisum, & elixum estur cum aceto & pipere, magna eorū voluptate qui Brassicis delectantur. Alij in iure capi veruecinæ & vitulinæ coquunt, sic lautiore apparatu, & meliore gustu: quomodo crambasparagorum parari solent tenelli asparagi, vt dictum est.

BRASSICÆ RVBRÆ
prima species.



BRASSICA NIGRA
Dodonæi.



Hæc albæ Brassicæ genera. Quarum primæ similis est Brassica nigra, Gallicè *Chou noir*, cui stipites longi sunt & proceri, folia grandia, lata, nigricantia, rugis multis asperata: flores lutei: semen & siliquæ vt cæteris.

Brassicæ rubra foliis est magnis, latis, lacinia-
tis, læuibus in viridi fusco rubescentibus, venis
etiam rubescentibus per transfuersum virgatis:
floribus luteis: siliquis longis & gracilibus: se-
mine minuto, rotundo, exterius fusco, interius
flauescente, napi vel rapi semini simili, sed ma-
iore. Hæc Brassica est Cumana & rubra, & Bras-
sica læuis Catonis Dodonæo, quæ prima omniū
à Fuchsio descripta est, Gallicè *Chou rouge*.

Brass. rub.
j. species &
forma.

Lib. 5. ca. 6.

Brassicæ rubræ secunda species superiorem
foliis plane imitatur, sed tempore folia quæ in
medio sunt, alia aliis incumbantia, vt in Bras-
sica alba capitata, conglobantur, eaque rubescen-
tia, aut purpurascentia. Dodonæus Brassicam
Lacuturrem appellat, Galli *Chou capu rouge*.

Brass. rub.
ij. species.

Lib. 5. c. 6.

Tertia species folia habet incisa, cæterum
colore, floribus, & semine primo generi proxi-
ma, Dodon. Brassica σελινοειδής, Latine Apiana.

Brass. rub.
iij. spec.

Ibidem,

Quarta foliis est valde rugatis crispisque cæ-
tera superioribus similis. Nigram Dodonæus
vocat. Fuchsius Brassicam crispam, & σελινοειδή,
idest Apianam à similitudine apij, Galli *Chou*
crispu noir.

Brass. rub.
iiii. spec.

Huic adiungenda Brassica crispa Tragi, quæ
radice, caule, flore, semine, sapore, superioribus
generibus similis, folia gerit plane illis dissimi-
lia, hoc est crispa, & per ambitum incisa, veluti
crispæ lactuæ. Quamquam in hoc genere quæ-
dam frequentioribus & profundioribus, alia
rarioribus & minoribus incisuris dissectæ sint.

Lib. 2. c. 59.

Ad idem genus referenda Lobellij Brassica
tenuifolia laciniata, cuius gemina est varietas.
Prior foliorum laciniatas incisuras ad medium
vsque neruum habet, artemisiæ, eryngijve cam-
pestris ritu, quæ hic appicta est.

Alterius fimbriata magis, laciniata minus
sunt foliata, quæ eadem est, aut valde similis Sa-
bellicæ Dodonæi.

Id postremum Brassicæ rubræ genus ponit
Dodonæus, quod est omnium minimum, & fe-
re siluestri simile. Caulibus & foliis primum

Ibid.

*BRASSICA Crispa Tragi.**BRASSICA Tenuifolia laciniata.**BRASSICA Siluestris.**BRASSICÆ III. Genus Fuchsj.*

genus maximè refert, nisi quod ea minora habet. Vix in cibos admittitur, sed feminis tantùm gratia feritur, ex quo exprimitur oleũ, quod vulgò olei ex naporum semine expressi nomine venundatur. *Huile de nauette* Galli vocant. Hanc tertiam

esse Catonis Brassicam existimat Dodonæus, quæ Crambe propriè dicatur.

Ibid.
Forma
Brassicæ
siluestris.

De Brassicæ sativæ generibus satis multa: nunc de agresti, quæ *κράμβη ἀγρία* nominatur, id est, Brassica siluestris. Foliis & floribus Brassicæ rubræ secundo & vltimo

mo

mo generi planè similis est, nisi quòd Caules foliæque minora habet, candidiora, hirsutiora, & gustu multò amariora. Cui planè similis est tertia Brassicæ satiuæ species Fuchsi, hîc appicta.

Alias duas Brassicæ siluestris species descripsit Cordus. Quædam est, inquit, quæ Lib. 1. plan. ca. 31. caulem erigit bicubitalem, & ferè teretem, glabrum, intus medullaceum, cui statim à terra vsque ad summitatem iunceæ gracilitatis deinceps adnascuntur rectæ virgæ, longitudine cubitali. Sub his iuxta exortum singula sunt folia longitudine digitalia, inferiùs vncie, aut interdum duùm digitorum latitudine, in mucronem desinentia, pingua, & glabra, sine pediculo caulem & virgas veluti sinu quodam circum amplexentia. Totis virgis siliquas erectas producit, digiti longitudine, valde graciles, intus sinapi similia semina continentes, quæ per longitudinem in duas partes tenuissima quadam membrana diuiduntur. Flores vere & æstatis initio in summis tantùm virgis apparent candidi, minimis quatuor foliolis, & paucis staminibus constantes. Floret particulatim. Itaque simul maturas & maturescen-
tes siliculas, simulque flores habet. Radix subest dodrantalis, digiti mediocris crassitudine. Tota herba satiuam Brassicam sapore æmulatur. Alia Brassicæ agrestis species est, inquit idem Cordus, quæ cubitalem habet caulem, teretem, glabrum, Lib. 2. plan. c. 89. aliquantulum concavum, & in ramulos diuisum: folia ex intervallo singula profert secus ramulorum eruptiones, trium aut quatuor vnciarum longitudine, paulo angustiora, subrotunda, glabra, & Brassicæ modo corrofa: flores veris exitu candidos & oblongos fert, quibus singulæ succedunt siliculæ, digito longiores, angustæ & quadrangulares, oblongo nigròque semine plenæ. Radice nititur exigua, lignosa, semestri, & inutili. Folia Brassicam gustu imitantur: semen verò amarius est, & aliquantulum acre. Nascitur pinguibus agris, lento & glutinoso solo. Hæc Cordus.

BRASSICA Campestris
Clusij.



cupari. Eius acrimonia proxime ad Brassicæ facultates hanc plantam accedere indicio est. Perfoliata siliquosa à Lobellio nominatur.

Clusius Brassicam aliam campestrem pinxit Lib. 2. stirp. 1. Hisp. c. 61. & descripsit, quæ caules pedales habet, candidantes, rotundos, ramulos aliquot, folia per intervallo, perfoliata similia, candicantia, colore Brassicæ, gustu feruido, caulémque sic amplectentia, vt tenellæ plantæ plurimum ad perfoliatam accedant, in ramulis ex alis exeuntibus flores insident candidi, Brassicæ floribus similes, deinde cornicula, siue siliquæ oblongæ, quadrangulæ, in quibus continetur semen minutum. Alterum eius genus firmioribus virgis, neque adeo ramosis, cuius folia in summo aliquantulum ferrata, & calidi etiam vt alia gustus: flores priori similes, maiores, leucoij aut violæ matronalis æmuli, purpurei, & floribus Bolbonac non absimiles, vtriusque radix licet dura, fibrosa & candida, annua tamen est. Plurima regno Murciano ad Eliocratam urbem, vulgò horca, in agris & iuxta vias nascitur. Floret martio. Primum genus agro Viennensi etiã frequēs. Incolæ Hispani *Collejon* appellant, quasi Brassiculam. Sunt qui Brassicam semine quadrágulo vocent. Potest etiam Brassica campestris nun-

Brassicam

Brassicæ
marinæ
Forma.
Lib.2.c.125.

BRASSICA MARINA
Soldanella officinarum.



In libr. 2.
Diosc. c. 115.

Lib.2. c.54.

Lib.3.c.54.

In Hort.
Germ.

Ibid.

Locus.

Ibid.

Brassicam marinam his adnumeravit Dioscorides, quæ Græcis *κράμβη θαλασσία* dicitur. A sativa prorsus abhorret, inquit, quod folia ferat rotundæ aristolochiæ, longa, tenuia: singula è ramulis rubentibus exeunt, singulari vt hederæ pediculo: albo succo prædita est, sed paucò, falso gustu, sed aliquantum amaro, pingui concretu. Hanc Brassicam censent herbarij peritissimi eam esse stirpem, quam officinæ Soldanellam & Soldanam appellant, etsi scripserit Dioscorides folia habere rotundæ aristolochiæ, longa. Quippe quæ in maritimis nascatur, ramulis constet rubentibus, ex quibus prodeunt folia, vt in hederæ, quæ lacteum succum emittunt, gustuque salsa & amara, & quadamtenus acria percipiuntur. Quare locum Dioscoridis mendo non carere rectè videtur Matthiolus existimasse, faciliq; librariorum lapsu euenisse, vt folia *μικρά*, idest longa, pro *μικρά*, idest parua nunc legamus. Tamen in nostris Dioscoridis exemplaribus nō legimus huius Brassicæ folia *μικρά* neque *μικρά*, sed *ὀμήκη*, idest prælonga. Dalechampi legit *πορμήκη*, idest porrecta, quod est

verissimum. Quo Dioscoridis loco sic emendato, Soldanella omnibus planè notis Brassicam marinam Dioscoridis refert. In qua etiam sententia cum sit Ruellius, quod Soldana vulgo dicta, vt scribit, cum tota Dioscoridis pictura nulla reclamante nota videatur subscribere, in eo tamen errat, quod eam folio aristolochiæ longæ, atque etiam prælongo esse prodiderit. Rectiùs Dodonæus qui Soldanellæ siue Brassicæ marinæ folia tribuit asari, aut aristolochiæ rotundæ, sed minora. Errat præterea Matthæus Siluaticus pandectarum auctor, quod Soldanellam Arabum Chachile esse crediderit, cum Serapio Chachile vsnæ simile esse, folioque non aristolochiam, sed nasturtium imitari tradiderit. Brassica marina, vt rectè ait Gesnerus, toto genere differt à Brassicis, nec aliud quàm nomen commune habet. Eam opinor ob causam, Dodonæus non cæteris Brassicis, sed similacibus læuibus, & conuoluulo subiunxit. Nam graciles & rubescentes cauliculos, seu viticulas per terram spargit, à quibus exeunt folia parua, rotunda, viridia, hederæ foliis rotundiora, & viridiora, asari aut aristolochiæ rotundæ similia, minora tamen. Flores similaci læui & minori similes, rubescentes siue purpurei: semen nigrum in siliquis, aut rotundis capitulis, vt similacibus: radix longa & tenuis. Denique similaci minori proxima est, demptis foliis, quod rotundiora sint, crassiora, & gustu salsa. Prouenit abundè in Zelandia, & Flandriæ litoribus marinis, in litoribus etiam Veneris, inquit Matthiolus, Aquilecensibus & Tergestinis.

Pena, Brassicam aliam perpulchram marinam siluestrem, à Dioscoridis specie diuersam, locis oriundam Angliæ maritimis ad Portlandiam insulam depinxit, sed quia inculta, neglecta, hispidior tota & prædura est, cymæ ingratiore multò, cibo toleranda tamen. Turnerus *μονόκαρπον* & *μονόσπερμον* à singulari semine vocabat. Sunt enim in florum pallentium alborum congerie eleganti, densa & umbellofa multis in ramis, siliquæ breuiores, crassiusculæ, quibus singulis singulum inest semen, paulo minus piso, Soldanellæ aut orobi æquale: folia eadem ferme quæ Brassicæ nigrae, sed crassiora & lætiore aspectu, & fimbriis vndulatis, plicisq; admo

BRASSICA MARINA
Siluestris, Monospermus Pena.

admodum artificiosis. Siluestris Brassica in maritimis Senensibus, Argentario promontorio, aliisque tum Thyrrheni, tum Adriatici maris littoribus frequens nascitur. Hanc non longè à Terracina vrbe, via qua itur Neapolim plurimam vidisse sese affirmat Matthiolus, foliis domesticæ similibus, sed hyoscyami modo hirsutis, amaro & insuauis gusto. Sic & Dioscorides maritimis præruptisque locis magna ex parte gigni prodidit, satiuæ similem, sed cãdidiorem, hirsutiorẽ, & amaram. Reliquæ Brassicæ in hortis passim proueniunt. Frigidis verò & pluuiis regionibus positio earumdem optima. Salsis etiam aquis iuuari Brassicam, & iis rigatam meliorem fieri tradit Theophrastus: quare nonnullos nitro aquæ permisto aspergere Brassicã, vt Ægyptios, atque ita multò dulciorem teneriorẽque effici, sicuti etsi priusquàm coquatur, sale commaceretur. Martialis nitrata aqua viriditatem conseruari scribit his versibus.

Ibid.

Lib.2.c.125.

Lib.2.caus.
c.7.In Xen.
Corn.in li.
7.commẽt.
phar.local.*Ne tibi pallentes moueant fastidia Caules,**Nitrata viridis Brassica fiet aqua.*

Palladius non nitrata aqua, sed nitrum ipsum

Lib.3.c.24.

inspergi iubet his verbis. Celerius coqui virore seruato, si dum est trium vel quatuor foliorum, nitrum tritum cribello desuper spargas, vt speciem pruinæ candentis imitetur. Quæ ex Geoponicis Cassiani Constantino attributis transcripta videri possunt. Εἰδέναι χρὴ ὅτι τὴν κράμβην ἐν ἀλμυρῷ τόπῳ ποτὶρην προσήκει. διὸ χρὴ περιφύλλῳ τᾷ αὐτῇ γενομένῃ, νίτρον λεῖτον, ἢ ἀλμυρὴν διὰ κοσκίνος καθαροῦ στήσαν παύσειν, ὡς δοκεῖν αὐτὴν πεπαχνῶσθαι. τὸ δὲ τῷ τρόπῳ ἐφανώσερα γίνεσθαι. Quorum quædam cum ex vetere quopiã scriptore, Didymo fortasse (quæ in Geoponicis postea exscripta fuerint) Plinius exprimere vellet, aut non intellexisse, aut alioqui corruptũ locum videtur descripsisse: sic enim ait. Sunt qui plantant (Brassicam) in transferendo alga subdita pediculo, nitròve trito, quod tribus digitis capiatur, celeriorẽ ad maturitatem fieri putant. Sunt qui semen trifolij nitrũque simul tritum aspergunt foliis. Nitrum in coquendo etiam viriditatem custodit: aut Apiciana coctura, oleo ac sale priusquam coquantur maceratis. Hic Plinius trifolij semen habet, pro περιφύλλῳ κράμβῃ γενομένῃ, id est, Brassica trium foliorum, vt rectè Palladius conuertit. Brassicæ Augusto mense potissimũ florent, ac subinde etiam semen proferunt. Brassica satiuæ, vt scribit Dioscorides, aluo idonea est, si modo leuiter feruefacta edatur. Nam percocta aluum sistit, sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur: stomachum autem male habet: acrior est æstiuæ. In Ægypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxã restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendam vrinã validior. Ea condita, siue sale asseruata stomacho inimica est, aluum conturbat. Crudæ succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit (legendum enim Græcè, ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς ὤμης, non ὤμους, id est crudus succus, vt vertit Ruellius) cum vino quoque potus viperarum moribus auxiliatur: cum fœnigræci farina & aceto podagris, & articulorum vitiis illinitur: prodest & sordidis vlceribus, & vetustis illitus: caput purgat naribus infusus: menses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per se illita, aut cum polenta trita conferunt inflamma

Lib.12.c.17.

Lib.19.c.8.

Tempus.

Vires &
Temper.
Lib.2.c.125.

inflammationibus, tumoribusque: epinyctidas, ignem sacrum, leprâsque sanant. Carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent. Elixâ autem ac melli permixta gangrænârum corrosiõibus auxiliantur (meliùs quàm quomodo vertit Ruellius, cocta addito melle aduersus depascentia vlcera, gangrænâsq; valent, cum Græcè legatur, ἐσθιόμενα ἢ καὶ μὴ ἐσθιόμενα μέλιτι πρὸς νομὰς γαγγραινῶν ποιεῖσι.) Cruda verò cum aceto si edantur, lienosis profunt (Græcè habetur, ὡμὰ ἢ ἐσθιόμενα μετ' ὄξους ἀληκεὺς ὠφελεῖ, quæ parum dilucidè reddidit Ruellius, lienosisque ex aceto cruda profunt.) Mansa deuorato succo interceptam siue abscissam vocem instaurant, (Ruellius φωνῆς ἀποκοπὴν retusam vocem non satis rectè videtur reddidisse.) Decoctum eius potu aluum & menses ciet. Flos sterilitatem adfert, siue conceptionem impedit post puerperium, siue partum in pessa subditus (Græcè legitur, τὸ ἢ ἄνθος ἀτόκιον μετὰ τὴν ἀποκύησιν προσεθὲν ἐν πεσσοῦ quæ sic Ruellius, flos post conceptionem in pessa subditus, partum abortu vitiat.) Semen eius præsertim, quæ in Ægypto nascitur potum tineas pellit. In antidota theriaca additur: faciei cutem lentiginésque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci vultu excepti, diuturnos laterum dolores mitigant. Siluestris Brassicæ cyma in lixiuio cocta ori non insuavis. Folia illitu vulnera conglutinât, & inflammationes tumorésque discutunt. Marina Brassica in totum stomacho inimica, acris: vehementissimè aluum ciet in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne. Hæc Dioscorides, in quibus quæ de foliis manducatis tradit: Asclepiades Galenum de cauliculis ad vocem interceptam præscripsit. Brassicæ viridis cauliculos absterfos manducandos præbe, & quod instar palearum exuccum est, expuere iube, succum verò delingere. Alia, Brassicæ succum cum melle coctum delingendum exhibe, auxiliabitur confestim. Quæ verò cyma Brassicæ dicta est, à Dioscoride κύημα appellatur. quid autem sit, declarat Plinius his verbis. Cymas à prima sectione præstat proximo vere. Hic est quidâ ipsorum caulium delicatior teneriôrque cauliculus. Et paulò post, post cymam ex eadem Brassica contingunt æstiuû autumnalésque cauliculi, mox hiberni, iterumq; cymæ, nullo æquè genere multifero, donec sua fertilitate consumatur. Cymas itaque τὰ κυήματα Plinius dixit, quæ Collumella in carmine Cymata appellat per synæresin.

Frigoribus caules, & veri cymata mittit.

Lib. 2. Alim. Id quod Galenus adnotauit, ὁ μὲν οὐδ', inquit, τῆς κράμβης (ἀσπάραγος suba.) ὁ καὶ κύμα καλεῖσιν ἐνίοι, καὶ συναίρεσιν ἐμοὶ Διοσκῶν, τὸ διὰ τριῶν συλλαβῶν ὀνόματος, λεγομένου τὸ κύημα, τῆς κράμβης &c. Id est, Brassicæ igitur germen, quod nonnulli etiam κύμα nominant per contractionem, opinor, nominis trissyllabi κυήματος, & cætera.

Lib. 1. co. ph. Eadem cymata prototomi caules appellantur à Galeno, quo loco & si corrupta sint vulgata exemplaria, quæ habent πρὸ τομῶ καυλὸς ἀφεψήματος κυάθους β'. νήκει δι-

Lib. 2. c. 125. Id est, Prototomi caulis decocti cyathos duos ieiuno ad dies nouem exhibitos. Cuius auxilij ab Archigene ad renum affectiones præscripti efficacia, & prototo-

Lib. 10. morum caulium lectio à Dioscoride confirmatur. τὸ ἢ αὐτῆς (κράμβης) κύημα, inquit, ὡς ομαχώτερον μὲν, δειμνύτερον δὲ, καὶ ἔρητικώτερον. Id est, Brassicæ cyma stomacho commodior quidem est, sed acrior, & magis vrinam ciens. Eorundem cau-

libum meminit & Martialis.

Et faba fabrorum, prototomique rudes.

Item.

Lib. 14. *Quum mihi boleti dederint tam nobile nomen,*

Prototomis, pudet heu, serui cauliculis.

Appellantur autem prototomi à prima sectione ac cæsura, quando videlicet ad feminis generationem augescentes succiduntur, & in ciborum vsum veniunt.

Cap. 20. A Marcello caules Haplofiles à teneritudine Græca appellatione dicti sunt. Brassicæ lau-

sicæ laudes longum exequi, inquit Plinius, quum Chrysippus medicus priuatim volumen ei dicauerit, per singula membra hominis digestum, & Dieuches. Ante omnes autem Pythagoras & Cato non parciùs celebrarunt. Quæ fusiùs persequi prolixum nimis & superuacaneum foret. Quare ea qui volet apud Plinium & Catonem legat, sed ita vt Catonis de Brassica iactatas religiones nihil moretur. Id vnum ex Plinio dicemus, quod & Dioscorid. sententiæ cõsentaneum est, Brassicam vino aduersari, vt inimicam vitibus. Antecedẽte in cibis cauere ebrietatem, postea sumptâ crapulam discuti. Haud ita multo post scribit Siluestreim Brassicam inimicissimam vino, quam præcipue vitis fugiat, aut si non possit fugere, moriatur. Et alio in loco, pernicialia esse Brassicæ cum vite odia. Quæ cum rectè ex veterum sententia dixisset, ea quæ sequuntur non sine errore scripsit. Quorundam natura non necat quidem, sed lædit odore, aut succi mixtura, vt Rhabbanus & Laurus vitẽ. Olfactrix enim intelligitur, & tangi eam odore mirũ in modum. Ideoque cum iuxta sit auerti & recedere, saporẽque inimicum fugere. Hinc sumpsit Androcides medicinam contra ebrietates, Rhabbanum mandi præcipiens: pro Rhabbano enim hic Brassicam bis reddere debuerat. Transtulit enim locum illum ex Theophrasto, qui ῥάφανον dixit, quod supra ostendimus, vt & veteres Græci, quam quidam & posteriores κράμβην vocauerunt. Ἐνια ὃ ἔ φθεῖρεται μὴ, χερῶ δὲ ποιεῖται τοῖς διωάμεσι τῶν χυλῶν καὶ ὁσμῶν, οἷον ἡ ῥάφανος, καὶ ἡ δίαφρη τὴν ἀμπελον. ὁ σφραῖνετα καὶ φήσι, καὶ ἔλθειν. Διὸ ὅταν πλεονέξῃ ὁ βλαστὸς γέννηται, πάλιν ἀναστρέφεται, καὶ ἀφορεῖται, ὡς πολέμιας ὕλης τῆς ὁσμῆς. Ανδροκύδης καὶ παραδείσῳ τὴν καλεχρήσαστο πρὸς τὴν βοήθειαν τὴν ἀπὸ τῆς ῥαφάνος γινομένην πρὸς τὸν οἶνον. ὡς ἐξελαύνουσιν τὴν μέθην. φάσκει καὶ δὴ καὶ ζῶν τὴν ἀμπελον τὴν ὁσμὴν. Sed & quod alio loco Plinius scripsit, Odium his (rhabbanis) cum vite maximum, refugitque iuxta fatos, de Brassica intelligi debet, non de raphano. Cur autem crapulam sedet Brassica, id causâ reddidit Aristoteles, quod dulcem succum abstergentemque contineat: quare eo medici ad eluendam aluum vtuntur. Ipsa autem frigida est: nam ad vehementes diarrhoeas vtuntur medici valde cocta, caule purgata, refrigeratâque. In iis autem qui crapula tentantur, Brassicæ succus crudos humores & vinosos in aluum attrahit, ipsa in ventriculo remanens refrigerat corpus, quo refrigerato tenues humores in vesicâ feruntur. Quum igitur humores vtrinque abiguntur, refrigerato corpore, illos crapula liberari perspicuum est, præsertim quum sequax vini vapor humoribus deorsum conuersis deuocetur, & præceps ad ima deuoluatur, qui sese efferens in caput, mentis arcem obsidet, & temulentiam grauitatẽque creat. Galenus ex Apollonio in dolore capitis ab ebrietate ad refrigerandum repellendũque, rosaceum per se, & cum aceto, aut hederæ, aut Brassicæ succo præscribit. Quin & ipsa Brassicæ folia calida macerata, capitique circumposita, ac obligata naturaliter ebrietati resistere ait. Sed de Brassicæ facultatibus idem verissimè differit alio loco, his verbis. Brassicæ succus facultatem habet purgatricem, corpus autem ipsius communi siccantium ratione sistit magis, quàm ad deiiciendum incitat. Quum igitur quæ in ventre continentur excernere voluerimus, è propinquo cacabo in quo cocta cum aqua fuerit, extractam ipsam protinus in vasa, in quibus oleum cum garo paratum fuerit, coniicere conueniet: nihil autem retulerit, si salem loco gari sumpseris. Quod si humentem aluum siccare voluerimus, priorem aquam, vbi Brassica mediocriter cocta videbitur, effundentes, aliam calidam mox iniiciemus: ac deinde rursus Brassicam, quoad contabuerit, ei incoquemus, quod non facimus cum ventris deiiciendi gratia sumitur: volumus enim hoc casu proprium ipsius succum omnem nõ deponere, sed quoad maximè fieri licet, retinere. Porro nihil quod coquitur, proprium succum seruare omnino potest: quin potiùs omnem abiicit, si coctũ diutius fuerit: Brassica paucum habet alimentum, & edulium

Lib. 20. c. 9.

Ibidem.
c. 157.

Lib. 20. c. 9.

Lib. 24.
præfat.

Li. 17. c. 24.

Lib. 4. hist.
cap. 20.

Lib. 19. ca. 5.

Probl. sec. 3

Lib. 2. com.
phar. local.

Li. 2. Alim.

Li. 7. simp.

est non firmum, sed laxum. Succum habet non probum, ut lactuca, sed prauum & graueolentem. Quod verò ad vrinas attinet, nihil ipsas, quod sciam, insigniter neque prouocat, neque moratur. Brassicæ germen quod nonnulli *χρυσός* nominant, minùs quàm Brassica ipsa siccatur, tametsi aliorum olerum caulibus temperatura ut plurimum est quàm folia sicciora, potissimum quum iam prope est, ut semen profundant. Et, Brassica esculenta desiccandi vim habet, tum esca, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui & vlcerum glutinat, & maligna vlcerum sanat: præterea phlegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se abstersorium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maximè Brassicæ Ægyptiæ: quòd ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amaræ qualitatis semen particeps est: sicut videlicet alia omnia medicamenta, quæ ad lumbricos idonea sunt. Eadem facultate ephelidas & lentes, & quæcumque modicam abstersionem postulant, adiuuat. Porro caules Brassicæ combusti cineres efficiunt admodum desiccantes, ut videlicet iam & causticam vim participant. Hac ratione ei veterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent: nam valenter digerens medicamentum efficitur. Brassica agrestis quodammodo calidior, sicciorque est quàm domestica: ceu alia propemodum omnia agrestia sui generis domesticis vtraque facultate valentiora sunt. Quamobrem neque intra corpus citra noxam sumitur, ut quæ longius ab humana recesserit temperatura. Eadem de causa & gustantibus amarior est quàm domestica: quanquam domestica quoque acrimoniæ nonnihil & amaritudinis contineat: sed vtramque agrestis habet validam: quare etiam extergit, & digerit quàm domestica valentiùs. Brassica marina præter quàm quòd venterm deiciat, ut pote subsalsa, & amara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis vsus, & ad ea omnia, ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea. Hæc Galenus. Symeon Sethi malum, inquit, & melancholicum succum Brassica procreat, visum hebetat, & somnum per tumultuosa insomnia interturbat. Succus eius aliquatenus purgat: corpus verò eius ventrem sistit. Quapropter in quibus humectam aluum siccare volumus, ipsam modicè decoquentes, aquamque primam abiicientes, confestim alteri aquæ feruenti indimus: nihil enim neque aeris, neque frigida aquæ quod bis coquitur tangere debet. Æstiuæ Brassica peioris succi est quàm hyberna. Et verò vrinam, lumbricos interficit, & iis qui ex vino crapula laborant auxiliatur. Fertur autem ab humiditate ortam hebetudinem sanare. Cocta cum pingui carne, plurimum noxæ atque vitij amittit. Flos eius proprietate quadam, semen genitale corrumpit vterò impositus, & mulieres concipere prohibet. Pulmonem lædit. Tradunt quoque si ante alios cibos assumpta fuerit, ebrietatem arcere. Et quod eius succus cum melle sumptus, magnificè defectiones vocis iuuat. Vulneribus imposita ea conglutinat, & malefica vlcerum, & induratas inflammationes sanat. Brassicæ semen crassiusculè contusum, inquit Matthiolus, & in carniū iure feruefactum, potumque vnà cum ipso iure colico dolore laborantes præsentaneo remedio iuuat. Brassica tormina discutit, si bis cocta edatur addito cymini semine, sale, oleo, & hordeaceæ farinae polline: præsertim si sine pane deuoretur. Idem facit ius decoctæ cum vetere gallo. Idem prodest iocinorosis, lienosis, & renum calculo laborantibus. Prodest per cocta tabidis, si frequenter edatur. Succus ex melle coctus visum clarificat, angulis tantum oculorum illitus. Datur succus vtiliter potandus aduersus fungorum venena. Cocta, & longo pipere aspersa, vnàque cum iure sumpta, nutritibus lactis vbertatem præbet. Caulium medulla ex cremore amygdalino decocta, & cum melle in ecligmate parata, datur lambenda magna vtilitate anhelosis.

Marinæ

In libr. 2.
Diosc. c. 113.

Marinæ Brassicæ decoctum cum rhabbaro potum, ad vacuandas hydropicorum aquas plurimum valet. Idem præstat eius puluis additis rhabbaro, & cubebis, sæpius ex vino haustus.

B E T A,

CAP. II.



QVOD olus Græcis τεύλον vel σέλων, Latinis Beta dicitur. σέλων *Nomina* autem Græci ab impulsu nominarunt: etenim cultus ratione quadam incrementum capessit arboris, neque vlli hortensium latitudo foliorum maior, quæ in binos pedes aliquando se pandunt, soli natura contentiente, & quibusdam locis amplissimæ Betæ proueniunt. Betæ nomen positum fuit, quod figuram β literæ, dum semine turgēt, referre videatur, nam summitatem in cacumine reflexam habet, id quod testatum nobis reliquit Columella his versibus.

Lib. 10.

Nomine tum Graio, ceu litera proxima prima

Pangitur in cera docti mucrone magistri,

Sic et humo pingui ferratæ cuspidis ictu

Deprimitur folio viridis, pede candida Beta.

Arabibus *Decka*, & *Celb*, Italis *Bietola*, Gallis *Bete*, *Iote*, *Poeree* nominatur, Germanis *Mangolt*, & *Pieffen*, Hispanis *Aselgas*. Beta duorum generum est, inquit Dioscorides *Genera* candida, & nigra. Plinius, Beta hortensiorum leuissima est. Eius quoque à colore duo genera Græci faciunt, nigrum & candidius, quod præferunt parcissimi seminis: appellantque Siculum, candoris sanè discrimine præferentes ut lactucam. Quæ ex Theophrasto exscripsit: ὡχρύτερον ὃ καὶ τῶν τεύλων τὸ λευκὸν τῷ μέλανος, καὶ ὀλιγοσπερμότερον, ὃ καλεῖται τινες σικελικόν. Sed quamuis siculæ cognomento Beta solummodo candida veniat, ut ex Plinij & Theophrasti locis intelligi licet, tamen nunc extrita vna litera omnibus ferè nostri seculi medicis omnis beta Sicla cœpit nominari. Beta nigra ad atrum colorem accedere videtur, quia ex rubro nigricat, Gallis *Bete rouge*, Germanis *Rotermangolt* vocatur. Cuius aliud est genus radice maiore crassiore, rubra, quæ Beta erythrorrhizos ob id cognominari potest, vulgò Beta Romana. Alij Betam nigram faciunt quæ eadem sit quæ candida, sed nigram vocant à foliorum colore ex obscuro magis virentium. Rubram verò vulgatiorem, quæ aliis est nigra, quæ à candida nihil differt, nisi saturo colore rubente, quæ hic ex Lobellio appicta est: rubram aliam, quæ ab aliis secernitur raposa radicis effigie. His addidit Dalechampius Betam τεύλον ἰσχυρόν, idest laticaulē, ut quatuor nobis sint hodie Betæ cognita genera. Plinius quoque hæc ad superiora adiunxit. Nostri Betæ generā faciunt vernum & autumnale, à temporibus satiuis: quanquam & Iunio feratur. Esse & Betam siluestrem Plinius scripsit, quam Limonium vocant, alij Neuroides, quam Dioscorides non nouit, qui Limonion à Betis valde disiunxit: neque eam sententiam probat Galenus, cum scribit, Maluam ut Lactucam diximus non modo esse satiuam, sed aliam etiam quandam esse agrestem: Nulla autem Beta est agrestis, nisi quis lapathon id nominare velit. Quibus verbis Galenus tam plausibilem ac receptam Platonis sententiam in Timæo ambigua nobis ut esset, effecit, satiuas omnes plantas olim fuisse feras, neque à seipsis nisi cultu differre. Cum enim, inquit Scaliger, lapathum à nobis multo studio huius rei gratia cultum, numquā induerit Betæ faciem, aut saporem, etiam nunc hæremus in illius sententia, non omnē plantam mitem, fuisse prius agrestem.

Lib. 7. hist. c. 4.

Ibid.

Lib. 20. c. 8.

Li. 2. Alim.

In lib. 2. causs. ca. 14.


Beta candida foliis est grandibus, latis, læuibus, inter quæ caulis exoritur bicubitalis, striatus, circa quem nascuntur flores exigui, in pallido virides, vel lutei stellarum figura. Deinde semen copiosum, rotundum, durum, asperumque.



BETA RUBRA.
vulgatior Lobellij.



In hist. pla.
cap. 77.



radix subest vnica, crassa, intus candida, in longum protensa, ex cuius lateribus alia modò singulæ, modò binæ, nonnumquam ternæ funduntur, fibris multis refertæ. Hinc Beta rubra, siue nigra vulgaris, foliis, caulibus, semine, radice proxima est, nisi quod ei folia caulesque non candicant, sed ex rubro nigricant. Cui Betæ rubræ Beta alia rubra, siue Erythrorrhizos foliis, caulibus, semine, figura, colore planè similis est, sed radice dissimilis: est enim huic multò crassior, breuior, medio sui ventricosa & turbinata, napi modo: foris, intusque tota rubens sanguineo cruore suffusa, & superiorum radicibus suauior. Fuchsius inter raporum genera recenset, & rapum rubrum vocat, cum tamè rapi species non sit. Beta *παραλόχαλος* Dalechampi, in monstrosis, vt ita dicam, plantis numeranda est. Nam vt in cæteris rebus, sic & in stirpibus interdum aut monstra existunt, aut prodigiosa quædam, & digna quæ literarum monumentis consignentur. Anno Domini 1557. Cepam vidit, manibusque tractauit Dalechampus, quæ in summa caulis parte, loco seminis bulbos paruos genuerat, & multos, raro prorsus euentu permutate vices natura, & quod radicem esse oportebat, pro semine sursum extrudente. Non minùs est admiranda Betæ species, quam hic depinximus. Cuius caulis est quatuor digitos latus, circa quem parua sunt folia, & quem totum semen operit, sed in eius fastigio ita densum, vt caulis prospectum adimat. Aliquando prope D. Ramberti oppidulum Allobrogum



BETA Πλατύκαυλος,
Platicaulos Dalech.



lobrogum in pingui quodam prato talem vidit Dalechāpius siluestris cichorij caulem. In hortis passim, & cultis locis nascuntur Betæ. Eas etiam aquis falsis iuuari, & iis rigatas meliores effici tradit Theophr. Iulio & Augusto mensibus, floribus & semine turgent. Beta nigra, ut scribit Dioscorides, coquitur cum lenticula ut ventrē sistat: quod magis radice eius præstatur (genus id cibi τῆς λευκῆς veteres appellarunt.) Candida aluo utilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se, noxij est succi. Vnde succus earum cum melle maribus indutus, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radice & foliorum, furfures lendesq; deterget: perniones fotu mitigat. Crudis foliis vitilignes nitro antea perfrictas, alopeciarum inanitates, scalpando prius exasperatas, atque depascentia vlcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustiq; cocta medetur. Plinius de Betis, ut de oleris & alimento hæc tradit. Vfus iis & cum lente ac faba, idemq; qui oleris: sed præcipuus ut lenitas excitetur acrimonia sinapis. Medici nocentior

Locus.

Lib. 2. caus. cap. 7.
Tempus,
Vires &
Temper.
Lib. 2. c. 116.

Lib. 19. c. 8.

rem quàm olus esse iudicauere. Quamobrem appositas non memini. degustare etiam religio est, ut validis potius in cibo sint. Gemina iis natura & oleris, & capite ipso exilientis, bulbi. (Nam cum foliis humisparsis caulis ex illorū medio prodicere incipit, eius caput gustu, & callosa quadam firmitate bulbo simile esse videtur.) Et paullo post. Mira differentia si vera est, candidis solui aluos modicè,

Lib. 20. c. 8.

nigris inhiberi. Et cum Brassica corrumpitur in dolio vini sapor, odore Betae foliis demersis restitui. Sed idem alio in loco usum medicum ex Beta præscribit, tum ea quæ Dioscorides, tum alia recensens. Nec Beta sine remedio est utraque. Siue candida, siue nigra radix recens & madefacta, suspensa funiculo contra serpentium morsus efficax esse dicitur. Candida Beta cocta, & cum allio crudo sumpta, contra tineas. Nigrae radices, ita in aqua cocta porriginē tollunt: atque in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores veteres, & vertigines, item sonitum aurium sedat, infusus iis: ciet urinam. Medetur dysentericis injecta, & morbo regio. Dolores quoque dentium sedat illitus succus. Et contra serpentium ictus valet, sed huius radice duntaxat expressus. Ipsa vero decocta per nionibus occurrit. Albae succus epiphoras sedat fronti illitus: aluminis pauco admisto ignem sacrum. Sine oleo trita, scilicet adustis medetur. Et contra eruptiones papularum, cocta quoque eadem contra ulcera quæ serpunt, illinitur, & alopeciiis cruda, & ulceribus quæ in capite manant. Succus eius cum melle naribus inditus caput purgat. Coquitur & cum lenticula addito aceto, ut ventrem molliat. Validius cocta fluxiones stomachi sistit & ventris. Galeno verò auctore, succus Betarum tergendæ vim habet manifestam adeo, ut ventrem ad excernendum incitet, & stomachum interdum mordicet, præsertim quibus natura sensu exactiore præditus est: ob idque edulium id stomacho est noxium, si largius sumatur: corpori autem ab ipsa, ut ab aliis oleribus paucum alimentum accedit. Verum obstructum hepatis malum magis aperit, & multo magis si cum sinapi, aut omnino saltem cum aceto mandatur. Lienosis item eodem modo sumpta utile est medicamentum. Et, Beta nitrosæ facultatis particeps est, quæ tum digerit, tum extergit, & per nares purgat. Cæterum cocta nitrositatem omnem exuit, sitque facultatis phlegmonis aduersæ, leuiter discutientis. Porro ad detergendum digerendumque validior est Beta alba: nam nigra adiunctum habet quippiam adstrictionis, & magis in radice quam in aliis partibus. Ex Symeone Sethi Betae succus mediocriter abstergit. Ventrem etiam ad effluxum proritat, & stomachum aliquando vellicat, eorum præsertim, qui hunc valde sensilem habent. Quapropter edulium est stomacho infestum, si plurimum comedatur. Exiguum est eius alimentum sicut cæterorum olerum. Vtilis verò est ad iccoris obstructions cum aceto comesta. Pari modo si edatur, & lienis obstructionibus bonum fit medicamentum. Constat autem Beta ex contrariis facultatibus: succus enim eius calidus est, ventrem constringit, & sitim adfert. Eius verò corpus crassarum partium, flatuosum, concoctum difficile, & frigidum, ventremque sistit: maxime si aqua in qua coctum est, subinde abiiciatur. Ad Betarum cocturam vinum & piper expeti scribit Martialis his versibus.

Vt sapiant fatua fabrorum prandia Beta

O quam sæpe petet vina pipérque cocus.

Marth. li. 2.
Diosc. c. 116.

Betae succus à facibus expurgatus, clysteribus infusus ad indurata alui excrementa euocanda mirum in modum valet, præsertim cum lenientia clysmata nihil profecerint. Albae radix darsa, & melle salæque illita suppositaque, aluum exonerat. Nigrae radix in aqua decocta & illita pruritum extinguit. Succus ex ea expressus tum potus, tum illitus, ad serpentium venenosorum morsus confert. Ex Beta erythrorrhizi radice hyeme in aqua, aut sub cineribus calentibus cocta, & corticibus exuta Germani acetaria parant asperso pipere, carotæ vulgo vocatæ modo. Sed hac illa dulcior est, & gustui gratior. Præterea eiusdem Betae radices parum elixatas, deinde transuersim in particulas sectas fictili vase cum aceto recondunt, addita raphano agresti, quam *Cren* vocant, minutim concisa. His vescuntur cum assis carnibus.

ATRIPLEX

ATRIPLEX, CAP. III.


ATRIPLEX olus Græcis ἀτράφαξις & χρυσολάχανον dicitur. Atriplex-
 xum vt Festus refert, appellabatur ab atro, vt aliqui putant, colore. Nomina
 Verum à voce Græca potius quàm ab atrore fluxit nomen. Nam
 Atriplicis olus ἀτράφαξιν Græcis dici Columella testatur, Hippocra- Lib. II. c. 3.
 tes ἀδράφαξιν appellat, Hefychius ἀδράφοξον, quod ἀδρῶς αὐξεῖ, & Suidas ἀτράφαξιν
 (Atticis, d, literam, in t, mutare frequenter amantibus) Εἶδος λαχάνος ὁ λαχέως εἰς
 μέγεθος αὐξέσθαι, id est, quod statim in amplitudinem adolescat: siquidem octauo à
 satu die profilit, confestimque incremento proficere conspicitur, fidem celeris
 augmenti facit ereptum in confinio cæteris herbis alimentum. Ac ne in hortis
 quidem iuxta eam nasci quicquam tradunt, nisi languidum χρυσολάχανον, id est,
 aureum olus Græci appellant, quod auri colorem repræsentet. Alij tradunt ab au-
 reo siue luteo flore nomen hoc inuenisse. Arabes *Caraf*, seu *Caraf* vocant, Itali
Atriplice, & *Reppice*. Galli *Arroches*, & *Bonnes dames*, Germani *Molten*, & *Milten*, Hispa-
 ni *Armoles*. Atriplicis duo genera esse ait Dioscorides, satium & siluestre. Dodo- Lib. 2. c. 112.
 næus duorum satiuæ atriplicis generum meminit, duorum item siluestris. Genera.
 Matthiolus tres siluestris species exhibet, præterea aliud atriplicis marinæ genus. Lib. 4. c. 1.
 Atriplex satiuæ radice nititur in altum descendente, fibris multis capillata, ex In libr. 2.
 qua caulis erigitur rectus, rubescens, inferiore parte rotundus, superiore quadra- Diosc. c. 112.
 tus, ad quatuor cubitos excrefcens, multis vndique adnatis. Folia prope caulem Forma.
 lata sunt, deinde in mucronem desinentia sagittarum instar, pingua, succosa, lon-
 ga, cum nouella sunt candicantiâ, perinde ac si farina aspersa essent, cum adoleue-
 runt colore ex viridi in luteum elanguescente. In caulium summitate flores nu-
 merosi coaceruantur, lutei, exigui: dein foliatum semen, & obductum cortice
 promitur. Alterius Atriplicis satiuæ folia, caules, flores in rubro fufcescunt, in- Ibid.
 quit Dodonæus, alioqui magnitudine & figura superiori Atriplici proximi.

ATRIPLEX Satiuæ.



Siluestris tam luxuriosa proceritate prodit,
 vt quaternos sæpe cubitos excedat: caule vt
 hortensis anguloso, ramoso, & purpurascen-
 te: folio hortensi non admodum dissimili, potif-
 simum quod ad colorem attinet, sed paulo mi-
 nore, & crenato: flore luteo, exiguo: semine ra-
 cematim congesto, radice fibrata. Atriplex sil-
 uestris secunda Matthioli, à Lobellio & Pena
 dicitur Atriplex siluestris vulgatio, sinuata.
 Hanc specie distare à satiuâ præter cultum fru-
 stra tentatum, etiam folia docent, quæ nigri-
 cant plumbeo colore solani, quo cum lubens
 sociatur in viarum marginibus, frequens etiam
 circa moenia & fimeta: foliis minoribus, angu-
 stioribus, obtuse per ambitum sinuatis, floribus
 ex luteo herbidis. Atriplex siluestris tertia
 Matthioli, est *Pes anserinus*, de quo mox. Huc
 referunt Pena & Lobellius plantam aliâ quam
 Atriplicem siluestem vocant *Polygoni* aut
Helxines foliis, Matthiolus secunda commen-
 tationum editione Atriplicem siluestem pri-
 mâ facit. In vinetis & agrorum marginibus fre-
 quens occurrit, foliis angustis siluestris Atri-

ATRIPLEX Siluestris I.
Matth. prima editionis.



ATRIPLEX Siluestris I. Matth.
Polygoni folio, secunda editio.



ATRIPLEX Siluestris II.



ATRIPLEX Siluestris III.



plicis, spargens humi ramulos striatos, cubitales & fescuibitales, flore muscoso, & semine folioso, Atriplicis hortensis onustos. Atriplex marina per humum repit, circumquaque caules spargens, in quibus folia sunt subalbicantia, Atriplicis siluestribus spinachij oleris figura, sed minora: semen in caulium summitatibus profert,

ATRIPLEX Marina.



POLYSPORON Casiani.



profert, baccis quibusdā inæqualibus, racematim coherentibus: radice nititur multiplici, sapore salso, nitidiores. Huius nulla (quod sciā) a Dioscor. & Galeno facta est mentio, sed iis facilis erit inuentu, qui maritimas stirpes studiosius conquirere voluerint. His inferere possumus ob similitudinē foliorū Polysporon Casiani Anguillaræ, à feminis florisque muscosi Botrydi non dissimili copia, quibus onusti numerosi cauliculi sesquicubitales exiliores, inis foliis Solani, aut Atriplicis siluestris, sumis minoribus multo & delicatioribus. Hac mire capiuntur pisces, auctore Casiano, cui subscripsit Anguillara experimento nixus. Radix alba, gracilis. Atriplex hortensis nō nisi sata prouenit. Siluestris sua sponte nascitur, prope vrbiū muros, & in cāpestribus. Vtraque assiduo humore satiari amat. Marina, inquit Matthiolus, in maritimis nascitur, copiosa Tergesti ad salinas in maris littore. Iunio & Iulio mensibus florent, deinde semen proferunt. Atriplex, vt scribit Dioscorides, cocta estur vt olus, aluum mollit. Panos discutit siue cruda, siue cocta illinatur. Semen cum aqua mulsā potum, regium morbum sanat. Atriplicis vt oleris in cibis vsum cum blito declarat Galenus, qua de re postea dicemus. Vsum medicum, & temperamentum alibi sic explicat. Atriplex frigida & humida temperie est, humida quidem secundi ordinis à mediis, frigida verò primi, quam vtique tepidam esse caliditatem posuimus, cuiusmodi ros inest: non tamen adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimum terrena, similiter ac malua. Quin & ventrem celeriter permeat, vt illa, ob lubricitatē. Porro parum omnino eius est, quod digerendi obtinet facultatē. Hortenses autem Atriplices & malua, quā agrestes tum humidiores sunt, tum frigidiores. Quare phlegmonis & phygerthlis incipientibus gliscentibusque, & mollibus etiamnum, ac velut feruentibus hortenses: vigentibus autem ac de-

clinantibus, & indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abster- gendi vim habet. Itaque ad morbum regium ex hepate obstructo obortum vtile est. Ex quibus sane verbis tota Dioscoridis sententia declarata est. Sed quæ de Atriplice Plinius tradit, audire operæ pretium est. Atriplex & siluestre est, & sati- uum, accusatum à Pythagora, tanquam faceret hydropicos, morbosque regios, & pallorem, coqueretur difficillimè: ac ne in hortis quidem iuxta id nasci quicquā, nisi languidum culpauit. Addidere Dionysius & Diocles, plurimos gigni ex eo morbos: nec nisi mutata sapius aqua coquendum. Stomacho contrarium esse, lentigines & papulas gignere. Miror quare difficulter in Italia id nasci tradiderit

Solon

Locus.

Ibid.

Tempus.
Vires &
temper.

Li. 2. Alim.

Li. 6. simp.

Lib. & c. 10

Solon Smyrnaeus. Hippocrates vuluarum vitiiis id infundit cum Beta. Lycus Neapolitanus contracantharidas bibendum dedit. Quibus subiicit ea cum quibusdam aliis, quæ Dioscorides & Galenus tradiderunt. Panos, furunculos incipientes, duritias omnes, vel cocto, vel crudo vtiliter illini putauit. Item ignem sacrum cum melle, aceto nitroque, similiter podagras: Ungues scabros detrahare dicitur sine vlcere. Sunt qui in morbo regio dent semen eius cum melle, arterias & tonsillas nitro addito perfricent, aluum moueant cocto vel per se, vel cum malua aut lentivula, concitantes vomitiones. Siluestri capillos tingunt, & ad supradicta vtuntur. Scribit Serapio Rhasim vidisse hominem quendam, qui ex Atriplicis semine duarum drachmarum pondere sumpto, tum crebris vomitionibus, tum alui deiectionibus adeo vexatus fuit, vt ad extremam virium imbecillitatem deueniret.

Ibidem. Et Matthiolus pharmacopœum quendam se nouisse ait, qui ad rusticos purgandos Atriplicis tantum semen exhibebat, quod iis non sine molestia magna aluum abunde ciebat, simul etiam crebros vomitus prouocabat. Quam facultatem cum scribat Matthiolus paucis hætenus fuisse cognitâ, eam tamen à Plinio non prætermittam fuisse ex superioribus intelligere licet. Atriplex frequentissima in Insubria feritur, quod ex ea præsertim rura sibi placentæ genus quoddam conficiant, hoc modo. Acutissimo cultello concisa Atriplicis folia caseo in scobem attrito, butyro, ouis commiscent, & in sartagine foliosa pasta substrata decoquunt.

BLITVM.

CAP. IIII.

Nomina



Atini Blitum olus vocant, & ita scriptum in quibusdam Græcis codicibus reperitur. Hippocrates tamen, Theophrastus, & Dioscorides βλήτον habent, Arabes appellant *Bachala iamenia*. & *Bachale aliemanie*, Itali *Blito*, Germani *Mayer*, Galli *Blete*. Plinius Bliti nomen ad ignauiam & fatuitatem referre videtur. Blitum iners videtur, inquit, ac sine sapore, aut acrimonia vlla. Vnde conuicium scæminis apud Menandrum faciunt mariti. Dicuntur etiam sæpe Hippocrati βλητοί, οἱ ἀποπληκτοί, siderati, stupidi, & attoniti. Et

Li. 20. c. 22.

Lib. 2. de morb.

Lib. 2. de mul. mo.

BLITVM Album maius.

alio in loco medicamentum ἐκβόλιον habet, quod τὸ παιδίον βλήτον γενόμενον ἐκβάλλει, idest, ictum & enectum. Festus Blitum appellatum esse à stupore ex Græco putauit, quod ab aliis βλάξ dicitur stupidus. Quod nomen in vulgus nostrum emanauit, socordes, inertesque medicos, nulliusque momenti homines Blitres, Bliteos Græca imitatione nominans. Sic Plautus Blitea meretricem appellauit. Bliti-genera duo, album & rubrum. Rursus albi genera duo facit Dodonaus, maius & minus. Rubri totidem genera, sicut & Matthiolus. Blitum album maius ad binum ternumve pedum altitudinem assurgit, caulibus ferè cinereis, rotundis, foliis laeuius, latis, subalbicantibus; Betæ vel Atriplici proximis. Flores, deinde semen corticeum, copiosum, & racematim coherens, tenuibus insident ramusculis ex alarum cauis prodeuntibus, panicularum effigie, vt in siluestri panico. Radix continuo multiplex est, & prolixa. Blitum album minus ocysimè erumpit, caule viridi, furculoso, foliis longiusculis & angustis, Betæ haud absimilibus

In Trucul.

Genera

Lib. 5. ca. 2.

In libro 2.

Diosc. c. 110.

Forma.



BLITVM Rubrum maius



BLITVM Rubrum minus.



milibus, sed multo minoribus, radice fibrata: floribus in rubro fuscis, semine racemoso, vt in Atriplice. Blitum rubrum maius, quod Polyanthes Dalechampus appellat, prosilit ex radice longa, crassa, multum fibrata, nigricante: caule est rubris lineis virgato, ad hominis altitudinem sese attollente, ramoso, firmo: foliis Bliti in viridi sub rubentibus: flore coccineo, spicato, praelongo, in plantæ summitate numerofo, villis asperiusculis, tanquam aristis munito, luteis punctis maculoso, aspectu pulchro, & ob id expetito: decerpta enim planta raram illam coloris venustatem in flore diu conseruat. Sapor qui & Bliti. Lobellius nomen ei indidit Amaranthi maioris floribus paniculosis, spicatis. Blitum rubrum minus foliis & caule est superiore longe minoribus, quæ tamen adeo rubescunt, vt coccineo colore infecta videantur, etsi temporis tractu tandem purpurascant. Radix etiam sanguineo succo madet. Flores & semen in ramulorum fastigio coherent. Blitum vtrumque *Locus.* in incultis prouenit. Sed & feritur in hortis, præsertim rubrum Polyanthes, ob coccinei nitoris in flore pulchritudinem. Blitum culto solo cum semel natum fuerit, ipsum se per multa sæcula seminis deiectione reparat, vt etiam si velis vix possit aboleri: satumque semel pluribus annis restibili fertilitate prouenit, nec run- *Tempus,* cari, nec farriri flagitat. Martio mense feritur, florètque media æstate & autumno, semineque *Viresc.* prægnans est. Blitum estur oleris modo, inquit, *Temper.* Dioscorides. Alio vtile est, nullius in medicina *Lib. 2. c. 110.* vsus. Blitum & Atriplex auctore Galeno, aliis *Li. 2. Alim.* oleribus sunt aquosiora, & qualitatis expertia: quo fit, vt non ex solo oleo & garo ipsa mandant, sed acetum etiam iniiciant: nam alioqui stomacho sunt noxia. Olera autem huiuscemodi ad facilem deiectionem sunt propensa, præsertim si cum humiditate lubricum quiddam habeant: propensionem tamen ac momentum pessum habent nõ forte, sed exiguum, propterea quod nulla qualitas ipsis inest acris ac nitrosa, quæ ventrem ad excernendum excitet. Porro alimentum corpori præbent exiguum. Et, Blitum *Li. 6. simp.*

olus est esculentum, humidæ frigidaq; temperatura in secundo maxime excessu à temperatis. Hippocrates contra, βλήτον scribit esse θερμόν, & διαχωρητικόν, idest calidum esse, & ad excernendum non incitare. Et alibi ad fluxum muliebrem rescicandum βλήτον τὴν βοτάνην ὡς γλῶσσαν, ἔσαν ἐν εἰλίῳ ποιεῖν προσθεῖν. Plinius inutile stomacho esse ait: ventrem adeo turbare, vt choleram faciat aliquibus. Dicit tamē aduersus scorpiones potum è vino prodesse, & clauis pedum illini: item lienibus,

& temporum

Lib. 2. de diat.
Lib. 2. de mul. mor.
Lib. 20. c. 22

& temporum dolori ex oleo. Hippocratem menstrua sisti eo cibo putare. Qui Hippocratis locus fortasse est quem paulo ante citauimus, in quo apponendam, & in lana subdendam Blitum herbam Hippocrates præcipit, si mulieribus fluxus sit exsiccandus. Plinius tamen in cibo sumendam parum attentè dixit, & ῥῶον Hippocrati dictum, menstrua vocauit. Blitum album Tridentina rura *Bredone* vulgo appellant, vt scribit Matthiolus, & à nonnullis in cibū admittitur. Primum aqua decoquat, dein affuso oleo, vel butyro in sartagine frigunt, additis allio, & omphacio, vel aceto. Sed is cibus, vt is vsu sese cōperisse testatur, vomitiones mouet, ventriculi & intestinorum tormina facit, & alui fluxiones ciet excitata bile. Mirū igitur si Hippocrates, Galenus, Plinius, Matthiolus vera scripserunt, quod dixerit Dioscorides Blitum aluo vtile esse, nullius in medicina vsus.

SYMPHONIA PLINII. CAP. V.

Nomina
Lib. 26. c. 7.

Hermol.
coroll. 159.
lib. 1. Dios.

Forma.

HAnc stirpem Blito propter similitudinem subiunximus, quæ Symphonia Plinio dicta, & Gomphrena (aliqui Cremphenam scribunt, alij Symphonam, alij Comphenam, aut Symphenam) existimari potest, ab Hetruscis hodie *Herba de la marauiglia*, idest, herba mirabilis, ob excellentem & admirandam coloris varietatem in foliis. Radice est breui, candida, in furculosas propagines diuisa: caule vnico, pedali, rubente: foliis Bliti, alternatim viridi, roseo, & luteo colore pictis, sic vt in singulis foliis adultis & perfectis ea coloris varietas iucundissimum intuentibus præbeat spectaculum. Non dissimulandum tamen Plinium scribere Symphoniam esse alternis viridibus roseisque per caulem foliis, considerandumque num velit per caulem sic disposita esse folia intelligere, vt vnum sit viride prorsus, id sequatur aliud roseum etiam omnino, & sic deinceps. A Lobellio inter Amaranthos recensetur, vocaturque Amaranthus Tricolor, à Trago Gelosia, fortasse Theombrotum est Persarum apud Plinium, inquit Pena, non è floribus, sed ex foliorum triplicis coloris maculis scitè distinctis venustas huius æstimatur, quæ sunt Ocimi aut Bliti, interdum luteo, viridi, vel purpureo, interdum triplici, viridi, luteo & sanguineo variegata, alarum psitacorum ritu: quare Flandri *Papagalli* vocant. Caterum planta hic depicta semen profert in exigua spica, villosa, cauli adhærente sine pediculo, flauescens punctis notata, quod vice floris est, perinde ac si natura tantum venustatis ac gratiæ prius in folia contulerit, vt deinde veluti picturæ florū oblita, eos vix inchoatos reliquerit. In hortis colitur ad acetariorum vsum, præsertim ab olitoribus Italis, allato ex Hetruria semine. Alsiosa est hæc planta, ad primam frigoris inclementiā flaccescens. Quamobrem ante veris teporem eius semen olitores terræ credere non audent, ne tenella herba algoribus vratur ac pereat. Sapor idem qui & Bliti, nisi quod paullulo magis austera est: quare in posca sanguinem reicientibus medetur, auctore Plinio.

SYMPHONIA Plinij.

Dalechampi.



Locus.

Tempus.

Vires.

Ibidem.

ribus, sed ex foliorum triplicis coloris maculis scitè distinctis venustas huius æstimatur, quæ sunt Ocimi aut Bliti, interdum luteo, viridi, vel purpureo, interdum triplici, viridi, luteo & sanguineo variegata, alarum psitacorum ritu: quare Flandri *Papagalli* vocant. Caterum planta hic depicta semen profert in exigua spica, villosa, cauli adhærente sine pediculo, flauescens punctis notata, quod vice floris est, perinde ac si natura tantum venustatis ac gratiæ prius in folia contulerit, vt deinde veluti picturæ florū oblita, eos vix inchoatos reliquerit. In hortis colitur ad acetariorum vsum, præsertim ab olitoribus Italis, allato ex Hetruria semine. Alsiosa est hæc planta, ad primam frigoris inclementiā flaccescens. Quamobrem ante veris teporem eius semen olitores terræ credere non audent, ne tenella herba algoribus vratur ac pereat. Sapor idem qui & Bliti, nisi quod paullulo magis austera est: quare in posca sanguinem reicientibus medetur, auctore Plinio.

LAMPSANA



Lus Græcis λαμψάνη dictum videtur ἀπὸ τῆς λάψαι, quod lambere significat, quòd foliorum mollitie, caduca decubituve in humū, eam lambere videatur. Sic & Latinis Lampšana vocatur, olim à Romanis Napus silvestris. Quibusdam λαψάνη, & Lapsana dicenda videtur, nō λαμψάνη neque Lampšana. Hanc Dioscorides inter olera recenset, nullis tamen notis eam vt notissimam delineat. Sed nunc non æquè omnibus cognita. Plinius scribit inter silvestres Brassicas Lapsanam esse, pedalis altitudinis, hirsutis foliis, napi simillimis, nisi candidior esset flore, coqui in cibo, aluum leuiter emollire. De eadem hæc Plinius alio in loco. Nec non olus quoque silvestre est trium foliorum, Diui Iulij carminibus præcipuè iocisque militaribus celebratum. Alternis quippe versibus exprobrauere Lapsana se vixisse apud Dyrrhachium præmiorum parsimoniam cauillantes. Est autem id cyma silvestris. Quæ hîc depicta est planta, nascitur frequentissima, inquit Matthiolus, in Hetruria, Apulia, ac

Nomina

Lib. 2. c. 109

Lib. 20. c. 9.

Forma.

Lib. 19. c. 8

Locus.

Ibid.

LAMP SANA Matthioli.



LAMP SANA Dodon.



plerisque Italiæ locis, iis præsertim campis qui aratrum eo anno non sensere: tamen hodie, nisi fortè urgente penuria in cibarium vsum vix recepta sit. Eam tamen, quod maxime oportuit, nec describit, nec cur Lāpsana Dioscor. sit explicat.

Lampšanam Betæ silvestris speciem facit Dodonæus, quæ foliis est latis, in pallido viridibus, vtrimque profundius incisis, napo similibus, sed minoribus: caulibus bipedalibus, in ramulos multos diuisis, in quorum fastigiis emicant flores multi, parui, lutei, hieracij minoris floribus fere similes. Eandem Lobellius Lampšanæ nomine depinxit. Vbique prouenit, in viis scilicet, & in hortis in quibus Betæ nascuntur, & humidis locis. Pena hanc Dodonæi Lampšanam, neque naps neque Brassicis congenerem esse censet, sed potius hieraciis, floribus nimirum stellatis, luteis, non Brassicæ, foliis hieracij modo laciniatis, caulibus ses-

Lib. 3. c. 109

Forma.

Locus.

LAMPANA Vera. falso
Theophr. Erysimum Dodon.

Lib. 5. cap. 10.



quipedem & binos pedes altis, è fibrata radice & exigua, semine pusillo. Hæc nulla sui parte in olerè manditur: quare Lampanam esse negat, eam vero genuinam esse putat, quam Galli *Saunes blanches* vocant, quasi Sinapistrum albū, quidam Sinapi silvestre, Lugdunenses *Rauenon*, Pena Rapisstrum aruorum, quam Dodonæus Theophrasti Erysimum esse falso credidit, de quo diximus, cap. De Rapo, & de Erysimo. Plus alit Lampana quàm Rumex, auctore Dioscoride, & stomacho vtilior est. Eius folia & caules coquuntur in cibo. Plinius scribit coqui in cibo, & aluū leuiter emollire. Galenus in lib. de Aliment. facultatib. de Lampana nihil scripsit, fortasse sub Brassicæ generibus comprehensa. Verum in lib. simpl. Lampana, inquit, si edatur, malum succum gignit. Si vero imponatur extergendi ac discutiendi vim quandam habet. Hanc Northmanni rustici prope Codomum inter segetes colligunt, & minutim confectam in iusculis coquunt, ac pro olerè comedunt non insuauis gustu.

PES ANSERINVS. CAP. VII.

Superioribus stirpibus duæ quæ sequuntur plantæ subnectuntur, non quod sint *ἀνίσχυρα*, & in cibos receptæ, aut quod in iis ferendis operam ponant olitores, sed ob tam magnam ipsarum cum Atriplice & Blito præsertim florum & seminum affinitatem, ut prior hæc,

PES ANSERINVS.

Nomina

In hist. pla.
252.

Forma.

Locus.

Tempus.
Temper.

cap. 252.
Lib. 5. c. 3.



tertia Atriplicis species à Matthiolo constituitur, à Lobellio Atriplex silvestris latifolia vocetur. Quidā tamen herbarij nomen eius veteribus Græcis Latinisq; ignotum esse arbitrati, à foliorū figura, quæ in ambitu ita laciniata sunt, ut Pedis Anserini formam repræsentet, Pedem Anserinum vocant, Galli similiter *Pied d'Oye*, Germani *Genz fusz*. Quum vero hæc herba suis etiam inimica sit, factū est, inquit Fuchsius, ut à mulierculis vocata sit *Seuutod*, & *Schueinztod*, id est, mors porcorum, Gallicè, *La mort aux pourceaux*. Caulem profert cubitalem, interdum maiorem, rectum, striatum, furculosum: folia lata, toto ambitu altius incisa, atque ideo Pedis Anserini speciem referentia: flores racemosos, exiguos, rubentes: semen racematim velut in Atriplice silvestri singulis ramulis insidens, radicem obliquam cum fibris plurimis. Locis incultis passim, & in hortis, aliisq; in locis ubi fimum reponitur, nasci solet. Iunio & Iulio mensibus floret. Sucundo refrigerat ordine, inquit Fuchsius, non secus atque solanum hortense, vel fere ad tertium

tertium vsque ordinem, vt putat Dodonæus. Suibus exitium adferre herbã hanc deuoratam experientia compertum est. Corpori humano exterius admota, idem quod Solanum hortense præstare potest. Quare etsi huius herbæ nullus sit in officinis vsus, tamen quia passim nascitur, & temere fortassis à nonnullis vires eius ignorantibus vsurpari posset, eam silentio præterire noluimus, vt tam vulgaris herbæ facultas omnibus perspicua foret.

VULVARIA.

CAP. VIII.



HÆc herba Atriplici quadamtenus similis est, nisi quod omnibus partibus minor, vnde quibusdam pusilla Atriplex, Lobellio Olida, & garum olens, Cordo Garosmam dicitur. Eius nomen Græcis Latinisque ignotum esse putant Herbarij. Quare à foetido odore Tragium vocauit Dodonæus, Gallice *Herbe de Bouc*. Quia vero duo sunt alia Dioscoridi Tragij genera, ad horum discrimen Tragium Germanicum cognominauit. Cateris Herbariis Vulvaria dicitur. Quia virosum illum odorem refert, quem impuri meretricum loculi spirant. Aliis atriplex canina, qui eam ex vrina canum nasci putant. Humilis est & tenera planta, cauliculis multis, per humum repentibus foliolis candicantibus, ac veluti farina aspersis, Atriplici similibus, sed minoribus, & maioranæ foliis vix maioribus. Semen

Nomina

Lib. 5. c. 4.

Forma.

paruum, album, racemosum profert Atriplicis siluestris modo. Tota planta odorise est abominandi, piscis, aut capitis piscis, aut olidi hirci foetorem referens. In viis & sabulosis locis prouenit. Æstate media floret, editque semen. Herbæ foetor foeminis strangulatu vuluæ oppressis confert, maximè si vmbilico imponatur.

Locus.

Tempus.

Vires.

SPINACHIA.

CAP. IX.

SPinacia, & Spinachia, & Spinaceum olus Latinis appellari potest, quod *σπανάκια* Græcis recentioribus dicitur. Spinacia quidem & Spinaceum olus ab insigni seminis spiculorum nota, quod tam glabræ, & mollis herbæ semen in spinas occalescat. *Σπανάκια* verò à raritate, quod raro illo medici vterentur. Quibus hæc vocabula displicent, Atriplicem Hispaniensem vocant, Mauritani *Hispanach*, idest, Hispanicum olus, fortasse quod inde primum duxerit originem, ad cæteras tandem nationes translatum: quidam Seutlomalachen. Ruellius Seutlomalachen, inquit, recens Græcia fecit olus, quasi dicas maluaceam betam, quod, vt reor, parentum adulterio natum existiment, veteribus inauditum, forte quod figura, & denticulato seminis habitu betam, & mollitia maluam mentiretur. Quod si ita est, neotericis omnibus tritissimum, ab insigni, spiculorum seminarium nota Spinaceum vulgò dictum putant. Sed forte Seutlolapathum, ait Gesnerus, hoc est mediæ inter betam & runcem naturæ, potius quam Seutlomalachon appellandum. Galli *Espinars* vocans, & *Espinaches*, Germani *Spinet*, vel *Spinnat*. Spinachiae genera duo, satiuum, & siluestre. Satiui item duo, mas & foemina. Mas semen fert. Foemina floret quidem, sed seminis infœcunda sterilescit. Nam Spinachia vt cannabe, semina edit, ex quorum nonnullis exit mas, ex aliis eiusdem plantæ foemina. Spinachia exit septem diebus à satu, folio primum triangulo molli, mox intubaceo, plerumque qua pediculo

Nomina

Lib. 2. c. 147

In hor. Ge.

Genera.

Forma.

SPINACIA.

In libro 2.
Diosc. c. 117



cohæret, laciniato, inertis sapore, exigua radice-
multiplici, tenuibus capillamentis fibrata: cau-
le cubitali, nonnūquam altiore, intus cauo: flo-
ribus in vertice rotundis, racematim coeunti-
bus, exiguis: semine spinulis horrido. Credi-
dere recentiorum nonnulli, inquit Matthiolus,
Atriplicem & Spinachia eiusdem esse generis.
Sed eos falli existimat, quia Spinachia nouum
in Italia olus est, foliorum, caulis, & seminis fi-
gura colorēque ab Atriplice maximè distās, si-
cuti & sapore. Nam Manardus Atriplicē & Spi-
nachiam chrysolachani species esse scripsit.
Cuius sententiam minimè probat Matthiolus:
Chrysolachanum enim, idest aureum olus in
Atriplicem quidem competit, vt dictū est, mi-
nimè tamen in Spinachia, quæ foliis, flore, cau-
le ac semine perpetuo virescit. Hoc olus vete-
ribus (quod mirum est) incognitum fuisse vide-
tur, cum de eo nihil illi, quod legatur, literarum
monumentis tradiderint: vel forsitan quod ci-
bo quàm medicinæ potius natū esset, nec quic-
quam illustre sortitum, ob id ingenij segnitie

obscurum: vel quod, vt coniici potest, nondum in vsum vulgi, literatorūque
cognitionem eo sæculo venerat, qui eorum quæ suafuerunt memoria, prorsus in-
tactum nihil intentatūque reliquerunt. Non enim silentio tam frequens olus
Vires. abolere voluissent, sed potius celebratum in lucem prodere. Nunc passim in
hortis feritur, nullūque solum respuit, sed quocumque prouenit lætissimè. Seri-
Tempus. tur Septembri mense, non horrēs hiemis frigora, vt vere cibum suppeditet, quo
tempore semen profert. Martio etiam mense feritur. Iunio & Iulio flores & se-
Vires & Temper. men edit. Spinachia primæ refrigerantium & humectantium classis. Aluum
emollit, melius Atriplice suppeditat alimentum, sed aluo parum hærens faciliè
exigitur. Flatus colligit, & vomitiones concitat, nisi excrementitius humor abii-
ciatur: ventrem decocti iure proluit. Citra aquam coquitur, quod magnam vim
humoris inter coquendum remittat, & veluti proprio contentum iure alienum
aspernetur. Ligula subinde percussum abacto lentore versatur, deinde in manua-
les globos expressa penitus sanie redacta, patinis in oleo vel butyro frigitur, addi-
to quo magis palatum titillet, omphacio. Bibitur eius succus ad scorpionum, &
Matth. ibi. araneorum ictus, ac etiam vulneri illinitur: quinetiam cocta lenit exasperatas
fauces. Spinacia siluestris plurimis statim à radice cauliculis fruticat, rotundis,
glabris, rubescentibus ima parte: cum adoleuerunt cubitalibus & longioribus, in
quibus ex longis pediculis singula folia dependent, ampla, longa, in ambitu mi-
nimum profundis laciniis sinuosa, rugata, auersa parte venosa, lætiùs virentia,
aduersa obscuriùs, acuminata, & sagittarum cuspidis figuram planè referentia.
In caulium summitatibus semen racemosum est. Ex radice vt cauliculi, ita pedi-
culi bene longi emergunt, singuli singula folia valde magna sustinentes. Sunt
qui aquam ex hac planta vitreis organis eliciunt, & ad ciendos sudores pluri-
mum valere predicant.


LACTV

LACTUCA CAP. X.

LACTUCA à lactis copia nomē adepta Græcis θρίδαξ dicitur, à recentioribus vt Psello, & Symeone Sethi μαρούλιον, vel μαίελιον, & θριδακίνη. Nomina
 quamquam siluestre olus quoddā propriè θριδακίνην appellari Galenus Li. 2. Alim. & lib. 2. cō. ph. loc. c. 1.
 scripsit, Mauritanis Cherbas, seu Chas, Italis *Lattuca*, Germanis *Lactuck* & *Lattik* Hispanis *Lechuga*, aut *Alfalfa*, Gallis *Laittue*. Lactucæ genera plurima. Plinius. Genera Lib. 19. c. 8.
 Lactucæ Græci tria fecere genera. Vnum lati caulis, adeo vt hostiola olitoria ex his factitari prodiderint. Folium his paulo maius herbaceo, & angustissimū, vt alibi consumpto incremento. Alterum rotundi caulis. Tertiū sessile, quod Laconicum vocant. Quæ ex Theoph. sunt exscripta. ἡ τῆς θριδακίνης ἡ λευκή γλυκυτέρα, ἡ ἀπαλωτέρα. γένη δ' αὐτῆς ἐστὶν ἀλλὰ τρία, τό τε πελαγικαυλον, ἡ τροχυλόκαυλον, ἡ τριήλον, τὸ λακωνικόν. Lib. 7. hist. ca. 4.
 ἀλλ' ἡ δὲ τὸ μὲν ἔχει σκολυμῶδες, ὀρθὴ δὲ ἡ βιάξης καὶ ἀπαράβλατος ἐκ τῆς Καμλῆς. τῶν δ' ὡς πλάθειων οὐδ' ὅτινες πελαγικαυλοὶ γίνονται, ὥς ἐν ἑνὶ φασὶ καὶ τῇραις χρεῖσθαι κηρωμαῖς. τὸ δ' ὁπωδὸς σφόδρα, ἡ μικρόφυλλον, ἡ λευκοκαυλότερον ὅμοιον ἀγρίῳ. Id est, Lactuca candida dulciōr & tenerior est. Cuius genera alia sunt tria, laticaulē, rotundicaulē, & laconicum. Hoc folio est scolymi, rectū, insigni proceritate, nec à caulibus brachiatū. Laticauliū quædam vsque eo in latitudinē adoleuerunt, vt aliqui in valuas hortarum vsurparint. Quæ verò valde succosa est, foliόque exiguo, ac candidiore caule, siluestri similis est. His plura genera deinceps Plin. statuit. Alij, inquit, colore & tempore satus generā discreuere. Esse enim nigras, quarum semen mense Ianuario Ibid.
 feratur: albas quarū Martio: rubētes quarum Aprili. Et earum omniū plantas post binos menses differri. Diligētiōres plura genera faciunt, purpureas, crispas, cappadocas, Græcas. Longioris has folij, caulisque lati, præterea longi & angusti, intubi similis. Pessimū autē genus cum exprobratione amaritudinis appellauere picrida. Est etiamnum alia distinctio atræ, quæ Meconis vocatur à copia lactis soporiferi: quamquā omnes somnū parere credūtur. Apud antiquos Italiæ hoc solum genus earū fuit, & ideo lactucæ nomen adepta. Purpuream maximæ radicis Cæcilianam vocant. Rotundam verò ac minima radice, latis foliis, Astylida (Athenæus habet Astytida, quasi vrbānam) quidāmq; Eunuchion, quoniā hæc maximè refragetur veneri. Est etiamnū quæ vocatur Caprina (marina ex Corn. Celsō) lactuca. Et ecce cum maximè cœpit irrepere satiuus admodum probata, quæ Cilicia vocatur, folio Lib. 20. c. 7.
 Cappadocæ, nisi crispum latiusq; esset. Columellæ quoque plura sunt lactucæ genera, quæ suo quoque tempore feri oportet. Earum quæ fusci, & veluti purpurei, aut etiam viridis coloris, & crispi folij, vti Cæciliana, mense Ianuario rectè differtur. At Cappadocia quæ pallido, & pexo densōque folio viret, mense Febuario, quæ deinde candida, & crispissimi folij, vt in prouincia Betica, est, finibus Gadi- Lib. 11. c. 3.
 tani municipij, mense Martio rectè pangitur. Est & Cyprij generis ex albo rubicunda, leni & tenerrimo folio, quæ Idibus Aprilis commodè disponitur. Lactuca in satiuam & siluestrem diuiditur à Dioscoride, à Matthiolo satiuā in crispam, rotundam, & capitatam, quibus quartam addit quæ Romana vulgò vocatur, & quintam Cypriam, quam ex Cipro allatā ferunt. Dodonæo lactucæ species sunt, lactuca vulgaris, crispa Plinij, & aliorum veterum, Gallicè *Laittue cressue*, tertia Lib. 2. c. 129
 lactuca capitata, Gallicè *Laittue pommee*, lactuca sessilis, & Laconica veterum, Columellæ Betica. Quibus addit lactucam Cæcilianam Columellæ, foliis fuscis, & fere purpureis: præterea lactucā Cypriā eiusdē, quæ lactuca est Græca Plinij, foliis rubescentibus, læuibus, tenerrimis, gustus optimi. Sed duas postremas species recētioribus incognitas esse ait. Lactuca satiuā foliis est longis, latis, læuibus, nudis, minimè cōglomeratis, inter quæ caulis excrefcit binū fere cubitorū altitudine, succo prægnans lacteo, in summo brachiatus, flores proferēs luteos, qui tandē in pappos abeunt: semen candidū, parū, oblongū. Radix subest longa, crassa, fibrata. Lib. 5. c. 18.



LACTVCA CRISPA
Dodon. & Fuchs.



Lactuca Crispa, folia habet crispa, intubo maiori similia, valde laciniata, caule superiori proxima. Rotunda in orbem spargitur, rotundioribus foliis tenerioribusque, vna se stipantibus. Capitata seu sessilis, foliis à rotunda parū differt, sed in globum folia circumuoluuntur, & extuberant Brassicæ capitatæ modo. Romana quæ in cibis omnibus præstat, foliis est maioribus pinguioribus, viridioribusque. Ea in ouatū caput extuberat, cæterisque tenerior & candidior fit, si in cacumine ligetur, terræque obuoluitur ad cacumen vsque: hac enim arte mirum in modum tenerescit, & candidior, gustuique gratior redditur. Caulem edunt omnes bipedalem, albicantem, lacteo prægnantem succo, in summo brachiatum, foliis plenum in acutum desinentibus. Flores in ramusculorum cacuminibus prodeunt lutei, qui tempore papposi facti in auras abeunt. Semen omnibus oblongū, in acutum tendens, candidū, quandoque etiam nigrum. Senescentes omnes amarorem contrahunt. Nascitur Lactuca quarto aut quinto à satū die, & adulta transponitur. Siluestris Lactu-

Lib. 2. c. 30.

Lib. 7. hist.
c. 6.

ca, inquit Dioscorides, sativæ similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora & asperiora: amaro gustu est. Theophrastus, γειδακίνη δὲ τὸ τε φύλλον βραχύτερον τῆς ἡμέρου, καὶ τελεφεμένον ἀχινύσται, ἔ τὸν χυλὸν ὁμοίως. Τὸν ὁπὸν ὃ δλεμὺν, ἔ φαρμακώδη. Φύε' δὲ ἐν ταῖς ἀράραις ἀπίζουσι ὃ ἀλὴν ὑπὸ παραμυθὸν, καὶ φασὶ καθαίρειν ὑδρωπα, καὶ ἀχλὺν ἀπ' ὀφθαλμῶν ἀπάγειν, καὶ ἄργεμα ἀφαιρεῖν ἐν γάλακτι γυναικείο. Id est,

Lactuca

Lactuca siluestris folio breuiore est quàm satiua, quod consummatum aculeatur, similiter & caule breuiore. Succo manat acri & medicato: nascitur in aruis. Carpitur succas per messes. Aiunt eo purgari hydropem, caliginem ab oculis atteri, & argema tolli cum muliebri lacte. Hæc est, inquit Ruellius, quæ passim ab Officinis nostris nunc endiuiâ dicitur, cum in aruis nascatur sponte, & vinetorum li-

Lib. 2. c. 69.

LACTUCA Siluest. Matth.

LACTUCA Siluest. vera,
Dalechampij.

mitibus, folio cum adoleuit per oras aculeato, dorso spinulis inhorrescente, quasi prona carinæ parte echinata, supina læuiore, nonnunquã cum insenuit laciniatim serrato: caulibus bicubitali proceritate confurgentibus, hirtis, flore luteo, succo candido, amaro, acri, ideo linguam & os aliquantulum vellicante. Huius vti satiuae semen occultitur lanugine. In eadem sunt sententia Fuchsius & Dodonæus. Quibus subscripsit etiam Matthiolus. Siluestris Lactuca, inquit, in cæpestribus nascens faciliè dignoscitur, quod caule, floribus, semine & folio satiuae iam flores & semina proferentem æmuletur. Verum gustu amara est, & lacte copiosiore referta. Hæc Lactuca siluestris Fuchsij & Matthioli, est Endiuiâ vulgarior Officinarum, Penæ & Lobellio. Seris satiua altera Lactucarum simillima, amara, angustifolia Dioscoridis. Alia verò Lactuca siluestris à Dalechampio hic exhibetur, quam veram esse arbitratur. Radice est minimi digiti crassitudine, candida, fere semper contorta, paucis fibris capillata, succi lactei plena. Folia circa radicem antequam in caulem assurgat humi iacent, Lactucæ similia, in ambitu crenata, sed non sinuosa, veluti huius edita pictura demonstrat, dorso aculeato, arefcentia cum caulis gliscit. Is teres est, cubito altior, aliquantum spinosus haud procul à radice, cætera glaber, subrubens, in quo folia impari intervallo disposita, caulem amplexantia, quam cauli iunguntur bifida, in summo tripartita, figura nonnihil ad triphyllum accedente. Flos est luteus, Lactucæ similis. Totius plantæ sapor insigniter amarus est. Alterius Lactucæ siluestris historia & pictura extat apud Penam, quæ omnibus partibus ad Lactucâ accedit, vel ad Seridem latifoliam, vulgò Scariolam, Lactucæ simillimâ. Succo lacteo tota manat, adeo ut præ eius copia saporifero sit odore tetro & ingrato, veluti opium. Caulis bicubitalis glutinosus: flores Lactucæ: semen aliquantominus nigricans. Ea, inquit Lobellius, in agro Romano foliis nigris maculis variata conspicitur. Satiua Lactuca in hortis prouenit, latis & riguis stercoreatisque. Lactuca siluestris Dalechampij in

In hist. pla.
c. 112.

Lib. 5. ca. 19.

In libr. 2.

Diosc. c. 130.

Locus.

Tempus. rupibus lapidosis saxosisq; locis nascitur, vbi durum solum pauca terra contegitur: nonnunquam ex rupium ipsarum rimis exilit. Seritur Lactuca toto anno, sed Martio, & Aprili mensibus potissimum, binis mensibus inter semen plantamque & maturitatem. Lactuæ satiua vt scribit Dioscorides, refrigerant, stomacho gratæ habentur, somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & veneri refragatur. Ipsæ verò frequentiores in cibo claritati oculorum officunt. Muria condiuntur, cum in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur succo lactis siluestris Lactuæ similem. De iisdem hæc Plinius. Est quidem natura omnibus refrigeratrix, ideo æstate gratæ stomacho fastidium auferunt, cibique appetentiam faciunt. Diuus certe Augustus Lactuca conseruatus in ægritudine fertur prudentia Musæ medici. Cum priores cauerent, religione nunc omni caret, intantum recepta commendatione, vt seruari etiam in alienos menses eas oxymelite repertum sit. Sanguinem quoque augere creduntur. Venerem inhibent, æstum refrigerant, somnumque faciunt. Cruditatem ipsæ nequaquam faciunt, nec vlla res maiorem in cibis auiditatem incitat, inhibetque. Ambustis profunt recentibus, priusquam pustulæ fiant cum sale illitæ. Vlcera etiam quæ serpunt, coercent initio cum aphronitro, mox in vino tritæ. Igni sacro illinuntur. Conuulsa & luxata caulibus tritis cum polenta ex aqua frigida leniunt: eruptiones papularum cum vino & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederunt, ad quod vtilissimæ quàm maximè caulis, & amaræ. Quidam lacte infundunt. Deferuefacti ij caules, & stomacho vtilissimi traduntur, sicut somno & satiua maximè Lactuca & amara lactensque, quam meconidem vocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte vtilissimum esse præcipitur, dum tempestiuè capiti inunguntur. Semen satiuarum contra scorpiones dari. Semine trito ex vino poto & libidinum imaginationes in somno compesci. Tentantes aquas non nocere Lactucam edentibus. Quidam tamen frequentiores in cibo officere oculorum claritati tradiderunt. Sed de iis accuratissimè Galenus. Plerique medicorum, inquit, hoc olus, vt ficus autumnalibus fructibus prætulerunt. Nam inter ipsa aliud melioris succi non inuenias. Quod porro nonnulli vitio verterunt, id ei in præcipuam laudem cedit, & si ita reuera haberet, non modo nulli olerum, sed ne optimi quidem succi, ac maximi nutrimenti eduliis esset secundum. Nempe Lactucam aiunt sanguinem generare. Quidam non simpliciter sanguinem dicunt, sed multum sanguinem generare affirmant. Verum ij tametsi prudentius obiiciunt, longius tamen aliis à vero absunt: quamquam hoc ipsum, puta, multum sanguinem procreare, non est quod merito quis damnet. Constat enim eiusmodi edulium laudatissimi succi esse, quod plurimū quidem sanguinis, aliorum vero succorū nullum producere sit comparatum. Si verò quia permultum è lactuca sanguinis congeratur, idcirco damnandam eam censeant facillimè huic malo occurri potest: quippe quum vrescentibus & liberalius exerceri, & ea parcius vti integrum sit. Hæc ergo aduersus eos qui olus hoc non rectè vituperant. Illud porro scire conuenit, omnibus aliis oleribus paucissimum sanguinem & vitiosum generantibus, ex sola Lactuca nō multum, quidē, nec vitiosum, haud tamen omni ex parte laudabilem gigni. Vt plurimū quidem cruda ipsa vescuntur: æstate autē cum iam in semen proruptura est, in aqua dulci præcoquentes cum oleo, garo, & aceto assumunt, aut cum aliquo ex condimentis, obsoniisve, præsertim iis quæ caseo constant. Pleriq; etiam antequam excaulescat in aqua elixa vtuntur, vt ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse cœperunt. Nam amicus quidam meus cum olere hoc à longo tempore, me vt familiari cibo vsum fuisse sciret, videretque post mandi à me citra magnā molestiā non

non posse, cocturæ rationem indicauit. Etenim in iuuentute quoniam os ventriculi bile efferuescebat, æstus moderandi gratia Lactuca utebar. Cum autē ad prouectam ætatem peruenissem, olus hoc contra quàm in iuuentute somnum iam omni studio & industria accercenti auxilio fuit. Quippe qui etiamnum iuuenis lucubrandi gratia vigiliis dedita opera me assuefeceram. Declinante iam ætate ipsa ex se insomni, grauius hoc incommodo afficiebar. Aduersus quod vnicum mihi præsentissimum remedium lactuca vespere commanducata fuit. Frigidum ergo humidumque succum profert, non tamen vitiosum. Itaque sicut alia olera à iusta concoctione non excidit, neque aluum cohibet vti neque impellit. Atqui hæc illi non immeritò accidunt, quum nec austera, nec acerba sit, quibus facultatibus in vniuersum aluus sistitur, quemadmodum à salis, acribus, & omnino abstergendi vim habentibus ad excretionem concitatur, quorum nihil lactucæ inest. Et alio in loco. Lactuca humidum est frigidumque olus, non tamen extremè, siquidem edendo non foret, verum maximè secundum aquæ, vt sic dicam, fontanæ frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas accommodum est, & ad parua & leuia erysipelata, non tamē ad maiora. Est etiam edulium siti aduersum. At semen potu genituræ profluuium cohibet, quamobrem iis datur qui libidinis somniis vexantur. Præterea Galenus alibi ex Archigene recensens olera, quæ stomachicis in cibo conueniunt, in iis habet lactucas, & *μυκωνιδας*, quas meconides lactucas conuertit Cornarius. Appellatur enim meconis quoddam lactucæ atræ genus, à copia succi & lactis soporiferi, similitudine quadam cum meconio, hoc est papaueris succo: *μυκων* enim papauer Græcis dicitur. Sed de hoc lactucæ genere Plinij verba supra adscripsi, de quo rursus ille alio in loco. Et amara lactensque, quam Meconidē vocauimus. Sic enim eo loco legi debet. Lactucæ succus, auctore Matthiolo, & ex rosaceo frōti & temporibus illitus, non solum febrientibus somnum conciliat, verum etiam capitis dolorem mulcet. Gargarizatur vtiliter ex punici mali succo, ad columellæ inflammationem. Testiculis illitus seminis profluuium cohibet, præsertim addito caphuræ momento, sed venerem extinguit. Idem præstat epotum semen ex papauerini seminis cremore haustum, atque etiam ardoribus vrinæ opitulatur. Cauendus lactucarum succus suspiriosis, sanguinem excreantibus, pituitosisque, & iis maximè qui liberis dant operam. Lactuca innatat acri. Post vinum stomacho, inquit Horatius, quæ res quia concoquendi vim debilitat atque obtundit, lactucas in prima mensa apponere, easque primas omnium gustare & esse debemus, siue crudas, siue coctas. Huc pertinet Martialis distichon.

Li. 6. simp.

Lib 8. com.
ph. loc. c. 4.

Lib. 20. c. 7.

In libro 2.
Diosc. c. 129.Lib. saty. 2.
sat. 4.

Lib. 13.

Claudere quæ cænas lactuca solebat auorum,

Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?

Nunc de lactucæ siluestris facultatibus dicendum. Viribus aliquantum papaueri similis est, inquit Dioscorides, vnde lacteum eius succum aliqui meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema caliginemque repurgat: cōtra adustiones efficaciter illinitur cum lacte mulierum. In summa somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit: contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter quàm satiuæ libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venerem arcet. Succus ad eadē valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, vt in aliis liquaminibus moris est, insolatum. De hac Plinius ita tradit. Lactucæ sponte nascentis primum est genus eius quam Caprinam vocant (marinam) qua pisces in mare deiecta protinus necantur qui sunt in proximo. Huius lac spissatum mox in aceto pondere obolorum duum, adiecto aquæ vno cyatho hydropicis datur, quibus verbis exprimere voluit illa Dioscoridis *χαλαίρει ὃ μὲν ὀξύχρατος ποθεῖς*, &c.

Lib. 2. c. 130.

Lib. 20. c. 7.

Aquam

- Ibidem. Aquam per aluum elicit potus in aceto mulso, & cætera. Eiusdem succi vsum medicum Theophrastus habet eo loco quem supra citavi. Ex quo & hæc Plinius descripsit, additis quibusdam aliis. Succus omnibus (siluaticis) candidus, viribus quoque papaveri similis: carpitur per messes inciso caule: conditur in fictili nouo. Sanat omnia oculorum vitia cum lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatrices, adustionesque omnes, præcipuè caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Idem succus aluum purgat in posca potus ad duos obolos. Serpentium ictibus medetur in vino potus. Et folia tosta thyrsiq; triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur, maximè contra scorpionum ictus. Verùm contra phalangia commisto vino ex aceto. Aliis quoque venenis resistunt, exceptis quæ stragulando necant, aut iis quæ vesicæ nocent: item psymmithio excepto. Imponuntur & ventri ex melle atque aceto, ad detrahenda vitia alui. Vrinæ difficultates succus emēdat Cratenas eum & hydropicis obolis duobus in aceto & cyatho vini dari iubet. Hæc verò Galenus tradit. Iis qui venereis somniis vexantur agrestis lactucæ semen exhibetur, cuius colligitur succus argema, caliginesque expurgans, tum adustiones cum lacte muliebri inunctis. Quæ argema Theophrastus, Dioscorides, Galenus dixerunt, Plinius cicatrices videtur conuertisse. Ad Theophrastum Dioscorides addidit, καὶ πρὸς ἐπικαύσεις succum illini, Galenus πρὸς ἐπικαύματα, quod idem est, Sunt autem ὄγυμα & ἐπικαύσεις, seu ἐπικαύματα oculorū vlcera, quæ Paulus aperte declarat his verbis. Vlcus in oculis genus quidem vnum est, differentiæ verò particulares diuersæ. Etenim in cornea brana vlcus cauum, angustum, & purum βόθρυον Græcis dicitur, id est, fossula. Quod autem latius bothryo est, sed minùs profundum κόλωμα nuncupatur. Argemon in pupillæ circulo iacens, ambientia comprehendit, vt etiam in exteriori pupillæ parte rubicundum, in interiori candidum appareat. Ἐπικαύμα vlcus est sordidum, & crusta obductum, quo repurgato humores oculi sæpe effluunt. Hæc Paulus. Galenus quoque de ocularibus compositionibus scribens, ait. Ἄλλο τρυφερόν ἐπιγραφόμενον, πρὸς ἐπικαύματα, & cætera. Ruellius in Dioscoridis & alij Galeni interpretes, adustiones conuertunt, secuti, vt opinor, Plinium, qui vt ex loco paulo ante citato intelligere licet, Dioscoridis ἀχλὺς, ὄγυμα, & ἐπικαύσεις, nubeculas, cicatrices, adustiones interpretari videtur. Qui omnes si adustiones igni, vel quouis alio modo ambusta accipiunt, vehementer errant. Cornarius inustiones vertit. Nec video, inquit, quomodo hoc vlcus oculorum genus possit Latinè commodè dici. Vstiones autem simpliciter dixit etiam Scribonius in collyrio psittatino. Et auctor Εἰσγωγῆς Galeno inscriptæ definit ἐπικαύμα esse, cum superior tunica in superficie inusta vlceratur, aut etiam paullo altior vlceratio fit, ob magni floris influxum. Vnde non malè adeo inustio dici potest.
- Li. 6. simp.
- Lib. 3. c. 22.
- Li. 4. com. ph. loc. c. 7.
- Ibidem.

PORTULACA.

CAP. XI.

Nomina




Νόστος Græcis, Latinis Portulaca dicitur, Arabibus *Bakleancha*, seu *Bachele albanica*, Italis *Porcellana*, *Porchellachia*, & *Porcellina*, Germanis *Burtzelkraut*, Hispanis *Verdolagas*, & *Baldroegas*, Gallis *Pourpier*, *Porchailles*, & *Porcellaine*. Portulacæ tria sunt genera. Satiuū, siluestre, & marinum.

Genera

Forma.

Portulaca satiuca caules edit crassos, pingues, teretes, glabros, erectos, lentè vergentes in puniceū: folia crassa, pingua, latiora & oblonga, in summo rotundata, fabariæ vulgò vocatæ, modo splendētia, à tergo candicantia: flores exiguos, luteos siue pallidos in summis fere caulibus semina nigra, exigua in caliculis herbaceis, & rotundis inclusa: radicem multifidam, teneram, fibratam. Portulaca siluestris quæ sponte in hortis, vineis, aliisque in locis nascitur, caulibus est rotundis, pinguibus, crassis,

PORTULACA *Satiua.*PORTULACA *Siluestris.*

ὑφάλμυρα. Idest, Andrachne siluestris folia oleæ habet minora tamen, multo numerosiora, & tenera, rubentes cauliculos, ab vna radice multos, in terra sessiles, qui commanducati succo abundant, & sapore falsi sunt. Reliqua omnia plane adulterina sunt, & supposititia. Portulaca marina Portulacæ siluestris species, caulibus multis fruticat, tenuibus, duris, lignosis. Folia habet crassa, pingua, cinerea, Portulacæ planè similia, falso sapore, sed candidiora, tactu læuia, neque tam lubrica

crassis, sed tenerioribus, minoribus, magis rubescentibus, & per humum sparsis: foliis minoribus, & oblongioribus quàm satiua, cætera planè similibus. Alterū verò siluestre, inquit Matthiölus, humi repens minoribus, tenuioribus, ac crebrioribus foliis. Hæ portulacæ succosæ sunt cum quadam austera aciditate. Hæ cū sint portulacæ vtriusque genuinæ delineationes, tum peritissimorum Herbariorum testimoniis, tum ipsa earum stirpium inspectione comprobata, perspicuum est caput de siluestri portulaca in vulgaribus Dioscoridis libris ad caput de satiua falsò, neque ab ipso auctore adiunctum fuisse. Quam sententiam approbasse videntur Ruellius, & Matthiölus, qui in vtraque suorum in Dioscoridem commentariorum editione id caput penitus sustulit, sed ab aliquo homonymia decepto, ex libro quarto huc temere translatum. Cum enim videret ille Dioscoridem cæterorum fere omnium olerum genera siluestria satiuis subiunxisse, & libro quarto tertiam semperuiui speciem portulacam, agrestem quibusdam dictam descripsisse, itemq; Plinium idem semperuiuum ita nominasse, & iisdem fere verbis depinxisse, eius historiam hallucinans Portulacæ coniunxit. Quasi verò ea semperuiui species Portulaca siluestris sit, quæ vulgari Portulacæ nostræ hortensi & esculentæ opponatur, cum illius vis sit excafactoria, acris, exulceras, vt Dioscorides ait, huius refrigerans & humectans, quaque in acetariis æstate cruda vescimur. Sic & telephium huc referendū esset, quòd vt scribit Dioscorides, foliis & caule Portulacæ similis sit, & Galeno in glossis Hippocraticis auctore, Portulaca siluestris nominetur. Alij in quibus sunt & Fuchsius, & Andr. Lacuna, id caput de Portulaca siluestri Dioscoridis esse agnoscunt, sed multis modis contaminatum, & ab aliquo imperito rerum ex capite de tertio aizoo multa excerpta, & huc sine iudicio inserta. Sic igitur legit Fuchsius. Ἀνδράχνη ἀγρία φύλλα ἔχει ὅμοια ἐλαίᾳ, μικρότερα δὲ πολλὰ, πλεονία δὲ καὶ ἀπαλὰ, καυλὶα ἐρυθρὰ ἀπὸ μικρᾶς ῥίζης πολλὰ ἐπὶ γῆν κεκλιμένα, μαοσώμενα ὃ ἐνχυμα, καὶ γλίσχρα, καὶ

In lib. 2.
Diosc. cap. 17.

Lib. 2. c. 56.

Ca. de sem
peruiuo.Lib. 4. de
semperui.


Lib. 2. c. vlt.

In hist. pla
cap. 39.

*PORTULACA Marina,**Halimus vulgaris, Matth.*Lib. 1. Diosc.
ca. 103.

Lib. & c. 22

Lib. 5. c. 20.



lubrica. In caulium summitate flores profert atriplicis, vel bliti modo, deinde semen minutum, racematim cohærens: radicem longam & lignosam. Mauritanos scribit Matthiolus Halimum molochiam & Atriplicem marinam appellasse. Cuius historiam referens Serapio, narrat olitores in manuales fasciculos digestâ per Babyloniam circumferentes molochiam clamarare. Quæ Mauritanorum molochia, inquit fortasse est secûdum Halimi genus à Plinio positum his verbis. Alij olus maritimum esse dixere falsum, & inde nomen, foliis in rotunditate longis, laudatum in cibis. Hæc planta frequentissima est in littoribus Venetis (incolæ Bidone vulgò appellant) & vt olus in cibum recipitur. Sed quæ à Matthiolo pictura expressa est, siue sit Arabum molochia, siue Pliniani halimi genus, nihil aliud prorsus est quàm Portulaca marina, quam hic describimus, & pictam damus. Cui nostræ sententiæ subscribit etiam Dodonæus. Interim studiosos rei Herbariæ admo- neamus Mauritanos hallucinantes molochiam cum halimo Dioscoridis, & atriplice marina

confudisse, si illis molochia est, quam Matthiolus, nòsque depinximus: Portulaca enim marina, halimus Dioscoridis, & atriplex marina valde à sese distant, vt locis idoneis demonstratum est. Hanc marinam Portulacâ Lobellius & Pena Crithmû esse Dioscoridis, arbitrantur, eiusque historiam Portulacæ marinæ multo aptius congruere quàm fœniculo marino, qua de re fusius tractauimus in Umbelliferis, capite de Crithmo Matthioli. Portulaca satiuâ in hortis seritur, siluestris in hortis

Locus.

Ibidem.

etiam sponte prouenit & in vinetis, nonnunquam in incultis & saxosis locis. Marina in littoribus maris. Nascitur frequēs, inquit Matthiolus, prope Tergesti mœnia circa salinas, vbi etiam seorsum, nec minùs copiosa visitur atriplex marina. Portulacæ Iunio & Iulio mensibus florent, semenque differunt in Septembrem vsque. Iam Portulacæ siue in cibis, siue in medicamentis vsum explicemus, ex Dioscoride. Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque cum polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, vesicæ doloribus auxilio est, commanducata dentium stupores sedât: stomachi & intesti- norum æstuationem fluxionesque mulcet: renes & vesicam adiuuat, etiamsi ero- sionem sentiant: veneris impetus exoluit: succus epotus simili effectu prodest, in febribus valens. Contra teretes ventris tineas, cruentam excreationē, dysenteriā, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis percocta efficax est. Item cōtra sepi mor- sus. Ocularibus medicamentis vtilissimè commiscetur: interaneis fluxione labo- rantibus, atque vuluarum erosionibus infunditur: contra dolores quos æstus exci- tauit caput ex rosaceo & oleo fouetur: eruptiones papularum in capite cum vino emendat: vulneribus quæ ad syderationem spectant ex polenta illinitur. Ex Plinio. Portulacæ memorabiles vsus traduntur, sagittarum venena, & serpentium hæmorrhoidum & presterum restingit pro cibo sumpta, & plagis imposita ex- trahit. Item hyoscyamo potò, è passòque expresso succo. Cum ipsa non est, semen eius simili effectu prodest. Resistit & aquarum vitiis, capitis dolori, vlcerebûsque in vino tusa & imposita. Reliqua vlcera cum melle commanducata sanat. Sic & infantium

Lib. 2. c. 117

*Temper.**& Vires*

Li. & c. 20

infantium cerebro imponitur, vmbilicóque prociduo. In epiphoris verò omniū fronti tēporibúsq; cū polenta. Sed ipsis oculis è lacte & melle. Eadē si procidāt, prodest, foliis tritis cum corticibus fabæ. Pustulis cum polenta & sale, & aceto ac cera. Et vlcera oris, tumoremque gingiuarum commanducata cruda sedat. Item dentium dolores. Tonsillarum vlcera succus decoctæ. Mobiles dentes stabilit cōmāducata. Cruditates sedat, vocēmque firmat, & sitim arcet. Ceruicis dolores cū galla & lini semine pari mēsurā sedat. Mammarum vitia cum melle, aut cimolia creta. Salutaris & suspiriosis, semine cum melle hausto. Stomachum in acetariis sumpta corroborat. Ardentibus febribus imponitur cum polenta. Et aliās mādūcata refrigerat etiam intestina. Vomitiones sistit. Dysenteriae & vomitis datur ex aceto, vel bibitur cum cumino. Tenesmis autem cocta, & comitialibus cibo vel potu prodest. Purgationibus mulierum acetabuli mēsurā in sapa. Podagris calidis cum sale illita, & sacro igni. Succus eius potus renes iuuat & vesicas. Ventrís animalia pellit. Ad vulnerum dolores ex oleo cum polenta imponitur. Neruorū duritias emollit. Venerem inhibet, venerisq; somnia. Pratorij viri pater est Hispaniæ princeps, quem scio propter impatibiles vix morbos, radicē eius filo suspensam è collo gerere præterquam in balneis, & ita liberatum incommodo omni. Quinetiam inueni apud auctores caput inde litum destillationem toto anno non sentire. Oculos tamen hebetare putatur. Ex Galeno. Portulaca quidam vt cibo vtuntur, sed imbecille præstat alimentum, idq; frigidum, humidum & glutinosum. Vt medicamentum autem dentium stupori medetur, ob lentorem suum morsus expertem. Ex eodem alio in loco. Portulaca frigida & aquea temperamento est, pauca cuiusdam particeps austeritatis. Proinde fluxiones repellit, & maximè biliosas, & calidas, cum eo quod eas mutet, & alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sanè in refrigerandi quidem facultate tertij excessus à temperatis, in humectando verò secundi. Hac ratione æstuentes, vt si quid aliud, adiuuat rum ventris osculo imposita, tum totis hypochōdriis, maximè in febribus hecticis. Præterea stuporem dentium sanat: nempe quæ ab acidorum contactu asperè exsiccata fuerant, leniens atque replens, vtpote quum viscosam habeat humiditatem. Similiter verò & succus eius. Itaque non foris modò impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sanè & toti herbæ comessæ accidit. Quoniam autem restringit, vtiliter dysenteriiis editur, & muliebri profluuiio, & sanguinis reiectionibus. Sed adhæc quidem multo est quàm herba, succus ipsius efficacior. In his cur dentium torporem discutiat portulaca, causam reddit Galenus. Alexander tamen Aphrodiseus hoc Portulacæ munus cæcis rerum facultatibus, & abditis causis acceptū retulit. Portulaca tam fatiua quàm sponte nascens apud nos solet cōdiri hac ratione. Crassissimos quosque cauliculos exēptis radicibus legunt: namq; graciles facilius in aceto contabescunt. Arenulæ quibus sunt obsiti, diligenter aqua proluuntur, si qua insedit sordes, aut limus adhæsit, decutitur, tantisperque siccantur, donec aliquantū inflaccuerint: alioqui marcoris labē, cui propter humoris copiam magnopere sunt oportuni, confestim sentiunt, aut rācore fracescūt. Deinde acerbæ varū melligine madefacti substrato fœniculi viridis spissamēto componuntur fictilibus vasis, aut doliolis, & cōsperso sale sufficiēti, interiectoq; rursum fœniculo, Portulaca vas impletur, & tandem spissamēto fœniculi cōtegatur, quod herbas deprimat, iusque quod est mistum duabus partibus aceti, & vna omphacij infunditur, ita vt ius in summum labrū fidelis perueniat: tum penore sicciſsimo, & auersa à sole recōdi debet, ne situ loci cōditura mucorē cōtrahat, quā innoxia ea res cōseruabit, vbi portulaca non innatet, sed semper sit iure submersa, & exemptis ad vsum salgamis quicquid superest, suo pondere ad fundū leniter deprimatur. Deinde cum vsus exigit, aqua vel etiā vino abluunt, & superfuso oleo vtuntur.

Li. 2. Alim.

Li. 6. simp.

In Probl.

Nomina
L. 10. c. 84.

Lib. 26. c. 7.

Forma.



Vfus. reo candicante : semine minutulo. Veris initio priusquam in caules assurgat in
Locus. acetariis ea vulgus vescitur. In pratis & agris nascitur, maximè tamen in vineis.

POLYPREMNUM in Geoponicis Cassiani Constantino attributis ea planè videtur esse herba quæ hic depicta est, dicta ἀπὸ τῶν πρέμων copia. Sunt autè τὰ πρέμνα arborum rami grandiores & insigniores, in quos caudex primum diuiditur. Sunt qui Chalchetum Plinij esse arbitrentur, sicq; dictum volunt à foliorum colore, qui subluteo pallore æs imitatur. Vulgus nostrū appellat, *De la Blanchette*, & *Poule grasse*. Polypremnum radice est candida, longiuscula, non admodum fibrata: foliis circa radicem multis, humi stratis, è viridi pallentibus, ac subflavescentibus, longis, saporis aquosi & diluti: cauliculis multis, ferè pedilibus, in duo veluti ramos crassiores perpetuo diuisis, non aliter quam crescentis arboris truncum in duos pragrades ac solidos ramos findi sæpe cōtingit: Flore copioso in summis ramis coaceruato, pusillo, è cin-

INTUBA.

CAP. III.

Nomina

Lib. 2. c. 28.

Lib. 3. c. 46.

Lib. 9. c. 48.

Li. 7. epist.

In ann. in
Pand.

IN TUBI generibus, & iis quæ κικωρώδη, idest cichoriacea, siue Intubacea Theophrastus appellat, deinceps dicemus. Σέρις Græcis dicitur quæ Latinis Intubus & Intubum, Arabibus *Dumbebe*, *Hundebe*, seu *Eudeba*, Italis & Hispanis *Endivia*, Germanis *Endiuien*, Gallis *Endiue*. Sed & Seris appellatur etiam à Græcis τρώξιμον: sic enim in Geoponicis Cassiani Constantino inscriptis legitur ex Didymo. Σέρις τρώξιμον ἐν ὄξει βαπτίζοντα & ἐσθιόντα τρομάχωμα ἀλλήλα. Seris, idest, troxima si aceto tingatur & edantur, stomacho grata sunt Et Paulus ait, τὸ ἰντυβὸν διὰ τὸ τρώξιμον. Et Aetius in quodā pharmacō, ἀναλαμβάνει χυλὸν τρώξιμον. idest, succo intybi excipe. Politianus tamē scripsit τρώξιμον etiam si nihil aliud addas, propriè de vua eduli intelligi, quæ & cibaria à Plinio dicitur. Atque ita Pauli iurisconsulti locū ex archetypo Pandectarū quod Florentiæ asseruatur restituit. Qui fundum vendidit pomum recepit, nuces & ficus, & vuas dūtaxat duracinas, & purpureas, & quæ eiusdem generis essent, quas non vini causa haberemus, quas Græci τρώξιμους appellant recepta videri. Sic & τρώξιμους verbum quod deerat, in antiquo se legisse Budæus affirmat. At cum τρώξιμος substantiuè, vt loquuntur Grammatici Intuba sint, vt superiorum scriptorū auctoritate probauimus, atque τρώξιμα sint appellata, quod cruda ex aceto & oleo, & quondam etiam garo addito velut lactuca edantur, videtur τρώξιμος adiectiuū, non ad vuam duntaxat, sed ad omne genus eorum quæ cruda eduntur pertinere, quæ ipsi peculiariter adiunguntur. Quare fructus τρώξιμος erit quicumque crudus esculentus est, velut vua, ficus, vua passa, pomum, raphanus, & quicquid eius generis crudum apponitur. Τραγήμια autem & τρωγάλια, quamuis eandem habeant cum troximis etymologiam, significatione tamen differunt, quod sint bellaria, & postremarum mensarum fercula. Hippocrates τρώξιμων διὰ ραφανίδι χρεέσθω, καὶ σελίω εἰς ὄξος βάπων. Idest, ex troximis autem, idest, iis quæ cruda eduntur, raphanide

nide vtatur, & apio in aceto tinctis. In Geoponicis Constantino adscriptis *τρωκλιν σαφίδα* legimus, idest, cibariam. Et Galenus in glosis Hippocraticis vocem *τρωκλῶς* exponit ὁμοῖς ἐσθιομύοις. Artemidorus, ὅσα δὲ ἀποξύνεται τρωκλὰ ὄντα, &c. Quæcunque deraduntur, & cruda comeduntur. Quare non minùs rectè *τρωκλῶς* quam *τρωξίμως* in superioribus Pauli verbis legere possimus. Seris duùm est genus. Altera siluestris, altera satiuæ. Siluestris duplex. Vna quæ picris & cichorium vocatur, altera latioribus foliis, & ori gratior hortensi. Hortensis autè duplex. Altera folio latiore, lactucæ similior, altera folio angustiore, & gustu amara. Hæ sunt Intubi species ex Dioscoride, doctissimorum Herbariorum præsertim Matthioli sententia, qui cū videret initium capitis de Intybo in Dioscor. valde deprauatū & confusum, ex Oribasio, & exemplaribus Dioscoridis manuscriptis ita restituit, & intyborum genera distribuit. Σέρεις ἀγρία καὶ κηπεύσι. ὣν ἡ μὲν ἀγρία διουσι. ἡ μὲν δὲ περικεῖς, ἡ καὶ κηχώριον καλεῖται, ἡ δὲ ἡμέρος παλαιφυλλοτέρα καὶ ὕψωμαχότερα τῆς κηπεύσεως, τῆς δὲ κηπεύσεως διττον εἶδος. ἡ μὲν δὲ ἐστὶ θεδακωδέτερα, καὶ παλιδύφυλλος. ὁ δὲ τενόφυλλος ἐμπικρος. Idest interprete Matthiolo. Seris siluestris & hortensis. Siluestris quidè duplex, altera picris, quæ & cichoriū vocatur: altera satiuæ latioribus foliis, & ori gratior quā hortensis. Hortensis verò duplex genus. Vna folio latiore, lactucæ similior, altera folio angustiore, & gustu amara. Huic lectioni, inquit, maximè adstipulatur Serapio, qui ex Dioscoride tot habeat siluestris seridis species, quot satiuæ. At si τῷ ἀγρίῳ, id est, siluestri, siue erratico, siue ei quod sponte nascitur, τὸ ἡμέρον, idest, mite siue satium opponatur ex diametro, qui seris siluestris in picrida siue cichorium, & in τὴν ἡμέρον, idest, satiuam rectè diuidetur? Siluestrē satiuam Matthiolus intelligit, quæ colitur vt mitescat: quod in hortis frequenter fit, vt in Intubis, ita in armoraciis, scolymis, asparagis. Sic Theophrastus cum τοῖς γεωργουμύοις τὰ ἀγεώργητα opposuerit, mox τὰ ἡμέρα τοῖς ἀγρίοις, in quibus τὰ μελαγχρία esset cum γεωργόμυα & ἡμέρα eadem esse videantur, & ἀγεώργητα, & ἀγρία, nisi plantæ multæ essent mites quæ non coluntur, vt arbores natura sua mites quæ ignauos habent colonos, & contrà multæ agrestes, quæ coluntur vt mitescant, sicuti diximus. Potest & emendata esse huius loci scriptura hoc modo. Σέρεις ἀγρία καὶ κηπεύσι. ὣν ἡ μὲν ἀγρία διουσι, ἡ μὲν δὲ περικεῖς, ἡ καὶ κηχώριον καλεῖται. ἡ δὲ παλαιφυλλοτέρα, καὶ ὕψωμαχότερα τῆς κηπεύσεως. τῆς δὲ κηπεύσεως, &c. Idest, Seris siluestris & hortensis. Siluestris duplex. Altera picris, quæ & cichorium nominatur. Altera latioribus foliis, & stomacho vtilior quam hortensis. Hortensis verò duplex, &c. Oribasius tria tantum fecit genera, si rectè interpres, quod illi facile fuit, conuertit. Seris agrestis est, & satiuæ. Agrestis picris aut cichorium vocatur, cuius & latiora & ori iucundiora quàm hortensis sunt folia. Hortensis verò duplex est genus. Altera enim magis ad lactucæ similitudinem accedit, & latis est foliis, & amarescens. Altera folia habet angustiora, & subamara est. Quam lectionem secutus est Cornarius. Seris duplex est, inquit, ex quibus siluestris quæ picris & cichorium nominatur latiora folia habet, & stomacho magis commoda est (ὕψωμαχότερα legit, nō ὕκωμοτέρα) quàm hortensis, Et huius duæ species sunt, &c. Intubum siluestre, picris, siue cichorium erraticum apud nos, inquit Plinius, quidam Ambugiam (meliora exemplaria, & Celsus Ambubeiam habent) appellauere, in Ægypto cichorion vocant quod siluestre sit. κηχώρη Theophrasto dicitur, & κηχώριον. Horatius cum dixit, *Me cichorea, leuifque malua*, &c.

Li. 14. c. 17.
Lib. 1. c. 65.

Genera.

Lib. 2. c. 125.

Li. 2. caus.
ca. 15.

Lib. 20. c. 8

Κηχώριον à singulari κηχώριον posuit. Hodie in Officinis cichorea siluestris, Gallice *Cichoree sauvage* nominatur. Intubum satium latifolium corrupta ab Intybo voce Endiuia passim appellatur. Gallice *Endiue* & *Cichoree de iardin*. Intybum satium angustifolium deminuto à Seris nomine Serida dicitur, quod deinde corrumpentes recentiores scariolam fecerūt Gallicè *Scariole*. Vtraque Officinis

etiam scariola dicitur, sed perperam, cum Intubo latifolio parvæ seridis nomen
 Ibid. convenire haud queat. Plinius satium serin vocat, quod est minus & venosius.
 At paulo post, rursus tum silvestre tum satium serin vocat. Seris & ipsa Lactucæ
 Forma. similima duorum generum est: silvestris melior, &c. Intubum satium latifolium

*INTVBVM Satium
 Latifolium.*



*INTVBVM Satium
 Angustifolium. Matth.*



*INTVBVM Satium
 Angustifolium. Dodon.*



foliis est magnis, longis, latis, in candido viridibus, lævibus, foliis lactucarum quarūdam haud ab similibus: caule procero, striato, frequentibus furculis brachiato: floribus venustis, caruleis, rarò candidis: semine albo: radice longa, candida. Endiuvia est & Scariola Officinarum Lobellio. Intubum satium angustifolium folia fert longa, angusta, aliquando per oras parum crenata, caulem rotundum, flores caruleos, superiori similes, radicem candidam, longam, succosam. Intubum silvestre latifolium, quam serida satiam latioribus foliis, & cichorium domesticum Matthiolus vocat, seridis silvestris specie statuens, Intubo satiuo latifolio similitum est, radice longa fibrata, foliis longis, latis, caule magno, ramusculis brachiato, pulchris & caruleis, rariùs candidis floribus ornato, Seris est satia Penæ & Lobellij. Intubum silvestre angustifolium, quod ille cichorium silvestre vocat, foliis est longis, in ambitu valde laciniatis, angustioribus, asperioribus, & amarioribus, & ob id ipsum picris appellatum. Seris est silvestris Ambubeia

Ambubeia Penæ & Lobellij. Hortensis Intubi tertium genus additur, quod crispū cognominatur, in acetariis expetitur, amplo foliosoq; cespite proueniens, foliis magnis, toto ambitu crispis, ac fimbriatis: caule cæteris maiore, crassiore ac tene-
riore, reliqua cum cæteris habet paria. Intuba media æstate florent, deinde semen-

Matth. li. 2.
Dioscor. c.
125.

INTVBVM Siluest. Latifol.

Cichorium satium Matth.

Seris satua Lobellij.



ferunt. Olitores hyeme instante terra & sabulo in hortis obruunt: quoniam hoc artificio al-
bescunt, tenerrima euadunt, & in totam hyemē asseruātur, artem hanc à natura edocti, quod vi-
derint sæpius in campestribus cichorium aqua-
rum inundationibus terra vel arena obrutum,
& tenerrimum, & candidissimum redditum,
deposita omni amaritudine. Huius oleris mul-
ta sunt, exq; permagnæ utilitates. Vtraque se-
ris, inquit, Dioscorides, refrigerat & adstrin-
git, stomacho utilissima: aluum sistit cocta si cū
aceto assumatur. Siluestres stomacho meliores,
quandoquidem æstuantem ipsum, & quem im-
becillitas vexat, cibo leniunt. Cardiacis per se,
aut cum polenta utiliter illinuntur: podagris &
oculorum inflammationibus auxilio sunt. Her-
ba cum radice illita percussis à scorpione sub-
uenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus
cū cerula & aceto valet ad illitus eorū quæ re-
frigerationē desiderant. De seride eadē ferè Pli-
nius. Vtraque stomacho utilissima, præcipuè
quem humor vexat. Cum aceto in cibo refrige-
rant, vel illitæ, discutiuntq; vel alios morbos
quàm stomachi. Cum polenta siluestrium ra-

Tempus.

*Vires &
Temper.*
Lib. 2. c. 125.

Lib. 20. c. 8.

INTVBVM Siluest. angust Matth.

INTVBVM Crispum.



Li. 8. simp.

Li. 8. com.
ph. loc. c. 8.

Lib. 2. c. 130.

dices stomachi causa sorbentur, & cardiacis illinuntur super mammam sinistram, ex aceto. Omnes eae & podagris utiles, & sanguinem reicientibus. Item quibus generitura fluit, alterno dierum potu. At de Intubis & cichorio. Intubi quoque non extra remedia sunt. Succus eorum cum rosaceo & aceto, capitis dolores lenit. Idem cum vino potus iocinoribus, & vesicis, & epiphoris imponitur. Et mox, Cichorium refrigerat in cibo sumptum: & illitum, collectiones, succusque decocti ventrem soluit: iocinori, & renibus, & stomacho prodest. Et paullo post. Quod quidem propter singularem salubritatem aliqui Chreston appellant, alij pancration: Galenus. Seris olus est subamarum, & magis quod agreste est, quod ob hoc ipsum picrida quidam nuncupant, quidam cichorium. Est autem sicca frigidaque; temperaturae, utrumque secundo excessu. Porro domestica magis etiam refrigerat quam agrestis. Sed & humiditatis multae admixtio siccitatem extinguit. Verum utraque adstringentis facultatis est particeps. Et alio in loco. Cichoria & seris cibarii generis sunt: nam apud nos rustici haec edunt & cruda, & cocta. Vtitur etiam iis Erasistratus abunde in affectionum circa alium curatione. Facultas horum olerum subfrigida est, & subamara, ac modice adstringens. Et propter has facultates optima sunt pharmaca calidis intemperaturis hepatis: nam praeterquam quod moderate refrigerant, robur etiam visceri addunt per adstringentem facultatem. Praeterea commissuras osculorum venarum in sima visceris parte ad eas quae in gibba sunt, extergens. Neque vero frigidas intemperies magnopere laedunt, quemadmodum quae frigidam humiditatem absque adstrictione aut amaritudine habent, facere solent: iuuare etiam viscus talium olerum substantia potest, etiam si citra serosorum aut aliorum humorum vitiationem intemperies fiat per se, & cum humiditatis cuiuscumque complexu: mixtura enim mellis humiditatem per urinam educunt: Quapropter etiam si siccata tusa quis potioni inspergat, itidem iuuant. Quin & eorum decoctum potatum multum commodi adfert. Si vero non calida aliqua intemperies infestet, aut si obturatio quaedam sit circa viscus magnopere auxiliantur ex vino albo, tenui potata, cum his quae urinam ciunt. Vtilis autem non solum succus ipsorum est, tum recens, tum exsiccatus, sed & ipsa olera exsiccata, tusaque; ac trita potui inspersa, & eorum decoctum in potu acceptum auxiliatur. Haec Galenus. Matthiolus acerbè inuehitur in perniciosam seplasiarum multorum ignorantiam atque ignauiam, qui cum horti omnes Intybo latifolio lactuce simili, quae vera endiuium est, ut diximus, & capi cichorio scateant, loco tamen endiuium modò hieracium, modò lactucam siluestrem supra descriptam succo lacteo manantem usurpant, atque ex his aquam plumbeis organis eliciunt, quam aquam endiuium falso vocant. Quae duae plantae quauis frigida vi praeditae sint, tamen nihil iis inest, quod iccori peculiariter prodesse tantopere possit: earumque succus lacteus, quo potissimum tempore eo refertae sunt, quibusdam suis partibus adeo calidus est, ut linguam vellicet, quibusdam adeo somnificus, ut non desint, teste Dioscoride, qui illum meconio permisceat. At Matthiolo gnauiter sese opponunt Lobellius & Pena, qui lactucam siluestrem illius prorsus respuunt, & Seridem domesticam alteram Dioscoridis, amaram & angustifoliam esse contendunt, ut diximus capite de lactuca, recteque; a patribus nostris pro endiuium usurpata, neque calore immodico, neque amarore nocere, cum eius amaror non sit a calido, aut certe non calidus: quemadmodum opium, meconium, papauer, lactucam, mandragoram, & quaedam alia calida esse non dicimus, quia amara sunt, cum multum sint frigida. Quare nostri illi patres doctissimi, quamuis barbari, tum ratione tum experientia freti, recte syrupis immiscuerunt, & stillatitias aquas ex ea elicuerunt, quod decocto, succo, stillatitia, ad intemperies obstructionesque hepatis & primarum venarum, & ad mare rationes rhabarbari & similium medicamentorum utiliore esse deprehendisset: quia cum tenuiore sit, & minus excrementitio humido, & amaro, melius abstergit & aperit,

tum

tum etiam intima rerum macerandarum altius permeat. Rectè igitur Dioscorides docet Serides silvestres stomacho vtiliores esse, nimirum æstuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo lenire: foris etiam admotas prodesse. Sunt præterea cichoriacei generis plantæ duæ à Matthiolo positæ, primâ Zacin-

In libro 2.
Diosc. c. 175.

ZACINTHA siue Cicho.
Verrucosum.



CICHORIUM Constantinopol. Matthioli.



tham, quidã ex Zacyntho insula in qua nascitur, ille ab effectu cichorium Verrucarium nominavit. Radice nititur rapunculi figura, subnigricante, adnatis circumquaque capillaceis fibris. Folia habet cichorij, sed asperiora paullo, caules cubitales, quandoque maiores, tenues, asperiusculos, in quorum fastigiis flores prodeunt aurei, cichoreacea specie, quibus dilapsis semen oritur subnigrum, capituli instar, per longitudinem melo peponis modo striatum. Mira est huius plantæ ad tollendas verrucas vis atque efficacia. Afirmat enim Matthiolus scire se nonnullos, quorum manus verrucis scatebant, ab iis planè liberatos fuisse, deuoratis semel tantum in acetario huiusce plantæ foliis. Idem præstat eius semen tribus diebus drachmæ pondere deuoratum, dum cubitum eunt verrucosi. Hac accepta refert Matthiolus Francisco Calzolari pharmacopæo Veronensi, qui plantam hanc ad eum cum facultatibus misit. Chondrillam vel cichorium silvestre vocat Pena, asseritque in Italia non solum in Zacyntho oriri, negat hanc semel voratam delere verrucas, illitam verò posse, certum & commune illi esse ait cum plurimis, quarum succo exuruntur aut exsiccantur verrucarum radices. Alterum cichorij genus Constantinopoli allatum, ad eundem Matthiolum Vienna misit Augerius de Busbeke Flander, radicibus numerosis, velut in asphodelo pendulis, siliquarum ferè raphani figura. Cuius imago ob rei nouitatem hic prætermittenda non fuit. At minimè nouum aut peregrinū putat Pena. Dentem leonis Monspeliensium vocat, & in Cene, Hetruriæ, Liguriæ, Galloprovinciæ & Narbonæ pratis, non parum copiosum prouenire asserit. Monspeliensium Dentem leonis etiã vocat Lobellius, fortasse Chondrillam alteram Dioscoridis, Asphodeh bulbulis. Rarum aliud cichorij genus addit Dalechampius, quod cichorium bulbosum vocat, de quo in libro de maritimis, dicemus. Nec minùs rarum, sed simile & mirandæ facultatis Cichorij genus ad nos misit Doctissimus Miconius Medicus Barcinonensis, quod strumosum appellat. Nascitur hæc herba in vmbrosis locis, & agrorum marginibus inter frutices, foliis digi-



tum vnum latæ, quattuor longis, læuibus, viridibus, minimè per ambitum ferratis, incertis spatiis eminentia quædam habentibus, ex pediculo emergentibus, quandoque multis, quandoque paucis, aliis per terram stratis, aliis rectis. Ea trita lacteum succum emittunt, sed paucissimum, horum sapor subamarus est vt sonchi. Flos ei est luteus, è suo calice emergens vt in soncho & consimilibus, intus & per orbem foliolis luteis cinctus, ex cauliculo pendet, vt in Dente leonis, tandem in pappum desinit. Radix tenuis est, per humum sparsa, non admodum profunde se diffundens. Huius extremo radix quædam videtur adnata, aut prorsus aut ferme globosa, interim candida, quandoque, ex cādido in purpureum vergens, cortice tenui, pulpa intus candida, valde amara. Radicem istam globosam ad strumas curandas, multum conferre se experimento didicisse Myconius asserit. Quinque aut sex integræ cum melle sumptæ, multis diebus continuis mirum in modum profunt. Eadem præstat aqua earum stillatilia, vel decoctū, sed inefficacius: item conditum ex iis cum melle paratum admodum iuuat. Quare hanc plantam Myconius cichorium strumosum à forma & effectu nūcupauit. A foliorum forma cichorium, strumosum vero ab effectū & forma radice, quæ strumas refert, & sanat. Quam ob causam Barcinone, vbi frequens oritur, Porcellanes vocant, quasi dicas strumosam.

CICHOREACEA ALIA.

CAP. XIIII.

Lib. hist. 7.
cap. 7.



Ἀχάνα, inquit Theophrastus τὰ τοιαῦτα καλεῖται, κιχώρη, ἀφάκη, ἀνδρύαλα, ὑποχίρις, ἡεγέρων, καὶ ὅλως ὅσα κιχωρώδη ταῦτα, διὰ τὴν ὁμοίωσιν τῶν φύλλων: πάντα γὰρ πῶς ἐμφερεῖ ἔχει τῷ κιχωρίῳ. Id est, olera hæc vocantur, cichorium, aphacæ, andryala, hypochæris, erigeron. Atque vniuersè omnia cichoriacea, à similitudine foliorum sic dicta: omnia enim quodammodo cichorio similia habent. At sunt quæ non foliis solùm, sed & radicibus, & floribus cichorio similia sunt: præterea lacteo succo plena sunt, & cruda coctæque similiter eduntur. Quorum multa cum hætenus ab herbariis non satis sint explicata, nec suis distincta nominibus, atque ob id magna ex parte ignota,

Dale

Dalechampus ex Theophrasto & Plinio sic explicauit. Cichoreacea seu intubacea sunt, Picris, Apate, Aphaca, Apargia, Crepis, Hypochæris, Andriala seu Hedy-
pnois, Thesion, Corchorus. Picris quæ amarago à Theodoro Latinè dicitur, herba
est quæ in arenosis & macris locis prouenit, lacte referta, foliis hieracij, minori-
bus rotundioribus, humi iacentibus, cinereis, cauliculis breuibus, flore aureo, qui

Nomina

Locus.

Forma.

DICRIS Dalech. Hieracium
Matth Dodon.



APATE Dalecham.



hyemis asperriam vel niuib. opertus, iniuriã
sustinet, eoque tempore in nudis campis & ge-
lu rigentibus conspicitur, tanta florescendi con-
stantia, vt fere numquam flos ei desit, vt rectè
scripserit Plinius & Theophrasto, eam toto an-
no florere, quod cum de cichorio erratico dici
non possit, florem ante hyemem amittente, fal-
luntur qui id cichorium Picridem esse putant.
Radiculis multis nititur, & tenuibus. Tota plan-
ta gustu est amarissimo, vt vix aloë ipsa sit ama-
rior, nomen etiam ei amaritudo imposuit. Sunt
tamen qui ea cocta vescuntur vt cichorio. Tol-
lit eximiè verrucas auctore Plinio. Matthiolus
Dodonæus, Lobellius pro hieracio minore de-
pinxere. Cum cichoriacea auctore Theophra-
sto germinet post Vergiliarum exortum, cir-
ca initia scilicet mensis Aprilis, apate, fraus, à
Theodoro dicta longè tardius exit, Mayo vide-
licet, quod cum in ea herba cichoreacea quotan-
nis vñ venire videmus, quam pro chondrilla
maiore Dodonæus & Lonicerus monstrarunt,
eam Theophrasti apaten esse iudicauit Dalechã-
pius. Gignitur ea frequentius in aruis pingui-
bus, & terrenis aggeribus, nonnumquam in si-
uis, radice longa alba, cichorio simili, multis fi-
bris superne capitata, foliis longis ex albo cine-
reis altissimè incisis, proximè terrã multis: cau-
le sesquipedali, nonnumquam altiore, tenui, in
exiles ramulos diuiso, in quo pauciora folia: ca-
pitulis in summis caulibus rotundis: flore cum
deliscit caruleo, cichorio simili, minore: non-
numquam luteo interdum puniceo, qualem in
silua Vernacensi haud procul Lugduno (inco-
le, *le bois du Verneau* vocant) Dalechampus vidit.
Theophrastus Apatē inter ἐπιγυρισφύλλα, id est,
quæ ab radice foliata sunt recenset, Plinius inter
ἐπικαυλόφυλλα, id est, quæ caule foliato sunt. Cau-
le foliato est, inquit, & crepis & apate. Sed eo
deceptus mihi Plinius videtur, quod apaten po-
stremam τῶν ἐπιγυρισφύλλων in Theophrasto, cre-
pidi proxime sequenti, & primæ τῶν ἐπικαυλό-
φύλλων coniunxerit, tanquam etiam ἐπικαυλό-
φυλλον. Aphacen primis imbribus post æquino-
ctium germinare, & cito florere Theophrastus
tradit, & eam ex æquinoctio nasci Plinius, ex
eodémque

Li. 21. c. 17.
Lib. 7. hist.
cap. 11.

Lib. & cap.
22.
In libro 3.
Dios. c. 63.
Lib. 7. hist.
cap. 11.

Nomina

Lib. 5. c. 16.

Locus

Forma.

Lib. 7. hist.
cap. 9.
Lib. 21. c. 16.

Aphace.

Lib. 7. hist.
cap. 8.
Lib. 21. cap.
14.
Lib. 7. hist.
cap. 11.



Ibid. eodémque Theophrasto subinde marcescente flore emittere alium, tota hyeme,
Lib.7. hist. totóque vere vsque in æstatem. Amaram esse & in cibos non admitti idem Theo-
cap.7. phrastus prodidit, inter olera tamen reposuit. Hæc cum in cichoriacea plāta hic
Lib.5.c.12. depicta perspicuè cernantur, aphacem esse indicauit Dalechampius, quam pro
Locus. Hedypnoide, siue cichorio luteo depinxit Dodonæus. Nascitur in locis humidis
Forma. & vliginosis, prope fossarum & lacunarum margines, radice pedali, succo lacteo

CREPIS Dalechamp.

referta, superne fibrata: foliis intubi siluestris, longioribus, latioribus, laciniatis: caule cubitali, multum ramoso: flore luteo hedypnoidi simili, capitulis comante. Apargiam inter plantas ἐπι-
γαιοφύλλης recenset Theophr. id est, quæ proximè terrā foliatæ sunt, qua nota cū hæc à reliquis cichoriaceis discrepet, à Dalechampsio pro Apar-
gia depicta est, à Dodonæo pro hieracio minori primo cui subscribit Lobellius, qui Hieraciū lon-
gius radicatum appellat. Prouenit in incultis ad oras pratorū, & agrorum, in fossis circa prædia, & viis, radice longa, candida, gracili, multiplici: foliis humi iacentibus, ex atro viridibus, longis, laciniatis, hedypnoidi similibus: caulibus multis, palmum altis, subatris, nudis, læuibus, flore luteo, multiplici strue congesto, in pappos abeunte. Contrà Crepis ἐπιφυλλόχουλος est Theophrasto, id est, in caule foliata, cuiusmodi cū sit hæc plan-
ta, & eam seruato adhuc crepidis nomine *Crepalo* vocent Itali, & terra *crepalo*, crepidem esse Theo-
phrasti

Apargia.

Lib.7. hist.

cap.9.

Lib.5. c. 14.

Locus.

Forma.



Crepis.

Lib.7. c.9.

phraſti indicauit Dalechampius. Naſcitur ſponte in aggeribus terrenis agri Mon Locus.
ſpeliensis, ſatu verò & cultu in hortis noſtris. Radicem habet intubo ſimilem, pa-
rum fibratam, candidam: caules multos, cubitales, foliatos: folia intubo ſimilia Forma.
ſunt, cãdidiore, minus infecta ac laciniata, ſucco lacteo manãtia, guſtatu ſuauiſſima,

ANDRYALA maior.
Dalecham.



ANDRYALA minor.
Dalecham.



HYPOCHAERIS
Dalecham



licet nonnihil amara ſint: flos luteus in pappos
euanascent. Lobellius Italicorum *Terracrepolo* vo-
cat *Chondrillam* cœruleam cichorij ſilueſtris laci-
niatis foliis. Andryalã inter oleracea & intuba-
cea numerat Theophrastus. Eam arbitrat Dalecham-
pius duplicem eſſe Fuchſij & Dodonæi
ſonchum. Alter eſt maior horridior & aculea-
tus, alter humilior, tenerior, & ſpinis carens.
Vterque in hortis humidioribus proſilit inter
olera, & in vliginofis agris, radice longa flau-
ſcente, multis fibris innixa: foliis longis, latis, per
ambitum incifis, in maiore pungentibus, in al-
tero minimè: caule anguloſo, cauo, geniculato:
flore luteo, hedypnoidi ſimili, minore, in pap-
pos abeunte, qui Iunio menſe prodiit, & tota
æſtate durat. Hypochaeris, inquit Theophrastus
lœuior eſt, & aſpectu mitior, & dulcior, nec vt
Chondrilla, quæ proſus edendo nō eſt, & radi-
ce ſuccum multum & acrem fundit. Hæc eſt
planta quam ex Dalechampii ſententia hîc de-
pinximus, quam Gazainepte Porcelliam vertit. Lib. 5. c. 12.
Cœruleo flore cichorium reſert, quare Dodo- Forma.
naus

Andryalã
Lib. 7. hiſt.
cap. 7.
In hiſt. pl.
cap. 261.
Lib. 5. c. 13.
Locus.
Forma.

Hypochaeris.
Lib. 7. hiſt.
cap. 11.

Lib. 5. c. 12.
Forma.

Locus. naus intubum siluestre & cichorium vocat. Foliorum laciniis chondrillam secundam imitatur. Gignitur in locis herbosis, humidis, & incultis, radice longa, candida, foliis angustis, longis, per ambitum incis, pallidis, grato colore prætereuntium oculos inuitantibus: caule cubitali, ramofo: flore cæruleo, æstate media

Lib. 21. c. 35.

HEDYPNOIS

Dalechampi.

Nomina

Lib. 20. c. 8

Matth. in

lib. 2. Dios.

cap. 125.

Ibid.

Lib. 1. c. 87.

Lib. 5. c. 16.

Forma.



THESION Dalechamp.

Endiua Tragi.



Lib. 20. c. 8.

Thesion.

Lib. 1. c. 87.

Locus.

vigente. In acetariis cocta apponitur cichorij modo, salubris & iucundi saporis non Ægypti tantum, vt scribit Plinius, sed & aliis, vt Græcis præsertim, & Siculis, qui oleribus multis, quæ nos negligimus, valde delectantur. Siluestre genus cichorij alij Hedypnoida vocant, inquit Plinius, Officinæ Rostrum porcinum, Dentem leonis, Taraxacon, & dentem caninum, quidam Caput monachi. Matthiolus aphacen Theophrasti de qua diximus, esse putat. Anguillara Chondrillam Galeni. Hedypnoidis nusquam meminit Theophrastus. Tragus pro hiæracio exhibuit. Dodonæus pro Chondrilla altera. Galli Pissenliet appellat, Germani Psaffenblat. Prodit hæc planta statim ineunte vere, in pratis, gramineis campis, sepulchretis, sepibus, radice cichorio proxima, lacteo succo referta, sed amariore, exterius flauescente, intus candida, gracili, longa, parum capillata: foliis magna ex parte per humum sparsis, cichoriaceis, longis, vtrinque per ambitum laciniatis, pinguioribus, mollioribus, auersa parte nonnihil venosis, erubescens, in mucronem sagittæ crispidi similem desinentibus. Inter quæ longi exoriuntur scapi rotundi, glabri, subrubentes, caui, lacteo succo pregnantes, in quorum verticibus flores emicant pulchri, lutei, multiplici foliolorum ordine densi, qui cum deciderint succrescunt lanuginosa & papposa capitula, admirabile naturæ ludentis opus, quæ tandem à vento dissipata in aërem auolant, remanentibus scaporum nudis, candidis & rotundis verticibus, raso monachorum capiti similibus, qua de causâ caput monachi plantam hanc quidam appellarunt. Stomachum dissolutum adstringit cocta, inquit Plinius, crudâque sistit aluum. Et dysentericis prodest magis cum lente. Rupta & conuulsa utroque genere iuuantur. Item quibus genitura valetudinis morbo effluat. Aprili mense floret. Est alterum prorsus huic simile plantæ genus, sed minus, nigrius, & radice succosa, non aliter quam eius quæ morsus Diaboli vocatur. Thesion eam esse plantam Dalechampus arbitratur, quam Tragus endiue, Lancerus lactucæ siluestris nomine pinxerunt. Locis incultis & saxosis, propter

pter muros & macerías, in frigidis & vmbrosis locis reperitur, radice breui, alba, fibrata: caule procero, rotundo, ramoso, foliolis linguam imitantibus ornato, reliqua folia lactucae similia sunt, minimè incisa. Flos est luteus, qui tandem in pappos euanescit, vt in senecione: semen nigrum est. Ex tota planta succus lacteus amarissimus exprimi potest. Quam ob causam,

CORCHORVS

Dalechampij.



CORCHOROS Lobel.



opinor, picridi thesion Plinius subiunxit: sic enim cum de picride dixisset, Thesion quoque, inquit, non dissimili amaritudine est, sed purgat aluum, in quem vsus teritur ex aqua. Id quod ex Theophrasto mutuatus est, sic scribente, ἡ δὲ τῆς θησιῶς φύλα τῇ μὲν γεύσει πιπράδα, τριβομένη δὲ κοιλίαν ὑποκαθαίρει. Athenæus thesij florem inter coronarias recenset ex Timarchide poeta. Corchorum oleraceis & intubaceis adnumerat Theophrastus, qui ob amaritudinem in prouerbio est, eiusque folium ocimum amatur, Plinius iis quæ sponte nascuntur, quibus pleraque gentium vtuntur in cibis. Alio in loco corchorum anagalida interpretatur, de qua hinc non agimus. Dalechampius corchorum esse suspicatur plantam eam, quam pro myosotide, id est, auricula muris maiore Tragus depinxit ac descripsit. Est enim valde amara, cocta tamen estur à quibusdam. Nascitur in vmbrosis nemoribus, interdum in veteribus muris soli non expositis radice breui, valde fibrata, plantaginis simili: foliis humi stratis octo vel nouem, ocimi maioris figura, in ambitu crenatis superne interdum maculis rubris conspersis, inferne plerumque rubentibus, villosis: caule cubitali, rotundo, tenui, hirsuto, & foliis, & geniculis destituto. Flos in summitate caulis & furculorum luteus, multiplici foliorum ordine stipatus existit, hieracio similis, in pappos tandem euanescens, floret Iunio. Tota planta lacteo succo madet. Cum Theophrastus corchorum ocimi folio esse dixerit, mirum est Plinium ex alio fortasse auctore scripsisse corchorum herbam esse conuolutis foliis ad similitudinem mori. Quare quidam legunt commaculatis foliis ad succi mori similitudinem, quod ex huius plantæ descriptione verum esse perspicitur. Illud vero silentio praterendum non est, proximè terram ad caulis exortum inter folia saluosum quendam humorem colligi, iuglandis magnitudine, rotundum, qui spatio temporis incanis, pilis obductus velut situ, muris effigie representat. Corchorus, vt scribit Plinius, præcordiis, vt ferunt, utilis, aloperiiisque & lenti-gini. Bouum quoque scabiem celerrimè sana-

Forma.

Li. & c. 22.

Lib. 7. hist. cap. 11.

Lib. 15.

Lib. 7. hist. cap. 7. Lib. 20. c. 15.

Lib. 25. c. 13.

Lib. 1. c. 92.

Locus.

Forma.

Lib. 21. c. 32.

Lib. 21. c. 32. Vires.

ri ea inuenio, apud Nicandrum quidem & serpentium morsus, antequam floreat. Lib. 1. c. 92. Aqua eius stillatitia, auctore Trago, ad quasuis internas & feruentes inflammationes cordis, stomachi, hepatis, pota & foris imposita facit. Chirurghi potiones vulneribus conferentes ex ea conficiunt, vino decoctam vulneratis propinantes, atque etiam foris admouentes. Succus expressus vtiliter auribus instillatur: nam punctiones earum & tinnitus tollit. Diuersum prorsus Cercorum pinxit Lobellius, Molochiam Serapionis quorundam, foliis Ocimi in sequipalmaribus & dodrantalibus cauliculis, flosculis iuxta pediculos luteis, semine in longis corniculis, Asclepiadis gracilioribus. Ex Hispano semine alebat in pensilibus hortis Io. Brancion in Bergio, & Corcorum Plinij faciebat.

CHONDRILLA, CAP. XV.

Nomina

Lib. 8. c. 22

Lib. 2. c. 126

Genera.

Diosco.
ibid.

Forma.



Ὠνδρελλή. Latinis Chondrilla, Plinio Chondrillon, & Chondrile, Arabibus Candaret, Candaron, seu Amiron dicitur. Aliqui, vt Dioscorides tradit, cichorion, aliqui Serin appellauere. Eius duo sunt genera. Prior caules, flores, & folia habet cichorio similia, qua ex causa nonnulli siluestris intubi speciem esse dixere. Verum tenuior tota est, nempe foliis, caule, floribus ac semine gracilioribus. In cuius ramulis gummi mastiches simillimum, magnitudine faba inueniri solet, à quo tuberculo mastichæ, aut nucleo thuris simili, quem chondrum Græci nominant, nomen chondrilla sortita est. Quamuis amarior sit, non minus quam cichorium in acetaria admittitur. Nasci-

CHONDRILLA

prior, Matth.



CHONDRILLA

altera, Matth.



tur in locis cultis, & scrobium aggeribus, secusque vias. Aliud chondrilla genus folium fert oblongum, circumrotum, humi sparsum: caulem succo madentem lacteo, radice tenui, rotunda, læui, veieta, flauescente, succosa. A lactis vbertate, quo omni in parte, præsertim in radice redundat, ab Hetruscis vulgò Lattaiola vocatur, quam rura suis acetariis pro cichorio immiscent. Nascitur in cultis & latis.

An hac

CHONDRILLA rara
purpurea, Lob.

An hæc Chondrilla rara sit Lobellij Chôdrilla purpurante flore? Belgis dicitur Crupina à vocabulo Cruppen, hoc est reperere, quia semen manu contrectatum se subducit ac prorepat. Hetruriæ, Syriæ, & agri Narbonensis collibus, non procul à Lupo monte plantula hæc non inelegans exit, ad Chondrillas referenda. Dodrantes & sesquipedates cauliculos & geniculatos erigit: flores purpurantes in capitulis ex squamulis compactis. Semen Iacæ aut Cartami silvestris nigrum, nitidum, pellucidum, deciduum. Prior chondrilla cum radicibus tusa adiecto melle, diuiditur in pastillos qui nitro admisti vitilignes emaculat. Gummi cum myrrha tritum, & linteo appositum instar oliuæ fœminarum menses trahit, inordinatos pilos replicat. Quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus pilis admoueat. Contra viperas in vino pota proficit. Succus decoctæ in vino, aut per se potus aluum sistit. Alterius chondrillæ caulis & folia concoquendi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Galenus de seride tractans, chondrillam seridis

Diosco.
Ibid.
Vires.

Lib. 8. sim.

speciem esse scribit, & adstringentis esse facultatis. Ac ut Dioscorides, & cichorium & serin appellari tradit, ita & Galenus hanc serin etiam nominari, esseque eiusdem ferè cum illa facultatis, nisi quod sapore amarior est chondrilla, ac præterea sicciore vi prædita. Idem tamen alibi. Lactuæ silvestre, inquit, simile olus est, quod chondrillam appellant, quæ citius in caulem assurgit, amaritudinemque habet magis perspicuam, & lentum quendam succum, albumque, cuiusmodi est timalorum succus, non tamen acer perinde ut ille: utimurque interdum ipso ad pilos in palpebris reglutinandos. Quo loco de secunda chondrillæ specie Dioscoridis loqui videtur Galenus. Hæ itaque species distinguendæ ex Dioscoride, tum ut internoscantur, tum ut in eorum usu non facile peccetur, quanquam haud periculosus error hic committi potest, cum facultatibus sint affines. Plinius vtramque speciem confundit, & quæ Dioscorides duabus, ipse vni attribuit. Chondrillon siue chondrile, inquit, folia habet intubi, circumrosis similia, caulem minus pedali, succo madentem amaro, radice fabæ simili, aliquando numerosa. Habet proximam terræ mastichen, tuberculo fabæ, quæ apposita fœminarum menses trahere dicitur. Tusa cum radicibus tota diuiditur in pastillos, contra serpentes argumento probabili. Siquidem mures agrestes læsi ab hac esse dicantur. Succus ex vino coctæ aluum sistit. Eadem palpebrarum pilos inordinatissimos pro gummi efficacissime regit. Dorotheus stomacho & concoctionibus vtilem carminibus suis pronuntiauit. Aliqui fœminis & oculis, generationi quæ virorum contrariâ putauere. Idem inter vulgares in cibo herbas chondrillam recenset. Et rursus, Chondrilla, inquit, amara est, & acri in radice succo. Clusius aliam chondrillam pictam dedit, & descripsit foliis latis cichorii modo diuisis, prorsus incauis, & densa tomentosaque lanugine obsitis: inter quæ caulis eminet pedalis aut amplior, rotundus, candidus, aliquot ramulis brachiatus, & foliis minoribus atque angustioribus, quibus atque etiam ipsis ramulis plerumque inhærent grumi fuluescentes succi istic concreti. Flos extremis ramulis insidet luteus, in pappos eua-

Lib. 2. Ali.

Lib. & ca.
22.

Lib. 21. c. 15.

Ibid. ca. 17.

Lib. 2. stir.

Hispa. c. 65.

nescens: radix longa, nigricans, digiti minimi crassitudine. Tota planta incaua est, & succo prægnans, qui siccatus fuluescit, & acris est. Inuenitur in agro Salmanticensi, locis incultis, & multis aliis Hispaniæ regionibus. Augusto floret, vel etiã ferius. Nonnulli Hispani vocant *Yerua di S. Gayteria*, eiusque decoctum præmorlis à cane rabido vtiliter exhiberi credunt. Clusio plurimum ad primam Dioscoridis chondrillam accedere videtur. Hanc Lobellius Verrucariam Chondrillam appellat, à canaliculatis feminum capitulis clauam exprimentibu, *Mazza di caualliero*, & *Mazza ferrata* Italicè dictam, à Matthiolo zacintham: quamquam figuræ inter sese differant. Conspicitur in eodem agro Salmanticensi post messes in aruis Chondrillæ genus vimineum, planè longis lentisque & flexilibus virgis, candicantibus, sesquicubitalibus & tactu viscidis, multis exiguis foliolis secundum longitudinem nascentibus, quæ secundum radicem initio maiora sunt, cichorij fere incisura, postea flaccescunt: extremi rami flosculum exiguum, luteum, & in pappos euanescentem gerunt: radix oblonga est, lacte manans, vt & reliqua planta. Floret quo superior tempore. Salmanticenses Iunquiera vocant, & ex ea scopas conficiunt, pueri viscum ex eius radice cum nigro melle conficiunt, ad cardueles aliasque aui-culas capiendas idoneum. Hanc chondrillam eandem esse puto, quæ à Pena

CHONDRILLA
prior, Clusij.



CHONDRILLA viminea
viscosa, Pena.



Chondrilla viminea viscosa vinearum dicitur. Nam radix vniuersaque planta, inquit, lacte turget, & viscida est tactui, creberrimis vimineis viriculis, flexu molli-bus, candidis, rectis, confertis assurgit, duorum cubitorum altitudine, folia in imo cichorij aut cyani incisura, sed valde exilia & tenera, reliqua foliola secundum viticulorum longitudinem certis & æquis distincta interuallis, ad fastigium vsque porriguntur, speciemque virgarum viridi albòque variegatarum præbent: sum-mis viticulis insunt, flosculi lutei in pappos dehiscentes. Chondrilla hæc visu pul-cherrima, plurima Iunio & Iulio floret cis Pontem Castrinoui à Mompelio vix sesquimiliare, cuius hæc datur pictura.



V O D *ἱεράκιον* Græcis similiter Latinis Hieracium dicitur, id est, Accipitrina, Gallicè *Herbe d'esperuier*, quod accipitres aues, Græcis *ἱερακες*, huius herbæ succo oculorum aciem acuere dicuntur. Hieracij genera duo facit Dioscorides, magnum & paruum, quibus adiecit Dalechampus hieracium *μακρόκαυλον*. At hieracium quidem minus Matthioli, picrida Theophrasti ex Dalechampi sententia esse diximus. Hieracium autem magnum

Nomina

Genera.

Lib. 3. c. 63.

Ibid.

HIERACIVM magnum
Dalechamp.

HIERACIVM minus Dalech.
maius Matth.



Dioscoridis, caulem emittit asperum & spinosum, subrubrum, cauum: folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia soncho per ambitum, luteos flores in oblongis capitulis. Hieracium maius id est, Matthiolo & Dodonæo, quod hîc Hieracij minoris nomine pinximus. Minus Hieraciû Matthioli & Dodonæi paullo ante Picridis nomine exhibuimus. Aliud verò hieraciû magnum profert hîc Dalechampus, quod radicem habet reliquis hieraciis similem, sed crassiorem: folia circa radicem magna, ampla, sinuosa, in medio caule quaterna, quinave eum amplexantia. Caulis cubito altior est, striatus: flos in eius vertice luteus, tragopogoni similis, amplior in lanuginē euanescens, non vt in reliquis id genus plantis candidam, sed è rufo nonnihil rubescentē. Lacteo succo tota planta manat. In pinguibus & apricis locis nascitur. Quod autem hieracium maius Matthiolus exhibuit, pro hieracio minore ex Dalechambio hîc proponimus: folia enim ex interuallis habet, diuisa in ambitu, cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Eiusdē hieracium *μακρόκαυλον* à caulium longitudine cognominatum est. Radice nititur crassa, in fibras multas diuisa: caule est cubito maiore, subrubro, rotundo, villosa, media sui parte foliato: foliis multis, vna stipatis, oblongis: flore & in caulis vertice, & medio, qua filia cumulata exeunt, luteo in oblongis capitulis, tandem in pappos auolante. Tota planta lacteum succum fundit.


Forma.

Locus.


In lib. 3.
Diosc. c. 63.

HIERACIVM Macrocaulon,
Dalechamp.

HIERACIVM Sabaudum
Pen. & Lobell.



HIERACIVM Narbonense
falcata siliqua, Lob.



Lib. 3. c. 69.
Vires &
Temper.

Inhumectis, pinguibus, & opacis gignitur. Lobellius duo alia Hieracia pinxit. Prius Sabaudum nominat: Pena montanum, foliis & laciniiis Chondrillæ cæruleæ altius incisfis, viridibus, in caule flaccido, molli, glabro: flore Dentis leonis, aliquanto minore: radice Tragopogonis. Alterum Narbonense falcata siliqua calendulæ semen & pedem alaudæ exprimente. Notissimum est Monspeliensibus, vbi inter segetes, & in agrorum marginibus Bontoneto finitimis luxuriat, foliis oblongis Hieracij, vel chondrillæ marinæ: gracilibus alis, multis diuisis cauliculis, & floribus luteolis lampsanæ similibus: semen in falcatis paruum, calendulæ ritu exilibus corniculis radiatim ab vno pediculo aptis, alaudæ, cancri, vel aranei pedes referentibus. Vtrumque Hieracium, vt scribit Dioscorides, vim habet refrigerandi, & modicè subadstringendi. Vnde illitum stomacho æstuantis inflammationibusque prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cū radice illita vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Galenus Hieracium in simplicium censu præterit, ita etiā Paulus & Aetius,

Lib. 20. c. 7. sub lactucæ aut intubi generibus id comprehendentes: Plinius de lactucæ sponte nascentis generibus tractans. Ex his, inquit, rotunda folia & breuia habentem, sunt qui Hieraciam vocent: quoniam accipitres scalpendo eam, succoque oculos tingendo

gendo obscuritatem cum sensere discutiant. Quare non sine ratione Cordus existimat Dioscoridem libro tertio inter umbelliferas plantas Hieracia non descripsisse: cum enim sint oleraceæ & intubaceæ plantæ, eas libro secundo, ubi de lactuca & intubo agitur, describi oportuit.

In lib. 3.
Diosc. c. 72.

SONCHVS.

CAP. XVII.

Sονχος Græcis dicitur, sic & Latinis Sonchus, ἀπὸ τῆς σῶον χέειν, id est, quod salubrem fundat succum. Cicerbitam à Romanis vocari, quo vocabulo etiam hodie Hetruria vitur, in quibusdam Dioscoridis exemplaribus legitur. Sed id nomen recens Dioscoridi attributum putat Ruellius, cum nusquā à Latinis usurpatum inueniatur. A recentioribus etiam lactucella, eademq; fortasse quæ ab Apuleio lactuca leporina nominatur, quod cum leporem animus deficit æstu, hac sibi solet mederi, Galli *Laiçterons* à lactis copia nominant, & leporis palatum, *Palais au lieure*, quod hoc animal ut ab æstu vindicetur, & caloris propulset incommoda, soleat sub ramis eius decumbere. Sonchi genera duo agnoscunt Herbarij omnes. Siluestrius quoddam, & magis spinis horrens. Alterum tenerius, cibis expetitur. Plinius item duo, album & nigrum, ambo spinosa. Galenus ait Sonchum ubi adoleuerit ex spinosis plantis esse. Theophrastus quoque inter spinosas & aculeatas plantas Sonchum retulit. Dioscorides verò cum duo Sōchi genera, quæ primū diximus, fecerit descripsitque, in fine capituli subiungit. Alter Sonchus tenerior arboris instar latis constans foliis, caulem in ramos exeuntem folia distinguunt. Quod tertium genus scribit Matthiolus in vtraque editione suorum in Dioscor. commentariorum non solum non inueniri in Italia, in qua non meminit se vidisse plantam, quæ Sonchum arborescentem referat, sed etiam nihil de eo à Theophrasto, & Plinio literis mandatum. Idem tamen in secunda commentariorum editione Sonchum læuem alterum depinxit tantum Corna-

Nomina

Lib. I. c. 20.

Genera

Li. 8. simp.
Lib. 7. hist.
ca. 9.

Li. 2. c. 124.

In lib. 2.
Diosc. c. 124

Embl. 117.
li. 2. Diosc.

SONCHVS *Lævis*
latifolius, Lobel.



SONCHVS *Asperior*,
Lobellij.



*SONCHVS Lavis laciniatis
foliis Lobel.*



SONCHVS Lavis.

*SONCHVS Asper
Matthioli.*



SONCHVS Lavis alter, Matth.



Embl. 117.
lib. 2. Diosc.

rius duo duntaxat Sonchi genera à Dioscoride constitui putat, nec tertium accipiendum genus, de quo postremis verbis agat, velut antea de duobus locutus fuerit, sed de priore quod agrestius & spinosius est, primum agere: deinde in fine capit de Soncho teneriore qui arborem refert. Lobellius alios, aut certe aliter pictos Sonchos exhibuit. Primum lauem teneriorē lavis foliis, leuiusculis per ambi-

tum

rum laciniis & spinulis, asperis. Alterum aculeis asperiores, aut horridiusculum, foliis angustioribus, laciniis amplioribus & spinis acutioribus. Tertium læuem foliis multum laciniatis, dentis leonis. Quartum læuem alterum, folio profundis laciniis sinuato, cuius summum hederæ folium refert, auersa parte rubens, nullis spinis hirtum: flos endiuivæ silvestris: caulis bicubitalis. Sonchus est lævis alter Matthioli. Sonchus latifolius Lobell. Sonchus asper Lobellij. Sonchus lævis Lobellij vulgaris. Dalechampius tertium Sonchi genus arborescēs protulit: item & aliud quorum Historiam eius iudicio hinc aliis Sonchis subiunximus. Sonchus asper & lævis caule cōstant anguloso, cubitali, intus cauo, inani, molli, fragili, lacte referto, & plerumq; rubescēte: foliis in ambitu per intervalla dissectis, siue cichorij modo laciniatis, quæ quidem in aspero crispa, aspera, & pungentia ac subrubescētia sunt, in lævi lævia, & sine spinis. In caulium summitate flores sunt latei, Senetioni haud absimiles, qui tandem in pappose evanescent. Hi Sonchi nascuntur in hortis, campis & vineis. Vtriusque vis refrigerat, inquit Dioscorides, modicè adstringit, æstuanti stomacho, & inflammationibus illiti profunt. Succus eorū stomachi rosiones sorbitione mitigat: lac elicit, in vellere appositus sedis ac vulvæ collectionibus opitulatur. Tam herba quam radix illita vibratis à scorpione ictibus subuenit. Galenus de Sonchi viribus hæc scripsit. Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Cæterum viridis etiānum & tener estur, perinde ut cætera olera silvestria. Temperamentum eius quodammodo mistum est: constat enim ex aquea terreaq; substantia, utraque læviter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps, & siue cataplasmatis modo illinatur, siue edatur, aperte refrigerat: postea verò quā planè resiccatus fuerit, terrestris eius temperamentū redditur, modicam habens caliditatē. Quæ præterea Plinius scripserit, scire operæ prætiū est. Estur & Sonchus, ut quæ Theseo apud Callimachū apponat Hecale, uterque albus & niger, lactuæ similes ambo, nisi spinosi essent, caule cubitali, anguloso, intus cauo, sed qui fractus copioso lacte manet. Albus cui est lactis nitor utilis orthopnoicis, lactucarum modo (ex embammate addit Cornarius ex vetere Pliniano codice.) Erasistratus calculos per urinam pelli eo monstrat, & oris graueolentiam commanducato corrigi. Succus trium cyathorum mensura in vino albo, & oleo calefactus adiuvat partus, ita ut à partu ambulent gravidæ. Datur & in sorbitione. Ipse caulis decoctus facit lactis abundantiam nutricibus, coloremq; meliorem infantium: utilissimus iis quæ lac coire sibi sentiant. Instillatur auribus succus, calidusque in straguria bibitur cyathi mensura, & in stomachi rosionibus cum semine cucumeris nucleisq; pineis. Illinitur & sedis collectionibus. Bibitur contra serpentes scorpionēsq; radix verò illinitur. Eadem decocta cum oleo in Punici mali calice, aurium morbis præsidium est. Hæc omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet vesci, ut morbos faciente, de albo consentiens. Agathocles etiam contra sanguinem tauri demonstrat succum eius. Refrigeratoriam tamē vim esse conuenit nigro, & hac causā imponendum cum polenta. Sic enim Cornarius ex eodem vetere codice. Soncho nostri utuntur hyeme in acetariis, inquit Matthioli, præsertimq; eius radicibus, quæ cum teneræ sint & dulces, mensis expetuntur. In vino decoctus stomachi fluxionibus medetur. Lacteus liquor è caule manans datur potandus ægrè spirantibus, & astmaticis. Idem auribus instillatus dolorem tollit, præsertim in mali corio cum oleo decoctus. Sonchus dendroides, idest, arborescens Dalechampij radicem habet crassam, nigricantem, ex qua radiculæ multæ prodeunt: caules bicubitales, atque interdum altiores, teretes, foliis stipatos sinuosis, seu per oras ex intervallo infectis, latis, quercui haud absimilibus, lacte diffluentibus. Rami in caulibus nulli sunt, sed ab imo scapo ad summū vsque non

Forma.

Locus.

Ibidem.

Vires &

Temper.

Li. 8. simp.

Li. & ca. 22.

Ibid.

SONCHVS Dendroi-
des, Dalechamp.



non procul à singulorum foliorum exortu, singuli nascuntur petioli, tenues, qui multos flores sustinent luteos, quales sunt aliorum Sonchorum, aut lactucæ, qui tandem in pappos abeunt. Hoc est tertiū Sonchi genus, cuius capite extremo de Soncho Dioscoridem meminisse diximus. Sed hic scrupulum ac dubitationem rei herbariæ studiosis iniiciet Dioscorides Latinus, in quo sic legitur. Alter Sonchus tenerior arboris instar, latis cōstans foliis: caulem in ramos exeuntem folia distinguūt, cum dixerimus ramis nullis, sed foliis tantum & floribus huius Sonchi caules ornari. Quem scrupulum eximent Græca quæ sic habent. ὁ δὲ ἑτερος σόνχος, ὁ δὲ τρυφερὸς, δειδρώδης ἐστὶ, καὶ παλίφυλλος: τὰ δὲ φύλλα διεστρε τὸν χυλόν. Quæ sic fidelius conuertisset Ruellius. Alter Sonchus qui etiam tenerior, arborescit, & latis constat foliis: caulem folia distinguunt. In saxosis frigidorum montium cliuis prouenit hic Sonchus. Eadem præstat quæ & reliqua Sonchi genera.

SENETIO.

CAP. XVIII.

Nomina

Lib. 7. hist.
ca. 7.



Racis ἡεῖρερον quod flores eius capillorum ritu vere canescant, Latinis Senetio dicitur, quibusdam vulgò Cardocello, aliis Spelicciosa, Gallis *Senesson*, Germanis *Creutzvurtz*, Hispanis *Benuaron*. Theophrastus Senetionem oleraceis & intubaceis adnumerauit. Is & Dioscorides vnus duntaxat Senetionis meminerunt. Recentiores iidemque rei herbariæ

Li. 4. Diosc.
c. 92.
Lib. 6. c. 17.

Genera

periti plura genera fecerunt. Quidam Iacobeam à quibusdam vocatam, Senetionem maiorem appellant. In qua etiam sententia est Matthiolus secunda cōmentariorum in Dioscoridem editione. Addunt his Senetionem marinum, Dalechampi Senetionem fœtidum. Dodonæus genera tria descripsit, Senetionem maiorem, huic similem minorem, tertium foliis longis & angustis, caule gracili, recto, ex fusco purpurascens, molli veluti lana vestito. In summitate flores in pallido lutei, statim atque dehiscunt cani fiunt. Hunc Theophrasti Senetionem esse arbitratur. Senetio Dioscoridis & veterum cauliculo est cubitali, subrubro: foliis cōtinuis, laciniatis, & per extremitates erucæ modo diuisis, sed minoribus: floribus luteis, qui celeriter dissecti vanescunt in pappos: radice superuacua.

Forma

Nascitur passim in hortis, atque etiā super mœnia & in maceriis. Virescit toto anno, & quolibet fere mense floret. Ideo non desunt qui hunc Italico idiomate vocent *Fiore d'ogni mese*. Folia cū floribus refrigerant, inquit Dioscorides.

Locus

Marth. ibi.
Lib. 4. c. 92.

Vires & Temper.

Li. 6. simp.

Quare illita cum vini modico, vel per se, testium, & sedis inflammationes sanant: quin & ex manna thuris medetur cum reliquis vulneribus, tum iis quæ nerui acceperunt. Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præstant. Verum recentes epoti strangulant. Totus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores à bile contractos persanat. Senetionis breuiter meminit Galenus

his

SENETIO *March.*

his verbis. Senetio facultatem mistam obtinet, simul refrigeratorem, & modicè digerentem. Plinius de Senetione multas easque diuersas sententias recenset, inter quas eam etiam quam ex Dioscoride proposuimus. Erigeron, inquit, à nostris vocatur Senetio. Hanc si sine ferro circūscriptam effodiat aliquis, tangatq; ea ter dentem, & alternis ter despuat, ac reponat in eundem locum, ita vt viuat herba, aiunt dentem eum postea non doliturū. Herba est trixaginis specie ac mollitia, cauliculis subrubicundis. Nascitur & in tegulis & in muris. Nomen hoc Græci dederunt, quia vere canescit. Caput eius numerosè diuiditur, lanugine qualis est spinæ inter diuisuras exeunte. (Sic enim legit & distinguit Cornarius, cum in vulgatis exemplaribus exaratum sit, caput eius numerosa diuiditur lanugine, qualis est spinæ, inter diuisuras exeunte.) Quare eam Callimachus Acanthida appellat, alij pappū. Nec deinde Græcis de ea constat. Alij crucæ foliis eam esse dixerunt, alij roboris, sed minoribus multo.

Lib. 25. c. 13.

Embl. 83. li. 4. Dioscor.

Radice alij superuacua, alij neruis vtili, alij potu strangulante. E diuerso quidam regio morbo cum vino dederunt, & contra omnia vesicæ vitia: item cordis & iocinoris. Renibus extrahere arenam dixerunt. Ischiadicis drachmam cum oxymelite ab ambulatione propinauere: torminibus quoque in passio vtilissimam. Præcordiis etiam cibo ex aceto eam prædicantes, ferentesq; in hortis. Nec defuere, qui & alterum genus facerent, nec quale esset demonstrarent, contra serpentes in aqua bibendā, edendamq; comitialibus dantes. Nos eam Romanis experimentis per vsus digeremus. Lanugo eius cum croco & ex igno aquæ frigida trita, illinitur epiphoris. Tota cum mica salis strumis. Nec hoc solum loco Plinius Romanis experimentis per vsus eam digerit, sed aliquanto post, Erigeron quoque cum farina thuris & vino dulci testium inflammationes sanat. Et rursus. Doloribus Erigeron ex aceto illinitur: quæ paulo aliter Dioscorides habet. Senetio maior quorundam, ab Herbariis vulgò Herba S. Iacobi, & S. Iacobi flos, & Iacobeæ nominatur, Gallicè *L'herbe S. Iaques*, Italicè *Carduncello maggiore*, Germanicè *S. Iacobs Bluom*, caulibus est longis, aliquando sesquicubitalibus, rubentibus, striatis, furculosis: foliis in ambitu laciniatis, crucæ silvestris æmulis, nigricantibus, gustu amaris, ante caulium exortum humi iacentibus: floribus luteis forma chamœmeli floribus haud dissimilibus, qui flaccescētes in papposam lanuginē euolant:

SENETIO maior, siue
flos S. Iacobi, *Fuch.*

diis etiam cibo ex aceto eam prædicantes, ferentesq; in hortis. Nec defuere, qui & alterum genus facerent, nec quale esset demonstrarent, contra serpentes in aqua bibendā, edendamq; comitialibus dantes. Nos eam Romanis experimentis per vsus digeremus. Lanugo eius cum croco & ex igno aquæ frigida trita, illinitur epiphoris. Tota cum mica salis strumis. Nec hoc solum loco Plinius Romanis experimentis per vsus eam digerit, sed aliquanto post, Erigeron quoque cum farina thuris & vino dulci testium inflammationes sanat. Et rursus. Doloribus Erigeron ex aceto illinitur: quæ paulo aliter Dioscorides habet. Senetio maior quorundam, ab Herbariis vulgò Herba S. Iacobi, & S. Iacobi flos, & Iacobeæ nominatur, Gallicè *L'herbe S. Iaques*, Italicè *Carduncello maggiore*, Germanicè *S. Iacobs Bluom*, caulibus est longis, aliquando sesquicubitalibus, rubentibus, striatis, furculosis: foliis in ambitu laciniatis, crucæ silvestris æmulis, nigricantibus, gustu amaris, ante caulium exortum humi iacentibus: floribus luteis forma chamœmeli floribus haud dissimilibus, qui flaccescētes in papposam lanuginē euolant:

Li. 26. ca. 8.

Cap. 12.

Forma
Iacobeæ.

*SENETIO Maior, siue
flos S. Iacobi. Matth.*

Locus.

Li. i. c. 47.

Forma



*SENETIO Fœtidus
Dalechamp.*

Lib. 25. ca. 5.

Locus.



euolant: in medio semen est cinereū : radix alba, & fibrata. Nascitur in agrorum marginibus, & aquarum ripis, locisque arenosis. Iulio & Augusto mensibus floret. Amara est, & adstringit, ideoq; calidam & siccam esse constat. Recentiorum medicorum experientia cognitum est, herbam hanc vulneribus mirificè mederi, & ad interanea prodesse. Fistulas quoque iidem curare, & ne vltra serpent prohibere impositam tradūt. Aiunt alij huius succo gargarizato gutturis inflammationes & apostemata sanari. Eandem pinxit Lobellius nomine Iacobæ Senetionis. De Senetione marino, siue Iacobæ marina Dodonæi diximus in libro de maritimis. Senetio fœtidus Dalechampij radice nititur palmum longa, lignosa, cõtorta, nigricante, fibrata: constat venusta foliorum coma ex atro virentium denso stipatu prodeuntium, Senetioni similium, elegantissimis incisuris diuisorum, vt acanthi speciem ob venustatem pictoribus sculptoribûsque magnopere celebratam vincant, tam pinguiū, vt melle illita quispiam credere possit, & complicata, & sese mutuo contingentia vix separentur, sic tanquam eo glutinis lentore cohærescunt, odore graui, qualis est scrophulariæ maioris, aut ebuli, vnde ei fœtidi cognomentum: caulæ pedem non excedente, supra folia parum extante, ac inter ea ferè abdito: flore Senetionis, luteo, in pappos abeunte. Quidam artemisiā fœtidā appellant, à quadam cum artemisiæ foliis similitudine. Sunt qui sideritim quartā à Plinio memoratam esse volunt, in maceriis nascentem, cum teritur fœtidi odoris. In macris, asperis, & frigidis locis luxuriat. Succum laudant ad vlcerē maligna. Alia duo Senetionis genera Myconus dedit quæ hic depinximus. Prius herba est in saxis nascens, fruticosa, radice minima, in radículas alias diuarcata, cauliculis multis, teretibus, lignosis, candicantibus, dodrantalibus, in quibus folia sunt minima, tenuia, roris-marini, sed tenuiora, superne viridia, inferne candida, quæ inæqualibus spatiis in caulibus oriuntur: in singulorum cauliculorū cacumine modo bina, modo ternam, quandoque quaternā capitula emergunt pinæ nucis effigie, quæ tandem in pappos euanescent. Trita manibus folia pini odorem referunt, mansa vero adstringentem saporem. Hanc ille Senetionem vocat, quod vt cætera Senetionis genera, facile canescat. At stœchadis citrinæ species potius videtur, de qua dicemus idoneo loco. Alterū genus, herba est in quercetis, locisque non admodū siccis

Secis, sed humidis, interdum & in pratis nascens, cubitali altitudine, radicibus tenuis, candidis, lignosis, dulcibus, caule aliquantisper piloso, rotundo, cauo, medulla lanuginosa farcto, in quo folia sunt exigua, pilosa, in ambitu ferrata, crassa, aliquantulum viridia, infernè rubescentia, quæ quandoque colore vinoso manus inficiunt. In caulis summitate flores sunt lutei, in pappos protinus abeuntes. Sapor totius plantæ aqueus est, ut vulgaris Senetionis. Videtur genus esse Se-

SENETIONIS Genus,
Miconij.



SENETIONIS Species,
Dodonæi.



netionis à Plinio descriptum loco supra adducto, trixaginis specie & mollitia, cauliculis subrotundis. Nascitur in tegulis & in muris. Sic ea quam hîc damus, foliorum specie trixaginem æmulatur, caulis & folia rubescunt, citò canescit, & flos in pappos abit. Quod in tegulis & muris oriatur, non repugnat: nam vulgaris Senetio etiam in montibus, & locis diuersis reperitur. Aliam Senetionis speciem protulit Dodonæus alio in loco, quæ tamen differt à Senetione maiore & minore, foliis maioribus, profundius incisis, & ad cichorij folia accedentibus, caules eius ramosi, pedales, comantibus in summo floribus luteis, qui citissimè & canescunt, & in pappos abeunt, veluti Senetionis, cætera Senetioni æqualis. Foetet herba nonnihil, vnde cichorium foetidum à nonnullis vocatur. Hæc herba certè in cichoracearum numero habenda, & talis quidem, inquit Dodon. qualis est Theophrasti Aphace cichoreacea, nisi quod hæc æstate solum floret. Theophrasti vero Aphace tota hyeme, totòque vere. Hanc pinxit Lobellius nomine Erigeri tomentosi. Foliis enim est tomentosis, in calidis regionibus proueniens.

Lib. purg.
Ape. l. c. 25.

Nomina

BΟΥΓΛΩΣΣΟΝ, & ΒΕΥΓΛΩΣΣΟΣ, Latinis etiam Buglossum, & lingua bouis, seu lingua bubula, nominatur, vulgò Borrigo, Plinio Euphrosynon ab efficienda voluptate, vt dicitur, Arabibus *Lesen arthaur*, seu *Lesan althaur*, Gallis *Buglosse* & *Bourrache*, seu *Borrage*, Italis *Borrachine*, Germanis *Borrescht*, Hispanis *Borraia*. Leoniceus, Manardus, Ruellius, Fuchsius, Tragus, Cordus, Matthiolus, Marcel. Virgilius, Dodonæus, Cornarius, Pena & Lobellius, atque alij rei herbariæ periti, Buglossum veterum, eam proculdubio herbam esse putant, quam borraginem vocamus, non illam quæ vulgò buglossa nominatur, & cuius in officinis communis est vsus, neque id temerè, ac sine iudicio. Primum

Li. 4. c. 124.

BORRAGO Buglossum verum.Dere rust.
ca. 40.Lib. 2. cauf.
ca. 436.

Quis nisi plane amens ex ipsa inspectione non iudicet Borriginem foliis esse verbasco similibus, nigrioribus tamen & asperioribus? Nonne & folia Borriginis in terram inclinant, & bubulas linguas tum forma, tum asperitate imitantur? Contra quæ Buglossi nomen in officinis sibi falsò vendicauit, nonne folia habet oblonga echio similia, non ita lata vt bubulas referant linguas? Ob id Cato surculum insitum cum lingua bubula obtegere iubet, si pluat, ne aqua in librum permanet, nonne rotundiore & latiore potius folio, quale est Borriginis, quàm longiore & angustiore, quale est Buglossa, ad contegendam rotundam insitionem vt maluit? Præterea Buglossa folia minùs in terram vergunt, quin potius surgunt, è toto ferme cespite sursum tendentia, nec aliqua ex parte verbascum referentia. Ad hæc Buglossa folia modicè hirsuta sunt, mollia, denique albicant, non nigricant. His accedit Auicennæ testimonium sic scribentis. Lingua bouis est herba lata habens folia sicut almaru, & ad tactum aspe-

ra, & rami eius asperi sunt, sicut pedes locustarum. Oportet autem vt illa administretur, quæ est in Corasceri crassa habens folia, super quorum faciem sunt puncta, quæ sunt radices spinarum & pilorum exeuntium ab ea. Quibus verbis adeo perspicuè Borriginem expressit Auicenna, vt facillè quiuis intelligat eam esse linguam bubulam, quam diligenter descripsit præter morem, quod suo quoq; tempore non deessent, qui veri Buglossi loco alia vterentur: quod declarat iis verbis quæ subiicit. Quæ autem in hac terra reperitur, & qua vtuntur medici, plurimum eius est genus almaru, & non est lingua bouis, & neque confert vt iuuamentum illius est. Hæc Auicenna. Iam vero Apuleius Buglossum Corraginem à Lucanis appellari scribit, quod cordis affectibus quam maximè opitulentur, quæ primæ duntaxat literæ mutatione à Borrachine distat. Cum igitur ex iis euidenter demonstratum sit Borriginem nostram veterum esse Buglossum, in posterum medici pharmacopœi; sicubi Buglossum ab antiquis in medicamentorum compositiones adhibitum legerint, Borriginem nostram, non vulgare Buglossum vsurpent

Li. de med.
herb.

vsurpent, vt iis vsuri quas debent vtilitates ex medicamentis capiant. Est igitur Borrigo Buglossum latifolium Lobellij, perperam Lycopsis Anguillaræ: foliis latis, oblongis, asperis, eminentibus vbique bullis, tenuissimis aculeis armatis, qui totam plantam hirsutam, atque rigidam reddunt: caule cubitali, & quandoque maiore, pingui, cauo, subrubente, aculeis vbique rigente, ramulis multis brachiato: floribus stellæ modo radiantibus, speciosis, cærulei coloris, nigro è medio prominente apice: semine nigro & striato: radice alba, tenera, pollicari crassitudine, gustu subdulci, & lento. Aliam Buglossam seu Borriginem scribit esse Cordus, quæ solo florum colore à superiore differt: omnino enim candidos edit. Quid verò de vulgari nostra Buglossa sentiendum? Buglossum domesticum seu hortense & satium Mesues esse Borriginem, silvestre verò seu erraticum esse Buglossam vulgò dictam censuit in Mesuem Manardus. In eadem est sententia Valer. Cordus. Matthiolus Borriginem & vulgarem Buglossam specie quidem & forma à sese differre arbitratur, sed iisdem pollere viribus, eundemque vtriusque saporem euidens facere eiusdem facultatis iudicium: aut si eadem prorsus vires non sint, certe proximas, & valde similes esse: quin & facie non multum ea differre, si illud genus spectes, quod hodie ex Hispania allatum in hortis feritur, quod etsi verbascum non omni ex parte referat, quemadmodum Borrigo, foliorum tamen figura bubulas linguas maximè imitatur. Fuchsius Buglossam vel linguam bovis Officinarum & Herbariorum, Cirsium Italicum vocat. Dodonæus eandem Buglossam domesticam maiorem Officinarum, Cirsium Fuchsi, Buglossum magnum satium vocat & lycopsim. Lobellius & Pena Buglossum angustifolium. A Dodonæo dissidet Matthiolus, sicut & ab iis qui Buglossam vulgarem echij genus esse statuunt, sicut in Echio & Circio dicemus. Cæterum buglossum vul-

Matthi. in
li. 4. Diosc.
ca. 124.

Forma.

Lib. 1. plan.
ca. 74.

Ibidem.

Li. de hist.
plan. c. 128.
Lib. 1. ca. 3.

Forma.

Matth. ibi.

Lib. 1. plan.
ca. 45.
Lib. 1. c. 77.
Ibidem.

Lib. 1. c. 3.

BVGLOSSVM Vulgare.



Buglossam silvestrem. Buglossum satium minus, quod modo ex Lobellio descriptissimus Buglossa maiori satiuo prorsus simile facit Dodonæus, caule, foliis hirsutis, asperisque & radice: nisi quod hæc omnia in isto sunt minora, cauliculi bre-

BUGLOSSVM *Minus*
siluestre, Dodonæi.

Cap. 128.



uiiores, folia minora, & angustiora, flores similes, minores, purpurei coloris, sed dilutioris: semen item simile, minus & nigrius. Id Fuchsius pro circio Germanico exhibet. Huic proximū Buglossum siluestre, siue Lycopsis siluestris, sed foliis asperioribus, minoribus, angustis, flores similes, sed multo minores & cærulei, semen minutum & fuscum, radix longa & gracilis. Fuchsius id echium esse, ac pro eo depingere voluit. Hic non omittendum Buglossum semper virens Penæ, etiam in frigidissimis regionibus, Anglia, Antuerpia & reliquo Belgio, vbi plurimum & per oportune viget in hortis ad vsus medicos. Folia ei subrotunda, latifolia Borriginis, vti etiam caulis: radix situ, habitu, & mucagine consolidæ maioris: flores vero secus alas & folia prorsum angustifolia, eiusdem saporis & utilitatis ad cordis, & melancholicos affectus. Huius plantæ Lobellius non meminit, sed alterius quam Symphytum pumilum repens Borriginis facie appellat, Borriginem minimam herbariorum, quæ alitur in hortis Belgij, foliis Borriginis, aut pulmonariæ, minoribus: flosculis item in cæruleo purpureis Borriginis, sed radix pulla Vlmariæ aut caryophyllatæ fibris implexa. Floret hyeme in pensilibus hortis, vere, etiam Augusto in hortis. Gustanti cum mucagine quandam acrimoniam exhibet, quod Borrigini aut Buglossu negatum est.

Quænam



Quænam sit hæc antiquis adhuc ignoramus. Hæc Lobellius, qui eandem aut
 persimilem vidisse se ait in horto Mutoni, cuius folia conspersa erant notulis
 pulmonariæ ritu. Sed quæ de Borragine & Buglossò dicenda supersunt persequamur.
 Borrago sponte nascitur in hortis omnibus, adeo ut inde haud facillè ex-
 tirpari possit, & in sabulosis campestribusque. Tota æstate floret. Borrago, aucto-
 re Dioscoride, in vinum iniecta animi voluptates auget. Cui subscribit Galenus
 sic scribens. Buglossum humidæ calidæq; temperiei est. Itaque vinis iniectum
 lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditur. Sed & iis qui ob gutturis asperitatem tuf-
 siunt, coctum in melicrato conuenit. Et Paulus his verbis, Buglossum humidum
 est & calidum temperamento: quamobrem vino immissum lætitiæ ac animi
 voluptates efficere dicitur: Plinius. Iungitur huic Buglossos, boum linguæ similis,
 cui præcipuum, quod in vinum deiecta animi voluptates auget, & vocatur
 eufrosynon. Quæ verò in quibusdam Dioscoridis exemplaribus reperiuntur,
 Buglossum nascitur in campestribus, &c. Deinde aiunt eam quæ tres thyrsos
 emittit, &c. Dioscoridis non sunt, sed planè supposititia, tum ob dictionis dissimi-
 litudinem, tum quod eadem in Plinio de Cynoglossò leguntur. Iungitur & Cy-
 noglossos caninas imitans linguas, topiariis operibus gratissima. Aiuntque quæ
 tres thyrsos seminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse,
 quæ quatuor ad quartanas. Quamquam etiam in Plinio simile quiddam habeat-
 ur de Buglossò: Buglossò inarescente si quis medullam è caule eximat, dicatque
 ad quem liberandum febreid faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem
 aiunt à febre liberari. Quare illa ex Plinio, vel ex alio quouis Dioscoridi adiecta
 esse constat, nec in Aldino exemplari Græco reperiuntur, neque ea habet Ruel-
 lius in translatione sua, in qua hoc capitis exordium est. Buglossum verbasco simi-
 le est, &c. Buglossum vrinam cit, inquit Symeon Sethi, & sitim sedat. Caules eius
 cocti, & crudi comesti iecoris affectibus prosunt. A viatoribus ex eo conficitur

Tempus.

Li. 4. c. 123.

Vires

Temper.

Li. 6. simp.

Lib. 7.

Li. 25. ca. 8.

Lib. 25. c. 8.

Lib. 26. c. 18.

Math. ibi.

zulapion, & est vtile. Vulgari Buglossò vt & Borragini vis sane magna inest ad animi deliquium, atque alios cordis affectus, & ad melancholicos morbos, & præsertim eorum decoctum ex vino velaqua. Trita vulgaris Buglossi radix ex aceto, & illita tribus diebus continuis scabiosos iuuat. Præstat vtriusque plantæ succus haustus ad epota venena, & venenatorum animalium morsus. Stillatitia eorum aqua deliriis, quæ cum febre eueniunt mirificè auxiliatur. Præterea oculorum inflammationes mulcet tum sumpta, tum imposita.

CIRSIVM.

CAP. XX.

Nomina

Li. 4. c. 114.

Forma.



ΚΙΡΣΙΟΝ melius quàm vt quidam transposita vna litera legunt *κελσιον*, Latinè etiam Cirsium dicitur, quod varices quos Græci *κυσσος* vocant, fanet à Romanis spina mollis. Cirsium, vt auctor est Dioscorides, caulis est tener, duorum cubitorum, triangularis ab imo foliola rosæ speciem referentia: anguli spinosi, per interualla molles: folia Buglossò similia, longiora, subcandida, modicè hirsuta, pattibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula in summo purpurea, quæ soluuntur

Lib. 27. c. 8.

CIRSIVM, Matth.

Li. 4. Dios.
c. 114.

in lanugines. Plinius iisdem ferè verbis Cirsium descripsit. Cirsium cauliculus est tener, duorum cubitorum, triangulo similis, foliis spinosis circumdatus: spinæ molles sunt, folia bouis linguæ similia, minora, subcandida, & in cacumine capitula purpurea, quæ soluuntur in lanugines. Ita Plinius à Dioscoride nihil differt, nisi quod folia minora dixit, vt qui *μικρότερα* legat, quod hodie codices habent *μακρότερα*, idest, longiora. Ruellius & Fuchsius, atque alij recentiores multi nihil aliud Cirsium esse crediderunt, quàm vulgare Buglossum: quod cum grandius sit, Buglossum magnum, siue Buglossum Italicum, siue Romanum vocant: quam sententiam minimè probat Matthiolus: quia Buglossum caulem triangularem non habet, sed rotundum, ab imo folia, per ambitum aculeata rosæ speciem non referunt, sed longa, & continua prodeunt. Denique Buglossi flores non vanescunt in pappos, sed flaccescentes integri decidunt, subnascente in folliculis semine. Plantam igitur à Clarissimo medico Luca Ghino ad se missam,

cuius figuram hîc apposuimus, pro Cirsio Matthiolus exhibet, quod ei Dioscoridis descriptio maximè conuenire videatur: Nascitur, vt ille scripsit, in vlgiginosis locis. Radicem Cirsij loco laboranti adalligatam dolores varicum sedare, Andræas scripsit referente Dioscoride. Et hanc herbam, Plinius ait, radicemve eius adalligatam dolores varicum sanare tradunt. Cirsium aliud describit Dodonæus, quod & hîc appinximus, foliis magnis, latis borraginis foliis maioribus, latioribusque, spinis paruis opertis: caule anguloso, tenero, fragili, circa cuius summum foliola multa sunt congesta, inter quæ carduus echinatus & rotundus prodit, flore purpureo in auras abeunte. Radix est crassa & fibrata. Locis humidis, & circum aquas prouenit. Augusto mense floret, frigido siccoque est temper

Locus.

Vires.

Ibidem.

Lib. 5. ca. 15.

Forma.

Locus.


CIRSIVM Dodonæi.



temperamento, & viribus soncho fere simile.

Cirsium aliud duobus in locis pictum dedit idem Dodonæus, cuius folia sunt oblonga, lactuæ fere similia, verum acuminata, & per circumferentiam aculeata, candidiora vulgaris buglosi foliis: caules recti, bicubitales, in alas nonnullas discreti, in quorum singulis capitulum eminet hispidum, quod post floris vigorem deorsum reflexum nutat, tandemque in papposam lanuginem resolvitur: flos purpureo rubet colore: semen splendet aliorum carduorum instar. In hortos aliunde illatum est. Fertur alicubi in maritimis exire. Id carduorum generibus adnumerat. Lonicerus & Fuchsius cirsium buglossum magnum, siue buglossum Italicum esse existimant. Cui omnino similem plantam quandam in Germania copiosè nasci tradunt, nisi quod minora omnia habet, cuius figuram hîc damus. Ob quam, cum cirsio seu buglossio Italico, ut illi putant, similitudinem Cirsium Germanicum nominarunt. Scribit Lobellius in Belgij hortis plures Cirsij ex

Lib. pur.
App. i. cap.
22. & lib.
de floribus

foliis & capitulis conspici differentias, præter genera memorata. Vnicaules quaternum & quinum cubitorum, folia incana buglossio hortensi angustifolio altero tanto maiora & longiora, oris & ambitu laciniatis & spinosis, flores purpurei, singuli in singulis cymis papposi in duplo maiore squamulis loricato capitulo, minus spinulis horrido. Eius hæc est icon. Pinxit etiam Lobellius Cirsium Anglicum quod videtur Spinam albam adumbrare, spithameo caule & fo-

*CIRSIVM Germanicum, Loniceri.**CIRSIVM aliud, Dodonæi.*



liis circij, ad quod commode referri potest, flos singularis Cardui bulbosi. Radix Belliolis, aut Ellebori nigri modo fibrata. Prouenit in pratis. Gustu præsicco, adstringente, moderatè calido. Hæc Lobellius.

MALVA. CAP. XXI.

Nomina
Lib. 20. c. 21
Lib. 20.



T malua Latinis quasi molua quod aluum molliat, dicta est, auctore Varrone, ita Græcis *μαλάχη* ab emolliendo vētre, quia *μαλάττειν* molire significat. Plinius mouorem, à Græcis molopen vocari in satuiis, alteram malachen scripsit. Athenæus *μαλάχην* Attice dici, in multis autem Anaphanis & Epicharmi exemplaribus *μολόχην* per *ο*, scriptum reperiri.

Genera.

Arabicè *Chubeze* seu *Chubas* nominatur, Italicè *Malua*, Germanicè *Pappel*, Hispanicè *Maluas*, Gallicè *Manue*. Maluæ multa sunt genera. Est enim malua *κηπδύνη*, id est, hortensis, siue satiuæ, & malua siluestris, non quæ in siluis, aut asperis locis, sed quæ in incultis sua sponte nascitur, quam *χερβίαν* Dioscorides vocat, quæ vox incultam & inelaboratam terram significat, qualis in semitis, pratis, aliisque huiusce modi ruris & agri partibus est. Et siluestrem hanc maluam, vulgare intelligimus, non althæam, nec alceam, de quibus postea dicemus. Hæc malua vulgaris in viis omnibus & areis prope vrbes luxuriat, caules multos edens teneros, flexiles, folia quâ plurima, crassiuscula, ambitu nonnihil laciniata, circinata, viridatia: flores tota æstate fert particulatim purpureos, vel ex purpureo pallidos, deinde orbiculos in quibus semina, radix est longa, digitū æquans, lignosior. Maluæ differentiæ sunt aliquot, ex florū figura, & vario colore. Alia enim rubras, alia candidas, alia in purpuras albicantes rosas producit. Et has rursus atq; illas vel simplici, vel multiplici foliorum textura constantes, quarum effigiem & pulchritudinem demirans vulgus Rosam transmarinam cœpit appellare, Gallice *Rose d'outremer*. Malua siluestris duplex: quædam enim altius attollitur, & fere arborefcit, quædam pumila est, & humi iacet. Malua hortensis quæ sæpe grandescit in arborem, radice est longa crassa: caudice simplici, luxuriosæ proceritatis, baculi vsum præbente, rotundo: foliis amplis, per ambitū ferratis, iis verò quæ in superiore caule sunt vulgaris maluæ

Genera.

Forma.

Malua hortensis quæ sæpe grandescit in arborem, radice est longa crassa: caudice simplici, luxuriosæ proceritatis, baculi vsum præbente, rotundo: foliis amplis, per ambitū ferratis, iis verò quæ in superiore caule sunt vulgaris maluæ

ua modo diuifis, flores pulcherrimi, caulem à medio fere ad verticem vſque exor-

MALVA Vulgaris, Matth.



nant, varij coloris, vt diximus, breui admodum pediculo dependentes, qui venustate roſis non cedunt, & ſi ſuppeteret odor, de principatu certarent. Primum capitula quædam breuibus innixa petiolis, & leuiter in mucronem ſaſtigiata è caule proſiliunt, iſſque paulatim intumeſcentibus prægnantia florum inuolucra fatiſcunt, in quibus dehiſcentes roſæ ſeſe pandunt, & explicantur in folia, interdum quinque interdum ſtruçtili quadam ſerie, vt diximus, numeroſa, calicibus apices paucos complexis, qui lutei mediis emicant, quibus decidentibus erumpunt purpurea ſtamina. Hiſ foetus ſuccreſcit multipliciter tunicatus, atque in vmbilici formam numeroſo ſemine coagmentatus, in quibus cum decuſſa ſunt folia, reliquarum maluarum modo ſemina recluduntur. Hæc malua maior à Matthiolo, & iure quidem nominatur. Aliam maiorem maluam depinxit, caudice non ſimplici, ſed ſimiliter craſſo, rotundòque & egregiis floribus decorato, ex cuius inferiore parte folia exoriuntur longis pediculis nitentia, valde ampla, rugata, venoſa, per oras ferrata, in profundas lacinias diuiſa, ſuperiore caudicum parte minora. Item tertiam, quæ aut eſt malua ſatiua laciniola Cordi, aut ab ea non multum diſſidens. Caulem ſingularem erigit humana ſtatura plerunque proceriorem, numeroſis & cubitalibus adnatis ramoſum, modicè anguloſum, glabrum, intuſque anguſta concauitate per-

Lib. 2. Dio
ſcor. c. iii.

das lacinias diuiſa, ſuperiore caudicum parte minora. Item tertiam, quæ aut eſt malua ſatiua laciniola Cordi, aut ab ea non multum diſſidens. Caulem ſingularem erigit humana ſtatura plerunque proceriorem, numeroſis & cubitalibus adnatis ramoſum, modicè anguloſum, glabrum, intuſque anguſta concauitate per-

MALVA Maior I. Matth.



MALVA Maior II. Matth.



*MALVA maior tertia,
Matthiol.*Lib. 1. hist.
cap. 5.

uium. Folia fert glabra, sub ramulorum exortu singula, in quinas, senas, aut septenas (non tamen profundius incisas) per ambitum crebro laciniosas, & infractas partes diuisa, quæ verò in summis virgis folia sunt, his magnitudine cedunt: flores per totam æstatē secus folia fert multos, paruos, candidos, ex quinque foliis constantes, singulis multa succedunt semina, in orbem mucroni cuidā velut centro circumposita quinque partito calice incidentia. Radice nititur pede longiore, singulari, candida, fibrata. Tota herba gustum dulcem, lubricum & glutinosum refert saporē. Malua hortēsis in hortis fata prouenit, quæ in tantā magnitudinē accrescit, vt iustę arboris formā adipiscatur, & iam nec herba, nec frutex, sed planē arbor dici debeat. Ob id δενδρομαλάχη Græcis dicta est, id est, malua arborea, quæ nihil aliud est quàm satiuæ, vt Matthiolus censet, cultorum diligentia & arte in tantam magnitudinem assurgens, quod Theophrasti auctoritate probat. Quædam cultū diuersa efficiuntur, & à natura sua discedunt, vt malua in altum accrescens, & arborescens.

Lib. 19. c. 4.

Quod non longo fit tempore, sed senis aut septenis mensibus, vt longitudine crassitudinēque hastam æquet: quare baculi vsum præbet, tempore verò longiore maius quoque proportionē fit incrementum. Plinius eadem fere prodidit. Tradunt auctores, in Arabia maluas septimo mense arborescere, baculi vsum præbere

*MALVA siluestris
Pumila, repens.*

extemplò. Sed & arbor est malua in Mauritania Lixi oppidi æstuario, vbi Hesperidū horti fuisse produntur CC. pass. ab oceano, iuxta delubrum Herculis antiquius Gaditano, vt ferūt. Ipsa altitudinis pedum XX. crassitudinis quam circumplecti nemo possit. At contra Pena maluæ siluestri euenire putat quod filici, sedo, arundini, atque aliis, vt etiam non cultæ arboream proceritatem, durationem & ramorum magnitudinem assequantur, asseritq; se in Cœnobio D. Spiritus prope Venetias, & aliis locis maritimis Thyrrhenæ oræ vidisse sponte adultas. Perficam arbusculam æquantes altitudine & crassitie stipitis, qui ramis sparsis, frondis læuore, virore, imo toto flore, semine, & facie maluam testabantur, sed crassiore totam & habitiorē, qualem Gallobelgiæ, Angliæ, & Germaniæ horti hodie colunt, quadriennium & quinquennium edurantem, lignosiore prægrandi radice, & solido trunco, duritie lignea, senūm & octonūm cubitorum, facultate non diuersa à malua vulgari, sine vlla olitorum industria, vt solo natiuo duntaxat deberi hanc differentiam ex natali

MALVA silvestris
maior.

secus folia fert paruos, quinquefolios, alteri silvestri maluæ similes, minores tamen, in candido rubentes, quibus exigua succedunt semina, in orbem disposita, radice nititur longa, neruosa, candida. Tota planta glutinosum humorem emittit. Nascitur circa hortos, pagos, & rudera.

MALVA Rosea simpliciore
flore, Lobellij.

natalibus perspicuum sit.

Malua silvestris maior seu altior rectū erigit caulem, sesquicubitalē, minimi digiti crassitudine teretem, raris pilis hirsutum, statim à terra in ramos diuisum, folia habet longis pediculis insidentia, multum laciniata, serrata, fusciore, minora & læuiora satiuarum foliis, flores æstate fert secus ramos & folia, satiuarum floribus, qui simplici sunt textura aut rosis siluestribus similes, quinquefolios, & in rufo candicantes, quibus in orbem disposita succedunt semina. Radice nititur pedali aut longiore, digiti crassitudine, candida, & in partes distracta. Tota herba dulci est gustu & glutinosa. Nascitur in aggeribus, hortorum areis, & circa rudera. Malua silvestris minor seu pumila, quam supinam vocat Cordus, repentem Lobellius, caules per terram spargit cubitales, teretes, virides & solidos, in quibus folia sunt in longis pediculis, minora, & non vt in superiore laciniata, sed rotunda, preterquam quod ab vna parte in profundum sinum recedunt usque ad pediculi adnexum, in ambitu serrata, pinguis, flores

Lib. 2. plā.
cap. 97.

males Roseæ, à floris Rosei elegantia & similitudine dicta, partim althææ, partem maluis cognata: etenim foliorum & cauliculorum incana superficie, molliore, mucrosa que radice althæam referunt, ambitu verò maluaceo, & caule arborescentem maluam plene assequuntur, sed althææ positu & modo oriuntur, quotannis etiam pereunt, radice denuo primo verè sese propagante, culmósque edente ternū & quaternū cubitorum. in quibus serotini prodeunt flores, videlicet Augusto, magnitudine, effigie, elegantia rosam prouocantes, interdum simpliciores, interdum multiplices & conferta foliolorum struili serie constantes, triplicis in hortis septentrionalibus varietatis: sæpe puniceo colore saturato, aliquando candido, interdum dilute rubente, aut vtrisque confusis. Semen althææ similis, sed maius. Hæc ex Pena. Malua hortensis Iulio & Augusto mensibus floret: neque enim flos is vt in rosa fugax est, sed diu vigor vitæque durat. Silvestris pumila per totam æstatem, & in maximam autumnii partem durat. Arborescens Iunio & Iulio mensibus floribus

Locus.
Tempus.

MALVA Rosea multiplex, Lobellij.

Lib. 2. c. III.
Vires &
Temper.

Lib. 2. Ali.

Lib. 7. sim.

Lib. 20. c. 21

bus quàm maximè abundat. Antiqui maluis cæterorum olerum modo vescebantur, subducendæ alui gratia. Vnde Martialis.

*Exoneraturas ventrem mihi villica maluas
Attulit, & varias quas habet hortus opes. Et
Vescere lactucis, & mollibus utere maluis,
Nam faciem durum phæbe cacantis habes.*

Quare scripsit Dioscorides, Malua satiua esui longe aptior est siluestri, stomacho aduersatur, aluum iuuat, sed multò magis caules: interaneis & vesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata ægilopas ex melle sanant, verùm cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salem vtendum est. Contra aculeatos apum vesparumque ictus illita efficax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti non feriuntur: vlcera manantia in capite, furfurèsque cum vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia tritaque vtilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas infensione mollit: prodest erosionibus vesicæ, & intestinorum, vuluæ, sedisq; clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua contra omnia venena auxiliatur, si continuò à

bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morsus remedio est. Lac euocat. Semen in vino potum, addito loti siluestris semine vesicæ cruciatus lenit. De hac perspicuè differit Galenus his verbis. Quemadmodum *γερσαλιν*, quæ lactuca agrestis est, ab hortensi, ita malua agrestis à satiua differt. Plantæ enim congeneres eò inter se dissident, quòd agrestis quidem siccitate, satiua verò humiditate superat. Porro succo maluæ lentor quidam inest, quod lactucæ non inest, à refrigerandòque abest perspicuè. Id quod etiam antequam edas intelliges, si vtrumque olus vicissim calido alicui affectui, vt erysipelati cataplasmatibus modo applicueris, quod etiam vulgò faciunt, tenera folia diligenter ad exactum leuorem conterentes. Senties enim in hoc cataplasmate lactucam quidem manifestè refrigerare: maluam autem calorem quendam habere moderatū ac tepidum. Cæterum hoc olus facile subducitur, non modò propter humiditatem, verùm etiam propter lentorem, & potissimùm quando quis cum oleo & garo copiosam ipsam sumpserit. Nutrit autem & ipsa mediocriter. Et rursus. Malua agrestis digerentis paululum & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis quantò plus habet aquæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est, fructus eius tanto validior est, quāto & siccior. Porro, huius generis est quæ dendromalache nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo. Plinius diffusius virtutes maluarum explicat. In magnis laudibus malua est vtraque, inquit, & satiua & siluestris. Omne solum in quo feruntur pinguius faciunt. Huic contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, præcipuè scorpionum, vesparum, similiūque, & muris aranei. Quin & trita cum oleo qualibet earum peruncti ante, & habentes eas non feriuntur, folium impostum scorpionibus torporem adfert. Valent & contra venena. Aculeos omnes extrahunt illitæ crudæ cum nitro, potæ verò decoctæ cum radice sua leporis marini venena restinguunt, & vt quidā dicunt, si vomatur. De iisdem mira & alia traduntur. Sed maximè si quotidie quis succi ex qualibet earum sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturum. Vlcers manantia in capite sanant cum vrina putrefactæ,

putrefactæ, lichenas & vlcera oris cum melle. Radix decocta furfures capitis & dentium mobilitates. Eius quæ vnum caulem habet radice circa dentem qui doleat punge, donec desinat dolor. Eadem strumas & parotidas panôsque, addita hominis saliuâ purgat citra vulnus. Semen in vino nigro potum à pituita & nausæis liberat. Radix mammarum vitiis occurrit, adalligata in lana nigra. Tussim in lacte cocta, & sorbitionis modo sumpta, quin diebus emendat. Stomacho inutiles Sextius niger dicit. Olimpias Thebana abortiuas esse cum adipe anseris. Alij purgari fœminas foliis earum manus plenæ mensura, in oleo & vino sumptis. Vtique constat parturientes foliis substratis celerius solui, protinus à partu reuocandum ne vulua sequatur. Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina. Quin & semen tritum adalligant brachio, genitale non continentium. Adeoque eæ veneri nascuntur, vt semen vnicaulis aspersum genitali fœminarum auiditates augere ad infinitum Xenocrates tradat. Item tres radices iuxta adalligatas Tenesimo & dysentericis vtilissimè infundi. Item sedis vitiis, vel si foueatur. Melancholicis quoque succus datur cyathis ternis tepidus, & insanientibus quaternis. Decoctæ comitialibus hemina succi. Hic & calculosis, & inflatione, & torminibus, aut opisthotonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacris ignibus, & ambustis decocta in oleum folia imponuntur: & ad vulnenum impetus cruda cum pane. Succus decoctæ neruis prodest, & vesicæ, & intestinorum rosionibus. Vuluas & cibo & infusione emollit in oleo: succus decoctæ pori meatus suaues facit. Scribit Symeon Sethi, maluam ventriculum facile subire, non solum propter humiditatem, verum etiam propter lentorem, atque imprimis si cum oleo & garo offeratur, vino quo editur tempore irrorata. Vesicam, thoracem, pulmonemque iuuare, & raucam vocem lenire. Siluestris malua, vt ferunt, comesta dolores ex vesparum ictu tollit. Si quis morsus à vespis aut apibus, succo maluæ præsertim siluestris perungitur, confestim dolore leuatur. Dicitur etiam huius decoctum potum lapides conterere, somnum conciliare, facilemque partum præstare, si mulier ea crebrius vtatur. Illita inflammationes lenit, & quæ indurata sunt mollit. Illud maluæ peculiare est, vt vesparum & apum ictibus imposita, dolores leuet. Maluæ radix sicca, inquit Matthiolus, die vno in aqua macerata, deinde madida papyro circumuoluta, & sub feruente cinere decocta, rursusque siccata, vtiliter vsurpatur ad dentifricia: dentes enim affricata expurgat, & gypseam materiam exterit, foliorum & radicum decoctum gargarizatu exasperatas fauces lenit, muccago verò acrimonias emendat, feruescentia folia in cibum apposita raucedines expediunt, ex oleo, sale, & recente butyro aluum citant, fit è foliis cum salinis frondibus tritis præstantissimum emplastrum ad vulnenum, & quascumque alias inflammationes: valent eadem cum porris & cepis illita ad serpentium venenosorum morsus. Succus auribus instillatus dolorem sedat. Decocta vnâ cum radice ad lentorem vsque datur potanda ægrè parturientibus magno eorum commodo. Id quod præstat succus selibræ pondere haustus. Semen ex vino nigro potum nauscam tollit. Cauliculi molles cocti ex aceto eduntur oleo & sale, asparagorum modo prima statim mensa, ad ciendam aluum. Datur succus vtiliter, melancholicis sex vnciarum, insanientibus octo pondere, hauriendus. Denique malua ad plurima utilis est, vt non immerito eam antiqui omnium orbicem appellauerint.

ALTHAEA.

CAP.

XXII.



QVÆ Græcis ἀλθαία, Latine simpliciter Medica dici posset: sic enim nominata est διὰ τὸ πολυαλθές καὶ πολύχρηστον αὐτῆς auctore Dioscoride, id est, quod inter primas sit utilis, & plurimis polleat remediis, ab ἀλθαίνειν quod mederi significat. Dicitur & ἰβίσκος, & ἰβίσκος. Latine Althæa, Ibiscus seu Ebiscus, & ab excellētia effectus à quibusdam Aristalthæa,

In libr. 2.
Diosc. cap.
III.

Nomina
Lib. 3. cap.
146.

Lib. 20. c. 21

Lib. 9. hist. inquit Plinius, à Theophrasto etiam *μαλάχη ἀγρία*, id est, malua siluestris: est enim, cap. 15. ut ait Dioscorides, in siluestrium maluarum genere. Et Plinius, è siluestribus, cui Ibid. Lib. 1. plan. grandefolium, & radices albae, althæa vocatur. A Cordo malua palustris appellatur, Arabice *Chitini*, *Chatini*, *Chathinie*, & Rosa *Zameni*, vulgò maluauiſcus nominatur, nomine ex malua & ibisco cōposito, ab Italis *Maluauiſco*, Officinis Bismalua, Lib. 9. hist. Germanis *Ibisch*, & *Heyluurtz*, à Gallis *Guimaue*, quod glutinosa sit malua. Theophrastus althææ species duas constituere videtur: sic enim ille. Habet althæa fo- cap. 19. lium maluæ, sed maius & hirsutius, caules molles, flores luteos, fructum veluti mal- Genera. uæ, radicem neruosa & albam, gustum quoque caulium maluæ. Vſus ad rupta & tusses in vino dulci, & ad vlcera in oleo. Aliam quamdam si cum carnibus co- quas, in idem coniungere, & has quidem agglutinare, alias attrahere, lapidis ma- gnetis modo & succini. De priore, cui luteos flores tribuit Theophrastus, mox di- cemus, nūc de vulgari. Althææ, inquit Dioſco- rides, folia vt cyclamino rotunda, lanugine ca- nescunt: flore rosaceo: bicubitali caule, radice lenta, intus alba. Sed totam sigillatim depinga- mus. Althæa caules emittit plerūmque bicubi- tales, rectos, minimi digiti crassitudine, rotun- dos, lanuginosos & solidos, foliis ex interuallis vsque ad summitatem vestitos, & longo petio- lo dependentibus, ex rotundo in angulum exeuntibus, in ambitu serratis, tres quatuorve digi- tos latis, tactu mollibus, breui, densa, & ve- luti detonsa lanugine holoserico-similibus: flo- res in summis caulibus profert maluæ siluestris, aut rosarum siluestrium figura, paulo minores tamen, in candido rubescens, quinque folio- lis constantes, in quorū medio paruum est nu- camentum rubescens, semen habet latum, par- uum in orbem centro cuidam circumpositum, quod cortice detracto nigricat. Radicibus ni- titur diuturnis, ab vno trunco exortis, cubitali- bus, digiti crassitudine, foris subpallidis, intus cādidis, neruosis, lentis, glutinosis, & dulcibus. Nascitur locis vliginosis & pinguibus, humēti-

Lib. 3. c. 146
Forma.

ALTHÆA Matthioli.



Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 146

Vires &

Temper.

bus, & palustribus pratis, & in fossis. Floret Iulio & Augusto mensibus maluarum siluestrium more. Multiplicem eius in medendo vsum ac vtilitatem declarat Dioſcorides his verbis. Decocta in vino aut aqua mulsā, aut per se pota efficax est contra vulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflamma- tiones, contusiones sedis, inflationes, neruorum rigores, siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta, vt dictū est, adiecto suillo adi- pe, aut anserino, terebinthināve, vt malagmatis lentor fiat, facit ad vuluæ inflam- mationes, præclusionēque in pēsis subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera vuluæ, reliquiasque à partu extrahit. Decoctæ succus ex vino potus succur- rit vrinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremu- lis, ruptis, (quæ cum Græcè legantur, τὸ ὅ τῆς εἰς τὴν ἀφ' ἧς οὐδ' οἶνον πινόμενον ὠφελεῖ δι' ὀσφουῶτας, λιθιόνων ὀμότητας, &c. sic vertenda censet Andr. Lacu. Radicis autem decoctum potum ex vino difficultati vrinæ auxiliatur, acerbissimisq; doloribus à lapillo excitatis. ὀμότης enim, vt ait, non solum significat cruditatem, sed acerbita- tem etiam summam, atque acrimoniam doloris. Cui conuersioni consentit, in- quit,

quit, rerum usus atque experientia: quippe contra dolores illos acerrimos, inementissimosque, quos excitare calculi solent, decoctum radicum althææ maximo successu propinamus: licet pluribus diebus id potum, non solum non conferat coctioni quæ in ventriculo fit, sed etiam eam vitiet & labefactet, id quod liquidò constat, tum ex nausea graui quam gignit, tum vel maximè ex ructibus fastidientibus quos excitat. Dalechamp. Lacunæ interpretationem improbat, & λιθίωντων ὀμβτητας interpretatur pituitosos, crudos, lentos humores meiando exeuntes, & grauissimos cruciatus excitantes inter meiendum, qui certissimo indicio calculum vesicæ, renūve, sed vesicæ magis significant, nunc præcedentes, nunc comitantes, nunc subsequentes.) Dentium mulcet dolorem cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccūmq; tritum vitilignes in sole cum aceto perunctas emendat (in vulgari quidem codice legitur, *ἡ χλωρὰ σὺν ὀξεί*, id est, inunctū cum aceto, in vetere autem *σὺν ὀξεί ἢ ἐλαίῳ*, id est, ex aceto & oleo.) Eodem cum aceto & oleo peruncti à venenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam, & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. In posca aut vino decoctum bibitur contra omnes vesparum, apū, similiūmq; aculeatos ictus, folia cum olei momento, morsibus & igni ambustis illinuntur. Constat aquam trita radice addita addensari. Quæ postrema Græcè sic habentur. *πηγνυσι ὃ ἡ ῥίζα* (in vetere codice additur *χλωρὰ*, id est, viridis) *καὶ ὕδωρ, μηχανεῖσα λεῖα, καὶ συνεξαίθριασθεῖσα*. Id est, radix viridis tusa, & aqua permixta, & simul tota nocte sub dio relictæ, cōdensat illam. Theophrastus ex quo hæc mutuatus est Dioscorides, vocem *χλωρὰ* non habet: sic enim ille. *πηγνύαι ὃ καὶ τὴν τῆς ἀλθαίας ῥίζαν τὸ ὕδωρ, εἰάν τις τεύξας ἐμβάλλῃ καὶ θῇ ὑποαίθριον*. Id est, Radicem althææ aquam densare aiunt, si quis tritam iniecerit, & sub dio reliquerit. Plinius maluarum usum medicum (de quo iam diximus) fusiùs persecutus, tandem addit, Althææ in omnibus supradictis efficacior radix, præcipuè conuulsis ruptisq; Cocta in aqua aluum sistit. Ex vino albo strumas & parotidas, & mammarum inflammationes tollit. Panos illita. Eadem arida in lacte decocta, quolibet perniciosæ tussi medentur. Hippocrates vulneratis, sitientibusque defectu sanguinis radicis decoctæ succum bibendam dedit: & ipsam vulneribus cum melle & resina, item contusis, luxatis, tumentibus, & musculis, neruis, articulis imposuit: & asthmaticis ac dysentericis in vino bibendam dedit. Mirum aquam radice ea addita addensari sub dio, atque lactescere. Efficacior autem quò recentior. Hæc Plinius, quorum quædam etiam Dioscorides habet. Verum quod aquam radice althææ addensari atque lactescere dixit, id iam ex Dioscoride atque Theophrasto protulimus, ut ex iis non immeritò dubitet Cornarius, an lactescere rectè in Plinio legatur, & non potius lentescere, aut coalescere. Idem Plinius qui illa de althæa prodidit, seorsum aliquot locis de ibisco, ut ab althæa diuerso scripsit. Hibiscum, inquit, à pastinaca gracilitate distat, damnatum in cibis, sed medicinæ vtile. Et, Pastinacæ simile hibiscum, quod molochen agriam vocant, & aliqui pistolochiam, vlcerebus cartilaginis, & ossibus fractis medetur, folia eius ex aqua pota aluum soluunt, serpentes abigunt. Apum, vesparum, crabronum ictibus, illita medentur. Et mox, Celsus & podagris, quæ sine tumore sunt, radicem eius ex vino decoctā imponi iubet. Et, Medetur lichenibus hibisci radix cum glutino & aceto acri decocta ad quartas. Quæ in re Plinio apertè refragatur Dioscorides & Galenus, cæteri q; Græci, qui althæam ibiscum, siue ebiscum vocauerunt. Sic enim Galenus. Ebiscus siue althæa, est autem malua agrestis, facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, concoquendi difficiles coctu abscessus. Radix porro eius & semen cætera quidem pari foliis modo agunt, verum tenuiorum partium, magisq; exsiccatariam, adhæc magis exterforiam facultatem ostendunt, ut & vitilignes detergant, & semen renum calculos confringat. At radicis decoctum ad dysenteriam,

Lib. 9 hist.
cap. 19.
Lib. 20 c. 21

Embl. 147.
lib. 3, Diosc.

Lib. 19. c. 5.
Lib. 20. c. 4.


Lib. 26. c. 4.

Lib. 6. sim.

Lib. 7. sim.

Lib. 5. c. 25
Lib. 9. hist.
cap. 19.

diarrhoeam, & sanguinis reiectionem aptū est, nempe cum adstringentem quandam facultatem habeat. Et de maluis agens. Huius generis est & ea quæ dendromalache nominatur: sed efficacissima prædictarum in digerēdo, appellatur etiam althæa. Dodonæus plantam secundo loco depictam althæam, seu ibiscum Theophrasti esse arbitratur, & Abutilon Auicennæ, foliis rotundis in exortu, sed in extremo acutioribus, candidis, tactu mollibus, & ferè lanuginosis, vt & prioris althææ, sed multo maioribus, & forma ferè magnitudinēque cucurbitæ foliis similibus: caulibus longis, crassis, validis, in quibus nascuntur flores lutei, deinde caliculi pilosi, membranei, in quibus semen paruum, nigricans: radix maluacea. Eandem pro Ibisco vel Althæa Theophr. descripsit Penna, pinxit Lobellius. Matthiolus eadem ostendit. Sed neque Althæam alteram Theophrasti neque Auicennæ Abutilon esse arbitratur, nullam ratione aliorum opinionem refellens: sed solum neutri respondere dicens. Non tamen prætermittenda est, inquit, eius herbæ cognitio, vt eius quoque omnibus cognita sit facultas. Nam experientia constat eius semine epoto sesquidrachmæ pondere ex vino, calculos in renibus frangi, educiq; vrinas eiici, doloresque finire: id quod tamen de abutilon Auicenna nō prodidit. Abutilon, inquit, est planta similis cucurbitæ. Dicitur recentibus vulneribus maximè prodesse, eaq; statim conglutinare. Aliam etiam hic althæam ex Dalechamptio depinxi-

ALTHÆA Theophr. sti.In lib. 3.
Diosc. cap.
146.

tremo acutioribus, candidis, tactu mollibus, & ferè lanuginosis, vt & prioris althææ, sed multo maioribus, & forma ferè magnitudinēque cucurbitæ foliis similibus: caulibus longis, crassis, validis, in quibus nascuntur flores lutei, deinde caliculi pilosi, membranei, in quibus semen paruum, nigricans: radix maluacea. Eandem pro Ibisco vel Althæa Theophr. descripsit Penna, pinxit Lobellius. Matthiolus eadem ostendit. Sed neque Althæam alteram Theophrasti neque Auicennæ Abutilon esse arbitratur, nullam ratione aliorum opinionem refellens: sed solum neutri respondere dicens. Non tamen prætermittenda est, inquit, eius herbæ cognitio, vt eius quoque omnibus cognita sit facultas. Nam experientia constat eius semine epoto sesquidrachmæ pondere ex vino, calculos in renibus frangi, educiq; vrinas eiici, doloresque finire: id quod tamen de abutilon Auicenna nō prodidit. Abutilon, inquit, est planta similis cucurbitæ. Dicitur recentibus vulneribus maximè prodesse, eaq; statim conglutinare. Aliam etiam hic althæam ex Dalechamptio depinxi-

ALTHÆA altera, Matth.*ALTHÆA Lignosa, Dalech.*

mus, quam lignosam & arboream vocant, propter arboream soliditatem. Radices plurimas habet, densas, crassas, caudicem non minus crassum, quàm est nostri corporis truncus, homine proceriorem, ramosum, cortice è rufo purpurascente, foliis althææ, magnis interuallis per ramos nascentibus: flore etiam althææ, grandi, candido. Nasquitur propè Miramuallem Monspelienſis agri vicum, in confragoſo saxo, cui Anachoritæ domuncula imposita est. Hæc eadem esse videtur, quæ Clusio Althæa frutex, Penæ & Lobellio Althæa arborea siue Arboreſcēs dicitur, & paucioribus locis & feruidiore cœlo (quale in maritimis Gallicæ Prouinciæ ad Olbiam) prouentu tanto fruticat, vt ad ſepes constituendas ſatis ſit. Multo ſolidiore ſcapo eſt quàm Malua arborea, ſalignæ quaſi concretionis, & in arboream formam verſo, ſlos maluæ vulgaris aut althææ, nec diſpar ſemen. Eſt & Althæa paluſtris, de qua dicemus in libro de Paluſteribus.

ALCEA.

CAP. XXXIII.

Aλεία Græcè, ita Alcea Latinè dicitur, Officinis ferè incognita, Italicè *Nomina* *Bismalua*, & *Malua ſaluatica*, & *Buon viſchio*, Germanis *Sigmars*, *Kraut*, Hiſpanicè *Malua de Vngria*, & *Malua montefina*, Gallicè *Guimaune ſauuage*. Vulgares herbarij & Empirici Symeonis herbam appellant. Alcea maluæ ſilueſtris ſpecies eſt, folia tamen habet magis ſiſſa, & profundius inciſa, & in plures partes diuiſa, verbenacæ ferè ſimilia, ſed multò minora: *Forma.* caules rotundos, rectos, bipedales aut maiores: flores figura maluis aliis ſimiles, purpureos, aut dilutiùs rubeſcentes: ſemen item ſimile, eodémque modo tunicatum: radicem craſſam, bipedalem, & eo maiorem, intus candidam. Hæc eſt eius icon ex Matthiolo. Eadem videtur eſſe quæ Alcea fruticoſa Penæ & Lobellij, Cannabiſ ſilueſtris Dioſcoridis, quibuſdam. Prolixioribus magiſque vimineis ſurculis fruticat, foliorum diuiſura altiore quinary, & crenulis exiguis. Pentaphyllum rubrum, ſiue Cannabim æmulatur: ſlos purpurascit. Eſt quibuſdam Cannabiſ ſilueſtris. Quare aliam Alceam vulgarem Pena & Lobellius proponunt, figura, ortu, cauli-

ALCEA Matth.

ALCEA vulgaris, Lobellij.



culis similem Maluæ, sed foliis altius incis, quinque partitis, qualia sunt Maluæ vetustiori pusillæ, aut Geranio: flore copioso, maluæ semine orbiculato compresso, fide item Maluæ: radice etiam prorsum Maluæ, minus mucosa. Et calidis & Septentrionalibus regionibus familiaris est. Dioscorides breuiter sic descripsit, Alcea siluestrium maluarum generi assignatur, folia habens densa, verbenacæ

Lib. 3. c. 147

ALCEA Veneta, Dodon.

Lib. 27. c. 4.

Locus.

Tempus.

Vires.

Temper.

Ibid.

Lib. 27. c. 4.

Lib. 26. c. 12

Ibid.

Lib. 26. c. 8.



Lib. 7.

*ALCEA villosa, Dalecham.*Fuch. in hi
stor. plant.
cap. 27.Dodo. lib.
5. cap. 7.Cordusin
obser.

proxima: caules tres aut quatuor, cortice cānabino vestita: florem rosæ paruum: radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ Plinius ex Dioscoride ferè transcripsisse videtur. Alcea, inquit, folia habet similia verbenacæ, quæ & peristereon cognominatur, caules tres aut quatuor, foliorum plenos, florem rosæ, radices albas, cum plurimum sex, cubitales, obliquas. Nascitur in pingui solo, nec sicco. Hæc Plinius. Nascitur & in incultis, campis, & agrorum, scrobiumque marginibus, iuxta sepes & vias, floret Iulio & Augusto mensibus cum malua siluestri. Radices cum vino aut aqua potæ, inquit Dioscorides, dysentericis ruptisq; medentur. Plinius, Vfus radice ex vino vel aqua dysentericis, aluo citè, ruptis, cōuulsis. Et, Alceæ radix collectiones discutit. Et paullo post, Spaticis, tremulis, opisthotonicis alceæ radix bibitur ex aqua mulsa. Sic & rigores excalfacit. Et, Alceæ siccæ farina torminibus pota cum vino resistit. Galenus Alceam in simplicium catalogo prætermisit. Paulus ex Dioscoride, Alceam silvestris maluæ speciem esse dixit, quæ cum vino pota dysenterias & rosiones sanat, & magis ipsius radix. In hoc tamen Paulus à Dioscoride & Plinio dissidet, quod *ῥοσῖες*, id est, rosiones, habet pro his quæ *ῥήγες*, id est, rupta, Dioscorides & Plinius appellauerunt, ut fortasse *ῥήγες* in Paulo, pro *ῥοσῖες* legere oporteat. Ex emplasticorum medicamentorum numero esse alceam, & folia quæ glutinosum quid ac lentum habent, etiā radix ipsa quæ glutinosa, dulcis, & modicè adstringens apparet gustantibus, abinde monstrant. Hinc satis constat alceam citra insignem tum caliditatem, tum frigiditatem siccare, ac planè emplasticorum consistentiam obtinere. Celebratur ad caliginem oculorum ab Empiricis, ita ut non desint qui credant radicem alceæ è collo suspensam aciem oculorum supramodum acueri, & tueri posse. Est herbariorum sententia Alceæ species hic depicta, quæ adfertur ex Italia, & ab iis Alcea Veneta nuncupatur, Gallicè *Guimaue de Venise*. Pena tamen ait se nuspiam in Italia ne dum Venetiis vidisse nisi in hortis, multoque maiorem

maiores eius copiam Septentrionales herbarios habere quam Italos. Quare ille & Lobellius Alceam peregrinam solisequam vocant. Tragus Alceā Venetā. Dodonæus in Histo. Purgant. Alceam vesicariam, Matthiolus perperam Hypeconum. Cauleni profert teretem, mollem, ramosum, aculeis hispidum: folia obscurius virentia, carnosa, fissa, & profundius incisa, foliis Alceæ superioris haud multū ab his similia, minora. Flores in summis caulibus emergunt, florum maluarum omnium speciosissimi, sed ferè similes, quinque foliis constantes, foris candidi, vel pallidi, in medio purpurei, ex quo apex pistilli forma lutei, siue aurei coloris emicat; tribus, quatuorve horis ab exortu solis sese aperientes, meridie horā vnam hiantes, deinde sese contrahentes. his succedunt vesiculæ, in quibus capitula rotunda, hirsuta, quibus semen nigrum includitur. Radix parua est, & tenera. Hæc Alcea non nisi herbariorum diligentia & cultu in hortis nostris prouenit. Martio aut Aprili mense feritur, Iunio, & Iulio floret. Huc spectat perelegans & noua planta à Lobellio depicta ex cultissimo horto D. Brancionis, quam quidam Sabdariffam vocant. Caule est singulari, alis donato, quinos & senos cubitos alto, cui insidēt flores Alceæ peregrinæ similes & eiusdem fere coloris, ex lutoecinereo obsoleti, sed maiores, alio sanguineo medium cingente. Eius folia maluam adultam prorsus æmulantur, sapor prorsus oxalidis. Hæc ex Lobellio. Ob similitudinē hanc quoque Alceam nuncupauit Dalechampius, quæ radice est palmum longa, è ruffo candicante, paucis fibris capillata, caulibus multis, densissima lanugine hirsutis: quamobrem Alcea villosa nominata est, palmo non altioribus: folio per ambitum valde crenato, in tria diuiso, lanugine quoque spissa tecto: flore puniceo, amplo, specioso, tracheliorū florem magnitudine penè superante: fructu nigro, placetæ simili,

Locus.

Forma.

SABDARIFFA, Lobellij.



SABDARIFFA Alia.



perinde ac maluæ vulgaris, intra folliculū clauso, densis ac subasperis pilis hirtū, & vndique fructum occultentem, vt in halicacabo. In radicibus Iuræ montis nascitur. Floret Majo mense. Fructus Iunio maturescit. Sabdariffa alia ad me missa fuit, quam tibi tradere volui, quoniam siliquata est, & ab alia quodāmodo diuersa.

Locus.

Tempus.

Nomina
Li.8.simpl.

Genera

Li.3. c.109.

Lib.7. hist.
ca.14.

Lib.9. hist.
c.12. & 15.
Lib.27. c.13.
Cap.8.

Lib.21. c.31.

In Hort.
Germ.

Li.4. Diof.
ca.68.

Forma



*S*olūnos, & præposito σ, *σολύνος*, inquit Galenus, Latinis Solanum nominatur, Officinis Solatrum, vulgò Cuculus, Vua lupina, Vua vulpis. Arabibus *Hameb alhomaleb*, *Hameb alchaich*, siue *Hanab althaleb*, Gallis *Morelle*, quod hortense est, Italis *Solatro hortolano*, Germanis *Nachtschadt*, Hispanis *Yerua mora*. Quatuor Dioscoride & Galeno auctoribus Solani sunt genera. Primum *σολύνος κυπαϊός*, Solanum hortense, quod olim in hortis cum aliis oleribus, quæ edendo sunt seminabatur. Hodie sua sponte, & inuitis cultoribus prouenit. Nigrum alio nomine à nigris foliis, aut à fructu in extrema maturitate nigro appellatur. Secundum *σολύνος ἀλιχαχιδός*, Solanum halicacabū, & *φουσαλīs*, idest, vesicaria à folliculis quos producit, vesicarum in animantibus speciem imitantibus, non quod vesicæ calculis medeatur. Officinæ Arabes secutæ corrupto halicacabi nomine *Achachengi* apellant, Itali *Halicacabo*, Germani *Indenkirschen*, Hispani *Bexigo de perro*, Galli *Alquaquenge*, Coqueret rura nostra vocant, ait Ruellius. Tertium *σολύνος ὑπνωϊκός*, Solanum somniferum, ab effectu scilicet. Sunt qui Solatrum dormitorium, & marinum dicant, quod in rupibus nō longè à mari inueniatur. Gallicè *Solane dormitif*, Italicè *Solatro somnifero*. Quartum *σολύνος μανικός*, Solanum furiosum, Officinis Solatrum mortale, Gallicè *Solane furieux*. Theophrastus tria genera facit cum scribit, ὁ μὲν δὲ ἐδωδιμος *σολύνος*, καὶ ὡς περ ἡμερον κάρπον ἔχων *ραγώδη*. ἕτεροι δὲ δύο εἶσιν, ὧν ὁ μὲν ὑπνον, ὁ δὲ μανίαν ἐμποιεῖν δυνάται. Idest, est Solanum edule, & fructū veluti mitem & acinosum ferens. Sunt alia duo, quorum alterum somnum, alterum insaniam adfert. Aliquanto post duo duntaxat genera statuit. τῶν δὲ *σολύνων* ὁ μὲν ὑπνωϊκός, ὁ δὲ μανικός. Solanum aliud somniferū, aliud furiosum. Plinius quatuor ponit genera. Solanum Græci strychnum vocant. Dixit autem suprā cucubali folia trita cum aceto, serpentium ictibus, & scorpionum mederi. Quidam hanc alio nomine strumum appellant, alij Græcè strychnum, &c. Quæ nomina sunt etiam inter supposititia apud Dioscoridem. Idem alio in loco strychni historiā Fuchsius persequitur. Strychno, quam quidā trychnum scripsere, vtinam nec coronarij in Ægypto vterentur (Dioscoride solo halicacabi fructu coronarij vtuntur, quod & hodie per hyemē in Gallia fit, non autem hortensis vtriuslibet folio, flore fructu) quos inuitat hederæ florum similitudo, (Lege ederæ fructum similitudo in duobus eius generibus. Præter illa tertiū cui acini, &c.) in duobus eius generibus. Quorum alterum cui acini coccinei, granosi folliculi, halicacabum vocant, alij callion. Nostri autem vesicariam, quoniā vesicæ & calculis profit, &c. (Halicacabum veteres vesicariam non dixere quod vesicæ & calculis profit, sed vt demonstrat vox Græca *φουσαλīs*, quod fructus folliculo tanquam vesica includatur vt diximus.) Tertiō folia sunt ocimi (ἐυζώμης Dioscorides habet, id est Eruca) minimè diligenter demonstranda remedia non venena tractanti: quippe insaniam facit paruo quoque succo, &c. Quin & alterū genus quod Halicacabum vocant, soporiferum est, &c. Gesnerus Solanorum genera permulta esse scribit præter illa quatuor à Dioscoride & aliis memorata. Omnibus sunt acini, inquit, iiq; seminibus albis pleni. Pleraque aliquam in foliis & floribus similitudinem habent, odore graui, vi refrigerante prædita. Matthiolum quoque experientia sese comperisse ait plura ac varia Solanorum esse genera. Solanum vulgare, quondam hortense, quia serebatur cibi gratia, nunc in cibis illud vitamus, frutex est pusillus, multis concauis alis: caulibus rotundis, pedali- bus, furculosis: foliis nigricantibus, tactu mollibus, succosis, ocimo sumilibus, sed latioribus, & multò maioribus, per ambitum incisus, in mucronem desinentibus. Flores tota æstate ex mediis alis profert paruos in singulis pediculis ternos, qua-

ternos,

SOLANVM Hortense.



ternos, quinos, aut senos, qui quinis exiguis, oblongis, acuminatis, & cādidis foliolis, instar radiorum stellæ dispositis constant, in quorum medio lutei minimiq; apices in vnū coniuncti eminent. Floribus singuli succedunt acini, rotundi, magnitudine pisi, substantia molles, primum virides, post maturitatē nigri, intus subviridi glutinosq; succo, atque paruis flauescētib; compressisq; seminibus pleni ab, vno pediculo instar corymbi, aut parui racemi dependentes, in terram spectātes. Radice nititur longa, fibrata, candida. Sapore folia sunt aqueo, simulq; adstringente, acini vero glutinosi, & aliquantulum, vinosi. Odorem spirat herba grauē & foetidum. Cordus huius Solani speciem alteram facit Solanum puniceum, acinorum colore ferē solummodo distans: nam ramulis, foliis, floribus acinorum figura & quantitate, radice, sapore, odore & natalibus superiori Solano simile est, differt tantum, quod paulo asperioribus constet ramulis, acinosque in croceo colore puniceos producat, qui etiam ante maturitatem virent. Id Solanum rubrum appellat Gesnerus, cui & luteū aliud addit, cui lutei sunt acini. Eadem cum vulgari, cui acinos nigros esse diximus, nisi colore acinorum differrent. Solanum halicacabum seu vesicaria, caules habet graciles, lentos, qui postquam adoleuerunt proni terrā spectant, in quibus folia Solano hortēsi similia sunt, sed minora, latiora, fir- miora, subasperaque, nec vt in illo nigricantia. Flores pallidi, maiores, & minus albi quā in Solano hortensi, ex quibus folliculi oriū- tur, vesiculis similes, iugladium magnitudine, & quandoque maiores, turbinata figura, ex octonis costis aequaliter à sese distantibus cō- pacti, qui recentes virides sunt, maturi rufes- cunt, baccis intus vinosis, quæ ima folliculi parte inhaerent, rubris vuæ acinis similes, sa- pore austero simul & amaro, ac numeroso, mi- nutoq; intus semine albicante, aut flauescēte, rotūdo, læui. Coronarij fertis apud nos acinos & vesiculas intorquent, vt pulchritudine coc- cinei grani, & folliculi punicei venustate co- rollas commendent. Alterum vesicariæ ge- nus à Fuchsio & Dodonæo descriptum est, peregrinum vocant, cuius etiam meminit Matthiolus, Vesicariæ repentis nomine. Alij Pisum cordatum, alij Cor Indicum vocant. Est tamen à superiore valde diuersum. Planta est pergulis operiendis aptissima: suis enim clauiculis latissimè sese diffundit. Folia habet ob- longa, laciniata: flores candidos, ex quibus ve- sicæ

Li. 2. plan.
ca. 137.

In Hort.
Germ.

Forma.

*SOLANVM Halicaca-
bum, Matth.*



no hortēsi similia sunt, sed minora, latiora, fir- miora, subasperaque, nec vt in illo nigrican- tia. Flores pallidi, maiores, & minus albi quā in Solano hortensi, ex quibus folliculi oriū- tur, vesiculis similes, iugladium magnitudine, & quandoque maiores, turbinata figura, ex octonis costis aequaliter à sese distantibus cō- pacti, qui recentes virides sunt, maturi rufes- cunt, baccis intus vinosis, quæ ima folliculi parte inhaerent, rubris vuæ acinis similes, sa- pore austero simul & amaro, ac numeroso, mi- nutoq; intus semine albicante, aut flauescēte, rotūdo, læui. Coronarij fertis apud nos acinos & vesiculas intorquent, vt pulchritudine coc- cinei grani, & folliculi punicei venustate co- rollas commendent. Alterum vesicariæ ge- nus à Fuchsio & Dodonæo descriptum est, peregrinum vocant, cuius etiam meminit Matthiolus, Vesicariæ repentis nomine. Alij Pisum cordatum, alij Cor Indicum vocant. Est tamen à superiore valde diuersum. Planta est pergulis operiendis aptissima: suis enim clauiculis latissimè sese diffundit. Folia habet ob- longa, laciniata: flores candidos, ex quibus ve- sicæ

In Hist. pl.
ca. 264.
Lib. 3. c. 89.
Li. 4. Diosc.
ca. 67.

Forma.

HALICACABVM Peregrinum, seu Vesicaria repens, Fuchf.

ficæ prodeunt virides, subrotundæ, senis per longitudinem diuisuris: semine intus pullo, erui magnitudine, aut maiore, in cuius medio veluti effigies cordis humani insculpta apparet. Radice nititur gracili & fibrata. Halicacabū hunc peregrinum ex Solano genere esse negat Gesnerus, quod acinis careat. Sciendum enim acinum nō pro vux vinaceo, sed pro vux fructu toto accipi, qui ex succo, & parte quæ veluti caro est, & ex vinaceis, & ex ambiente cute constat. Vt cum Dioscorides de Solano halicacabo dixit, χαρπὸν δὲ ἔχει ἐν θυλακίαις περιφερῶσιν, ὁμοίῳς φύσας, πυρρὸν, περιφερῆ, λεῖον, ὡς ῥάγα εαρυλῆς, intelligendum est Solanum halicacabum fructum habere rufum, rotundum, lauem, velut vux fructum, non vuarum acinis, idest, vinaceis similem, quin non vux vinaceo, sed vux fructui toto similis sit Solani huius fructus. Plinius non aliter acinorum nomē vsurpauit, cum dixit de eodē halicacabi fructu, cui acini coccinei, &c. sic certè ῥάγα πυρρὸν reddēs. Et de Solano hortensi dixit, acinos habet nigros, quos ῥάγας μέλανας apud Græcos legerat. Est etiam hīc animaduertendum Theodorum Gazam τρύχης, idest, Solani species omnes malè in Theophrasto vesicarias interpretari. Nā vesicaria peculiare nomen est, & halicacabo tantum proprium, quæ fructus vesicæ similes fert, vel quòd vesicæ & calculis proferit, vnde & nomen inuenit. Solanum hortense nascitur in hortis & viridariis, secus publica itinera, præsertim prope sepēs, & ædificiorum ruinas. Halicacabum in vinetis copiosissimè prouenit, prope sepēs, locis humidis, & parietinis: feritur etiam in hortis. Solanum hortense tota fere æstate floret, autumno autem fructus eius maturefcit. Halicacabum vesicās illas suas in fine Augusti, & inter initia Septembris mensis colore primū viridi, mox paulatim rubescente profert. Nunc singulorum Solanorū vires diligentius declarandæ. Solano hortensi natura refrigerandi, inquit Dioscor. quare folia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris cōuenienter cum polline polentæ illinuntur. Agilopa capitisque dolores trita & imposita per se sanant: æstuantī stomacho auxiliantur: parotidas cum sale detrita illitu discutunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, & vlcera quæ serpunt, cum cerusa, rosaceo & argenti spuma: ad agilopas cum pane: infantium adustioni quam Syriāsin vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyriis aquæ vel oui vicē exhibet, cōtra acutas fluxiones illitus

In Hor.
Germ.

Li. 4. c. 67.

Lib. 21. c. 31.
Lib. 27. c. 8.*HALICACABVM Peregrinum, siue Vesicaria repens, Matth.*

Locus.

Tempus.

Vires &
Temper.
Li. 4. c. 66.

illitus: aurium dolori instillatus prodest, mensium abundantiam sistit in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum cortalium subactus, & linteo appositus, agilopiis præsentaneo est remedio. Solano, inquit Plinius, vis reprimendi refrigerandiq;. Et, Cucubali folia trita cum aceto serpentium ictibus & scorpionum mederi. Quidam hanc alio nomine strumum appellant, alii Græcè strychnon. Acinos habet nigros. Ex his cyathus succi cum mulsi duobus medetur lumbis: item capitis doloribus cum rosaceo infusus. Ipsa strumis illita. Sed hic vsus medicus in Dioscoride non habetur. Tradit Galenus Solani esculenti quod in hortis nascitur, omnibusq; noti vsus esse ad ea omnia quæ refrigerari, adstringi, postulant: potest enim hæc duo ordine secundo. Et inter olera quibus vescimur nullum se nouisse, quod tantam habeat adstrictionem quantam Solanum. Merito igitur raro quidem ipso uti homines ut alimento, ut medicamento autem assidue: efficax enim est in iis in quibus adstrictionis & refrigerationis vsus incidit: minimi autem est alimenti. Scribit Matthiolus cum foliorum, tum baccarum succum addito rosaceo, & aceti momento aduersus capitis dolores à caliditate ortos plurimū valere: phreniticos etiam iuuare, imbutis eo linteolis sincipiti impositis. Illinuntur fronti eodem modo ad calidas oculorum fluxiones. Gargarizatur quoque utiliter cum aceto ad faucium & columellæ inflammationes, additurq; in vnguenta quorum ad vlcera contumacia est vsus. Solanum halicacabum, inquit Dioscorides, vim vsusq; hortensis habet: verum cibis nequaquam expetitur. Regium morbum purgat semine potu, & vrinam pellit. Quæ vltima sententia cum Græcè sic legatur, *διώλει δὲ ὁ χυμὸς αὐτῆς τὸν βίχον καὶ τὸν πόρον ἀποκαθαίρει ἐπὶ τὸν ὄν*, sic transferri debuit: fructus eius potu expurgandi morbum regium vim habet, cum vrinas cieat. Etenim ob id quod vrinas moueat is fructus, ait Dioscorides ab eo bilē per ictericorum corpus effusam expurgari. Galenus halicacabum in foliorum facultate hortensi Solano simile esse scribit, fructum habens ciendæ vrinæ idoneum: quare multis compositionibus, quæ ad iecur, ad vesicā, ad renes accommodantur,

Li. 27. ca. 13.
Cap. 8.

Li. 8. simpl.

Li. 2. Alim.

Ibid. c. 67

Ibidem.

Lib. 21. c. 35

*SOLANVM Americum,
Dalechamp.*



miscetur. Huius baccarum vis præstantissima est, inquit Matthiolus, non solum ad ciendam vrinam, sed ad eius quoque ardorem mulcendum. Earum enim succus ex papaueris albi cremore, aut seminū melopeponum, aut cucurbitæ, aut ex malux decocto, aut ex hordeacea prifana potus, mirificè ardoribus vrinæ succurrit. Baccæ musto dilutæ efficaciter imponuntur incipientibus oculorū carbunculis. Calculosi cum maturis vuis acinos miscent, & dies aliquot simul efferuescere sinunt, ut habeant vinum acinaticium contra renū & vesicæ mala, vocantq; Coquereticum vinū, Gallicè *Vin de Coqueret*. Hoc propinatum vnciarum quatuor pondere, magnam arenularum vim deturbat. Nec illud prætereundum ex Plinio, aspidum naturæ halicacabū in tantum aduersam, ut radice eius propius admota soporetur illa sopore enecans vis earum. Ergo trita ex oleo percussis auxiliatur. His addendum Solanum Indicum, seu Americum appellatum, quod ex America, quam Indiam occidentalem vocant, Hispanorū classe & armis debellata, huius semē aduectum

aduectum sit. Ex vna radice multis ramis fruticat, cubitalibus, lentis, obsequiosis, furculosis: folio Solani hortensis angustiore, longiore, acutiore, quale visitur in summo Solani hortensis fastigio, acri persicariæ quam hydropiper vocant, non dissimili, venoso, pallidius virente: floribus violæ candidis, ex longo pediculo dependentibus, ternis ferè, aut quaternis simul, tuberculo in medio extante, umbo- nis figura, phœniceo, aut crocato, venustissimiq; coloris, apice tenuissimo ex illo prominente: baccis rubris, ceraso, aut halicacabi acino paribus, acidis, subamaris: semine minuto, candido, copioso refertis, quale est halicacabi. Licet id in feruidis- simo solo cæloq; Americorum spõte proueniat, frigidum tamen & alsiosum no- strum nõ dedignatur, tantisper dum æstatis tepor fouet: nam hyeme moritur, nec brumæ sæuitiam tolerare potest. Amomum Plinij quidam putarunt, rectius alij strichnodendrum, idest, Solanum arborescens. Dodonæus, Pseudocapsicū vocat. Hispani *Guyn das de las Indias*, idest, Cerasa Indiana.

L A P A T H V M.

CAP. XXV.

Nomina



ΑΠΑΘΟΣ & λάπαθον Græcis dicitur, qui Rumex Latinis, Barbaris Lapathium: à Lapatho tamen Lapathium diminutum nomē barba- rum non est. Varro: Hanc eandem voluptatem tacitulus taxim con- sequi Lapathio, & prisana possim. Lapathus autem ἀπὸ τῆς λαπάξιν di- ctus est, quod valet exinanire, & pro ventrem leuare vsurpatur: vnde λαπάξις, qua

Li. 2. Phyl.

voce vititur Aristoteles, οἷον τὸ βαδίσαι, εἰ λαπάξιος ἐνεχθῇ, idest, verbi gratia am- bulare, si est alui leuadæ gratia. Lapathum Arabes *Humadh*, *Hundh*, seu *Hamad* ap- pellant, Itali *Rombice*, & *Lapatio*, Germani *Ampffer*, Hispani *Labaca*. Theophrastus

Lib. 7. hist. cap. 6.

Genera

duo genera Lapathi tradidit, siluestre & satium. Dioscorides quinque non eo quo solet, sed perturbato ordine descripsit. Ex generibus Lapathi, inquit, oxylapa- thum vocant, quod in acutum tendit, dura habens extrema, in palustribus nascēs.

(At cum Græcè legatur, λάπαθον. τὸ μὲν αὐτὸν ὀξύλάπαθον λέγεσθαι, φυόμενον ἐν ἔλεσι, σκληρὸν, καὶ ἄκρα, ὑπόξυ, conuertendum erat. Ex Lapathi generibus oxylapathum

Li. 20. c. 21.

dicitur, durum, & aliquantum in extremis acuminatum.) Aliud est satium illi dis- simile, & ὁμοιον τῷ πρῶτῳ, vt vulgata habent exemplaria. Alia, & vt opinor me- liora, & ἀνόμοιον, idest, non dissimile. Cui lectioni subscribit Plinius, qui oxylapa-

thum satiuo similis facit: quāquam non dissimulandum in quibusdam codicibus etiam dissimilius legi. Oribasius habet, & ὁμοιον τῷ πρῶτῳ, non omnino si- mile primo: vt priora duo Lapathi genera non tantum inter sese differant, quan- tum ex vulgata lectione intelligere licet: Tertium genus siluestre, paruum, plan-

tagini proximum, humile, & molle. Quartum est quod alij oxalida, alij anaxyrida, aut Lapathon vocant (additur in vetere codice ἄγρον, idest, siluestre Lapathum)

folia eius siluestri ac exiguo rumici similia: caule non magno: semine subacuto, rubente, acri, in caule & agnatis appendicibus emicante. Postremum hippolapa-

thum olus est magnum in paludibus nascens. Vides primum Lapathi genus agre- ste à Dioscoride positum, deinde satium, tum ad siluestria redire. Plinius ita di-

stinguit. Nec Lapathū dissimiles effectus habet. Est autem & siluestre, quod alij oxalidem appellant, satiuo proximum, (pro satiuo lege siluestri exiguo) foliis acu-

tis, colore betæ candidæ, radice minima: nostri verò rumicem, alij Lapathū can- therinum, ad strumas cum axungia efficacissimum. Est & alterū genus, ferè (feri

non fere) oxylapathum vocant, satiuo item similis (Cornarij codex pro item si- milis, dissimilius habet: prior tamen lectio Oribasio, & melioribus Dioscoridis

libris consentit, vt diximus,) & acutiora habet folia, ac rubriora, non nisi in palu- stribus nascens. Sunt qui hydrolapathum tradunt in aqua natum. Est & aliud

hippolapathum maius satiuo, candidiusque ac spissius. Aliquanto post ex Solone

adiicit

adiicit bulapathum: Siluestre itaque genus quod oxalis dicitur, Latinis rumicem vocari dixit, non alia Lapatha. Idem etiam alio in loco. Omnia autem siluestria ferè sunt & foliis minora, & caulibus, succo acriora, sicut cunila, origanum, ruta. Solummodo ex omnibus siluestre Lapathum melius. Hoc in sativis rumex vocatur, nasciturq; fortissimum. Traditur semel satum durare, nec vnquam vitari terra, maximè iuxta aquam. Non desunt tamen qui legendū contendunt. Hoc in sativis rumex vocatur, nasciturq; fortissimū: traditur certè semel satum durare, nec vinci vnquam à terra, &c. vt rumicem hîc hortensem faciat, quem superiore loco siluestrem posuit. Oxalidem autem propriè Romani rumicem appellarunt, forsitan quod ab ea succus non aliter atque mamma, quam rumem veteres dixerunt, siccantibus exugi soleat: nam foliorum acor à quibusdam hauritur, vt lac ab agnis, qui in suis matribus subrumantur. De quo Vergil.

Fœcundusque rumex, malua, violæq; virebant.

In Moreto.

Nisi quis à teli similitudine ductum nomen existimet: quod sparo cognatum in modum pedis recuruatur, cuius meminit Lucilius.

Tum spara, tum rumices portantur, tragula porrò.

citante Nonio. Adfertur tamen & hic versus à Festo, sed pro rumices habet murices. Galenus de iis ita scribit. Licet Lapathum appellare betam agrestem, vt quod non gustu modo, sed viribus etiam betæ hortensi sit simile. Verùm cum beta Lapathum sit suauior, nemo est qui non libentiùs ea vescatur. At oxylapathi qualitatem & vires nomen ipsum indicat: est enim Lapathum acidum. Quod autem ad Lapathum attinet, nemo est qui crudum ipsum mandat, quemadmodum neque betam. Oxylapathum tamen mulieres nostræ pica laborantes, interdum & pueri quidam gulosi crudum mandunt. Perspicuum autem est olus hoc ex genere esse eorum quæ non nutriunt, multò magis quàm Lapathum. Ex his intellectu facile est Galenum oxylapathum pro oxalide accepisse, & non ab acuminatis foliis, sed ab acore, siue acido sapore oxylapathum dictum asserere. Idem alio in loco tria duntaxat Lapathi genera ponit. Lapathum simpliciter dictum, oxylapathum, & hippolapathum. Sed cum herbariis plura Lapathi genera hodie cognita sint, ea sic distribuemus. Lapathum aliud hortense, aliud siluestre. Hortense foliis est nigrae betæ, minoribus, plantagini proximis, humi iacentibus, nō tam acuminatis, venosis, è longis crassiq; pediculis pendentibus: caule cubitali, striato: flore rubro: semine minuto, pellucido, subnigricate: radice crocea, amarâque. Id secundum est genus à Dioscoride traditum, quod in hortis rura colunt apud Allobrogas, præsertim oppido Cremutio vicina, vocantq; *du Lapas*, eiusq; foliis vtuntur in iusculis, aluū cieri eius decocto arbitantes: & quamuis in hortis non feratur, in iis tamen sponte nascitur. Gesnerus in Sabaudia, circa Laufannā, & alibi sese vidisse ait, & Lampe vocari. Idē asserit Tragus. Matthioli prima commentariorum in Dioscoridem editione nomine hippolapathi representauit. Fuchsius pro Lapathum satiuo, id quod vulgò Rhabarbarū Monachorū appellant. Item Dod. & alij. Siluestris Lapathi multa sunt genera.

Li.2. Alim.

Li.7. simpl.

Forma.

Locus.

In Hort. Germ.

Li.1. c.104.
Li.2. Diosc.
ca.108.

In hist. pl.
ca.174.
Lib.5. ca.9.

LAPATHVM Satiuum.



OXYLAPATHVM.

Forma.



Ibidem.

Forma.

In Hort.

Germ.

Li. 2. c. 49.

Ibidem.

patho proximum esse ait, sed breuioribus foliis, & latioribus, per humum sparsis, plantagini ferè similibus, caule minore. Illud est fortasse Lapathū, quod rotundum vocat Gesnerus, & circa Friburgum Heluetiorum inueniri ait. Istud Lapathum Ruellius acidulam, aut minutam oxalidem vulgò dictam, Gallicè *Oseille menue*

LAPATHI Siluestris

II. Genus.

Lib. 4. c. 11.

Li. 1. c. 104.

In Actiū.

Forma.



Oxylapathum Dioscoridis est primum Lapathi genus cuius notum, sic, vt ille ait, dictum non ab acido sapore, vt oxalis, sed à foliis subacutis, vt ὀξύ, & in sapore, & in mucronata figura intelligatur. Id quod non animaduertentes Auicenna & Serapio, Lapathū omne sine discrimine acetosam nominauère, nō rectè ad saporem referentes, quod ad foliorum figuram retulit Dioscorides in hoc Lapathi genere. Officinæ Lapatium acutum nuncupant, Galli *Parille*, Germani *Mengelwurtz*. Foliis est longis, angustis, duris, in summo subacutis: caulibus rotundis, geniculatis, cauis, nigricantibus, in quorum fastigiis flosculi copiosi, pallidi, semē triangulum, nigricans, tenui membrana conclusum. Radix est longa, intus crocea. In palustribus nascitur. Alterum siluestre tertium Dioscoridis Lapathi genus, paruum, plātagini proximum, humile & molle, vt ille describit. Docti quidam vulgi acetosam rotundam esse rentur: omnibus enim reliquis folia dura sunt, huic soli mollia & tenera. Dodonæus oxyla-

patho proximum esse ait, sed breuioribus foliis, & latioribus, per humum sparsis, plantagini ferè similibus, caule minore. Illud est fortasse Lapathū, quod rotundum vocat Gesnerus, & circa Friburgum Heluetiorum inueniri ait. Istud Lapathum Ruellius acidulam, aut minutam oxalidem vulgò dictam, Gallicè *Oseille menue* arbitratur esse. Fuchsius eam plantam, quæ vulgato nomine Bonus Henricus, Germanicè *Gutter Heinrich* nominatur, quam Dodonæus Chrysolachanum, idest, aureum olus, ob excellentes virtutes appellat, eoque nomine eam depinxit ac descripsit: vulgò Totabona dicitur, Gallicè *Toutebonne*. Tragus Rumicem vnctuosum vocat, Germanicè etiam *Schmerbel*, à pinguibus & mollibus foliis, quem alij bonum henricum. Hollerius idem Lapathum siluestre eam plantam exiguum esse credit, vbique copiosissimam, quæ Gallis *Lapas*, Delphinatibus *Du lapais* dicitur. De oxalide minore dicetur postea. Bonus Henricus autem folia fert lata, crassa, oxalidi fere similia, sed breuiora & latiora: caulē crassum, pedē & dimidiū altū, in quo coaceruatur semen fere sicut in atriplice: radice nititur grandi, longa, crassa & crocea. Locis incultis gignitur, secus semitas & sepes. Iunio & Iulio mensibus floret. Tertium Lapathi siluestris genus Dioscoridi indictum, Lapathū nigrum, & sanguis draconis à foliorum & caulium colore, & succo, à recentioribus nuncupatum, superiori caulibus, foliis, semine proximum

LAPATHVM Silueſtre,

III. Genus.



mum est, sed caules quidem habet purpureos, folia verò in rubro nigricantia, Lapathi acuti angustiora, longiora, numerosa, rubris venis sparsa, gustu adstringente, quæ expressa rubrū succum remittunt. Ex Lapathorum est genere, quoniam toto habitu Lapathum refert. In Septentrionis hortis etiam sponte oritur, rariùs in calidis regionibus. Quartum genus eam plantam quidam esse putant, quam nonnulli panaces chironium folio Lapathi, flore aureo a Plinio dictum esse arbitrantur. Radice est breui, furculosa, fibrata, dura, lignosa: caulibus duobus aut tribus, angulosis, palmi altitudine: foliis oxylapathi, oblongis, angustis: flore in summis ramis aureo. Vnde Anthoxanthon, idest, lutei floris Lapathum nuncuparunt, copioso, densius aceruato, vt in spinaceo olere, quod teutlomachen quidam vocant. In fossis & vliginosis locis prouenit.

Forma.

Locus.

In Hor.
Germ.

Forma.

geniculata, ex singulis geniculis fibras emittens, quibus vado inhæret, primis internodiis rubescens. Caules edit multos, rotundos, quinque aut sex cubitos lōgos, in aqua fluitantes: folia palmum atque eo amplius longa, angusta, in ambitu cre-


LAPATHVM Silueſtre,

IIII. Genus, Dalech.





OXYLAPATHVM

Aquaticum, Dalechamp.



Locus.

nata, alternatim per caules nascentia, gustu fatuo & sicco. In caulium vertice thyrsus eminet ea prorsus specie, qua in potamogetone visitur. Nascitur in vadis amnium pigrorum vt Araris. Longe diuersum Hydrolapathum, idest, Lapathū aquaticum Lobellius proposuit, idq; duplex. Maius tota facie Hippolapathum satium

OXALIS MAIOR.*OXALIS Minor,*
Matth.*HYDROPOLAPATHVM*
Maius, Lobel.

gustu,

referens, folio nigriore, non dispari, vti neque caule, neque semine, radice duntaxat breuiore, magis fibrata, foris nigriore, intus magis rubra. Frequens in aquis, nec alibi sponte exit. In aquis etiam prouenit Hydrolapathum minus, sed non nisi limpidis & fontanis, ex quarum fundo exerit cauliculos teneriusculos, flaccidos, graciles, non absque filamentis, vt cetera aquatica, stipantibus & pendulis. Folia sunt admodum tenuia & mollia, nec tamen aqua innatantia ritu Potamogetonis, sed erecta, ex atro viridia, lanceolata similia, angustiora quā Potamogetonis. Postremum Lapathi siluestris genus Dioscorides quartum oxalida constituit, quæ vt ex eius descriptione intelligere licet, nihil aliud est quā oxalis nostra maior & pratensis, cui folia sunt Lapathi acuti, delicatiora, tenuiora & magis oleracea, in imo latiora, pinnatas, & lunatas, Spinaciam & Attriplicem referentia: caulis striatus, ruber, succulentus: semen angulosum, acutum, in folliculis Lapathis cæteris nō dissimilibus. Radicibus nititur plurib⁹, sed nō vt in rumice croceis, acido

gustu, perinde ac folia & caules. Oxalidem igitur sic diuidemus, vt alia sit siluestris, alia hortensis. Siluestris oxalis Dioscoridis ea est, cuius modò historiam retulimus, quæ maior cognominatur. Alia est minor tenuifolia, sinuata, veruecina nuncupata, cui folia sunt longè minora, cuspidis lanceæ figura, mollia, læuia, qui-

Genera.

Forma.

HYDROLAPATHVM

Minus, Lobel.



busdā veluti capillamentis subrubentibus inspersa, succosa, foliis maioris acidiora, & in medicos vsus plusquàm cætera expetita. Hortensis item duplex est, maior quæ pratensis est in hortos translata, oblongis & nigricantibus foliis. Altera foliis albicantibus, rotundiusculis, breuib, angulosis, hederæ foliis ferè similibus, tamen minoribus, neque crassis, neque duris. Caules eius teneri sunt, in quibus semen cæteris simile. In hortis nostris passim obuia est, vt & prior. Quæ oxalis à Gallis, imitatione Græca, *Oxaille* dicitur, & *Ozeille*, ab aliis *Vinette*, à nonnullis *Aigrette*, à Lugdunensibus, *Salette*, à Germanis *Saurampffer*. Oxalis siluestris minor omnium acidissima, *Ozeille menue*, & *Ozeille debrebis*. Hortensis minor, *Ozeille ronde*, *Ozeille franche*, & *Ozeille Romaine*. Dicitur autem Oxalis ab acido eius succo: gratum enim acorem palato repræsentat: vnde acetosam nominarūt Officinæ. Hic minimè præmittenda Oxalis alia à Lobellio posita radicibus tuberosis filipendulæ vel Oenanthes valdè spectabilis, exotica: etiam foliis, caule & semine hortensis, quā toto habitu præfert. Raram esse

Forma.

OXALIS Tuberosa, Lobel.



OXALIS Rotunda.



HIPPOLAPATHVM

*Siluestre, Matth.**Genera.*

Li. I. c. 104.

Lib. 3. cauf.
Theophr.
ca. 1.

multum abhorret à vero: vocant enim *La patience*. Huic addunt Lobellius & Pena Hippolapathū aliud, rotūdo folio, Pseudorhab. recentiorū, quod pauci & diligētiore herbarij colūt, quasi multò magis affine vero Rheobarbaro, quia folio sit rotundiore, & summo ambitu retusiore, propioreq; ad Personatā, aut Petasitem,

ait Lobellius in Belgio, & huc ex Italia delatā. Superest Hippolapathum, cuius species duæ. Siluestre non solum in paludibus nascens, sed etiam in mōtibus iis præsertim in locis in quibus pecudum diutius stabulantium latamine pinguescit solum: sequenti Hippolapatho simile, sed foliis angustioribus & magis in acutum tendentibus. Alterum hortense, Matthioli iudicio, id quod passim in hortis rhabbari monachorum nomine habetur, quod alij Lapathū satiuū Dioscoridis esse opinantur vt diximus, Gallicè *la Patience*. Id Oxylapatho ferè simile est, nisi quod folia maiora sunt, latiora, molliora, in summo non mucronata. Caules longissimi sunt, crassi, rubri: flores flavescentes: semen rubrum, triangulum: radix longa, crassa, crocea. Id Lapathum satiuū Dioscoridis, Fuchsi, Dodonæi, Solerij sententia diximus esse. Tragus Hippolapathū Dioscoridis esse putat, Scaliger Bulapathū, sic enim scribit. Quod sanè in hortis pro *Raued* ostentant, Bulapathum est, radice admodum medicata. Francigenæ virgines Deo dicatæ, quo nomine illud appellant, haud

HIPPOLAPATHVM

Satiuum latifolium, Lob.

HIPPOLAPATHVM

Rotundo folio, Lobel.

quibus

HIPPOLAPATHVM

hortense.



quibus ferniè magnitudine æquiparatur: non tamen maiore, aut ita diuersa radice Hippolapato, nec vsu aut natura dissimili. Lapathorum & hippolapathorum historias retulimus, nunc eorum virtutes sunt explicandæ. Omnium decocto olere, inquit Dioscorides, alius emolitur. Crudi illic melicerides rosaceo aut croco adiecto discutiuntur. Siluestris (nempe mollis) & oxylapathi, & eius quam oxalida nominant, semen ex aqua aut vino vtiliter bibitur contra dysenterias, & celiacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ crudæ lepras, impetigines, & scabiosos vngues persanât, sed ante locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis decoctum earum sedat, si foueatur, aut in foliis balnearum confricetur (Græcè legitur ἐπαντλέμενον, ἢ λούζω μινύμενον, id est, si affundatur, aut si vt fots adhibeatur, aut cum aqua balnei misceatur, tamen hæc verba ἢ λούζω μινύμενον, in multis græcis codicibus desiderantur, ea tamen legisse vide-

Lib. 2. c. 108
Vires &
Temper.

tur Plinius, de eadem re scribens, Pruritus corporis in folia balnearum additum) Coctæ in vino & instillatæ aurium dentiumque dolorem mulcent: strumas, parotidasque discutiunt: lienem cum aceto extenuant (quibus verbis Græca non satis exprimi videntur, leguntur enim, παρηγοροῦσι τὸ ὠσάλγαν, καὶ ὀδονταλγίαν ἐφ' ἠθροῖσαι ἐν οἴνῳ, καὶ διαλυζόμενα. Διαφοροῦσι καὶ χοιράδας, καὶ παρατίθλας ἐφ' ὅθαι σὺν οἴνῳ, καὶ καταπλαθεῖσαι, σπλήνα. τὸ σὺν ὀξέει. Id est, aurium & dentium dolorem leniunt coctæ in vino, si colluantur, strumas parotidasque discutiunt coctæ in vino, & cataplasmatismodo adhibitæ, splenem autem cum aceto coctæ.) Aliqui amoliendis strumis radicum gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Tritæ & admotæ fœminarum profluvia sistunt: cum vino autem potæ regio morbo medentur, calculos vesicæ cominuunt, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathum eadem vires habet, quas supradicta rumicis genera. Plinius non eundem quem Dioscorides vsum medicum habet, scribit enim. Siluestria scorpionum ictibus medetur, & ferire prohibent habentes. Dioscorides ait, eum qui præbiberit, nihil ex scorpionis ictu mali passurum. Radix, inquit Plinius, aceto decocta si coletur, succus dentibus auxiliatur, si verò bibatur, morbo regio. Dioscorides ad vtramque affectionem in vino coquit, & mendosè vulgata exemplaria, coletur, habent pro colluatur. Semē stomachi inextricabilia vitia sanat. Dioscorides ἄσπην στομάχου dixit, id est, stomachi fastidium ac nauseam, cum os stomachi à vitiosis humoribus ita mordetur, vt nauseam & fastidium pariant. Hippolapathi radices priuatim vngues scabros detrahunt. Dysentericos semen duabus drachmis in vino potum liberat. Quæ siluestris, & oxylapathi, & oxalidis radicibus Dioscorides attribuit. Oxylapathi semen lotum in aqua cælesti sanguinem reiicientibus adiecta acacia lentis magnitudine prodest. Præstantissimos pastillos faciunt ex foliis & radice addito nitro, vel iure exiguo (thure pro iure reponit Cornarius) in vsu aceto diluunt. Sed satium in epiphoris oculorum illinunt frontibus. Radice meliceridas & lepras curant. In vino verò decocta, strumas, & parotidas, & calculos. Quæ de

Lib. 20. c. 21

Lib. 20. c. 21.

Embl. 102.
lib. 2. Diosc.

Ibid.

filuestrum radice Dioscorides dixit. Poto vino & lienes (Cornarius emendat, femine potio è vino, & cætera.) cœliacos æquè ac dysentericos, & teinesmos. Ad eadèmq̃ue omnia efficacius ius lapathi (ius τὸ ἀπέψημα, id est, decoctum intelligit) quod ructus facit, & vrinam ciet, & caliginem oculorum discutit: item pruritus corporis in folia balnearum additum, aut prius ipsum illitum sine oleo. Firmat & commanducata radix dentes. Eadem decocta cum vino sistit aluum, folia solvunt. Alio in loco cap. 12. 20. de lapatho filuestri ita scribit. Vfus eius cum

Ibid. ptisana tantum in cibis leuiorem gratioremque saporem præstat. Quo loco Cornarius verba hæc, cum ptisana tantum, redundare arbitratur, & rectè quidem:

Lib. 7. sim.

coquitur enim oxalis integris foliis vt reliqua olera cum cibis, carnibus, & piscibus, non cum ptisana tantum. Lapathum, inquit Galenus, moderatè digerentem facultatem habet, at oxylapathum mixtam: nam cum eo quod digerit, non nihil quoque repercutit. Semen eorum manifestam quoque quandam adstrictionem obtinet, vt & dysenterias, & diarrhœas sanet, & maximè oxylapathi. Porro hippolapathum quod totum in paludibus prouenit, easdem facultates ob-

Lib. 6. c. 24.

tinet, sed imbecilliores. Aetius scribit vlcus demorforum à cane rabido perfundendum esse chamæmeli, radicis lapathi, quod oxalidem vocant, decocto, nouissèque sese senem quendam, qui vbi quis morsus esset à rabioso cane, sola oxalide curabat. Nam & vlcus decocto perfundebat, & herba integebat, & de ipsa bibendum dabat. Meiunt autem homines qui ipsam acceperunt multa, & cum vrinæ incontinentia. Et propterea morbum regium hæc expurgant. Nos verò etiam impetiginem ex ipsa cum aceto confricatam depellimus: & pruritus auxiliamur per eandem radicem. Vtunturque etiam ipsa ad canis rabiosi morsus cum aliis auxiliis. Similiter facit etiam syluestre lapathum, foliis in acutum tendentibus, radicem habens oblongam veluti raphanus paruus. Hæc Aetius. Ex oxylapathi radicibus aqua destillatur, quæ ad pustulas, alphas, ionthos, vitiligines, lichenas, omnes denique cutis, præsertim faciei maculas delendas plurimum facit, hoc modo. Eius aquæ & melonis præmaturi sumantur singulorum libræ duæ, oua hirundinum decem, salis nitri semuncia. Quæ teri debent, trita cum aquis in vitreum vas coniiciantur, vnde succenso igne aqua extrahitur, qua manè facies abluenda, vesperi illinenda oleo ex tartaro, & amygdalino, permistis. Decoctum oxylapathi ex vino, diebus aliquot potum auriginem pellit, & cutim pristino nitori restituit. Credunt quidam lippire nunquam eos qui rumicis siluestris radicem luna decrescète effossam nitidissimè secum porterint. Quæ planta Bonus Henrichus dicitur, vulneraria est, & mirificè ad sordida purganda, ac glutinanda vlcera cõfert, sic vt appensa etiam, ac trita vulneribus imposita vermes, qui in iis nati sunt, excidere faciat. Denique siccatur & abstergit. Hippolapathi, quod rhabarbarum monachorum vocant, radix auctore Fuchsio, purgandi vim habet, si in puluerem redacta drachmæ pondere sumatur. Neque id mirum admodum, inquit, cum Dioscorides omnium rumicum olus decoctum aluum mollire, atque decoctas eorum radices cum vino, regio morbo correptos emendare, ob bilis nimirum per inferna educationem testetur. Tragus affirmat radicem hanc cum pauxillo zingiberis sumptam phlegma & bilem per inferiora euacuare, seseque hoc remedio vsum experientia didicisse. Ex ea autem medicamentum sic conficitur. Radicis aridæ drachma, zingiberis scriptulum, in puluerem redigantur, sumanturque à ieiunis in iure calido.

Vires Boni Henrichi.

In hist. pl. cap. 174.

Lib. I. c. 104



Ἀσπάραγος, vel ἀσφάραγος, Latinis similiter Asparagus dicitur, Mauritanis *Halion*, siue *Helion*, Italis *Asparago*, Germanis *Spargen*, Hispanis *Espáragos*, Gallis *Asparge*, Officinis extrita prima litera Sparagus. Græci, inquit Galenus, omnes propemodum teneros caules, qui tempore ad fructus & seminis productionem auferunt, asparagos vocant, vt brassicæ, lactucæ, atriplicis, bliti, betæ, maluæ, radiculae, rapæ, sinapi, Cnici, pyrethri. Sed de asparago peculiari genere plantæ hîc loquimur, sic dicto quod cauliculos hos, qui prima germinatione prodeunt è terra, præcipuos habet. Cuius genera duo memorat Dioscorides, siluestrem siue petraeum, & satium. Galenus βασιλικόν, id est, regium, & ἐλαεινόν, id est, palustrem. Matthiolus quoque duplicem esse asparagum scribit, altilem, & sponte prouenientem. Huius tria esse genera, palustre, montanum, & petraeum. Is & myacanthinus dicitur teste Galeno, Latine Corruda. Plinius, Indicauius & corrudam. Hunc enim intelligo siluestrem asparagum, quem Græci horminium (ἀπὸ τῆς ὁρμῆς), nam & decoctum & semen veneris causa bibitur. Plinius. cap. 10. lib. 20. Auenionenses adhuc appellant corrupta voce Hormioconin, alij Romioconin) aut myacanthon vocant, aliis ve nominibus. Inuenio nasci & arietis cornibus tuis atq; defossis. Et, Siluestres fecerat natura corrudas, vt quisq; demeteret passim. Ecce nunc altiles spectantur asparagi. Theophrastus ἀσπάραγον simpliciter pro siluestri vsurpauit, cum scripsit, τὰ μὲν ἀπλῶς ἐστὶν ἀκάνθαι, καὶ θάπερ ἀσπάραγοι, καὶ ὁ σκόρπιος, ὅδε δὲ καὶ ἔχουσι φύλλον παρὰ τὴν ἀκάνθαν. Quæ Plinius sic conuertit. In totum spina est asparagus, & scorpio, nullum enim folium habent. Quæ ita legit Hermolaus, vt vnam non duas herbas esse putet, asparagum scorpio-nem: aliūmq; ab eo qui notus est omnibus. Idem scribit in Corollariis. Sed id haud rectè ab Hermolao annotatum esse, intelligi licet ex iis, quæ alio in loco de scorpio & asparago spinoso seorsum prodidit idem Theophrastus his verbis. τῶν δὲ διηρημένων εἰδῶν πλεῖστον μὲν ἐστὶ τὸ φυλλάκων, ἐλάχιστον δὲ, ὡς εἶπεν, τὸ ἀκανθῶδες ὅλως. βραχὺ γάρ τι πᾶμπαν ἐστὶν, ὥσπερ ἐλέχθη, καὶ σχεδὸν ἑξ ῥάδιον λαβεῖν παρὰ τε τὸν ἀσπάραγον, καὶ τὸν σκόρπιον. ἀμφότερα δὲ ταῦτα ἀνθεῖ μετὰ ἰσημερίαν φθινοπωρινήν. ὁ μὲν καὶ σκόρπιος ἐν τῷ σαρκώδει τῷ ἐξοιδνί, ὑπὸ τὸ ἄκρον τῆς ἀκάνθης ἔχει τὸ ἄνθος (sic enim legendū ex Theodoro, non vt in vulgatis codicibus exaratum est, ἐν τῷ σαρκώδει τῷ ἐσποδέντι, ὑπὸ τὸ ἄκρατον τῆς ἀκάνθης ἔχον τὸ ἄνθος) ἐξ ἀρχῆς μὲν λυκόν, ὕστερον δὲ ἐπιπορφύρεον. ὁ δὲ ἀσπάραγος ἐκφύει παρὰ τῆς ἀκάνθης κορυφῶδες μικρόν. ἐκ γέτε δὲ ἔχει τὸ ἄνθος μικρόν. (Lege ἐπὶ τέττα γε ἔχει τὸ ἄνθος) ὁ δὲ σκόρπιος μονόρριζον, καὶ βραχύρριζον (in Græco, vox βαθύρριζον redundat, vel lege εὐθύρριζον) ὁ δὲ ἀσπάραγος βαθύρριζον δὲ εὐ μάλα καὶ πολὺρριζον, πυκναῖς ταῖς εἰς αἰς, ὥστε τὸ ἄνω σιωχεῖς εἶναι αὐτῶν, ἀφ' ὧ καὶ αἱ βλαστῆσεις αὐτῶν τῶν καμυλῶν. ἀναβλαστάνει δὲ ὁ καμυλὸς ἐκ τῆς ἀσφαραγίας τῆς ἥρας, καὶ ἐδωδιμος ἐστὶν, εἰθ' ὅτως ἀποτραχιώει, ἐξανθεῖ τε προίσεως τῆς ὥρας. ἡ δὲ ἀνθησις ἐκ ἐκ τούτου μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν πρότερον. καὶ ἐπετεῖτο καμυλὸν ἐστὶν. Legendum, ἡ δὲ ἀνθησις ἐκ τέττου μόνον, καὶ ἐκ ἐξ ἄλλων τῶν πρότερον. τοῦτο καὶ ἐπετεῖτο καμυλὸν ἐστὶν. Id est, Ex iis quæ distincta sunt generibus, plurima quidem sunt quæ aculeata folia habent, paucissima verò omnino, quæ in totum spinosa sunt, & vix fere inuenias præter asparagum & scorpium. Ambo post autumnæ æquinoctium florent. Scorpius quidem florem in carne extuberante sub extremo spinæ profert, initio candidum, postea leuiter accedentem ad purpuram. Asparagus verò iuxta aculeos exiguum quiddam clauæ simile producit, in quo florem paruum habet. Scorpius vnicam habet radicem, eamque breuem & rectam, asparagus valde profundam & numerosam, cum densis radicibus, ita vt superior pars ipsis continua sit, ex qua caules proueniunt. Producitur autem caulis vere ex asparagorum summis radicibus, vel ex aspara

Nomina

Lib. 2. Ali.

Lib. 2. c. 118.

Genera.

Li. 2. Alim.

Lib. 6. sim.

Lib. 19. c. 8.

Lib. 19. c. 4.

Lib. 6. hist.

cap. 1.

Lib. 2. c. 1.

Ibid.

Corol. 19.

lib. 2. Diosc.

Lib. 6. hist.

cap. 3.

asparagorum plantario & silua, qui eduliseft, deinde asperatur, & deflorefcit procedente tempore, flos vero ex ipfo folùm, non ex prioribus emergit: hic enim annuo constat caule: Quæ Theophrastus dixit, ἀναβλασανεὶ ὁ καυλὸς ἐκ τῆς ἀσφαργίας, Theodorus interpretatus est, exit caulis de Corrudagine. Verum ἀσφαργίαν, seu ἀσπαργίαν, vel pro summis asparagi radicibus, vel potius pro asparagorum plantario & silua, vt & conuertimus, videtur vfurpasse. Id quod & Hermolaus adnotauit.

ASPARAGVS sativus.

Corol. 139.
lib. 2. Diosf.

Lib. de re
rust. c. 6.

Forma.

In libr. 2.
Diosc. c. 118



*ASPARAGVS Siluestris,
Matthioli.*

Lib. 11 c. 3.



Theophrastus asparagiam, inquit, pro planta ipsa videtur accepisse, aut etiam pro loco vbi satus est asparagus, eodẽ etymo ferè quo apud nos Cepina, Rapinãque. Theodorus corrudaginem, quasi aliud quàm Corruda genus interpretatur. Cato certè ad eundem modum corrudam quo cepinam & rapinam accipit. In arundine- to, inquit, corrudam serito, vnde fiant asparagi. Hac Hermolaus, qui altiles asparagos veteribus incognitos fuisse iudicat, corrudamque dictam ab Atticis non horminion, sed orminion, siue ormenum potius, ab aliquibus Libycum, asparagum siluestrem, qui post inuentum altilem propriè corruda est. Scorpionem alibi descripsimus, nunc de asparagis dicendum. Asparagus sativus ex radicibus thyrsos primũ emittit teneros, virides, læues, rotundos, sine foliis, carnosos, digiti ferè crassitudine, cacumine in turulos turbinato. Hos thyrsos orobanche rectè comparat Matthiolus, qui tãdem increfcentes explicantur in prægrandes ramos, quibus insunt folia capillamenti modo, & vt fœniculi tenuata, quæ occalescunt in spinulas, florem fundit paruulum, pallidum, quo decusso bacca dependent rotundæ, pisi magnitudine, virides, quæ tandem maturitate rubescunt, seminibus nigris, & corneæ soliditatis refertis. Radices circa caulem spongiosæ, vnde numerosæ oriuntur radiculae inter sese implicatae & quasi unitatem facientes, quas radiculas sic illigatas & connexas olitores spongas appellant, inquit Columella, & veteres asparagum spongiam in radicibus habere dixerunt. Corruda nouellis cauliculis seu turionibus, fructuque satiuo asparago proxima est, ceterum tota spinosa est, & aculeata: nam foliorum capillaceorum loco, quibus altilis asparagi ramuli vestiuntur, tota spinis horret, minutis, breuib, duris & pungentibus. Ex Matthiolo Asparagum satiuum & siluestre hîc pictum damus. Sed is sponte perumens sola transplâtatione & cultu à satiuo differt. Quare Corruda non est, quæ specie ab altili asparago prorsus differt, rarior multò, vt scripsit Pena neque

CORRUDA Dodonæi.



CORRUDA Penæ.



neque enim Veneto tractui maritimo, neque Germaniæ, Galliæ, Angliæve maritimis visitur, vbi tamen altilis frequens oritur: facilis autem à superiore dignotio, quod hæc tota candidior, & rigidior est, & ramis diuaticatis funditur per sæpes, folia acutiora, breuiora, & magis in ordines stipata: flosculis oleæ luteolis, crebris, subter alas emicantibus, semen illi non vt altili, corallij colore, sed cum maturuit, nigricat ex viridi, magnitudine aliquanto inferius, quod glomeratim proximè furculos adnascitur. Hæc scitè Pena expressit hac pictura. Magis montosis & collibus in decliui & afflatu maritimo delectatur. Altilis asparagus passim in hortis feritur & colitur. Corruda siccis & saxosis locis nascitur in Gallia Narbonensi, præsertim in sepibus & fructetis. Ille thyrsus primum cum ver appetit emicante viret, spica tum cibus expetita. Recentes hos thyrsulos in voluptatem gulæ verterunt helluones, & Rauennatibus palmam dedere, quæ gloria etiam hodie mansit ei terræ. Hodie decoctus in iure asparagus, aceto, sale, & oleo conspersus magno gulæ delectamento comeditur, & in principum delitiis est. Contra corrudæ caliculi amariusculi sunt, & nullam ferè in cibus gratiam habent. Semè æstate legitur. Dioscorides petræi asparagi virtutes primum declarat. Huius cauliculi, inquit, in cibo cocti ventrem emolliunt, vrinam cient (legitur in vetere codice ἡ τὸ καύλιον ἐπ' ὀλίγον ἐψηθὲν καὶ βρωθὲν, id est, cuius cauliculus modicè elixus esitatusque, & cætera. Cui lectioni cum experientia ratio etiam patrocinator, quia per longiorem cocturam vtræque vis & molliendi alui, & ciendi vrinam exoluitur in asparagos). Radicis decoctum contra vrinæ difficultatem, regiū morbum, renum vitia, & coxendicum cruciatus in potu proficit: cum vino autem phalangiorum morsibus auxiliatur. Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad eadem valet. Canes, vt aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodiderunt arietis cornibus contusis, atque defossis, quod à veritate abhorre credit Dioscorides. Quod verò deinceps dicit,

Locus.

Tempus.

Lib. 2. c. 118.

Vires.

Temper.

And. Lac.

ὁ μὲν τις ἀσπάραγος οὗτος, id est, Hic quidem asparagus, &c. ad satium referendum est, & quæ deinde sequuntur, sicut priora illa ad siluestrem. Declarat id quod dixit, si quis cornua arietis contusa defodiat nasci asparagum, vt sic satius ex siluestri fiat. Hic quidem asparagus, & cætera. Deinde quæ sequuntur ad siluestrem referri minimè possunt: cum enim hunc initio capitis notum esse dixisset, facultatibus eius

Ibidem.

eius explicatis descriptionem non subiecisset. Hic quidem asparagus, siue altilis asparagus, inquit Dioscorides, multis ramis fruticat, foliis fœniculi, longis, numerosis, radice rotunda, grandi, spongiam habente (ἐχῶσα κόνδυλον, id est, tuber habente, siue tuberosa). Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant (in Græcis corruptè legitur, πᾶντι φρενίτιδα, sedat phrenitida, pro πᾶντι νεφρίτιδα, sic enim statim initio capitis, βοηθεῖ νεφρικοῖς, opitulatur nephriticis) Asfus autem elixúsve vrinæ stillicidium, difficultatémque ac dysenterias mitigat. Radix cum vino aut aceto cocta luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis aut ciceribus sumpta, regium morbum sanat: coxendicis cruciatus stranguriámque leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum conceptum adimit, & sterilitatem adfert, ποιεῖ ἀλόκιον, καὶ ἄγονον, conceptionem impedit, & infœcunditatem adfert,

Lib. 20. c. 10

melius. Plinius eundem ferè vsum medicum de asparago altili, & siluestri prodidit. Vtilissimus stomacho, cibo asparagi vt traditur. Cumino quidem addito inflationes stomachi coliq; discutunt, iidem oculis claritatem adferunt. Ventrem leniter molliunt. Pectoris & spinæ doloribus intestinorúmque vitiis profunt, vino cum coquuntur addito. Ad lumborum & renum dolores semen trium obolorum pondere, pari cumini bibitur: venerem stimulant: vrinam cient vtilissimè, præterquàm quòd vesicam exulcerant. Radix quoque plurimorum prædicatione trita, & ex vino albo pota calculos quoque exturbat, lumborum & renum dolores sedat. Quidam & ad vuluæ dolorem radicem cum vino dulci propinant. Eadem in aceto decocta contra elephantiasin proficit. Asparago trito cum oleo perunctum pungi ab apibus negant. Siluestris ad supradiçta omnia efficacior vis, & candidiori maior. Regium morbum extenuat. Veneris causâ aquam eorum decoctam bibi iubent ad heminam. Ad idem & semen valet cum anetho ternis vtrinque obolis. Datur & ad serpentum ictus succus decoctus. Radix miscetur radici marathri inter efficacissima auxilia. Si sanguis per vrinam reddatur semen asparagi, & apij, & cumini ternis obolis in vini cyathis duobus, quinque diebus Chrysippus dari iubet. Sic & hydropicis cōtrarium esse, quamuis vrinā moueat, docet: item veneri, vesicæ quoque nisi decoctum: quæ aqua si canibus detur, occidit eos. In vino decoctæ radicis succum, si ore contineatur, dentibus mederi.

Lib. 2. Ali.

Asparagi Galeni sententia siue regij sint, siue palustres stomacho vtilis sunt, vrinam cient & parum præbent nutrimenti. Si tamen ij probe concoquantur, ole-

Lib. 6. sim.

rum asparagis magis alunt, nimirum quanto illis sunt sicciores. Rursus, Asparagus petræus seu myacanthinus abstergendi vim habet, idque citra manifestam aut frigiditatem aut caliditatem. Hinc renes ac iecur inferctum liberat, & maximè herbe ipsius radices ac semen. Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine,

Lib. 4. feu.

vlt.


Lib. 2. stirp.

Hispan. c. 84.

quam vel maximè dentes requirunt. Scribit Auicenna asparagos in cibis sumptos suauis odore corpus commendare, verum vrinam fœtidam trahere. Hic Clusij corrudas proponere volumus. Prior Dodonæi vel Penæ corruda fuerit. Quam Mat-

Lib. 1. Ali.

thiolus exhibet, Clusius corrudâ esse negat, sed asparagi altilis genus esse ait, quod (quia maritimis decliuioribus & herbidis locis sponte prouenit) marinum vocat, caule breuiore, firmiore, foliis crassioribus, firmioribus, ex cæruleo virentibus, baccis maioribus quàm vulgaris hortensis, & non adeò coralli modo intensè rubētibus: fortè, inquit Clusius, is erit, quem Galenus ἑλκτον id est, palustrem vocat. Altera Clusij corruda fruticosa est, in viridibus & mollioribus ramis, siue virgis ramosis, spinas acutas tres aut quatuor hinc inde pro foliis ferens, virides itidem vti ramus sunt, florem nullum ille vidit, sed frequentes baccas rotundas vti in superiore, primum virides, deinde per maturitatem nigricantes, succo & pulpa virente plenas, qua semen includitur durum, foris nigrum, intus candidum, plerúmque vnicum, interdum bina: radix crassa, longa, superiori similis, frequens est ad Tagum in

CORRUDA *tertia, Clusij.*CORRUDA *altera, Clusij.*

gum in Lusitania, & in Bætica, solo petroso, in collibus & sepibus. Tertia eiusdem corruda cubitales profert virgas, ramosas, candidas, lignosas, & priori similes, firmis, candicantibus, & deorsum spectantibus spinis alternatim, & secundum ramorum virgarumque inæqualium inflexionem horridas, ad quas quina aut sena folia simul & ex eodem capite prodeunt, prioris speciei longiora, mollioraque, que cōmanducata subdulcia, & aliquātulum gummosa deprehenduntur, flos inter folia ex alarum sinu longo tenuiq; pediculo dependet, ex viridi pallescens: deinde fructus propemodum rotundus, qui tricoccus videtur (tametsi vnicum granum contineat, rarò bina, foris nigrum, intus candidum, firmum, uti in superioribus) initio virens, per maturitatem rubescens & carnosus, siue succum & pulpam concludens lentam & viscidam: radice firmatur multiplici, velut alij silvestres asparagi, longa, crassa, intus alba, foris flavescente, fert aliquot thyrsos, qui aliorum asparagorum modo eduntur cocti & crudi cum oleo, aceto, & sale. Nusquam abundantius quàm supra Vlysiponem salebrosis locis iuxta vias, non procul à Tago se obseruasse ait. Nascitur tamen & aliis Lusitaniæ locis & tota ferè Bætica.

FRAGARIA.

CAP.

XXVII.

HERBA quæ fraga fert, fragaria ab herbariis nominatur, quæ quomodo à Græcis appellata sit nondum constat. Sunt tamen qui rubum Idæum non spinosum esse putant, quorum sententiam non improbat Fuchsius, cui non subscribit Dalechâpius, ex cuius iudicio longè alium, & verum rubum Idæum non spinosum depinximus. Apuleius Græcis κόμα-pov appellari scripsit, quod si verum est, longè alia est à comaro, quam ex Dioscoride, Galeno, & aliis descripsimus: hæc enim arbor est, illa herba. Fragaria à verbo frago, quod odorem reddo significat, nominata est, Gallis *fraisier*, fructus fraga, *fraises*, Germanis *Erdbeer*. Seruius mora terrestria vocat. Fragariam ex quinquefoliorum genere esse quidam arbitrantur, quod falsum esse ipsa quinquefolij plantæ

Nomina

In hist. plā.
cap. 327.In Dum.
cap. 1.

Genera. inspectio apertissimè testatur, vt fusiùs suo loco dicetur. Fraga nascuntur in montibus & siluis, quæ dicuntur montana, & siluestria. Alia in hortis, & dicuntur sativa. Distinguntur & colore, non tantùm loco. Sunt enim quædam alba, quædam

Forma.

FRAGARIA.



Locus.

Tempus.

Dodo. lib.

1. cap. 17.

Vires &

Temper.

In lib 4.

Diosc. cap.

38.

rubra. Fragaria humi sine caule spargitur, multis à radice lanuginosis pediculis, singulis ternis folia sustinentibus, quinquefolio quodammodo similia, crenata in ambitu, venosa, flores sunt candidi, intus lutei, figura quinquefolij floribus proximi, fructus initio viridis, rotundus, cum maturuit ruber vel albus, tum gustu, tum odore suavisissimus, radix foris atra aut rubescens, intus candida, multo fibrata capillitio.

Alia in siluis & opacis montibus gignitur. Alia in hortis colitur. Aprili mense floret, Maio & Iunio fructus est maturus, fragaria & fraga viridia, necdum matura frigido, siccoque sunt temperamento, fraga matura frigido & humido, fragaria auctore Matthiolo refrigerat ordine primo, siccátque secundo, folia & radix vulnera & vlcera sanant, muliebres fluxus & dysenterias cohibent, urinam cient, & lienì cõferunt. Herbarum & radicum decoctum potum auxiliatur iocinoris inflammationibus, mundátque renes & vesicam. Eodem si colluatur os, gingivæ roborantur, dentes firmantur, destillationes sistuntur. Fraga verò biliosis æstuatibusque ventriculis prosunt, & sitim sedant. Vinum quod ex iis exprimitur vlcusculis, quæ in facie à caliditate oriuntur mirificè medetur: varos & oculorum nubes, calidasque defluxiones impositum tollit.

CUCURBITA.

CAP. XXVIII.

Nomina



VNC cartilaginei generis plantas cucurbitas scilicet, & cucumeres, atque id genus alias per horri nostri areas digeramus. Κολόκινθα, θης, κολοκινθή, & κολόκιντα Græcis, Latinis Cucurbita dicitur, à concur-

Lib. ix. 20.

Athe. lib. 2.

uatu, quod facile si quid obstiterit, aut fuerit impedimento quò minus extendatur, incurvescat. Græci, vt scribit Ruellius, ex aduerso vocabulum imposuere, colocyntham nominantes, quod scilicet pumili breuésque sint fructus, quos ipsa passim enititur, cum corporis mole omnes herbarum arborumve fructus videantur superare. Euthydemus, cucurbitam vocauit Indicam cucumerem, quod semen eius ex India fuisset delatum. Menodorus duplicem esse cucurbitam dixit, vnâ Indicam, quæ σικύα, id est, cucumis, alteram quæ κολοκινθή vocatur. Helespontij longas vocarunt σικύας, cucumeres, rotundas cucurbitas. Tanta porro naturæ cognatio est inter cucurbitas, cucumeres, pepones, & melopepones, vt sepe numero & proprietates, & nomina Græci confundant. Illud quoque ventricosum instrumentum quod corpori affixum vel spiritu, vel leui scarificatu sanguinem elicit, Græci à cucumere σικύαν, Latini à cucurbita per diminutionem cucurbitulam cognominarunt. Globosæ verò cucurbitæ cum penitus inaruiissent, à principio venerunt in vsus medicorum. Nunc ex ære, cornu, vitroque confinguntur. Cucurbitæ duo potissimum sunt genera. Cucurbita sativa siue hortensis, quæ κολόκινθα ἐδωδέλιμος, id est, cucurbita edulis dicitur, Arabibus Haraha, Hara, seu Charba,

Charba, Italis *Zucca*, Germanis *Kurbß*, Hispanis *Calabazza*, Gallis *Courge*, & *Concourde*. Altera agrestis, de qua postea. Latini siue cucurbita in globum tumeat, siue teres in longitudinem extendatur, eodem vocabulo sunt complexi, neque ob dissimiles formas, natura & viribus differunt. Varia enim in iis forma arte facile effingi potest, vt dicemus. Herbarij tamen varias eius species & formas, & locis distinctas enumerant. Plinius duo cucurbitæ genera facit. Vnum reptantibus flagellis scandens parietum aspera in tectum vsque, natura sublimitatis arida. Vires sine adminiculo standi non sunt, velocitas pernix, leui vmbra cameras ac pergulas operies: inde camerarium vocatur. Alterum plebeium quod humi repit. In priore mirè tenui pediculo libratur pondus immobile auræ. Cucurbita quoque omni modo figuratur, vaginis maximè vitilibus, cōiecta in eas postquam defloruit. Crescit qua cogitur forma, plerumque & draconis intorti figura. Libertate verò pensili concessa iam visa est nouem pedum longitudinis. Ex quibus perspicuum est genera quæ herbarij ad formam respicientes constituunt, cucurbitæ camerariæ & plebeie species esse. Vnam scilicet maiorem, alteram verò minorem. Maiorem vocant à floribus & fructu quos maiores habet. Minorem cui hæc minora sunt. Tertiā

Lib. 19. c. 5.

Fuchf. cap.

137.

Dodo. lib.

5. cap. 32.

In libr. 2.

Diosc. cap.

127.

Forma.

CUCURBITA Cameraria, longa.



longiorem à fructu oblongiore. Matthiolus etiam triplicem tradit esse cucurbitam. Longam, rotundam, & sessilem. Cucurbita longa flagellis longis, sarmentosis, teneris, angulosis, vitis modo sese diffundens per humum repit, nisi adminicula nacta fuerit, quæ capreolis suis, quos secus folia singulos producit, facile complectitur: iisdem etiam arbores & pergulas scandit, seseque illis implicat, folia ex interuallo profert singula, singulis petiolis insidètia, ferè rotunda, nisi maximè anteriore parte acuminati anguli emerent, subcandicantia, tactu mollia, leuiter hirsuta, ampla admodum, asari foliis haud multum absimilia, flores iuxta capreolos & folia albos, figura liliaceos, vel in quinque foliola stellæ modo diuisos, intus hirsutos partim steriles, partim fœcundos, qui sic facile internoscuntur. Steriles breues habent in medio apices, & hirsutiores sunt, nec qua pediculo iunguntur tuber siue capitulum vllum intercedit, futuri fructus spes: fœcundi verò in medio tria crassiuscula bifidaque stamina continent, nec statim pediculo hærent: nam inter ipsos & pediculum capitulum paruum & leui-

ter hirsutum extuberat, cucurbita futura, iuxta adnexam in angustum collum desinens, quod marcescente flore paulatim accrescit, deinde in magnam & longam molem, quam cucurbitam vocamus auctum maturescit. Fructus is primum herbaeus est, & lanuginosus, cortice tenero, pulpa candida, gustu dulci, in maturitate flauus, cortice duro, pulpa fungosa, seminibusque plena. Ea plana sunt & compressa, altera parte acuminata, eaque duabus eminentiis veluti cornuta, altera latiuscula, quorum cortex lignosus est & candidus, gustu dulcem nucleum includens. Tota planta radice nititur candida, in multas radículas distracta. Cucurbita cameraria maior siue sessilis viticulis, foliis, floribus, semine superiori similis est, fructu distat, qui in hac in orbem collectus intumescit, crassusque & latus est. Huic

CUCURBITA Came-
raria maior,



proxima est cucurbita cameraria minor, siue rotunda, nisi quod semine minore est, & fructu in breue crassamentum coacto, collo oblongiore angustioréque. Sed hæ diuersæ cucurbitarum formæ olitorum arte possunt effingi. Nam semina quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt cucurbitas : item ab imis, sed non comparandas supradictis : quæ in medio rotundas : quæ in lateribus crassas, breviorésque. Si verò cordi sit, vt fiant incrementi vastioris, de media parte cucurbitæ semen inuerso cacumine posito. Eæ cum inaruerint in vsum veniunt cadorum vice ad vina atque alia condenda, quod aluo capaciore plus cæteris intumeant, viatoriis ferè vasis dicatæ. Quæ seruantur ad semina, vsq; ad hyemem in sua vite depêdeant: deinde in sole siccentur aut fumo, ne semina putrefacta depereant. Sunt & alia cucurbitarum genera peregrina, quas ferunt ab occidentis Indiis asportatas fuisse, vnde, cucurbitæ Indicæ à multis cognominantur. Hæ magnitudine, figura, colore differunt, omnes tamen ad melopeponum figuram, accedunt. Aliæ magnæ

Cap. 266.

sunt, aliæ paruæ, aliæ mediocres. Aliæ rotundæ, qualis hîc exhibetur. Aliæ oblongæ, qualis & hic depicta est, cuius fructus admodum flauus est, quem Fuchsius nomine cucumeris Turcici depinxit. Sunt & varij coloris. Foliis sunt longè maioribus quàm nostrates, firmioribus, asperis, vitigineis, rigido pediculo adnexis, sar-

CUCURBITA Came-
raria, minor.



CUCURBITA
Indica, rotunda.



mentis

CUCURBITA Indica longa.
Cucumis Turcicus, Fuchsy.



CUCURBITA
verrucosa.



mentis crassis, angulosis, asperis, & hirsutis, quæ longo reptatu per humum diffunduntur, per-
 tictis etiam, & aliis adminiculis innixa pergu-
 las & attegias scandunt & opacant: flores illis
 magni, liliorum effigie, aureo colore, fructus
 autumnò decerpuntur, qui totam hyemem in
 culinis asseruatur, semen includunt magnum,
 amygdalini nuclei figura, in quo nucleus dul-
 cis & suavis. Sapor his cucurbitis nō vt nostra-
 tibus vsque adeo insipidus. Ad hæc genera ad-
 iunxit Dalechampius cucurbitam verrucosam
 quæ aliis cucurbitis radice, folio, flore, capreo-
 lis similis est, fructu differt, qui in aliis læui &
 plano cortice tegitur, costis tamen in Indicis
 elatis & eminentibus, in hac verrucarum acro-
 chordonum modo nodis plurimis tuberosus
 est, ludentis lasciuiensq; naturæ visendo spe-
 ctaculo. Præterea cucurbitam laciniatam appel-
 lauit ille, quam peponis lati nomine descripsit
 Dodonæus, cuius fructus compressus est, rotun-
 dus & latus, tenui & molli cortice contextus,
 in ambitu laciniatus: clypei figuram refert, in-
 tus semen album continet, cucumeris semini
 simile, sed maius. Vulgus appellat *des oreilles*.
 Cucurbita quoque siluestris inuenitur, inquit
 Plinius, Somphos à Græcis appellata, inanis
 (vnde ei nomen) digitali crassitudine, non nisi
 in saxosis nascens. Huius commanducatae suc-
 cus stomacho admodum prodest. Cucurbitam
 marinam nonnulli putant esse. A colocynthi-
 de, quæ siluestris etiam cucurbita dicitur, lon-
 gè alia est. Hæc cucurbita somphos Plinij Mo-
 mordica nostra est peritiorum herbariorum
 sententia. Cucurbita amat rigua & fimum, nec
 nisi fata prouenit, plurimūq; iuuatur hu-
 more. Quæ tamen sine multa rigatione con-
 ualuit, fructum iucundioris saporis præbebit.
 Copiam aquæ nacta minorem curam deside-
 rat. In calidioribus locis citius, in frigidioribus
 tardiùs maturefcit. Cucurbitæ cibus quò lon-
 giores tenuiorésq; eo gratiores auctore Pli-
 nio, & ob id salubriores quæ pendendo creu-
 re: minimūq; seminis tales habent, duritia
 earum in cibus gratiam terminante. Inuenta est
 ratio qua cibus quoque seruarentur, eodēq;
 modo cucumis, vsque ad alios penè prouentus,

Lib. 5. c. 29.

Lib. 20. c. 3.

Locus.

Tempus.

Lib. 19. c. 5.

Viresc.

Temper.

& id quidem in muria fit. Sed & in scrobe, opaco in loco arena substrato, scænoque
 sicco opertas ac deinde terra, virides seruari tradunt. Hæc Plinius. Hodie Genuen-
 ses cucurbitam in longas fascias solerter & ingeniosè dissectam in solatu siccant,
 totòque anno subdulces & quasi pauxillo saccharo conditas eas fascias seruant,

CUCURBITA

Laciniata.

Lib. 2. Ali.



Lib. 7. sim.

Lib. 2. c. 127.

tanta est cæli calidioris in ea prouincia commoditas, in iusculis edunt, libra ferè quinis assibus venali. Cruda quidem cucurbita insuavis est, vt docet Galenus, stomachumque lædit, & concoctu est difficillima: adeò vt si quis alterius cibi inopia cucurbitam edere coactus fuerit, pòdus frigidum ventriculo incumbere sentiat stomachumque habeat euersum; ac vomituriat, quo solo vomitu à prementibus symptomatis poterit vindicari. Hanc igitur & alia fugacium pleràque, postquam elixa fuerint, aut statim certè, aut in sartagine frixa, aut assa omnes edere consueuerunt. Cucurbita autem elixa nullam euidètem saporis habet qualitatem. Humidum frigidumque, & ob id exiguum corpori præbet alimentum. Facile autem subsidet cum ob substantiæ suæ lubricitatem, tum ob communem omnium ciborum humidorum rationem, qui scilicet citra adstrictionem sunt humidi. Ad hæc coquitur non ægrè, si modo prius corrupta non fuerit. Id verò illi accidit, cum parata vitiosè fuerit, aut succus prauus in ventriculo fuerit aceruatus, interdum autem

quòd in ipso diu morata sit, quòd aliis quoque omnibus fugacibus quæ humido sunt temperamento solet accidere. Corruptuntur enim in ventriculo ni celeriter occupent subside. Quemadmodum igitur cucurbita quantum in se ipsa est, succum qui in totum corpus alendi gratia distribuitur, habet qualitatis ad sensum expertem, ita cum alicui eorum quæ acrem, aut salinam habent qualitatem mixta fuerit, facile illi assimilabitur. Assa autem vel frixa in sartagine, quamplurimum quidem de propria humiditate deponit, reliquum autem ipsius nullam insignem obtinet facultatem, vti cum nec in iure simplici parata fuerit. Caterum ob aqueam qualitatem sibi innatam meritò gaudet origano. Omnia enim eiusmodi succis acris, vel acidis, vel austeris, vel salis admiscere postulant, si modò in cibo suauia sunt futura, & nauseam non paritura. Quantum verò ad eius in medicina vsum attinet, Galenus humidæ frigidæque temperaturæ esse scribit, vtraque qualitate secundi ordinis. Quocirca ramentorum eius succum ad aurium dolores cum phlegmone iunctos cum rosaceo vtilem esse. Sic tota quoque calida illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. In esu autè humida est & sitim propellens. Dioscorides, cucurbita esculenta, inquit, cruda trita illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam siriasin vocant in sincipite illinuntur: oculorum inflammationes podagræque refrigerant. Succus è ramentis tusus per se, aut cum rosaceo infusus aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardente febre illitu adiuuat. Totius feruefactæ & expressæ succus cū melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excauatam infusum, si mistum sub dio teneatur, potum aluum mitigabit. Quæ postrema sententia cum Græcè legatur, καὶ εἴ τις κοιλίαν ἀντὴν ὤμην, ἐγγχεῖς τε οἶνον, καὶ ἐξαμβλιάσας, κεράσας τε πρὶν νῆστις, μαλάτῃ τὴν κοιλίαν κοῦφως, conuertenda fuit, Si quis autem in ipsam crudam excauatam vinum infuderit, & sub dio reliquerit, ac temperatū ipsum ieiunus biberit, aluum molliet leuiter. Verum vbi vulgares codices habent πρὶν νῆστις legitur in vetere codice δλὼν πιεῖν, hoc est bibendum

bibendum perrexerit. Plinius eadem quæ Dioscorides, & plura remedia ex Cucurbita describit. Cucurbitæ sativæ rasæ succus tepesfactus auribus medetur. Caro eius interior sine semine clavis pedum, & suppurationibus, quæ Græci vocant apostemata. Decoctæ autem vniuersæ succus dentium motus stabilit, & dolores inhibet. Vinum cum ea feruesfactum oculorum etiam impetus. Folia eius cum recentibus cupressi contusa & imposita: ipsa quoque tosta in argilla, ac trita cum adipe anseris vulneribus medentur. Nec non ramentis corticis recētes podagras refrigerat, & ardores capitis, infantiū maximè. Et ignes sacros vel strigmentis his impositis, vel seminibus. Succus ex strigmentis illitus cum rosaceo & aceto febrium ardores refrigerat. Aridæ cinis impositus mirè combusta sanat. Chrysippus medicus eas damnabat in cibis. Sed omnium cōsensu stomacho utilissimæ iudicantur, & interaneorū vesicarumq; exulcerationibus. Quos itaque Plinius dixit capitis ardores & maximè infantiū, Dioscorides σφραῖσι παιδίαις habet: σφραῖναι verò παιδία sunt pueri, quos inflammatio partium circa cerebrum & membranas eius vexat: ita enim Paulus scribit: Σφραῖσις ἐστὶ φλεγμὴ τῶν περὶ τὸν ἐγκέφαλον ἔμφυτας μωρίων. Et mox ipse Cucurbitæ ramenta ad siriasas præscribit. Plinius alibi adustionem infantiū siriasim vocat. Ossibus in canino fimo inuentis adustio infantiū, quæ vocatur siriasis, adalligatis emendatur. Et alibi infantiū destillationes, folia, inquit, infantiū destillationibus, quod siriasin vocant, illita medentur. Aliquando simpliciter Græco verbo utitur, ut siriasēsque infantiū spongia frigida cerebro humefacto, rana inuersa alligata efficacissimè sanat, quam aridam inueniri affirmant. His modis Plinius siriasin reddidit. Strigmenta verò eadem quæ ramenta idem vocat Dioscorides ξύσμαλα, & ea succo febrium ardores refrigerare tradit, quod Dioscorides ait: πρὸς χυσομύρην ἐπιπράνδαν ἐγγερόμυρος ὠφελεῖ, idest, adustiones cutis in ardente febre illitu adiuuat. Vel ut vertit Cornarius, Cuti summæ à febris ardore, ac æstu vexatæ illitus prodest.

Lib. 20. c. 3.

Lib. 1. c. 13.

Lib. 30. c. 1.

Li. 22. c. 21.

Li. 32. ca. 10.

CUCUMER SATI VVS.

CAP. XXXIX.

CΥΣ, & σίκυος ἡμερος, & σίκυον Græcis, Cucumis & Cucumer Latinis dicitur, à curuore, ut Varroni placet, quasi Curuimer. Demetrius auctore Athenæo, σίκυος dictos esse ait ἀπὸ τῆς σέυεδαυ ἔκφυ, idest, quod venerem cieant, cum contra veneri refragentur. Inde prouerbiū fuisse commemorat Athenæus, τὸν σίκυον τρώγσσα γυνή, τὴν χλαῖναν ὕφαρε, idest, texens palliū mulier cucumerem deuoret. Cum enim textrices magna ex parte, si Aristoteli creditur, sint impudicæ, ut in iis veneris impetus refrenetur, adagium edendos cucumeres textricibus consulebat: nam venereorū auiditatem inhibere tradidit Diphilus. Quare καὶ ἀνίσφρασιν nomen impositum ei fuit. At potius σίκυοι dicuntur ἀπὸ τῆς σέυεδαυ ἔκφυ, quod ad gignendos, spargendos, diffundendos ramos caulesq; valdè incitentur, non quod venerem stimulent. Matron suis carminibus terræ filium Cucumerem nominauit. Heraclides Tarētinus Hedygeon, quasi terræ suauitatem. Recentiores Græci Cucumeres ἀγέχεια vocarunt. Symeon Sethi, ἀγέχεια τὰ λεγόμενα σίκυα, καὶ κοινὴν ὃ τετράγωνα. Anguria Cucumeres dicuntur, communi sermone tetragura, Arabes Chathe, Chetha vocant, Itali Cocomero, Hetrusci Cedriuolo, quasi Citrulum, Germani Cucumern, Hispani Cogombro, Galli Concombre. Est Cucumis satiuus, est & filuestris. Cucumerum Græci tria genera fecere, inquit Plinius ex Theophrasto, Laconicum, Scytalicum, Bœoticum. Ex his tantum Laconicum aqua gaudere. Cucumerem Dioscorides, ut vulgaris notitiæ plantam nō descripsit, sed nec aliorum veterum vllus suis notis nobis illum repræsentauit. Quare dubitatur à multis an Cucumeris nostratis vires capite huic dicato exposuerit Dioscorides, an verò

Nomina

Lib. 3. deipno.

Athen. ibi.

Genera.

Lib. 19. c. 4.
Lib. 7. hist. cap. 4.

Li. 2. c. 128.

Li.2. Dios.
ca.128.

Li.19.c.5.

Ibidem.

Forma.

vulgaris anguriæ. Sed Dioscoridem cæterosq; Græcos σίκυος nomine Cucumeré, Gallorum *Concombre*, intellexisse veris coniecturis assecutus videtur Matthiolus. Scribit enim Dioscorides Cucumerem siluestrem fructu solo à satiuo differre, cū foliis, floribus, sarmentis satium prorsus referat. Quibus omnibus cum hic illi prorsus similis sit, nemini dubium esse debet Dioscoridem de Cucumeris nostri vulgaris, non de anguriæ viribus hoc capite tractasse. His accedit Plinij auctoritas ita scribentis. Cucumeres crescunt qua coguntur forma, in Italia virides, & quàm minimi, in prouinciis quàm maximi, & citrini aut nigri. Placent copiosissimi Africæ, grādissimi Mœsiæ. Viuunt hausti in stomacho in posterum diem, nec perfici queunt in cibis, non insalubres tamen plurimum. Quæ de Cucumeré nostro verissimè dici possunt, minimè verò de anguria. Nam anguriæ in Italia in magnam excrescunt molem, ac cum aqueæ sint substantiæ, ac prædulces cum maturæ fuerint, facilè à ventriculo descendunt, quod Cucumeribus nostris nō euenit, qui cum frigido glutinosoq; sint succo, ob id concoctu contumaces, non nisi longo tempore labuntur. Præterea Cucumeres eodem auctore, in fistula flore demisso, mira longitudine crescunt: quod in Cucumeribus nostris certa experientia compertum habemus. E quorum semine qui postea sunt orti, eandem retinuerūt formam, vt in vite sua pendentes longi, & anguium modo contorti spectentur. Ad hæc natura oleum odere mirè, vt idem scripsit: nec minùs aquas diliguunt. Deiecti quoque ad eas modice distantes adrepunt: contra oleum refugiunt: aut si quid obstat vel si pendeant, curuantur: idq; vel vna nocte deprehenditur, si vas cū aqua subiiciatur, quatuor digitos descendantibus ante posterū diem: at si oleum eodem modo sit, in hamos curuatis: quod anguriis, quæ globi instar rotundæ semper sunt, euenire non potest. Cucumis satiuus igitur & esculentus viticulis, longis, asperis per terram repit, in quibus folia scabra, & quadamtenus rotunda, capreoliq;. Flores in pallido lutei: fructus longus, cartilaginei generis, tuberculis maculosus, initio viridis, postremo luteus: semen intus cādīdum, latum. Huius species est Cucumis anguinus Columellæ: foliis, floribus, sarmentorum reptatu superiori similis: fructu dissimili, longo tres pedes, atque etiam amplius, angusto, leuiter striato, è viridi nigricante, anguē figura imitante. Quo fit, vt vel hoc genus sit à vulgari Cucumere diuersum, vel fructu vulgaris in fistulam demisso, & ad eam longitudinem extento, semen inde exemptum seruatumq;, talem Cucumin gignat. Cucumis feritur in hortis: aprica loca amat: hyemem odit & frigora. Particulatim autem floret, vt scribit Plinius, sibi ipse superflorescens, & sicciore locos patitur, candida lanugine obductus, magisq; cum crescit. Mira voluptate Tiberio Principi expetitus, vt refert Plinius, nullo quippe non die contigit ei, pensiles eorum hortos promouentibus in solē rotis olitoribus, rursusq; hybernis diebus intra specularium munimenta reuocantibus. Quin lacte & mulso semine eorum macerato, apud antiquos Graciæ auctores scriptum est feri oportere, vt dulciores fiant. Sic apud Theophrastum, Τὰ τῶν σικύων σπέρματα γάλακτι βρεχόμενα καὶ μελικρατῶν γλυκυτέρας

CVCVMIS Satiuus.



Locus.

Tempus.
Lib.19.c.5.

Ibidem.


Lib.3. cauf.
ca.12.

specularium munimenta reuocantibus. Quin lacte & mulso semine eorum macerato, apud antiquos Graciæ auctores scriptum est feri oportere, vt dulciores fiant. Sic apud Theophrastum, Τὰ τῶν σικύων σπέρματα γάλακτι βρεχόμενα καὶ μελικρατῶν γλυκυτέρας

γλυκυτέρας

(VCVMIS Longus.

(VCVMIS Anguinus.



γλυκύς πρὸς τοῖς. Idest, Cucumerum semina lacte & melicrato si macerentur, eos dulciores efficiunt. Inuenta est ratio, inquit Plinius, qua cibis seruantur Cucurbita & Cucumis, vsque ad alios prouentus: & id quidem in maria fit. Sed & scrobe opaco in loco arena substrato, scenoq; sicco opertos, ac deinde terra, virides seruari tradunt. Salgamari, hodie sale, aceto, sceniculo, sampsucho condiunt. Alij trita sinapi cum aceto. Cucumeres, vt tradit Galenus, vrinam quidem, vt & pepones cient, sed minus quam illi, quod ipsorum substantia minus est humida, ideoq; non facile, vt illi, in ventriculo corrumpuntur. Inuenias autem qui ipsos bellè concoquant. Qui autem eo ipso fisi affatim sese impleuerunt, tandem longo tempore succum frigidum ac mediocriter crassum in venis coaceruant, qui in ea concoctione qua in venis fit haud facile mutationem in probum sanguinem recipit. Quam ob causam omnibus prauis eduliis abstinendum, etiamsi ea quibusdam concoctu sint facilia. Nobis enim non aduertentibus prauus succus ex ipsis post longum tempus in venis colligitur, qui postea exiguum ad occasionem putredinem nactus, febres malignas accendit. Et alio in loco. Cucumis esculentus maturus quidem tenuioris essentiae est, immaturus autem crassioris. Sed & abstergendi & incidendi facultas eis inest. Quare & vrinam mouent, & corpus splendidum reddunt, ac magis quoque si quis semine arefacto contusoq; atque cribrato vice pulueris absterforij vtatur. Superat in eis frigida humidaq; temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen, aut radicem arefaciat, haud etiam humida fuerit naturæ, sed iam desiccantis: idq; in primo quodammodo ordine, aut etiam secundo, sed incipiente. Est & in istis maior abstergendi facultas, quam in fructus ipsius carne. Quibus consentanea sunt quæ de eodem Dioscorides tradidit. Satiuus Cucumis aluo & stomacho perquam utilis habetur: refrigerat, corruptionem non sentit. Vesicæ prodest, olfactu reuocat quos animus liquerit: semen modicè vrinam mouet: cum lacte aut passo vesicæ vlcerationibus subuenit. Illita cum vino folia morsus canum sanant, & epinyctidas cum melle. Hæc Dioscorides, Quorum initium paulo aliter conuerti debuit.

Sic enim

Ibidem.

Li.2. Alim.
Viresc.
Temper.

Li.3. simpl.

Li.2. c.128.

Sic enim Græcè habetur, *Σίκυς ἡμερος δίκολιος, δ' ὅμαχος, ψυδικὸς & φθέρμυθος*. Id est, Cucumis sativus aluum lenit, ventriculo est gratus, refrigerat si nō corrumpatur. Quæ postrema ideo adiecit Dioscorides, quod si Cucumis in ventriculo corrumpatur, biliosum & acrem humorem, atque inde ardentissimas gignit febres, ut eo non modo non refrigeretur corpus, sed etiam exuratur. Id quod Galenus docet cum aliis locis, tum libro de Euchy. & Cacochy. his verbis. Sunt autem inter fructus Cucumeres, & Pepones, & Melopepones. Sed qui à bonitate succi tantum absunt, ut nisi celeriter transeant, in ventre corrupti succum ex ea corruptione faciant mortiferis venenis proximum. Horum probatissimorum auctorum sententiæ ut assentiuntur omnes, adstipulante ipsa etiam experientia, ita Diphili Carysij opinio reprehensione digna, qui apud Athenæum Cucumerem noxium damnauit primis mensis, ut qui raphani modo sursum feratur, ultimo cibo innocentiorum esse, concoctūq; faciliorem, alioqui vsum eius abdicauit. At contra cum prauus sit succi, ante alios omnes cibos sumendus, ut facilius per aluum subeat, nec in eo corrumpatur, quod facile ei eueniet, si aliis cibis postremus ingeratur. Addidit his quæ vera sunt, vrinas eo cieri, refrigerandi vim habere, difficile in corpus distribui, ægrè per ventris anfractus euadere. Quinetiam horrores conciliare, bilem creare, venærem arcere. Plenilunio maximè gliscunt in hortis Cucumeres, manifestumq; capessunt incrementum, & more marinorum echinorum implentur, ut tradit Athenæus, quod est aquei humoris incrementum. Sunt qui herba, quæ vocatur Culix nomine, trita, semen eorum macerari iubent, ut sine semine nascantur, vel prius eorum semina Sesamino oleo perungi. A mulis Cucumeres expetuntur, capiunturque mira eorum voluptate, nec non odorem minus sentiunt. Quare munienda sunt Cucumeraria, ne irrumpentes ea depopulentur, ac proterant.

PEPONES, MELOPEPONES. CAP. XXX.

Lib. 19. c. 5



UNT etiam Cucumerum species Pepones: & horum Melopepones. Plinius tradit Cucumeres cum magnitudine excessere Pepones vocari. Ecce, inquit, cum maximè noua forma eorū in Campania prouenit, mali cotonei effigie. Forte primo natum ita audio, vnū mox semine ex illo genus factum, Melopepones vocant. Non pendent hi, sed humi rotundantur. Mirum in his præter figuram, coloremq; & odorem, quod maturitatē adepti, quamquam non pendentes, statim à pediculo recedunt. Ex quibus verbis intelligere licet Pepones in genere cucumerum esse, & Melopepones in genere Peponū: quos Palladius Melones appellat, à mali Cydonij figura, quā referūt nomine cōposito Melopepones appellatos. A Peponibus autem differunt, quod Pepones maiores sunt, magis striati, magisq; succulenti, sed minùs grati, carne molliore, & semine pauciore, oblonga figura, ut cucumeris, Melopepones globosa. Πέπων igitur Græcis, inquit Galenus, τὸ πέπων, hoc est maturum significat, quod omnibus aliis fructibus maturis conuenit. Sed peculiarem fructum hoc nomine appellarunt, quomodo atramentum quo scribimus μέλαν, id est, nigrum. Quare medici non simpliciter fructum hunc nominare voluerunt Pepona, sed σίκυς πέπων, id est, Peponem cucumeralem. Aristoteli σίκυς πέπων dicitur, & Polluci. Quinetiam περυσίας. de quo Dioscorides, Galenus, & Plinius seorsum à cucumeribus & Melopeponibus tractarunt, Gallis *Pepon*, & *Poupom* dicitur. Eius permulta sunt genera, quæ sapore, figura & colore distinguuntur. Est enim ventricosus Pepon, qui à pediculo ad vmbilicum vsque striatus & canaliculatus est. Alius quam foeminam vocant, minùs striatus. Quidam totum corticem textura quadam reticulari

Nomina

Li. 2. Alim.

Prob. se.
20. quæst.
32.

Genera

culari, miro naturæ artificio conspersam habent. Aliquorum fructus grandis est, humani capitis instar, aliquando etiam maior, nonnullorum longè minor. Sunt qui herbaceo sunt colore, alij flauo, alij pallido, nonnulli cinereo. Interior quoque pulpa varia: in quibusdam enim rubet, in aliis albicat, in nonnullis ex albo rufescit. In quibusdam dulcis, & gustui suauissima, in aliis insuavis & insipida. Sunt item qui Hircini, & vulgò Turcici dicuntur. Melo pepones etiam varij sunt, nunc magni, nunc mali Cydonij figura & magnitudine. Horum caro interdum candida est, interdum flaua, quandoque pallidior, aliquando solidior, aliquando laxior. Præferuntur candidi, solidi, ac sic dulces, vt saccharo conditi videantur, quos ideo Saccharatos vocant, Galli *Succrins* & *Succredes* vocant. Præterea quibusdam semē pulpæ firmissimè inhæret, vt cultelli mucrone particulatim euellendum sit, aliis in medulla humida semen iacet, quæ concusso fructu separatur sponte, ac decidit à reliqua pulpa disiuncta. Sunt præterea qui olitorum mangonio rosarum & moschi odorem spirant, seminibus qua parte germināt parumper apertis, & aqua rosacea quæ moschum exceperit, maceratis. Est genus quoddā hybernū, quod in area non maturefcit, sed flauescit laquearibus appensum, magnāq; voluptate hyeme comeditur. Hoc Hetrusci melle saccharove condiunt citrei pomī modo. At citrulus & anguria Peponum etiam species sunt. Hæc omnia Peponum Melo peponumq; genera scilicet in Gallia proueniunt. Pepo longis ac viticulosis sarmentis & hirsutis per terram reptat cucumeris modo. Folia profert vitis similia, non tam profundis incisuris diuisa, scabra, hirsuta, & iuxta hæc capreolos quibus vicinis sese alligat: flores magnos, luteos: fructum magnum, crassum, rotundū,

Forma.

P E P O.

M E L O P E P O.



ea varietate quam diximus distinctum: in quo semen includitur, latum candidū semine Cucumeris maius. Melo pepo similibus viticulis per terram reptat, sed minoribus, foliis etiam similibus, sed minoribus, nec tam altè incis: floribus itidem similibus & luteis: fructu minore, rotundo, varioq; vt diximus, semine itē minore. Ex multis qui ex eadē planta nascuntur fructibus pauci sunt qui bonitate excellāt, ceteri

*Tempus.**Li.2. c.128.**Vires &**Temper.**Li.2. c.127.**Embl.121.
lib.2.**Lib.20.c.2.**Emb.121.li.
2. Diosco.**Li.2. Alim.*

cæteri sunt insuaues. Odor suavior, crassior pediculus, pondusq; bonitatis sunt indicia. Gaudent læto & aprico solo ac libero, quò possint latius euagari. Rigatione gaudent si pluviae defecerint. Cum verò maturefcere cœperint, pluviae iis aduersissimæ sunt, ab iisq; insipidi, & gustui insuaues redduntur. Calidiore loco & æstate citius, frigidiore tardius maturantur. Peponis caro, vt tradit Dioscorides, in cibis vrinam cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius cōtra siriasin sincipiti imponuntur: fronti admota oculorum fluxiones auertūt. Succus cum semine adiecta farina siccatus in sole, cogitur in smegmata, quæ faciē repurgant, & nitorem adferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota drachmæ pondere vomitionem mouet. Si quispiam moderatè secundum cœnam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illita cum melle vlcera, quæ ceria vocant. In his quæ interpretes & rectè quidem transtulit. Ramenta eius contra siriasin sincipiti imponuntur, in vulgatis exemplaribus leguntur, τὸ δὲ βρέγμα ὡς σιριῶσι παίδις καὶ τὸ βρέγματιος ἐπιθῆναι, videtur βρέγμα mendosè pro ξέσμα positū fuisse, sicut ipse etiam Dioscorides de cucurbita dixit, τὸ δὲ ξέσμα ὡς παίδις σιριῶσι ὠφελίμως καὶ τὸ βρέγματιος χαλαράσσει. Id est ramenta eius infantibus siriasi vexatis sincipiti vtiliter admouentur. Cornarius tamen vocis βρέγμα lectionem non improbat, & significare videtur, inquit, sinciput, & apicem, ac summam Peponis partem, quæ recisa eum vsum præbeat, quem cucurbitæ ξέσμα, id est, ramentum. Eadem ferè à Plinio traduntur. Pepones qui vocātur, refrigerant maximè in cibo, & emolliunt aluum. Caro eorum epiphoris oculorum, aut doloribus imponitur. Radix sanat vlcera in modum faui, quæ ceria vocant. Eadem contra vomitiones siccatur, & in farinam tusa datur quatuor obolis in aqua mulsā, ita vt qui biberit, quingentos postea passus ambulet. Hæc farina & in smegmata adiicitur. Cortex quoque vomitionem mouet, faciem purgat. Hæc Plinius. Qui, nisi mendosi sint codices, Dioscoridi & Galeno planè aduersatur, cum dixit radicem contra vomitiones ficcari, vt legendum putet Hermolaus. Eadem contrahit vomitiones: siccatur, & in farinam, &c. Cornarius legit, Eadem ad vomitiones siccatur, &c. quam emendationem perspicuè approbat sequens Plinianæ orationis contextus. Quod verò dicit radicis farinam in smegmate addi, an de eadem Dioscorides intelligat cum scribit succum cum semine admixtum, ad farinam siccatum in sole cogi ad smegmata, dubitari sanè potest. Nam etsi radici eandem quam Plinius vomitiones concitandi vim tribuat Dioscorides, nulla tamen adhuc radicis mentione facta, eius farinam qui potuit intelligere? At cum ad eum vsque locū de Peponis carne tantum tractarit Dioscorides, cum etiam hæc Galeno abstergendi vi prædita sit, magisq; semen ipsius, eius carnis exsiccatae farina hoc loco accipienda videtur, vel τὸ ἀλάρον simpliciter farina aliqua vulgaris vt triticea, vel hordeacea, quæ si non ad abstergendū, certè ad pastillorum formam effingēdam, succo & semini admisceatur, eaq; forma illa excipiātur. Galenus apertè naturam Peponum, & Melopeponum expresit his verbis. Vniuersa Peponum natura frigidior est cum humiditate copiosa: habent autem vim quandam abstergendi, cuius beneficio vrinam cient, & deorsum expeditius quàm cucurbita, Melopeponéſve permeant. Quod porrò abstergeant intelliges, si sordidam cutem ipsis fricueris. Quamobrè si quis maculas à sole contractas, aut lentes in facie habeat, aut alphos, hos quoque detergent. Semen autem potentiùs deterget, quàm ipsorum veluti caro, adeò vt aduersus renes calculo infestatos conueniat. Succum autem in corpore gignit caro vitiosum, idq; potissimum cum concocta probè non fuerit. Quo casu cholerae morbo obnoxios efficere consuevit. Quinetiam priusquàm corrupta fuerit, ad vomitiones quoq; est idonea, largiusq; sumpta (nisi quis post ipsum aliquid eorū quæ probi sunt succi supermandat) omnino vomitum excitabit. Hæc Galenus de

Peponibus

Peponibus, qui quod radici Peponis tribuerunt Dioscorides & Plinius, ipsius Peponis carni adscripsit, De Melo peponibus verò sic. Melo pepones minùs quàm Pepones sunt humidi, nec adeò prauis sunt succi, minùs item vrinas mouent, tardiusq; deorsum descendunt. Ad vomitum præterea excitandum, non tantùm quantum Pepones habent momenti. Sicut nec celeriter adeò, vt illi, in ventriculo corumpuntur, quum prauus humor in eo collectus fuerit, aut alia quæpiam corruptionis causa ipsum prehenderit. Cæterùm etsi in iuuando stomacho, autumnalibus fructibus longè sint inferiores, haudquaquam tamen ei vt Pepones, sunt noxij: neque enim vomitum, vt illi, excitant. Huc accedit quod in Peponibus homines à carne intima, in qua semen habetur, abstinere: in Melo peponibus autem mandunt, idq; ipsis ad deiectionem confert. Qui verò eorum quasi carne tantùm vescuntur, non tam cito eam ac Peponum excernunt. Ex Melo peponibus in particulas sectis, ari, bryoniæq; radicibus, & limonum succo, ac caprino lacte quod hæc omnia superet additis, aqua vitreis organis, vt vocant, destillatur, qua faciem mulieres adornant, & concinnam reddunt. Seminis Melo peponum & Peponum cremor febrientibus vtiliter ex hordeacea ptisana propinatur, non solum enim refrigerat, sitimq; extinguit, sed etiam obstructions tum hepatis, tum vasorū expedit, & vrinam prouocat. Datur tussientibus, tabidis, & marasmo affectis: atque etiam contra vrinæ ardores valde prodest, additis pastillis ex halicacabo, aut glycyrrhizæ succo, mannæ, gummi arabici, aut tragacanthæ momento. Sed & magis confert, si seminum papaueris cremor accedat, baccarumq; halicacabi, & maluæ decoctum. Peponis siue cucumeris species est, qui Citrus medicis dicitur, quasi Citreolus, quod Citrei mali in forma & colore sit æmulus, Gallis *Citrouille*, Italis *Anguria*, Auicennæ *Batheca*. Andr. Bellunensis in expositione nominum Arabicorum, *Melon abrachi*, inquit, est *Melon Indus*, idest, Anguria communis, quæ apud Arabes quandoque appellatur *Batheca Inda*, quandoque *Batheca viridis*, quãdòque *Batheca filistin*, quandoque *Batheca alzachi*. Est & *Barhec*, seu *Batheca* nomen commune ad omnes species Melonū, & Anguriarum. Serapio cum de Peponibus & Melo peponibus ex Galeni sententia dixisset, peculiare de anguria caput subiicit, quam Arabicè *Dullaha* nominat. In cuius historia & viribus exponendis cum nulla Græcorum, sed Arabū duntaxat testimonia proferat, facile intellectu est angurias veteribus Græcis penitus fuisse ignotas. Eam ob causam eos hallucinari qui Pepones angurias esse arbitrati sunt: item Fuchsiū qui Cucumerem quem primo loco descripsimus, Anguriam esse dixit. Anguria itaque folia fert colocynthidis, maiora, aspera, per ambitum diuisa, alarum seu pennarum instar: caulem sarmentosum, humi repentem sicuti Cucumis & Pepo: florem luteum. Fructum edit magnitudine insigni, rotundum, grauē, cortice læui connectum, herbaceo, maculoso, & qua parte humi iacet albicante. Carne constat humida, aquosa, in aliis insipida, in nonnullis subacida. Semen in ea concluditur latum, Peponum semine duplo maius, cortice solidiore, & nucleo grandiore in quibusdam nigrum, in aliis rubrū. Fructus

Matthi. in lib. 2. Diosc. ca. 128.

ANGURIA, Citrus
Officinarium.



Anguria itaque folia fert colocynthidis, maiora, aspera, per ambitum diuisa, alarum seu pennarum instar: caulem sarmentosum, humi repentem sicuti Cucumis & Pepo: florem luteum. Fructum edit magnitudine insigni, rotundum, grauē, cortice læui connectum, herbaceo, maculoso, & qua parte humi iacet albicante. Carne constat humida, aquosa, in aliis insipida, in nonnullis subacida. Semen in ea concluditur latum, Peponum semine duplo maius, cortice solidiore, & nucleo grandiore in quibusdam nigrum, in aliis rubrū. Fructus

In Hist. pl. ca. 266.
Forma.

*Vires &
Temper.*

etiam immaturus in aceruo tritici diutius asseruatur, illicq; maturefcit. Frigidus & humidus est ordine secundo, siti arcendæ maximè conueniens. Quare Itali ardente sirio eius pulpa sese reficiunt:ardentibus febribus,maximeq; linguę ariditati confert:acres humores reprimat,iisq; præsertim febrientibus auxiliatur,qui humorum malignitate potius vexantur, quàm copia grauantur. Nam anguria, vt Serapioni placet,aluum initio non valenter citat: quare illis conuenit qui tenues & imbecilles, macriq; sunt, ac exangues: quibûsque alterantia potius humores quàm euacuantia sunt ex vfu. Quod quamuis acidis effici possit, insipida tamen, & dulcedine quadam prædita,qualis est anguria,ad id longè sunt aptiora. Etenim acida incidunt & attenuant,quæ cum maciem augeant, & ventriculum lædant, imbecilli corpori, macro & exangui sunt noxia. Quod si acida sint & adstringentia, exsiccat,nihilq; prorsus humectant. Insipida verò quæ crassa sunt substantia,& quibus dulcedo aliqua, vt anguriæ inest, humectant simul & refrigerant, generantque sanguinem aquosum,qui flauæ bilis feruorem coërcet & extinguit, tam in hepate, quàm in venis. Anguria in calidis regionibus suauior prouenit. Ideoq; circa Romam,in Campania,in Apulia,Calabria, Sicilia præstantior habetur,& mole vastior. Semine ex Asia misso Anguriæ Lugduni prouenerunt, externa quidē specie

PEPO MAXIMVS INDICVS, Lobel.



similes aliis, sed carne rubra, & gustu tam dulci, vt aspersæ conditæve saccharo videantur. Est Pepo alius fructu rotundo quadatenus compresso, Melonis effigie, caulibus & foliis hirsutis vulgaris, flore luteo, simili, semine minore albo. His adden-

dus ex Lobellio Pepo maximus Indicus compressus, magnitudine à superioribus discrepans. Fructus interdum octoginta libras pendet:& folia rotundiora.

MELONGENA.

CAP. XXXI.

Li. 2. c. 445.

Nomina

Lib. 4. c. 71.

Diolcor.

Lib. 3. c. 84.

Li. 2. c. 124.

Li. 1. de pl.

Genera

Forma.

MELONGENA scriptum est in codice Auicennæ, & Arabicū nomen est. Itali Poma, corrupto nomine *Melanzanas* vocant, Ligures *Merenzanas*, Hetruscis, teste Matthiolo, *Petranciani* dicuntur, Dodonæo nomine Hispanico *Veranges*, Germanis *Melanzan*, & *Dollopffel*, idest, poma furoris, Gallis *Pommes d'amour*. Quidam suspicātur Mandragoram marem esse Theophrasti. Cur autem Poma amoris appellentur à nostris, haud scio, inquit Ruellius, nisi quod fortassè elegantia & perpulchra placeant, & ita digna quæ amentur. Sunt tamen & alia Poma amoris, vt infra dicetur. Melenzanas mala insana minùs sano iudicio vocat Hermolaus, inquit Scaliger: esitata namque nullos excitant furores: quotidianis bellariis vtuntur Genuenses, Melongena quædam poma fert purpurea, alia in flauo candicantia, siue pallida, sed cæteris omnibus partibus similia: caulem erigit vnicum, semicubitalem, aliquando etiam cubitalē, crassitudine minimi digiti, solidum, lignosumq; teretem, ramosum, subpurpureū, hirsutum. Folia fert lata, fusca, maiori solano haud absimilia, sed subaspera, hirsuta, parum

MELONGENA.



parum & inæqualiter sinuata, in mucronem desinentia. Secus quæ breues, rubentes & hirsuti oriuntur pediculi, & in his singuli aculeati calices, ex quibus singuli item nascuntur flores subpurpurei, aliquando candicantes, in acuminata, & rugosa foliola stellæ modo diuisi, in quorum medio quinque sunt erecta lutei coloris stamina, in medio vno eminente apice. Floribus subnascuntur fructus oblongi, cucumeris ferè magnitudine, plerumq; rubentes, aliquando etiã flauis, & candicâtes, læuissimo cōtecti cortice, succosa, rara, & albicâte intus pulpa: semine numerofo, paruo, siliqua stri æmulo. Radicibus nititur numerosis, in fibras ceu capillamenta distributis. Seritur in hortis & viridariis ineunte vere. Floret æstate, & autūno fert fructum. Planta est frigoris impatiens. Brasauolus & Fuchsius, Hermolaum reprehendunt, quòd putarit Melongenam tertiam esse Mandragoræ speciem, quam Morion vocant, cū scribit. De Morio Mandragora nihil habeo quod addi possit iis, quæ à Dioscoride no-

rantur. Sed quoniam mala terrestria & canina Mandragoræ fructus appellantur, in mentem subeunt quæ vulgò *Melanzana* vocitamus, hoc est, vt ipse puto, mala insana: de quibus nihil à veteribus scriptum fuisse desino iam mirari, quod multa huiusmodi reperio: sicut hercle multa quondam fuere, quæ modo vel ignorantur, vel certè non habentur. Mala ergo insana è frutice vulgari sunt passim nascente, vt Pepones, melones, & cucurbitæ, pari quoque cultu, foliis propè ficulneis: flore oblongo, specioso, candido. Manditur vulgò pomum ex oleo, sale, pipere, fungorum modo coctum. Hæc Hermolaus: Ex quibus nemo sanæ mentis colligat, mala insana Morij mandragoræ fructus esse. Melongena vetus auctore Aui-cenna, noxia est, recens melior. In ea calidam temperiem superare, & siccam esse secundo ordine, ex amarore & acrimonia calligit. Melancholiam gignit, cancrum, lepram, hæmorrhoidas, panos, dolorem capitis, & fœtorem oris. Obstructiones hepatis & lienis efficit, nisi cum aceto cocta fuerit, colorem corporis fœdum, atrum & citrinum, vt mirum sit Auerroëm mala insana commendasse suo quodam modo parata. Fuchsius in his malis haud dubiè, vt in cucumere esculento aut fungo frigidam & humidam temperiem superare scribit. Hodie mala insana elixa, cortice exuta, & in particulas secta, deinde farina aspersa, oleo, aut butyro in patellis frigunt, mensisq; apponunt, sale & pipere condientes: sunt enim gustui non ingrata. Alij vbi paulum inferbuerunt igni, in orbiculos vel taleolas digerunt, & in acetariis ex oleo, vel pipere & aceti momento mandunt. Salgamarij in muria acida seruant, cibo per hyemem & ver ori non ingrato, sed tamen qui ægrius coquatur. Sunt qui his malis vescuntur ad venerem excitandam. Quod fortasse præstare possunt, quod cum concoctu difficilia sint, flatus pariunt.

Locus.

Tempus.

Coroll. ca.

79. lib. 4.

Dioscor.

I. i. 2. c. 450.

Vires &

Temper.

Li. 5. Colle. ca. 201.

Nomina

PEREGRINA quoque est, & à superiore diuersa hæc planta, quæ fructum fert Pomum Amoris nuncupatum, à quibusdam Pomum aureum, Italicè *Pomi d'oro*, Gallicè *Pomme d'amour*, & *Pomme d'or*, Germanicè *Goltoppffel*. Planta hæc caulem producit rotundum pallidum, hirsutum, ternum quaternumve pedum altitudine, ramosum: folia magna, profundius incisa: ex breuibus pediculis flores luteos, quinos senosve simul, quibus succedunt

POMA AVREA.



Locus.

Tempus.

Poma orbiculata, melopeponum modo striata, colore primum viridi, deinde per maturitatem in quibusdam plantis aureo, in quibusdam rubro. Multo accuratius depinxit & descripsit Dodonæus lib.3. purgam. Caules, inquit, habet rotundos, bicubitales & ampliores, multis alis ramosos, succi plenos, facile collabentes, foliis luxuriat multis, multipliciter dissectis, agrimonix ferè modo: flosculi lutei sub foliis prodeunt: excipiunt hos fructus rotundi, profundis crenis striati, mediocris mali magnitudine, per maturitatem aut pulchrè rubentes, aut auri luteo colore relucens, & sine striis, in quibus copiosa humens medulla succi instar, qua semen cõditur. Tota herba grauem fœtidumq; odorem spirat, è viridi colore inalbicat, & aliquantulum hirsuta est. Facile in hortis sata prouenit. Rigatione gaudet & solo pingui. Iulio & Augusto mensibus floret: Autumno fructus perficit: Hæc Mala aurea cum vniuersa planta refrigerant, aliquanto tamen minùs quàm mandragora: quare noxius est ipsius vsus. Poma tamen à nonnullis cum pipere, sale & oleo præparata & cocta eduntur. Præbent autem corpori alimentum quidem perexiguum, & hoc ipsum prauum ac vitiosum. Quidam Lycopersium esse putant memoratum à Galeno in lib. simpl. Alij Glaucium Dioscoridis.

STRAMONIA.

CAP. XXXIII.

Nomina

ST etiam externa hæc planta quæ Italis *Stramonium*, & *Stramonium* dicitur, & *Pomum spinosum*, Turcis *Tatoula*, Græcis hodiè *Paracoccalon*, siue *Barycoccalon*, idest, nux grauians, siue torporem & somnum inducens, quibusdam Corona regis, Venetis *Melospinus*, Gallis *Pommes du Perou*, Germanis *Stech. oppffel*, & *Rauch oppffel*. Cordo Hyoscyamus Perunianus.

In hist. pl.
ca. 264.

Lib. 3. c. 86.
Li. 4. Diosc.
ca. 69.
Li. 1. Diosc.
ca. 141.

Fuchsius stramoniam à nonnullis inter solani species numerari scribit, non quod descriptioni respondeat, sed quod eius folia opij odorem referre videantur. Flores huius herbæ, inquit, suauem lilij odorem spirant. Videtur viribus parum à posterioribus generibus solani differre. Dodonæus Stramoniam sui generis plantam describit. Matthiolus priore commentariorum in Dioscoridem editione idem planè, quod Fuchsius de Stramoniam literis mandauit. Secunda verò editione priore mutata sententia nucem Methel, Stramonij fructum esse cõset Auicennæ auctoritate

STRAMONIA.



auctoritate fretus, qui scribit nucem Methel stupefaciendi vi præditam esse, & similem nuci vomicæ, cortice crassis & breuib; aculeis armato: semine mandragoræ, vt legit Matthiolum, vt ego, citri semini simili. Sic Stramonix fructus nuci imaginem refert, aculeis crassis, & breuib; riget, semen mandragoræ semini simile habet. Nec dubium quin fructus ipse atque tota planta soporiferæ sit facultatis. Id quod plantæ facies solano non absimilis, odorq; illius grauis apertè videtur indicare, vt etiam libro de peregrinis dicemus. Gesnerusq; Stramoniam Fuchsi núcè, Methel Auicennæ esse putat, & mādregoris annumerandā videri posse hanc plantā, aut sui generis potius esse, quā solani. His assentiri videtur Andr. Bellunensis, & nihil aliud nuci Methel nomine describere, quàm Stramonix fructum, his ferè verbis. Nux Methel, inquit, ex sententia Ebeubitar, atque omnium Physicorum Syriorū, & Ægyptiorum fructus est cuiusdam plantæ magnitudine & foliis melōgenæ similis: vnde & à qui-

In Hort.
Germ.

busdam Arabibus Berbengine nominatur, idest, Melongenæ similis. Flos huic est albus, magnus, oblongus. Fructus nux Methel nuncupatus, est veluti nux aspera, cortice spinoso, intus semina habet Pomi mandragoræ seminibus similia, dulcia, pingua. Hoc fructu pharmacopœi & physici Orientales ad stupefaciendū vtuntur, & nucem Methel esse affirmant, quia facultatibus iis præditus sit, quas nuci Methel Auicenna attribuit, eosdem effectus habere experientia ipsa doceat. Stramoniam igitur, siue nux Methel caulem emittit rotundum, binos fere pedes altum, folia habet cineritia, solano ferè similia, sed maiora præsertim ea quæ radici propiora sunt: flores albos, rotundos, cauos, campanæ fere effigie, lilij odore: fructus rotundos pomi instar, virides spinis vndique stipatos, intus melongenæ modo seminibus confertos. Non nisi in herbariorum hortis reperitur. Stramoniam auctore Auicenna, stupefacit, cerebro noxia est, cordi aduersatur. Carum adfert, drachmæ sexta pars sumpta inebriat, drachma vna eadem die interimit.

Forma.

Vires.

BALSAMINA.

CAP. XXXIIII.



BALSAMINE siue Balsamina, aliis Momordica, Venetis & Patauinis *Charantia* dicitur, Hetruscis *Pomum Hierosolymitanum*, Italis quibusdam *Viticella*, Gallis Pomū mirabile, *Pōme de merueille*, Cordus Cucumin puniceum vocat. Lobellius Balsaminā cucumerinam puniceā. Balsamina veteribus incognita, planta est, nisi sit cucurbita somphos Plinij, vt supra monuimus, quæ tenuibus prælongisque, & angulosis flagellis vltro citroque reptantibus euagatur: foliis vitis, aut bryoniæ, sed minoribus, & per ambitum profundius incisis, tactu aspectūque glabris & mollibus. Capreolos prope singula folia producit intortos, quibus vicinis adminiculis sese illigat, & ea comprehendens ascendit. Flores edit cucumeri similes, subluteos, quosdam steriles, quosdam fœcundos. Steriles pauca, breuia, luteaque stamina in medio habent, sed nullum post se tuberculum, quod secuturi fructus principium sit.

Nomina

Lib. I. plant.
ca. III.

Forma.

BALSAMINA,

Matth.



Locus.

Tempus.

Dodon. li.
3. ca. 87.

Vires.

Temper.

Matthi. in
li. 4. Diosc.
ca. 177.

lorésque mulcendos, ad exulceratos inflammatosque vteros siphone iniectum. Idem fructus doloribus hæmorrhoidum mirè auxiliantur, oleo amygdalino

BALSAMINVM,

seu Balsamina femina,

Matthiol.



Balsaminū

Forma.

Fœcundi terna reflexa, bifidaque stamina in medio habent, & post se oblongum capitulum futuri fructus rudimentum, quod dilapsis florum foliolis paulatim in fructum excrescit oblongum, figura plerumque ouatum, siue vtrimque turbinatum, cute carnosâ, tuberosa, aculeis rigente. Huic maturo color est puniceus, & ultimam maturitatem adeptus facile rumpitur ac dissilit, gravidamque aluum seminibus ostendit, anguriæ similibus, sed minoribus, cortice crasso, duro, pingui & lubrico, ac valde rubente contextis. Radice nititur, minimo digito graciliore, in fibras desinente. Nusquam nisi sata & diligenter culta in hortis prouenit, nec citius fructum maturat quàm ineunte Autumno, siue Augusto & Septembri mensibus. Balsaminæ poma ordine primo calida, sicca secundo esse quidam affirmant. Hæc diu in oleo omphacino insolantur, aut in balneo aquæ calidæ, aut in fimo equino calido macerantur. Ex quibus oleum exprimitur præstantissimum ad vulnerum, & mammarum inflammationes inhibendas, do-

lorésque mulcendos, ad exulceratos inflammatosque vteros siphone iniectum. Idem fructus doloribus hæmorrhoidum mirè auxiliantur, oleo amygdalino dulci, aut oleo ex semine lini expresso macerati vt diximus, additis ad singulas olei libras, singulis liquidæ vernicis vnciiis. Idem tam igne quàm feruente aqua ambustis medetur. Punctis fauciatisque nervis vtiliter illinitur. Vulnerum cicatrices attenuat, atque etiam delet. Scribunt recentiores quidam steriles mulieres fœcundas reddi, si à balneo ex iis, quæ ad vterum conferunt parato, eodem oleo vteri osculum perunxerint, deinde cum viris concubuerint. Ramicosis pueris confert eodem locum affectum sæpius inungi. Idem aiunt foliorum puluerem cochlearis mensura ex plantaginis siue equiseti decocto, intestinorum vulnera sanare. Sunt & qui eundem puluerem ad coli dolores, & intestinorum tormina valde commendant. Est & alia planta Balsamine quoque dicta, & Balsamella, sed à superiore planè diuersa, Itali Balsaminum genere neutro vocant, Dodonæus Balsaminam fœminam, vt superiorem marem, absurdè, cum toto genere differant. Lobellius & Pena etiam Balsaminam fœminam persicifoliam. Caulem cubito altiore à radice mittit, rubentem vt in portulaca, inferius circa terrâ, qua manum implere



implere possit crassitudine, superius minimo digito multo graciliorem, cui ab inferiore parte usque ad summum vndique cubitum longi, crassi & recti adnascuntur rami. Li, & caulis, læues sunt. Pingui, carnosæ, succosæq; substantia constant, vt portulacæ caules, sed multò robustiores sunt. Pinguia & mollia totam herbam vestiunt folia, salicis vel tenuifoliæ lauri foliis similia, leuiter per ambitum serrata. Flores sunt venusti, magni, in rufo purpurei, purpureis violis non dissimiles, sed multò maiores, à tergo breuem apicem, & incuruam caudam ferentes, quamuis in anteriore etiam parte longiorem apicem gerant, ex singulis floribus singula capitula prodeunt, hirsuta, in quibus milio æqualia sunt semina, nigra, aliquantulum aspera. Radicibus fulcitur crassis & robustis, à quibus numerosæ aliæ tenues, & pingues descendunt.

CAPSICVM.

CAP. XXXV.

ARECENTIORIBVS planta hîc depicta Piper Indicum, Piper Calcuthium, Bresilicum, & Piper Hispanum nominatur, Gallicè *Poivre d'Inde*, & *Poivre d'Espagne*. Auicennæ zingiber Caninum quibusdam videtur esse, Dodonæo Actuarij Capsicum. Est Fuchsijsententia siliquastrum Plinij, à siliquis nimirum magnis & oblongis, quas producit sic dictum. Quæ & piperitis ab eo dicitur, quòd semen eius Piperis sapore & acrimonia sit, diuersa tamen ab ea quæ ab herbariis vulgò piperitis nominatur. Plinius, Castor inquit, Siliquastrum demonstrabat caule rubro & longo, densis geniculis, foliis lauri: semine albo, tenui, gustu Piperis. Et alio in loco Panax Piperis saporem reddit, & magis etiam siliquastrum, ob id piperitidis nomine accepto. Hanc piperitidè Fuchsius in quatuor distinxit genera. Est enim, inquit, maius & minus siliquastrum. Maius siliquas producit maiores, & colore subnigras, aut fuscas. Minus cōtrà minores profert, & colore puniceas. Tertium longissimas, & colore puniceas. Quantum verò latiores, multoque breuiores producit siliquas. Dodonæus in tria diuisit siliquarū magnitudine & figura distincta. Primum siliquas mediocriter longas & crassas habet, Capsicum appellat, alterum longas & angustas, vnde Capsicum oblongum dictum. Tertium breues, latas & rotundas, & Capsicum latum nominat. Cætera in his omnibus non valde dissimilia sunt. Piperitis caulem emittit cubitalem, aut etiam longiorem, minimi digiti crassitudine, in angulos striatum, viridem, & circa foliorum ramorumque exortus in purpureo nigricantem, intus ceu sambuci medulla farctum. Habet oblonga folia initio lata, dein in mucronem fastigiata, media lauri & solani foliorum similitudine. Flores ex ramulorum alis erumpunt candidi, quinque senisve foliolis stellæ modo dispositis constantes, paucis in medio staminibus, quibus dilapsis rotunda, & sine commissura ex caliculis succrescunt vascula siue siliquæ, ea quæ iam à nobis dicta est longitudine & latitudine, principio viridia, cum maturuerunt subnigra aut fusca

Nomina

Fuchf. cap. 280.

Lib. 5. c. 69.
Lib. 19. c. 20

Lib. 20. c. 27
Lib. 19. c. 19.

Ibid.

Genera.

Ibid.

Forma.

CAPSICVM maius &
minus, seu Piper maior &
minor. Matth.



Locus.
Tempus.
Vires &
Temper.

in primo genere, in reliquis punicea, siue coralli expoliti instar rubefcentia atque pellucida, quæ aperta plurima in flauo candida, compressa, & lenti similia semina, sed tenuiora ostendunt. Radices habet numerosas, tenues, & in minimas fibras diuisas. Caulis, flores, & radices nullam insignem qualitatem habent. Vascula cum feminibus, & quod carnosum in medio est, acerrimo sapore linguam vellicant, & odorata sunt. In hortis ac in fictilibus testaceisque passim prouenit. Aestate floret, decedente flore siliquæ nascuntur. Aliud Capsicum ex Dalechamptio his adiicimus, rotundum scilicet & striatum. Id nascitur in hortis, radice in plurimas exiles fibras diuisa, subluteas, caule cubitali, ac interdum proceriore, virgato, è viridi nigrescente, ramoso, foliis in ambitu laciniatis, ad pediculum latioribus, in extremo acuminatis, superne virentibus, inferne albicantibus, flore paruo, breuibz pediculis nixo, foliolis sex albis constante, in medio luteo, fructu rotundo, rimis profundioribus fisso, rubro, pusillis granis farcto, subflauis, gustu acri. Vis eadem quæ & cæterorum generum. Exotica planta est, &


non nisi magna cum diligentia semine terræ credito prouenit. Lobellius ad Solana refert, & Solanum pomiferum Herbariorum vocat, Vulgò Piper de Gui-

CAPSICVM Latum,
Dodonai.



CAPSICVM Oblongius,
Dodonai.



CAPSICVM Rotundum,
Dalechamp.CAPSICVM Brasilianum,
Clusij.

neque quamvis minime vrat. His addendum Capsicum Brasilianum, quod Clusius observavit in nonnullis Lusitaniae locis, fruticosum, cubitalibus ramis, virentibus, foliis hortensis folani ferè, aliquantulum angustioribus: flore candido, exiguo, ut folani hortensis: fructu in longis pediculis, parvo, initio viridi, deinde nigricante, uti maturuit, rubro, quo clauduntur multa semina latiuscula, alterius Capsici modo, tam feruidi gustu, ut fauces aliquot dies incendat gustatum, floret & fructum profert toto autumno, & in calidioribus regionibus etiam hyeme. Illi vocant *Pimenta de Bresil*, hoc est piper Brasilianum, in qua provincia copiosè nascitur, & multiplici in usu est. Hac Clusius. Valenter excalfacit atque desiccatur, inquit Fuchsius, id quod seminis insignis acrimonia, & foliorum amaritudo evidentiè monstrant, ut certè non temerè plerique hoc semine loco veri piperis utantur, ut quod easdem facultates haud dubiè habeat. Dodonæus hoc piper Indicum calidum siccumque esse ordine tertio, eademque quæ Fuchsius de eius viribus tradidit, quibus addit eo cibos quibus miscetur, croceo colore infici, ventriculum excalfieri, ciborum coctionem promoueri, strumas, cæteraque œdemata discuti, eodem cum melle illito maculas faciei lentiginèsque deleri, frequentem tamen eius usum noxium esse, quod malefica quadam vi eaque occulta præditum sit, qua canes, si id comederint, interimit. Piperitis, inquit Plinius, quam & siliquastrum appellamus, contra morbos comitiales bibitur: utilis gingivis, dentibus, oris suavitati & ructibus. Avicenna zingiber caninum, canes interficere scribit: calidum esse ordine secundo, siccum primo, recens cum semine tritum cutis & faciei maculas lentèsque abstergere, duos tumores digerere.

Lib. 5. c. 69.

Lib. 20. c. 17

Lib. 2. c. 748

Nomina

Lib.2.



Ῥαφανός & Ῥαφανίς Græcis, & Ῥαφάνη Homero, Latinis raphanus, radix & radícula dicitur. Raphanus ἀπὸ τοῦ Ῥα φαίνεσθαι auctore Athenæo,

Lib.19.c.5.

id est, quòd facile appareat, sibi nomen asciuit: nam tertio à satù die profilit. Radicis vocabulum, ut auctor est Varro, è Græcia venit in Latium, cum veteres Græci radicem dixerint, quam nunc raphanum. Nisi quis forsitan arbitretur nomen accepisse, quod cæteras amplitudine superet, vel quàm paucissimis magnitudine cedat. Etenim plerumque in tantam molem accrescit, ut frigidis locis quibus gaudet, sicut in Germania, Plinio teste, infantium puorum magnitudinem æquet. Id quod etiam hodie in Thuringis, & ad Erfordiam videre licet. Est etiam attendendum aliam esse herbam, quæ simpliciter radícula dicitur, Græcis struthium, & à raphano plurimum distat. Præterea Aristotelem, Theophrastum, & alios veteres Ῥαφανόν, non ἀντὶ Ῥαφανίδος, sed ἀντὶ κράμβης, id est, non pro radice, sed pro brassica vsurpasse, quæ res Pliniū adeo fefellit, ut radicem cum brassica confuderit, ut cum de brassica ageremus demonstratum fuit, & infra demonstrabitur. Raphanus ab Arabibus nominatur *fugel*, siue *fegiel*, ab Italis *Raphano*, & *Radice*, à Germanis *Retrich*, ab Hispanis *Rauano*, & *Rauanillo*, à Gallis *Reisfort*, id est, radix fortis, hoc est, acris. Dioscorides duo raphani genera facit.

Genera.

Lib.2.c.106

Vnū est Ῥαφανὶς ἡμερος, raphanus satiuus, alterū Ῥαφανὶς ἀγρία, raphanus siluestris. Latini Armoraciam, siue Armoracium vocant, hodièque Romani antiquam raphani siluestris appellationem retinentes, raphanum satium primæ literæ metathesi Ramoraciam vocant. Theophrastus in plura genera raphanum distribuit. Distinguunt hæc, inquit, foliis, radicibus, coloribus, succis, atque aliis huiusmodi, ut radicis genera Corinthium, Cleonæum, Liothalassium, Bæotium. Corinthia maximè adolefcit, quæ radicem habet nudam: nam sursum versus protruditur non ut cæteræ deorsum. Liothalassia, quam nonnulli Thraciam vocant, aduersus frigora validissima. Bæotia dulcissima est, & figura rotunda, nō ut Cleonæa, longa.

Lib.7.hist.
cap.4.

Lib.2.

Athenæus Theophrasti locū hunc citat his verbis. Θεόφραστος ἐν τοῖς περὶ φυτῶν, γένη Ῥαφανίδων φησὶν εἶναι πέντε, κορινθίαν, λιοθαλασσίαν, κλεωνάϊαν, ἀμωρέαν, βοιωτίαν, &c. Id est, Theophrastus in libris de plantis, raphanidōn genera quinque esse dicit, Corinthiam, Liothalassiam, Cleonæam, Amorheam, Bæotiam, &c. Pergit Theophrastus. Quarum autem læuia folia sunt, eæ dulciores, & suauiores sunt, quorum autem aspera, acriores. Præterea genus est quoddam, cui foliū est erucæ simile.

Lib.19.c.5.

Hæc de radice Theophrastus. Quæ transtulit Plinius. Sed quæ ille περὶ Ῥαφανίδος scripsit, eadem hic de napis tradidit. Idem naporum genera, inquit, quinque fecere, Corinthium, Cleonæum, Liothasion (non Liothalassium, ut in vulgatis Theophrasti exemplaribus exaratum est), Bæotiū, & quod per se viride dixerunt. Ex iis in amplitudinem adolefcit Corinthium, nuda ferè radice. Solū enim hoc genus supernè tendit, non ut cætera in terram. Liothasion quidam Thracium appellant, frigorū patientissimum. Ab eo Bæoticum dulce est, rotunditate etiam breui notabile, neque ut Cleonæum prælongum. In totum quidem quorum tenuiora folia ipsi quoque dulciores, quorum scabra & angulosa, & horrida, amariore. Est præterea genus siluestre, cuius folia sunt erucæ similia. Hæc ex Theophrasto Plinius, ex quibus perspicuū est ipsum raphanidas Theophrasti napos esse existimasse. Sicut autem raphanidem pro napo hic agnouit, ita mox eodem loco raphani genera recensens his verbis, Genera raphani Græci fecere tria, foliorū differentia, crispī, atque lævis, & tertium siluestre, raphanum pro brassica à Theophrasto vsurpatum, raphanidem Dioscoridis, & eum quem hodie raphanum & radicem appellamus, esse putauit, sicut capite de brassica docuimus. Mox Plinius eo-

Lib.19.c.5.

dem

dem loco rectè de raphano radice hæc tradit. Nostri alia fecere genera. Algidense à loco, longum atque translucidum. Alterum rapi figura, quod vocât Syriacum, suauissimum ferè ac tenerrimum, hyemis quoque patiens. Præcipuum tamen est, quod è Syria non pridem aduectum apparet, quoniam apud auctores non reperitur: id autem tota hyeme durat. Etiamnum


RHAPHANVS satius,
Matthiol.



vnum siluestre Græci agrion vocant, Pontici armon, alij leucon, nostri armoraciam, fronde copiosius quàm corpore. In omnibus autem probandis maximè spectantur caules. Immitium enim rotundiores, crassioresque ac longis canalibus, folia ipsa tristiora, & angulis horrida. Raphanus satius foliis est magnis, latis, scabris multum laciniatis, napo similibus: caulibus rotundis: floribus candicantibus: siliquis tumentibus, in mucronem desinentibus, in quibus semen concluditur rufum, aut fuscum, acre. Huic raphano pro vario genere cultuq; radix est varia, huic longa, alba, teres, tenera, fragilis, translucida, nec admodum acris, illi crassa, napi penè figura, durior, acrior, gustui ingratior. Raphanus secundus Matthioli est Raphanus minor purpureus Lobellij & Penæ, qui multis hortis Italiæ præsertim, rubello colore colitur & editur, ut minor, sic suauior, minus acris, lautiorque ex aqua salita excitandæ appetentiæ gratia, idque prima mensa. Raphanus siluestris habet folia satiuo similia, sed minora,

Forma.

RHAPHANVS secundus,
Matthiol.



RHAPHANVS siluest.
Dodonæi.



& ma

*RHAPHANVS purpureus
minor, Lobel.*

In hist. pl.
cap. 255.

Lib. 2. c. 106

*RHAPHANVS Rusticus,
Matthiol.*

Dodo. lib.
5. cap. 37.

In libr. 2.
Diosc. cap.
186.
Embl. 101.
lib. 2.

Locus.

apocopen facta sit. Crescit circa margines itinerum, & in locis arenosis, nonnunquam etiam in pratis. In Germania hodie feritur, & edomita feritate mitescit, meliôrque fit. Mense Aprili exoritur, Iunio floret. Rhabanus satius in hortis feritur. Seri autem vult auctore Plinio terra soluta, humida, finum odit, palea contentus.

& magis incisa: caulem pede altiore, flores luteos, siliquas paruas, in quibus semen minutum admodum includitur, radicem multò minorem, acriorem, ut mendosum Dioscoridis codicem esse necesse sit, in quo habetur, ἔλα δὲ ἰχὴν, μαλακὴν, ὑπόδουμος. Id est, interprete Ruelio, radix gracilis, tenera, subacris. Quare legendum esse ex vetere codice censet Lacuna, non μαλακὴν, sed μακρὰν, id est, longa. Est enim radix silvestris multò durior atque strigosior quàm sativa. Præterea longior, gustûque magis feruente. Fuchsius pro silvestri raphano siue armoracia plantã eam depinxit, quæ vulgò rhabanus rusticus, siue rhabanus magnus, siue montanus nominatur, ραφανὶς ἀγροδέραι Gallis Reiffort sauvage, Germanis Merrettich, fortassè tũ hac appellatione, tum acri admodum huius plantæ sapore in eam sententiam inductus.

Quæ multũ à vero abesse, Matthiolo & plerisq; doctis herbariis videtur. Nam rhabanus silvestris folia raphano sativo similia habet teste Dioscoride, rhabanus rusticus folia habet multo maiora, latiora, hippolapatho similia, grandiora tamen & asperiora: caules teneros, breues, graciles, in quorũ summitate oriuntur candidi flosculi, deinde siliquæ parvæ in quibus semen. Radix longa est, crassa, gustatu acerrima & valde linguam vellicans. Hæc planta, præsertim radix calida siccaque est tertio ferè ordine, qua vniuersa ferè Germania & Pannonia ad carniũ & piscium intinctus & condimenta sinapi vice vtuntur. Recentiores, inquit Cordus, raphano adscripserunt acrem istam radicẽ, quam Germani Merrettich appellant, & ea vtuntur supradicti raphani loco, sed malè: nullum enim ex veteribus auctorem habent, qui Merrettich raphani speciem esse indicarit, quam plantam ipse Cordus maius thlaspi esse indicavit, quod Arabes nasturtium album appellarunt. Cornarius quoque armoracium alium raphanum esse iudicat ab eo, qui per Germaniã plerisq; omnibus rhabanus silvestris esse creditur, nimirum is quem officinæ raphanum maiorem, & Germani Mherratic, quãsi maiore vi præditam radicem vocant: nisi hæc appellatio ex armoracio per

tentus. Rhaphanus siluestris in fossarum aggeribus, & locis aliis vlgiginosis prouenit. Eundem etiam satium in Italia esse Plinius tradit. Cum enim loco iam citato rhaphanum siluestrem armoraciam vocari dixisset, aliquanto post de eodem rhaphano siluestri ait. Est & satiui vsus in Italia, & armoraciam vocant, de siluestri armoracia non de satiua intelligens, quæ in Italia feritur, & ferendo mitescit: quemadmodum hodie in Germania rusticus rhaphanus ut diximus, in hortos transfertur. Rhaphanus satiuius vere & æstate feritur, quare æstate & hyeme colligi potest, estq; illius vsus quotidianus. Quæ autem sint eius vires, Dioscorides declarat his fere verbis, quæ rectius fortasse conuerti possunt quam Ruellius verterit. Rhaphanus excalfacit, flatus gignit, ori suavis est, ventriculo non acceptus: ructus mouet, vrinam cit, aluum facilem reddit. Si quis ipsum à cibo sumpserit, distributioni eius uti lior erit, præsumptus autem cibum attollit siue subleuat. Prodest etiam vomituris datus ante cibum, sensus exacuit, decoctus contra veterem tussim, & crassitudinem in pectore natam prodest. Cortex eius cum oxymelite sumptus potentiùs vomitiones citat: hydropicis utilis, ad motus cataplasmati modo lienosis confert. Cum melle nomas sistit, sugillata tollit. Contra viperarum ictus auxiliatur, alopecias pilis explet, lentigines cum loliacea farina exterit. His qui à fungis strangulantur tam cibo quam potu salutaris est, menses trahit, semen eius vomitum proritat, vrinamque mouet. Cum aceto potum lienem extenuat. Coctum cum oxymelite calido angina laborantibus vtiliter gargarizatur. Contra cerastis morsum potum ex vino auxilio est. Cum aceto illitum gangrenas validissimè emarginat. Siluestris rhaphani tam folia quam radix olerum modo in cibo coquuntur. Excalfacit autem, vrinam cit, æstuosus est. Plinius quæ sequuntur rectè de rhaphano tradit. Cor-

*Tempus.**Vires &**Temper.*

Lib. 2. c. 106

Lib. 19. c. 5.

Lib. 20. c. 4.

sinapi sumpti, & lethargicis. Praxagoras & iliosis dados censet, Plistonici & cæliacis. Intestinatorum vlcera sanant, ac purulenta præcordiorum, si cum melle edantur. Quidam ad hæc coquere eos in luto illitas malunt, sic & fœminas purgari. Ex aceto & melle sumpti intestinatorum animalia detrahunt. Item ad tertias decocto eorum cum vino, enterocelis profunt, sanguinem quoq; inutilem sic extrahunt. Medius ad hæc & sanguinẽ excreantibus coctos dari iubet: & puerperis ad lactis copiam augendam. Hippocrates capitis mulierum defluuia fricari raphanis, & super umbilicum imponi contra tormenta vulvæ. Reducunt & cicatricem ad colorem. Semen quoq; ex aqua impositum sistit vlcera, quæ phagedænas vocat. Democritus venerem hoc cibo stimulari putat, ob id fortassis voci nocere aliqui tradiderunt, folia quæ in oblongis duntaxat nascuntur, excitare oculorum aciem dicuntur. Vbi verò acrior raphani medicina admota sit, hyssopum dari protinus imperant. Hæc antipathia est. At aurium grauitati succum raphani instillant. Nā vomituris summo cibo esse eos vtilissimũ est. Siluestris raphanus vtilior vrinæ duntaxat ciendæ. Non est hic silentio prætereundum longè diuersam plantam esse, quæ raphanus agria, id est, raphanus siluestris Plinio dicitur, quæ est Apios ischas. Quod verò Plinius priore loco dixit, cum sale ieiunis dados esse, atque ita vomitionibus præparari meatum, Dioscorides habet, præsumptus eleuat cibum. Quare etiam vomituris præsumptus cõmodus est. Quod autem Dioscorides ait,

Si quis ipsum à ciboumat, ad distributionem conferre, hoc Galenus refellit his verbis. Mirari subit eos medicos, atque idiotas, qui post cœnam coctionis iuuandę gratia crudos raphanos esitant, ipsi quidem hanc rem experientia satis sibi exploratam esse affirmant, qui tamẽ ipsos sunt imitati, omnes læsi fuerunt. At posteriore loco Plinius sibi ipse repugnat, cum scribit, nam vomituris summo cibo esse eos vtilissimum, cum priore dixisset, ieiunis cum sale dados esse, atq; ita vomitionibus præparari meatum. Sed Galenum audiamus de raphano tum vt cibo, tum vt medicamẽto loquentem. Urbani, inquit, homines solam radiculam crudam vt plurimum ante alios cibos cum garo alui deliciendę gratia mandunt, quidam autem aceti quidpiam admiscent. Rustici verò cum pane sæpenumero vescuntur, vt aliis obsoniis quæ sua sponte proueniunt. Radicula autem caulem etiam ac folia mandunt, sed cõacti potius quàm voluntarij. Radix autem ex iis est quibus assiduẽ vescimur, estq; obsonium magis quàm alimentum: nimirum quæ & ipsa cum manifesta calfactione attenuãdi habet facultatem. Nam qualitas acris in ipsa superat. Vere autẽ caulem quẽdam, qui in altum assurgit, gignere consuevit, quemadmodum & alia omnia quæ caulem sunt productura, quem caulem elixantes mandunt cum oleo & garo & cum aceto, vt rapæ caulem, ac sinapi, & lactucæ, nutritq; magis caulis iste, quàm cruda radícula, vt qui in aqua acrimoniã omnem ponat: paucissimum tamen & ipse habet alimentum. Quidam autem non caulem modò, sed & radículas ipsas elixantes mandunt, non aliter ac rapa. Et alio in loco, Raphanus exalfacit quidem ordine tertio, desiccat verò secundo. Agrestis autem in vtroque efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est, facultas ei inest digerendi. Itaque ad fugillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem accõmoda existunt. Hæc Galenus. Recens minutim incisa radix, vt scribit Matthiolus, albo meraco conspersa, & in sartagine calfacta, pubiq; admota, suppressam vrinam euocat. Idem præstat eiusdem succus duarum vnciarum pondere ex vino Cretico haustus. Corticis vncia cum mercurialis pari pondere, croci granis quatuor, pulueris cassiæ odoratæ drachma, succi sabinæ drachmis duabus, omnibus simul in mortario contusis tenuissimo linteo exceptis, vteri q; cernici admotis, ægrè parturientibus mirifice subuenit. Eiusdem radices succus cum oleo dulciũ aut amararum amygdalarũ, & vini albi & colocynthis momento aurium sonitus tollit, si calidus instilleretur.

Lib. 16. c. 8.

Li. 2. Alim.

Lib. 2. Ali.

Lib. 8. sim.

In lib. 2.
Diosc. cap.
106.



VÆ γογγύλη & γογγυλῖς Græcis, Latinis Rapum & Rapa dicitur, unde deminutum nomē apud Horatium rapulum, Arabibus *Seliem*, *Seligem*, siue *Alsegiem*, Italicè *Rapo*, Germanicè *Ruebem*, Hispanicè *Nabo redondo*, Gallicè *Rabe*, & *Naueau rond*, Græci γογγύλης aut γογγυλίδος vocabulum à figura quæ plerumque rotunda esse solet, detorserunt: nam quod in rotunditatem circumactum est γόγγυλον, hoc est τρόγγυλον dixerunt. Et Hippocrates gongyli vocabulum pro globulis orbiculisve qui deuoratur, quasi catapotiiis vsurpauit. Rapa verò quod ex terræ rure, quasi ruapa Varrone teste nominata est. Alij quod passim rapiatur rapi nomen inditum esse putant. A Græcis tamen manasse id nomen facile videri potest, qui raphyn & raphyn auctore Athenæo dicunt. Rapas Lacedemonios γαστέρας id est, ventres vocare Apollas apud eundem Athenæum tradidit. Sed Nicæder Colophonius γαστέρας à Bæotis brassicas intelligi, rapas verò Zaceltidas appellari voluit. Amerias & Timachides non rapas, sed cucurbitas ita dici arbitrantur. A rapo rapina Gallis *Rabiere*, & Rapitium deflectitur, vnde rapitios caules dixit Cato. Rapi genera duo sunt Dioscoridis sententia, rapum satium & siluestre. Plinius aliter ea distinxit. Genera eorum, inquit, Græci duo prima fecere, masculum, fœmininumque, & ea ferendi modo ex eodem semine. Denfioe enim satu mascullescere, item in terra difficili. Semen præstantius quò subtilius. Species verò omnium tres. Aut enim in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari. Tertiam speciem siluestrem appellauere, in longitudinem radice procurrente, raphani similitudine, & folio anguloso scabroque. Apud Athenæum legimus Theophrasto duo esse raporum genera, marem & fœminam, & ambo ex eodem semine nasci. Hæc autem sunt Theophrasti ea de re verba. Τογγυλίδος ὃ οἱ μὲν φασὶν εἶναι, οἱ δ' ἔ φασιν, ἀλλὰ τῷ ἄρρενι, καὶ τῇ θηλείᾳ διαφέρειν. γίνασθαι δ' ἐκ τῆ αὐτοῦ σπέρματος ἁμφοῶν. πρὸς δ' τὸ ἀποθηλυῦνθαι, πηγνύναι δεξιμανὰς. ἐὰν γὰρ πυκνὰς, πᾶσας ἀπορρένῃ. τὸν ἀντὸν δ' τρόπον καὶ ἐν γῇ μοχθηρᾷ σπαρῶσι. Rapi genera quidem esse alij aiunt, alij negant, sed mare & fœmina differre, nasci autem ambo ex eodem semine. Vt autem fœminæ fiant, rariùs feri oportet, si densius, omnes mascullescere aiunt. Eodem modo si in vitiosa terra seueris. Quæ repetit Plinius his verbis. De rapis abundè dixisse poteramus videri, nisi medici masculini sexus facerent in his rotunda: latiora verò concaua, & fœminini, præstantiora suauitate, & ad condendum faciliora: quæ sæpius fata transeunt in marem. Tria igitur sunt rapi genera quæ nos agnoscimus, & habemus, rapum latum, siue masculum, rapum rotundum, siue fœminam, tertium siluestre. Rapum satium profert initio folia magna, lata, aspera, profundius in lateribus incisa, raphano similia. Deinde caulem erigit, in quo flores oriuntur parui, lutei, hinc siliquæ paruæ fuscum semen includentes, quibus floribus, siliquis, & seminibus brassicæ rapum valde simile est. Radice est crassa, candida, & tanta, vt vidisse sese affirmet Plinius Rapa quadraginta libras excedentia, & Matthiolus innumera, quæ triginta libras penderent, & centum quibusdam in locis, permagno naturæ miraculo, quæ ex tam paruo semine, tribus perne mensibus, tam magnas gignit radices. Idem in Ananiensi agro longa, & colore purpurea sese vidisse ait. Illi orbiculata siue globosa radice, huic teres & oblongior & napo similior effigie, qua sola à superiore differt. Rapum siluestre, Dioscoride auctore, in aruis nascitur, frutex est cubitalis, ramosus, læuis in cacumine, folia habet læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructum in siliquis caliculatis. Cúmque eorum inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Siluestre rapum copiose nascitur auctore Pena, apud Flandros & Germanos, qui serum,

Nomina
Li. 2. Saty.

Lib. 9.

Cap. 35.

Genera.

Lib. 18. c. 13.

Lib. 9.

Lib. 7. hist.

cap. 4.

Lib. 19. c. 5.

Forma.

Lib. 18. c. 13.

In lib. 2.

Diosc. cap.

104.

ibid.

Lib. 2. c. 104.

*RAPVM Sativum orbiculatum.**RAPVM Longum.**RAPVM Silvestre.**RAPUNCVLVS Minor. Matth.*

hoc quod folia bubus pabulo cedant. Luxuriat enim tanto foliorum numero, ut radix iam non tuberosa aut raposa, sed exilis, nec ventricosa vspiam sit, alioqui sativæ rotundæ oblongiori non absimilis, sed discretu facilis, crispior, rugosiorq; & vberiore folio. Huius generis est Rapistrum vulgo dictum, Lugdunensibus *Ra- uenon*, passim viarum margines & segetes ornans, præsertim Septentrionalium: floribus numerosis, luteis Brassicæ aut Rapi: folia sunt in caulibus sesquicubitalibus

Rapi

Rapi siluestris, Brasicæ læuore, & virore, non erucæ, quæ debentur Eryfino Dioscoridis: radix tenuis, non fibrata, gustu Rapi siluestris, cuius facultates etiam ferè habet, sed vehementiores. Matthiolus Erysimum Dioscoridis fecit, cuius depicta est in Capite 42. sub nomine Irio. Fuchsiū secuti herbarij multi, siluestre rapum

In libr. 2.
Diosc. cap.
104.

RAPVNCVLVS

Minor, Dodon.



esse putant plantam, quæ vulgò rapunculus, rapunculum & rapontium nominatur. Gallicè *Raiponce*, Germanicè *Rapinetzeln*, quo in acetariis passim omnes vtuntur. Sed horum sententiæ refragatur Matthiolus, quoniam rapunculi capitula, in quibus semē concluditur, duplicia nō sunt, nec vlla in eius semine reperitur qualitas, quæ abstergere possit, vt de rapi siluestris semine dicemus. Est autem rapunculus planta cubitalis, primū folia ferens, oblonga, humi iacētia, initio violis Martiis ferè similia, deinde caules rotundos, duros, in cacumine ramosos, in quibus folia sunt longiora & angustiora. In ramulorum summitate flores edit purpurascētes, in cæruleum inclinantes, qui quatuor foliolis constant. Semen minutum in simplici capitulo continetur, pullo colore. Radix est trium, interdum quatuor digitorum longitudine, crassiuscula, protuberante media ipsius parte, alba, fragilis, tenera, subdulci succo prædita, id quod Dioscorides non prætermisisset, si rapunculus rapum siluestre fuisset. Nascitur in aruis non cultis, in sepibus, & in pratis. Seritur etiam in hortis vt grandiores edat radices, quarum esu plurimi delectantur, eduntur in acetariis & crudæ & coctæ. Dodonæus Fuchsiū, opinor, secutus, rapunculum hunc, rapum siluestre minus vocat, & alterum statuit genus, Rapunculum maius scilicet, Gallicè *Grande raiponce*, quod rapum siluestre maius appellat. Id rapunculi genus caules emittit rectos, cauos, in quibus folia primū latiora oriuntur, deinde angustiora, in quibusdam plantis, quas masculas esse putant, atria macula notata: in caulium cacumine spicæ magnæ, flosculis longiusculis confertæ, qui antequam dehiscent, corniculis incuruis simillimi sunt, aperti in quatuor foliola angusta diuiduntur, cærulea, vel purpurea, vel cineritia, vel alba. Iis succedunt siliquulæ multæ rotundæ, inter sese iunctæ, rapunculi superioris capitulis, siue caliculis similes, sed minores. Radix est crassa, candida, succosa, figura gustūque superiori proxima. Hanc plantam Dodonæus Alopecuron Theophrasti esse affirmat, qua de re alio magis idoneo loco dicetur. His aliam Rapunculi speciem Dalechampius addit, quam à figura Pyramidalem vocat, quoniam pyramidis instar latior inferne sit, superne angustior. Radicem ea mittit longam, crassam, obliquā, furculosam, & pallidè subluteam, viuacem, vtpote quæ hyemis sæuitiam perferat, & quotannis repullulet: caules multos hominis

Locus.

Lib. 5. c. 35.

Rapūc. genus. 2.

Forma rapūc. maior.

RAPVNCVLVS Maior,
Dodon.



et, Gallicè *Grande raiponce*, quod rapum siluestre maius appellat. Id rapunculi genus caules emittit rectos, cauos, in quibus folia primū latiora oriuntur, deinde angustiora, in quibusdam plantis, quas masculas esse putant, atria macula notata: in caulium cacumine spicæ magnæ, flosculis longiusculis confertæ, qui antequam dehiscent, corniculis incuruis simillimi sunt, aperti in quatuor foliola angusta diuiduntur, cærulea, vel purpurea, vel cineritia, vel alba. Iis succedunt siliquulæ multæ rotundæ, inter sese iunctæ, rapunculi superioris capitulis, siue caliculis similes, sed minores. Radix est crassa, candida, succosa, figura gustūque superiori proxima. Hanc plantam Dodonæus Alopecuron Theophrasti esse affirmat, qua de re alio magis idoneo loco dicetur. His aliam Rapunculi speciem Dalechampius addit, quam à figura Pyramidalem vocat, quoniam pyramidis instar latior inferne sit, superne angustior. Radicem ea mittit longam, crassam, obliquā, furculosam, & pallidè subluteam, viuacem, vtpote quæ hyemis sæuitiam perferat, & quotannis repullulet: caules multos hominis

Ibid.

PIRAMIDALIS Rapunculi
genus, Dalechamp.



Locus.

Tempus.
Lib. 8. c. 13.

altitudine, per intervalla foliis vestitos, rapunculo similibus, infernè proluxa ligula subiuntis aliis, aliis breuiore pediculo fultis, quibusdam caulem attingentibus, supernè verò vel parùm à caule disiunctis, vel illum proximè amplexantibus. Ad singulos foliorum exortus vtrinque virgulæ prodeunt, quæ flores sustinent copiosos, caruleos, candicantes, aspectu pulchro, rapunculi forma: quibus succedunt vascula corticosa, fermè rotunda, minuto semine distenta. Apud nos in hortis satù provenit. Rapunculi genus esse propter foliorum, floris, seminis similitudinem arbitrantur. Sed ad rapum redeat oratio. Id in hortis feritur, potissimum æstate Iunio ac Iulio mensibus in arvis cultis. Mense Octobri cum radix summoperè extuberaverit, eruitur. Terram, inquit Plinius, non morosè eligit, penè ubi nihil aliud feri potest. Nebulis & pruinis, ac frigore vltro aluntur amplitudine admirabili. Quare non sunt in Gallia nostra quàm in Lemouicis copiosiora, suavioraque, affatim suppeditante eius regionis cœlo nebulas, frigora, pruinâsque. Plinio &

Columellæ palma Nursino agro nascentibus, proxima in Algidonatis. Athenæus & Pollux è Mantinea maximè commendarunt. Alpinis quibus rara seges rapa valde vtilia sunt, & necessaria, tam ad hominum alimentum, quàm iumentorum pabulum. *Χειμαζομένη ὅ χαίρει καὶ αὐτὴ γογγυλὶς*, inquit Theophrastus, *καὶ ῥαφανὶς, δὶονλαι ἄμα γλυκαίνεσθαι τε, καὶ τὴν αὐξησιν εἰς τὴν ῥίζαν βέπεσθαι, καὶ ἐκ εἰς τὰ φύλλα. τὰς δὲ νόλαις καὶ τὰς ἐυδαίαις ἐκκαυλεῖται ταχὺ.* Quæ sic Plinius transcripsit, frigore dulciora fieri existimantur, & grandiora, tepore in folia exeunt. Quæ æstate feruntur vindicantur ab crucarum iniuria, quæ plerumque tenella folia prorsus erodunt, commista sationis tempore semini fuligine, aut eodem semine maioris sedi succo per noctem macerato. Id quod Columella experientia sibi comprobatum esse asserit. Rapi cocta radix, inquit Dioscorides, alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, venerem stimulat. Decoctò podagræ pernionisque fouentur: contritòque rapo atque imposito iuuantur. Si excavata radici rosaceum ceratum adigatur, & feruente cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Cimæ eius decoctæ manduntur, & vrinam cient. (Græcè habetur, ὅ ὃ ἐξ αὐτῆς ἀσπάραγος βιβρώσκεται ἐφθός, ἐπὶ δὲ διερρηκός. Id est, ipsius asparagus, &c. Plinius cymas dixit, vterque turiones caulis inter folia ex summo rapo emicantes intelligit.) Semē antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est (τὸ ὃ ἀπὲρμα εἰς ἀνιδότους, καὶ θηριακάς ἀνοδύνας εὐθελον. Id est, semen antidotis & theriacis, quæ dolores leniendi vim habent, admodum vtile est. Quare Ruellius minùs rectè ἀνόδυνα quæ sensum doloris auferunt, interpretatus est: sunt enim ea νάρκωτικά, id est, stupefacientia, quæ sensum non propriè dolorem tollunt eximia sua frigiditate. Anodyna verò quæ non extinguendo sensum aut stupefaciendo, sed partes relaxando, & demulcendo dolorem leniunt & mitigant.) Potum contra venena salutare est: venerem concitat. Rapum muria conditum minus alimenti sufficit, sed multò magis appetentiam recreat. Silvestre rapum additur in medicamenta quibus ad detergendam cutem in facie, totòque corpore vtimur: præsertim quæ ex lupini,

Lib. 7. hist.
cap. 4.

Lib. 18. c. 13.

Lib. 2. c. 104
Vires &
Temper.

lupini, aut erui, tritici, aut lolij farina fieri solent. Eundem ferè Rapi vsum tradit etiam Plinius his verbis. Est & Rapo vis medica. Perniones feruens impositū sanat. Item frigus vellit ex pedibus aqua decoctum. Et ius feruens podagris etiam frigidis medetur. Et crudum tusum cum sale cuicumque vitio pedum. Semen illitum & potum in vino, contra serpentes & toxica salutare esse proditur. A multis verò antidoti vim habere in vino & oleo. Democritus in totum ea abdicauit in cibis, propter inflationes. Diocles magnis laudibus tulit, etiam venerem ab eis stimulari professus: item Dionysius, magisq; si eruca cōdirentur. Tostum quoque articulorum dolori cum adipe prodesse. Siluestre Rapum in aruis maximè nascitur, fruticosum, semine candido, duplo maiore quàm papaueris. Hoc ad læuigandam cutem in facie, totoq; corpore vtuntur, mista vrina pari mensura. Erui, hordei, tritici, & lupini radix ad omnia inutilis. Quæ postrema in publicis exemplaribus deprauatissima sunt: ea enim verba, mista vrina pari mensura, & cætera, ad ea de quibus hic agitur nihil prorsus faciunt. Quare ex Dioscoride sic corrigēda. Hoc ad læuigandam cutem in facie, totoq; corpore vtuntur, admixto in smegmata, quæ ex erui, lolij, tritici, aut lupini farina fiunt. Alio in loco tradit Rapi siluestris succum acrem, qui circa messem exceptus sit, oculos purgare, mederiq; caligini admistō lacte mulierum. De rapis verò vt cibis idem ita scribit. Quando aliis vsus præstantior quàm his non est. Ante omnia namque cunctis animalibus nascuntur, nec in nouissimis satiant ruris alitum quoq; genera, magisq; si decoquantur in aqua. Quadrupedes & fronde eorum gaudent. Est homini non minor rapaciorum (melius ex vetere codice legas Rapitiorum) suis horis gratia, quàm cymarum: flaccidorum quoque, & in horreis enecatorum, vel maior quàm virentiū. Ipsa verò durant & in sua terra seruata: & postea passa penè ad alium prouentum, famemq; sentiri prohibent. A vino atque messe tertius hic transpadanis fructus. De iisdem sic Galenus. Huius plantæ oleraceum quidem est quod terra extat, radix autem quæ terra continetur, dura quidem est nisi coquatur, & non esculenta: aquæ autem incocta nulla plantarum congenerum minùs nutrit. Hanc quoque variè vulgò apparant, adeò vt aceto vel muria condientes, in totum annum ipsa vtantur. Succum autem in corpus distribuit mediocri crassiore. Proinde si quis ipsa liberaliùs vescatur, succum crudum asseruabit, potissimum si ipsam minùs iusto in ventriculo confecerit. Quod verò ad ventrem attinet, nemo ipsam, neque deiicere, neque sistere dixerit, præsertim cū cocta bellè fuerit. Coctionem enim diuturniorem postulat: eaq; est laudatissima, quæ cocta bis fuerit. Quod si sumpta crudior fuerit, concoctu est difficilior, ac flatulenta, stomachoq; noxia. Nonnumquam autem & ventrem mordicat. Præterea scribit Galenus Rapi semen venerem excitare, vt pote spiritum flatulentum procreans. Sic & radicem coctu difficilem esse, inflare, & semen generare. His adiungenda Symeonis Sethi de iisdem sententia. Rapa admodum nutriunt, inquit, vrinam ciunt, inflant, genitale semen gignunt, fauces leniunt atque thoracem. Crebrior illorum vsus crassum humorem generat, & obstructions iecoris parit. Ventrem nec sistunt, nec mouent. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum, & haustum magna copia venerem suscitatur. Aiunt enim qui hoc ipsum semē cum calamintha & lemnia terra sumpserit, eo die neque veneno, neque venenati animalis morfu lædi. Appensum inguinum morbis peculiari quadam proprietate medetur. Rapunculum cum sale & aceto estur ad appetentiam excitandam & ciendam vrinam, præsertim modicè elixum. Cum lupinorum aut lolij farina illitum tergit & nitidam reddit faciem, atque etiam totius corporis cutim. Foliorū & caulium præsertim minoris succus oculis cum lacte mulieris instillatus eorum aciem acuit.

Li. 20. c. 13.

Lib. 18. c. 13.

Ibidem.

Li. 2. Alim.

Li. 6. simpl.

Nomina



ΟΥΝΙΑΣ Græcis, Latinis Napus nominatur, Italicè *Nauone*, Germanis *Steckrueben*, Hispanis *Nabicas*, Gallis *Nauet* & *Naueau*. Βενιάδος appellationem à tumēte figura, quam præ se fert hæc planta, Græci deflexerunt: namque radix eius in amplitudinem excrescit, & in rotundum extuberat. Cliuos, colles, verrucosâq; loca βένυς nominant. Dioscorides Napum neque descripsit, neque in genera distribuit. Apud Athenæum legimus Theophrastum Βενιάδα quidem non nominasse, cum Nicander eo antiquior eius mentionem fecerit, sed marem quoddam Rapum vocasse, quod fortasse Bunias est. Quia, opinor, Napi in raporum genere videntur esse, & raphano & rapo similes, ut ex Plinio mox dicemus. Foliis etenim & radice raphanos referunt, caule, floribus, semine rapum æmulantur. Eandem ob causam puto Galenum inter rapum quæ γογγυλὶς vocatur, & Napum quæ βενιάς discrimen nullum statuere, cum scribit. Siue γογγυλίδα vocare volueris, siue βενιάδα hanc plantam, oleraceum in ipsa est, id quod è terra eminet, quæ verò in terra continetur radix. Et in lib. pharma. simpl. Βενιάδος mentionem nullam fecit, gongylidis, ut suprâ diximus, vires declarauit. Plinius τῆς ραφανίδος Theophrasti genera ad Napos transtulit, Corinthium, Cleonæum, Liothasion, Bœoticum, &c. ut ex vtriusque locis iam ostendimus. Ex quibus aperte perspicitur τὰς ραφανίδας Theophrasti, id est, radículas pro Napis vsurpasse. Porro idem Plinius velut superiorū Naporum generum oblitus, duas rursus Naporum differentias statuit his verbis. Naporū duas differentias & in medicina Græci seruant. Angulosis foliorum caulibus florentis (Cornarius emendat, Angulosis alterum caulibus florentem) quod Bunion vocant, purgationibus fœminarum, & vesicæ, & vrinæ utilem decoctum, potum ex aqua mulsâ, vel succi drachma. Semen dysentericis tostum, tritumq; in aquæ calidæ cyathis quatuor. Sed vrinam inhibet si non lini semen vnâ bibitur. Alterum genus Buniada appellant, & raphano & rapo simile: seminis præclari contra venena. Ob id &

Li. 2. Alim.

Lib. 19. c. 5.

Genera.

Li. 20. c. 4.

Li. 4. Diosc.
ca. 119.

NAPVS SATIVS.

Lib. 5.
Li. 4. Diosc.
c. 124.In hist. pl.
cap. 63.
Lib. 5. c. 34.
Lib. 5. c. 23.
Forma.

in antidotis vtuntur ipso. Ex quibus Plinij verbis colligit Matthiolus Bunion eam esse plātam, quam Napum siluestrem *Rura* in Hetruria appellant. Idem in epistolis Bunium Dioscoridis siluestrem Napum esse ait. Qua in re Matthiolus cum Plinio vehementer errat: nam à Bunio plurimùm Bunias differt. De quo Bunio in Umbelliferis dicemus. Item Matthiolus duo tantùm Napi genera reperiri scribit, album & flauum. Album flauus crassitudine superat, & magis colore placet: est tamen insipidior, & gustui minùs gratus. Fuchsio & Dodonæo duo sunt Napi genera, satium, & siluestre: quod siluestre Fuchsius non Bunium, sed Buniada siluestrem vocat. Dodonæus Bunium longè diuersum à Buniade siluestri descripsit. Napo satiuo folia sunt multa à radice exeuntia, magna, lata, profundissimè vtriusque incisa, rapi foliis simillima, sed læuiora. Inter hæc caulis erigitur cubitalis, in quo flores, siliquæ & semen perinde atque in rapo. Radix subest longa, rotunda, crassa, acrior rapi radice.

radice. Napus siluestris superiori similis est, sed foliis magis incisis, erucae non dissimilibus, radice breuiore, sed rotundiore. Satius in agris & hortis colitur. *Locus.* Siluestris locis humidis, & secus riuos amnesq; nascitur. Plinius post rapa de Napis hæc scripsit. Napi verò Amiternini, quorū *Lib. 18. c. 12* eadem ferè natura, gaudent æquè frigidis. Et *Lib. 19. c. 7* alio in loco. Palma Romæ Amiterninis datur, inde Nursinis, tertia nostratibus. Et Martialis Napos nursinas pilas appellat his versibus.

NAPVS Siluestris, Dodon.



Nos Amiternus ager felicibus educat hortis.

Nursinas poteris parcius esse pilas.

Cocta Napi radix inflat, vt rectè scripsit Dioscorides, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur. *Li. 2. Dioscorides Vires* Conditur muria radix. Galenus medicamenta *Temper.* simplicia, quæ in theriacam adduntur expendens, siluestris Napi semen ex Creta sumendum esse ait. Cui non omnino adstipulandum esse censet Matthiolus, quoniã Andromachus, nec *Lib. 1 de Antid.* satiui, nec siluestris meminit, sed dulcis feminis Napi, quod de satiui semine potius intelligendum videtur, quia in agresti nulla dulcedo insit, sed potius acris quadam amaritudo: in satiui vero cõtra. Præterea iunior Andromachus, item Democritus Napi tantū semen requirunt. *Li. 5. Epist.* Quibus accedit Dioscoridis auctoritas scriben-

tis Napi semen si præbibatur, letalia venena inefficacia reddere, & antidotis admisceri. At fortasse Galeno compertum erat siluestris ex Creta semen peculiari, quadam virtute aduersus venena pollere, atque ob id in theriacam addendum, quod tamen destituti satiui semine vtendum in antidotis esse censet Matthiolus. Id semen eodem Matthiolo auctore, necat interaneorum animalia ex limonum aut arantiorum succo potum: ex adianti siue lentium decocto cum alia exanthemata, tum sublimia illa, quæ vulgò Morbillos vocant, ad cutim pellit, tum quod ab imis corporis partibus ad extimas partes morbificam materiam ducit, tum quod propria vi morbi malignitati resistit. Datur vtiliter cochlearis mensura ex vino addita feminis lini drachma ad ciendam vrinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit, si ex oxymelite & tepente aqua hauriatur. Summopere etiam prodest multis diebus eius feminis drachmam ex marrubij decocto propinare ictericis, & aquæ intercuti incipienti.

Li. 2. Dioscorides ca. 105.

SINAPI.

CAP. XXXIX.



SRAECI σινηπι & σινάπι, νάπυ Athenienses appellauerunt auctore Athenæo, & Plinio, alij Thapsi, alij Saurion, Latini Sinapis & Sinapi, Arabes Cardel, seu Chardel, Itali Senape, Germani Seness, & Senff, Hispani Mostaza, Galli Senewe, & Moustarde, inde fortasse deducta appellatione, quod cum musto acre illud Sinapis semen ad intinctus conteri soleat. Dicitur autem σινηπι auctore Athenæo, ὅτι σινεῖ τὸς ὤπας τῇ ὀσμῇ, idest, quod olfactum luminibus officiat. νάπυ verò quasi νάφω eodem interprete, quoniam non sine natura sit, sed acri, ac proinde incommoda. Addit quod vel pusilla sit corpore: namque ἀφὸς dicunt quod natura priuatū sit, inde piscis apua nominatur detracta aspiratione

Nomina

Lib. 9.

Lib. 19. c. 8.

Lib. 9.

Genera
Li. 2. Dios.
ca. 148.
Lib. 5. ca. 55.
Ca. 203.
Lib. 19. c. 8.

aspiratione. Alij Napi per priuationē, videlicet *νηπιον*, quasi immite dici volunt, quoniam acrimoniæ vehementis particeps sit. Sinapis tria genera numerant Matthiolus & Dodonæus, Fuchsius duo duntaxat. Plinius trium generum esse dicit. Vnum gracile, alterum simile rapi foliis, tertiū erucæ. Semen optimū Ægyptium. Sinapi igitur aliud est hortense siue satium, aliud siluestre. Hortense duplex. Vnum semine fusco, siue rufescente, alterum candido. Hoc album, illud nigrum Galli vocant. Sinapi hortense, cæteris maius, nigrū & vulgare caulem habet hirsutum, ramosum: folia terræ propinqua rapo, aut erucæ, haud absimilia, minora tamen & asperiora, toto ambitu infecta: folia alia minora & crenata: flores luteos: siliquas rotundas & hirsutas, plenas semine in rufo nigrescente, calido & acri, atque ideò celebri apud Gallos adagio, qui insignem veteratoris astutiā indicaturi, Sinapi callidiore esse aiunt, quod ignea vi semen nares & cerebrum apprehendat, & lacrymas excitet. Alterum hortense caule, foliis, & proceritate superiori simile est: flores eidem lutei, & in siliquis semen pallidum & minus acre. Satium Sinapi semine albo facit Pena simile prorsus figura & semine Napi vulgaris, sed albo, duplo maiore. Istud vero Matthioli secundum, Lobellius & Pena siluestre faciunt apij, aut potius laueris folio, cætera haud admodum dissimile figura & seminis acrimonia. Sinapi tertiū Matthioli erraticum est folio & semine tenui, quod Lo-



SINAPI Hortense.



SINAPI Satium.



SINAPI Siluestre.

bellius & Pena appellant Sinapi siluestre minus Bursæ pastoris folio. Aridis locis iuxta margines & rudera prope vrbes nascitur, foliis valde laciniatis, Bursæ pastoris similibus, sed acutioribus minutioribusq; laciniis: flores veluti in umbellis, & siliquæ circa summitates erysimi Dioscoridis: caulis pedalis. Tota planta gustu est sinapi feruidissima. His Sinapi echinatum Dalechampius addidit, quod in

SINAPI Echinatum.



*SINAPI Amarum,
Dalechampij.*



agris prope Monspelium gignitur, radice crassiuscula, fibrata, caulibus multis, cubitalibus: foliis longis, angustis, in ambitu nonnihil laciniatis, in caulibus paucis: flore luteo, quinque foliolis constante, echinis quadrangulis semen continetibus, gustu acre. Aliud Sinapi Amarum cognominatum ex eodem, hic pictum damus: gaudet hæc planta pinguibus & humidis locis, in quibus feri cannabis solet. Ad altitudinem cubiti surrigitur, radicibus paucis, brevibus, gracilibus, albis: caule cubitali, virgato, rubescente, intus fungosa medulla pleno, furculoso: foliis longis, angustis, obscurius viridibus, hyssopo ferè similibus: flore aureo, densius congesto, in quatuor foliola explicato: semine minutulo, rufo, siliquis oblongis & prætenuibus incluso: saporis in tota planta & omnibus eius partibus amarissimi. Flos Augusto mense profilit, & ad Nouembrem usque particulatim emicat. Frequens hæc planta est in agris Arari vicinis iuxta Insulam & Cœnobium D. Barbaræ, propè Lugdunum. Vtrumque Sinapi sativum in hortis & arvis colitur. Terram diligit

aratam, & si fieri potest congestitiam: quamvis ubicumque nascatur, & nullo cultu plerumque germinet. Silvestre saxosis locis & humidis, & secus vias provenit. Iunio & Iulio mensibus floret, deinde semen profert. Eius in medicina multæ & magnæ vires. Nam auctore Dioscoride, ad calfaciendum, extenuandum, attrahendum efficax est. Ad eliciendâ capitis pituitam manditur: contra præduros tonsillarum tumores, ac veterem callosamq; arteriæ scabritiem succus ex aqua & melle convenienter gargarizatur: sternutamenta ciet tritum & naribus admotum: comitialibus quoque auxiliatur: scæminas vulvæ stragulatâ oppressas excitat: lethargicis derafo capite illinitur. Ficis admistum, & impositum donec rubescat locus, ad coxendicum cruciatus, lienes, & omnis generis veteres dolores confert, cum permutandi mali causa ex alto ad superficiem attrahere volumus. Alopecii illitum medetur: faciem purgat: sugillata cum melle, adipe, aut cerato rapit: feræ impetigines & lepræ eo cum aceto perunguntur. Contra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui polentæ modo inspergitur (Græcè legitur,

*Tempus.
Vires &
Temper.
Li. 2. c. 149.*

ὡς ἄλφιτα ἐπιπασσόμενον τῷ ὡσίῳ. Quod sic melius vertetur. Bibitur autem aridum contra circuitus febrium, instar pollinis potui inspersum.) Attrahentibus emplastris, scabiemq; extenuantibus vtiliter admisceri solet: tritum grauitati aurium, & sonitui cum fico impositum prodest. Succus ad heberudines oculorum, & genarum scabritias magna vtilitate cum melle illinitur. Expressus recenti semine succus in sole siccatur. Plinius de Sinapi hæc scribit. Id

Lib. 19. c. 8.

esse acerrimum sapore, ignei effectus, ac saluberrimum corpori, nulla cultura, melius tamen planta translata. Quin è diuerso vix est sato semel eo liberare locum, quoniam semen cadens protinus viret. Vfus eius etiam pro pulmentario in patinis decocto, citra intellectum acrimoniæ. Coquuntur & folia, sicut reliquorum olerum: Alio in loco eius effectus, & vsum fusius persequitur. Sinapi Pithagoras principatum habere, ex his quorum in sublime vis feratur, iudicauit: quoniam non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Ad serpentium ictus & scorpionum tritum cum aceto illinitur. Fungorum venena discutit. Contra pituitam tenetur in ore, donec lique scat, aut gargarizatur cum aqua mulsæ. Ad dentium dolorem manditur. Ad vuam gargarizatur cum aceto & melle. Stomacho vtilissimum contra omnia vitia, pulmonibusq; Excreationes faciles facit in cibo sumptum: datur & suspiriosis. Item comitialibus tepidum cum succo cucumerum. Sensus atque sternutamentis caput purgat, aluum mollit, mēstrua & vrinam ciet. Hydropicis imponitur: cum fico & cumino tusum ternis partibus comitali morbo. Ex vuluarum conuersione suffocatas excitat odore, aceto mistos: item lethargicos. Mox Sinapisimi vsum qui fit cum ficibus, & sine ipsis ad rubrificationem vsque declarat. Etsi vehementior somnus lethargicos præmat, cruribus, aut etiam capiti illinitur cum fico ex aceto. Veteres dolores thoracis, lumborum, coxendicum, humerorum, & in quacumque corporis ex alto vitia extrahenda sunt, illitū caustica vi emendat, pustulas faciendo. At in magna duritia sine fico impositum (Legit Dalechamp. At in magna lienis duritia, &c.) Vel si vehemēter vrigo timeatur, per duplices pannos. Vtuntur ad alopecias cum rubrica, psoras, lepras, phthirias, letanicos (falsò habent habent vulgata exemplaria lithanicos) opisthotonicos. Inungunt quoque scabras genas, aut caligantes oculos cum melle. Succusq; tribus modis exprimitur in fictili, calefcitque in eo in sole modicè. Exit & è cauliculo succus lacteus, qui ita cum induruit, dentium dolori medetur. Semen ac radix cum immaduere musto, conteruntur, manusq; plenæ mensura sorbentur ad firmandas fauces, stomachum, oculos, caput, sensusq; omnes: mulierum etiam lassitudines, saluberrimo genere medicinæ. Calculos quoque discutit potū ex aceto. Illinitur & liuoribus, sugillatisq; cum melle & adipe anserino, aut cera Cypria fit, & oleum ex semine madefacto in oleo, expressoq; , quo vtuntur ad neruorum rigores, lumborumq; & coxendicum perfrictiones. Horum omnium effectuum causas breuiter reddidit Galenus his verbis. Sinapi calfacit & siccatur ordine quarto. Alio in loco Sinapi Alexandrinum probat, sicut Plinius Ægyptium. Rectè etiam Symeon Sethi scribit Sinapi vim habere dissoluendi, & discutiendi humiditates quæ in capite, & stomacho sunt. Conferre etiam lienis affectibus ab humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex adusta pituita contracti sunt. Adhæc & podagris à pituita factis. Officere verò visui, & calido capiti, & iecori. Adiuvat concoctionem & distributionem ciborum crassarum partium. Minuit quæ in ventriculo sunt humiditates. Illitum lepris eas in melius mutat. Linguas etiam humiditate grauatas siccatur. Si cum melle sumatur, tussis resoluit. Cum caricis verò ischiadicis illitum, & lienosis, vtile est: trahit enim quæ intus sunt ad corporis superficiem. Suffitum verò & incensum serpentes fugat. Nostri musteum semen nocte macerant aqua, deinde manibus expressum adiecto aceto pila terunt, acerrimo

Li. 8. simpl.

Li. 9. med. loc.

acerrimo ciborum cōdimento. Alij per vindemias cū multo maduerit semen conterunt, ita magnam acrimoniæ vim exuit, totoq; anno seruatur. Nec hodie quicquam hyeme ad intinctus ubiq; cibis frequentius immiscetur, gratissimō obsoniorum condimento: nihil quoque frigidis diebus magis epulas videtur commendare. Quod si vel assidua consuetudine, vel vsu, gratia ciborum exolescit, huius acrimonia fastidiosus gustum reuocant, & hoc velut irritamento elanguescentem appetentiam inuitant, quo velut igniculo morosius palatum titillante, vandi moliuntur auiditatem. Sed huius vis confestim in sublimē fertur, vt ex Plinio diximus, nec aliud magis in nares ac cerebrum penetrat. Quare si modus abierit, huius odor naribus raptus, statim sternutamenta ciet, & vellicans sensum crymas elidit, quod & testatur Columella canens.

Lib. 10.

Seq. laceffenti fletum factura Sinapis.

nde Aristophanes Cleonem ira percitum, contracta fronte, & indignabundum exandescendentemq; innuens, dixit.

In Equiti.

Κ' ἔλεψε νάπυ, καὶ μέτωπ' ἀνέσπασεν.

Conspexit Sinapin & frontem contraxit.

ERUCA.

CAP. XL.

ERUCA Græcis, Eruca Latinis nominatur, Arabibus *Iergir*, *Ergir*. seu *Giargir*, Italis *Ruchetta*, & *Rucola*, Germanis *Rokette*, & *Rokelen*, Hispanis *Oruga*, & *Aruga* Gallis *Roquette*. Ὠρωον dictum volunt, quod iura commendat, habeatq; peculiarem in eis gratiam: quod dixit Plinius, in condiendis obsoniis tanta est Erucæ suauitas, vt Græci Ὠρωον appellaerint. Erucam verò, quod erodat: nam si degustaueris, os & linguam satis acriter vellicabit. Ea duplex est, satiuæ, & siluestris. Satiuæ folio est longo angustioq;

Nomina

Li. 20. ca. 13.

Genera

ERUCA SATIUA.



in profundas, sed rariores crenas diuiso, sisymbrij aquatici modo, sapore acri & amariusculo: caule pedali aut sesquipedali: floribus in cacumine albicantibus aut pallidis, semine in corniculis incluso, vt in irione. Radix est illi alba, tenuis acris. Erratica foliis est satiuæ angustioribus, frequentioribus incisuris laciniatis, gustu acriore, sapidioreq; caulibus numerosis, floribus luteis, corniculis in vniuersa ferè planta numerosis, sursum spectantibus, semine sinapi simili, acri & amariusculo. Vtraque in acetariis cum lactuca frequentissimè vescimur. Cruda Eruca, inquit Dioscorides, venerem largiore cibo concitat. Semen eius idem præstat, vrinam ciet. Concoctioni prodest, aluo perquam accommodata. Semine ad condimenta vtuntur: quod vti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto digerunt in pastillos. Gignitur etiānum siluestris Eruca maximè in Iberia, quæ Occidentem spectat. Cuius semine pro Sinapi incolæ vtuntur. Vrinam vehementius pellit, & multò satiuæ acrior. Erucæ facultatem & vsum medicum, Plinius explicat

Li. 2. ca. 134.

Vires & Temper.

Lib. 19. c. 8.

his verbis. Eruca quoque & nasturtium vel æstate vel hyeme facillimè nascuntur. Eruca præcipuè frigorū contemptrix, diuersa est quàm lactuca naturæ, conci-

ERUCA Siluestris.

Li.20. c.13.

Li.2. Alim.



liatrix veneris: idcirco iungitur illi ferè in cibis, vt nimio frigori par feruor immixtus temperamentum æquet. Et alio in loco. Eruca semen scorpionum venenis & muriasranei medetur. Bestiolas omnes innascentes corpori arcet. Vitia cutis in facie cum melle illitum: lentigines ex aceto. Cicatrices nigras reducit ad candorem cum felle bubulo. Aiunt verbera subituris potum ex vino, duritiam quamdam contra sensum inducere. Putant subtrita Eruca si fricentur oculi, claritatem restitui. Tussim infantium sedari. Radix eius in aqua decocta fracta ossa extrahit. Tria folia siluestris Eruca sinistra manu decerpta, & tria in aqua mulsa si bibantur, regio morbo medentur. Galenus quoque scribit hoc olus manifestissimè calfacere: quare solum ipsum mandere, nisi lactuca foliis misceatur, non esse facile. Semen autem generare, & coeundi appetentiã excitare. Capiti etiam dolorem inferre, præsertim si quis ipso solo vescatur. Non solum autem supradictorum auctorum, sed Poëtarum

etiam testimonio Eruca stimulanðe veneri nata videtur. Martialis.

Et venerem reuocans Eruca morantem.

Columella.

Et quæ frugifero seritur vicina priapo,

Excitet vt veneri tardos Eruca maritos.

Idem salacem nominauit.

Iamque Eruca salax sæcundo prouenit horto.

ERUCA Palustris.

Item Ouidius:

Nec minus Erucas iubeo Vitare salaces.

Erucis annumeranda videtur herba illa, quam alicubi in hortis colunt, & acetariis immiscet, & quam vulgares herbarij S. Barbaræ herbam appellant, Dodonæus Barbaræam; Galli l'Herbe sainte Barbe, Germani S. Barbara kraut.

Eruca igitur palustris nominetur. Caulem habet rotundum, solidum, striatum: folia Erucæ modo laciniata: flores luteos: siliquas teretes, semine refertas: radicem ex obliquo prodeuntem, & oblongam. Pæssim in campestribus nascitur, & locis aliis incultis, maximè vliginosis. Majo & Iunio mensibus floret, ac subinde in siliquis semen profert. Pena pseudobuniadem dici posse ait, quod sit incisura, magnitudine, floribus & siliqua napi siue Buniadis. In aruis humidis prouenit. Gustanti primùm subacris esse, deinde parum etiam adstringere videtur, vt calidam & siccam esse nemo dubitare debeat. Vulnerariam herbam esse & temperamentum eius, & experientia docet. His verò

Forma.

Locus.


Tempus.



verò potissimùm vlceribus medetur quæ impura sunt, & in quibus caro super-
crescit: nam quod quadamtenus acris sit, sordes extergere, quod valenter siccet
carnem minuere potest. Sunt & qui Erucam cineream vocent herbã hîc postre-
mo loco depictam, quod foliis Erucæ siluestri proxima sit. Radicẽ est modicẽ fi-
brata, crassiuscula: caule sesquipedali, anguloso,

Forma.

ERVCA Cinerea, Dalech.




lanugine candida & molli obducto: foliis Erucæ siluestris, vt diximus, auersa parte albicanti-
bus, aduersa planè cinereis, lanuginosis, crassis:
flore in vertice caulium velut racematim con-
gesto, spissa lanugine pubescentẽ, nigris pun-
ctis maculoso. In maritimis Corsicæ prope
Aiaceam nascitur. Præter has Erucã peregrinã
Clusius pictam dedit, quæ aliquot caules ex
vna radice exeuntes habet, sesquipedales, ro-
tundos, graciles, & in his multa foliola oblon-
ga, angusta, incaua, nonnihil veluti circumro-
sa, acri sapore: flores in summis caulibus con-
gestos, luteos, Erucæ vulgaris floribus mino-
res: quibus succedunt siliquæ, seu folliculi sub-
rotundi, tumentes, in quibus semen subrufum,
acre. Radix est minimi digiti crassitudine, can-
dida, nonnihil fibrosa. Crescit quibusdam Ca-
stellæ locis incultis & secus vias, vbi Maio flo-
ret, in Belgio, Iunio & Iulio. Hanc ille inter
Erucæ genera referendã censet. Lobellius Pa-
tauinum marinum Leucoium vocat. Hîc etiã
inferanda fuit propter communes & affines

Locus.

ERVCA Peregrina, Clus.



ERVCA Siluestris, angustifolia.



naturam & effigiem inter Erucam & Erysimum, quæ Eruca siluestris angustifolia Lobellio dicitur: Profert enim ex cauliculis inflexis & cubitalibus flores luteos. Erucæ siluestris, cornicula siliquarum Sinapi sunt aut Nasturtij siluestris, vbi semen acre; vti folia angustiora, eiusdem cum Eruca siluestri coloris, sed minimè diuisa, Tarconis ferè paria, quæ Erucam aut Erysimum sapiunt, quibus idcirco affinis natura putatur, imo Erysimum nostris verum videtur esse.

ERYSIMVM.

CAP. XLI.

Nomina



Ερύσιμον Græcis dicitur quod Latinis Erysimum & Irio teste Plinio: Ερύσιμον quidem ἀπὸ τῆς ἐρείκης, idest, à multiplici foliorum sectione: nam erucæ modo laciniata conspiciuntur. Alij ab oleris præstantia dictum volunt, quasi Ερύτιμον, quod est pretiosum & nobile.

Forma.

Nonnulli ἀπὸ τῆς ἐρύνης, quod ob suam caliditatem maxima trahendi facultate præditum sit. Irionem autem Latini ab irruendo nuncuparunt, quod ignea vi, &

Lib. 8. hist. ca. 3.

feruido sapore irruat in gustum. Erysimum scribit Dioscorides foliis esse erucæ siluestris: cauliculis in lori modum lentis, & obsequiosis: floribus luteis: siliquis in

Ibid. ca. 7.

cacumine gracilibus, vt fœnigræci, corniculatis, semine nasturtij, exiguo, vrentis

gustus. Theophrastus (quod & hîc diligenter animaduertendum est) Erysimum

inter cerealia connumerat, & sesamo simile facit, atque ideo ab Erysimio Dioscori-

dis prorsus diuersum, quod folia erucæ siluestris habet, atque inter plantas acres

non inter frumentaceas, in quibus de sesamo agitur, ab eo recensetur. Cum Theo-

phrastus scribat, τῶν δὲ θερμῶν κέγχρως μὲν καὶ μελίνης χαλαμώδης σησάμου δὲ καὶ ἐρυσίμου

ναρθηκώδης μάλλον. Idest, Æstiuarum milij, scilicet & panici arundinaceus caulis,

Sesamo autem & erysimo ferulaceus magis. Et rursus, σήσαμον δὲ ὁδεῖς ἐσθίει χλω-

ρόν, ὁδὲ θερμόν, εἰ δὲ μὴ ἐρύσιμον, μὴ δὲ ὀρμινόν. σκεπτόν καὶ τὰ ὅτι εἰ πικρὰ. ἔτι δὲ ὁ μὲν

ἐρύσιμον ὁμοίον συσάμου, καὶ λίπος ἔχει. Id est, Sesamū viride nullus edit, neq; lupinum.

Si etiam neque Erysimum, neque orminum, quærendum si & hæc amara sunt.

Est autem Erysimum sesamo simile, & pinguitudinem habet. Plinius vtriusque

Erysimi meminit. Vno enim loco Theophrastum secutus frugibus annumerat.

Lib. 18. c. 7.

Æstiuæ quæ æstate ante Vergiliarum exortum seruntur, vt milium, panicum, se-

sama, orminum, irio, Italiæ duntaxat ritu. Et paulò post. Æstiuæ frumēta diximus,

sesamam, milium, panicum. Sesama ab Indis venit, & ex ea faciunt oleum. Color

eius candidus. Huic simile est in Asia, Græciāq; Erysimum: idemq; erat nisi pin-

guius esset, quod apud nos vocant Irionem, medicaminibus annumerandum po-

Li. 22. c. 25.

tius quàm frugibus. Alio in loco Dioscoridis Erysimum memorat his verbis.

Irionem inter fruges sesamæ similem esse diximus, & à Græcis sesamum vocari.

Galli Velarum appellant, (vetus Cornarij codex Velam habet). Est autem frutico-

Li. 6. simpl.

sum, foliis erucæ, angustioribus paulò, semine nasturtij. Galenus quoque inter

simplicia medicamenta, erysimū plantis acrimonia, & ignea facultate præditis

comparat, inter alimenta sesamo. Ex quibus perspicuum est hoc erysimum ab il-

Li. 1. Alim.

lo multum differre. Etsi Plinius ea non distinxisse, sed pro eadem planta accepisse

videatur. Hermolaus & Ruellius siluestrem illam erucam, quam Nobilem vo-

cant Itali, Erysimum esse dixere: quorum sententiam Matthiolus improbat, & duo

alia Erysimi genera proposuit. Priori notas ferè omnes à Dioscoride traditas in

eum competere putat. Alterum cui folia sunt minora, cornicula paulò vegetio-

ra, magis genuinum esse censet. At Matthiolum reprehendunt Pena & Lobel-

lius, quod Rapistrum vulgò à rapi sapore & aliquâ foliorum similitudine sic di-

ctum loco Erysimi prioris acceperit, quod neque Dioscoridis Erysimio respōdet,

neque cum Matthioli Erucæ siluestris foliis similitudinē habet. Tum odor, sapor

rapi,

IRIO, Matth.




busdam videtur esse. Erysimum, ut scribit Dioscorides, iuxta vrbes, itinera, hortosq; nasci. Contra thoracis fluxiones efficax est, etsi purulenta extusiuntur, inquit: regio morbo & coxendicibus prodest: contra venena in delinctu cum melle datur (Græcè legitur, τοιοῦτα πρὸς θώρακος ῥευματισμούς, ἐμπύους, βήχας ἰσχυράς, ἐκλεγχόμενον σὺ μέλιτι, τῶν ἐ) ὅ, &c. Id est, ea semina faciunt ad fluxiones in thoracē,

Locus.
Vires &
Temper.
Lib. c. 10.

IRIO Altera, Matth.



ERYSIMVM Verum.



pectore suppuratos, tusses, icterum, coxendicum dolores, si cum melle delingantur. Bibuntur etiam aduersus letalia venena) Illinitur ex aqua aut melle vtiliter cæcis carcinomatis, parotidibus, duritiis mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multò ad clysteres fiet, si aqua madescat, atque torreatur, vel linteo alligatum pinsita farina oblitum perassetur. Ruellius corruptum codicem secutus sic vertit: sed in vetere legitur non *Εἰς τὰ κλύσματα*, sed *Εἰς τὰ ἐκλείγματα*. Vertendū igitur, melius multò ad eclegmata, siue linctus fiet, &c. Hanc lectionem cōfirmat etiam Galenus de Erysimi viribus sic scribens. Erysimi fermen sicut gustu nasturtio apparet simile, ita facultate igneum est, & calfaciens. Porro vbi in eclegmate vti ex vsu est, præstat aqua maceratū refrigerare, aut linteolo inuolutum, & crusta pistoria circūlitum torrere. Vtile est cum eclegmate ad promouendas crassorum lentorumq; pectoris pulmonisq; humorū expuitiones. Quin & parotidas induratas, & duritias antiquas vberum & testiculorum iuuat. Refert Dioscorides quod cum aqua & melle cataplasmatismodo illitum occultis profit cancris. Eadem tradidit Plinius, & præterea quædā alia habet. Erysimum vtilissimū tussientibus cū melle, & in thoracis purulentis excreationibus. Datur & regio morbo, & lumborum vitiis, pleuriticis, torminibus, cœliacis. Illinitur verò parotidum & carcinomatum malis. Testium ardoribus ex aqua aliàs cum melle. Infantibus quoque vtilissimum. Item sedis vitiis & articulariis morbis cū melle & fico. Contra venena etiam efficax potū medetur & suspiriosis: item fistulis cum axungia vetere, ita ne intus addatur. His facultatibus quā maximè Erysimi nostri virtutes respondent: constat enim tenui quadam moderatè & incidente substātia, cum humidis & abstergentibus partibus permixta, vt crassam viscidamq; pituitā citra nimiam exsiccationem incidere, & abstergere, atque propter flatū nonnihil commixtum non magno concitu expectorare. Quare arteria cum est præstantissimum, asthmaticis infarctu & obstructione pulmonum laborantibus vtilissimū, atque etiam voci raucæ, etiam diuturnæ. Hoc primus quod sciam, in vsum adduxit Præceptor Rondeletius, quem memini pueri phonaſci vocem retusam admodum & pene cū spiritu amissam, clarā sonorāq; reddidisse eius dūtaxat decocto.

NASTURTIVM.

CAP. XLII.

Nomina



ΑΡΔΑΜΟΝ Græci, Latini Nasturtium dicunt, Mauritani *Nas alchef*, seu *Narf*, Itali *Nasturtio*, & *Agetto*, Germani *Kressen*, & *Gardēkress*, Hispani *Nasturcyo*, & *Malpica*, Galli *Cresson de iardin*, *Cresson alenois*, & *Nasitort*. Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Barbari quidam herbarij Creſsionem hortensem vocant. Nonnulli *κάρδαμον* Græcis dictum putant, quasi *καρῆδαμον*, quod caput domet: nam arcem mentis obsidens sua ferit acrimonia, & ignea vi præditum caput tentat. Alij *παρὰ τὸ κέρας μύδν*, idest, quod pupillas coeuntibus oculorum palpebris abscondat, ita dici aiunt: nam luminibus admotum subinde cogit conuiuere. A quo *καρδαμήτην* verbum declinarunt, quod conuiuere dicimus. Nec desunt qui dictum arbitrentur *ἀπὸ τῆς καρδίας*, quod cor foueat, & in syncope cardiaca plurimum valeat. Id innuere videtur Aristophanes, cum ait, *ἐχθὲς ἐφαγον κάρδαμα*. Τὶ *καρδαμύζης*; Edi heri Nasturtia. Quid Nasturtiaris? Et, *ὀξύθυμων καὶ δολγίων, καὶ βλεπόντων κάρδαμα*, idest, qui acri sunt animo, iustique, quique Nasturtia tuentur, idest, acutum cernunt. Nasturtium verò Plinio auctore nomen accepit à narium tormento. Et inde vigoris significatio prouerbio id vocabulum vsurpauit, (Legit Dalechamp. Et inde vigoris significatione prouerbium id vocabulum vsurpauit,) veluti torporem excitantis. Quæ vulgarium Plinij codicum lectio cū vix tolerari possit, voce excitantis ad præcedentē gignendi

In Thes.
mop.
In Vesp.

gignendi casum non rectè relata, cum potius excitans scilicet significatio, siue prouerbiū legi debere videatur, Cornarius multò emendatiùs locum hunc legisse videtur, hoc modo. Et inde vigoris significatio prouerbio eius esum vsurpauit, velut torporem excitantis. Est enim reuera prouerbiū, ἔσθιε κάρδιανον, Ede nasturtium, quod in socordem, ignauum, & hebetem dicebatur, propterea quod vim nasturtio inesse credebant animi vigorem excitandi, vt ex Plinio dicemus. Dioscorides nasturtij vnus meminit. Plinius duo eius genera cum fecisset, vnum album, alterum nigrius, aliquanto post nasturtij siluestris meminit. Hic tria nasturtij genera primū facimus, nasturtium hortense, silvestre, & marinum, de quo in libro de plantis maritimis dicemus. Fuchsius & Dodonæus Iberidem nasturtium silvestre vocant. Nasturtium hortense caules erigit teretes, pedales, aliquando etiam sesquipedales, tenues, in quibus

NASTURTIVM,
Hortense.



Lib. 20. c. 13.
Genera.

Cap. 121.
Lib. 5. c. 65.

Forma.

NASTURTIVM
Silvestre, Dalech.



Lib. 19. c. 8.

Lib. 2. c. 141.
Vires & Temper.

folia parua, laciniata, gustus acris & feruidi, flores paruos, albos: folliculos rotundos ac pressos, in quibus semen includitur, in rubro nigricans. Paucim in hortis satum prouenit: floret aestate, Iunio potissimū mense. Haud multò post semine pragnans est. Nasturtium silvestre radice est longa, tenui, candida, fibrata: caulibus multis fruticat dodrantalibus, & si pinguius solum fuerit, pedalibus, folio est satiui, copioso, densius per ramos congesto: flore in umbella ex albo purpurascens: semine in latis vaginis, thlaspeos modo bifidis, gustus acris, & satiuium nasturtium odore imitante. In agris frumentariis prouenit, & lapidosis, macrisq;. Nasturtium, inquit Plinius, in Arabia miræ amplitudinis dicitur gigni. Idem cum Dioscoride dicit esse Babylonicum. Omnium semen Dioscoride auctore est acre, excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas excutit, lienem imminuit, partus examinat, menses cit, venerem stimulat, sinapis & crucæ simile intelligitur: lepras & impetigines absterget. Illitum cum melle lienem extenuat, fauos expurgat: pulmonum vitia extrahit sorbitionibus incoctum: serpentium venenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur: tumores collectionesque discutit: ad suppurationem perducit furunculos, illitum cum muria. Herba ad omnia eadem effectus, licet minor. Plinius diffusius nasturtij vires declarat, & in quibusdā à Dioscoride dissentit. Nastur-

Lib. 20. c. 13.

tium, inquit, venerem inhihet, animum exacuit. Album purgat, bilem detrahit potum ex aqua decem denarium pondo. Cum lomento strumis illitum opertumq; brassica præclarè medetur. Nigrius capitis vitia purgat. Visum compurgat, commotas mentes sedat ex aceto sumptum: lienem ex vino potum, vel cum fico. Tussim ex melle, si quotidie ieiuni sumant. Semen ex vino omnia intestinorum animalia pellit, efficacius adhibito mentastro. Prodest & contra suspiria, & tussim cum origano, & vino dulci. Pectoris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos discutit cum pice, extrahitq; corpore aculeos. Et maculas illitum ex aceto. Contra carcinomata adiicitur ouorum album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infantibus verò è melle vtilissimè. Sestius adiicit vstum serpentes fugare, scorpionibus resistere. Capitis dolores contrito, & alopecias emendari addito sinapi, grauitatem aurium trito imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in aures succo. Porriginem & vlcera capitis cum adipe anserino, furunculos concoquit cum fermento. Carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit. Phagedanas vlcerum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis cum polenta ex aceto illinitur: item licheni: item vnguibus scabris: quippe natura eius caustica est. Siluestri verò ad omnia ea effectus maior. Hæc Plinius. Dioscorides tradidit nasturtij semen *συνισίαν πα-*

Lib. 12. c. 27.

πορμῶν, id est, venerem stimulare. Plinius contra venerem inhihere. Cui assentitur Florentinus in Geoponicis Constantino attributis, *φασὶ δὲ*, inquit, *τὸς ἐσθίωντας κορδαμον, ὁ ξυλέπους τὴν δύναμιν γίνεσθαι*. Et addit, *ἀφροδισίων ἐπεκτινῶτερόν ἐστι*. Sed quum hæc tum Dioscoridi, tum experientiæ repugnent, dicendum aut eos nasturtij virtutes nō rectè intellexisse, aut codices eo in loco deprauatos esse. Galenus perspi-

Lib. 7. sim.

cuè eius vires & facultates explicat. Nasturtij semen, inquit, adurentis seu causticæ facultatis particeps est, velut napy. Proinde coxendicis & capitis dolores leuat, atque adeò quodcumq; rubrificationem postulat & excalfacit sicut napy. Miscetur quoque remediis iis, quæ exhibentur asthmaticis, tanquam scilicet id, quod crassos succos valenter incidere valeat, velut & napy. Nam per omnia ei simile est.

NASTURTIVM Peregrinum, Myconij.



Porro & herba arefacta similem semini vim possidet. Humida verò adhuc ac viridis, propter aqueæ humiditatis mixtionem, multò femine inferior est, adeoq; tunc mordacitas eius moderata est, vt cum pane eo vti liceat. Hæc Galenus. Nostri cum lactuca in acetariis nasturtio per æstatem libèter vescuntur. Adiiciemus hic ex doctore Myconio rarum & peregrinum Nasturtium quod Perunianum cognominat, atque ita describit. Herba est bicubitalis multos ab vno trunco caules ex viridi rufescentes, leues, geniculatos, rotundos, solidos, & ex iis ramulos itē multos hac illac spargēs, & longiùs porrigens, vt adminiculis egeat, quibus fulciatur, & ob id vicinas plantas amplectatur. Ex iis folia longis pediculis nixa pendent, rotunda, læuia, neruosa, neruis à centro foliorum ad circumferentiam ductis veluti lineis, & qua foliorum extremitates attingūt, veluti in spinas desinentibus, folia non prorsus rotunda sunt, sed quadam ex parte anserinum pedem æmulatur, caua sunt acetabuli figura, supernè viridia, infernè minùs. Horum ferè medio siue centro pediculus

NASTVRTIVM.

Indicum, Dodon.

NASTVRTIVM

Silueſtre, Cluſij.

pediculus inferitur, prope cuius è caule exortum, alius pediculus emergit longus, cui flos infidet luteus, calathi specie, ex quinque foliolis contextus, quæ rursus ambiunt alia quinque folia exterius rubescentia, quemadmodum & totus calathus rubescit. Calathi forma est consolidæ regali adsimilis, nisi quod recta protenditur. In tribus inferioribus foliolis, florum ad latera diuisuræ quædã sunt & sectiones, in quorum medio macula rubra conspicitur, & supra eorundem trium foliolorum medium secundum longitudinem à centro ad folij extremum decurrit stamen quoddam instar fimbriæ ex multis tenuibus, breuibus & luteolis pilis contextæ, ut in iride visitur. Caterum per omnia foliola à calathi fundo ad apicem usque, lineæ quædã dicuntur rubræ: flos inodorus est, qui autumnino exoritur, quo abeunte vas quoddam relinquitur, ex tribus veluti vasis compactum, viride, asperum, ut in secunda heliotropij specie. Semine cum legitur viride est & molle, deinde nigrescit & rugatur. Radix subest candida, non admodum altè depacta, multifida, fibrata. Sapor radice, caulium, foliorum, florum, idem qui nasturtij. Odore etiã nasturtio proxima est. Quare nasturtium Myconio iure dictum, veteribus ignotum. Perunianum verò à Peru unde aduectum, nobis non nisi in hortis diligenter cultum & satum provenit. Vires nasturtio similes esse gustus demonstrat. Quare in acetariis & medicamentis idem qui nasturtij, usus. Dodonæus plantam pictam Nasturtij Indici nomine accipit, quæ ex icone minus affabrè delineata ita describit. Speciem cōvoluuli exhibet, folia eius lata, angulosa, & pulchrè depinguntur virentia: flos luteus retro propendens habet corniculum instar floris regij, quem Delphiniū appellant. Clusius aliud Nasturtiū silueſtre Valentinū depinxit, atque sic descripsit. Vnicus huic caulis, atque statim à radice supra solum in ramulos diuisus, hirsutus & asper, virens, rotundus, pedalis, foliis tenuibus & multifidis, nasturtij ferè vulgaris æmulis, sed tenuioribus, viridibus, acri gustu & sapore, vulgaris nasturtij modo fert extremis ramis spicatim pallidulos flosculos, deinde exiguas siliquas, duabus valuulis constantes, cum

ligula prominente, in quibus semen continetur nasturtij. Radix singularis, candidans, quæ singulis annis perit. In regno Valentino reperitur. Martio floret. Quod pleraque notas cum nasturtio communes habeat, nasturtij nomine donauit cui (quantum ex gustu diiudicare licet) per similes facultates habere potest.

Nomina
Lib. 2. c. 121.
Ibid.



CARDAMO cardamine est affinis, atque ideo sic dicta, auctore Dioscoride, quod gustu cardamum, id est, nasturtium representat. Sisymbrium cardaminem Dioscorides, alij sion appellant. Sed cardamine solo nomine sisymbrio similis est: nam nasturtij potius quam sisymbrij species est. Cardaminem magno consensu Ruellius, Matthiolus, Fuchsius eam herbam esse putant, quam Officinæ nasturtium aquaticum appellant, vulgus *Cressionem*, Galli *Cresson*, Germani *Brunnenkroß*, Itali, *Crescione*, quod notæ omnes à Dioscoride expositæ huic maxime faueant. Est enim herba riguum vernacula, & laueris comes: nusquam nisi in aquatilibus nascitur, tum nasturtium resipit, vnde cardamines, id est, nasturtiaræ, & in Officinis nasturtij aquatici nomen. Adhæc folio est, cum inter initia emicat orbiculato, cum adoleuit in folium erucæ laciniatum degenerat. Postremo nec ei desunt vires à Dioscoride & aliis veteribus assignatæ, vt dicemus. His paucis in re notissima delineamentis Dioscorides contentus cressionem nostrum expressit. Cæterum caule profilit cauo, sesquipedali, ima parte multis radicularum fibris subinde capillato, è cuius alarum cauis cirri frequētes sinuatim erumpunt, candidulo flore: semine in siliquis exiguo & acri. Ramuli in aquis cum insenuerunt etiam candicantibus capillamentis articulatis confibrantur, quæ seniles canos aliquatenus representant. Plinius eiusdem meminit, cum enim de priore sisymbrio dixisset, subiicit, Quod in riguis nascitur simile nasturtio est. Pena & Lobellius id Sion erucæ folium Cratenæ esse arbitrantur, vt annotauimus in lib. de Palust. Est & Cardamine altera eiusdem generis auctore Matthiolo, hic secundo loco appicta, sed foliis & caulibus longè minoribus, ramulis numerosis, in cacumine tantum comantibus, in quibus flosculi exeunt albicantes. Hæc non solum in aquosis & riguis prouenit, sed & in hortis, & secus itinera, acri sapore. Pena & Lobellius cum Matthioli Cardamine, siue Sisymbrium aquaticum primum, id est, vt vulgi verbis utar, Cressionem nostrum, fecerint Sion Cratenæ, erucæ folium, istam secundam cardaminem Matthioli siue sisymbrium aquaticum secundum statuunt cardaminem primam siue sisymbrium aquaticum primum Dioscoridis. Idem Dodonæus in Historia stirp. Gallicè *Passerage sauvage*, à caloris acrimonia, aut *Petit Cresson aquati*

SISYMBRIVM, Cardamine
I. Cressio vulgaris, Matth.

Lib. 2. c. 60.
In lib. 2.
Diosc. cap.
120. & 121.
cap. 275.



Forma.

SISYMBRIVM, Cardamine
II. Matthioli.

Lib. 20. c. 22

Genera.

lib. 2. Diosc.
cap. 121.



Cardaminem magno consensu Ruellius, Matthiolus, Fuchsius eam herbam esse putant, quam Officinæ nasturtium aquaticum appellant, vulgus *Cressionem*, Galli *Cresson*, Germani *Brunnenkroß*, Itali, *Crescione*, quod notæ omnes à Dioscoride expositæ huic maxime faueant. Est enim herba riguum vernacula, & laueris comes: nusquam nisi in aquatilibus nascitur, tum nasturtium resipit, vnde cardamines, id est, nasturtiaræ, & in Officinis nasturtij aquatici nomen. Adhæc folio est, cum inter initia emicat orbiculato, cum adoleuit in folium erucæ laciniatum degenerat. Postremo nec ei desunt vires à Dioscoride & aliis veteribus assignatæ, vt dicemus. His paucis in re notissima delineamentis Dioscorides contentus cressionem nostrum expressit. Cæterum caule profilit cauo, sesquipedali, ima parte multis radicularum fibris subinde capillato, è cuius alarum cauis cirri frequētes sinuatim erumpunt, candidulo flore: semine in siliquis exiguo & acri. Ramuli in aquis cum insenuerunt etiam candicantibus capillamentis articulatis confibrantur, quæ seniles canos aliquatenus representant. Plinius eiusdem meminit, cum enim de priore sisymbrio dixisset, subiicit, Quod in riguis nascitur simile nasturtio est. Pena & Lobellius id Sion erucæ folium Cratenæ esse arbitrantur, vt annotauimus in lib. de Palust. Est & Cardamine altera eiusdem generis auctore Matthiolo, hic secundo loco appicta, sed foliis & caulibus longè minoribus, ramulis numerosis, in cacumine tantum comantibus, in quibus flosculi exeunt albicantes. Hæc non solum in aquosis & riguis prouenit, sed & in hortis, & secus itinera, acri sapore. Pena & Lobellius cum Matthioli Cardamine, siue Sisymbrium aquaticum primum, id est, vt vulgi verbis utar, Cressionem nostrum, fecerint Sion Cratenæ, erucæ folium, istam secundam cardaminem Matthioli siue sisymbrium aquaticum secundum statuunt cardaminem primam siue sisymbrium aquaticum primum Dioscoridis. Idem Dodonæus in Historia stirp. Gallicè *Passerage sauvage*, à caloris acrimonia, aut *Petit Cresson aquati*



aquatique, Germanicè *Gauchblum*, *Wilder Kresz* dicitur, à quibusdam herbariis flos cuculi. Nasturtium silvestre & Iberis Fuchsis, Nasturtium silvestre Cordo, & pratense Trago, folia primùm rotunda emittit. Deinde caulem rotundum erigit, ferè pedalem, in quo erumpunt folia oblongiora, vtrinque profundius incisa, foliis

CARDAMINE Altera,
siue Sisymbrium.



erucæ ferè similia: in cacumine flores candicantes, deinde siliquæ parvæ, quæ semen continent. In pratis humidis provenit, & circa fossas & stagna. Cardamine altera siue sisymbrium, cardamine secūdum, Lobellio auctore, exit pratis vdis Angliæ, Germaniæ, Belgij, & frigidarū regionum, vbi Cardamine quam foliis imis refert. In pedali caule ut plurimùm singulari folia exitiora nasturtij hortensis similia, flores lactei purpurantes erucæ aut napi, cardamines prioris maiores, gustu, uti vniuersa planta, & viribus sisymbrium referentes. His accedit ex eodem Lobellio Cardamine trifolia, quibusdam Belgij cultoribus & stirpium ditioribus hortis repertu facilis, nasturtij cardamines gustu & facie plantula palmaris, foliis quadantenus sisymbrij cardamines, sed posita terno, oxys Plinianæ ritu, humi procumbente, flos in pediculis albus, isopyri vulgaris aut cardamines. Radix multum fibrata. His alias duas cardamines species Dalechampius addidit, cardaminem minimam aquaticam, & cardaminem odoratam. Cardamine minima aquatica, radice est tenui, longiuscula,

CARDAMINE, V.

Dalechamp.

CARDAMINE Trifolia,

Lobellij.



giuscula, parum fibrata, candida, foliis eius quam sisymbrium cardaminem vocat Dodonæus, minoribus: flore paruulo, candido, minore quàm in superiore, strigiflore, & graciliore: siliquis tenuibus eiusdem gustus. In marginibus & aggeribus fossarum prata cingentium nascitur. Cardamine odorata radice est crassiuscula, sensim gracilescente, dodrantali, granulis plurimis candidis, & coriandri semine non maioribus, tuberosa, albæ saxifragæ modo, multum fibrata, foliis sisymbrij

Ibid. cardamines Dodonæi, humi stratis, amplioribus, nigricantibus, gustu acribus, sed odore cùm manduntur, tam suavi, vt ad cinnamomum accedat. Quam ob causam cardaminem odoratam, seu nasturtium odoratum vocauerunt, flore ac fructu est eodem. Quidam Caltitrichon Plinij esse putant, cui folia sunt lenticulæ similia, caules iunicei, tenuissimi, radix minima. Nascitur in opacis & humidis gustatu feruens. In Sequanorum siluis abietibus & piceis consitis cardaminem hanc odoratam vidit Dalechampius, muscoso solo. Cardamine, inquit Dioscorides, exsiccit, vrinas mouet, cruda estur, lentigines purgat, cutisq; vitia in facie, noctibus imposita, matutinisq; detracta. Galenus, sisymbrium cardamine quoniam cardamo, id est, nasturtio simile quiddam gustu præse fert, cùm siccum est, tertij est ordinis calfacientium & desiccantium: cùm humidum, & viride, secundi. Quare Cressionis nostri cum lotium hæret, decocto, vel crudi esu medici vrinas mouent & calculos comminuunt. Estur quotidie crudum & coctum primis mensis. Cum raphano & petroselini radicibus ex albo meraco & butyro calfactum, & pubi admotum vrinas remorantes educit. Succus ex aceto illinitur vtiliter veteriosis.

Lib. 2. c. 11.

Lib. 2. c. 121.

Vires &
Temper.
Lib. 8. sim.

THLASPI. CAP. XLIIII.

Nomina



SINAPI, erucæ nasturtio similis est herba, quæ Græcis τὸ θλάσσι, & ἡ θλάσση & θλασσίδιον dicitur, & σίηπι ἄγρον, Latinis Thlaspi, & thlaspe, Capsella & Scandulaceum. Sunt huius temporis herbarij, qui nasturtium tectorum vocent: quoniam subinde in parietinis nascitur

ali;

alij siluestre. Vulgus nostrū sinapi rusticum appellat, quoniam digitis friatum sinapim subolet. Germani *Baurnfensf*, & *Baurnkresz*, Hispani *Paniqueso del flor blanco*, Galli quidam *senene sauvage*. Thlaspi autem Græcis à fructus forma dictum est, qui nasturtio similis est, sed latior, & veluti infractus & contusus. *θλασπ* enim contundi & infringi significat, infringendoque quod globosum tumidumque erat, malleo vel lapide cum dilatatione exæquare, vel à seminis inuolucro foliaceo transuersim per mediūve incusso aut diffracto. Duo thlaspeos genera memorat Dioscorides, vnum angustifolium, alterum Cratenæ latifolium. Eadem Plinius habet, nulla thlaspeos Cratenæ mentione facta. Periti herbarij multò plura genera ex seminis forma, à qua huic herbæ nomen inditum fuisse diximus, obseruarunt, vt ex singulorum historia intelligetur. A thlaspe Dioscoridis exordiemur, quæ herba est angustis foliis, digiti longitudine in terram versis, subpinguibus, in cacumine diuisis, binūm dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascantibus ramis (Græcè legitur *ἀποφυάδας ὀλίγας ἔχοντα*, id est, qui adnata, siue ramulos, siue propagines paucas habet) fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente: semine nasturtij, incluso vasis Lenticulæ effigie, nisi quod infringitur (Græcè habetur, *ἐν ᾧ σπέρματιον ἐμφερὲς καρδίαιω, δισκοειδὲς, οἷον ἐν τεθλασμένον*. Id est, in quo semen exiguum, simile nasturtio, disci figura, veluti compressum. Ruellius legisse videtur *φακοειδὲς*, quod verterit lenticulæ effigie, nec temerè, quum thlaspi semen illi pulchrè respondeat, vel ex Plinio ita interpretatus est, vulgaria tamen Dioscoridis exemplaria *δισκοειδὲς* habent) vnde nomen accepit, flos albicat. Nascitur in semitis & parietibus, sepibusque. Semen asperigustus (ita Ruellius ex Plinio vertit, quod Græcè dicitur *σπέρμα λεγνύ*, id est, semen acre) excalfaciens. Alterum thlaspi tradit Cratenes, quod aliqui Persicam sinapi vocant, latis foliis, radicibus magnis. Quæ omnia Plinius ex Dioscoride trāscripsisse videtur, aut certè vnde ille exscripserat. Thlaspi, inquit, duorum generum est, angustis foliis, digitali longitudine & latitudine, in terram versis, in cacumine diuisis, cauliculo semipedali, non sine ramis, peltarum specie, semine incluso lenticulæ effigie, nisi quod infringitur, vnde nomen, flos albicat. Nascitur in semitis & sepibus. Semen asperi gustus. Alterum thlaspi, aliqui Persicon napy vocant, latis foliis, radicibus magnis. In quibus Plinij verbis mancum id videri potest, non sine ramis, pellarum specie, ita vt vox fructu deesse videatur, quæ pellarum speciei comparetur. Galenus de thlaspi hæc etiam prodidit. Vtuntur thlaspi quod è Creta adfertur, quodque vbique nascitur, colore inter luteum & flauum medium, figura rotundum, exiguum adeò, vt sæpe grano milij cedat. Melius est autem è Cappadocia comportatum thlaspi imponamus. Hoc ad nigredinem inclinat, figuram non exquisitè rotundam habet, & antedictum magnitudine per multum superat, atque ab vno latere paruam quandam veluti compressionem præ se fert, vnde ei nomen inditum est. Nascitur luteum vt hoc, ita & illud in Cappadocia plurimū. Ideoque non absolute quod inde asportatur, optimum censendum est, sed quod peculiariter in Sauro nascitur, nec Cretico, nec passim nascenti simile. Hæc de thlaspi Galenus. Ex quibus colligitur duplex esse thlaspeos genus, semine, figura, & colore distans præter illud quod Dioscorides & Plinius secundum fecerunt. Primum Dioscoridis & Plinij thlaspi, Matthioli, Fuchsj, & aliorū peritorum herbariorum iudicio, id est, cuius effigiem hîc proposuimus, quod etsi caule iam edito folia non habeat in cacumine diuisa, tamen cum ceteræ omnes notæ, quas thlaspi suo Dioscorides assignat, ei conueniant, credendum id legitimum esse, præsertim cū antequam caulem emittat, vt obseruare perfacile est, ineunte vere folia proferat humi accubantia, vtrinque circa cacumen diuisa. Sed hæc fugacia sunt, statimque conflascunt. Quæ autem in caule sunt, angusta sunt, vt Dioscorides ait, subpinguia, digitali longitu-

Lib. 2. c. 150.
Genera.
Lib. 27. c. 13.

Forma.

Locus.

Lib. 27. c. 13.

L. b. 1. Anti.


THLASPI. I. Matth.



THLASPI Angustifolium, Fuchsj.



THLASPI. II. Matth.



THLASPI. III. Matthiol.



dine. Ad hæc caule est tenui, duorum dodrantum longitudine, non sine adnatis ramulis, circa quos totos fructus spectantur, folliculi scilicet compressi, aut disco similes, aut lenti, in quibus semen concluditur nasturtio simile, acri sapore. Pena & Lobellius hoc Thlaspi vulgatissimū esse aiunt Vaccarię folio. Sunt qui hoc thlaspi esse Cratenæ, cuius Dioscorides & Plinius meminerunt, falsò credunt. Nam & fo-

liis

THLASPI IIII.

Matthiol.



liis latis, & radicibus magnis caret, quæ thlaspi Cratenæ habet. At si qua sit planta hodie nota, quæ thlaspi Cratenæ merito censerî possit, eam esse putat Matthiolus, quam raphanum rusticum appellauimus & descripsimus: huic enim folia lata sunt, radices magnæ, & ischiadicis confert. Cordus id maius thlaspi sine dubio eam herbam esse putat, quam Germani *Merrettich* appellant, Arabes nasturtium album à candore radices, eosq; reprehēdit, vt diximus, qui acrem istam radicem raphano adscripserunt, eaque malè vtuntur, cum raphano vtendum sit. Alterû thlaspi genus ex Matthiolo etiam depinximus, quod eius semen thlaspi haud absimile videatur. Nascitur in agro Pragensi, locis saxosis & asperis, floret medio vere, Iunio mense semen profert gustui acre. Addidit Matthiolus & tertium & quartû thlaspeos genera hîc quoque apposita. Plura periti herbari obseruarunt, & in lucem protulerunt: quorum declaratio in librum de plâis, quæ in asperis, aridis & montosis nascuntur, reicienda. Est & thlaspi marinum, minimum, de quo in libro maritimis stir-

In lib. 2.
Diosc. cap.
186.

Cap. de rapha.

Locus.

Tempus.

Lib. 5. c. 62.
In hist. plâ.
cap. 114.

pibus dicato, dicemus. Quare de thlaspeos viribus Dioscoridem nunc audiamus. Semen, inquit, bilem vtrinque extrahit potum acetabuli mensura: prodest ischiadicis infusum: sanguinem potu educit, internas suppurationes rumpit: menses ciet, sed partus enecat. Alterum thlaspi vtile ischiadicorum infusioni. Eadem Plinius iisdem verbis habet. Eadem & Galenus, thlaspeos semen, inquit, facultatem habet acrem, adeò vt internos abscessus potum disrumpat: menses ciet, & fœtum necat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuat, ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum supernè tum infernè biliosorum humorum euacuatorium oxybaphi mensura epotum.

Lib. 2. c. 150.

Vires &

Temper.

Lib. 27. c. 13.
Lib. 6. sim.

ARABIS SIVE DRABA. CAP. XLV.



ARABA siue Draba, siue Arabis herba dicta reperitur, & à Serapione nasturtij generibus adnumeratur, quam nasturtium orientale vocat, ob insignem eius acrimoniam, quidam Babylonicû nasturtium vocant. De draba hæc in Dioscoridis exemplaribus leguntur. Draba herba ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex vtroque latere folia seu lepidij, sed molliora & candidiora. In cacumine verò sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem. Herba hæc cum ptisana coquitur in Capadocia maximè. Semen aridum pro pipere obsoniis admiscetur. Sed hoc caput Dioscoridi falsò adscriptum fuisse Marcel. Verg. Matthiolus, atque alij viri docti non sine ratione suspicantur. Primû plantę appellationem si rectè expendamus, neque Græcam, neque purè Latinam esse comperiemus, cum neque apud Galenum, Oribasium, Paulum, Aëtium, neque apud Plinium, aliòsve Græcos aut Latinos auctores scriptum de ea quicquam reperiatur. Deinde in exemplari Dioscoridis Græco manuscripto, bis hæc herba secundo Dioscoridis libro habetur, tum statim post thlaspi, tum in fine libri post glastum ante telephium intrusa,

Nomina

Forma.

*ARABIS SEV DRABA,**Dodon. seu Thlaspi Creticum.**ARABIS SEV DRABA,**Matthiol.**ARABIS SEV DRABA**altera, Pena & Lobell.*

Lib. 4. c. 63.

In lib. 2.
Diosc. cap.
187.

quod aperte ostendit suppositicia n esse in Dioscoride hanc herbam. Cæterum siue à Dioscoride, siue à quouis alio herbario literis prodita sit hæc herba, illam putat esse Dodonæus, quam hîc pictam damus, quam recentiores herbarij thlaspi Creticum vocant. Pedalis est herba, foliis angustis, iberidis foliis ferè similibus, in caulicorum summitate umbellas ferens, in quibus flosculi oriuntur candidi, aut quasi in purpura albicantes: deinde siliquæ parvæ, compressæ, thlaspeos siliquis similes, minores tamen, in quibus semen includitur, gustu acre & feruens, sicuti thlaspeos semen. Huic herbæ thlaspeos vires Dodonæus tribuit. Cordus Plinium eius herbæ mentionem fecisse nomine Dryophoni existimat, cuius verba cum de dryopteri dixisset, hæc sunt. Dryophonon similis herba est, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdatis vtrimque foliis, pollicari amplitudine, qualia oxymyrsines, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido sambuci. Edunt cauliculos decoctos. Semine verò eius pro pipere vtùtur.

Drabam aliam exhibuit Matthiolus, quâ legitimam esse censet, in qua cum leuiuscula sentiatur acrimonia, quam insignem in Draba requirit Serapio, an ea sit eius draba quæ in Italia nascitur, affirmare non audet, nisi forte drabæ pro regionum diuersitate accidat, quod aro accidere scripsit Galenus. Drabam aliam Lobellius monstrat, quæ inter Narbonensium Drabam

& Myagrū media est & congener. Dignoscitur reptatu dodrantalium cauliculorum densissimorum, & radicis exilitate, flos albidus est, quatuor foliolis constans. Hæc Lobellius.

I B E R I S.

CAP. XLVI.



QVÆ ἰβερὶς Græcisherba dicitur, ab Iberia regione nomen inuenit. **Nominat.** Paulus lepidium, & ἀγροκαρδάμων, id est, siluestre nasturtium appella- **Lib. 3. c. 17.**
ri scripsit. Aëtius Cardaminen, quia odorem, saporem, & figuram car- **Lib. 3. c. 17.**
dami, hoc est nasturtij habet, & Galenus odore & viribus cardamo si- **& lib. 12. c. 12.**
mile lepidium esse dicit. Quare in Dioscoride ἰβερὶς ἥτοι καρδάμων pro καρ- **Lib. 7. c. 17.**
δάμων falso legi Cornarius existimat. Galenus etiam lepidium eandem esse her- **Lib. 10. ph.**
bam cum iberide declarat his verbis. Damocratis extat libellus Clinicus inscri- **loc. cap. 4.**
ptus, in quo versibus Iambicis de tribus differit medicamentis. Ac primò quidem
eo quod ex herba quam ipse iberidem appellat, constat. Mox subiungit Galenus.
In Iberide medicum quendam amicum suum hac herba curatum esse, quam ipse
Damocrates iberidem appellat, ut qui ipso visu herbam cognorit, nomen autem
eius nullum audierit, quinetiam id ipsum ignorarit is qui eum usum eius docuit.
Verum ex signis quæ scribit, videtur iberidē appellare, quæ à Græcis lepidium ap-
pellatur, à regione in qua amicus eius curatus est, appellatione ducta. His subiicit
Galenus Damocratis iambos quibus iberidē descripsit. Addit rursus his Galenus.
De hac iberide etiam Archigenes scribit, lepidium ipsam appellans. Dicit autē &
splenicis, & ischiadicis ipsam cōuenire. Ad ischiadas & perfrigerationes Hygieni
Hipparchi. Herbam iberidem quam aliqui lepidium vocant aut agriocardamum
colligito, &c. Cū igitur iberis & lepidium eadem sit herba, perspicuum est ibe-
ridis caput calci primi libri Dioscoridis à nimis curiosis librariis vel medicis, nō
à Dioscoride adiectum fuisse, cū is iberidi locus non rectē assignetur, sed libro
secundo, in quo cum permultis plantis quæ acri facultate præditæ sunt, de lepi-
dio tractat. Eius effigiem his iambicis versibus Damocrates depinxit.

Gal. lib. 10.
ph. loc.
Locus.

*Herba hæc ubiq; multaq; frequens nascitur,
Monumenta iuxta antiqua, muros & veteres,
Tritasque quondam publicè pedibus vias,
Quas iuxta aratrum duxit haud quis agricola.
Semper virescens foliis nasturtij,
Florentibus vere, attamen maioribus:
Caulem cubitalis longitudinis gerit,
Paulò minorem, aut rursus ampliorem, ab hoc
Aestate pendent folia, donec multa hyems
Sarmentitiam deducat hæc ad imaginem, &
Deiecta & exsiccata depereant gelu.
Adnata radici tamen cernes alia.
Aestate florem fert colore lacteo
Multum, tenuem, variūque valde, cauliculus.
Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,
Visum ferè ut fallens, oculos quoque effugiat
Odorem habet radix inde acerrimum,
Vero similem quàm maximè nasturtio.*

Forma.

Hos versus aperte declarat Plinius his verbis. Inuenit nuper & Seruilius Damo- **Lib. 25. c. 8**
crates è primis medentium quam appellauit iberidem, quamquam ficto nomine,
inventioni eius assignato carmine. Nascitur maximè circa vetera monumēta, pa-
rietinasq; , & inculta itinerum, floret semper folio nasturtij, caule cubitali, semi-

Lib. i. c. vlt.

ne tam paruo, vt vix aspici possit. Radici odor nasturtij, &c. Huic descriptioni etiã simillima est ea quę in Dioscoride reperitur, siue ab eo posita sit, siue ab alio auctore inserta. Iberis folia habet nasturtij, vere virētiora, caulem cubitalē aut minorē. In incultis nascitur. Aestate lacteum florem promit, quo tēpore efficacior est. Ra-

IBERIS siue *Lepidium* . *Matth.*

Lib. 12. c. 2.

Lib. 3. c. 184.

Matth. lib.
i. Dioscor.
cap. vlt.
Forma.



Lib. 19. c. 8.

LEPIDIVM PAULI
& *Plinij.*

Lib. 3. c. 77.

Cap. de fi-
liq.

Forma.

dices duas nasturtio similes habet calfacientes & adurentes. In qua descriptione corruptus est locus, μήκος ὃ ὅσον πήχυαῖον, ἢ ἑλαττον, id est, caulem cubitalem aut minorem. Deest enim vox καρλοῦ, & πλεόν, vt sic legatur, μήκος ὃ καρλοῦ ὅσον πήχυαῖον, πλεόν ἢ ἑλαττον, Id est, caulem longitudine cubitalem, maiorem, aut minorē, sic enim Damocrates habet. Sic & Aëtius, versus Damocratis, sed lege carminis soluta recitans, & Archigenes in Epistola ad Aristonem referente Aëtio, in qua iisdem planē verbis iberidem describit, vt vel ex Dioscoride exscripsisse videatur, vel ex ipso Archigene ad finem libri primi Dioscoridis caput de iberide aliquis attexuerit. Veterum Græcorum iberis siue lepidiū doctissimorum herbariorum iudicio, ea est quam hic pictam exhibemus, *Nasturtio saluatico* Italarum, *Passerage sauvage* & *Cresson sauvage* Gallorum, caulibus rotundis, cubitalibus, surculosis: foliis angustis, floribus candidis, & siliquis in quibus semen: radice crassa, candida, gustu acerrima. Ab herbariis colitur in hortis. In Italia tamen & Gallia Narbonensi locis incultis sponte nascitur. Huic iberidi cū minimē conueniant quę de lepidio quodam Plinius tradit, id exire in cubitalem altitudinem, foliis laurinis, sed molli-
bus, item Paulus fruticosam quandā apud suos nasci iberidem similibus lauri foliis, & multo amplioribus, attendēdum id lepidium à superiore iberide siue lepidio prorsus esse diuersum: præsertim cū Dioscorides Lepidiū suum βοτάνιον vocet, id est, Herbulam. Est autem id primum siue maius lepidium Pauli & Plinij ea planē herba quæ à recentioribus Piperitis nuncupatur, (non est autem piperitis Plinij, de qua iam diximus) quod acerrimo gustu linguā vellicet, Officinis raphanus siluestris, non ille quidem de quo post satium diximus, neque raphanus rusticus, sed qui nominatur à Gal-
lis *Passerage*, à feruido gustu, à Germanis *Pfiffkraut*. Lepidiū maius Cordi & Tragi. Folia huic longa sunt, lata, laurinis similia, sed latiora & longiora, & toto ambitu parum crenata: caules rotundi, fractu contumaces, fere bipedales: in quorū summitate flores parui & candidi, deinde semen minutum, radix longa est, & simplex, quæ

quæ sub terra serpit, vnde quotannis furculi multi enascuntur. In hortis herbariorum passim colitur, semelq; sata haud facile extirpari potest. Sed de Iberidis, siue lepidij prioris viribus dicamus. Lepidiū, inquit Galenus, ex quarto est ordine excalfaciētiū, simile nasturtio, tū odore, tū gustu, tū viribus: sed minū eo desiccatur. Qui verò qualitates has sequatur effectu, hi sunt ex capite de Iberide, quod in Dioscor. additū fuisse diximus. Radices ischiadicis cū salsa axungia emplastri modo vtilēs, quaternis horis alligatæ, vt dein in balneas descēdatur, & postea oleo cū lana locus perungatur. Idē auxiliū de Iberidis radice præscripsit Damocrates, his versibus.

Vires & Temper.
Li. 7. simpl.

Gal. lib. 10.
ph. loc.

*Hanc erutam larga satis cape copia
Æstate, nam tunc optima & fortissima est
Adhuc recens siccata sit, sed debilior.
Tusam hinc probe (nam difficulter tunditur)
Pauca subactamque excipies axungia.
Crurique toti, & maxime coxendici
Adhibebis, & ligabis, & fines duas
Horas mulieribus, viris sed quatuor.
Hinc balneo inductos, nec ullo ex unguine
Nec smegmate ullo pinguiore collines,
Sudore sed modico exiliente, in solium
Merges iubens perferre: nam mordacitas
Ingens, caloris sensus atque exoritur.
Verum hinc rigatos leniter perducito.
Illati enim quamuis manibus sint plurimum,
Exibit attamen pedibus suis valens,
Quicumque consilium hoc bonum susceperit.
Ad multum oleum miscebis hinc vinum modicum,
Et concuties, & illines lotos eo.*

Ac mox madore terfo, & pinguitudine Totum teges crus mollibus tu velleribus.

Hoc sanè vtendi modo, inquit Galenus, & inueteratos capitis dolores, & alias omnes quacumque corporis parte inueteratas & ægrè solubiles affectiones ac resolutiones se curasse Damocrates, & omnino vitia in quibus alij sinapismo, alij remedio ex thapsia vtuntur, se hac herba perfanasse ait. Idem omnino ad ischiadas remedium Aëtius bis habet. Idem & Plinius his verbis. Radici Iberidis odor nasturtij. Vfus æstate efficacior, & recenti tantum. Tunditur difficulter: coxendicibus, & articulis omnibus cum axungia vtilissima, viris plurimum quaternis horis, sceminis minū dimidio adalligata, vt deinde in balneis descendatur in calidam, & postea oleo ac vino corpus perungatur: diebusq; vicenis interpositis idem fiat, si qua admonitio doloris superfit. Hoc modo rheumatismos omnes sanat occultos. Imponitur non in ipsa inflammatione, sed imminuta. Ex his grauiſſimorum auctorum scriptis locum in Dioscoride capite de Iberide corrupto legi putat Cornarius, καὶ ἐλαίῳ μὲν ἐρεῖς τοῖς τόποις ἐπιχέρεσθω, & postea oleo cum lana locus perungatur, pro καὶ ἐλαίῳ μὲν ὀίνῳ τοῖς τόποις ἐπιχέρεσθω, hoc est, oleū cū vino locis illinatur: sic enim habent Damocrates & Plinius, vt ex superioribus intelligitur. Sic & Aëtius: ἐξελθὼν δὲ οἶνε λαίῳ λιπαρῷ περὶ ἀντληθεῖς, καὶ περὶ ἀξάμνος, σκέπε τὸ ἰχθὺν ἐρεῖς καὶ θαροῖς. Idest, Egressus autem vino & oleo multo perfusus ac deterfus, coxendicem lanis puris tege. Et alio in loco. A balneo ad oleum multum paucum admodum vinum admisceto, & illinito. Superiores auctores radices Iberidis vsum solummodo ischiadicis præscribunt, Paulus etiā foliorum: sic enim scribit. Quæ verò Iberis apud nos fruticosa nascitur similibus lauri foliis, & multo amplioribus, respondere multa experimenta testantur, non solum in coxarum,

Lib. 10. ph.
local.

Li. 3. c. 184.
& 12. ca. 2.
Lib. 25. c. 8.

In li. 10. ph.
loc. Gal.

Lib. 12. c. 21

Lib. 3. c. 77.

sed in aliis quoque diuturnis affectibus. Per æstatem verò longè sunt efficaciora. Atqui si folia tunc non produxerit, cortex ipsius radice contunditur cum adipe fuillo, vt emplastri specie representet, inde linteolo dēfiori illitum locis maximè dolentibus imponitur, &c. Dioscorides etiam lepidij folia ad coxendicis dolores adhibet. Vis foliorum acris & exalfaciens, inquit, quapropter trita ischiadicis præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice, quarta parte horæ illinatur: lienosis simili modo prodest: lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur. In quibus verba illa, si quarta parte horæ illinatur, quæ Græcè leguntur ἐπὶ τῆς ἰσθμίου πρὸς τὴν ἄσπρον ὥρας, mendo non carere suspicatur Cornarius. Cum enim cæteri omnes auctores, vt diximus, emplastrum ex lepidio impositum, quatuor horas sinendum præscribant, credibile non est rectè hîc legi, vt ad quartam horæ partem imponatur: neque enim tam breui tempore vires suas exerere potest: & fieri potuit, vt τῆς ἄσπρον pro τῆς ὥρας sit suppositum, quod faciliè euenire potuit, si quaternarij numeri nota, δ, interpreti fuit exprimenda. Porro reliquum lepidij in medicina vsum, & ex eius radice amuletum Plinius aliter quàm Dioscorides refert his verbis. Lepidium inter vrentia intelligitur. Sic & in facie cutem emendat exulcerando, vt tamen cera & rosaceo faciliè sanetur. Sic & lepras & psoras tollit semper faciliè, & cicatricum vlcera. Tradunt in dolore dentium adalligatam brachio qua doleat, compescere dolorem.

CORONOPVS.

CAP. XLVII.

Nomina



ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΣ, Latine Cornicis pedem significat, atque etiam refert, foliis ita fissis & dispositis vt Cornicis pedem representent. Est enim Coronopus Dioscoridis acetarium olus, quo horti omnes hodie scatent, Manardi, Scaligeri, Matthioli, Fuchsi, Cordi, & aliorum doctissimorum herbariorum sententia, quod vulgò herbariorum à foliorum integrorum figura Cornu cerui, Gallis *Corne de Cerf*, Italis *Herba stella*, Germanis *krautfuoss* dicitur: etsi eius breuissima sit apud Dioscoridem descriptio: oblonga herbula est, inquit, per terram strata, fissis foliis, coquitur in olere. Radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo cœliacis facit (vel vt in vetere codice legitur, ἡ ῥίζα ἐφορμὴν καὶ ἐσθιορμὴν ποιεῖ πρὸς κοιλιακὰς, idest, cuius radix elixa si edatur, cœliacos iuuat.) Prouenit in aggeribus & locis incultis, & secus vias. Breuiter etiam eadem tradit Plinius. Coronopus oblonga herba est cum fissuris. Seritur interim, quoniam radix cœliacis præclare facit in cinere tosta. Et alio in loco. Aculeatarum caules aliquarum per terram serpunt, vt eius quam Coronopum vocant. Quæ ex Theophrasto expressa sunt, qui Coronopum inter ἐπιγόφυλλα, idest, ea quæ ab radice foliata sunt recenset: itemq; inter aculeatas & sponte crescentes herbas. Etsi verò Dioscorides Coronopum aculeatam esse herbam non dicat, neque de ea libro tertio cum cæteris aculeatis herbis agat, sed libro secundo cum oleribus, iisq; quæ in ciborum vsum veniunt, nemo tamen iure eorum sententiam reprehendere possit, qui Coronopum hîc depictum Dioscoridis Coronopum esse existimarunt. Theophrastus enim ad Coronopi foliorum præsertim recentium formam allusit, vt rectè censet Matthiolus, quæ ea sunt laciniarum tenuitate, vt aculeata videantur, cum tamen pungere non possint, vt cum acanthinis similiter lusit Dioscorides, vel vt ait Fuchsius, foliorum fissuras aculeos appelles licet. Coronopus igitur siue Cornu cerui, folia fert longa, angusta, hirsuta, & in singulis lateribus terna, quaternave foliola, ita vt folia integra Cerui cornibus ramosis simillima sint, per humum strata, & in stellæ figuram disposita, ex quorum medio rotundi & hirsuti oriuntur cauliculi spicam, florem, semen edentes, omnia hæc plantagini proxima, vt nullum ferè discrimen obseruari possit. Vnica nititur radice, innumeris tamē capillamētis stipata. Hæc Dioscorides & Plinius, vt diximus, cœliacis

Li.2. c.170.

Embl. 159. lib.2.

Li.20. c.17.

Li.22. c.19.

Li.21. c.16.

Lib.7. hist. cap.9.

Li.2. Dios. c.123.

Ca.169.

Forma.

cœliacis prodesse scripserunt, quibus subscripsit Galenus. Coronopodis radix comesta, inquit, cœliacis prodesse creditur. Aëtius idem tradit. Paulus colicos iuuare scribit, non cœliacos. Nec librarij est hic error ex vocum affinitate decepti, sed ipsius auctoris Pauli, qui cum alaudam colicis auxiliari scripsisset, mox subiunxit, κορωνόποδος ἢ ῥίζα καὶ ἀλὴ περὶ τὸ κωλικὸς ὠφελεῖν ἐσθιομένη. Id est, Ipsa etiam Co-

Li. 7. simpl.
Lib. 7.

Corn. Em.
bl. 116. li. 2.

CORONOPVS, *Marth.*




ronopodis radix colicos iuuare creditur. Scribit Matthiolus inueniri Coronopū sponte nascentem diluto extenuatoq; solo, in Comitatu Goritiensi, quam ibi vulgus Serpentinā appellat, quòdeius radix in vino pota viperarū, aliorumq; venenatorum animalium morfibz maximè aduersetur, adeò vt ipsa sola (id quod se experientia compertum habere affirmat) liberet demorfos. Huius etiā meminimus in libro de iis quæ in asperis nascuntur, capite de Holoftio. Est & Serpentina minima, nullatenus distans à superiore, præterquàm exilitate: cauliculis enim vix vnciā, aut sesquiunciam æquat. In celsis montium iugis sterilis Sauenæ in Gallia Narbonēsi copiosè prouenit. Ea est, opinor, quam Pena pingēdam curauit: & quam Monspelienses Holoftium suspicabantur, sed perperam propter radicis notam planè contrariam. Eadem etiam aut eam proximè referens, quæ à Clusio nomine Holoftij Salmaticensis depicta est & descripta, vt ostēdimus loco supra citato. Ex his quæ de Coronopo diximus, perspicuum

SERPENTINA *Omnium minima, Lobellij.*



CORONOPVS *Siluestris, sive Serpentina.*



est vehe

est vehementer eos errare, qui Coronopum, plantam eam esse putant, quæ herbariorum vulgò Pes Coruinus, à nonnullis Pes gallinaceus dicitur, quo nonnunquam ad exulcerandas corporis partes, necessitate ita postulante vtuntur medici, cum reuera ranunculi species sit, vt suo loco dicitur. Fuere alij eruditi viri qui multum temporis & diligentia in plantarum natura cognoscenda posuere, qui

CORONOPVS Ruellij,
ex Dodon.



CORONOPUS Mas-
siliensium, Pena.

Li. 2. c. 62.



aliter de Coronopo senserunt. Leonicensius imprimis Coronopum eam herbam esse putat, quam ipse lingua vernacula Capriolam vocat, alij Itali sanguinellam, quod eam pueri æstate in nares immittant, vt sanguinem eliciant. Cuius sententiam minimè probat Manardus. Nam etsi herba hæc in culmi fastigio quinque graciles veluti spicas gerat, quæ cum dilatantur, formam Pedis cornicis, vel alterius aus repræsentent, tamen cum hominum cibis nõ expetatur, folioq; sit nullis incisuris dissecto, nec feratur in hortis, & arida fœni modo assurgat, Coronopus nullo modo dici potest. Quod si quis obiiciat Plinio & Theophrasto Coronopum aculeatam esse herbam, atque ideo Capriolam, siue Sanguinellam esse posse, facile is refelletur, quod Capriolæ caulis calami modo geniculis interreptus humi minimè repat, sed rectus in altum assurgat, & culmorum more spicas ferat. Dodonæus quem Coronopum esse diximus, non Dioscoridis Coronopum, sed Pseudocoronopum vocat, atque aliam plantam exhibet, quam ad Coronopum Dioscoridis proximè accedere ait, quæ à Ruellio graphicè depicta est his verbis. Herbulæ protritit itineribus & semitis passim viret, quasi pedibus calcari latetur, humi semper sparsa proserpit, folio in multas partes laciniato, sessilibus cauliculis, flore candido, exili inuolucris seminum orbicularibus, per ambitum echinatis, in quibus duplices prominulo ventre sinus extuberant, singuli singulorum seminum eo capaces. Vulgus quod folium multipliciter confectum in Ceruini cornu imaginem effigietur, hoc ei nomen non immerito dicauit. Verum quænam haberetur apud veteres, hæc herba Ruellius affirmare non audet. Pena verò hanc multò melius Coronopi speciem habendam esse censet, quàm Serpentariam Matthioli, quæ incerta est, & foliis longè dissimilibus, & potius holostij species. His idem Pena nouam antiquis & recentioribus indictam subdidit, quæ collibus & cautibus Massiliæ vicinis ad maris allisiones inter tragacanthum passim luxuriat, densissimo sparsoque foliorum stipatu, sedi minimi saxei montani, vel pinastru ritu, positu, & rigiditate

CORONOPVS Repens, Lobell.



rigiditate, innumera etiam sobole cauliculorum dodrantalium, semen pusillum plantaginis, aut serpentinae vulgaris spicis includentiū. Radix longiuscula, lignosa, crassior, gustu nonnihil calida, aromatica.

MENTHA

CAP. XLVIII.

MENTHAE nomen suauitas odoris apud Græcos mutauit, inquit Plinius, cum alioqui Mintha vocaretur. Vnde veteres nostri nomen declinauerunt. Quæ sic scripsit Plinius, quod ἡδύσμος Græcis nunc appelletur ab odoris iucunditate, quæ antea μίνθη dicta nobis Mentham fecit, Arabes *Nabatnaho* vocant, Itali *Mentha*, Germani *Muntz*, Hispani *Hierua Buena*, Galli *Menthe*. Dioscorides duorum duntaxat Menthæ generum meminit, sativæ siue hortensis, cuius ut vulgò cognitæ descriptionem prætermisit, & siluestris, quam Mentastrum Latini vocant. Recentiores plures Menthæ hortensis species esse annotarunt. Matthiolus plures Menthæ hortensis species esse ait. Vna enim, inquit, breuioribus & crispioribus constat foliis, alia rubenti caule & flore, alia albicante. Fuchsius genera quatuor, sed diuersa depinxit, totidem Dodonæus, siluestris duo. Matthiolus primâ Menthæ speciē breuioribus

Nomina
Lib. 19. c. 8.

Lib. 3. ca. 35.
Genera

Cap. 110.
Lib. 2. c. 62.

MENTHA Sativa Crispa,
Dodon. prima.

MENTHA Sativa, Matth.
prima, Dodon. 111.



& crispio

& crispioribus constare foliis scribit, de qua mox ex Dodonæo & Fuchſio dicemus, aliam rubente caule & flore, aliam albicante, quas duas postremas depinxit. His addidit Mentham Græcam, quæ Salvia Romana nominatur, de qua alio capite tractabimus. Fuchſij & Dodonæi mentha ſatiua prima ea eſt quæ mentha criſpa, Gallicè *Menthe creſpue*, Germanicè *Deyment*, & *Kranßdeyment* vocatur.

MENTHA Satiua
altera, Matth.

Forma.



MENTHAE Sarracenica,
species altera Myconij.



Mentha vulgata serpens rotundiore folio Lobellij. Cauliculos edit quadrāgulos, nigricantes, lanugine pubescentes: folia ferè rotunda, ferrata, saturata viriditatis, criſpa, mollia, odoratissima: flores purpureos, internodia geniculatim coronantes verticillato semper ambitu. Radice est fibrata per terrā longius euagante. Altera eorundem ſatiua Mentha Germanorū *kranßmuntz* & *kranßsalsam*, idest, Balsamū criſpū, Lobellij. Mentha rotundifolia altera, flore spicato, siue cruciata Mentha, superiori valdè similis est, foliis rotundis, nigricatibus, odoratis, cauliculis quadratis, radicibus per terram serpentibus: sed in fastigiis flores sunt spicati. Hæc est Mentha secunda ſatiua Matthioli. Mentha ſatiua tertia eiusdem Dodon. Mentha Sarracenica, & Mentha Romana quibusdam dicitur, Gallicè *Menthe de Noſtre Dame*, & *Mente Romaine*, Germanicè *Balsammuntz*, & *Unſer fraunenmuntz*. Lobellij Mentha Romana Officinarum, siue præstantior, angustifolia, ſatiua prima Matthioli, folio longiore & acutiore constat, salicis folio simili, sed candidiore molliore, & hirsuto: flosculis purpureis cauliculorum cacuminibus spicatim insidentibus, radice tenera, fibrata. Aliam Menthæ Romanæ, siue Sarracenicæ speciem ex Myconio hîc appinximus: quæ à Pyreneorum montium incolis, ubi frequens nascitur, vocatur *Herba del Moro*, idest, Herba Sarracenica. In locis frigidis maximè provenit, in pratis, & iuxta fluenta, vix alibi. Herba est cubitalis, interdū minor. Ramulos à radicibus multos edit, aliqua ex parte per caulis longitudinem, velut striis notatos, nonnihil lanuginosos, in quibus folia parva, brevia, non admodum lata, viridia, in ambitu ferrata, odorata, medio inter ageratum vulgare & Menthastrum odore, & tam simili Menthæ Romanæ vulgò dictæ, ut hæc illi commodè possit succedere. Flores in cacumine multi, anthemidi similes, in medio luteoli, in ambitu candidi, odorati. Radices subsunt candicantes. Floret Iulio & Augusto mensibus. Iuribus carniū eam incoquunt ad saporis gratiam. Myconius Menthæ Romanæ speciem

speciem esse credit, sapore, odore, & simili fermè foliorum figura inductus, nisi docti alij herbarij aliter senserint. Quarta *Mentha* Germanis *Hertzkraut*, & *Balsamkraut* dicitur, Gallicè *Herbe de cœur*. Lobellij *Mentha* Romana angustifolia, siue cardiaca: foliis itidem longioribus est, caulibus & radice proximæ dictæ similis,

MENTHA Sativa
quarta, Dodon.



sed flores purpurei geniculatim internodia haud secus quàm in prima specie caules coronant. *Mentha* silvestris siue *Menthastrum* ἡδύσμος ἀγρός Græcis, Gallis *Menthe sauvage*, & *Menthe cheualine*, Germanis *Rossmuntz*, & *vilderbalsam*, Italis *Mentastro*, hirsutior est folio, ut ait Dioscorides, & prorsus maiore quàm *sisymbrii*, grauiore odore, quare minùs ad sanorum vsus expetitur. Idipsum est herbariorum sententia quod hîc exhibemus. Cauliculos habet quadrangulos, hirsutos: folia longiuscula, rugosa, mollia, tam supernè quàm infernè lanugine canescentia, & hirsutiora, *sisymbrio* procerius, odore magis viroso, flosculis spicatum cauliculorum fastigia coronantibus, radice est tenera & fibrata. Alterum *Menthastrum* genus Dodonæi, *sisymbrium* est, de quo proximo capite agemus. Lobellius *Menthastra* alia ostendit. *Campense* & *Zuuolense*, *Mentastro* vulgari persimile, sed foliis nigrioribus, longioribus, profundius crenatis, minùsq; incauis & hispidis, & florum spicatorum diuisura. In agro Frisio secus Campen & Zuuolen oritur.

MENTHASTRUM
vulgare, Matth.



MENTHASTRUM Campense
& *Zuuolense*, Lobellij.



MENTHASTRUM

*niueum Anglicum, Pena
& Lobelij.*



*Tempus.
Lib. 3. ca. 35.
Vires &
Temper.*

MENTHASTRUM

minus spicatum, Lobelij.



Li. 19. c. 20.

Li. 20. c. 14.

Menthastrum niueum Anglicū, quod cultiores horti alunt in Anglia, vt ait Pena, vulgato longè minus & odoratius, cuius folia partim sunt viridi colore, partim niueo candore & læuore nitidissimo, cuiusmodi in hyssopo & salvia illic euenire ipsemet Pena annotauit. Menthastrum minus spicatum, odore mitius minusq; graue, folio Heliotropij Tricocci. Satiuæ Menthæ passim in hortis proueniunt. Amant apricum locū, non pinguem, non stercoreatū: humidis facilius adolefcunt. Menthastrum vliginosi locis gaudet: passimq; irrigua hoc Menthastro pubent. Florent omnes mēse Augusto. Superest vt Mēthæ vires declaremus, primū ex Dioscoride. Mentha hortensis calfaciendi, adstringendi, atq; exsiccandi vim habet. Sistit sanguinem potu ex aceto succo: tineas in ventre teretes enecat: venerē stimulat. Singultus, vomitiones, choleraq; sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti capitis dolores mulcet: mammas si tendantur, aut lacte turgeant compescit: cum sale canum moribus illinitur: aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit: vuluæ ante coitū admota conceptioni resistit: linguæ scabritiem cōficta læuigat: Lac coire densariq; in caseum non patitur, si folia (aliàs κλωνάκια, idest, ramuli) potionibus lactis immergantur. In summa stomacho vtilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Ex Plinio. Grato Mentha menthas odore percurrit in rusticis dapibus. Semel sata diutina ætate durat. Et aliquanto post. Menthæ ipsius odor animum excitat, & sapor auiditatem in cibis, ideo embammatum misturæ familiaris. Ipsa acescere aut coire, densariq; lac non patitur. Quare lactis potionibus additur, ne huius coagulati potu strangulentur. Datur in aqua aut mulso: eadem vi resistere & generationi creditur, cohibendo genitalia densari. Aequè maribus ac fœminis sistit sanguinē, & purgationes fœminarum inhibet: cū amylo ex aqua pota cœliacorum impetus. Syriation & vomicas vuluæ curauit. Ille & iocinorū vitia ternis obolis ex mulso datis. Itē sanguinem excreantibus in sorbitionem. Vlcerata in capite infantiū mirè sanat; arterias humiditas siccatur, siccas adstringit. Pituitas corruptas purgat in mulso & aqua. Voci succus sub certamine vtilis duntaxat, qui & gargarizatur vna tumente, adiecta ruta & coriandro ex lacte. Vtilis & contra tonsillas cū alumine, linguæ asperæ cum melle: ad conuulsa

intus

intus per se, vitiisq; pulmonis. Singultus & vomitiones sistit cū succo granati, vt Democritus monstrat. Recentis succus nariū vitia spiritu subductus emēdat. Ipsa trita choleras, in aceto quidē pota. Sanguinis fluxiones intus. Ileum etiam imposita cum polenta: & si mammæ tendantur. Illinitur & tēporibus in capitis dolore. Sumitur & contra scolopendras, & scorpiones marinos, & ad serpētes. Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus: itē sedis vitiis. Intertrigines quoque, vel si teneatur tantū, cohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt & lieni mederi eā in horto gustatā, ita ne vellatur, si iis qui mordeat dicat se lieni mederi per dies nouē. Aridæ quoque farinā tribus digitis apprehensam & stomachi dolorem sedare in aqua, & similiter aspersam in potionem, ventris animalia expellere. His Plinius partim plures virtutes Mēthæ quā Dioscorides tribuit, partim Dioscoridi apertē refragatur, qui Mentham ἀποδιῶσα ἐρεθίζει, idest, venerem stimulare dixit, Plinius eam veneri officere, adducta etiā cur id faciat causā, inquit Cornarius. At Plinius non dixit veneri officere, sed generationi resistere: quod ait Dioscor. ἀσυνλ-
ληψίαν ἐργάζεσθαι, Idem Florētinus in Geoponicis habet, Si Mentha in lac iniiciatur, etiam si coagulū postea immittatur, lac non coagulabitur. Et addit, Inēpta etiā ac incōmoda rebus venereis habetur. Dioscoridi etiā Hippocrates & Aristoteles aduersantur, vterq; diuersam rationem secutus. Sic enim Hippocrates, Mētha calfacit, vrinā ciet, & vomitus sistit. Et si quis saepe comedat, semē genitale colliquescit vt diffuat, arrigere prohibet, & corpus debile facit. Aristoteles in Problematis sic proponit. Cur dicitur Menthā belli tempore, neque edendā, neque ferendā esse? Num quia perfrigerat corpus? Indicat autē id seminis corruptio. Hoc autem contrarium est fortitudini atque audaciæ, sicut ipse ostendit alio Problemate, cū ait, eos qui natura sunt frigida formidolosiores esse, contrā qui calida, audaces. At Hippocrates immodicū Mēthæ esum veneri resistere intelligit, quod caliditate sua sanguinē extenuet, & semē genitale colliquet, eamq; ob causam arrigere prohibeat. Aristoteles verò, Menthā corpus ex accidēte refrigerare, atque debilitare, quod semen corrūpat. Galenus Mēthæ facultates, & causam cur ad venerem incitet, exponit his verbis. Hedyosmos, alij verò Minthen odoratā vocāt. Est enim & alia quādā Mentha insuavis odoris, quā calaminthē vocāt. Vtraque gustu acri, & facultate calida est, ex tertio ordine calfacientium. Inferior tamen est Mētha odorata quā calaminthe, & minū calfacit. Vt enim in vniuersum dicam, hac seu siluestris quādā est, illa seu domestica. Quamobrē sanet ob eam quæ ex cultu accedit humiditatem, mediocriter item ad venerē excitat. Id quod omnibus accidit quā humiditatē semicoctam & flatuosam continent. Ob talem ipsius herbæ temperaturā in abscessibus ea quidā cū polenta mista vtūtur. Id quod in calaminthæ facere nequeas, propterea quod valentiū tum excalfaciat, tum desiccet quā id genus medicamenta poscant. Habet verò etiam quiddā amarū in se & acerbū. Illo quidem lumbricos interficit, acerbitate verò, si cum oxycrato bibatur, recētes sanguinis eiectiones reprimat. Substantia est, vt si qua alia herba, tenuium partiū. Nec omittenda sunt quæ Symeon Sethi de ea prodidit. Iuuat iecur frigidum, & ventrē corroborat ac stomachū, coctionē facit, vomitū sedat ac singultū. Prodest etiam ad cordis morsus, & appétitionem suscitāt. Flatus discutit, & lumbricos interimit, potissimū siluestris Mēthæ ius. Venerem stimulat, & iecoris obstructions tollit. Verū hac vesci ad satietatem non oportet: quoniam sanguinem extenuat, & serosum facit, & ipsum in flauam bilem mutat. Dein efficit vt sanguis, qui maximē est tenuium partium, discutatur, & crassus ac melācholicus relinquatur. Quare oportet biliosos ab ea abstinere. Cōtrita cū sale & rabiosi canis morsui imposita, medicamentum fit salubre. Arida verò trita, & post cibum sumpta ad concoctionem facit, & lienosos iuuat. Cum vino pota difficulter parienti succurrit.

Li. 12. c. 24.

Lib. 2. de diat.

Sect. 20. Prob. 2.

Li. 6. simpl.

Li.3. Diosc. cap.35. Ferunt etiam quod mansa lippienti imposita fiat remediū: quodq; eius decoctum absorptum confestim sanguinem ex faucibus eiicientes sanat. Huius semē ventrē purgat, & pulmonem lædit. Scribit Matthiolus aquā è tota Menthæ planta destillatam, quatuor vnciarū pondere epotam sistere sanguinem (quod mirum fortasse multis videbitur) è naribus profluentem. Sunt & expendenda quæ de Mēthastro scribit Plinius. Genus eius (Menthæ) silvestre Menthastrum est, & hoc propagatur vt vitis, vel si inuersi rami serantur. Et aliquāto post. Menthastrū silvestris Mētha est, differens specie foliorū, quasi figura ocimi, pulegij odore, propter quod quidā pulegiū silvestre vocāt. Legitur tamen in excusis exemplaribus pulegij colore, quod falsum esse odor vtriusque arguit, & ex Dioscoride perspicuè ostēditur, qui capite de calamintha, primā & secundam eius speciē iisdem planè describit verbis, quas duas species Plinius in vnā Menthastri speciē cōfudit. Et Galenus loco antea citato calamithē velut silvestrē quādam Menthā satiux opposuit. Postea tamen de calaminthe suo ordine seorsum tractat. Neque sanè mirū, inquit Fuchsius, quando quidē auctores societate quæ est inter Menthā, Menthastrū, & Nepetā decepti, tum species, tū nomina cōfundunt. Plinius Menthastri descriptioni mox vires & eius in medicina vsum subiungit, qui à Dioscoride capite de Mētha prætermisus est, sed eadem capite de calamintha ferè omnia calaminthæ ab eo attributa reperiuntur. Sic igitur Plinius habet. Lis (Menthastri foliis) cōmanducatis & impositis sanari elephantiasin, Magni Pompeij atate fortuitò cuiusdā experimēto propter pudorē faciei illita compertū est. Eadem illinūtur bibunturq; aduersus scolopendras & serpentium ictus, drachmis duabus, in vini cyathis duobus. Aduersus scorpionū ictus cū sale, oleo & aceto. Itē aduersus scolopēdras ius decocti. Aduersusq; omnia venena seruantur folia arida ad farinæ modū. Substratū vel accēsum fugat scorpiones. Potū fœminas purgat à partu: sed partus necat. Orthopnoicis, torminibus, cholericis efficacissimū: itē lūbis, podagris impositū. Succus auribus verminosis instillatur: in regio morbo bibitur: Strumis illinitur. Sōnia veneris inhibet. Tineas pellit ex aceto potum. Contra porriginē ex aceto infunditur capiti in sole.

S I S Y M B R I V M.

CAP. XLIX.

Nomina



ATINI Sisymbrium, vt Græci σισύμβριον vocāt, Arabes Sinasbarium, seu Sinasbar. Sisymbriū autem dici putat Varro à Sisymbrio, quæ fuit veteribus comœdiis meretricula. Coronā etiam veneris nōnulli appellarunt, q̄ ob odoris suauitatē quā præ se fert, eo iuuetus, quæ amoribus gaudet coronata, in comessationibus suis blando odoris oblectamento suas illecebras cōmendaret. Dioscorides duo facit Sisymbrij genera. Vnum Sisymbriū silvestre, alterū Sisymbrium cardaminē. De hoc quod solo nomine priori simile est, iam diximus, de illo nūc dicendū. Est id Sisymbriū Mēthæ species. Vnde Gallis dicitur *Menthe aquatique*, Germanis *Fischmuntz* & *Vuassermuntz*. Lobellij aquatica, siue Sisymbria Mentha, Balsamine Officinarum. Est enim hæc planta primæ menthæ hortensi similis, quadrato caule, quadrātenus purpurascēte, foliis mēthæ, ferratis, latioribus, & odoratoribus: floribus purpureis, albicātibus, cauliculorum summitati insidentibus, rotundorū capitulorū instar: radicibus longis, per terram serpentibus. In aquosis nascitur. Quæ cū Dioscoridis Sisymbrio conueniunt, sic scribentis. Sisymbriū in solo inculto nascitur, menthæ hortēsis similitudine, odoratius, latiore folio: inseritur coronis. Idem Sisymbrium intelligit Plinius, cum ait.

Li.2. ca. 121.

Genera

Sisymbrium silvestre à quibusdā Thymbraum appellatū, pedali non amplius altitudine. Et alibi. Serpyllo & Sisymbrio montes pleriq; scātent, sicut in Thracia, vbi aquæ ex iis deferunt auulsos ramos, feruntq;. Item Sicyone ex suis montibus, & Athenis ex Hymetto. Simili modo & Sisymbrium ferunt. Lætissimum nascitur in

Forma.

puteorum

Locus.

Li.2. ca. 121.

Li.20. c. 22.

Lib.19. c. 8.

SISYMBRIVM Siluestre.



SISYMBRIVM Hortense.



puteorū parietibus, & circa piscinas ac stagna. Quæ ex Theophrasto expressa sunt: sed perperam. Nam Theophrastus lib.6.hist.c.7.Serpyllo nō Sifymbrio alicubi mōtes planaꝫ; scatere tradit, vt in Thracia. Præterea serpyllū siluestre esse, quod quidā è mōtibus delatum ferunt, vt Sicyonenses & Athenienses ex Himetto, &c. Vt legendum sit, si Theophrastum sequamur. Serpyllo mōtes alicubi planaꝫ; scatent, sicut in Thracia, vbi quidam, non aquæ deferunt ex iis auulsos, &c. At idem Theophrastus locis aliquot satiui Sifymbrij mentionem fecit. Quod Matthiolus & periti herbarij eam esse putant, quam Officinæ Balsamitam appellant, vulgus Mentham Romanam, siue crispam, Galli *Bau-me crespu*, Florentinus in Geoponicis videtur Balsamum hortense appellasse. Lobellio est Sifymbria Mentha agrestis satiua, cruciatæ Menthae, idest, secundæ Mēthæ satiua Dodonæi superiori capite descriptæ congener aut eadem. Italis etiā *Balsamita*, seu *Mentha crespa*. Folia enim profert rotunda, vulgariss menthæ foliis

Lib.6. hist. c.7.

Cap.28. li.ii.

Forma.

latiora, crispæ: caulē quadrangulū, rubentē, virentemq; , odoreq; est quā mēthæ vehementiore. Denique Balsamita facili in menthā degenerat, nisi diligens adhibeatur cultura, quod de Sifymbrio prodidit Theophrastus. ἡ δὲ τῶ σισυμβρίου εἰς μίνθαν δι' ἀργίαν γενομένη. συμβαίνει γὰρ ὅταν μινθεῖς ἐξεργάσῃ μινδ' ἀποδιδῶ τὴν οὐκ εἰς γερασίαν, ῥιζοῦσθαι μᾶλλον εἰς τὸ χράτω. ῥιζοῦμενον δὲ, ἔ τὴν διωάμιν ἐκείσε τρέπον πᾶσαν ἀσθενέστερον εἴωθε γίνεσθαι, καὶ τὴν λεμυλῆα ἀποβάλλει τῆς ὀσμῆς, ὥστερ' ἐξ ἀμφωτέρων ἢ ὁμοιότης, ἣ δὲ βλαστῆς, καὶ τῆς ὀσμῆς. τῆς γὰρ λεμυλῆος ἀφαιρεμένης, ἢ καὶ ἀλειπὸς ὀσμὴ μαλακὴ τις ἔσται, καὶ ἀνιδμή, προσεμπερῆς τῇ μίνθῃ γίνε'. Id est, Sifymbrij in menthā mutatio ex neglectu euenit. Cum enim quis non excolit, neque solitā curam adhibet, radicatur magis in inferiora: cū autem radicatur, & illuc totam vim conuertit, debilius Sifymbriū solet reddi, odorisq; sui acrimoniam amittere, quasi ex ambobus illis germine atque odore similitudo proueniat: sublata enim acrimonia, reliquus odor mollis & remissus, fit menthæ simi-

Lib.5. caus. ca.8.

lis. Plinius non in mentham, sed in calamintham degenerare Sifymbriū dixit. Sed cū id, ex Theophrasto hausisse certum sit, mēdosē calaminthā pro mēthā legi viri docti existimant: Degenerare autē odore quē vehementissimū habet, Sifymbrium in menthā, non tota specie & natura in ipsam transire quidā credunt. Quade re Scaligeri eruditissimi & integerrimi viri sententia hæc est. Quidam præcipiti ingenio maleferiati, qui ad primā quāq; inspectionē transfugiunt à receptis

Li.9. caus. 10.

Lib.1. de pl.

opinionibus, ac temerè constituunt effata vniuersalia: Sifymbrium menthæ odorẽ tantũ capere, non autẽ speciem sibi vindicare. Nos verò, inquit, Sifymbrio perire pristinam faciem, nitorẽ, rotunditatẽ, odorem, saporẽ, atque abire in mentham, & vidimus sæpenumero, & meminimus, & profitemur. Sifymbrium siluestre calfaciendi vim habet, vt auctor est Dioscorides. Contra stillicidia vrinæ calculosq; semen ex vino bibitur: tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore fronti & temporibus illinuntur: itẽ cõtra vesparũ apumq; ictus. Vomitiones potu cohibet. Plinius prolixius tam Sifymbrij siluestris, quàm Sifymbrij cardamines facultates simul declarat. Breuius verò & apertiùs Galenus huius de quo agitur, his verbis. Sifymbrium tenuium est partium, digerentis, excalfacientis, & resiccantis facultatis est, & temperaturæ in tertio ordine: sed & semen eius tenuium est partium, & calidum: quocirca ipsum quidam cum vino exhibent singultientibus, & tormina patientibus. Hæc Galenus. Sifymbrium tam hortense quàm sponte nascens, vt tradit Matthiolus, flatus & lumbricos pellit cũ herba ipsa in puluerem trita, tum decoctũ eius potum. Valet ad vteri inflationes, si cũ parthenio in calente tegula calfactũ, & odorato mero aspersum ventri applicetur. Valentius vteri doloribus à partu subuenit, si cum parthenio, anthemidis flore tenuiter cõcisa tribus aut quatuor ouis excepta, in patella cum oleo lilino ad ignem fiat placenta, quæ calida vmbilico applicetur. Illinitur tam recēs, quàm sicca herba calfacta, & vino Cretico aspersa ad ventriculi dolores. Succus testibus illitus seminis profluuium cohibet.

COSTVS HORTENSIS. CAP. L.

Nomina



VAE hic exhibetur herba, viuacissima passim in hortis prouenit, à quibusdã mentha Græca, & mentha Sarracenica, in Hetruria Saluia Romana, quòd foliis saluiam potiùs, quàm mentham referat, ab aliis Herba D. Mariæ, à quibusdã Lassulata nominatur. Dodonæus Balsamitam vocat, Galli Coq. Hanc faciunt peregrino illi Costo vel nomine affinem, & Costum hortensem appellant. Quorũ iudicio subscribere videtur Florentinus in

Lib. 2. c. 64.

COSTVS Hortensis.

Forma.



Lib. 1. c. 32.

Lib. 2. c. 91.

Li. 20. c. 17.

Geoponicis, cũ Costũ & balsamũ in hortis feri viuiradice Nouẽbri mense prodit, odoratu perquam suauẽ: vti sampsuchum Aprili & Maio. Nam balsamum sua ætas sifymbriũ hortense, vt diximus, & Costũ herbã de qua hĩc agimus, videtur innuisse. Costus hĩc folio est saluia longiore, latioreq; betonicae amulo, per oras serrato, in viridi albicante: caulibus cubitalibus, & aliquãdo maioribus, in quorũ cacumine flores lutei, capitelli similes, vt in tanaceto, sed minores: radice fibrata, & furculosa. Tota herba amara est, & subastringens, grauitẽrque odorata. Hæc est Matthioli. Mentha Græca, & multorum herbariorum Costus hortensis. Atque ita se sentire cum Ruellius duobus locis aperte declarasset, alio Costum hunc hortensem, Gallorum Coq, siliquastrum, siue Piperitidem Plinij esse putat, quam Castor demonstrauit caule rubro, longo, densis geniculis, foliis lauri, semine albo, tenui, gustu piperis, vtilem gingiuis, dentibus, oris suauitati, & ructibus. Quæ siliquastri effigies, inquit, cum Costum nostrum in hortis nascentem exprimat, nulla refragante delineatione, cui etiam

etiam vires adstipulantur, hunc Plinij filiquastrum, seu piperitidem esse credit. Sed cum filiquastrum filiquas magnas & oblongas producat, vnde filiquastri nomen inuenit, & semen eius gustatum saporem piperis præ se ferat, vnde etiam piperitis nuncupatur, vt capite de filiquastro diximus hac in re Ruellium hallucinatum esse constat. Sunt quibus Costus hic noster potiùs Leucas Plinij esse videatur, de qua pauca hæc scripsit. Leuce mercuriali similis, nomē ex causa accepit, per medium folium candida linea transcurrente. Mox subiicit, fortassis eadem sit quæ Leucas appellatur, contra omnia marina venena efficax. Speciem eius auctores non tradunt, nec aliud quàm siluestrem latioribus foliis esse efficaciorē, hanc semine acriorem. Tota Costi hortensis planta auctore Matthiolo, excalfacit, siccatur, aperit, attenuat, roborat, abstergit, & prouocat, auxiliatur vteri affectibus. Medetur hydropicis, & præsertim anasarca laborantibus: quia refrigeratū hepar excalfacit, & vasorū obstructions aperit. Illinitur ex oleo irino lienosis, & ex vino feruefacto vrinam ægrè reddentibus. Lentigines, alphas, & alia cutis vitia absterget illitus noctu succus, folia adduntur in placentas quæ à mulieribus vteri affectibus obnoxii eduntur. Sunt qui ea tenui pulcra illita frigunt patellis in oleo aut butyro, & iis in cibis vtuntur. Huius epotus succus alui tineas, & lumbricos necat: frigidum vtero subuenit: ventriculum roborat tam haustus quàm illitus, & vomitiones compescit. Tota planta tum substratu, tum suffitu serpentes fugat, & eorum venenis resistit.

Lib. 27. c. ix.

Lib. 3. c. 35.
Diosc.Vires &
Temper.

O C I M V M. C A P. L I.

QUOD ὄκυμον Græci dicunt, Latini similiter Ocimum appellant, Mauritani *Berendaros*, & *Bedarog*, Itali *Basilico*, Germani *Basilien*, & *Basilgram*, Hispani *Albahara*, Galli *Basilic*, quod nomen apud omnes ætatis nostræ herbarios, & Officinas, & multas gentes increbuit, à recētoribus Græcis deriuatum, qui βασιλικὸν vocant, id est, regium, quod ob præstantem odorem basilica, id est, regia domo dignum sit. Sunt tamen qui Ocimum cario-

Nomina

O C I M V M Maximum.



phyllatum duntaxat sic nominant. Ocimum autem quibusdam à nascendi celeritate dictum videtur, quia à satū tertio statim die erumpit. At veriùs id ocymo etymum videtur conuenire, quod pabuli & farraginis quoddam genus est, sic nominatum ab ὄκυς Græca dictione, quæ citum significat. Quare sunt qui significantiùs per ζ, scribendū putent ozimum, ab ὄζω, quod valet redolere: quoniam tota herba suauissimū odorem spiret. Sunt qui statuunt Ocimi duo genera, vnum latiora folia habens, alterum angustiora. Fuchsius tria, ocimū exiguum, alterum mediocre, tertium magnum, foliis tantum distantia, quæ in primo genere sunt admodum exigua, in altero paulò latiora, in tertio latissima, quibus tribus vnus idēque est odor. Matthiolus quoque tria haberi Ocimi genera tradit, eaque in secunda in Dioscoridem cōmentariorum editione accuratiùs quàm in prima distribuit, hoc modo. Primum Ocimum est maximum. Secundum medium siue mediocre: cuius duæ sunt species, alterum enim vulgaris ocimi, alterum citrei mali odore est, quod eam ob

Dodo. lib.
2. cap. 60.
cap. 207.

Genera.

causam citratum vocarunt Arabes. Tertium ocimum minimum est, quod Itali *Basilico Gentile* vocant. Quorum omnium meminit Serapio de ocimo differens, appellans medium de quo tractavit Dioscorides, ocimum non caryophyllatum,

Lib.2.c.135.

*OCIMUM Medium,**Fuchsj.**Forma.**Locus.*Lib.5. cauf.
cap.8.*OCIMUM Medium,**Matthiol.*Lib.2.c.135.
*Vires &
Temper.*

caryophyllatū verò omnium tum minimum, tum odoratissimum, postremum citratum ab odore. Ocimum pedali altitudine profilit, furculosum, ramulis rotundis, folio diluti viroris, floret particulatim, primò parte inferiore, de mùm superiore: flosculo candido aliquando purpureo: semine paruo & nigro. Radix vna descendit crassior & lignosa, ceteræ, à lateribus funduntur exiles ac prolixæ. Ocimum maximū Matthioli folia habet amarantho longe maiora, lata, longa, crassa, citreæ malo similia. Secundum foliis est & ramulis minoribus, cuius vna species vulgare ocimum, altera citream malum odore adeo refert, vt nulla ferè inter ea odoris differentia percipi possit, vnde citratum Mesuces, atque alij eiusdem familiæ auctores, vt diximus, appellarunt. Tertium foliis constat angustis, minutis, &c. odoris præstantia superat. Ocimum in hortis satum fœliciter prouenit. Passim etiam in figulinis vasis extra fenestras ædium fouetur. Iunio & Iulio mensibus floret, dein semen producit. Ocimum quandoque in serpyllum degenerare auctor est Theophrastus, & causam ad Solem refert. τὸ δὲ ὠκίμον, inquit, τὸ ἐν ἡλίῳ πολλάκις κείμενον ἀφερπυλλέσκει, διὰ τὸ ξηραίνεσθαι μάλλον. καὶ γὰρ τὸ φύλλον ἔλαττον γίνεται, καὶ ἡ ὁσμὴ διεμυτέρα τῶν ξηρῶν. ἔλαττον γὰρ καὶ ἡ τροφή. Id est, Ocimum quod in sole sæpe situm est, abit in serpyllum, quia magis siccatur. Etenim folium minus redditur, & odor vehementior est siccorum: minùs enim ea aluuntur. Ocimum vt tradit Dioscorides, copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum mollit, flatu mouet, vrinam pellit, lac euocat: ægrè tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est (Græca pulmonum vocem non habent, nec eam Cornarius in conuersione sua expressit) Draconis marini & scorpionis ictibus per se prodest, & cum vino Chio oculorū doloribus (quæ aliter ex Græco sunt distinguenda, Draconis marini & scorpionis ictibus, per se autem in vino Chio, &c.) Succus visus caliginem abstergit: destillationes exsiccatur. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili vrinæ, inflatîq; naribus haustum subinde mouet sternutamenta, quod idem herba efficit. Sed oculos premi necessum est cum

OCIMUM Paruum.



OCIMUM Caryophyllatum.



cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant, quandoquidem manducatum & in sole positum vermiculos creat. Aphri autem adiiciunt, si feriantur à scorpione qui ocimum ederunt, nullo conflictari dolore. At non solum vt noxium in cibis, sed & vt in medicina inutile & perniciosum veterum quidam grauitè repudiarunt, quod declarat Plinius his verbis. Ocimum quoque Chrysippus grauitè increpuit, inutile stomacho, vrinæ, oculorum quoque claritati. Præterea insaniã facere & lethargos, & iocinoris vitia: ideoque capras id aspernari. Hominibus quoque fugiendum censet. Addunt quidam tritum si operiatur lapide, scorpionem gignere: commanducatum & in sole positum vermes afferre. Aphri verò, si eo die feriat quispian à scorpione, quo edirit ocimū, seruari non posse. Quinimo tradūt alioqui manipulo ocimi cum cācris decem marinis vel fluuiatilibus trito, conuenire ad id scorpiones ex proximo omnes: Diodotus in Empiricis, etiam pediculos facere ocimi cibum. Secuta ætas acriter defendit id esse capras nec cuiquam mentem motam: & scorpionum terrestrium ictibus, marinorumque venenis mederi ex vino, addito aceto exiguo. Vsu quoque compertum deficientibus ex aceto odoratu salutare esse: item lethargicis & inflammatis refrigerationi. Illitum capitis doloribus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris impositum ex vino, stomacho quoque vtile, inflammationes & ructum ex aceto dissoluere sumptum. Aluum sistere impositū, vrinā ciere. Sic & morbo regiō, & hydropicis prodesse, choleras eo, & destillationes stomachi inhiberi. Ergo etiam cœliacis Philistio dedit, & coctum dysentericis & colicis Plistonius. Aliqui & in tenesmo, & sanguinē excreantibus in vino, duritia quoque præcordiorum. Illinitur mammis, extinguitq; lactis prouentum. Auribus vtilissimum infantium, præcipuè cum adipe anserino. Semen tritum & haustum naribus sternutamenta mouet, & destillationes quoque capiti illitum. Vuluas purgat in cibo ex aceto. Verrucas misto atramento sutorio tol-

Lib. 20. c. 12.

lit. Venerem stimulat, ideo etiam equis asinisq; admissurę tempore ingeritur. Hęc Plinius. Auicenna etiam libro de viribus cordis à Dioscoride dissentire videtur: scribit enim Ocimum sanguinem turbidum & melancholicum generare: quoniã superuacua humiditas quæ in ipso est, parit inflationem in venis. Nec aliter videtur sensisse Galenus, cum ait. Ocimum ex secundo est ordine excalfacientium, ha-

Lib. 8. sent.

bet autem

bet autem recrementitiam humiditatem, proinde nec commodum est quod in corpus sumatur. Caterum foris illitum ad digerendum, & concoquendum utile est. Et alio in loco. Ocimo plerique ut obsonio utuntur, ex oleo & garo esitantes. Vitiosi autem est succi, quod impulit quosdam, ut falsa de eo prodiderint, affirmantes quàm celerimè paucis diebus scorpiones generare, si tritum in ollam novam immittatur, & potissimum si quis quotidie ollam ad Solem calfecerit, quod falsum est. Verè autem dixeris olus stomacho esse noxium, praviq; succi, & concoctu difficile.

OCIMOIDES.

CAP. LII.

Nomina

Lib. 20. c. 13.

Lib. 4. c. 25.

Forma.

In lib. 4.
Diosc. cap.
26.

Cap. 343.



RAECIS *ωκυθος* dicitur haud alia ratione, quàm quod ocimo foliis potissimum simile sit, ocimastrum à Latinis appellari in notis Dioscoridis legimus, quasi silvestre ocimum, & sic ipsum videtur appellasse Plinius. Itali *Basilico saluatico* vocant, Hispani *Allahaqua montesina*, Galli *Basilic sauvage*. Ocimoides depinxit Dioscorides foliis ocimi, & ramis dodrantalibus, hirsutis, siliquis hyoscyamo similibus, femine ut gith, nigro prægnantibus, radice tenui & superuacua. Id Ocimastrum esse putat Matthiolus, quod hîc exhibemus, passim copiosè nascens in Italia, præsertim inter segetes, propè septa, & in agrorum marginibus, foliis sanè ocimo satiuo similibus, ramulis hirsutis, quadratis, dodrantalibus aut cubitalibus, in quorum vertice flores exeunt candidi, quandoque purpurei, quod Dioscorides omisit, è quibus vascula enascuntur ut in hyoscyamo, capaci ventre, arctis faucibus, per ambitum denticulatis, viperinis dentibus similia, in quibus semen includitur nigrum, melanthio ferme similè. Ocimastrum aliud depinxit Fuchsius, cui quidem Dioscoridis descriptionem adeò conuenire putat, ut nulla prorsus reclamare nota videatur, si quidem folia fert ocimi, ramulos palmares, quadratos, hirsutos, flores purpureos, forma ocimi floribus similes, qui tamen colore, qui illis candidus est, constat: deci-

OCIMOIDES *Maius*,
Matthiol.



OCIMASTRUM
Fuchsj.



dentibus

OCIMOIDES Minus,
sive album.*SESAMOIDES Paruum,*
sive Ocimoides minimum.

dentibus floribus siliquas hyoscyamo similes, feminis nigri, melanthio similis plenas ostendit. Radice etiam nititur tenui & superuacua. His omnibus accedit odor, qui planè ocimum referre videtur. Dodonæus Acini nomine depinxit. Alia ocimastri genera Dalechampio videntur esse. Primum ocimoides minus, fortasse Perdicium secundum Plinij. Id ex radice longa fructicat, crassiuscula, intus lignosa, carnosapulpap foris obducta, nodosa, flagella multa huc illuc diffundente, ex quibus rami multi assurgunt cubitales, vel etiam proceriores, rotundi, geniculati: foliis binis ex singulis geniculis enatis, figura foliorum calthæ, aut violæ quam Cheiri vocant Officinæ, eiusmodi multis ad radicem iacentibus, & proximè terram stratis, circa caules longioribus & acuminatis: caulibus in summo sic pinguibus, ut dum attrectantur, melle peruncti censeripossint, in ramulos plures fisis, rotundos, sesquipedales, geniculatos, ad genicula superiora, quæ folia prodire dictum est, nascētes, flore albo, ex quinque foliolis constructo, ea forma, ut singula foliola ex coniunctis duobus transcurrente linea diuisis composita videantur, ut in Dodonæi vaccaria, quam Officinæ Ben album vocant: calice post floris lapsum oblongo, in metam fastigiato, viridi, semine pleno, gustu lèto & amaro. In asperis, sabulosis, frigidis & ventosis prouenit, floret Maio mense. Id Clusius à Salmanticensibus Sesamoides magnum dici scripsit, eoq; nomine depinxit. Cui dissimilem omnino plantam subiungit, quæ etiam Salmanticensibus Sesamoides paruum nuncupatur, tametsi eius descriptioni minimè conueniat. Est verò eadodrantalis, tres aut quatuor virgulas teretes ab vna radice producens circa quas folia lini exigua, densa, inordinata, & in extremis plurimos flosculos, spicæ aut racemi instar cōfertos, ex herbaceo purpurascētes primùm, deinde tenuibus capillamentis ex albo pallescentibus ornatos, in quorum medio veluti quatuor grana viridia conspiciuntur, quæ decidēte flore in paruas siliquas excrescunt, semine exili nigricante plenas. Radice candida, satis crassa & dura quæ perennis est, & ante hyemē repullulat. In col-

Lib. 22. c. 17
Forma.

Locus.

Tempus.

libus Salmanticæ proximis prouenit, lapidoso solo, vbi Maio floret, deinde semen profert. Ocimoides minimum dicenda potius quàm Sesamoides. Ingrato est gustu & amariuscule. Pena plantas duas pictas dedit, quas à plebecula Muscarias Viscarias, siue Muscipulas vocari ait, quia veluti glutine quopiam adeò sunt perlita,

vt

*MUSCIPULA Altera**flore muscoso, Pena.**OCIMASTRVM Valen-**tinum, Clusij.*

vt non solum manum, sed etiam muscas & papiliones prateruolantes implicet. Priorem putamus esse. Ocimoides minus siue album à nobis modò descriptum. Alteram non multum diuersam esse scribit, folio, caliculis, semine, & cauliculis, sed perquam exiguo flore racemoso, ex luteo herbaceo, quam hîc appinximus. Alterum Ocimoides repens appellari potest, quod & cucubalum Plinij multi esse censent. De quo in libro, de iis quæ in vicina adminicula scandunt, tractauimus. Hæc de diuersis ocimastrî generibus. Quibus addemus Ocimastrum Valentinum Clusij, quod est pedali altitudine, ramis quadrangulis, hirsutis: foliis per singula genicula ex aduerso sitis, ocimi magnitudine & forma, gustu adstringentibus: circa summos ramos flores proueniunt orbiculatim compositi marrubij modo, candidi, ocimi floribus similes in vasculis pungentibus, semine marrubij, nigro: radix vrticæ aut Lamij æmula. Prouenit copiose circa riuos ex flumine ductos ad urbem Valentiam in Hispaniis, vbi eam initio Aprilis florentem & semine prægnantem obseruauit Clusius, nec vsquam alibi. Istic Ocimastrum appellant, etsi non admodum Dioscoridis descriptioni conueniat. Marrubium Hispanicum odore Stœchadis Lobellius appellat. Caterum ocimastrî Dioscoridis semen in vino potum vim habet qua viperarum cæterarumq; serpentium moribus medeatur. Datur ischiadicis cum vino, melle, myrrha, & pipere. Ocimoides, inquit Galenus, quidam philetærium cognominant. Radix superuacua est, at semen renuium partium, ac desiccantis citra mordicationem facultatis est. Plinius, cum de ocimo scripsisset, subiicit. Siluestri ocimo vis efficacior ad eadem omnia, peculiaris ad vitia quæ vomitionibus crebris contrahuntur: vomiciq; vuluæ, contraque bestiarum morsus radix in vino est efficacissima. Sed cum hæc cum iis quæ Dioscorides & Galenus de ocimoide tradiderunt non consentiant, ocimum siluestre Plinij, illorum ocimoides, siue ocimastrum vix esse potest.

Lib. 27. c. 8.

Lib. 2. stirp.

Hispan. c. 53.

Lib. 4. c. 25.

Vires &

Temper.

Lib. 8. simp.

Lib. 20. c. 13.



LITORES hodie in hortis serunt herbam Græcis & Mauritanis indictam, præterquam Simeoni Sethi, à quo Tarchon dicitur, vulgò Draconem vocant, Galli *Dragon*, alij Targon, Italis *Dragoncello* & *Dragone*, vnde Dracunculus hortensis à Matthiolo, & recentioribus herbariis nominatur. Herba est folio angusto, oblongo, quadantenus nigricante,

Nomina

Forma

DRACO, Hortensis.



folio hyssopi vulgaris haud absimili, eo & radice linguam amburens, aceti & salis gustu: caule rotundo, cubitali, in ramulos diuiso, in quibus capitula minima, ex quibus dehiscen-
tibus flosculi emicant lutei, quandoque candidi, deinde semen minutum, nigrum, radice est longa, gracili, fibrata, humi repente. Sunt qui plantam istam cultorum mangonio factitiam esse, nec talem natura prouenire credunt: eam enim nasci lini semine excauatis cepis imposito, ac in terra condito. Sed qui huiusce rei periculum facere voluerunt, operam perdiderunt. Saporis acrimonia commendationem attulit ad vsum acetariorum, ex qua ex ordine esse vehementer excalfacientium facile est coniicere. Draco hic hortensis Chrysocome Dioscoridis est Dale-
chamio, palmum alta (cultu procerior) coma hyssopi, corymbis onusta (κορυμβώδην legit, non κορυμβοειδῆ) radice densa (δασύαν sic vertit nō hirsutam) tenui, instar veratri nigri, cypero pari, gustu non insuauis, ex dulci subaustero. Quæ omnia conueniunt. Nascitur sponte in saxosis montibus foro Sebusianorum propinquis, vul-

Diosc. lib.
4. cap. 50.

gò Bourg en Bresse, haud procul pago Cæsarea, vulgò *Cæseria*, qua itur in oppidulum comitatus Burgundiæ *Chauanas*. Fabulosum est quod aiunt nasci lini semine cepa incluso & sic fato.

CARYOPHYLLATA.

CAP. LIIII.



VO NOMINE herba hæc ab antiquis Græcis & Latinis scriptoribus nuncupata sit, nondum compertum est, nisi fortasse sit Geum Plinij, cui radículas tribuit tenues, bene olentes. Sunt qui falsò Dioscoridis Lagopum esse credunt, quia in segetibus non nascitur. Recentiores Latini Caryophyllatam vocant à radicum odore, vulgus Benedictam à Diuina efficacia, & Sanammundam. Duo esse eius genera animaduertit Fuchsius, non tamen multum à sese dissidentia. Primum genus caryophyllatam hortensem vocat, cui ex cultura aliqua teneritas accedit in foliis, floribus, & paniculis, cuique flos paulò minor & pallidior quàm siluestri. Alterum caryophyllatam siluestrem appellat, cui flores multò maiores, & magis crocei. Duo quoque genera hîc depicta sunt. Caryophyllata vulgaris, & Caryophyllata montana. Caryophyllatæ vulgari folia sunt in summis pediculis tripartita, hirsuta, subaspera, agrimonix foliis quadantenus similia, quibus bina alia succedunt in eodem pediculo multò minora, omnia in ambitu infecta: caulis ramosus, rotundus, sesquicubitalis, geniculatus, hirsutus: flores pentaphylli æmuli, quibus villosa succedunt capitula, in quibus se-

Nomina

Lib. 26. c. 7.
Matth. in
lib. 4. Diosc.
cap. 17.

Genera.

Cap. 143.

Forma.

CARYOPHYLLATA,

Matthioli.

CARYOPHYLLATA

Montana, Dalech.



Locus.

Forma.

men: radices copiosæ, tenues, subrufæ, caryophyllorum odore. Colitur in hortis ab herbariis. Nascitur etiam sponte secus vias, circa agrorum & hortorum sepes, & opacis locis gaudet. Caryophyllatæ montanæ radix nigra est, supernè crassâ, paulatim gracilescens, vndique fibrata, inodora, fatuiq; gustus: folia non ita multa, caryophyllatæ superiori similia, in ambitu serrata: caulis pedalis, tenuis, in quo pauca folia & parua: flos luteus, lineis puniceis plurimis distinctus, capite in medio extuberante, quod succusso flore arrectis nigricantibus pilis horret. Aquosis locis gaudet. Aliam Caryophyllatam montanâ exhibet Matthiolus. Caryophyllatâ maiorem rotundifoliam vocat Lobellius. Hæc folia habet crassiora, crispiora, hirsutioraq; quâ vulgaris, multa ab vna radice enata, longis pediculis nixa subaspera, laciniata, humi strata: caules tenues in cacumine non brachiatos, in quibus rara paruaque folia spectantur. In caulium singulorum verticibus singuli flores insident, pulchri, triplo ferè quàm in vulgari maiores, aurei, qui tandem flaccescentes pinnatum efficiunt orbem, magno naturæ artificio, radice firmatur spithamæ longitudine minimi digiti crassitudine, sed non fibrata, rufaque: odore caryophyllorum, & gustu adstringente. Efficaciorem esse putat vulgari. Caryophyllatam aliam Pena descripsit, siue Geum Alpinū recentiorum, folia habet in imo plura, hederacea, nonnihil cristata, asari

CARYOPHYLLATA

Montana, Matth.



In lib. 4.
Diosc. cap.
17.

men: radices copiosæ, tenues, subrufæ, caryophyllorum odore. Colitur in hortis ab herbariis. Nascitur etiam sponte secus vias, circa agrorum & hortorum sepes, & opacis locis gaudet. Caryophyllatæ montanæ radix nigra est, supernè crassâ, paulatim gracilescens, vndique fibrata, inodora, fatuiq; gustus: folia non ita multa, caryophyllatæ superiori similia, in ambitu serrata: caulis pedalis, tenuis, in quo pauca folia & parua: flos luteus, lineis puniceis plurimis distinctus, capite in medio extuberante, quod succusso flore arrectis nigricantibus pilis horret. Aquosis locis gaudet. Aliam Caryophyllatam montanâ exhibet Matthiolus. Caryophyllatâ maiorem rotundifoliam vocat Lobellius. Hæc folia habet crassiora, crispiora, hirsutioraq; quâ vulgaris, multa ab vna radice enata, longis pediculis nixa subaspera, laciniata, humi strata: caules tenues in cacumine non brachiatos, in quibus rara paruaque folia spectantur. In caulium singulorum verticibus singuli flores insident, pulchri, triplo ferè quàm in vulgari maiores, aurei, qui tandem flaccescentes pinnatum efficiunt orbem, magno naturæ artificio, radice firmatur spithamæ longitudine minimi digiti crassitudine, sed non fibrata, rufaque: odore caryophyllorum, & gustu adstringente. Efficaciorem esse putat vulgari. Caryophyllatam aliam Pena descripsit, siue Geum Alpinū recentiorum, folia habet in imo plura, hederacea, nonnihil cristata, asari

CARYOPHYLLATA,

sive Geum Alpinū Pena.

ta, asarinæ rotunditate, aut saxifragiæ albæ, sed maiora: caulem è radice geniculata, & ex fusco rufôve albicante rectum, gracilem, cubitalem, summo ramulis diuisum, & flosculis albis, stellatis onustum. Tota nonnihil calfacit, exsiccaturque, gustu caryophyllatæ aut saniculæ. Recentiores, & peruetustus herbarius calidam & siccam esse caryophyllatam in secundo ordine statuunt, folia sanè in gustu non mediocrem adstrictionem ostendunt. Radix itidem haud parum adstrictionis habet. Ea luto & sordibus eluta siccatur, & imbre aceti respersa arcas & vestes iucundo odore commendat. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandisque coli dolores. Pectoris laterisque dolores & cruditates iucundo sapore discutit. Manuscriptus herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit, fomentum item ex vino decoctionis eius menses ciere. Contra venena etiam cum vino sumptam valere, concoctionem roborare, dolorem ventriculi & intestinorum à frigiditate aut flatibus ortum, decoctū in vino sanare ait. Mirifi-

Fuchs. cap.

143.

Vires &
Temper.

cè etiā ad inferna vulnera huius herbæ decoctum cōfert. Externa verò ex ea collini debent. Scribit etiam Matthi^{ol}us recētiore caryophyllatæ potu uti ad thoracis interna vulnera: succum eius admista ærugine cuniculosis, contumacibusque vlceribus vtiliter iniici. Eandem olfactu spiritus recreare, & frigidum cerebrum roborare. Epotam prodesse cœliacis, dysentericis, fœminarum profluuiis, & cruenta expuentibus. Tam intus sumptam, quàm foris illitam enterocelis auxilio esse. Temperamentum ei excalfaciens & exsiccans, maximè radicibus, quæ odoratæ & adstringentes gustu deprehenduntur, quibus qualitatibus attenuat, discutit, adstringit, & roborat.

In lib. 4.
Diosc. cap.
17.



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER SEXTVS,



In quo describuntur & depinguntur plantæ Umbelliferae.

FŒNICVLVM, CAP. I.



Nomina

Genera.

Lib. 3. c. 67.

Forma.

VE MADMODVM earum rerū quæ absconditæ sunt demonstrato & notato loco facilis inuentio est, sic, cum rei herbariæ studiosi stirpes peruestigare cupimus, natales singularum locos scire debemus: sic enim diuersarum diuersis in locis à natura procreatarum scientiam percipiemus & consequemur. Quare primam stirpium differentiam à locis petitam primū exposuimus: deinceps verò differentias aliàs, quæ tum à partibus earum insignibus sumuntur, tum à notis quibusdam illustribus, tum ab occultis & admirabilibus viribus, persequemur. Exordiemur autem ab iis quibus umbella summam infidet, quæq; venustè coronantur, veluti Fœniculum, anisum, anethum, daucum & alia pleræque. Est autem umbella floris feminis'ue pedamentum, in multos digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodem tanquam centro orti, in latius continuò radiātur, singuliq; florem vel semen sustinent in orbem circumactum. Quod quoniam umbellæ, qua mulieres vultum vindicant à solè, & æstum arcent, circinatum effigiem gerit, Græci primū hunc floris habitum σκιαδιον, mox Græcos imitati Latini dixerunt umbellam, à qua umbelliferæ plātæ cognominantur: inter quas vulgatissimæ notionis est Fœniculum, quod Græcis μάραθρον dicitur, Actuário μάλαθρον, Latinis Fœniculum, Arabibus *Raienigi*, Gallis *fenouil*, Germanis *fenchel*, Italis *finocchio*, Hispanis *Hinoio*, & *funcho*. Μάραθρον autè, ἀπὸ τῆς μαράναις, id est, à marcescendo Græcis dictum putant, quod eius è maridi & arentis multus sit vsus ad condienda plurima. Fœniculum autem à Latinis, quod satum magno cum fœnore semen reddat, vel potius Græcorum imitatione Fœniculum dictum, quod quasi fœnum in hyemes arefactum & maridū reponatur. Eius genera tria assignat Dioscorides, marathrum siue fœniculum, hippomarathrum, id est, fœniculum erraticum siue siluestre, cuius aliud genus est semine coriandri. Apud nos in triplici differentia visitur, vulgare, dulce, & erraticum siue hippomarathrum. Fœniculum vulgare siue satium (quamquam & sponte virens reperitur in agris squallidis & siccioribus, vt in Narbonensi) caule assurgit geniculato, rotundo, multum ramoso, hominis plerunque altitudine, læui exterius & herbaceo cortice, medulla intus fungosa, foliis longis, mollibus, minutissimè dissectis, vt capillamentorum congeriem potius quàm folia dixeris, odoris iucundi: umbella in summis caulibus rotunda, ampla, lutea, in orbem radiatim circinata, in qua semen pallidum

FOENICVLVM

Vulgare.



FOENICVLVM Siluest.

Loniceri.



pallidum siue luteum, oblongum: radice candida, longa, odorata. Dulce caule est breuiore & exiliore, foliis anethi, semine maiore, gustu anisi dulci, colore albido, minus acri, hyemes non perinde fert ac vulgare, nec perinde frequens feritur, vt potè semine è Syria vel Græcia delato, tum pharmacopæis, tum coquis in apparandis cibis vsu frequentissimum. Siluestre Foeniculum nominant Officinæ auctoribus Ruellio & Lonicero, satiuo procerius, brachiali crassamento, foliis etiamnum maioribus, semine miliaceo, radice alba, odorata. Tantæ amplitudinis in Mauritania, vt caulis duodecim cubitis assurgat, crassitudine palmorum quatuor. Foeniculum passim in hortis satum prouenit. Agreste in petrosis & calidis inuenitur. Floret Iunio & Augusto mensibus, Augusto semen maturum est: Foeniculum herba si edatur, inquit Dioscorides, aut semen cum ptisana bibatur, lac attrahit. Comæ decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod vrinam excitet, (Sic Ruellius græca conuertit quæ in vulgatis codicibus leguntur. τὸ δὲ ἀφέχημα τῆς κόμης ὑποτέθεν, νεφελικοῖς καὶ τοῖς περὶ κύστιν χρήσιμον, quæ sonant, Comæ autem decoctum subditum, renum vitiis ortis circa vesicam confert, &c. In veteri autem codice leguntur, τὸ δὲ ἀφέχημα τῆς κόμης ποθεν, νεφελικοῖς, καὶ τοῖς περὶ κύστιν χρήσιμον, διὰ τὴν ἰκτὸν ὑπάρχον. Hoc est, Potum autem ipsius comæ decoctum, renum atque vesicæ vitiis est utile, cum vrinam cieat. Quæ lectio est omnium inculpatissima, & eam Cornarius agnouit, non enim renibus & vesicæ supponi potest hoc decoctum, maximè vt vrinam citet. At, dicet aliquis, imponi quidem posset his locis coma, vna cum decocto, aut etiam decoctum, sponsia ex ipso imbuta, atque sic ἐπιτεθεὶν legendum esset. Sed neq; hic vtendi modus vrinam ciere posse videtur. Quare omnino ποθεν legendum, vt is effectus sequatur. Eandem comprobat Serapio, locum hunc Dioscoridis sic interpretatus. Et quando sumitur decoctio summitatum Foeniculi in potu prouocat vrinam, & ideo confert doloribus renum & vesicæ.) Contra serpentium ictus in vino potum prodest, menses ducit, in febribus nauseam & stomachi ardorem

Lib. 3. c. 48.
T. 1. fo. 233.

Locus.

Tempus.

Vires &

Temper.

Lib. 3. c. 67.

And. La.

Embl. 71.
lib. 3.

ex aqua frigida potum sedat. Radices contritæ & cum melle illitæ, morsibus canum medentur. Succus caulibus & foliis expressus, in sole siccatus, medicamentis quæ ad excitandam oculorum aciem conficiuntur, vtiliter adiicitur. Extrahitur etiam succus ex semine viridi, foliis, ramulisq; ad eadem utilis, & radix exprimitur in pri-

ma germinatione. In Occidentali Iberia liquorem gummi similem reddit. Caul-
 lem medium dum herba floret incolæ demetunt, igniq; admouent, quò faciliùs
 vi caloris exudans gummi remittat. Hoc efficacius succo est ad medicamenta oculo-
 rum. Hippomarathrum est fœniculum siluestre, magnum fert semen cachryi si-
 mile, radix subest odorata, quæ pota vrinæ stillicidium sanat, radix apposita men-
 ses ducit. Semen autem & radix aluum sistunt potu, & contra serpentium morsus
 auxiliantur, calculosq; atterunt, & morbum regium expurgant. At foliorum deco-
 ctum potum lac attrahit, & mulieres à partu purgat. Vocatur & alterum hippo-
 marathrum, folia habens angusta, parua, oblonga, semen rotundum, ad coriandri
 semen accedens, acre, odoratum, calfaciendi vi prædictum, facultas eius superiori
 Lib. 20. c. 23 respondet, sed efficacia debiliore. Plinius eadem ferè de iisdem tradidit his verbis,
 Fœniculū nobilitauere serpentes, gustatu, vt diximus, senectam exuendo, oculo-
 rumq; aciem succo eius reficiendo. Vnde intellectum est, hominum quoq; caligi-
 nem præcipuè eo leuari. Colligitur hîc caule turgescente, in sole siccatur, inungi-
 tûrque ex melle. Vbique hîc est. Laudatissimus in Iberia è lacrymis fit, & ex semine
 Lib. 8. c. 27. recenti, fit etiam ex radicibus prima germinatione incisus. Dixerat autè de serpen-
 tibus multò ante. Anguis hyberno situ mēbrana corporis obducta, fœniculi succo
 impedimentū illud exuit, nitidusq; vernat. Et paulo post. Idē hyberna latebra visu
 Lib. 20. c. 23 obscurato, marathro herbæ sese affricans oculos inungit ac refouet. Quo loco grę-
 ca *μαράθρου* voce vsus est. Istis subiūgit. Est & in hoc genere siluestre, quod alij hip-
 pomarathrum, alij Myrsineum vocant, foliis maioribus, gustu acriore, procerius,
 brachiali crassitudine, radice cādida. Nascitur in calidis, sed saxosis. Diocles & aliud
 hippomarathri genus tradit, longo & angusto folio, semine coriandri. Medicinæ
 in satiuo, ad scorpionum ictus, & serpentium, semine in vino poto. Succus & auri-
 bus instillatur vermiculosq; in his necat. Ipsum condimentis prope omnibus infe-
 ritur: oxyporis etiam aptissimè quin & panis crustis subditur. Semen stomachum
 dissolutum adstringit, vel in febribus sumptum, nauseam ex aqua tritum sedat, pul-
 monibus & iocinoribus laudatissimū. Ventrem sistit cū modicè sumitur, vrinā
 exciet, & tormina mitigat decoctū, in lactisq; defectu potum māmās replet, radice
 cū ptisana sumpta. Renes purgat, siue decocto, siue succo, siue semine sumpto. Pro-
 dest & hydropicis radix ex vino cocta: item conuulsis. Illinuntur folia tumoribus
 ardentibus ex aceto. Calculos vesicæ pellunt, genituræ abundantiam quoquomo-
 do haustum facit. Verendis amicissimū, siue ad fouendum radice cum vino cocta,
 siue contrita in oleo, illitum. Multi tumoribus & suggillatis cum cera illinunt. Ra-
 dicis succo, vel cum melle contra canis morsum vtuntur, & contra multipedam
 ex vino. Hippomarathrum ad omnia vehementius, calculos præcipuè pellit. Pro-
 dest vesicæ cum vino leni, & fœminarum menstruis hærentibus. Efficacius in eo
 semen quàm radix. Modus in vtroque, quod duobus digitis tritum additur in po-
 tionem. Petridius qui Ophiaca scripsit, & Miction (Alij Micon legunt) qui Rhi-
 zotomumena, aduersus serpentes nihil hippomarathro efficacius putauere. Sanè
 Lib. 7. sim. & Nicander non in nouissimis posuit. Galenus vtriusque facultates distinctius ex-
 plicat, à Dioscoride tamen non dissentit. Fœniculum, inquit, tam valenter excal-
 facit, vt ex tertio ordine excalfacientium censeri possit, desiccatur verò non æquè,
 sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit, quare lac procreat, quod
 si admodum desiccaret, non sanè efficeret, suffusis eadem ratione auxiliatur, vri-
 nas mensesque ciet. Porro est & alterum fœniculum, quod ob magnitudinem
 hippomarathrum nuncupant, cuius radix ac semen amplius quàm domestici de-
 siccandi vim habet. Quocirca ventrem quoque hoc nomine sistere videtur. Nec
 sanè manifesta illis inesse videtur adstrictio. Huius non radix modo, sed & se-
 men cachryi adsimile est, potestque & calculos frangere, & ictericos sanare, men-
 sesque

sesq; & vrinas mouere, non tamen lac congerere sicut illud superius. Aliud est hippomarathrum, cuius semen rotundum est & acre, simile semini coriandri, facultate quidem hippomarathro simile, sed debilius. Hæc Galenus.

A N E T H V M.

C A P. I I.



N H Θ O N Græcis, similiter Anethum Latinis, Mauritanis *Xebet*, *lebet*, siue *Sebet*, Italis *Anetho*, Germanis *Dyllen*, & *Hochkraut*, Hispanis *Eneldo*, Gallis *Anet*. Ἀνῆθον autem quasi ἀνέκτιστον, idest, inuictum quidā dictum volunt, quia appetentiam cibi excitat, sed etiam ἀνῆθός ἐστιν congressus est, familiaritas, & coitio venerea, ad quam lacescit Anethi esus, ut antiqui prodiderunt, tametsi plurimo vsu genituram tandē exhauriat. Dioscoride teste. Anethum caules fert rotundos, geniculatos, ramosos, sesquicubitali proceritate, folia exilia, fœniculi haud absimilia, sed duriora & crassioribus staminibus: flosculos lateolos in umbellis caulium fastigiis insidentibus, ut in fœniculo semen minutum, latum, & quasi foliatum: radicē lignosam, neque adeò prolixam, neque adeò multis subnixam fibris. Adeò fœniculo simile est, ut pharmacopeos sæpè fallat, nisi sapore faciliè discerneretur, ingrato, calidiore, & colore obscurius virente. Hortis iam frequentissimum est, interdum etiam sponte fœniculi modo prouenit. Iunio & Iulio mensibus floret. Facultatibus his pollet, auctore Dioscoride. Anethi aridi comæ ac seminis decoctum potum lac attrahit, inflationes ac tormina sedat: aluum vomitusq; sistit (Sic vertit Ruellius quæ in vulgari codice leguntur, κοιλίαν τε, καὶ τὸς ἐπιπολεῖς ἐμέτους ἰσῆσι. Idest, Aluum & vomitus leues supprimit: quāuis in veteri exemplari legamus, κοιλίαν τε καὶ θάλασσαν, καὶ τὸς ἐπιπολεῖς ἐμέτους ἰσῆσι: quod est, aluum purgat, & vomitus leues supprimit, vrinas ciet, singultus lenit, oculos hebetat, & geniturā extinguit assiduè potum. Vtile etiā est ipsius decoctum mulieribus præfocatione vuluæ laborantibus ad defectiones: semen eius vstum & illitum condylomata tollit. Plinius cū Anisum & Anethum culinis & medicis nasci dixisset,

Nomina

Pet. Pe. in

Hol. fol.

347.

Forma.

Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 8.

Vires &

Temper.

Lib. 19. c. 8.

Li. 20. c. 18.

Li. 6. simpl.

A N E T H V M.



postea Anethum quoque ructus mouet, inquit, & tormina sedat: aluum sistit. Epiphoris radices illinuntur ex aqua vel vino. Singultus cohibet semen feruens olfactum: sumptum ex aqua sedat cruditates. Cinis eius vuam in faucibus leuat: oculos & genituram hebetat. Anethum, inquit Galenus adeò excalfacit, ut habendum sit, aut secundi ordinis intensi, aut primi finientis. Itaque meritò in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat, & crudos incoctosq; humores concoquit: fit enim ex eo oleum cuius propinqua sit temperies pus mouentibus, & concoquentibus medicamentis, nisi quatenus paulò illis tum calidius, tum tenuiorum partium est, ac digerendi facultate præditum. Vstum autem tertij ordinis tum excalfacientium, tum desiccantium fit. Propterea vlceribus nimis humidis mollibusq; prodest, potissimum iis quæ in pudendis cōsistunt. At quæ in præputio sunt inueterata, iis probè cicatricem obducit. Cæterum viride humi-

dius est, & minùs calidum. Itaque magis quàm siccum concoquit, & somnum conciliat, sed minùs digerit. Idcirco mihi videntur veteres in conuiuiis vsi esse coronis ex eo concinnatis.

ANISVM.

CAP. III.

Nomina

Lib. 2. c. 17.

Petr. Pe. in
Ad. fol. 322

Forma



NISON & ἀνισον Græcis, Latinis & Officinis Anisum, Mauritanis Aneisum, & Anexissum, Italis Aniso, Hermanis Anisz, & Enisz, Hispanis Matuhalua, & Yerna dulce, Gallis Anis. Ἀνισον quidam, auctore Plinio, quasi ἀνιχνισον vocauere, quia appetetiam cibi præstaret. Sed verisimilius est sic dictum ὅτι ἀνιχνισον ἐμπνέει καλῶς, idest, quod remittit & laxat tensiones flatulentas internas & externas. Anisum foliis est apio hortensi recens

ANISVM.



Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 16.

Vires &

Temper.

prodeunti par, caulem edit rotundum, tenuiter striatum, inanem, multis ramulis brachiatum: folium cum primùm enascitur, rotundum, sed deinde apii modo dissectum, verùm minus & magis candicans: in caulium summitate elegantes vmbellæ spectantur, floribus candidis decoratæ, deinde semine grauidæ, candicante, oblongo, odore & sapore dulci suauiq;. Ex Syria & Creta originem habet, sponte illuc proueniens, nunc passim in hortis etiam Septentrionalium regionum satum fruticat. Iunio & Iulio mensibus floret, semineq; prægnans est. Cuius facultates has esse tradit Dioscorides. Anisum in vniuersum vim habet excalfaciendi, siccandi, facilem respirationem reddendi (ἐμπνέει Græcè legitur, Ruellius vertit oris halitum iucundiolem facit, Plinium secutus, qui sic vocem ἐμπνέει reddidisse videtur) dolorem sedandi, discutiendi, vrinam ciendi, diffundendi. Hydropicis potum sitim arcet. Prodest ad venenata animalia, & ad inflationes. Alium & album mulierum profluuium sistit. Lac ad mammas elicit, & venerem stimulat. Suffitum

naribus dolorem capitis sedat: tritum & cum rosaceo instillatum aurium medetur rupturis. Hæc Dioscorides. Quæ particulatim & pluribus verbis Plinius declarauit. Anisum aduersus scorpiones in vino bibitur, Pythagoræ inter pauca laudatū siue crudum, siue decoctum. Item viride aridumve omnibus quæ cōdiuntur, quæq; intinguuntur desideratum: panis etiam crustis inferioribus subditū. Saccis quoque additur. Cum amaris nucibus vina cōmendat, quin ipsum oris halitū iucundiolem facit, fœtoremq; tollit manducatum matutinis cum smyrnio, & melle exiguo ore mox vino colluto: vultum iuniorem præstat. Insomnia leuat suspensum in puluino, vt dormientes olfaciant. Appetentiam ciborum præstat: ob has causas quidem Anicetum id vocauere. Dolores capitis leuat suffitum naribus. Epiphoris oculorum è vino radicem eius tusam imponit lollas. Ipsum cum croco pari modo & vino, & per se tritum cum polëta ad magnas fluxiones, extrahendisq;, si qua in oculos inciderint. Narium quoque carcinodes consumit illitum ex aqua. Sedat anginas cum melle & hyssopo, & aceto gargarizatum. Auribus infunditur cum rosaceo. Thoracis pituitas purgat tostum: cum melle sumptum melius. Cum acetabulo

Li. 20. c. 17.

tabulo Anisi nuces amaras quinquaginta purgatas tere in melle ad tussim. Præcipuum autem est ad ructus, ideò inflationibus stomachi, & intestinorum torminibus, & cœliacis medetur. Singultus & olfactum decoctum potumq; inhibet. Potum somnum conciliat, calculos pellit, vomitiones cohibet, & præcordiorum tumores. Et pectorum vitiis, neruis quoque quibus succinctum est corpus vtilissimum. Prodest eius & capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Non aliud vtilius ventri & intestinis putant: ideò dysentericis & in tenesmo datur tostum. Dalion herbarius dedit bibendum cum Anetho parturientibus. Phreniticis quoque illinunt recens cum polenta. Sic & infantibus comitialia vitium, aut contractiones sentientibus. Pythagoras quidem negat corripere vitio comitiali in manu habentes, ideòq; quamplurimum domi ferendum. Parere quoque facilius olfactantes. Sosimenes contra omnes duritias ex aceto usus est, & contra lassitudines, in oleo decoquens, addito nitro. Semine eius poto lassitudinis auxilium viatoribus spondit. Heraclides ad inflationem stomachi semen tribus digitis cum castorei obolis duobus ex mulso dedit. Similiter ad ventris, aut intestinorum inflationes, & Orthopnoicis, quod ternis digitis prehenderit seminis tantumdem hyosciami cum lacte asinino. Multi vomituris acetabulum eius, & folia lauri decem, trita in aqua, bibenda inter cœnam suadent. Strangulationes vulvæ si māducetur & linatur calidum, vel si bibatur cum castoreo aceto & melle sedat. Vertigines à partu cum semine cucumeris & lini pari mensura ternum digitorum, vini albi tribus cyathis discutit. Tlepolemus ad quartanas ternis digitis seminis anisi & fœniculi usus est, in aceto, & mellis cyatho vno. Lenit articulares morbos, cum amaris nucibus illitum. Sunt qui & aspidum venenis aduersari naturam eius putent. Vrinam ciet, sitim cohibet, venerem stimulat. Cum vino sudorem leuiter præstat. Vestes quoque à tineis defendit. Efficacius semper recens, & quò nigrius. Stomacho tamen inutile est, præterquam inflato. Hæc Plinius. Galenus, Anisi semen, inquit, maxime vtile est, acre & subamarum, ut propè ad vrentium accedat caliditatem. Est autem & in siccando tertij ordinis, sicut & in calefaciendo. Proinde & urinam ciet, & digerit, & flatus ventris reprimit. Hæc Galenus. Sed cum nullum sanè ex omnibus flatus dissoluentibus oleraceis seminibus gratius sit ventriculo, minùs habeat acrimoniæ, aut plus suauitatis quam anisi semen, neutiquam, ut ex Dioscoride Galenus arbitratur, tertio gradu hodie gustanti apparet calidum. Quare id de Aniso in Syria, aut sponte alibi in regionibus calidis nato intellexisse videtur, nunc cum nuspiam sponte proueniat, sed in hortis duntaxat etiam Septentrionalium regionum colatur, mutatione cœli, soli & cultus, non nihil caloris deposuisse necessum est. Simeon Sethi ad vetustos ex frigore iecoris affectus Anisum prodesse scripsit, & ad spirandi difficultatem quæ ex pituita proficiscitur. Flatus qui in ventriculo sunt digerere, obstructions tollere, & lactis copiam facere.

Li. 6. simpl.

C A R V M.

C A P. I I I I.

Carus Græcis & καρόν siue καρῶν, Latinis Carum, vel Careum, Officinis Carui nominatur, Arabibus Caruia, Karauia, seu Carui, Italis Caro, Germanis Mathekumich, Hispanis Alcaraua, Gallis Carui. Carum autem à Caria regione in qua laudatissimum nascitur, appellationem accepit. Id pastinacæ siluestri haud absimile caules ab vna radice multos emittit quadrangulos, geniculatos, cubitales, folia pastinacæ silvestris, umbellas in summis caulibus, candidis floribus refertas, semen angulosum, copiosum, subnigricans, acre, & linguam vellicans, radicem oblongam & luteam, crassiusculam. In pratis hodie prouenit, optimum, ut dictum est, in Caria. Maio & Iunio mēsis florēt, & semine prægnans

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

CARVM; *Math.*

Lib.3. c.57.
Vires &
Temper.



Lib.19. c.8.

Li.7. simpl.

Li.2. Alim.

Matthi. in
ca.57. lib.3.

prægnans est. Carum, inquit Dioscor. calfacit, vrinam ciet, stomacho vtile est, ori gratum (legitur enim Græcè *ἄνηθον*, Ruellius vertit os commendat, quod est idem ac si dicas suauem anhelitum reddit) concoctionem adiuuat. Miscetur etiam commodè antidotis & oxyporis. Anisi vicem præstat, (Sic Ruellius, cum legatur in veteri codice *ἀναλογουῖ ἀνίσω, ἢ ἀνήθω*. quod est, aniso, aut anetho proportionem respondet) Radix elixa pastinacæ silvestris modo edendo est. De eodem breuiter sic Plinius. Peregrinum & Careum, gentis suæ nomine appellatum, culinæ principale. In quacunque terra feri vult, ratione eadem qua Olusatrum. Laudatissimum tamen in Caria, proximum in Phrygia. Cari semen, inquit Galenus, calfacit & exsiccat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem qualitatem possidens. Quare & flatus extinguit, & vrinam ciet, non semen tantum, sed & planta. Idem alibi radicem Cari melioris succi esse ait, quàm pastinacæ, tamen æquè cōcoqui. Notissimum est Officinis Carum, præsertim eius se-

men quod aperit, prouocat, dissoluit, incidit. Auxiliatur frigidis vteri affectibus, confert omnibus frigidis morbis capitis, visum acuit. Herba pro oleribus editur, radix cocta estur perinde vt pastinaca. Seminis farina miscetur cataplasmatibus, quæ ad sugillata parantur. Integrum semen Germani cum pane subigunt, ciborumq; condimentis indunt, quemadmodum nos anisum & fœniculum.

A M M I.

C A P. V.

Nomina



MMI Græcis, Ammi Latinis dicitur, Officinis corruptè Ameos, Arabibus *Nanochah*, *Anazue*, seu *Nanachue*. Cui idem quod superioribus non euenit: harum enim descriptiones à Dioscoride prætermisæ, quin etiam vulgo notæ essent efficere non potuerunt, illius integra facies ab eodem non delineata quodnam genuinum sit ex multis generibus, quæ ab herbariis proponuntur, ambiguum reliquit. Ait enim ille duntaxat *σπερμάτιον*, idest, paruum semen esse vulgo notum, multò minùs cumino, gustu origanum resipiens, vt videatur Ammi appellatio perpusillum quasiq; arenaceum exilitate & colore semen esse. Fuchsius & eum secutus Dodonæus Ammi commune, siue Ammi Officinarum, verum Ammi esse autumant: quod caule rotundo & herbario constat, surculis multis & exiguis: folio oblongo, angusto, per ambitum incisuris diuiso: flore paruo, candido, umbella anethi: semine exiliore multò quàm cuminum, acris & subamaro, origanum præ se ferente: radice candida & multifida. Quidam Bupleuron Plinij esse volunt, vt Buprestin Auriculam leporis descriptam post hac cap.23. de Panace. Esse autem hanc herbam verum Ammi, inquit Fuchsius, seminis in gustu sapor qui subamarus & acris est, omnium maximè ostendit: talem enim in eo saporem Galenus requirit: origanum etiam gustu referre videtur. Quibus accedit antiqui & manuscripti herbarij testimonium, cuius pictura & testimonium satis docent hanc herbam esse Ammi genuinum. Inter cætera enim semen Ammios piper gustu referre, ideoq; à nonnullis piperulam dictam esse ait.

Id quod

Ca.21. hist.
Lib.2. c.79.

Forma.

Ibidem.

A M M I, Fuchf.*A M M I, Matthioli.*

Id quod verissimum esse comperies, si semen gustaueris: miram enim huic acrimoniā inesse senties. Nusquam apud nos sponte sua nascitur, inquit Fuchsius, satum tamen facile & magna copia prouenit, sic vt deinde extirpari vix queat. Augusto mense floret, ac deinceps vbi defloruit semen abundè producit. Sed hæc improbat Matthiolus his verbis. Quod Ammios nomine passim in Officinis habetur, cum probatissimum, Plinio teste, omnino sit candidius, id nigricat, adeoq; vulgaris petroselini semen æmulatur, vt visu ab eo discerni minimè possit, sed in hoc gustum consulere oportet: nam cum haud leuiter sit acre, facultatis discrimen gustu facile deprehenditur. Præterea cum hoc nullū origani saporem gustu representet, perspicuum est non esse legitimū. Hæc ille. In quibus animaduertendum Plinium candidioris nota non præstātiā seminis Ammios, sed huius à cumino discrimen indicasse. Sunt enim hæc eius verba. Pleriq; alterius naturæ (à cumino Æthiopico) in totum putant, quoniam sit exilius & candidius. Illi verò legitimum Ammi substituit Matthiolus, quod ex horto Patauino Anguillara misit. At Pena istud in Patauinis hortis cultum, etiamq; nō procul Ageno & Garumna in Aquitania à se collectum, foliis & vmbellis Dauci cretensis, semine & radice hortēsis apij, neutiquam illis in Ammi semine viribus expetitis præditum est. Aliud semen non multis ab hinc annis cœptū fuit deuehi ex Siria aut Creta Venetias, hortensi apio par, sed flauum, gustu aromaticum, feruidum, origanum præferens. Ex eo in horto Condenbergij, sapore pastinacæ, aromatico semine prouenisse ait Lobellius Ammi Creticum aromaticum, quod & pinxit Matthiolus. Aliud Ammi perpusillum ex Lobellio hîc appinximus, radice superioris simili, foliis fœniculi, semine perpusillo in vmbellis multis. Sunt qui aliud Dauci genus faciunt, id nimirum quod Matthiolus crithami terrestris nomine descripsit his verbis. Nascitur, inquit, in Bohemia, præsertim in agro Prageni non solū inter segetes: sed in agrorum marginibus & secus vias, foliis longis, angustis, firmis, ternis ex vno pediculo, ipsoque longo prodeuntibus, vtrinq; denticulatis, falcis frumentariæ modo. Caterū quæ in caulium summis partibus habentur minora breuioræque sunt: caulem gerit ramosum, alis concauum, geniculatum, in cuius summitate ramuli exeunt diuisi, in quibus floridæ albicantesq; vmbellæ, postremò semen paruum, oblongum, acre & odoratum. Radice nititur simplici,

*Locus.**Tempus.*

Ca. 61. li. 3.

Li. 20. c. 15.

In Ad. fol. 323.

Ca. 132. li. 2.

pastinacæ



Lib. 3. c. 61.

*Vires &**Temper.*

Li. 20. c. 15.

Li. 6. simpl.

pastinacæ haud absimili, minore tamē, sapore imprimis dulci, sed si diutius mandatur, acri & odorato. Ammi, inquit Dioscor. vim habet excalfactoriam & exsiccantem. Facit ad tormina, vrinæ difficultatem, venenatorum morsus cum vino potum, menstrua ciet. Miscetur rodentibus ex cantharidibus confectis medicamentis, vt inde exortis vrinæ difficultatibus resistat. Suggillata cum melle illitum tollit. Colorem potum & inunctum in pallorem mutat. Suffitum cum vua passa aut resina vuluas purgat. Eadem tradit Plinius. Inflationes & tormina discutit. Vrinam & menstrua ciet. Suggillata & oculorum epiphoras mitigat cum lini semine. Scorpionum ictus in vino potum drachmis duabus, priuatimq; cerastarum cum pari portione myrrhæ. Colorem quoque bibentium similiter (nimirum vt cuminum,) mutat in pallorem. Suffitum cum vua passa aut resina vuluas purgat. Tradunt facilius concipere eas, quæ odorentur id per coitum. Galenus herbæ quam vocant Ammi, semen maximè vtile esse scribit, facultatis excalfactoriæ & desiccatoriæ, tenuiumq; partium. Sed & gustu subamarum est, & acre. Hinc perspicuum est quod digerat, & vrinam moueat. Fuerit autem in calfaciendo resiccandoq; ex ordine tertio intenso.

CUMINVM SATIVVM. CAP. VI.


*Nomina*In Ad. fol.
330.*Genera*
Pe. ibid.

Y' MINON Græcis, sic & Latinis Cuminum, Officinis Cyminum, Arabibus *Camum* seu *Kemum*, Italis *Cumino*, Hispanis *Comino*, Gallis *Comin*, Germanis *kimmel*. Est autem tantæ feracitatis, inquit Pena, inter oleracea Cuminum, vt etiam maledictis satū vberrimè luxuriet. Vnde Cuminum quis, quasi prægnavs à verbo *κύνω* manasse putet. Eius genera tria sunt Dioscoridi, sativum, & silvestre duplex. Sativum aliquantū diuersum diuersis è locis Syriæ, Græciæ, Ciliciæ allatum obseruatur. Quod enim albicat hirsutumq; est semen, præstantius habetur. Aliud neutiquam hirsutum est. Nec putandum discrimen aliud fuisse Æthiopici aliúsve, quàm loci prærogatiua. Visusq;

Visusq; est Hippocrates satium istud albicans hirsutumq; , basilicum seu Æthiopium statuisse. Cuminum satium caule est longo, recto, multis adnatis ramulis, foliis minutim discisis, fœniculi similibus, flores in vmbellis emicant veluti in fœniculo, in quibus tandem copiosum semen. Radix albicat, & summo repit

Forma.

CUMINVM Satium
Matthioli.



cespite. Tractu gaudet calido & putrescibili, quamobrem frequentissimum in maritimis nascitur. Prouenit, inquit Dioscor. in Galatia, in Asia, Cilicia. Omnibus præfertur Æthiopium, quod Hippocrates regium appellat. Secundum locū tenet Agyptiū, reliqua sequuntur. Cuminum siluestre eodem Dioscoride auctore, frutex est paruus, caule palmum alto, tenui, in quo foliola quaterna aut quina, tenuia, veluti, serrata, & gingindij diuisura: in cacumine capitula quina aut sena habet, rotunda, mollia, in quibus semen est acerosum, gustu satiuo acrius. Nascitur in collibus. Plurimum efficaciusq; , inquit Dioscorides, in Lycia, Galatia Asiæ, & in Carthagine Hispaniæ. Alterum siluestris Cumini genus satiuo non dissimile est, quod à singulis floribus elata promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile. Cuminum satium vulgo satis notum, hic ex Matthiolo pictum damus. Item prius siluestris genus ex Cortusiana liberalitate. Alterum verò siluestris genus, idem Matthiolus cum Ruellio & Gesnero eam plantam esse putat

Locus.

Lib. 3. c. 59.

Cap. 59. li. 3.

CUMINVM Siluestre,
I. Matthioli.



CUMINVM Siluestre,
II. Matthioli.



quam herbarij Consolidam Regiam sive Regalem appellant, Galli *Pied d'Alouette*, Germani *Rittersporn*, idest, equitis calcar. Caulem fert simplicem, ramulis multis brachiatus, tenuibus, longis, diuisis, siluestris nigellæ modo. Flores edit purpureos, nigra violæ æmulos, ex quorum altera parte prodeunt cornicula sursum spectantia, quæ calcaris veterum formã exprimere videntur, vnde illi nomen à Germanis inditum. Semen fert in corniculis melanthio simile. Hanc plantam Dodonaus nomine buccini, seu Delphini alterius pinxit & descripsit, & huic prorsus similem, sed omnibus partibus maiorem & habitiozem Cōsolidam Regalem hortensem, Delphini nomine. Fuchsius perperam nomine Chamæmeli eranthemi. Sed in postrema Commentariorū editione Matthiolus sententiam retractat, aliudq; Cuminū siluestre alterum, ab eodem Cortuso acceptū, idq; verum depinxit, Hypecoum Clusij & Dodonæi. Eadem cumini siluestris genera Pena: his ferè verbis explicauit, atq; ita delineauit. Speciem præ se ferunt, inquit, vtriusque siluestris Cumini duæ plantæ, quæ locis glareosis prope Aquas Sextias Gallicæ prouinciæ vberim crescunt. Primæ foliola gingidij, vel siluestris pastinacæ modo diuisa sunt, radix albicat, parua, cauliculi inflexi, exiles scandicis seu pectinis venerei modo, sed albidis, rotundis, villosisq; glomerulis, globulos arctij imitantibus, tenera papposave lanugine cinctos, in spherulam densam, magnitudine pinpinellæ, platani modo globulariæve Monspeliensibus dictæ. Semen dētis leonis vel platani, sed multò minus. Alterius siluestris duæ sunt plantæ quæ effigie satis congruere videtur. Ea quæ minùs cognita, exigua & pulchra, non procul Aquis Sextiis oriunda, complura gerit cornicula, siliquata, adunca, scorpioidis dictæ modo, sed crassiora, semine intus præsepiolis distincto, colore flauo, oblongo: cauliculi graciles, teneriusculi, & folia parua, carei aut scandicis, pectinis venerei, fumariæve incisuris profundis: exigua radix, lutei flores Maio mense, Chelidonijs maioris, aut erucae, sed minores. Eidem eisdemq; natalibus siliquata perquam similis sociatur altera non nisi folio tenuiore, distans, angustiore, feseli Massiliensis diuisura, ad imum plantæ iuxta radicem albicantem, chœrephylo similem plurimum nascente, cauliculis ferme glabris, siliqua maiore: semine ibi contento, galegæ, subfuluo. Regia verò consolida alibi dicta, Cumini foliis, floribus purpureis, & interdum

CUMINVM Siluestre
alterum, Matth.

Lib.2.ca.25.

Ca.8. hist.

In Ad.



CUMINVM Siluestre
siliquatum, Pena.



terdum candidis, speciosis, coronariis, in calcaris antiqui speciem, è quibus cornicula oblonga, recta promuntur, semine nigellæ nigro, adeò hortis mulierculisq; familiaris est, vt minimè notionis dilucidioris egeat. Hasce itaque plantas Pena proposuisse se ait, vt quisque pro arbitrio de illis statuatur. Cum enim Cumini satiui sapore odoréve grato non polleant, nedum id superent, dubium est illane sit Cuminum silvestre. Alteri quidem lutei flores insunt, & semina melanthij defunt. Sola horum Regia consolida vocata videtur adhuc Cumini silvestris coniecturâ fouere: tametsi vsus medicamentis, aut cibis, vel nullus vel incertus. Hæc Pena. Nunc de viribus dicendum. Cuminum satium, inquit Dioscor. ori gratum est (vetus codex & Oribasius habent *ὀσφύμαχον*, idest, stomacho gratum) Calfacit, adstringit, exsiccat, ad tormina inflationesque conuenit coctum, & cum oleo infusum, aut cum hordeacea farina impositum. Orthopnoicis datur in posca, demorsis à serpente in vino. Testium inflammationibus auxiliatur impositum cum vua passa, aut lolij farina ceratove. Fluxum muliebrem cohibet, item sanguinis è naribus profluuium tritum cum aceto & admotum. Siue bibatur, siue illinatur corporis colorem in pallidius mutat. Cumini silvestris prioris semen bibitur ex aqua aduersus tormina inflationesq; , ad venenatas bestias, & stomachi humiditatem cum vino: singultus ex aceto sedat. Tollit & suggillata commansum, ac cum melle & vua passa impositum. Inflammationes etiam testium sanat cum iisdem illitum. Alterius Cumini silvestris semen serpentium moribus optimum est præsidium. Vrinæ stillicidio vexatis, & calculosis auxiliatur, & iis qui sanguinis grumos meiunt. Sed iis apij semen feruefactum postea bibendum est. Cumini vtriusque easdem vires Fuchsius declarauit. Plinius his verbis, Cumino satiui magnus vsus in stomachi præcipuè remediis. Discutit pituitas & inflationes tritū & cum pane sumptum, vel potum ex aqua vinoq; : tormina quoque & intestinorum dolores. Verumtamen omne pallorem bibentibus gignit. Ita certè ferunt Porcij Latronis clari inter magistros dicendi, affectatores similitudinem coloris (palloris alij legunt) studiis contracti imitatos: & paulò ante Iulium vindicem assertorem illum à Nerone libertatis, in captatione testamenti sic lenocinatum. Narium sanguinem pastillis inditum, vel ex aceto recens sistit. Testiculorum epiphoris per se impositum, tumentibus cum melle prodest. Infantibus imponi in ventrali satis est. Morbo regio in vino albo à balneis datur. Æthiopicum maximè in posca, & in ligmate cum melle. Africano priuatim vrinæ incontinentiam cohiberi putat. Satiuum datur ad iocinoris vitia tostum, tritum in aceto: item ad vertiginem. Iis verò quos acriore vi vrina mordet, in dulci tritum vino. Ad vuluarum vitia in vino, præterque impositis cum vellere foliis: testium tumoribus tostum tritumq; cum melle, aut cum rosaceo & cera. Silvestre ad omnia eadem efficacius. Præterea ad serpentes cum oleo, ad scorpiones, ad scolopendras. Sistit & vomitionem nauseasq; ex vino, quantum apprehenderint tres digiti. Propter eolum quoque bibitur, illiniturque, vel penicillis feruens adprimitur fasciis. Strangulationes vuluæ potum in vino aperit, tribus drachmis in tribus cyathis vini. Auribus instillatur ad sonitus, atque tinnitus cum seuo vitulino vel melle. Suggillatis illinatur cum melle, & vua passa, & aceto: lentigini nigræ ex aceto. Cymini semine

Lib. 3. c. 59.
Vires &
Temper.

Li. 20. c. 14

maximè vtimur, inquit Galenus, quemadmodum Anisi, Ligustici,

Cari, Petroselini. Est verò & facultatis excalfacientis,

sicut illorum vnumquodque, tum vrinam mo-

uentis, & flatum extinguentis, ex

tertio ordine excalfa-

cientium.

Li. 7. simpl.

NominaFuchf. cap.
283. hist.

In Ad.

Genera

Lib. 3. c. 46.

Forma

R A E C I S σέλιον, & σέλιον κηπόδιον, Latinis dicitur Apium, & Apium hortense, aut satium, Arabibus Charß, Charfi, seu Chares, Italis Apio domestico, & Petrosello, Germanis Petersilien, & Peterlin, Hispanis Perexil, Gallis Persil. Selinum autem Græci vocant, quasi ἑλκς σελόμυον, hoc est paludibus impulsus: quapropter Homerus ἐλεότρεπον σέλιον cognominat, quod paludosis gaudeat, & in iis enatum lætius exurgat. Mauult tamen Pena Selinum quasi lunaticum, dictum ab illo formidando affectu, quem accersit esu, quã à palustri solo, vbi non semper nascitur. Multa alia sunt Apij genera à locis & magnitudine nomen sortita. Apium siluestre, Gallis Persil sauvage, Eleoselinum, Oreoselinum, Petroselinum, Hipposelinum. Apium hortense siue satium verum antiquorum, omnium ferè herbariorum sententia, & coniectura potius quã vlla à veteribus expressa figura, vulgare nostrum Petroselinum hortis frequentissimũ, cibisq; gratissimum esse creditur, caule concauo, inquit Ruellius, tenuiter striato, rotundo, multisq; ramis brachiato, sæpe cubitalem æquante altitudinem: foliis tripartito dissectis, & leuiter crispis, oris leuiusculè laciniatis: flosculo candido, &

A P I V M Hortense.



A P I V M Siluest. Dalech.

Lib. 7. hist.
ca. 4.

Li. 3. c. 69.

Forma**Locus**

Lib. 5. c. 45.

quo minutiolem haud temerè reperias, nudo semine, radice singulari, suauiter olente. Aliud est hortense Apium crispatum, perelegans & rarum, à superiore nihil distans, nisi foliorum crispatis oris, argutioribusq; & minutioribus incisuris: σέλιον ἄγριον, Apium siluestre, cuius meminerunt Theophrastus & Dioscorides, hîc ex Dalechampij opinione depictum est, descriptumq; radice gracili, longa, candida, odorata, folio Apii hortensis, perquàm tenui, caule palmum alto, flore pusillo, albo in exiguis umbellis, quas herbacei cortices glumis spicarum non dissimiles sustinent, & subtus ambiunt, semine minutulo. In asperis collibus prouenit. Dodonæus longè aliud siluestre Apium exhibuit, quod foliis est magnis, valde incis, planè siluestris pastinacæ, sed multò maioribus, caulibus rotundis, cauis, quaternos

APIVM Siluest. Dodon.



ternos quinóſve pedes longis, ima parte ex fuſco rubentibus, in quorum ſummitate rotundæ vmbellæ flores albos gerunt, deinde ſemen cōpreſſum, hirsutum, anetho, haud diſſimile, ſed maius: radix in duas tréſve alias ſecatur radices, non in altum ſcendentes, ſed obliquè huc il-luc ſparſas, calefaciendi vi præditas, & linguam vrentes. Ex tota herba, tam ex caulibus quàm ex foliis ſuccus albus manat non aliter quàm ex tithymalis. Thyſſelium fortasſe Plinij. Thyſſe-lum eſt, inquit, non diſſimile Apio: huius radix commanducata purgat capitis pituitas. Silaus Plinij quibuſdam, perperam Meum Batauis & Antuerpienſibus. Ελφοſέλινον, paluſtre apium, Gazæ paludapiū, Officinis Apiū, Mauritanis *Aſſilis*, Italis *Apio paluſtre*, Germanis *Epfſich*, ſeu *Eppich*, Hiſpanis *Perexil d'agua*, Gallis *Perſil de marez*, *Ache*, *Api*. Satiuo grandius, ſed ingrati-tum ſaporis, tum odoris, in aquoſis locis naſci-tur. ὀρεοſέλινον, Latine etiam Oreofelinum, & Apium Montanum, Gallicè *Perſil de montagne*. Id, inquit Dioſcor. Caulis eſt vnus dodrantalis

Thyſſeliū
Plinij
Lib. 25. c. 11.

Forma.

Oreofeli-
num.
Lib. 3. c. 64.

Forma.


extenui radice. Circa ipſum ſunt ramuli & capitula cicutæ ſimilia, multò tamen tenuiora, in quibus ſemen oblongum, acre, tenue, odoratum, cumino ſimile. Naſcitur in petroſis & montibus. Quod ex herbariorum ſententia hîc depinximus, radice crasſa, longa extrinſecus nigra, intus candida, acri, odorata, aromatica, fo-liorum denſa coma circa radicem humi iacentium, Apio hortenſi ſimilium, ſed

APIVM Paluſtre, Match.



APIVM Paluſtre, Fuchſ.



APIVM Montanum, Dalech.*PETROSELINVM**Dalechampij.*Petroseli-
num.

Lib.3.c.64.

Forma.

latiorem iucundè olentium in pediculis infernè rubentibus: caule cubito altiore, è medio foliorum ambitu profiliente, ferulaceo: Flore in umbella candido, semine Apij, acri, odorato & amaro. Prouenit in asperis, saxosis, lapidosis, apricis, nonnunquam etiam ex saxorum rimis emicat. Floret Iulio mense. Sed cum in hac planta quædam Dioscoridis historiæ repugnent, nihilominus herbarij, vt diximus, plantam istam Oreoselinum, & horum quidam Oreoselinum maius appellant: aiuntq; deprauatos esse Dioscor. codices, præsertim vbi legitur, *περὶ δὲ αἴσον κλωνία ἢ κεφάλια μηκωνίω παρεμπερῆ*, in aliis *κωνίω παρεμπερῆ*. Nam cum Theophrastus & Plinius scribant, vt dicemus, Apio montano inesse folia Cicutæ, cumq; nihil edat capitulis papaueris simile, perspicuū est legendum esse non *κεφάλια μηκωνίω*, sed καὶ φύλλα κωνίω παρεμπερῆ, idest, & folia cicutæ similia. Alij aliud Oreoselinū proponunt in Sequanorum montibus ad pratorum saxosos margines nascens, caule & foliis Cicutæ, nunc humile, nunc procerum pro loci natura: radice tenui, candida. Flore in umbella albo, semine oblongo, nigro, acri, odorato, Cymino simili. Parisienses pro Oreoselino plantam mōstrant raram & nobilem in sabuloso Surenai montis vertice, nec vsquam alibi nascentem, radice longa, crassa, acri, odorata, sapore & odore Empetro nostro simillimo, coma Apij, humi procumbente, densa: flore in umbella candido, semine acri, & odoris suauis. *Πετροσέλινον*, & *πετροσέλινον μακεδονικόν*, Latine Petroselinum & Petrapium, & Apium saxatile, & Petroselinum Macedonicum, quod copiosius in Macedonia proueniat, in præruptis locis, ait Dioscorides, semine ammij, odoratiore, acri & aromatico. Verū id Petroselinum esse putat Dalechampsius, quod hīc depinximus, in saxosis tumulis prope Gratianopolim nascens, atque adeò rupibus ipsis paucula terra operis hærens, qua sol flagrantissimus illidit radios, radice breui, parum fibrata, nigra, nec, quod mirum est, acri, nec odorata, supernè festucis comata, folio Apij hortensis, non illo quidē latiusculo, coriandro simili, prope radicē luxuriante, sed Altero illo tenuiore, anetho propemodū simili, summis Apij caulibus & ramis conspicuo ac exili, cum teritur Apij hortensis odorem sic spirare, vt si quis clausis oculis naribus admoueat, apium hortense olfactu esse iudicet, flore in umbella non prorsus candido, sed nonihil rubente, semine apij hortensis, primum

mum subrubro, deinde nigrescente, si gustes, amaro initio, at cum plusculò manditur acri & valde vrente, odorato quod Galenus in hoc semine requirit. Aliud

PETROSEL. Macedon.
Matthiol.



HIPPOSELINUM, Matth.
sive Leuisticum vulgare.



sed paulum quid vtrinque retusa in basi, medicato gustu, acri, ad Smyrnum accedente, radix est satis crassa longaque, hortensi magis succosa, vesca, tenerior quam

Petroselinum Macedonicum depinxit Matthiolus, quod iam in quibusdam Italiae hortis colitur petito ex Macedonia semine, foliisque

exit apio palustri similibus, sed minoribus, caule crasso, ramoso, alis frequentibus cauo, floribus albis, semine hortensi apio simili, odorato & amarescente, *ἵπποσέλινον* Græcis, Latinis O-

lufatrum nominatur, Gazæ Equapium, à magnitudine sic dictum. Est enim maius Apio hortensi & candidius, inquit Diosco. caule cauo, alto, tenero, veluti lineas habente, foliis la-

tioribus, subpuniceis, in quibus est coma velut roris marini, flore plena, in corymbos priusquam deflorescat, compacta. Semine est nigrum, oblongum, acre, solidum, aromaticum: radix

odorata, candida, non crassa, ori grata (*εὐσχομος* enim legitur in vulgatis exemplaribus, in antiquo *εὐσχομαχος*, id est, ventriculo grata) Nas-

citur in locis vmbrosis, & iuxta paludes. Matthiolus pro Hipposelino monstrat Leuisticum vulgare hic depictum, cum nullam aliam plantam norit quæ legitimum referat, & Brassauolam reprehendit, qui herbam Maceronem Italis vulgo vocatam Hipposelinum esse falso existimat:

fortasse, inquit, peruersa Marcelli interpretatione deceptus, qui præter Dioscoridis sententiam hipposelino radicem intus candidam, foris nigram reddidit, cum tamen in Dioscoride nulla nigri coloris fiat mentio. Eius Marcelli lapsus in causa esse potuit, quod apud Theophrastum legerit Hipposelini radicem Raphani modo crassam esse, sed nigram, cum Theophrastus illic non Dioscoridis Hipposelinum, sed Smyrnum potius descripserit, ut dicemus. At non solum Marcellus & Brassauola, sed Dodonaus, Pena & plerique alij herbarij plantam, quam recentiores Petroselinum Alexandrinum, Officina non sine errore Petroselinum Macedonicum vocant, Galli *Alexandre*, Hipposelinum verum esse asserunt. Caules edit alasve multas statim à radice, folia Apij palustris, sed maiora, rotundiora ex atro virentia. Caulis est striatus, bicubitalis, cõcauus: Apij umbellæ corymborum instar pendulæ, maturitatē affectæ, onustæ semine copioso, atro, vnde illi Olufatri nomen, pleno, grani, semisphærica figura,

In cap. 64. lib. 3.

Hipposelinum.

Ibid. *Forma.*

In cap. 64. lib. 3.

Lib. 5. c. 45. In Ad. fol. 315.

suapte sponte nato, foris color pullus, intus albus, odora, gustu grato & nonnihil medicato: non solum Italis, sed & Gallis, Germanis, Anglis avidissimè in acetariis expetita, quæ etiamnum tempore Dioscoridis cruda coctave edebatur. Quamobrem à sedulis olitoribus passim in hortis colitur. Leuistici nullus usus in acetariis, non est enim herba oleracea, sed ingratisima & acerrima gustu: semen multum diuersum sapore, odore, & tota umbella. Quatum ad Marcelli interpretationem attinet, ea peruersa existimanda non est, si radices foris nigras, intus albas in

Lib. 7. hist.
cap. 4.

quopiam exemplari à vulgaribus diuerso legit & scripsit. Theophrastus apij genera distinxit his verbis. τῶν δὲ σελίνων καὶ ἐν τοῖς φύλλοις, καὶ ἐν τοῖς καυλοῖς αἱ διαφοραὶ. τὸ μὲν γὰρ πυκνὸν ἔσται, καὶ διασπύ τὸ φύλλον ἔχει. τὰ δὲ μανώτερον καὶ παλαιοτέρων, καυλὸν δὲ μείζων. τούτων δὲ πάλιν τὰ μὲν λευκὸν καυλὰ, τὰ δὲ πορφυρόκαυλα, ἢ ποικιλόκαυλα. τὸ δὲ ὅλον

Lib. 19. c. 8.

ἅπαν τὸ τοιοῦτον ἐμφέρειται τῷ ἀγρίῳ. Quæ Plinius reddidit his verbis. Et satiui autem differentia in folio denso, crispo, aut rariore & læuiore, item caule crassiore & te-

Lib. 7. hist.
cap. 6.

nuiore, & caulis aliorum candidus est, aliorum purpureus, aliorum varius. Idem Theophrastus aliquanto post, τὸ δὲ ἵπποσελίνον καὶ ἐλεοσελίνον, καὶ ὄρεοσελίνον, καὶ πρὸς ἐκαστὴν διαφορὰν ἔχει, καὶ πρὸς τὸ ἥμερον. τὸ μὲν ὃ ἐλεοσελίνον τὸ παρὰ τὰς ὀχέους, ἔν τῳ τοῖς ἔλεσι φυόμενον, μονόφυλλον δὲ, ὃ διασπύ γίνεται, πρὸς ἐμφέρειται δὲ τῷ σελίνῳ καὶ τῇ ὁσμῇ, καὶ τῷ καυλῷ, ἔν τῳ σχήματι. τὸ δὲ ἵπποσελίνον φύλλον μὲν ἐμφέρειται τῷ ἐλεοσελίνῳ, διασπύ δὲ, καὶ μεγαλόκαυλον, ἔν τῳ ρίζαν ὥσπερ ῥαφανὶς ἔχει τὸ πάχος, μέλαιναν. μέλας γὰρ καὶ ὁ καρπὸς, μέγεθος δὲ μείζον ὁρόβου. τὸ δὲ ὄρεοσελίνον μείζους ἔτι διαφορὰς ἔχει. τὸ μὲν γὰρ φύλλον ἔοικε κωνίῳ, ρίζα δὲ λεπτή, τὸν δὲ καυλὸν ἔχει καρθὰ περ ἄνηθον, πλὴν ἐλάτῳ. διδῶσι δὲ

Lib. 19. c. 8.

τοῦτον ἐν ὀνίῳ ἀντηρῶ, τῶν γυναικείων χάριν. Ex quibus Plinius hæc mutuatus est. Id quod sponte in humidis nascitur, eleoselinum vocatur, vno folio, nec hirsuto. Rursus in siccis hipposelinum, pluribus foliis, simile eleoselino. Tertium est oreoselinum, cicutæ foliis, radice tenui, semine anethi, minutiore tantum. In quibus error est in Plinio, qui de eleoselino μονόφυλλον pro μονοφύλλῳ legit, atque ita deceptus vno folio pro raro folio conuertit. Deinde falsò legitur in Theophrasto de oreoselino καυλὸν pro καρπὸν. Non enim caulis, sed semen anethi semini simile est, veluti Plinius rectè reddidit, semine anethi. Ex utroque verò perspicuum est in Dioscoride de oreoselino tractante legendum καὶ φύλλα κωνίῳ ἐμπερῇ, pro κεφάλια μηκωνίῳ ἐμπερῇ id est, folia cicutæ similia, pro capitula papaueri similia, ut iam diximus. Præterea Theophrastus ex hipposelini radice raphani modo crassa, nigra, & succo eius myrrhæ simili apertè docet, id se cum smyrnio, quod etiam monuit Dioscorides, confudisse, quod etiamnum hodie Græci faciunt. Nunc singu-

Vires &

Temper.

Lib. 3. c. 64.

lorum vires expendendæ. Apij hortensis herba, inquit Diosco. ad eadem ad quæ coriandrum conuenit: ad inflammationes oculorum cum pane aut cum polentæ polline illinitur: æstum stomachi mitigat: mammas ex concreto lacte induratas laxat: siue crudum, siue coctum edatur vrinas ciet. Dococtum ipsius radicis que potum letalibus medicamentis resistit, vomitus mouet, aluum sistit. Semen vehementius vrinam ciet, contra venenatarum bestiarum morsus, & epotum lithargyrum auxiliatur, flatus dissoluit. Admiscetur commodè medicamentis dolorem sedantibus, & thoracis & tussis remediis. Galenus verò, Apium usque adeò calidum est, inquit, ut & vrinas & menses ciet: flatus quoque, discutit, & magis semen quàm herba ipsa. Quæ siue de apio nostro hortensi vulgariq; siue de apio palustri intellecta, si vera sunt, ut certè vera esse experientia certò comprobatur, qui apium calidum ad eadem ad quæ coriandrum conuenit, quod idem Dioscorides refrigerandi vi præditum esse scripsit? Qui calidum inflammationibus oculorum proderit? æstuantis stomacho, mammis lacte turgentibus? Hunc nodum sic soluit Petrus Pe. esse præsidia non parum multa, quæ contrariis aut valdè diuersis polleant facultatibus, & tamen eidem medeantur affectui eiusdem incrementi & modi. Id in capitis fractu

fo. 314. &
315.

fracturis & vulneribus, inquit, facile de Galeni Celsiq; lectione, & medicamento-
rum collatione discas, quorum hic siccantibus frigidis, ille verò calidis digeren-
tibus, etiàque humectantibus fœliciter vsi fuere. Testium tumoribus viola-
ceo farinis excepto leguminum quidam, alij verò Creteni feruido vino excepto
cumini puluere medentur. Sic nihil mirum coriandri succo refrigerante, & paul-
lum quid adstringente partim dissipari, partim repelli materiam eiusque incre-
mentum, vel apio calfaciente digerentēque in habitum per poros laxatos diffuari.
Galenus in Consilio pro puero epileptico apium probat & laudat. Contra Aui-
cenna tanquam venenum fugiendum esse suadet. Aiunt enim Arabes tum oculis,
tum epilepticis noxium esse, quod eius vsus epilepsiæ paroxysmum inuehat. Sed
Galenus apium, nostrum est hortense & vulgare petroselinum, incidendi vi prædi-
tum, quod in epilepsia tuto dari potest. Auicennæ verò & caterorum Maurita-
norum apium, id est, quod Officinis hodie quoque apium dicitur, Græcis Eleose-
linum, de quo mox. Apio, inquit Plinius, gratia vulgo est, namque rami largis
portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Lib. 20. c. 11.
Præterea oculis illitum cum melle, ita vt subinde foueantur feruenti succo deco-
cti, aliisque membrorum epiphoris per se tritum, aut cum pane vel polenta im-
positum mirè auxiliatur. Pisces quoque si ægrotent in piscinis, apio viridi recreā-
tur. Galenus alibi, familiarissimum, iucundum, & stomacho gratum apium esse Lib. 2. Ali.
scribit. Hippocrates, Apium, inquit, magis vrinam ciet quàm aluum mouet: & Lib. 2. de
radices magis quàm ipsum, aluum mouent. Idem in libro de internis affectionib. Diatr.
vbi à pituita in aquam intercutem transitus fit, ex oleribus raphanorum & apij
vsum præscribit. Ex quibus colligere licet apium hîc intelligi vulgare nostrum
petroselinum hortense. Videmus enim etiam hoc tempore eius folia ramulós-
que per iura tum carniū, tum piscium innatare, aqua butyróque incoqui, & iu-
sculum iucundum inde effici, sicuti idem Plinius apium suauiores aquas potui in-
coctum præstare dicit. Eleoselinum id est, paludapium, siue apium palustre, ad ea-
dem ad quæ apium efficax est, inquit Dioscorides, sed est ingrati tum saporis tum Lib. 20. c. 11.
odoris, vt si quod fuerit apium Chrisippi, Dionysiiq; medicorum consiliis à cibis Petr. Pe.
abdicatum, quia propensius paroxysmum epilepticum excitet, visus quoque cla- Pl. lib. 20.
ritati sit inimicum, istud palustre apium sit meritò censendum. Est tamen efficax cap. 11.
valde, ideóque Arabibus & pharmacopœis nonnullis vsitatus in syrupis ad ob-
structiones tollendas præscribi solitis vt in Byssantino, & quinque radicum. Pli- Lib. 20. c. 11.
nius, Eleoselino, inquit, vis priuata contra araneos. Oreaselinum vrinam ciet, au-
ctore Dioscoride, semine ac radice ex vino potis: menses trahit. Miscetur antido- Lib. 3. c. 64.
tis & medicamentis vrinam cientibus & excalfactoriis. Petroselinum eodem au-
ctore, vrinam ciet & menstrua: contra stomachi & coli inflationes & tormina
prodest: laterum, renum & vesicæ doloribus in potu subuenit. Admiscetur anti-
dotis vrinam cientibus. Petroselini semen, inquit Galenus, maximè vsui est, tum Lib. 8. sim.
tota etiam herba vnà cum radice similem, sed imbecillio rem facultatem fortiat. Ibid.
Est autem gustu acre cum amaritudine, sic & facultate calidum vnà cum inciden-
di effectū. Hinc menses & vrinas affatim prouocat, flatus extinguit, fuerit itaque
& ipsum tertij ordinis tum excalfacientium, tum desiccantium. Hipposelinum,
vt scribit Dioscorides, oleris modo editur, vt apium radix tum cruda tum cocta
estur, folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparan-
tur, crudaque muria condiuntur. Vim ducendi menses semen habet in mulso
potum, calfacit frigore prehensos tum potum tum illitum: vrinæ stillicidio auxi-
liatur. Radix eadem præstat. Plinius, Olusatrum, inquit, quod hipposelinum vo- Lib. 20. c. 11.
cant, aduersatur scorpionibus. Poto semine torminibus interaneis medetur: itē-
que difficultatibus vrinæ semen eius decoctum ex mulso potum. Radix eius in vi-
no deco

Lib.7. hist.
cap.6.
Lib.19. c.8.

no decocta calculos pellit, & lumborum ac lateris dolores. Canis rabiosi morfibz potum & illitum medetur. Succus eius argentes calfacit potu. Hæc ferè omnia ex Dioscoride qui quos *ῥιγοῦντας* dixit, ille argentes conuertit, id est, aut frigore aut rigore prehensos. Nam de vtrisque intelligi posse videtur, tum de his qui ab externi aëris frigidi occurfu frigus contraxerunt, tum de iis qui rigorem febres præcedentem patiuntur. His addit Theophrastus, *γίνεται ὃ καὶ τὸ δάκρυον ἐξ αὐτῶ ὅμοιον τῇ μύρρῳ. οἱ δὲ φασὶν ὅλως μύρραν*. Quæ Plinius sic. Sed præcipuè olusarium myrrhæ naturæ est, hipposelinū Græci vocant, alij smyrnium. E' lacryma caudicis sui nascitur, feritur & radice. Succum eius qui colligunt, myrrhæ saporem habere dicunt. Auctorque est Theophrastus myrrha sata natum. Ex quibus colligere licet Theophrasto hipposelinum dici, quod ab aliis smyrnium vocatur.

S M Y R N I V M.

C A P. V I I I.

Nonina



Lib.3. c.64.

Lib.3. c.65.

Forma.

Locus.

Lib.27. c.13.

Lib.19. c.12.

Cap.290.
hist.


In cap. 65.
lib.3

Μύρριον Græcis, Smyrnium Latinis dicitur, in Cilicia petroselinum, & quibusdam hipposelinum agreste auctore Galeno. Smyrnium dictum est, quod semini idem sit odor qui myrrhæ, vel radici, vt scribit Plinius. Monuit Dioscorides hipposelinum à quibusdam Smyrnium vocari, quum tamen aliud sit quod propriè Smyrnium dicitur, quod ex descriptionum collatione cognosci potest. Smyrnium, inquit, caulem gerit apio similem, propagines multas habentem, folia latiora, ad terram confecta, subpinguia, robusta, cum acrimonia odorata, medicatæque, & colore sublutea, umbellam in caule qualis anetho inest, semen rotundum, brassicæ simile, nigrum, acre, myrrhæ sapore, vt alterum pro altero vsurpetur. Radix est acris, odorata, tenera, succosa, fauces mordens, cortice extrinsecus nigro, intus cum virore pallido, aut subalbicante. Nascitur in petrosi locis, siccis collibus & limitibus agrorum. Plinius idem Smyrnium describens in paucis à Dioscoride variat. Smyrnium, inquit, caulem habet apij, folia latiora, & maximè circa stolones multos, quorum à sinu exiliunt pinguia, ad terram infra-cta, odore medicato, & cum quadam acrimonia iucundo, colore in luteum languescente, capitibus caulium orbiculatis vt anethi, semine rotundo, nigro, quod arefcit incipiente æstate. Radix quoque odorata, gustu acri mordet, succosa, mollis, cortex eius foris niger, intus pallidus, odor myrrhæ habet qualitatem, vnde & nomen. Nascitur in saxosis collibus & in terrenis. Idem alibi, & Smyrnium olus feritur iisdem locis, myrrhæque radice resipit. Hæc ille de Smyrnio propriè dicto, qui tamen alibi, vt ostendimus, hipposelino, quod & impropriè Smyrnium appellatur, tribuit myrrhæ saporem, atque cum illo Smyrnium confundit Theophrastum secutus. Hæc quamuis dilucidæ satis delineationes, non æquè omnibus notum Smyrnium reddiderunt. Fuchsius Ruellium secutus Smyrnium eam herbam esse putat, quam hodie Leuisticum nominant, Gallica rura *Leueche*. Matthiolum contendit Smyrnium ei herbæ simillimum esse, quæ in Hetruria vulgò vocatur *Macerone*, quod caule sit apij, stolonibus multis referto, foliis latioribus, subpinguibus, robustis, ad terram versis, odore medicato, cum quadam acrimonia iucundo, colore in luteum languescente. Præterea in caulium summitatibus umbellam gerit anethi modo, semine brassicæ, maiore, oblongo tamen, nigro, acri, odore myrrham referente. Denique radice nititur odorata, acri, succosa, molli, cortice exteriori nigricante, interiore parte ex albo virescente. In quibus etsi Maceronis semen brassicæ semini compararit, tamen iis respondens qui similitudinem hanc reprehendere possent, quod illius semen rotundum non sit veluti brassicæ, ait, cum cætera omnes notæ illi respondeant, facile in seminis delineatione mendum subesse potuisse, vel quod non in rotunditate, sed in alio quopiam huic semini.



femini cum illo intercedat similitudo. Aliis, inquit Pena iam in procinctu est
 smyrnij veri cognitio, & ab hipposelino & leuistico distinctio, quibus nota sit illa
 planta iamdiu in multis Galliae & Belgij hortis enata, cuius radix crassiuscula, fo-
 ris nigricans, intus alba: folia ima ampla & multipliciter dissecta, reliqua rotunda

SMYRNIVM Creticum,
Matthiol.



& caules circumambientia, ut ab eis traiecta,
 in perfoliata herba cernantur, umbellae ane-
 thi, aut perfoliatae: flores ex luteo herbacei pal-
 lentes, semen fuscum, subrotundum raphano-
 minus, brassicae par & simile, prorsum myr-
 rham spirans, acre. Hanc plantam sic expresse-
 runt Dodonaeus & Lobellius. Matthiolus Smyr-
 nium Creticum depinxit, quod ab aliis accepit,
 sed est eius pictura à superiore satis diuersa.
 Hoc ita describit. Fert folia macerone crassio-
 ra, quina ex singulis pediculis, per ambitum fer-
 rata, altera parte ima ab exortu mutila, longè
 autem diuersa in caule: sunt enim rotunda, & à
 caule ramisq; in quibus nascuntur, perfoliatae
 modo transguntur, nullis in ambitu denti-
 culis. Caulem edit firmum, striatum, & subter
 folia geniculatū, è quo in latere quo folia per-
 forantur ramuli exeunt, ex singulis foliorum
 finibus, striati. Umbellam in caulium ramulo-
 rumque summitatibus gerit, racematim disse-
 ctam, floribus albicantibus, semine haud bras-
 sicae simili, sed rotundo, anguloso, & in acutum
 desinente, colore ex flauo nigricante, sapore
 acuto

In cap. 65.
 lib. 3.

Matth in
 cac. 65. lib. 3

Vires
Temper
Lib. 3. c. 65

Lib. 27. c. 13

Lib. 2. Ali.

Lib. 8. sim.

acuto & amariusculo, pediculis longis striatisq;. Quare iudicat smyrniū suum multò propius ad smyrnij Dioscoridis historiam accedere. Veri smyrnij radix, herba & semen vim habent calfaciendi, inquit Dioscorides, olerum modo comeduntur folia muria macerata, & aluum sistunt, radix serpentium moribus pota succurrit. Tusses & orthopnœas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Illita recentia œdemata, phlegmonas, & duritias discutit, & vulnera ad cicatricem perducit, feruefacta & subdita abortus facit. Semen eius lienis, renum & vesicę vitiis prodest, menses & secundas pellit. Commodè ischiadicis cum vino bibitur, inflationes stomachi mitigat: sudores & ructus ciet. Potum peculiariter hydropicis, & febrium circuitibus prodest. Eadem & quædam alia huic tribuit Plinius his verbis. Vis eius calfacere, extenuare, vrinam & menses cient folia & radix, semen aluum sistit, radix collectiones & suppurationes non veteres, item duritias discutit illita. Prodest & contra phalangia & serpentes, admixto cachry, aut polio, aut melissophyllo in vino pota, sed particulatim, quoniam vniuersa vomitionem mouet, qua de causa aliquando cum ruta datur. Medetur tussi & orthopnœæ semen vel radix: item thoracis, aut lienis, aut renum, aut vesicę vitiis. Radix autem ruptis conuulsis. Partus quoque adiuuat, & secundas pellit. Datur & ischiadicis cum crethmo in vino. Sudores ciet & ructus: ideo inflationem stomachi discutit, vulnera ad cicatricem perducit. Exprimitur & succus radicis, utilis fœminis, & thoracis præcordiorumque desideriis: calfacit enim, purgat, & concoquit. Semen peculiariter hydropicis datur potu, quibus & succus illinitur, & malagmate è cortice arido. Et ad obsonia vtuntur cum mulso & oleo, & garo, maximè in elixis carnibus. Quidam, Plinium putant in exemplari Græco vnde hæc sumpsit pro ἐπιθύματα legisse ἐπιθυμήματα, id est, remedia admouenda thoraci & præcordiis. Galenus de Smyrnio scripsit vt alimento, & vt medicamento. Smyrnium, inquit, non est insuaue, ideoque Romæ plurimùm vanit. Multò autem acrius est & calidius quàm apium, quin & odorati quippiam habet. Quapropter efficacius vrinam, quàm apium, hipposelinum, fium, & mulieribus menses mouet. Veris tempore caulem producit, qui crudus edendo est haud aliter quàm folia, quæ sola per hyemem inhærent plantæ nondum caulem habenti, sicut neque tum apium habet. Postea verò caule accedente tota planta iucundior redditur, siue quis crudam ipsam, siue coctam mandat, siue ex oleo & garo, siue acetum, siue vinum velit adiicere. Et alio in loco. Smyrnium quidam hipposelinum agreste cognominant. Ex eodem genere & ipsum cum apio est, & petroselino, apio quidem validius, petroselino autem imbecillius. Menses itaque & vrinas mouet, calidum & ficcum tertio ordine. Cilices in Amano monte natum, Petroselinum vocant, minus verò petroselino & smyrnio (nimirum hipposelino, quod & Smyrnium vocant:) acre est. Proinde & vlceribus imponi potest, quia sine molestia desiccet. Sed & digerere quæ indurata sunt potest. Reliqua vis eius apio & petroselino similis est, quare & semine eius vtimur ad menses, vrinas, & asthmata.

S I S O N.

C A P. I X.

Nomina
Lib. 3. c. 55.
Forma.



Q UOD Græcis σίσων, Latinis quoque Sison dicitur, Hippocrates vocat Sinona. Scribit Dioscorides semen esse paruum in Syria proueniens apio simile, oblongum nigrum, feruens. Huius seminis plantam docti quidam herbarij iudicant esse eam, quæ hîc depingitur, & à Dodonæo petroselini Macedonici nomine describitur, ab aliis petroselinum exterum nuncupata. Foliis est longiusculis, in plura scissis, profundius incisis lateribus, & toto ambitu crenatis, caulibus gracilibus bipedalibus, in quibus umbellæ paruæ albicant:

*SISON seu Petroselinum
Macedonicum Dodonai.*



albicant: semen est fuscum hortensi apio simili, suauius tamen, odore magis aromatico & feruidiore, radix gracilis est, & multum fibrata. Locis asperis, saxosis, & incultis gaudet. Seritur etiam in hortis, in quibus mense Iulio floret, Augusto semē profert. Bibitur ad splenis vitia, inquit Dioscor. urinae difficultatem, & ad suppressos menses. Utuntur ipso incolae pro condimento, cum cucurbita cocta & aceto sumentes. Habet autem velut granula multa in cacuminibus. Eadem tradit Galenus. Sison, alias Sinon calidus, & subamarus gustu est, quare urinam mouet & concoquit, mensesque prouocat omnesque viscerum obstructions referat. Cornarij vetus Plinianus codex, Sinon habet, vbi in vulgatis simul legitur, & quod sequitur ad Sinon pertinet, smyrnio attribuitur. Locus is est. Sinon concoctiones facit, sapore similima piperi. Eadem in dolore stomachi efficax. Quod sapore piperis esse ait, respondet voci πυρωτικόν, quam Diosco. usurpat, feruidum esse scribens.

Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 55.

Vires &

Temper.

Lib. 8. sim.

Embl. 53.

lib 3.

Lib. 27. c. 13

GINGIDIVM.

CAP. X.



GRAECIS γκινδίων, & λεπίδιον auctore Dioscoride, Latinis Gingidiū. Nascitur copiosissima in Cilicia & Syria, inquit ille, herbula siluestri pastinacae similis, sed tenuior & amarior (Graecè legitur λεπίδιον ὃ γὰρ πυκνότερον, id est, tenuior densiorque, aut solidior. Cui lectioni retragantur interpretes omnes, qui πικρότερον, id est, amarior conuerterunt, Galenum & Plinium secuti) radice subrotunda, amarescere. Editur crudum & coctū, & sale asseruatum. Est autem stomacho vtile: ciet urinam, decoctum ipsius ex vino potum vesicae prodest. Plinius non multò clarius id designauit, Syria in hortis operosissima, indeque proverbium Graecis, Multa Syrorum olera. Simillimam staphylino herbam serit, quam alij gingidium vocant, tenuius tantum & amarius eiusdemque effectus. Estur crudum coctumque stomachi magna vtilitate. Siccatur enim exactos omnes eius humores. Galenus, Plurimum, inquit, in Syria Gingidium nascitur & editur, simile apud nos scandisci. Est autem stomacho valde commodum, siue crudum, siue feruefactum edere ipsum velis, longiorem autem cocturam non sustinet. Quidam edunt ipsum cum oleo & garo. Quidam etiam vinum aut acetum addunt, & multò magis commodum est, & auersantibus cibum appetentiam facit, si cum aceto edatur. Est satis clarum hanc herbulam, medicamentum potius esse quam alimentum. Nam & adstringendi vi, & amaritudine manifesta non modica participat. De hoc itaque vt medicamento rursus agit his verbis. Gingidium quemadmodum gustu amaritudine & adstrictione participat, ita temperamento caliditate & frigiditate. Iuxta ambas autem qualitates siccatur, & stomacho commodum est, eo quod non pauca adstrictione participat. Caliditatem equidem non ita manifestam possidet, siccatur autem ordine secundo. Gingidium igitur ex Syria venit in Graeciam & Latium, Dioscoridis, Galeni, Pauli; atate notissimū olus, nunc vix vlli notum. Ruellius gingidium plantam eam esse censet, quae vulgò

Nomina

Lib. 2. c. 131.

Forma.

Lib. 20. c. 5.

Lib. 2. Ali.

Lib. 6. sim.

Lib. 2. c. 70.



Ca 78. hist.
In cap 131.
lib. 2.

Forma.

Chærephyllon, Gallis *Cerfeuil*, Germanis *Kerfel*, & *Kerfelkraut* dicitur: Fuchsius eandem pro *Gingidio* pinxit & descripsit. Quibus Matthiolus refragatur, legitimūque *Gingidiū* ex Syria allatum, & à Iacob. Anton. Cortuso ad se missum depinxit, descripsitq; his verbis. *Gingidium* *pastinacæ* siluestri haud ab simile est, amarius ta-

VISNAGA, *Gingidium*
Matthiol.




Lib. 5 c. 51.

men, caule rotundo, ramoso, sesquipedali, striato, subnigricante, geniculatoque: umbella in cacumine alba, minoribus circumquaque comantibus foliis, è floribus semen prodit, quo maturecente umbellæ in sese contrahuntur; vt in *pastinaca*, & tactu glutinosæ sentiuntur, radicem habet candicantem, palmari longitudine, subamaro sapore. Ex Syria in Italiam aduectum semen iam in hortis seritur. Lobellius aliud *Gingidium* foliis *Bauciæ* *Syriacum* monstravit. Hæc dodrantalis planta, inquit, Venetias Alepo Syriæ missa Sequini Martinelli opera: flos illi albus & sapor *Gingidij*, folia verò *Bauciæ* vel *Elaphobosci* minora. Tradit Matthiolus non deesse qui velint plantam *Visnagam* appellatam, vel legitimū esse *Gingidium*, in qua sententiâ sunt *Dodonæus* & *Anguillara*, vel eius alterum genus, quod folia quadantenus magis *Pastinacam* referre videantur. Illorum opinionem Matthiolus improbat, quod *Visnaga* planta sit *pastinaca* longè maior, & grandes robustasque gerat umbellas, adeò vt pediculi ex quibus constat *dentiscalpij* iam multis in vsum venerint.

VISNAGA Gingidium,
Dodonai.

CEROFOLIUM Gingid.
multorum, Matth.



nerint. Quare Visnagam potius maiorem pastinacam siluestrem vocandam esse censet, quod eam non solum notis omnibus refert, sed etiam viribus. Hanc Pena In Ad. fol. vidisse se affirmat multis Italiae locis, praesertim via qua itur Pæsaro Roman, & 324. Aquitaniae Ageni secus Garumnam, & Burdegalam, tam bene congruentem descriptioni quam ceteras. Nam de gingidij umbella nulla in Dioscoride mentio. Foliis quidem caulibus geniculatis, floribus, & reliqua facie silvestri pastinacae similis est Visnaga: sed foliis tenerioribus, densioribus, minutius dissectis, caulibus gracilioribus & laevioribus, neque tota hirsuta quemadmodum pastinaca silvestris, sed laevis & nuda, amaro gustu, flosculi in umbellis candicant velut in pastinaca silvestri semine maturo, adeo rigida & lignea fit umbella, ut dentiscalpiis apta sit, radix candida est & amara. Ceterum cum Cerofolium nostrum in ciborum usum veniat, & suas quoque in medicina vires habeat, gingidiique species videatur, de eo hic differendum. Planta est nemini non nota, passim in hortis nascens, fragilis ac tenera, senis ferè semper ex singulis pediculis emergentibus foliis, vulgaris petroselini modo, in ambitu incisus, caulibus sesquicubitalibus, pinguibus, subrufescentibus, inanibus, geniculatis: umbellam in summo caule gerit albis floribus ornatam, è quibus tenuia rectaque oriuntur cornicula, multa ex vno pediculo prodeuntia, pilosa, rufescentia, in cacumine aculeata, in quibus semè longiusculum concluditur pullo colore, radix illi brevis, in multas diuaticata fibras. Tota planta dulcis est & odorata, acriusculo quodam sapore vix sensili, quò fit ut aliis oleribus addita, ea gustui gratiora reddat. Plinius. Kursus alio comitatu, aequinoctio autumnii feruntur coriandrum, anethum, atriplex, malua, lapathum, chærephyllum, quod paderota Græci vocant. Nam quæ sequuntur, & acerrimum sapore, &c. ad sinapi pertinent. Sed hoc Plinij Chærephyllum à Cerofolio nostro planè diuersum est. Matth. lbi. Lib. 19. c. 8

Nomina

Lib. 2. c. 132.

Vfus.

Lib. 8. sim.

Lib. 2. Ali.

Lib. 22. c. 22

Lib. 21. c. 15.

Lib. 7. hist.
cap. 8.

Lib. 5. c. 52.



Κάνδιξ Græcis, Scandix Latinis, siluestre olus est, inquit Dioscorides, subacre, amarum, in cibi vsum veniens, crudum & coctum si edatur, ventri & stomacho vtile. Dococtum in potu, vesicæ, renibus, & iocinori prodest. Similiter Galenus, Scandix inquit, ex agrestium olerum genere est, subacre, & amarum, adeo vt in siccando & excalfaciendo, aut secundi sit ordinis intensi, aut tertij incipientis. Vrinā valenter ciet, & viscera obstructione liberat, ex dictis qualitatibus constans. Alio in loco gingidium Scādici simile esse dixit. Vileolus Scandicem esse Plinius ostendit his verbis. Scandix quoque in olerē siluestri à Græcis ponitur, vt Opion & Erasistratus tradunt. Item decocta aluum sistit, semine singultus confestim ex aceto sedat. Illinitur ambustis, vrinā ciet. Decoctæ succus prodest stomacho, iocinori, renibus, vesicæ. Hæc est quam Aristophanes Euripidi poëtæ obiicit ioculariter, matrem eius ne olus quidem legitimum venditasse, sed Scandicem. Eiusdem meminit. Reliqua vulgarium in cibo apud eos herbarum nomina Chondrylla, Hypochæris, Caucahis, Antriscum, Scandix, quæ ab aliis Tragopogon vocatur. Qui locus mancus est: legendum enim, Scandix, quæ ab aliis Tragopogon vocatur, &c. Theophrastus Scandicem inter ἐπιγυθόκαυλα, id est, ea quibus caulis per humum prorepat, enumerat, sed vulgata exemplaria habent ἐπεγυθόκαυλα, & Theodorus annicaules conuertit. Locus is est. κοινή ὅ διαφορὰ πάντων τῶν ποωδῶν ἢ τοιάδε. τὰ μὲν γάρ ἐστιν ὀρθόκαυλα, καὶ νευρόκαυλα, τὰ δὲ ἐπιγυθόκαυλα, καὶ ὅπερ μελάγχη, σκάνδιξ, σίκυς ἀγροῦ. Id est, Communis omniū herbarum differentia est, quod aliæ recticaules sunt & neruicaules, aliis caulis per humum repit, vt maluæ, scandici, cucumeri siluestri. Hæc scandix notissima olim Græcis omnibus, quæ toties Athenis in theatro risum & plausum excitauit, plebis cibus, & quotidianum pulmentū, vix hodie à quoquam cognita est, tantum ex capitum in Dioscoride consecutione, & stirpium collatione, & ex Galeno Aëtiōque gingidio similem esse intelligimus. Sunt qui gingidium Matthioli, Scandicem esse putent.

SCANDIX.



Lib. 24. c. 19

Forma.

Alij herbam hîc depictam, quæ radice est pastinacæ siluestri similis amara & subacri, eodem fere sapore qui & in radice smyrnij siue Petroselini Macedonici deprehenditur: foliis pastinacæ silvestris latioribus, ad apij foliū magis accedentibus, candidis, minimè hirtis, è caule per interualla sic prodeuntibus, vt in corticosam membranā dilatatū prope caulem folium alterum intra se concipiat, & foras protrudat: caule striato, cubitali: flore in vmbella candido, non fœniculi modo & aliarum id genus plantarum, quæ vmbellam gerunt, pediculis rotatim constructa, sed quamplurimis apicibus ex candido herbaceis velut coagmentata, peculiari quadam compositione, in nullis aliis herbis vix perspecta. Alij, in quibus est Dodonæus, herbam quæ scanaria, Acus pastoris, & Acula vulgò dicitur, Gallis *Aiguille de Berger*, Plinio pecten veneris, proceritate, cauliculis, foliis, floribus, cerefolio nostro haud multum dissimilem, sed grato illo odore destitutam. Cauliculis est rotundis, duris, foliis cerefolio grandioribus, magis infestis



gis infectis, magis ad fuscū vergentibus, floribus candidis in umbellis, deinde emicantibus ab eodem capitello multis acuminatis rostellis inter se disjunctis, quæ acus seu pectines planè referunt, quibus mulieres linum depectunt & concinnant, radix est alba, digitali longitudine. Veneris pectinem, inquit Plinius, appellant à

SAXIFRAGA Umbellifera, Anglorum.



similitudine pectinum, cuius radix cum malua tusa omnia corpori infixæ extrahit. Sed pecten Veneris, inquit Pena, fumariam gustu, foliis & vñu representat: vulgus pharmacopœorum etiā Venetiis putat & vsurpat. Acrimonia verò & amaroris eiusdem momenti sunt argumenta, qualia sunt Galeni de fumariæ acrimonia. Quā sententiam merito docti viri vellicant, & res ipsa reclamation. Sic chelidonij minoris, ari, & ceparum multò mitiorem experimur acrimoniā, quam illis tribuerint antiqui. Qui verò Saxifragam *Percepier* Anglorum probè perspectum habet, superiorum duarum stirpium vtrius simile esse sciunt, & neutiquam iisdē viribus secundum, amaror etiam & acrimonia in eo percipitur, & passim valetudinis causa pro olerè manditur, figura ei cerefolij proxima, sed herbula semper est dodrantem alta, nusquam adultior, toto anno suapte sponte erumpit, arido & trito solo luxuriat, sine caule, flosculis herbaceis, vehementer & repente urinas ciet, muria condita seruatur, & ex ea aqua stillatitia magno vsu elicitur. Hanc plantam Pena proponit magis

Lib. 24 c. 19

In Ad. fol. 324

quam asserit, vt pote quæ herbariis non valdè nota sit, neque dum, quod sciam, ab ullo alio descripta. In Anglia tamen frequentissimo apud mulierculas vsu recepta. Huc accersenda Saxifraga umbellifera Anglorum, facie Sefelis pratensis Monspelienfium. Hanc ab eximia virtute frangendi calculi sic Angli nominarunt, pratis vdis familiarem, foliis fœniculi, latioribus, pratensis Sefelis minoribus. Radix odora, foris nigra, intus alba, Pencedani facie: flores in Umbellis candidi, semē fœniculi, caulis cubitalis & sesquicubitalis est.

CAVCALIS.

CAP. XII.

Nomina



Aυγαλις Græcis, ita Latinis Caulalis nominatur, fortassis à seminum effigie, quæ vascula oblonga & semisphærica imitatur, aut quod præarida strepitum edunt hæc semina ventis concussa vindemiis exactis, quemadmodū caucalia vasa sonum edunt, dum aqua confertim egreditur aëre exeunte, & contra strepitum edunt dum implentur. Gaza in Theophrasto Pedem gallinaceum conuertit, nonnulli, auctore Dioscoride, daucum siluestre vocat. Caulalis inquit ille, cauliculus est dodratalis, aut etiam maior, subhirsutus, foliis apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; vel densis, vt alij reddūt (Sic Ruellius secutus vitiatum codicem, qui habet. φύλλα ἔχον σελίω ἐμπερή, ἐπ' ἀκρων ὁμαροειδῶς πολυχιδνή, διασέα. Verum in exemplari veteri, atq; in recentiorum compluribus legitur, φύλλα ἔχον μαράθρω ὅμοια, πολυσχιδή. Id est, folia habet fœniculo similia, multifidaq; Quæ lectio congruit plurimū constitutioni caucalidis) candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum coctū me oleum modo estur, vrinam ciet. Theophrastus caucalidem inter oleracea recenset.

Lib. 1. c. 133.

Forma.

Lib. 7. hist.

cap. 7.

Lib. 21. c. 15.

CAVCALIS, Matthioli.

Lib. 22. c. 22

Lib. 7. sim.


In cap. 133.
lib. 2.

Plinius velut herbæ vulgaris, & in cibis vsitatae meminit his verbis. Reliqua vulgariū in cibis apud eos herbarum nomina, chōdrylla, hypochæris, & caucalis, &c. Eandem descripsit alibi. Estur & caucalis fœniculo similis, breui caule, flore candido, cordi utilis. Succus quoq; eius bibitur, stomacho perquam accommodatus, & vrinæ, calculisq; & arenis pellendis, & vesicæ pruritibus, &c. Caulalida, inquit Galenus, quidam daucum siluestrem nuncupant. Est enim ei adsimilis gustu & viribus: ex calfacit enim, vt ille, & desiccatur: tum vrinam ciet, & muria condita reponitur. Ex his tribus ordine descriptis oleribus, hoc tertium vix cæteris notius est, quia nō multò clarioribus notis designatum fuit à Dioscoride. Præterea vitiata est eius lectio, hæc enim verba, foliis apio similibus, à quopiam in margine adscripta sunt, quæ postea in contextum latinum irrepsērunt: nam in Græcis exemplaribus desiderantur, & superuacanea sunt. Audacius tamen herbarij Caulalides aliquot exhibēt. Matthiolus nasci ait caucalidem hîc pictam in Hetruriæ campestribus, inculto præsertim solo, vt

& Ananienfi tractu in Tridentino agro, nullis reclamantibus notis. Petrosello saluatico vulgò vocant. Quippe quod folia quæ per ima prope radicem exeunt, apiū quadantenus effigie referunt, quod vulgò petrosello vocant, etsi quæ superiore parte prodeūt, per ambitū sint fœniculi modo capillamētis diuisa. Caulem mittit

Pastin

CAUCALIS, Dodonæi.



CAUCALIS, Pena.



Pastinacæ, in cacumine vmbellâ gerit floribus candicantem, odoratam, dauco non absimilem. Caulalidem flore rubro latioribus foliis vocat Lobellius, qui etiam aliam pinxit vulgarem floribus candidis, foliis minoribus, sed caule proceriore. Caulalidem aliam exhibet Dodonæus, hirsutam nimirum plantam, à Pastinaca silvestri parum distantem, foliis coriandro ferè similibus, magis dissectis. In cauliû summitate vmbellæ rotundæ, floribus candidis decoratur, quorum extima folia sunt ampliora: semè longum, hirsutû, veluti Pastinacæ silvestris, cumini semine maius. In campestribus provenit. Iunio mense floret, paulò post semen maturum est. Plantam aliam pro caucalide exhibet Anguillara, foliis apio minimè similibus. Eam à se iamdiu collectam Pena asserit in præruptis. S.

Lib. 5. c. 49.

Specus vocari ad fanû Magdalenæ in prouincia Narbonensi, & liberum facit quid cuiuslibet ea de re videatur statuere. Hic ex Pena appingendam curauimus. Est hæc, inquit, caule fœniculi, & foliis & diuisura, cubitum alta: vmbella albet, & odorata est. Radix vnica, recta, humi pacta, candida, sapore pastinacæ. Verùm hoc magis placent vulgares caucalides, inquit Pena: quia sunt caule, foliis, vmbella & semine hispidis, eoq; magis congruunt verbis Dioscoridis. Duæ namq; sunt in nostris vinetis & segetibus differentia: altera candida, foliis minoribus, sed caule proceriore, & hæc Matthioli. Altera purpurascens vmbellis seu floribus. Folia habet latiora & crassiora, semè maius. Est istud semè argutum & elegans: nã triquetra, & spinulis horrida habet glumã, glycyrrhizæ quadatenus simile, vestibis mordicus hærentē. Ea exuta granû oblongû, auenæ exenteratæ modo cernitur, haud gustu insuaue, qua quidē satis expressa nota insigniuit caucalides Dioscorides, & à similibus discreuit. Matthiolus caucalidē suã longè pluribus pollere facultatibus scripsit. Est enim cordi utilis. Succus calculos & arenas pellit, iocinoris, lienis, renumq; pituitas extenuat. Semè potum oculorum aciem acuit, & menses fœminarum adiuuat. Datur viris cõtra seminis profluuium

In Ad. fol. 325.

Ca. 133. li. 2.

Vires.

cum aspleno & viticis semine. Steriles facit prolificas assiduè ex vino potum. Præstat aduersus trygonis, draconis, & scorpionis marinorum ictus, vulneri illitum. Herba tota ex aceto mäsã, & vomitione reddita ventrē purgat, appetitû languescentē excitat, & nausæ fastidia discutit. Melancholicos iuuat tum herba ipsa in cibis deuorata, tum succus potus, tum semen, quemadmodû totius plantę decoctû. Quare datur vtiliter quartanariis & scabiosis: quinetiam morbo gallico affectis.

Nomina
Genera
Lib. 25. c. 9.



Αὔκος Græcè, Daucus Latinè, Daucum & Daucium nominatur, Arabicè *Dacu*, *Gezar*, siue *Giezar*. Dioscorides tria Dauci genera recenset, Creticum, Selinoides, tertiū foliis coriandri. Plinius, Dauci, inquit, genera quatuor fecit Petronius Diodotus: quæ persequi nihil attinet, cū sint differentiæ duæ. Probatissimum in Creta, mox in Achaia, & in siccis vbicumque natum, fœniculi similitudine, candidioribus foliis & minoribus hirsutisq;: caule pedali, recto, radice suauissimi gustus & odoris. Hoc in saxosis nascitur meridianis. Reliqua genera vbique nascuntur terrenis collibus, limitibusq;, nec nisi pingui solo, foliis coriandri, caule cubitali, capitibus rutundis, sæpe pluribus quàm ternis, radice lignosa, sed cum inaruit, superuacua. Semen huius cumino simile, prioris milio, album, acre: odoratum omnibus, & feruens. Secundum priore vehementius est, ideoque parcè sumi debet. Si iam maximè tertiū genus facere libeat, est simile staphylino, quod pastinacam erraticam appellant, semine oblongo, radice dulci. Omnia hæc & hyeme & æstate sunt intacta quadrupedi, nisi post abortus. Ex aliis vsus seminis: ex Cretico radice & succi, sed magis ad serpētes est. Bibitur è vino drachma vna. Datur & quadrupedibus percussis. Hæc Plinius: qui habet de primo genere folia candidiora λευκότερα, quæ Dioscorides λεπτότερα, idest, tenuiora. Eadem descripsit his verbis Dioscorides. Daucum Creticum folia habet fœniculo similia, minora & tenuiora, caulem palmi altitudine, umbellam Coriandro similem, flores albos, & in his semen acre, album, hirsutum, in mandendo odoratum. Radix est digiti crassitudine palmi longitudine. Nascitur in petrosis & soli expositis locis. Aliud est eius genus siluestri apio simile, acre, aromaticum & odoratū, gustantiq; feruidum. Præstantissimum est Creticum. Tertium eius genus folia habet coriandro similia, flores albos, caput & semen anetho similia, & in capite umbellam pastinacæ similē, semine oblongo refertā, & acri velut cuminū. Tria hæc Dauci genera inueniri affirmat Matth. quorū illud Italis frequentius esse, quod siluestrem

Forma.

Ca. 69. li. 3.

DAVCVS, I. Matthioli.



DAVCVS, II. Matthioli.




pastinacam

pastinacam æmulatur. Est enim in Senensi agro præsertim in maritimis frequentissimum. Creticum autum legitimum ex Creta tantum afferri existimat. Id verò quod coriandri foliis prouenit, semine cumino simili, non solum in multis Italiae, sed etiam Germania Bohemiaeque locis reperiri. At primum illud Creticum non solum in Creta nasci Pena asserit: non modo enim Germanicas Alpes, sed etiam

In Ad. fol.

DAUCUS II. genus, Dalech.



DAUCUS III. genus. Dalechamp.



Genuensium colles, & Genuensium circa Iurā rupes hoc Cretico abundare, indeque Lugdunum & ad alia emporia hodie venum deferri: eoque pluris emi etiam Venetiis, quia ad Theriacam & similia antidota efficacius est quouis alio congenere Dauco. Eius folia exilia, inter fœniculum & carottam media sunt, umbellæ candidæ, flores anethi, copiosum semen, oblongum, ut cumini, sed lanugine albidum, gustu acre, odorum, & cuius usus potissimum. Vsi etiam radix pastinaca minor, gustu feruidiore, & odoratior. Huic quo minus sit Creticum, si quid deest, solum calumve erit. Sanè effigie nihil, viribus autem perparum abest. Daucum secundum Marth. Veneti pharmacopœi saxifragiam dicunt illique cõsimiles vires frequenter experimento tribuunt. Nihil tamè obstat quin sit Daucus alter Diosc. Foliis enim est coriandri aut petroselinii semine in umbellis oblongo, anguloso fœniculi modo. Radix albicat, aroma olet, suauisque gustanti est, superneque comata est Mei modo. Daucus Selinoides secundus dicitur Lobellio, Rosmarinum siue Libanotis prima Theophrasti, folio apij palustris, Italis *Valdebona*, vulgò & Saxifragia Venetorum. Vsiatior Daucus Officinarum Italiae, Galliae, Germaniae, est Pastinaca silvestris Dioscoridis, siue Carota silvestris vulgi, ut paulò post dicemus. Istud frequentius Cretici penuria usurpant, duplumque nonnulli substituunt, freti Galeni sententia, tametsi non parum facultatibus & effigie à Dioscoridis Daucis absit. Dodonæus pro Dauco tertio eandem Carotam silvestrem descripsit & depinxit: Alia ab iis Dauci genera ex Dalechampij opinione hinc proponimus. Secundum scilicet, hipposelino simile, quod ἀγριον σέλινον dici Dioscorides auctor est. Caule, folio, radice, quamuis qua parte apio silvestri simile sit hoc Dauci genus, Dioscorides non expresserit. Folium tamen in illo profundius incisum quam in hoc Dauco, cætera pariter carnosum & crassum. Gignitur in glareoso campo quem Drauus irrigat prope Gratianopolim, radice alba, odorata, acris, paleis in summo capillata, caule cubitali, nonnunquam al-

223

Lib. 2. c. 87.

Lib. 2. cap. de hippos

tio-

tiore, anguloso, folio prope radicem terræ instrato, latiore, hippofelino simili, in exilibus ramulis tenuiore, magisq; dissecto apij modo, umbella apij, flore candido, copioso, semine minuto, oblongo, acris, odorato. Tertium Dauci genus in saxoso colle Gratianopoli imminente nascitur, quem indigenæ *Chalemont*, idest, calidum montem vocant, quod apricus & ad meridiem situs solis radiis assidue tepescat, & interdum æstuet: quamobrem insignium plantarum feracissimus est. Huius igitur plantæ radix ex flauo candicat, brevis & exilis, festucis in summo villosa. Folia prope radicem coriandro similia, quanto sunt propiora caulis & ramulorum summitati, tanto tenuiora, adeò vt in plantæ vertice ad tenuitatem fœniculaceorum anethinorumve gracilescant: quod est, κεφαλὴν δὲ ἔχει χαρπὸν ὅμοιον τῷ ἀνῆθω. Caulis apij, flos in umbella candidus, anetho pastinacæve siluestri similis: nam pastinacæ siluestris umbellam cum anetho comparat Dioscorides, semen oblongum, anethini æmulum saporis acris, qualis in cumino gustanti percipitur.

Lib. 3. cap.
de past.

DAUCVS Pratenfis, Dalech.



Lib. 3. c. 69.
*Vires &
Temper.*

Li. 26. ca. 15.
Li. 6. simpl.

His Dalechampius adiungit Daucum pratensem, qui in montosis pratis nascitur, radicibus multis, candidis, rotundis ab ima caulis parte in diuersa sparsis, breuib, dulcibus, odoratis, foliis proximè radicem sex aut septem, totidem digitos longis, foliolis per ordinem multis, orbiculatim cauliculos totos ambientibus, myriophyllo similibus, mollibus, latè virentibus, caule medio fœniculi, cubitali, in ramos duos, vel tres diuatico, foliis paucis vestito, interdum nudo, umbella per initia nonnihil rubescente, postea, alba, amara, subacris, odorata. Floret Maio mense. Semen omnium, inquit Dioscorides, vim habet excalfaciendi: menses, fœtus & vrinas potum extrahit, tormina discutit, veteres tusses mitigat. Auxiliatur à phalangio commorsis potum cum vino. Discutit quoque tumores in cataplasmate impositum. Seminis quidam aliorum vsus est duntaxat, Cretici verò etiam radicis, quæ maximè aduersus bestias venenatas bibitur cum vino. Quod Dioscorides habet, ἐμμήνων, ἐμβρύων, & ἔρων ἀγωγόν, Plinius

reddidit Daucum & menses & secundas potu facillimè pellit, quasi qui δολιέρων legisset pro ἐμβρύων. Dauci herbæ semen, inquit Galenus, excalfaciendi vehementer facultatem habet, adeò vt inter prima efficax sit, tum vrinæ mouendæ medicamen, tum mensibus prouocandis. Multum etiam digerere per hâlitum foris impositum potest. Ipsa verò herba similem quidem vim obtinet, tamen semine infirmiore, nimirum ob aqueæ humiditatis mixtionem, quamquam utique & ipsa calida sit temperie.

PASTINACA.

CAP. XIIII.

Nomina



PASTINACA. RAECE φαρυλινός, Latinè & Italicè Pastinaca, Arabicè Iezar, Gezar, seu Giezar, Germanicè Pasteney, & Pastnachen. Hispanicè Cauaoria blanca, Gallicè Pastenade. Pastinaca verò à pascendo dicta videtur, quia sponte in agris nascitur, eamq; plebs sæpissimè depascitur, quemadmodum etiam φαρυλινός, à radicis scapo bryoniæ (quæ etiam ἔρως dicitur) non ita absimili, appellationem sortita videtur. Dioscorides duo Pastinacæ genera facit

Lib. 3. c. 52.

facit, siluestrem & satiuam. Plinius quatuor. Ex his Pastinacæ vnū genus agreste sponte prouenit, Staphylinos Græcè dicitur. Alterum feritur radice, vel semine primo vere vel autumnno, vt Hygino placet Februario, Augusto, Septembri, Octobri, solo quàm altissimè refoffo. Annicula utilis esse incipit, bima vtilior, gravior autumnno, patinisq; maximè, & sic quoque virus illi intractabile est. Hibiscum à Pastinaca gracilitate distat, damnatum in cibis, sed medicinæ vtile. Est & quartum genus in eadem similitudine Pastinacæ, quam nostri Gallicam vocant, Græci verò daucum: cuius genera etiam quatuor fecere. Meminit & alibi Pastinacæ pratensis. Hanc quidam eandem esse cum ea, quam hibiscum nomine cum althæa communi vocant, alij diuersam putant. Vt vt res hæc habeat, hæc Pastinaca à siluestri Dioscoridis distat. Quartum eiusdem genus Carota nostra videtur esse, Dauci quartū genus ab eodem proditum, vt diximus. Pastinaca siluestris, inquit Dioscorides, folia Gingidij habet, sed latiora, subamara, caulem rectum, asperum, qui vmbellam gerit Anetho similē, in qua flores candidi, & in medio purpureum quiddam exiguum, veluti crocum referens. Radix est digiti crassitudine, palmi longitudine, odorata, quæ cocta estur. Satiuam notis nullis Dioscorides expressit, sed tantum ad eadem pollere, inefficaciorem tamen esse, & cibo aptiorem scripsit. Eam tamē quæ hîc picta est, inquit Pena: quia posteritatis consensu, & multo vsu recepta est,

Genera
Lib. 19. c. 5

Lib. 21. c. 15.

Cap. de
Dau.
Lib. 3. c. 52.
Forma.

Ad. fol. 316.

PASTINACA Satiua
vulgi, Matthioli.



vt genuinam agnoscunt herbarij. Similis est Sisaro facie, similior tamen Elaphobosco, quæ siluestrem Pastinacam siue Bauciam Officinæ dicunt. Lutei namq; sunt Bauciæ flores: radix concolor, & eiusdem saporis. Siluestris similis est tota Carotis seu Dauco Staphylino cui Pastinacam siluestrem succedaneâ faciunt pharmacopœi, vt paulò ante monuimus. Umbellæ densæ & satis magnæ sunt, flores candicant. Ea scatent agri & sata: sed minor multò superiore est: radix eundem gustum, sed medicatū exhibet, minùs tamen cibis expetita. Satiuam scribit Matthiolus in Italia frequētissimè in hortis feri: & Ruellium reprehendit, qui Carotas vulgò vocatas, satiuas esse Pastinacas crediderit. Erratica in campis & incultis sua sponte nascitur. Vtraq; albicantibus constat radicibus, quæ coctæ manduntur. Satiuam etiā Allobroges & Sequani in hortis colunt, & seruatis Latini nominis vestigiis *Panetz* vocant. Lobelius Pastinacā satiuam hîc positā, Pastinacam domesticam vulgi appellat, Pastinacam satiuā Dioscoridis, Daucum Theophrasti, Gallorum *Pastenades* & *Carottes iaunes*. Pastinacam silue-

Cap. 52. li. 3.

stem Dioscoridis, Carottam siluestrem vulgi, *Carotte*, ou *Pastenade sauvage*, quæ Daucus est officinarum, cuius iconem hîc videris. Satiuæ vero Pastinacæ Dioscoridis, siue Carottæ luteæ siue Dauci lutei edulis iconem habetis, cap. de Carottis, apud Matthiolum, ca. de Sisaro nomine Sisoris secundi. Pastinacæ siluestris semen potum & impositum menses mouet auctore Dioscor. Conuenit etiam in potu vrinæ difficultate laborantibus, hydropicis, pleuriticis, & à venenatis bestiis ictis morsis ve. Eos verò qui id præsumperunt negant ab illis iniuria vlla affici: conceptus adiuuat. Radix vrinas ciet, venerem stimulat, partus apposita eiicit. Folia trita

Vires &
Temper.

PASTINACA Siluestris,
Matthioli.

trita cum melle imposita phagedænica vlcera purgât. Plinius vtriusque Pastinacæ vires multò fusius persequitur his verbis. Alterum est genus staphylinos, quod Pastinacam erraticam vocant. Eius semē contritum & in vino potū, tumentem aluum & suffocationes mulierum doloresq; lenit, in tantum vt vuluas corrigat, illitum quoque è passo ventri earum prodest: viris verò prodest cum panis portione æqua tritum, ex vino potum contra ventris dolores. Pellit & vrinam, & phagedænas vlcerum sistit recens cum melle impositū, vel aridū farina inspersa. Radicem eius Dieuches cōtra iocinoris ac lienis, ilium, lumborum & renum vitia ex aqua mulsā dari iubet. Cleophrantus & dysentericis veteribus. Philistio in lacte coquit, & ad stranguriam dat radice vncias quatuor: ex aqua hydropicis, similiter & opisthotonicis, & pleuriticis & comitialibus. Habentes eam feriri à serpentibus negantur: aut qui ante gustauerint nō lædi. Percussis imponitur cum axungia. Folia contra cruditates manduntur. Orpheus amatorum inesse staphylino dixit, fortassis quoniam

niam venerem stimulari hoc cibo certum est: idē cōceptus adiuuare aliqui prodiderunt. Ad reliqua & satiuā pollet: efficacior tamē siluestris, magisq; in petrosis nata. Semen satiuæ quoque cōtra scorpionum ictus, ex vino aut posca salutare est. Radice eius circūsculpti dentes dolore liberantur. Hæc Plinius. Staphylinus satiuus imbecillior, inquit Galenus, agrestis ad omnia potentior est. Vrinæ mensesq; prouocat: cum herba quidem tota tum maxime semen ac radix. Habet porro etiā absterforium in se quidpiam: quamobrem vlcerum phagedænica quidam foliis eius cum melle, quo pura reddant, illinunt.

Lib.8.simpl.

*ELAPHOBOSCVM.**CAP. XV.*

ΛΑΦΟΒΟΣΚΟΝ Græcè, sic Latine Elaphoboscū, & Cerui ocellus dicitur, significat autem Elaphoboscum cerui pabulū, quod hanc plantam Ceruæ monstrarint auctore Plinio. Est autem caulis, vt tradit Dioscorides, Libanotidi aut fœniculo similis, angulosus foliis latitudinis duorum digitorum, satis longis velut terebinthi, circumfractis quodammodo asperis. Habet & adnata multa ipse caulis, umbellas anetho similes, flores subluteos, semen anetho simile. Radix est longitudine trium digitorum, vnius crassitudine, alba, dulcis, edulis. Sed & caulis olerum modo editur dum recens est. Idem sic describit Plinius. Elaphoboscum ferulaceum est, geniculatū, digiti crassitudine, semine corymbis depēdentibus simili effigie, sed non amaris, foliis olusatri: & hoc laudatum in cibis. De hoc veterum Elaphobosco dubitant Herbarij. Pharmacopœi, id quod etiā Pena tradit, duas Pastinacæ siluestris species statuunt. Vnam Dioscoridis, cuius superiore capite meminimus, alteram Arabum, quam Bauciam vocant, quæque supradictæ dissimilis est, quia foliis, facie, floribus, & caule simillima est domesticæ, nisi quod radice est minore, gustu tamē magis vegeto, & medicato, paucioribusq; foliis. Hanc si attentius expendas, inquit Pena, & cum Elaphobo

Lib.3.c.66.

Li.22.c.22.



Elaphobosco Dioscoridis conferas, nihil prorsum erit quod requiras. Eandem Elaphobosci nomine pinxit Dodonæus. Sunt qui Pastinacam pratensem Plinij esse velint, quam etiam Hibiscum Pastinacam appellat, & *μαλαχὴν ἀγρίαν*. Lugdunenses rustici hodie vocant, *Panetz sauvage*, idest, Pastinacam silvestrem, & eius radice vescuntur vt hortensis. Matthiolus scribit herbam quādam se vidisse tum in Tridentino, tum in Goritienſi agro, cuius picturam hīc damus, quæ ita notis omnibus Elaphobosco respondeat, vt aut legitimum Elaphoboscum, aut plātā illi similem esse credat. Cuius descriptio ab eo prætermiſſa hæc est. Gignitur in asperis locis, duorum cubitorum altitudine, radice crassa, odorata, foliis Angelicæ, in singulis pediculis ferè quīnis aut septenis, venosis, crassiusculis, toto ambitu diuisis: flore in caulis vertice ex luteo pallescente, in vmbellis multis, dispari altitudine euectis, his procerioribus, illis summiſſioribus, vno tamen ex loco, nempe caulis fastigio sese attollentibus, eleganti quadam figura, quæ in aliis vmbelliferis non conspicitur. Incidendi, attenuandi, detergendi, obstructions aperiendi facultatem inesse sapor odórque demonstrant. Tradunt ceruas, inquit Dioscorides, Elaphobosci herbæ pabulo resistere serpentium morſibus. Vnde & semen eius morſis à serpentibus datur cum vino bibendum. Plura tradit Plinius. Quippe etiam conditum prorogatur, ad vrinam ciendam, lateris dolores sedandos, rupta, conuulſa sanāda, inflationes discutiendas, coli quoque tormenta. Cōtra serpentiū omniumq; aculeatorū ictus. Quippe fama est hoc pabulo ceruas resistere serpentibus. Fistulas quoque radix nitro addito illita sanat. Siccāda autē in eos vsus prius est, ne succo suo madeat, qui contra serpentium ictus non facit eam deterio- rem.

Lib. 5. c. 39.
 Lib. 21. c. 15.
 Lib. 19. c. 5.
 Li. 20. ca. 4.
 Ca. 66. li. 3.

Li. & c. 22.

CAROTAE.

CAP. XVI.

PASTINACAM satiuam duplicem statuit Lobellius. Priorem, Pastinacam satiuam Dioscoridis. Carottam nostram luteam. Alteram Pastinacam satiuam ex atro rubentem, quam alij *Carottes* simpliciter. alij *Pastenades*, & *Carottes rouges* appellant, à colore radicis ex atro ru-

Nomina

bescente, atrioréque eius succo. De priore paulò ante diximus. nunc de altera. Carotis nomenclatura indita fuisse videtur, inquit Pena, ab illa quam cum Carui similitudine & cognatione sortitæ fuerunt. Mediæ videntur inter Daucum & Pastinacas naturæ, vtrique congeneres, neutræ tamen dici possunt: quam naturam

CAROTA Vulgaris.



CAROTA, March. altera.



Li. 6. simpl.

Lib. 9. hist.
ca. 15.

nullus significantius expressit quàm Galenus, qui Carotam Daucum Staphylinum appellavit peritiorum herbariorum sententia. Item hæc quæ Carotis cum Daucis intercedit similitudo, fecit ut Theophrastus Carotam Daucū nigrū appellauerit. Καὶ δαυκὸν περὶ τὴν πατρικὴν διαφέρειν. τὸτο δὲ γερμανικὸν φύσιν ῥίζαν δὲ ἔχει μέλαιναν. Id est, & Daucum in Patrensi agro præstantius: huic vis excalfaciendi, radix nigra. Carota folia fert nigricantia, dissecta, cerefolij foliis proxima, sed magis fusca, maiora, & minutius incisa, cauliculos rotundos, parum hirsutos, cauos, in quibus umbellæ magnæ flores candidos ferunt, deinde semen hirsutum, Aniso specie haud dissimile, radix crassâ, longa, huic flava, illi rubra, tam internè quàm externè, admirandæ interdum tum crassitudinis, tum longitudinis. In hortis feritur. Iulio mense floret, Augusto semen fert. Radices frixas vel elixas vulgus esitat satis magno gulæ irritamento, oleo, sale, & aceto additis.

SISARVM.

CAP. XVII.

Nomina

Genera

In Ad. fol.

317.
Forma.

RAECE Σίσαρρον, Latinè etiam Sifarum & Sifer dicitur, nonnullis Seruillū, Seruilla, vel Cheruilla, Gallis Cheruy, Germanis Gerlin, & Gierlin. Plinius duo facit Sisari genera, satium & silvestre, quod Dioscorides omisit. Huius historiam veterum nullus, quod sciam, literis mādavit, quia vulgaris esset cognitionis, eaque causa fuit cur id quod illis fuerit notissimū, nobis hodie sit ignotum, nisi ex vestigiis appellationis & similitudine Sionis aut laueris, & radicum coniectura, inquit Pena: ideò quod vulgò frequens Narbonēsi agro (nō perinde in Italia, aut alibi) vescēdi causa alitur, legitimū putatur. Sapor illi quàm domesticæ Pastinacæ gratior, cui facie similis est, aut laueri, sed in radicibus maius discrimen: sunt enim ex vna quasi radice basi pendulæ, bulbosæ, ænanthes asphode

SISARVM Maius, Matth.



asphodelive modo, quæ quia sunt edules, non sine ratione docti quidam ambigunt, sint ne illæ quas stultis Hesiodus exprobat, scribens nescire eos quanta, in Malua & Asphodelo sit utilitas. Nam Dioscoridis Asphodelus nō homini, sed pecori potius aut sui in alimentū cedat. Matthiolus multis rationibus adductus plantam eandem hīc pictā Sisarum esse censet. Primum, inquit, quod Sisarū apud veteres plāta sit Pastinacæ congener. Plinius enim post Pastinacam mox de Sisere tanquam cōgenere tractavit, quemadmodum & hoc nostrū Pastinacæ domesticæ cōgener videtur esse. Deinde quod eius radix, ut Plinius ait neruum seu matricem intus habeat, quæ eximitur cum cocta fuerit. Præterea quod seratur frequētius, auulsis à radice agnatis, ut Inula, Liliū, Arum, quam semine, quod semine satum nō nisi tertio anno esui idoneum proueniat, radice verò quotānis. Id quod fecisse veteres de Sisere fatione testatur Marcellus & Ruellius: quod innuit Columella sic scribens. Pastinaca & Siser, atque Inu-

Ibidem.

Ca. 107. li. 2

Lib. 20. c. 5.

Lib. 2. c. 48.
Lib. 11. ca. 3.

la conualescunt altè pastinato & stercoreto loco, sed quam rarissimè ponēda sunt, ut maiora capiant incrementa. Quæ si diligentius expēdantur, radice feri Siser, nō semine facile constabit: quinetiam quod numerosa sit radice Asphodeli modo, rarissimè idem poni oportere, ut latius radices fundantur, & incrementum capiant. Nam quò crassiores, eo gustui suauiores. Ad hæc scribit Dioscor. decoctam Sisari radicem, & ori gratā esse, & stomacho vtilem, quod in huius plantæ radicibus perspicuè deprehēditur, cū prius elixa, deinde butyro in patellis farina circūlita fringuntur. Vnicus superest scrupulus, quod in nostrate Sisaro nulla percipiatur amaritudo, cū tamen Galeno & Plinio auctoribus, Sisarum amarore non vacet. Verū id à sententia nos abducere non debet, quod certum sit regiones sæpe plantis immutare saporem. Siquidem Cēpa, quāquam sui natura acris admodum sit, tamē in Caietano agro vbi omniū maxima prouenit, nulla acrimonia prædita est, id quod multis locis in Raphano videmus, & in Aro, ut Galen. inquit, quod in Cyrenaico agro nascitur. Sisari radix cocta, inquit Dioscorides, ori grata est, & stomacho utilis: urinam ciet, & appetentiā excitat. Plinius, Inter medica dicendū Siser: & ipsum Tiberius princeps nobilitauit, flagitans omnibus annis à Germania. Gelduba appellatur castellum Rheno impositum, vbi generositas præcipua. Ex quo apparet frigidis locis conuenire. Inest longitudine neruus, qui decoctis extrahitur amaritudinis tamen magna parte relicta, quæ mulso in cibis temperata, etiam in gratiā vertitur. Et de siluestri fusiū. Siser erraticum satiū simile est & effectū: stomachum excitat, fastidium absterget: ex aceto laserpitiatum sumptum, aut ex pipere & mulso, vel ex garo, urinā ciet, ut Opion credit, & venerē. In eadem sententia est & Diocles. Præterea cordi conuenire cōualescentiū, & post multas vomitiones perquā vtile. Heraclides cōtra argentū viuū dedit, & veneri subinde offensanti, (aliās offensæ, id est, languescētis) agrisq; se recolligentibus. Hicetius ideo stomacho vtile videri dixit, quoniā nemo tres Siseres edendo contiūuaret: esse tamen vtile cōualescentibus ad vinū trāseuntibus, Satiui priuatim succus cum lacte caprino potus, sistit aluū. Hæc Plinius. Galenus hæc de eodem. Sisari radix cocta stomacho grata

Li. 2. c. 107.

Vires.

Lib. 19. c. 5.

Lib. 20. c. 5.

Li. 8. simpl.

est, & vrinam mouet, secundo ordine excalfaciens, adiectam habens amaritudinem quandam cum leuicula adstrictione.

SISER PALVSTRE.

CAP. XVIII.

Nomen.
Forma.



Is subiungenda plāta quam herbarij Siser palustre vocant. Ea in cœno pigrarum aquarum nascitur, radicibus multis, breuibus, subnigris, carnosis: foliis propè radicem multis, in terra stratis, apio similibus, latioribus, crassiusculis, in caule paucis, tenuibus, ferè capillaceis, qualia in apij hortensis iam adulti summo vertice conspiciuntur: caule pedali: flore in umbella candido, semine odorato.

ANGELICA. CAP. XIX

Nomen.

RECENTIORES omnes vno ore plantam hanc Angelicam, Sancti spiritus radicem, à diuinis & immēsis aduersus grauissimos morbos & venena facultatibus, & à suauissimo radiceis odore appellant, Galli *Angelique*, Germani *Angelick*, & *Desbedigengeysls vurtz*, siue *Brustwurts*. Vix autem credi par est, inquit Pe-


In Ad. fol.
311.

na nostrates Angelicas Indicis deliciis aut præsidiiis neutiquam posthabendas, antiquitati notas fuisse, nisi sint apud auctores veterinariorum Gallorum laserpitia memorata: nec enim siluissent illi tam diuinam fragrantie gratiam, & vicarias diuine beneficentie vires, siue Angelicas nostratis Angelicæ. Duo eius genera statuunt

Genera
Ca. 43. hist.
Li. 2. ca 93.
Ca. III. li. 4.

ANGELICA Satiua
Matthioli.

Forma.



Locus.

Fuchsius & Dodonæus, vnam satiuam, alterā agrestem. Matthiolus plura. Alia satiuā est, inquit, alia domestica, alia siluestris, alia in aquosis proueniens. Pena triplicem facit. Satiuæ & procerioris folia sunt lata, hippofelini smyrniuæ æmula, per ambitum serrata, ex viridi in pallidum languescentia, mollia: caulis binūm ternūmve cubitorum, striatus, cauus, pallefcēs, ferulaceus, umbellæ fœniculi, aut pastinacæ satiuæ, lutei flores, semina foliacea, rotūda, compressa & albida, acris gustus, & odoris eximij, radix crassa, & aliquantum supernè tuberosa, multis appendicibus humi mersa, intus candicat, foris pulla, odore perquā suauī, aromatico, pinguem, gummosum, flauamq; succum remittens. Scribit Pena: Nonnullis in hortis Londini Antuerpiæq; conspici aliam, quæ tota minor est, cuius suauiore odorem radix spirat, prope quam folia ima ex purpura rubescunt, superna autem ex rubore virescunt, umbellæ, ceteraq; semina similia. Celsos vtraq; montes, gelidāq; amat iuga, veluti Imperatoria, cum qua in hortis colitur in Anglia, Belgio,



Belgio, Gallia. Angelica silvestris satiuæ similis est, nisi minora folia haberet, acriora, pauciora, minus incisa, caulem graciliorem & breuiorem, umbellæ magis albicant, radix pluribus fibris, odoréq; cæteris multò minore est, gustu tamen non ingrato, & ferè Pastinacæ. Rarius hortis, sed sæpius vliginosis & pratensibus locis frigidis gaudet. Iulio & Augusto mēsisbus floret. Quidā Phellandryon esse putant

Tempus.
 Temper.
 Vires.

ANGELICA Silvestris,
Matthioli.



à Plinio memoratū, cap. 12. 27. In palustribus nascens. Api, folio, cuius semē bibitur propter calculos, & vesicæ vitia. De alio Phellandryo dicemus in lib. de palustribus. Excalfacit & deficcit ordine secundo completo, aut tertio incipiente. Aperit, extenuat, discutit. Vnicè venenis aduersatur. Pestilentia populatim sæuiantis arcet contagia. Corpora à lue pestifera vindicat, si tantum, vt affirmant, in ore teneatur. Per hyemem ciceris magnitudine cum vino, per æstatem ex stillatio rosarum liquore sumpsisse satis est: Nec sensurum eo die contagionem pollicentur quo quis deuorarit: nam, vrina & sudore venenum abigit. Lentitiam pituitæ digerit: quapropter tussi quam frigus excitarit, medetur. Crassa quæ in thorace coierint, discutit. Herba ipsa in aqua & vino cocta, vulnera interna glutinat, concretum sanguinem resoluit, stomachum esu corroborat, cor recreat, pituitam ventriculi deiicit, fastidiaciborum discutit, & languescentem inuitat appetentiam. Rabiosi canis morfu, aut serpentis ictu liberat, si contrita cum ruta

& melle folia indantur, deinde cocta in vino bibantur. Libidinem extinguit ore ieiuno sumpta. Lasitudines reficit, thoracem expurgat. Supra febricitantis caput imposita fertur ad se feruorem elicere. Valere contra fascinationes affirmant, si quis eam secum gestarit. Radix in puluerem trita animi deliquiis, & cæteris cordis affectibus summopere opitulatur. Datur radice semidrachma vna cum theriacæ drachma ex stillatitia ipsiusmet aqua iis qui peste laborant, deinde sudare coguntur, idemq; repetitur eodem modo post septem horas. Mansa radix & dentium cauis imposita, eorum dolorem sedat, anhelitum adeo commendat, vt præsumpti alij odorem occultare facile possit. Siluestri in Anglia libenter vtuntur, inquit Petr. Pen. quia aptior eduliis condiendis: corrigit enim prouentum saburrâmq; crassorum & viscidorum humorum, atque foetidum halitum emendat tetri spiritus ex praua concoctione manantis, copiosior etiam & gratior est. Est & alia

Ad. fol. 311.

ARCHANGELICA, Dod.

Lib. 5. c. 25.

Forma.



Vires.

quædã Angelicæ Aquaticæ species Matthioli & Gesneri, quam Archangelicam Dodonæus appellat, cuius hæc est descriptio. Hæc, inquit, Est foliorum amplitudine, satiuâ haud inferior, sed tamen singularem frequentia numerosior: in plurima enim folia, huius diducuntur. Caulis crassus, quãdoq; vnâ cū foliorum pediculis rubens, geniculatus quoque, valdè ramosus è singulis siquidem articulis tres aut quatuor alas promit, multis idcirco vndeque umbellis cingitur, quorū flores candicant: semen latum, longius & crassius quàm Angelicæ. Alta radix & albida, exigui odoris, maioris tamen, quàm folia vel caulis, quæ nullius aut admodū obscuri. At Angelicæ, & quidē maioris radix, cuius est vsus, excalfaciens ac resiccans est ordine secundo inteso, aut tertio incipiente. Proinde aperit, extenuat digerit, & sudores mouet: venenis resistit: pestilētes morbos curat si tēpestiuè exhibeatur. Datur autē pulueris eius drachma cum vino tenui: aut si febris vehementior, cū Cardui Benedicti, aut Tormentillæ stillatitia aqua & exiguo

aceti, & per se quidē, aut addita Theriace ex viperis, à cōtagio deinde horū & præferuat, in ore detenta, aut cōmansa solūm. Lentos crudosq; humores eadē ad concoctionē perducit: crassorū, quæ pulmonibus thoraciq; inhe rent expurgationē faciliē procurat: hepar & lienē aperit: Virginū remorātes mēses euocat: secundas expellit: aduersus rigores febriū huius decoctū ex vino prodest. Valere etiam cōtra fascinationes radicem affirmant, si quis eam secum gestarit, vt Fuchsius ait.

IMPERATORIA.


CAP. XX.

Nomen.

Forma.



Braras & præstantes facultates Augusto nomine Imperatoricæ planta hæc donata fuit. Dicta est etiam Ostrutium & Astantia, Laserpitiū à Fuchsio, Smyrniū à Trago, est affiniore facie satiuæ angelicæ quàm siluestri. Folia tamen propius sphondylium aut hipposelinum æmulantur, vt plurimū terna, statim ab humo cauliculis subnecta, robusta, hirsuta, aspera. Caulis sesquicubitalis, aut bicubitalis est purpurascens, rotundus, nodosus, hirsutusq; in cuius cacumine umbellæ floribus candidis ornatur, ex quibus semen prodit angelicæ siluestris, vel anethi, odoratum. Radix digitum æquat, crassa, rugosa, lignosa, multis fibris in terrā sparsa, foris fusca, intus albicans, siue subuiridis, multo

IMPERATORIA,
Matthioli.

multò vehemētiōris & acrioris facultatis & odoris quàm angelicæ. Iisdem gaudet natalibus. In Ananiensibus montibus supra Tridentum frequentissima Matthiolo auctore. Tradunt recentiores Imperatoriæ radicem excalfacere tertio excessu completo, vel quarto incipiente, siccare verò secundo. Discutit hac mirificè tum ventriculi, tum intestinorū, tum etiam vteri flatus, quapropter coli cruciatibus, & ventris torminibus maximè utilis est. Cit menses & vrinam, fouentur vtiliter eius decocto dentes, præsertim si in vino austero radix decoquatur. Eadem ex vino pota vteri strangulationibus prodest, conceptum adiuuat quem frigiditas intercept, concoctionem roborat. Commansa est præstantissimus apophlegmatismus, vt quæ efficaciter cerebri pituitam expurget. In puluerem trita & è vino pota, frigidis succurrit morbis. Quare resolutis, comitialibus, conuulsis auxilio est. Aiunt nonnulli quartana eos sanari, qui pulueris cochlearij dimidium hora vna ante accessionem ex mero biberint. Oris habitum commendat, & omnes roborat sensus. Epide-

In ca p. 65, lib. 3.

Temper. & Vires.

miis morbis, venenis fermè omnibus, ac venenatorum animalium tum morsibus tum ictibus opem præstat. Asthmaticas iuuat, obstructions aperit, aqua intercute laborantes & lienosos sanat. Denique excalfacit vniuersas corporis partes quas frigus occuparit. Ex quibus perspicuum est herbari istam tot tantisque viribus præditam non immeritò Imperatoriæ nomen sibi adsciuisse.

LASERPITIVM.

CAP. XXI.



QVOD Græcis Σίλφιον, Latinis Laserpitum nominatur, Mauritanis Silsion, caulis eius Dioscoridi μάσπετον, Oribasio μαστίηρον, Latine similiter maspetum & mastierum, Arabibus Mastastes, Theophrasto & Plinio non caulis, sed folium maspetum. Quare quidam, inquit Dioscor. caulem σίλφιον, radicem μαγύδιαον, folia μάσπετα vocauerunt. Succus ex silphio laser appellatur teste Plinio, ex caule χαυλίας Theophrasto, ex radice ρίζιας, hunc radicarium, illum scaparium conuertit Gaza. Brevis extat silphij apud Dioscoridem descriptio his verbis. Laserpitum in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo quod maspetum vocant: foliis apio similibus, lato semine. Theophrastus multò fusiùs id descripsit. τὸ δὲ σίλφιον, inquit, ἔχει ρίζαν μὲν πολλὴν καὶ παχέαν, τὸν δὲ χαυλὸν ἡλίκον νάρθηξ, σχεδὸν δὲ τῷ παχέϊ παραπλήσιον. τὸ δὲ φύλλον δὲ χαλδοὶ μάσπετον ὁμοίον τῷ σελίῳ. σπέρμα δὲ ἔχει πλατὺ, φυλλῶδες, ὅιον τὸ λεγόμενον φύλλον. ἐπετιόχουλον δὲ ἔστιν ὡς περὶ νάρθηξ. ἅμα μὲν σὺ τῷ ἡερὶ τὸ μάσπετον τῷ τοῦ ἀφίησιν. ὁ καθαίρει τὰ πρόβατα, καὶ παχύνει σφόδρα, τὰ κρεὰ θάμματα ποιεῖ τῇ ἡδονῇ μετὰ δὲ ταῦτα χαυλὸν ἐσθίει πάντα τρόπον (adde ἀγαθὸν ex Gaza, vt & constet sensus) ἐφθόν, ὅπῃ τὸν χαυλὸν ἔστιν τοῦτο φασὶ τὰ σώματα τετραράκοντα ἡμέρας. ὅπῃ δὲ διττὸν ἔχει, τὸν μὲν ἀπὸ τῆς χαυλὸς, τὸν δὲ ἀπὸ τῆς ρίζης. διὰ χαλδοὶ τὸν μὲν χαυλίαν, τὸν δὲ ρίζαν. ἡ δὲ ρίζα τὸν φλοιὸν ἔχει μέλαν, τὸ τοῦτον περιαιροῦσιν. ἔστι δὲ ὡς περὶ μέγα τῶν ριζοτομιῶν αὐτῆς, ἐξ ὧν ὁ πόσον ἂν διοκῇ συμφέρειν ταμιεύμενοι πρὸς τοῖς νομαῖς, τὸ δὲ ὑπάρχον τέμνουσιν. ἐκ ἑστὶ γὰρ

Nomina

Lib. 3. c. 78.

Forma.

Lib. 6. hist. cap. 3.

οὐτε παρατέμνιν, ὅτε πλεῖον τῶν τετραγμένων. καὶ γὰρ διαφθείρεται ἔσθιται τὸ ἀργὸν εἰς χρονίστην. Κατεργάζονται δὲ ἀγόντες εἰς τὸν περὶ τὸν δὲ τὸν τρόπον. ὅταν βάλλωσιν εἰς ἀγρία, καὶ ἀλδρα μίξωσιν, σείουσιν χρόνον συχνόν, ὅθεν καὶ τὸ χροῖμα λαμβάνει, ἔργασθὲν ἀσηπτον διαμένει. τὰ μὲν οὖν καὶ τὴν ἐργασίαν καὶ τομὴν ἔτι εἶχει. τόπον δὲ πολλὸν ἐπέχει τῆς Λιβύης. πλείω γὰρ φησὶν ἢ τετρακισχίλις (lege πλείω γὰρ φασὶν ἢ τετρακισχίλια σταδία, sic enim Plinius) τὰ πλείονα δὲ γενέσθαι περὶ τὴν σύρτιν, ἀπὸ τῶν εὐεσπερίδων (lege περὶ τὴν σύρτιν καὶ κήπον τῶν ἐσπερίδων. sic enim legitur in manuscriptis exemplaribus, & ita legendum suadet Plinius) ἰδίον δὲ τὸ φεύγειν γῆν ἐργαζομένην. καὶ δὴ σιμωργαζομένης, καὶ αὐτὸ σιμωμερουμένης ἐξαναχωρεῖν, διεομένου ὡς δὲ δηλονότι θεραπείας, ἀλλ' ὅντος ἀργίου. φασὶ δὲ οἱ Κυριωαῖοι φανῆναι τὸ Σίλφιον ἔτεσι πρότερον ἢ αὐτοὶ τὴν πόλιν ὤκησαν, ἑπτὰ. οἱ δὲ μάστιγα περὶ Ξιακόσια εἰς Σιμωνίδην ἀρχόντα Αθήνησιν. οἱ μὲν οὖν τὸ λεγούσιν. οἱ δὲ τὸ Σιλφίου τὴν ῥίζαν φασὶ γενέσθαι πηχυαῖαν, ἢ μικρῶ μείζονα. ταύτην δὲ ἔχει ἐπὶ τῷ μέσῳ κεφαλῇ, ὃ δὲ μετεωρότατόν ἐστι, καὶ χειρὸν ὑπὲρ γῆς. ἐξ ἧς δὴ τμηθείσης ῥεῖν γάλα· μεταταύη δὲ ἐκφύεσθαι τὸν καυλόν, καλεῖσθαι δὲ τὸν Μαγύδαριν, καὶ τὸ καλεῖσθαι φύλλον. τὸ δὲ εἶναι σπέρμα. ἔστι δὲ νότος λαμπρὸς πνεύση μετὰ κύνα διαρρίπτεσθαι ἐξ ὧν φύεσθαι τὸ Σίλφιον. (Quæ, cum ex iis quæ in vulgatis codicibus leguntur sensus idoneus vix elici possit, ex Plinio sic videntur emendanda. ἐξ ἧς δὴ τμηθείσης ῥεῖν ὅπῃ ὡς γάλα. μετὰ ταύη δὲ φύεσθαι τὸν καυλόν, καλεῖσθαι δὲ μαγύδαριν. ἐκ δὲ τούτου τὸ καλεῖσθαι φύλλον χρυσοειδές. τὸ δὲ εἶναι σπέρμα. καὶ ὅταν νότος λαμπρὸς πνεύση μετὰ κύνα, διαρρίπτεσθαι, ἐξ ὧν φύεσθαι τὸ Σίλφιον) τῷ αὐτῷ δὲ ἔτι, τὴν δὲ ῥίζαν γίνεσθαι, καὶ τὸν καυλόν. ὅθεν δὲ τούτου ἰδίον. ἔστι γὰρ τῶν ἄλλων. εἰ μὴ τοῦτο λέγουσιν, ὅτι εὐθὺς φύεται μετὰ τὴν ἐκκρίσιν, καὶ τὸ ἰδίον, καὶ διαφέρων τοῖς πρότερον. ἔτι (Sic enim legendum non ὅτι) φασὶ δὲ εἶναι ὁρτύττειν ἐπέτετον. εἰς δὲ εἰσθῆ, φέρει πᾶν τὸ σπέρμα, καὶ τὸν καυλόν. χεῖρ δὲ γίνεσθαι καὶ ταύτα, ἔτι τὴν ῥίζαν. ὁρυττομένης δὲ βελίτης γίνεσθαι διὰ τὸ μετὰβάλλεσθαι τὴν γῆν. ἐναντίον δὲ τὸ φεύγειν τὴν ἐργασίαν ἐσθίεσθαι καὶ τὰς ῥίζας προσφάτεις, καλενομένης εἰς ὄξος. τὸ δὲ φύλλον τῇ χροῖᾳ χρυσοειδές εἶναι. ἐναντίον δὲ καὶ τὸ καλεῖσθαι τὰ πρόβατα τὸ φύλλον ἐσθίοντα. φασὶ γὰρ καὶ τὸ ἦρος ἔτι χεῖμῶνος εἰς ὅρος ἀφίεναι. νέμεσθαι δὲ ἔτι τὸ καὶ ἕτερον ὅμοιον ἀεροδόνω. θερμαντικὸν δὲ ἄμφω δοκεῖ εἶναι. ἔτι θαρσύνει μὲν οὐ ποιεῖν ἀναξηραίνειν, καὶ συμπέπειν. εἰ δὲ τι νοσῶν, ἢ χροῖα ἔχον εἰσέλθῃ πρόβατον, ὑμάρζεσθαι ταχέως, ἢ ἀποθνήσκειν, ὡς δὲ ἐπὶ πολὺ σώζεσθαι μᾶλλον. ταύτα μὲν οὖν ὅποτέρως ἔχει σκεπτόμεν. ἢ δὲ καλεῖσθαι Μαγύδαριν ἕτερον ἐστὶ τὸ Σίλφιον (γένος deest, quod ostendunt Dioscorides & Plinius) μανθόρον δὲ καὶ ἡττον διρμυ, ἔτι τὸν ὅπῃ ἐκ ἔχει. διαδήλως δὲ ἔστι καὶ τῇ ὁψὲ καὶ τοῖς ἐμπείροις (sic enim legendum, non ἐμπύροις) γίνεται δὲ περὶ εὐρίαν, καὶ ἐκ ἐν Κυριῷ. φασὶ δὲ καὶ ἐν τῷ Παρνασίῳ ὅρῳ πολλὸν. ἔνιοι δὲ Σίλφιον τὸ καλεῖσθαι. εἰ δὲ φεύγει τὴν ἐργασίαν, ὥσπερ τὸ Σίλφιον, σκεπτόμεν. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ τι ὅμοιον ἢ παραπλήσιον ἔχει φύλλον δὲ περὶ, ἔτι καυλὸν, καὶ εἰ ὅλως ἀφίησιν τι διακρυσιν. Quæ Gaza sic interpretatus est. De Laserpitio nunc iudicandum est. Laserpitio radix multa crassâq; caulis quantus ferula, & crassitudine ferè proximus, folium quod Maspetum vocant, apio simile est, semen latum, foliaceum scilicet quod folium appellatur, caulis annuus sicut ferula. Ergo vere ineunte maspetum hoc exit, & pecus eo purgatur, pinguescitq; vehementer, & carnes mirabilem in modum suaves redduntur. Post hæc caulem edit hominum cibo idoneum omnibus modis elixum, assûmque corpora eo quoque purgari ferunt quadraginta diebus. Succus capitur duplex, alter ex caule, alter ex radice, qua de causa alterum scapariû, alterum radicarium vocant. Radix nigro cortice tegitur, quem detrahare solent. Sunt veluti certæ mensuræ cædendæ radicis, quibus quantum conferre putetur ad futuram cæsura referuantes, reliquum abscindunt. Nec enim de iis (alio pacto, fortè melius) neque plus constituto ordine cædere licet: corrumpitur enim putrescitque si diu mansit. (si in exercitatu aut iners diu mansit, ex Græco) Præparant id conficiuntque in Pyraum portum aduectum hoc modo. Cum in vasa coniecerint, farinamque admiscuerint, quatiunt crebrò & diu hinc etiâ colore capessit, & conditum iam

incor

incorruptum perdurat. Præparatio cæsuræque ita se habet. Locum Africæ amplum occupat, ampliore quàm quatuor stadiorum millia. In hortis hesperidum ferunt eius magnam partem colligi, sed maiorem apud Syrtes. Peculiare huius culta fugere loca proditur, quamobrem si colatur, mitescâtque solum, deuiat (in deserta fugit, rectius ex Plinio) atque omnino degenerat, utpote natura culturæ aspernans, ferocitatisque constans vernaculum (ferum ac contumax vertit Plinius) Cyrenenses annis septem prius quàm ipsi urbem habitarent, laserpitium exstitisse affirmant, habitant verò annos maximè trecentos usque ad Simonidæ Athenis magistratum. Illi sic referunt. Alij radicem laserpitij cubitalem esse tradunt, aut paulò maiorem. Hanc in medio extuberare in caput, quod sublime penitus extat, ut ferè supra terram esse appareat. Vnde (ἐξ ἧς sub. κεφαλῆς, id est, ex quo capite) primùm quod lac appellant erumpit, dein caulis assurgit, Magydarin vocant, ex quo nascitur id quod folium nuncupant, folium id semen est, quod cum auster ingenuè (λαμπρὸς, vehemens melius) post caniculam flauerit, disuicitur, atque ita laserpitium nascitur, eodémque anno radix consummatur & caulis. Sed hoc haudquicquam peculiare notatur, nam aliis quoque idem tribuitur, ni dixeris, quod disiectum id protinus nasci potest, ortum peculiarem sortiri, supradictisque propterea diuersum intelligi posse. Adhæc circumfodiendum id quotannis censent. Nam si cultura ea prætermittatur, semen vniuersum caulémque totum proferri, & deteriora tam hæc quàm radicem reddi existimant. Defossa autem fieri meliora scilicet solo subactò, benèque gluto. Sed huius contrarium illi volunt, qui culta recusare inquirunt (vel ex Græco, hoc autem repugnat eorum sententiæ, qui culta fugere volunt). Mandi quoque radices ex aceto recens decisas referunt, folium colore aurum æmulatur. Contrarium etiam quod pecora folio esitato purgari minimè iudicant (Sic vertendum ex Græco, Alienum etiam quod pecora folio esitato purgari narrant.) Nam & vere & hyeme pecus ad montem dimitti affirmant. Cibus non solum hoc, sed etiam altero quodam abrotono simili administratur. (Dilucidius sic, depasci verò à pecore non solum hoc, sed etiam alterum quoddam abrotono simile aiunt). Vim ambo calfactoriam sortiri planè videntur, & purgandi quidem vim non habere: exsiccare autem & concoquere vnicè posse. Quod si qua pecus ægrescens, aut alias minùs benè se habens ingressa sit, mox eam sanari, aut mori aiunt, sed magna ex parte posse seruari. Hæc igitur utro tandem sint modo, quærendum. Quod verò magydarin vocant, nimirum à laserpitio differt (legendum ut emendauimus, alterum est silphij genus) tenerius enim minùsque vehemens id sentitur, & sine lasere est, nec non & aspectu manifesta experto homini constat (Sic melius, Expertis verò vel ipso aspectu & figura planè dignoscitur). Nascitur in Syria, nam apud Cyrenem (non apud Cyrenem, ex Græco & Plinio) & monte Parnaso largè prouenire eandem affirmant. Sed quidam laserpitium id appellant. An culta quoque laserpitij modo fugiat, quærendum. Quin & si quid simile aut proximum habeat, ad folij caulisque rationem, & si quam vllò pacto emittat lacrymam id inuestigandum. His verbis Theophrastus laserpitij historiam luculentissimè exposuit, à quo Plinius hæc mutuatus est. Ab his proximum dicetur auctoritate clarissimum laserpitium, quod Græci silphium vocant, in Cyrenaica prouincia repertum. Cuius succum vocant laser, magnificum in usu medicamentisque, & ad pondus argentei denarij pensum. Multis iam annis in ea terra non inuenitur, quoniam publicani qui pascua conducunt, maius ita lucrum sentientes depopulantur pecorum pabulo. Vnus omnino caulis nostra repertus memoria, Neroni principi missus est. Si quando incidit pecus in spem nascentis, hoc deprehenditur signo: oue cum comederit, dormiente protinus, capra sternuente. Diuque iam non aliud ad nos inuehitur laser, quam quod

quod in Perside, aut Media & Armenia nascitur largè, sed multo infra Cyrenaicum, id quoque adulteratum gummi, aut sagapeno, aut faba fracta, quò minùs omittendum videtur C.Valerio, M.Herennio Cofs.Cyrenis aduecta Komam publicè laserpitij pondo.xxx.Cæsarem verò Dictatorem initio belli ciuilis, inter aurum argentumque protulisse ex ærario laserpitij pondo c x i. Id quod apud auctores Graciæ euidentissimos inuenimus natum imbre piceo repente madefacta tellure, circa Hesperidum hortos Syrtimq; maiorem, septem annis ante oppidum Cyrenaicum, quod conditum est vrbs nostræ anno c x l i i i. Vim autem illam per quatuor millia stadiûm Africæ valuisse. In ea laserpitium gigni solitum, rem feram ac contumacem: & si coleretur in deserta fugientem: radice multa crassâque, caule ferulaceo, haud simili crassitudine. Huius folia maspetum vocabant, apio maximè similia. Semen erat foliaceum, folium ipsum vere deciduum (Theophrasto, nascens.) Vesca pecora solita, primòque purgari, mox pinguescere, carne mirabilem in modum iucunda. Post folia amissa, (rectius emissa,) caule ipso & homines vescebantur decocto, asso, elixòque: eorum quoque corpora quadraginta primis diebus purgante à vitiis omnibus. Succus duobus modis capiebatur, è radice atque caule. Et hæc duo erant nomina, rhizias, atque caulias, vilior ille ac putrescens. Radici cortex niger, & ad mercis adulteria. Succum ipsum in vasa coniectum, admisto furfure, subinde concutiendo ad maturitatem perducebant, ni ita fecissent, putrescentem. Argumentum erat maturitatis, color, siccitasque sudore finito. Alij tradunt laserpitij radicem fuisse maiorem cubitali, tuberque in ea super terram. Hoc inciso profluere solitum succum ceu lactis, supernato caule, quem magydarim vocarunt, folia aurei coloris pro semine fuisse, cadentia à canis ortu, austro flante. Ex his laserpitium nasci solitum, annuo spatio & radice & caule consumantibus sese. Hoc & circumfodi solitum prodidere, nec purgari pecora, sed ægra sanari, aut protinus mori, quod in paucis accidere. Persico (rectius, Cyrenaico.) silphio prior opinio congruit. Alterum genus est quod magydaris vocatur, tenerius & minùs vehemens, siue succo: quod circa Syriam nascitur, non proueniens in Cyrenaica regione. Gignitur & in Parnaso monte copiosius, quibusdam laserpitium vocantibus: per quæ omnia adulteratur rei saluberrimæ utilissimeque auctoritas. Probatio sinceri prima, in colore modicè rufo, & cum frangitur, candido intus, mox translucente: gutta aqua saliuâq; liquefcit. Vñus in multis medicaminibus. Hæc Plinius. Strabo succi Cyrenaici defectus causam in Barbaros non in publicanos reiicit his verbis. Cyrenis finitima est regio quæ silphiû gignit, & Cyrenaicum succum, quem silphium posterius effert vertendum quem liquorem Silphium fundit. Interpretes enim non viderunt eo loco ὁπωθεν ἀπὸ τῆς ὀπιζῆν duci, nec aduerbium esse. Idem Strabo lib.15. scribit Alexandro ab Arachosia transeunti ad Bactrianos per iter nudum arboribus, copiosissimum Silphium occurrisse. Id propemodum defecit, cum aliquando Barbari odio quodam ingruissent, ac radices eius pene omnes eruisent. Ex hac varia apud veteres Silphij historia, iudicatu perdifficile est quamnam sit hodie planta quæ laserpitium dici possit. Attamen Pena quantum inspectione assequi potuit, id candidis lectoribus impertietur his verbis. E regione Massiliæ, inquit, & non procul insulis quas videtur Dioscorides vocasse Stœchadas, inter multas raras plâtas nascitur ferulacea & visenda plâta, cuius radix prægrandis, intus alba, foris cineritia, succo prægnans mollis, pinguis, odorata, maior quàm thapsiæ aut ferulæ: caulis proceritate & crassitudine ferulam æquat, folia Eleoselini, sed crassiora, rigidiora. Umbellæ prægrandes, ferulæ, aut latiores quàm anethi, semen angelicæ foliaceum, rotundum, compressum, odoratum, colore buxæo, quam hic expressimus. Nec minor est de silphij succo inter rei herbariæ studiosos ambiguitas & controuersia, aliis contendentibus

Geograp.
lib.vlt.

Laserpitium
è regione
Massiliæ re-
pertum.

LASERPITIVM,

Pena.



dentibus gummi illud odoratum quod belzuinum siue benzoinum vocatur laser esse aliis negantibus, quoniam laser ferulaceæ plantæ, belzuinum arboris proceræ multò suavisimū sit excrementū, tum etiam quod belzuini qualitates facultatēque, de quibus idoneo loco tractabimus, minimè sint eadem quæ laseris.

Eas verò Dioscor. sic declarat. Radix calefacit, agrè concoquitur, vesicam lædit, sanat strumas & tubercula cerato excepta, & sugillata cū oleo imposita. Ischiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato, eminentias circa sedē cum mali corio in aceto cocta ac imposita tollit, letalibus medicamentis pota resistit. Eadem origata est, si ad salem & intinctus admisceatur. Succus cyrenaicus etiam si quis paululum de ipso gustet, sudorē toto corpore mouet, & odoris leuissimi est, adeò vt gustanti neque os nisi paululum spiret. (Sic enim hæc Græcè leguntur, ὁ μὲν τοι κυρηναῖος κἀνὲπ' ὀλίγον τις αἰθὼν γεύσῃσιν, ἱκμάδα κινεῖ χεῖρ' ὅλην τὸ σῶμα. τῇ τε ὁσμῇ προσηνέστατος, ὥστε γούσμεναι τὸ σῶμα μηδὲ πνεῖν, εἰ μὴ ἐπ' ὀλίγον. Quæ longè aliter vertēda censet

Lib. 3. c. 78.
Vires &
Temper.

And. Lacuna hoc modo. Cyrenaicus liquor, si ex eo vel tantillum quispiam gustarit, statim per totum corpus quendam madorem excitat, adeoque leni odore solet demulcere delinirēque gustantem, vt quandiu eo fruitur, nihil prorsus aut perexiguum respiret, &c. Siquidem, inquit Lacuna, quemadmodum vñ venit, vt dum cernimus paulò attentius formam aliquam spectabilem, tamdiu cohibeamus respirationem, donec animus exsatiatus per oculos tali obiecto, sese ad perficienda sua munia conuertat, sic etiam dum aliquid grati atque exquisiti saporis nostro occurrit palato, aliquandiu supersedeamus à respirando, quod videlicet respiratio ipsa, vt est necessaria olfactui, ita gustui aduersetur, quodammodo exoluens ipsum atque præpediens. Id quod videtur eo in loco monuisse Dioscorides). Medicus & Syriacus viribus debiliores sunt, & magis virosum odorem reddunt. Est succus flatuosus & acris, curat alopecias cum vino, pipere, & aceto illitus. Acuit visum, & incipientem suffusionem dissipat cum melle illitus. Ad dentium dolores inditur cauernis, & cum thure in linteolo circumligatur, colluitur cum hyssopo & ficis coctis in posca. Prodest in rabiosi canis morfu vulneribus impositus, & contra omnia animalia venenum ei aculantia, & contra sagittas venenatas tum potus tum illitus. Scorpionum plagis oleo dilutus oblinitur. His quæ in gangrænam transeunt prius scarificatis infunditur, carbunculis cum ruta, nitro, & melle, aut per se imponitur. Clauos & callos prius circumscarificatos tollit præmollius cerato, aut aridorum ficuum carne: recentes lichenas ex aceto sanat: excrescentem carnem & polypos cum chalcantho (vetus codex habet, μετὰ χαλκὸς ἀνθρῆς, id est, cum flore aris) aut Erugine per dies aliquot illitus: extuberantia cum forfice extrahit. Auxiliatur & diuturnæ gutturis asperitati, vocēque repentē exasperatam aqua dilutus, & absorptus statim expurgat. Columellas cum melle illitus reprimit. Anginis ex aqua mulsa vtilissimè gargarizatur. In victu sumptus coloratiores reddit. Tussi commodè in forbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus, ictericis, & hydropicis vtiliter cum aridis ficis. Soluit & rigores cum pipere & thure in vino

potus

potus (habetur in veteri non cum thure, sed *συν ῥιγάνῳ*, hoc est cum ruta) Tetano & opisthotono detentis oboli pondere cera oblitus deuorandus datur. Hirudines gulæ adhærentes si cum aceto gargarifetur, auellit. His qui lac in grumos concretum intus habent, & comitialibus cum aceto mulso sumptus opitulatur, menses ciet cum pipere & myrrha potus, coeliacos adiuuat in acino vuæ sumptus. At cum lixiuio potus, conuulsa & rupta repente sanat. Dissoluitur in potiones amygdalis amaris, aut ruta, aut calido pane. Cæterum foliorum succus eadem præstat, sed multò inefficacius. Editur hic cum aceto mulso ad expediendam arteriā, maximè in voce retusa. Hæc Dioscorides. Plinius etiam vsum silphij medicū multis verbis exponit, multa ex Dioscoridis sententia præscribens, in eo præsertim dissidens medicamēto, quod ad dentium dolores facit, ait enim, Non censuerim quod auctores suadent, cauernis dentium in dolore inditum cera includi, magno experimento hominis qui se ea de causā præcipitauit ex alto. Quippe tauros inflammant naribus illitis: serpentes auidissimas vini admistum rumpit. Ideo nec inungi suaferim cum Attico melle, licet præcipiant. Hæc Plinius. In hoc tamen medicamento Dioscorid. nō cera, sed thure includit. Breuius sic Galenus Silphij liquor calidissimus est, imo & folia, & caulis & radix sat strenuè excalfaciunt. Sed omnia flatulentæ magis essentia sunt, ac proinde coctu difficilia: foris tamen imposita corpori efficaciora, & omnium potissimum liquor, admodum trahentem facultatem habens, attamen & excrescentias amoliendi, & liquandi vim quandam propter propositam temperiem obtinet. His omnibus, præsertim viribus diligentius perpēsis atque examinatis, planè assentiendum iis, qui Asam Laserpitum esse censent, quod vt variis nomenclaturis Græci Silphium plantam vocarunt, eius folia maspeton, caulem Magydarin, semen φύλλον, & Latini succū Laser, quod Officinæ balbutientes Asam pronuntiant: sic Arabes plantam appellarunt *Aniuden*, & *Angeiden*, succum verò *Altiith* & *Antit*, Auicennas etiam *Almharut*, Indorum populi & *Imgu*, & *Imgara*: quamuis interdum *Altiht*. succi nomen plantam etiam significet, vt Serapioni, qui sub hac appellatione historiam Laserpitij Græcorum tradidit. Laser duplex etiamnum Indis cognoscitur: alterum sincerum & pellucidum, coloris puri, electro similis, odoris validioris, maioris pretij, quod ex Guzarate, Patane, Mandon, Chitor, Dely regione admodum frigida, & ad Chiruam usque protensa afferri putant: alterum impurum & turbidū, minus odoratum, quod ex Corasone Ormusium Persiæ conuehi narrant, atque in Pegu, Malacam, Tanafarim, & prouincias vicinas, illinc portari. Sincerum Baneanes Cambayæ olim Philosophi, nunc mercatores ab animalium esu abstinentes, quod institutum secutus est Pythagoras, pro suarum facultatum modo comparant, ac suis iusculis & oleribus immiscent, confricato primū eo lebate, nec alio condimento in cibis vtuntur, sapore ipsis & odore iucundo, nec aliis quamuis inassuetis, fastidiendo. Gustus eius non nihil amarus principio, vt oliuæ conditæ, deinde si diutius mandatur, valdè gratus. Impuro baiuli & tenuioris fortunæ homines qui solo pane & aqua vitam plerūque tolerant, tum ad medicinam vtuntur, tum ad condimentum, pretij magnitudine deterriti, ne sincerum emant. Sordidum id Baneanes, qui rationem tractandarum & interpolandarum hoc genus mercium callent, defæcant, & purgant, nec nisi ea diligentia curatum in cibos admittunt. Laseris usu ventriculum roborari, discutiq; flatus Indis persuasum est, tum etiam venerē concitari. Solent & cum dētes erosi dolent, ad cruciatum leniendum cauernis eorum indere. Narrauit quidam mercator Indus Garcia, ex cuius historia nos hæc transcripsimus, Laser è caule plantæ inciso elici, cuius folia corylo similia sint, id quod ab Angelicarum nostrarum foliis non ita discrepat, si auulsa seorsum singula contempleris, nulla situs ordinis ve ratione habita. Addebat & mercator ille, collectū

Laſer in corium bubullum illitum ſanguine cum farina tritici permixto, incolas prouinciarum apud quos Laſerpitium naſcitur, conicere, vt melius atque diutius conſeruetur, atque ideò ſi quid in laſere fabæ lomento ſimile cõſpiciatur, non vitium adulterati hoc eſſe, ſed inditium potiùs bonitatis & puritatis. In Officinis noſtris duo Laſeris genera viſuntur: alterum frequentius, vilius, colore rufo, gummoſis offis, laxis, non ſolidis, guſtu principio amaro, deinde acri, vehementiori acrimonia quàm in altero genere, diutius in ore & faucibus perdurante, odoris ingratioris: alterum rarius & commendatius, colore ad flauum magis inclinãte, denſius & compactius, intermixtis micis quamplurimis candicantibus, ſimilibus amygdalarum fructulis exutis cortice ſuo, ammoniacive guttis lacteis, quamobrem Amygdalatum Laſer inſtitores vocant, guſtu minus amaro & acri, odoris leuioris & ſuauioris. Vtrũque pertentans cum guſtaſſem, frigido cœlo & flante Borea, poſt exiguam ambulationem mador ſtatim per corporis trũcum, brachia & caput diſfuſus eſt. Accidit & paulò poſt prandenti mihi, vt vix vnquam libentiùs cibum ſumpſerim, quæ Laſeris viribus apud Dioſcoridem omnia congruunt. Quare rectè ſcribit Garcias vehementer errare eos qui Aſam fœtidam & Laſerpitium diſferre putant, quod Laſerpitium veterum in cibos admiſſum eſſe aiunt, Aſam verò fœtidam medicamentis ſolùm vtilem, idque raro: in cibis verò planè damnari ob tetrum odorem: quia nullum medicamentum ſimplex per totam Indiam maiore eſt in vſu quàm Aſa fœtida, tum in medicina, tum in condiendis cibis.

Lib. 1. Aro.
In cap. 3.

S P O N D Y L I V M.

C A P. X X I I.

Sφονδύλιον Græcis, & Latinis Sphondyliũ & ſpondylium dicitur. Fortaſſe ob odoris grauitatem, à ſpondyle infecti genere, odoris grauis, vt Pena tradidit. Sed parum hic digredi libet, & Lectori ex Dalechampio indicare, quod cuius fortaſſe notũ non eſt. Sphondyle, ſiue Spondyle Theophraſti, mi-

Nomina
Lib. 3. c. 74.
Forma.

Lib. 9. hiſt.
cap. 14.

S P O N D Y L I V M, Matth.



nimè ſerpens eſt, vt Plinius credidit lib. 27. cap. 17. ſed vermis in terra profundius deliteſcens, inſtar blattæ flexuoſus, mouens ſeſe quaſi vertebris, aluo candida, rubeſcente parte quæ capiti proxima eſt, atque inde naſcentibus vtrinq; pedibus quatuor, ore nigro, dentibus firmiſſimis, quibus radices vitis præcipuè, rodit, arborũque nedum herbarum. Lugdunenſes ruſtici vocant *Vn Turc*, quaſi Turcam. Huic ſubiungere duo alia plantis malefica & infeſtiſſima animalia alienum non fuerit. Vnum eſt quod Praſocouris à tondenda radice porri vocatur. Lugdunenſes *Courterole*, ἀπὸ τοῦ κουρῆν nomen indiderunt: cæteri Galli *Taillepré*, quaſi Pratife- cam nominant, quod etiam herbarum in pratis naſcentium radices proſcindat. Alterum muſ exiguus, pilo fuſco, roſtro acuto, vt talpa & muſ araneus, cæcus vt talpa, & perinde terram ſuffodiens, cauda curta, olitorum inimi- ciſſimus hoſtis & inſidiator, vt qui carduorum & cinararum radices occultus depaſcatur. Ruſtici vocant *Ratecourte* quaſi βραχυὸν μῦν. Redeamus nunc ad ſpondylii hiftoriam. Herba eſt,

Lib. 3. c. 74. inquit Dioscorides, folia habens platano quadantenus similia, ad Panacis folia accedentia, caules cubitales aut etiam maiores, fœniculaceos, semen in cacumine simile fœseli, duplex, sed latius & candidius, & magis paleaceum, & grauis odoris: flores albos, radicem albam, raphano similem. Nascitur in palustribus & aquosis locis. Penę & Lobellio Panax Heracleum, Heraclea fronde Smyrniij vel Imperatorię.

Locus.

Lib. 12. c. 26

Plinius vbi de Panace egit, Ab hac ferula, inquit, differt quę vocatur Spondylium

SPONDYLIVM,

Vulgare.



Ca. 25. hist.

foliis tantum, quia sunt minora, & platani diuisura, non nisi in opacis gignitur. Semen eodem nomine filis speciem habet, medicinę tantum vtile. Planta hęc depicta Matthioli Spondyliũ est, in montiũ pratis vliginosis copiosum, folio platani aut panacis, caule fœniculi, cubitali & maiore, in cuius cacumine umbella candidis floribus referta, ę quibus semen prodit fœseli non absimile, latius tamę & squamosum, sapore iniucundo, vt quod cimices ferme resipiat. Radix alba, raphani æmula, gustu non ingrato. Spondylium vulgare Penę, Lobellij, Dodonæi & Dioscoridis Anguillarę est Acãthus Germanica Fuchsiij. Passim & sponte nascitur, caule bicubitali, rotundo, subhirsuto, foliis similiter nonnihil hirsutis & asperis, ex pluribus ac sæpenumero quinque cohærentibus, & exiguis per ambitum & profundioribus incisuris diuisis, ficulnea ferę referentibus, sed minoribus, flores in umbellis candidi, semen latum, planum, tenue, radix in plures distributa candicat. Huic similem ostendit Dodonaus pro Spondyljo altero, de qua Cap. De Panace differemus. Semen spondyliij potum, auctore

Lib. 3. c. 54. Dioscoride, pituitosa per aluum excernit, sanat etiam potu hepaticos, ictericos, orthopnoicos, epilepticos, & vteri strangulationem. In profundum somnum delatos suffitu reuocat, cum oleo commodę infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus, cohibet etiam herpetas cum ruta illitum.

Vires & Temper.

Radix datur ictericis & hepaticis. Dersa & indita fistulorum callos consumit. Recentis floris succus ad vlceratas purulentasque aures conuenit. Eundem spondyliij vsum præscribit Plinius his verbis. Sphodylium infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum: item capitis doloribus longis. Cum oleo vetere bibitur, & in iocinorum vitiis, morbo regio, comitialibus, orthopnoicis, vuluarum strangulatione quibus & suffitu prodest. Aluum mollit. Illinitur vlceribus serpentibus cum ruta, flos auribus purulentis efficaciter infunditur. Radix dersa & in fistulas coniecta, callum earum erodit. Auribus quoque instillatur cum succo. Datur & ipsa contra regium morbum, & in iocinoris vitio & vuluarum. Capillos crispas facit peruncto capite. Galenus verò facultates ita tradit. Spondyliij fructus atris & secantis est facultatis. Quare ad asthma & morbum comitalem aptum est medicamentum, prodest & ictericis. Radix similis facultatis ad eadem conuenit, sed & insuper fistularum callos tollit, sed imponere eam circumrasam oportet. Porro flores etiam succus ad diuturniora aurium vlcera conueniens reponitur.

Lib. 24. c. 6.

Lib. 8. sim.

CORIANDRV M. CAP. XXIII.



Κόριον Græcis & κορίανον, Latinis etiam Corion & Corianum, vulgò *Nomina*
& Officinis Coriandrum, Arabibus *Cusbor, Kusbero, & Kuzbara*, Italis
Coriandro, Germanis *Coriander*, Hispanis *Culanthro*, Gallis *Coriandre*. Corio
nomen fecisse cimices verisimile est, quos folia & caules eius olent:

CORIANDRV M

Satiuum, Matth.



CORIANDRV M Alterum
minus odorum, Lobell.



κόπος enim Græcis id insecti genus est, quod Latinis Cimex dicitur. Dioscorides & alij veteres Coriandri vnus duntaxat meminere, & Theophrastus Corianum in iis numerat, quibus generis diuersitatem deesse scribit Plinius quòq; Coriandrum inter siluestria inueniri negat. Tamen Nicandri Scholiastes duo Coriandri genera posuit, vnum satiuum, alterum siluestre, quod Myconus medicus Barcinonensis peritissimus vnà cum raris aliis plantis depictum & descriptum ad nos misit. Coriandro fatiuo caulis est exilis, rotundus, ramosus cubitalis aut sesquicubitalis, folia candicantia, multū incisa, inferiora seu primū erumpentia cerefolio aut apio proxima, superiora & quæ in caulibus sunt, tenuiora & magis diuisa: fumariæ similia: flores in vmbellis candidi, ex quibus racematim semē oritur, rotundum, cauum, striatum. Radix est breuiuscula, lignea, neq; admodum fibrata. Totus plantæ foetidus est ac cimicum odor, at semē siccum odoratum redditur, & ad multa vtile. Alterum, minus odorum pinxit Lobellius, ima folia habens multum incisa, & semen habet ius, copiosum, in pluribus spita-
meis procumbētibus cauliculis. Alitur in hortis. Siluestri coriano radix est singularis, tenuis, non altius demissa, cui radiculæ aliquot tenues adnascuntur. Hæc caules multos edit, quinq; angulis constantes, solidos, geniculatos, ramuli incerto ordine similiter solidi è singulis geniculis prodeunt, folia ferentes summis prioris Coriā dri foliis similia, sed minora, in quorum cacuminibus vmbellæ veluti in altero coriandro, floribus ex purpureo candicantibus refertæ, quibus discussis semen oritur rotundum, id peculiare habens, quod in singulis pediculis duplex sit, atq; vnum alteri iunctum. Odor totius plātæ grauior quàm satiui Coriā dri, & caput magis tentans. Nicandri Scholiastes istud siluestre fatiuo simile depinxit, sed latioribus foliis, & multò longius, multa habens adnata, multas radices, multosque flores. Cuius cum latiora folia esse dicat, soli naturæ id tribuendum censet Myconius, qui minora huius folia depinxit. Nascitur locis quadantenus sic-

Genera.

Lib. 7. hist. cap. 4.
Lib. 20. ca. 20.

Forma.

In Alexip.

Locus.

CORIANDRVM

*Silueſtre, Myconi.**Tempus.**Lib. 3. c. 62.**Vires &**Temper.**Li. 20. c. 20.**Lib. 7. sim.*

cis, marginibus & limitibus terrenis. Vberius tamen pullulat, & altius adoleſcit ſolo humidiore. Satiuum non niſi ſatum prouenit, & terram amat pinguem Palladio teſte. Sed & macro ſolo naſcitur. Iulio & Auguſto mēſibus floret, autumno dum ſemine pręgnans eſt, carpitur. Deinceps de Coriandri viribus eò diligentius diſſerendũ, quo maior eſt de iis inter probatiſſimos auctores cōtrouerſia. Primum Dioſcorides auctor eſt id refrigerandi vim habere. Quare illitum cum pane aut polenta eryſipelata & herpetas ſanare: item epinyctidas, teſtiũ inflammationes, carbunculõsque cum melle & vua paſſa: cum faba freſa ſtrumas & tubercula diſcutere. Lumbricos ſemen cum paſſo potum pellere, & genituram augere, largius autẽ ſumptum mentem nõ ſine periculo mouere, quapropter copioſiorem & continuum eius uſum cauere oportere. Succum cum ceruſſa & lithargyro, nec non aceto & roſaceo illitum, ar dentes in ſumma cute inflammationes iuuare. Hęc Dioſcorides. Quibus cõſentaneã ferẽ ſcribit Plinius hiſ verbis. Coriandrum inter ſil-

ueſtria non inuenitur. Pręcipuum tamen eſſe conſtat Aegyptium: valet contra ſerpentium genus vnum, quod Amphibænas vocant, potum impoſitũve. Sanat & alia vulnera: epinyctidas, puſtulas tritum. Sic & omnes tumores collectioneſque cum melle aut vua paſſa, panos verò ex aceto tritum. Seminis grana tria in tertianis deuorari iubent aliqui ante acceſſionem: vel plura illini fronti. Sunt & qui ante ſolis ortum ceruicalibus ſubiici efficaciter putent. Viſ magna ad refrigerandos ardores viridi. Vlcerata quoque quę ſerpunt ſanat cum melle, vel vua paſſa: item teſtes, ambuſta, carbunculos, aures: cum lacte mulieris epiphoras oculorum: ventris & inteſtinorum fluxiones ſemen ex aqua potum. Bibitur & in choleris cum ruta. Pellit animalia interaneorum, cum mali punici ſucco & oleo ſemen potum. Xenocrates tradit rem miram ſi vera eſt, menſtrua contineri vno die, ſi vnũ granum biberint fœminæ, biduo, ſi duo, & totidem diebus quot grana ſumpſerint. M. Varro Coriandro ſubtrito cum aceto carnem incorruptam æſtate ſeruari putat. In quibus duo potiſſimum tanquam abſurda reprehenduntur. Vnum quod refrigerandi vi Coriandrum præditum eſſe, alterum quod ſtrumis prodeſſe aiunt, quę calidis & digerentibus, minimẽ verò frigidis curantur. Quare ſic ſcribit Galenus. Vetuſtiores Græci Corianum nominant, recentiores omnes medici Corion, ſicut & Dioſcorides, refrigeratoriã eſſe herbam dictitans, ſed perperam. Siquidem ex contrariis conſtat facultatibus, plurimũ habens amaræ eſſentiæ, quam oſtendimus eſſe tenuium partium & terrenarum, nec modicum etiam aqueæ humiditatis obtinet, quę eſt facultatis tepidæ. Habet autem & adſtrictionis pauxillum. Ex quibus omnibus variẽ quidem agit ea quę ſcribit Dioſco. & non tantũ ex refrigeratione. Quibus aliquanto poſt ſubiicit. Itaque ne id quod refrigerato iam eryſipelati auxilio eſt, refrigeratorium eſſe credamus, ſicut Dioſcorides Corianum, quod vt ipſe ait, cum pane aut polenta illitum eryſipelas ſanat. Nam quod exquiſitum eſt eryſipelas, & iam vtiq; inflammatum & flauum nequaquam cum pane ſanabit Corianum, ſed illud quod iam refrigeratum eſt. Porro quod longe à refrigeratione

geratione absit Coriandrum, vel ex iis quæ ipse Dioscorides scripsit discere licet. Nam strumas, inquit, cum faba fresa discutit. Quod verò nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit discutiendis strumis, vel ipsum Dioscoridem non dubitare arbitror, ut qui sexcenta scripserit medicamenta strumas sanare potentia, quæ omnia temperie calida & actionibus digerentia esse confessus est. Haftenus Galenus. Cui apertè refragatur Auicennas his verbis. Scripsit Galenus Coriandrū Lib. 2. c. 143 diuersis facultatibus constare, nempe terreum in eo cæteris excellere, esse simul & in eo quādam aqueam tepidam, & aliam adstringentem pauxillum. At mea quidē sententia, aquea ipsius qualitas frigida est, non tepida, nisi & forsan admisceatur aliquid exalfacientis substantiæ, quæ ab eo confestim euanescat. Quapropter dixit Hunaym, remouet Galenus frigiditatem à Coriādro, & contradicit Dioscoridi. At id Archigenes, Rufus & alij posteriores frigidum esse testati sunt, frigidum igitur est in fine primi ordinis vsque ad secundum: siccum in secundo. Ego verò sentio siccum esse, & ad caliditatem exiguam vergere. Galenus verò censet ex omni parte calidum esse, quod fortasse ipsum dixisse putandum, ob tenuem quandam ipsius caliditatem, quæ dum bibitur aut editur, facilè dissoluitur. Aliter enim non necesse foret, si homines necat frigiditate sua, multam succi eius quantitatem exhiberi. Quibus paulò post subiicit Auicennas. Inquit Galenus, si Coriādrum strumas dissoluit, quomodo frigidum erit? Cui respondeo, Potest Coriandrum id agere occulta quadam qualitate aut forma, aut quod in eo tenuis quādam insit facultas, quæ in profundum penetrare possit, frigida exterius relicta. Sed cum bibetur, caliditas illa resoluitur, quo fit ut sola frigida remaneat, & in corpora agat. Hæc Auicennas non sine ratione. Quæ, ut tota lis dirimi, statuiq; certi aliquid de iis possit, distinguenda, & diorismis explicanda videntur hoc modo. Coriandri herba tota, aut semen vsu frequenti in medicina vsurpatur, & ea quidem aut arida, aut virens adhuc. Iam verò multiplici experimento, & antiquorum certissima obseruatione compertum est, eius expressum succum, aut herbam confusam illitu tumorum feruores compescere, semen multis de causis stomacho perutile, præsertim siccum, concoctionem iuuare, vaporum sursum eruptionem, flatuūq; impetum sistere, temperatæq; qualitatis alimentum esse: vnde ad sanguinis seminisque incrementum, ac ne quidem correctum prodesse, ut immerito eius vsum quidam damnent, vehementerque illos errare scribant, qui eo tam frequenter ad roborandum caput cui insensissimum est, vtantur, cum pharmacopoli aut etiam plebecula, quotidianis epulis aut medicamentis correctum misceant, nullo vnquam cuiuspiam detrimento. Plerumque etiam illud saccharathum Officinarum neutriquam correctum est, nisi putes saccaro igneque. Igitur non aceti frigiditate, sed feminis siccitate & tenuitate, virus foetidūque spiritum abstergi putandum. Quare Coriandri herba præsertim succo frigida est, ideoque nonnullis in locis, Arabiū testimonio, eius succus epotus exitio est, quod de Hiurca siue Iucca Americæ recentiores etiam exploratum habent. Herba etenim vesca est, & boni alimenti, succus hominem necat. Quapropter & erysipelatis illitus Coriandri succus reprimet inflammationem exceptus polenta aut panis medulla, quam Galenus haud reiiciet, ut qui, libello de paratu facilibus, ex antiquis doceat hordei farinam, polentam, panem & similia addi solita, non tam ut agant, quàm ut succorum qui agere debent vires excipiant. Tamen si videntur etiam iuuare digerendo & siccando, ut hordeacea, aut etiam demulcendo, ut panis medulla. Atque hinc responsio eruenda de strumis. Multa namque sunt minimè calida, quæ strumas incipientes discutere valent: eoque hic farinam fabæ fresæ addi vult Dioscorides, tum excipiendo medicinam, tum iuuando actionem, digerit enim faba, &

Pena in
Ad. fol. 314.

- cum Coriandri succo mixta moderatè repellit exsiccando, quæ etiam vi phlegmonas testium iuuat. Sicca enim id optimè præstare, modo modice refrigerent, & discutiant, præsertim initio, methodus Galeni docet. Sic plantago etiam Dioscoridi, sic capilli veneris strumas discutunt. Addi potest & his strumarum varietas, quæ interdum sunt genera phlegmones, exquisitæ, spurixve, ac ideo talia remedia postulant. Quod verò Dioscorides scripsit semen Coriandræ largius sumptum non sine periculo mentem mouere, id Auicennas de succo tradit, qui vnciarum quatuor pondere potus interficit: tristitiâ enim adfert & syncopen parit. Denique à liberaliore eius vsu abstinendû. Sed Diosc. de semine recenti & viridi intellexisse videtur, qui & alibi dixit generatim Coriandrum potû vocẽ exasperare, & insaniam inducere similẽ iis, qui ex ebrietate læsi sunt. Præterea scribit Dioscor. Coriandri semen genituram adaugere, contra Auicennas, quod ex eo humidû est, & quod siccû, inquit, frangit virtutẽ coitus, & erectionẽ virgæ desiccando sperma. Et Serapio ex auctoritate Alcanzi ait: Quando Coriandrû siccû infunditur in aqua, & bibitur aqua eius cum saccharo, abscindit erectionem virgæ, & desiccatur sperma.

PANACES.

CAP. XXXIII.

Nomina



RAECIS *πάνακες* & *πάναξ* dicitur, Latinis Panaces & Panax, nomen multis plantis cõmune, quæ neq; facie inter sese, neq; viribus similes sunt, magnæ tamẽ ad morbos cõmendationis, quod plurimis scateat remediis, à *παν* & *ἄκος*, id est, ab omni medela siue remedio nũcupatæ.

Lib. 3. c. 48.

49 & 50.

Genera.

Lib. 9. hist.

cap. 13.

Lib. 3. c. 48.

Forma.

Locus.

Lib. 1. c. 49.

Lib. 9. hist.

cap. 12.

Lib. 3. c. 50.

Ibidem.

Dioscor. tria Panacis genera descripsit, *ἡράκλειον*, id est, heracleum, siue herculeum, Arabibus *Steusir*, *Ieusir*, siue *Giausir*. *Ἀσκληπιόν*, vel *Ἀσκληπίς*, id est, Asclepium, siue Asclepij, vel Aesculapij, Arabibus *Panax asclibet*. Panax *Χιρώνιον*, Chironiũ, Arabibus *Panax Caronion*. Theophr. quatuor, primũ quod in Syria nascitur, alterũ Chironium, tertiũ heracleũ, quartũ Asclepiũ. Quibus explicatis subiicit. Ἄλλα ὃ *πανάκη*, τὸ μὲν λεπτόφυλλον, τὸ δὲ παχύφυλλον, &c. Id est, Sunt & alia Panacis genera, alia tenuifolia, alia crassifolia. Panax heracleum, auctore Diosc. foliis est asperis, in terra iacentibus, valdè viridibus, ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinq; partito diuisis, caule vt ferulæ, altissimo, qui lanuginẽ habet albam, & folia circa se minora, vmbellã ceu anethi in cacumine, longã, florem luteũ, semen odoratũ feruensque: radices ex vno principio multas, cãdidas, graueolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ & Macedonia. Theophr. sic describit. Τὸ ὃ *ἡράκλειον* φύλλον μὲν ἔχει μεγάλα, καὶ πλατὺ, καὶ τρισὺν ἑκατὸν πανταχῇ. ῥίζαν δὲ ὡς δακτύλου τὸ *πάχος*, διικρανῇ ἢ τρικρανῇ, τῇ γὰρ ὁ μὲν ὑπόπικρον, τῇ δὲ ὁ σμῆν καὶ θάπτερ λιβάνω τῷ καθαρώς. Id est, Gaza interprete, Panax herculeũ folio constat magno & amplo, vt quoquo versus tres palmos pficiat, radice crassitudine prope digiti, bifida aut trifida, gustu subamara, odoratu sincerum thus redolente. Panaces verò Asclepium sic delineat Diosc. Caulem è terra emittit tenuem, cubitalem, geniculatũ, circa quem folia fœniculo similia, maiora tamẽ & hirsutiora, odorata: & in cacumine vmbella in qua flores aurũ referentes, acres, odorati: radix est parua, cũ quibus Theophr. descriptio non omnino conuenit. τὸ δὲ *Ἀσκληπιόν*, inquit, τὴν ῥίζαν μῆκος μὲν ἔχει ὡς σπιθαμὴν, λακκὴν δὲ καὶ παχέϊαν σφόδρα, καὶ φλοιὸν παχὺν, καὶ ἀλικώδη. καυλὸν δὲ ἔχει γονατώδη πανταχόθεν, φύλλον δὲ ὅμοιον τῇ θαψία, πλὴν παχύτερον. Id est, Asclepiũ cõstat radice magnitudine palmi, candida, & crassa vehemẽter, cortice crasso & falso, & caule geniculato vndiq; folio Thapsiæ simili, sed crassiore. Panaces chironiũ, ita tradente Diosc. in Pelio monte maximè prouenit. Folia autẽ habet amaraco similia, florẽ aureum, radicem tenuem & non profundam, gustu acrem. Neque his consentiunt, quæ de eodẽ Panace Theophr. literis prodidit. ἔχει δὲ τὸ μὲν *Χιρώνιον*, φύλλον μὲν ὅμοιον *λεπάθω*, μείζον δὲ *ἑδαιούτερον*, ἄνθος δὲ χρυσοδές, ῥίζαν δὲ μακράν. φιλεῖ δὲ τὰ χεῖρα τὰ πόδια. Id est, Chironiũ foliũ habet simile Rumici, maius tamen & hirsutius, florem auri specie: radicem

radicem longā. Plinius sine generū distinctione de Panace hæc scribit. Panacē & vnguentis eadē (Syria) gignit, nascentē & in Psophidæ Arcadiæ circaq; Erymāthi fontes, & in Africa, & in Macedonia: ferula sui generis, quinque cubitorum, foliis primo quaternis, mox senis in terra iacentibus, ampla magnitudine rotūdis, in cacumine verò oleagineis, semine in muscariis dependēte, at Ferulæ. Deinde alio in loco eiusdem genera exponens ait. Panaces ipso nomine omniū morborū remedia promittit, numerosum, & Diis inuentoribus adscriptū. Vnum quippe Asclepiū cognominatur, quoniam is filiam Panaceam appellauit, &c. Alterum genus Heraclion vocāt, & ab Hercule inuentū tradūt. Alij Origanum Heracleoticum silvestre, quod est Origano simile, radice inutili. Tertium Panaces chironium cognominatur ab inuentore. Foliū eius Lapatho simile, maius tamen & hirsutius. Flos aureus, radix parua. Nasciē pinguibus locis. Hæc Plinius: in quibus multū à Diosc. dissidet, & Theoph. magna ex parte assentitur, à quo & sua mutuatus est. Sed quam dixit Theophr. radicē Chironij μακράν, Plinius μακράν legit, idest, parua, Dioscor. λεπτήν, idest, tenuem, vt fortassis Theoph. exēplaria hīc mendosa sint. Panaces Heracleū in Apulia frequens nasci scribit Matth. quemadmodum in Apenninis iugis, & in Argentario promontorio in maritimis Senensibus. Colitur & in Italiæ viridariis: quod ex eodem pictū hīc damus. Dodon. idem depinxit. Aliud Panax Heracleum statuunt Lobellius & Pena, caule bicubitali, lanugine quadam incauo, folis quadātenus Smyrniū aut Imperatoria, sed lacinis ambituq; magis circinato, in viridi pallentibus, rigidis & leuiter hirsutis, floribus in umbella lata luteis, (albos in Belgij viretis se vidisse, ait Lobellius) radice Ligustici vel Angelicæ, non perinde succulenta. Hanc Dodonæus Spondylium alterum appellat, supra descripto similem, sed rariorem & maiore, cui plures sæpe caules assurgunt, crassiores altioresq; folia ex tribus ferè composita, maiora, & ficulneis similia, aspera nonnihil, atque vnà cum caulibus hirsuta: flores, semen, radix, vt prioris. Hoc genus, inquit Dodonæus, non Sphondylium alterum, sed Panaces Heracleū creditur. Desideratur tantum floris color, quē Dioscorides luteum esse ait. Folia aspera ficulneis respōdent: caulis hirsutus, radix multiplex, quale Heracleum scribitur esse Panaces. At hīc de florum colore scrupulus facilè eximi potest. Nam in Belgij viretis flores albi sunt, teste Lobellio qui etiam Venetiis in Franciscanorū horto se luteos vidisse refert, & luteos flores

Li. 12. c. 26.

Lib. 25. c. 4.

Ca. 48. li. 3.

Li. de succ. ca. 9.

In Purg. hist.

PANACES Herculeum Mat.



PANACES Asclepium, Matt.



In Ad.fol.
350.

esse scribit Pena eiusdem sponte enatæ in illo saxoso colle, qui Frontignano re-
deunti Monspelim ad læuam est. Panaces Asclepium ex eodẽ Matthiolo hĩc
exhibemus, quod diuersi generis non est à Ferula, inquit Pena, nec item figura
dissimile, præsertim istud doctioribus verum putatum, forte quale in Matthiolo

PANAX Heracium, Lobellij.
Sphondylium alterũ Dod.

Ibidem.




PANACES Asclepium
alterum, Dalechamp.



pietũ videtur. Sed id tantum se vidisse ait Mat-
thiolus, effigiẽmque eius pinxit omĩsis notis
omnibus. Scribit autem Pena Ferulæ simile ef-
se effigie, sed multò minus, semine non fœni-
culi, sed vt Ferulæ, lato, foliis & floribus haud
dissimilibus: caule & radice magnitudine & si-
militudine Anethi, odorato. Ab hoc differt
id quod ex aliis herbariis hĩc depinximus in
asperis locis & tumulis propè Monspeliũ pro-
ueniens, radice Apij, candida, tenui, acri, odo-
rata, folio tamen Apij, aut Coriandri potius
quàm fœniculi, hirsuto, flore luteo in vmbellis
circinata rotunditatis. Pro Chironio scribit
Matthiolus quosdam plantam ostendere, quæ
flos solis nuncupatur, quorum sententiæ mini-
mè suffragatur, sed in Symphytorum genere
esse putat. Aliis Panaces Chironium videtur
esse Bupleuri species, Monspeliensibus Auri-
cula leporis dicta, folio longo, rigido, latiuscu-
lo in medio, supernè in angustum desinente,
ferè lanceolata, multis striis quasi costis distin-
cto, nonnihil concauo aut inflexo, vnde illi
Auriculæ leporinæ nomen: caule procero,

PANACES Chironium
sive flos solis, Matth.



genicula

PANACES Chironium,
quorundam, Dalech.*P A N A X Chironium,*
Dodonai.

geniculato, in ramulos superiore parte diuiso, umbellis in summitate pusillis, sparsis, luteolis floribus, semine Anisi, aut Anethi, oblongo. Alij Daphoboscum nominant. Quidam Buprestin Plinij esse putant: Ammi verò vulgare descriptū suprā, cap. 5. Bupleuron. Theophrasti autem Chironium Pena coniecit esse Herbam Auream Narbonensem, foliis Limonij, aut Lapathi, aut sanè vnum eorum quæ Plinius ad Theophrastum retulit, vt Pharnaceū, Panaci Chironio hac subiungens, li. 23. ca. 4. Quartum genus Panacis ab eodem Chirone repertum Centaurium cognominatur, sed Pharnaceum in controuersiam inuentionis à Pharnace Rege deductum, &c. De hac Herba Aurea Lobelij & Penæ fusiùs tractauimus in Vmbrosis, capite de Virga Aurea. Diuersam à superioribus Panacis speciem pinxit Dodonæus, quæ peregrina stirps est, foliis amplis, multiplicibus nonnihil hirsutis & asperis, quorum singula Lapathi folia æmulantur, sed minora sunt: caulis duorum, trium, aut quatuor cubitorum altitudine: flores in umbellis luteis: semen planum, latum, & subflauum: longa & candida radix. Panacis speciem esse, inquit Dodonæus, semen demonstrat, in Panacis lacryma repertum, ex quo Petro Condēbergio Antuerpiensi Pharmacopœo primùm enata stirps est. Ex incisa radice Panacis Heraclij, inquit Dioscorides, nō Asclepij, vt vult Plinius, colligitur succus recens adhuc germinantibus caulibus, qui dicitur Opopanax, Officinis Opopanacum. Colligitur & ex caule per messes inciso: qui hodie ad nos ex Alexandria Ægypti conuehitur, Officinis notior, quā ipsa Panacis genera. Vim habet, auctore Dioscoride, calfaciendi, molliendi, attenuandi. Quare febribus per circuitus repetentibus, rigoribus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, tussi, torminibus, stillicidio vrinæ conuenit: contra vesicæ scabiem ex aqua mulsā, aut vino bibitur: ducit menses, & fœtus enecat. Inflationes vteri & duritias discutit cū melle dilutus. Illinitur ex eo ischiadicus dolor. Admiscetur acopis & medicamentis capitis, carbunculos rumpit. Podagricis cum vua passa illitus subuenit: dolore dentium liberat cauis

Li. purgan.
& de flor.*Vires &
Temper.*
Lib. 3. c. 48.

inditus. Visum acuit oculis illitus. Cum pice mixtus optimum est emplastrum aduersus rabiosi canis morsus. Radix derafa & vuluæ admota partus euocat. Facit & ad vlcera vetera, & ossa denudata carne obducit trita inspersa, & cum melle illita. Semen cum Absinthio sumptum menses pellit, cū Aristolochia prodest aduersus animalia

- animalia quæ venenum eiulantur, & contra vuluæ strāgulatus in vino bibitur. Galenus de eodem sic scribit. Ex Panace Heracleo fit Opopanax, radicibus eius & caulibus scilicet incis. Porro Opopanax ipse longè est ad plurimos vsus aptissimus, vtpote excalfaciens, emolliens, & digerens: ponatq; ipsum quispiam in calfaciendo tertij ordinis, in desiccando verò secundi. Cortex radice exsiccatum simul & excalfactorium est medicamentum, sed minùs quā succus. Quin & nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoque vtimur ad nuda ossium, & ad vlcera maligna & contumacia. Fructus calidus & ipse est, a mensibus mouendis medicamen commodum. Theophrastus Heraclij radicem vtilem esse scribit contra morbum comitalem coagulo vituli marini admisto ad quartam partem, & contra tormina è vino dulci: vtilem etiam ad vulnera sicca, ex melle ad madida. Mesues his & multis aliis dotibus adiicit succo huic vim inesse purgandi pituitam crassam & lentam clam à remotis partibus, cerebro, neruis, sensorijs, iuncturis, thorace. Ob id prodesse harum partium affectibus frigidis inde natis, visui imbecillo, tussi antiquæ, difficultati spirandi, ischiadi, gonagræ, podagræ, quam purgandi vim Græci tacuerunt. Panacis Asclepij flores & semina, auctore Dioscoride, vim habent aduersus vlcera, tubercula, & phagedænas, si trita cum melle imponantur. Contra serpentes cum vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Id semen Heraclio minùs est calidum, ait Galenus. Quare floribus & semine melle mistis ad vlcera, phymata, & phagedænas vtuntur Theophrastus Asclepiū suū valere scripsit ad serpentes, si bibatur derafum, & ad lienem, cū sanguis circa eum constiterit: ex mulso, & capiti, tritum ex oleo, & inunctū, & si qua alia parte obscura laboret quis, & ventris doloribus ex vino rasum, posse etiam & longas ægritudines depellere. Insuper & vlceribus, humidis quidem siccum aspersum, elotumq; vino calido. Siccis etiam ex vino subactum, & aspersum. Chironij verò radix pota, inquit Dioscorides, serpentium venenis resistit: illita coma eadem præstat. Id similem Asclepio facultatē habet, inquit Galenus. Theophrastus Gaza interprete. Vtuntur ea aduersus viperas & phalangia, & tineas vestium, & cætera reptilia, data ex vino & vnctā oleo. Viperae autem morsui inspergitur ex acido, & potui datur. Valere aiunt & ad vlcera ex vino & oleo, & ad tubercula ex melle: quo Theophrasti loco exemplaria Græca habent τὸς σήλας, Gaza conuertit tineas vestium, vulgarem lectionem secutus: & sunt quidē σήλες vermes, qui vestes & libros corrodunt. Verū aduersus hos quomodo Panaces Chironium cum vino bibatur, aut cum oleo illinatur? Quare legendum τὸς σήλας, aduersus seps. Est autem, vt Lucanus ait,

Ossa que dissoluens cum corpore tabificus seps.

Serpentis genus, ex cuius ictu partes putrescunt, atque ipsi icti intra tres aut quatuor dies pereunt: de quo Dioscorides & Aëtius scripsere. Ex iis quæ diximus perspicuum est, quam variæ sint etiam Classicorum auctorum de Panacis generibus sententiæ: de quibus hæc doctissimè cōmentatus est Dalechampius. Certum est, inquit, Dioscoridi tria genera Panacis constitui. Primum Heracleum, cuius succus Opopanax est, non Panacis Asclepij, vt Plinius scripsit, ca. 4.25. magna inconstantia, & obliuione, cum cap. 26.12. plantam quæ Opopanacem fundit, notis Heraclæi delineasset. Secundum Panacem Asclepion, cortice salso, & crasso, Theophrasto, non multo, vt vertit Plinius. Tertium Chironium, Amaraci folio Dioscoridi: Lapathi Theophrasto. Præter hæc tria famosa, Dioscorides Origanum silvestre, siue Cunilam bubulam, quæ Cunilæ gallinacæ, siue Origano Heraclæotico similis est, Heraclæon Panaces dici tradit: quinetiam ligusticum, Panaces, & Panaceam: quod & Plinius affirmat: Centaurij quoque magni radicem Panaceam, quam & Panaceam, & Pharnaceum, vocari docet etiam Plinius: quamuis in hac re sapere

ſapere qui ſeſe putant, arbitrentur Liguſtici cognomen id apud Dioſcoridem ſpurium eſſe, quoniam in exemplari Græco non extat, & quæ de Centauri radice ad finem capitis leguntur, nō eſſe Dioſcoridis, ſed adiectitia, audaciùs eo loco incuſcata. Alterum genus (Panacis) inquit Plinius, cap. 4. 25. Heracleon vocāt, & ab Hercule inuentum tradunt. Alij (nimirum Crateuas, cap. 8. 19.) Origanum ſilueſtre Panaces Heracleon vocant, quod eſt Origano ſimile: (Heracleotico, ſcilicet, dicto ab Heraclea vrbe Cretæ, non ab Hercule.) Sic reſtituēdus locus ille corruptus Plinij, qui Panacis nomine appellauit, Heracleon, Aſclepion, Chironium, Origanum ſilueſtre, Liguſticum, Centaurij magni radicem, vt Dioſcorides, & inſuper Achilleā Sideritim, cap. 5. 25. Theophrastus cap. 12. 9. Hiſt. Panacis genera recenſet Syriacum, Heracleon, Aſclepion, Chironium, & alia præterea duo, alterū folio tenui. λεπτόφυλλον: alterum craſſo, παχύφυλλον, non πλατύφυλλον, vt vulgò legitur: idemq; Heracleon, Aſclepion, Chironium deſcribit luculenter. Syriaci verò ſe paulò ante meminſſe, inquit, nimirum eiufdem libri, cap. 7. cū ait, ex India & Arabia ad vnguentorum confectiones odoras aduehi, vnguētis autem ferè immiſceri Caſiam, Cinnamonum, Nardum, Neron, ſiue vt quidam legūt, Maron, Baſamum, Iridē, Nartam, ſiue vt quidā legunt ex Dioſcoride Narcaphthō, Coſtū, Panaces, nō vt Gaza, Liguſticum, Crocum, &c. ac rurfus ca. 11. Panacis, inquit, varij ſunt vſus, nec ad eandem rem omnes. Seminis quidem ad prouocandos abortus, neruorum diſtenſiones, & dolores id genus, ad morbos auriū, & vocis exercitationes: radicis verò ad partus accelerandos, ducenda muliebria, & morbos veterinorū. In Syria Panaces gignitur, & per meſſem inciditur. Hæc Theophrastus de Syriaco, in quibus nulla eius nota deprehenditur. Quodnam id ſit docti ambigunt. Plinius cap. 26. 12. Heracleum fuiſſe declarat, quoniam cū Panaces vnguentis Syriam gignere Theophrastum ſecutus dixiſſet, mox ſubiicit, naſci in Phocide Arcadiæ, (nō Pſophide) Africa, Macedonia: Ferulam ſui generis eſſe quinque cubitorum, (caule Ferulæ, altiſſimo, Dioſc.) folijs primò quaternis, mox ſenis, (lego, primò ternis, mox quinis, ſic enim oriuntur:) (in ambitu quinque partiti diuiſis: Dioſc.) in terra iacentibus, ampla magnitudine, rotundis, (ad ficulnea multum accedentibus, Dioſc.) in cacumine vero oleagineis, (circa caulem minoribus: Dioſc.) ſemine in muſcariis dependente, vt Ferulæ: (vt Anethi: Dioſc.) Excipitur ſuccus incifo caule meſſibus, radice, Autumno. (τέμνεν) περὶ πυραμίδων. Theoph.) Laudatur candor eius coacti. Sequens pallido ſtatera (Sequitur pallor ſiccato. Dioſcor.) &c. quæ omnia Heraclei deſcriptionem continent, alibi nuſquam traditam à Plinio, quod illic diligenter explicaret. Opinionem Plinij laudo & amplector, legēdumq; apud Theophr. arbitror: Πανάκη ὃ καλεῖται, πρῶτον μὲν τὸ ἐν Συρίᾳ, ἡράκλειον, περὶ ὃ μικρὸν πρότερον εἶρη): ἀλλὰ δὲ, τὸ μὲν χερσῶνον καλεῖσθαι, τὸ δὲ ἀσκήπιδον. ἐχθρὸν τὸ μὲν χερσῶνον, &c. vt ſuperuacua reliqua ab inconfiderato quodam infarcta ſint, Syriacum Panaces præter illa tria pro quarto numerante, niſi fortasſe putet aliquis Heraclei deſcriptionem quæ poſtrema eſt, amouendam ſuo loco, & præponendam hiſtoriæ Chironij & Aſclepi, vt ordine procedat philoſophi oratio. Pari dubitatione de Leptophyllo Panace & Pachyphyllo quæritur, ea quænam ſint. Dodonæus Pachyphyllon eſſe iudicat Cētaurium magnum, cuius radicem etiam Panaceam vocari teſtatur Dioſcorides, Leptophyllon verò, Centaurium minus, vt vtrumque Centaurij genus Panacis cognomine velut decoretur, quoniam nomine promittit omnia morborū remedia. Ego verò, cum extra dubium ſit Origanum ſilueſtre, & Liguſticum, Panaces vocari, nullus autem de Centaurio minore id prodiderit, probabilius eſſe credo, Origanum ſilueſtre παχύφυλλον eo loco à Theophrasto dici, Liguſticū autem, λεπτόφυλλον, non obſcura in folijs eorum hac differentia.

Nomina

Li. 3. ca. 51.

Locus.

Forma.

Lib. 3. ca. 51.

Lib. 19. c. 8.

ΛΙΓΥΣΤΙΚΟΝ Græcis, Galeno vnus literæ immutatione λιβυ-
κόν, nisi mendosi sint illius codices, Latinis quoque Ligusticū, quod
nascatur plurimū in Liguria, inquit Dioscorides, in Apennino al-
pibus contermino. Vocant autem incolæ Panaces, non sine ratione,
quoniam & radice & caule Panaci Heraclio simile sit, & viribus iisdem præditū.
Gignitur in altissimis asperisq; ac vmbrosis montibus, maximè circa scrobes.
Cauliculum profert tenuem, similem anetho, geniculatum, circa quem folia sunt
meliloti foliis teneriora, odorata, propè summum caulem graciliora, & magis di-
uisa: in cacumine vmbella est, in qua semen nigrum, solidum, oblongum ad fœni-
culi semen accedens, gustanti acre & aromaticum. Radix candida Heraclei Pana-
cis similis, odorata. Sic Ligusticum depinxit Dioscorides. De quo breuiter hæc
Plinius. Ligusticum siluestre est in Liguriæ suæ montibus: feritur vbiq;: suauius fa-
tium, sed sine viribus. Panaces aliqui vocant. Crateuas apud Græcos Cunilam
bubulam eo nomine appellat Ligusticum ex Matthiolo hîc pictū Siler est monta-
num Officinarum, quod multi esse Sefeli Mafiliense existimarunt, tamen magis
placet etiam Dodonæo Ligusticum esse. Folia enim ad meliloti folia accedunt,

LIGVSTICVM,

Matthioli.



LIGVSTICVM

alterum, Lobell.



ipsis tamen molliora & angustiora: semen crassum, sordido Cumini colore subni-
gricans, quo maius & acrius. In Liguriæ montibus gignitur. Lobellius Ligusticum
alterum Belgarum ostendit, plantam non inelegantem multis iam annis à se re-
pertam in Taurinis collibus, non procul à Padi fluentis. In hortis Belgicis alitur,
caulem ferens cubitalem & sesquicubitalem, quem ambiunt folia rutacea, Sileris
montani latiora, rotundiora, absinthij fruticis ferè paria: flores & semen rotundū,
nonnihil aromaticum in Vmbellis Smyrni Cretici. Hæc Lobellius. Ex quibus
perspicuum est leuisticum vulgò vocatum à Ligustico prorsus distare. Nam hoc

caule

caule assurgit tenui, & foliis meliloti. Leuisticum caule, procero, geniculato, albo, crasso, concauo, foliis in plures lacinias diuisis, maioribus, & crassioribus, læuibus, splendentibus, ex luteo, veluti ipsi caules, virentibus, floribus luteis, semine nigricante, grandi, carnosâ & restibili radice. Id enim est Leuisticum Herbariorum Gallicè *Leuesche*, Matthioli Hippofelinum, Laferpitium Germanicum, Smyrnum Lacunæ. Tota planta grato est & aromatico odore. Huius etiam meminimus, cap. 7. huius libri. Radicis & seminis Ligustici vis auctore Dioscor. excalfactoria est, cōcoquens. Prodest ad internos dolores, tumores, concoctiones, item ad inflationes præsertim circa stomachum, & contra serpentium ictus. Vrinæ & mēstrua potu ducit. Eadē præstat radix apposita. Radix & semē vtiliter oxyporis & cōcoquētibus medicamentis miscetur. Valdē gratū est stomacho. Quare pro pipere vtuntur eo indigenæ, obsoniis permiscentes. Plinius, Ligusticum, inquit, aliqui Panacē vocāt: stomacho inutile est (falsū, cum ex ipsius facultatibus, & Dioscor. auctoritate stomacho vtilissimum esse constet.) Item conuulsionibus & inflationibus. Sunt & qui Cunilam bubulam appellauerint, vt diximus falsū. Galenus scribit Libystici radicem & semen esse ex genere excalfacientium, adeo vt & menses cieant, & vrinas prouocent, flatuq; extinguant. Leuisticum haud multum viribus differt à Ligustico, eueiq; illud tutæ substitui potest. Quare radix & semen siccata, & cum vino pota, ventriculum exsiccant & excalfaciunt, tormina sedant, flatus dissipant, vrinas & menses cient.

Ibidem.

Vires &

Temper.

Li. 7. simpl.

P E V C E D A N V M.

C A P. XXVI.



G R A E C I S *ωκυδάνας*, Latinis Peucedanus & Peucedanum, Arabibus *Harbatum*, vulgò fœniculus porcinus, Gallis *Fenouil de pourceau*, Germanis *Harstrang*, qua voce pilorum restis significatur, & *Schuefencheltz*, & *Seuufenchel*, idest, radix sulphurea, & fœniculus porcinus. Dictus autem est Peucedanus à *ωκύν*, quæ Græcis est pinus, quod folio sit pinus: quare Apuleius Pinastellum appellauit. Vel à piceo fœtore Peucedanus nomen inuenit: nam amarorem horrendū & fœtorem *ωκυδάνας* vox apud Poëtas significat. Plantæ descriptio hæc est ex Dioscoride. Peucedanum caulem mittit tenuē, gracilem, fœniculo similē comā habet circa radicē copiosam, ac densam, florē luteum: radicē nigrā, crassam, grauis odoris, succi plenam. Nascitur in mōtibus vmbrosis. Colligitur succus radice tenera incisa cultello, & quod defluit statim in Sole ponitur, in vmbra enim liquefcit. Dum autem colligitur, capitis dolorē & vertiginem inducit, nisi quis nares prius rosaceo illeuerit, & caput eodem irrigauerit. Inutilis redditur radix succo inde extracto. (Sic enim legendum, *ἀχρητος ὃ γίνετ' ὀπισθεῖα ἢ ῥιζα*, non *ὀπισθεῖα*, vt vulgares codices habent, quos secutus Ruellius cōuertit, Affatione radix inutilis fit.) Colligitur etiam succus ex caulibus, & liquor, & ex radice, vt ex mandragora. Inefficacior autem est liquore succus, & citius expirat. (Sic enim legitur in vulgaribus codicibus, *ἡτιον ὃ ἐνεργεῖ τὸ χυλὸν ὃ ὀπὸς*: quos etiam secutus Ruellius conuertit. Verū inefficacior succo lacryma habetur. In veteri autem contrarium legi annotat Andr. Lacu. *ἡτιον ὃ ἐνεργεῖ τὸ ὀπὸν ὃ χυλὸν*: quod est, Inefficacior succo liquor: cui lectioni adstipulatur Galenus de Peucedano scribens: *χρῶμεθα δὲ καὶ τῷ ὀπῷ καὶ τῷ χυλῷ*. Idest, Vtimur etiam succo & liquore, & *μοχ. ἰχυρότερος ὃ αὐτῶν ὃ ὀπὸς*. sed valentior succus. Alibi tamen Dioscorides, *ὃ χύλισμα* siue *τὸν χυλὸν*, idest, liquorem siue liquamentum hyoscyami & mandragoræ præfert *τοῖς ὀποῖς*, idest, succis ab iisdem plantis expressis.) Inuenitur etiam concreta lacryma thuri similis, caulibus & radicibus adhærens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, grauis odoris, fuluus, linguam calfaciens. Plinius eandem descriptionem declarat, sed in quibusdam à Dioscoride variat Theophrastum in

Nomina

Lib. 3. c. 77.

Forma.

Locus.

Li. 8. simpl.

Li. 4. c. 64.

Li. 4. ca. 71.

Lib. 25. c. 9.


his secutus. Sed inter primas, inquit, celebratur Peucedanum laudatissimū in Arcadia, mox Samothrace. Caulis est ei tenuis, longus, Fœniculo similis, iuxta terrā foliosus, radice nigra, crassa, granis odoris, succosa. Gignitur in montibus opacis foditur exitu Autumni. Placent tenerrimæ & altissimæ radices. Hæ conciduntur in quaternos digitos osseis cultellis, funduntq; succum in vmbra, capite & naribus rosaceo perfusis, ne vertigo sentiatur. Et alius succus inuenitur caulibus adhærēs, incisifq; manat. Probatur crassitudine mellea, colore rufo, odore suauiter graui, feruens gustu. Et hîc in vsu, & radix, & decoctum eius pluribus medicamētis. Succo tamen efficacissimo, qui resoluitur amaris amygdalis, aut ruta, bibiturq; contra serpentes, & ex oleo perunctos tuetur. Hæc Plinius. Theophrast. radicem solam probat, semen inutile esse dicit, itemq; succum his verbis. Θερμαντικὸν τῇ τῆς ψευκεδάνου ρίζῃ, ἀλκυμιάῃ ποιεῖσι ἐξ αὐτῆς ἰδρωτικόν, ὥσπερ ἐξ ἄλλων. Δίδοι δὲ τῇ ψευκεδάνου πρὸς πῖναι ἀλγῆνας, δὲ δὲ ἀπὲρμα ἔκ ἐνήσιμον, ὅδε δὲ ὁ πρὸς αὐτῆς γίνεσθαι ἐν Ἀρχαδίᾳ. Quod in Arcadia nasci ait, habet etiam Plinius, & Samothracē addit. Quare etiam in Dioscoride pro Σαρδωνίᾳ legendum videtur Ἀρχαδίᾳ. Matthiolus Peucedanū in Ananienfibus montibus copiosissimè prouenire scribit, cum aliis notis, tum radice

Cap. 21. 9.
hist.

Ca. 77. li 3.

PEUCEDANVM,

Matthioli.



PEUCEDANVM,

Dodonæi.



In Ad. fol.
350.

Dioscoridis Peucedano simillimum, quam habet crassam, nigram, succi plenam, grauiter olentem. Multum crescit, inquit Pena, in Hetruriæ æstuosis, & Narbonensis Galliæ glareosis collibus, præsertim in luci Gramuntij aditu, & circum, inter sentes & dumeta. Radix profunda nigricat foris, intus virescens, succumq; remittit gummeum, flauū, odoris grauis & fœtentis, comatq; supernè denso capillitio, fusco, ambiente caulem gracilem, sesquicubitalem multis interdū ab imo surculis diuisis in folia terna, fœniculi modo, quàm ferulæ duplo latiora, longiora, minùs crassa: Umbellæ latiores luteis flosculis prægnantes, semine angelicæ haud absimili, ingrato. Sic & purgandi vi donata fuit radix herbæ, sed propter fœtorē vtriusque minùs in vsum deducta. Peucedanum Italicum, inquit Lobellius, est

Narbonensi

PEUCEDANVM Maius
Italicum, Lobell.



Narbonensi quadruplò maius omni sui parte. Prouenit copiosè in collibus Lauretanis & agri Romani. Dioscorides & Galenus succo radicique vires insignes attribuunt his verbis. Succus ex aceto & rosaceo illitus prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus in vniuersum vitiis neruorum ex oleo & aceto illitus prodest. In vteri strangulatione olfaciendus naribus ad-mouetur, & sic quoque in soporem altius delatos reuocat. Suffitu serpentes fugat. Aurium doloribus commodè ex rosaceo instillatur, & ad dentium dolorem cauernis inditur. Facit & ad tussim cum vino sumptus. Subuenit difficultati spirandi, torminibus & inflationibus. Aluum leuiter emollit, & lienem liquat. Difficiles partus egregiè adiuuat. Et ad dolores & distensiones vesicæ & renum potus facit. Aperit etiam vterum. Radix ad eadem utilis est, sed minore efficacia: bibitur autem ipsius decoctum. Eadem arida trita purgat sordida vlcera, & ossium squamas remouet, & vetera ad cica-

tricem perducit. Miscetur ceratis & malagmatis calfacientibus. Galenus, Peucedani, inquit, radice, quidem maximè, sed tamen etiam succo & liquore vtimur. Sunt autè omnia hæc eiusdè specie facultatis: sed valentior succus, admodum ex-calfaciens & digerens. Quare affectibus omnibus circa neruos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone, thoracèq; ex crassitudine & viscositate humorum prouenientibus. Atque nitro quidem in corpus sumptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro quod incidat & extenuet, sæpe etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus, protinus sedauit, quia videlicet tenuium est partium, & excalfaciens. Quinetiam lienes induratos iuuat, nempè incidendo, digerendo, atque extenuando crassos humores. Sed ad hæc & radice vti liceat, quæ & squamas ab ossibus celerrimè detrahit, quia videlicet validè desiccat, minus tamen quam succus excalfaciens. Et vlceribus contumacibus aptum est remedium arida illita: ipsa enim expurgat, carnem inducit, & ad cicatricem perducit: excalfaciens quidem ordine secundo iam completo, desiccans verò tertio iam incipiente. Plinius easdem atque alias etiam vires describit variis in locis. Peucedanum pectoris doloribus subuenit. Pituitam & bilem detrahit Peucedani radix. Eadem decocta lienì & renibus prodest. Perungunt & radice sudoris causa eliciendi, quoniam caustica vis ei est. Peucedano ad recentia vulnera tanta vis est, vt faniem ossibus extrahat. Cum semine cupressi bibitur, si sanguis per os redditus est, fluítque ab infernis. Strangulatus vuluæ nidore vltum recreat, laxanturque suffocationes eo, sed quidam admiscunt in vino semen cupressi contritum. Potum cum coagulo vituli marini æquis portionibus comitiales sanat. Succus infantium ramici, & vmbilicis eminentibus iungitur. Stranguriæ cum melle medetur. Item semine lethargici excitantur, & vt perhibent, ex euphorbio, naribus tactis Peucedani succo.

Li. 8. simpl.

Nomina

Li. 24. c. 19.
& lib. & c.
22. & li. 13.
ca. 26 & li.
27. cap. 7.

Genera

Forma.

Cap. 53. li. 3.



VAE planta σέσελι Græcis, similiter Latinis Sefeli nominatur, Arabibus *Sifalios*, Barbaris Sifelios. Plinius Sili videtur appellasse multis locis: in quibusdam etiam Sefeli vocat. Dioscorides tria Seseleos genera ponit, σέσελι ὁ μαοσαλεωικόν, idest, Sefeli Mafsiliense, Officinis Siler montanum dictum, σέσελι αἰθιοπικόν, Sefeli Æthiopicum, & σέσελι πελοποννησιακόν, Sefeli Peloponnesiacum: quibus quartum addit in alio capite, σέσελι κρηικόν, Sefeli Creticum, Tordylium nominatū. Quæ singillatim sic deliniat. Sefeli Mafsiliense folia habet fœniculo similia, sed crassiora, caulem vegetiorem, umbellam anetho similem, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre: radix longa est, odorata. Matthiolus Sefeli Mafsiliense, ita depictum exhibet, & in omnibus

SESELI Mafsiliense,
Matthioli.



SESELI Æthiopicum
Matthioli.



In Ad. fol.
352.

ferè Tridentinis montibus colligi ait, quod tamen legitimum esse negat Pena, quid verò sit, inquit, cum Matthiolus non descripserit, nobis ignorandum: illud tamen is asserit se in Tridentinis alpibus hanc plantam nuspiam vidisse, ac ne in Baldo quidem monte longè illis feracior. Genuinum verò Sefeli Mafsiliense passim & copiosè crescere illis in tractibus qui Mafsilia Aquas sextias ducunt, transque Rhodanum in Monspeliaci agri asperis. Se etiā id collegisse via qua Roma Senas itur propè colles oppidi Montfiascone dicti. Radix illi alba, fœniculi effigie & magnitudine, altè humi depacta & euulso difficilis, quàm fœniculi odoratior & calidior: caulem ut plurimum sesquicubitalem, ferulaceum, hinc inde alis multis ex geniculis prodeuntibus reflexum emittit, prædurū, rigidum: folia pauciora, sed firmiora, crassiora quàm fœniculi, & albida sunt: umbellæ cōfectæ, anethi, floribus candidis, & semine aniso similiore quàm fœniculo, gustu suavi, acri, & medicato, Mei aut Panacis gustu. Planta illic valdè nota est fœniculi tortuosi nomenclatura. Neque quantum illic locorum est Mafsiliæ circumlustranti, vllā plantam videre

videre est, quæ magis quadret Sefeli. Hanc plantam descriperamus & pinxeramus fœniculi tortuosi nomine. Istud Sefeli Massiliense diximus. Officinis Siler montanum vocari, & Siseleos: cū tamen hoc ab illo multū diuersum sit. Est enim Siler montanum, inquit Pena, duūm cubitorum ferulaceus caulis, radix odorata, Ligustici, folia terna, non modo fœniculo, vt Massiliensi Sefeli, maiora, sed vel

FOENICVLVS Tortuosus, Dalechamp.



SESELI Massiliense, Pena.



peucedano latiora, ac paulò minus Ligusticū, vel coronarium rosmarinum æquantia, mollia: umbellæ prægrandes, Angelicæ, quibus semen foliaceū, longius cumino, colore pallido, quod gustu, etiam saccharo conditum, acrius quam Æthiopicum est, tanto magis quā Massiliense, cui acrimonia præfert Æthiopicū. Quare qui Pharmacopœis & recentioribus suaserūt Siler montanum, siue Siseleos nihil aliud esse quam Dioscoridis Sefeli Massiliense, eos quidem hac in re fefellerunt, quātum verò ad vires attinet, minimè. Est enim planta multò maioris acrimoniæ & efficaciæ quàm vllum Sefeli: eoque menstruis ciendis valdè cōmoda. Id suprà pictum dedimus, cap. de Ligustico, ipsius Ligustici Dioscoridis nomine. Sefeli Æthiopicum, vt tradit Dioscorides, folia habet hederæ similia, minora, oblonga, ad foliorum periclymeni similitudinē. Frutex est magnus (nam emendatiores codices habēt, ῥάμνος δὲ μέγας ἔστι, quod & Hermolaus expressit, non ῥάμνος ὁ μέγας ἔστι, vt conuertit Ruellius, frutex nigricat) palmi-
tibus in bina cubita extensis, in quibus rami sunt duorum palmorum, & capitula velut anethi: semen autem nigrum, dēsūm velut triticū, acrius ac odoratius quam Massiliense, ac vehementer iucundum. Ruellius facit etiam semen hoc amarum, quod neque ex vulgari, neque ex veteri codice constat. Additur autem ad finem eiusdem capitis in codice antiquo: ὁμοῖα δὲ τὰ ὄντα, idest, easdem vires habet. Huius Seseleos imagines duas dat Matthiolus. Vtraque enim, inquit, verum repræsentare videtur. At prius à Sefeli Æthiopico multū distat: est enim herba quam recentiores libanotidem Theophrasti prodiderunt, eoq; nomine descripsit & depinxit Dodonæus, viribus & figura alienā à Sefeli Æthiopico, quem fruticem, adeoque magnum Dioscoridis correctior codex statuit esse, vt suprà diximus. Alterum igitur verum Æthiopicum sufficere debebat in locum illius herbæ, cui videtur postposuisse: quod Pena graphicè sic depingit. Id saxeis illis & deuexis Massiliæ maritimis, tum etiam ad Cestii montis celsi radices, qua in stagnum vergit, fruticat


Lib. 3. ca. 53.

Cap. 53. li. 3.

In Ad. fol. 281.

Lib. 2. c. 84.

Ibidem.

SESELI Aethiopicum verum.

Li. 3. ca. 153.
Forma.

Locus. *SESELI Peloponnesse,*
Matthiol.

Cap. 53. li. 3.
In Ad. fol.
327.



Vires &
Temper.
Lib. 3. ca. 53.

vberi proventu Iulio & Augusto, spectatu valde elegans. Multis constat virgultis rectis, ligneis, nigricantibus, rigidis, binos ternosve cubitos altis, in varios furculos diductis, folia crassa, rigida, & lævia, viridia vt hederæ, figura oblonga, propiora periclymeno prominentibus. Luculentas in summis gerit umbellas, luteis floribus anethi, quas semen stipat fuscum, oblongum, copiosum, fœniculo maius. Non solū semen, sed etiam vniuersus frutex gustanti aromatis saporem acrem, medicatum & subamarum, sed gratum imprimit, suauemq; odorem spirat à summo ad imam vsque radicem, quæ lignosa est. Eximia vis est eius semen ad theriacam, quod etiā, vt Dioscorides innuit, Mafsiliensi multò odoratus & efficacius est. Sesele Peloponnesse, vt scribit Dioscorides, folia habet cicutæ similia, latiora (vulgaris enim codex habet *ωλαύλερα*, legitur in vetusto *τραχύλερα*, idest, asperiora) & crassiora, caulem maiorem, quàm Mafsiliense, ferulaceum, in cacumine umbellam, in qua semen latius odoratū, & carnosius. Nascitur in asperis locis, humidis, & collibus, & in Ida. Eisdem viribus præditum est. Hoc Matthiolus sic pinxit. Longè aliud proposuit & descripsit Pena his verbis. Ad montem Lupi, & iuxta ædes sacri ficuli in decliui-bus salebrosis insulæ montis Cestij, qua mare se pandit, est planta quidem copiosa, sed non ubiq; obuia, cuius radix magna, intus alba, foris nigricās, recta & altè porrecta, ferulæ thapsiæve modo, odorata, & aliquantum acris. Caulis digitum æquat crassitie, sesquicubitum altus, ferulaceus, a quo promūtur alæ turionēsve complures in ambitum sparsi, vbi folia multa, cicutæ magnitudine, sed incurua, pilosa & crispa, rugatæque. Umbellæ multæ anethi luteæ sunt, semen latum foliaceum, compressum, angelicæ figura & magnitudine, color illi ex pallore flauescit, odor suauissimus, Æthiopici adeò similis, vt statim odoratu, cū primum vidisset ille, Peloponnesse coniectarit, quā coniecturam certiore exploratione notarū & virium, Doctores Monspelienses fulcierunt, vt nullus iam ambigat verum esse Sesele Peloponnesse, cū tamen antea nonnulli thapsiæ speciem suspicari fuerint. Ab hoc sola magnitudine discrepans Peloponnesse. Sesele maius exhibuit Lobellius, in Belgij hortis ex Hispano semine ortum, altero tanto maius, maioribus latioribusq; foliis & semine. Id Thapsia est latifolia Clusij & quorundam. Mafsiliensis Seseleos semen & radix excalfaciendi vim habent, inquit Dioscorides, potu stranguriæ & orthopnœæ

SESELI PELOPON.

folio cicuta, Pena.



orthopnoæ medentur, profunt etiã vteri, stran-
gulationibus & epilepticis, mēses & partus tra-
hunt, ad omnia terna mala pollent, & tusses ve-
teres sanant. Semen cum vino potum conco-
quit, & tormina discutit: hepialis febribus vti-
le, & contra frigora in itineribus cum pipere
& vino bibitur. Datur etiam capris, & cæteris
pecudibus ad partus facilitatē. Plinius de ceruis Lib. 8. c.
loquens, fœmina ante partum, inquit, purgan-
tur herba quadam, quæ Sesele dicitur, faciliore
ita vtentes vtero. A partu duas habent herbas,
quæ aros & Sesele appellantur. Et alibi. Simpli- Lib. 25. c. 8.
cius ceruæ mōstrauere elaphoboscum, de qua
diximus: item Sesele enixæ a partu, quod apud
Aristotelem sic habetur. Ἐ ὅταν τέκη, ἐσθίει τὸ Lib. 9. h. 11.
χορὸν πρῶτον, καὶ ἐπὶ τὴν Σέσελιν ὃ τρέχουσι, ἔφαγ-
σαι οὕτως ἔρχονται πρὸς τὰ τέκνα πάλιν. Galenus animal.
scribit Seseleos & radicē & fructum vsq; adeo Lib. 8. fin.
excalfacere, vt admodum vrinā mouere queat.
Sed & tenuium esse partium, & comitali mor-
bo, & orthopnoæ competere. Supradictis ge-
neribus subiunxit Dioscorides σέσελι κρητικὸν Lib. 3. c. 54.
quibusdam dictum, & τορδύλιον, Paulo γορδύλιον,

Latinis etiam Tordylium, & Sesele creticum, Ordalion, Nicandri Anguillaræ. Her-
bula est succulosa, inquit Dioscorides, semine rotundo, duplici, scutulis simili, sub-
acri, aromatico, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur. Hanc esse censet Do-
donæus teneram herbulam, hîc appictam, sesquipedalem, furculis exilibus & te-
neriusculis, in quibus folia pauca, minitius infecta, corian-
drinis similia, inferioribus latioribus, & minùs incis, su-
perioribus tenerioribus, & magis infectis. In furculorum
cacuminibus vmbellæ albicant, semē rubrum, rotundum, Lib. 2. c. 86.

TORDILYVM,

Dodonai.



teneriusculis, in quibus folia pauca, minitius infecta, corian-
drinis similia, inferioribus latioribus, & minùs incis, su-
perioribus tenerioribus, & magis infectis. In furculorum
cacuminibus vmbellæ albicant, semē rubrum, rotundum,
compressum, circulo velut limbo candido circumdatum, *Locus.*
duplex: alterum enim alteri iungitur, singula scutulis si- *Tempus.*
milia, radix gracilis est, tenera, annua. In hortis seduli her-
barij colunt. Iulio mense floret, Augusto semen maturum
profert. Diuersum ab hoc Tordylium Sesele creticū mon-
strat Lobellius. Hoc, inquit Pena, passim in segetibus Nar-
bonensis Prouinciæ & secus vias occurrit, succulosa, hirsu-
ta, rigida, aspera planta, folio rotundiore, cærefolij, vm-
bellis albidis, purpureis, paruis, quibus succedunt semina *Vires. &*
copiosa, circinata, quasi toreumatis elaborata, vnde fortè *Temper.*
nomen peculiare, orbiculata, compressa, ex geminis val- *Lib. 3. j4.*
uulis, vt ferulæ semen conflata, clypeoli speciem referen-
tia, gustu Myrrhidis. Lobellius addit aliud Tordylium si-
ue Sesele Creticum maius, fruticosius multò, longioribusq;
foliis & bicubitalibus caulibus in pratis Laterēsis Mon-
speliensis agri, & Lugdunensis Galliæ per fœniscia occur-
rit. Belgis hortense est. Calidum siccūque secundo or-
dine. Hoc bibitur ad vrinæ difficultatem, inquit Diosco-

*TORDYLIVM SESELI,**Creticum Lobellij.**TORDYLIVM* *sive Sefeli,**Creticum maius Lobellij.**SESELI, Pratenſe.**Lobellij.*

Lib. 3. c. 23.

Sefeli
*Prat.**Forma.*

rides, & ad menſes ducendos. At ſuccus caulis & ſeminis adhuc viridis trium obolorum pondere potus cum paſſo dies decem, nephriticos ſanat. Radix efficax eſt ad educenda quæ in pectore hærent, ſi cum melle delinguatur. Eadem Paulus gordylio attribuit. Tamen alibi ad ſugillata Tordylium recipit his verbis. Ad diurna ſugillata & liuida Tordylii partes duas, terræ ſamiæ partem vnam cum melle impone, animaduertens ne locus exulceretur. His addunt Lutetiani & Monſpelienſes ſtudioſi, inquit Pena, plantam illam quæ in pratis frequentior occurrit, ſaxifragiæ tenuiſſimæ ſimilis, quam pratenſe Sefeli vocant. Radix illi dauci vel pencedani, foris nigra, odora: caulis bicubitalis, folia ſileris montani, minora, anguſtiora, rigidiora, vmbella candida, ſemen Mei, nigrius & maius quàm fœniculi, omnium ſefeleon minimè odoratum, eoque perparum acre, quamobrem putarunt olim quidam Monſpelienſes eſſe maſſilienſe Sefeli Dioſcoridis.

FERVLA

FERULA.

CAP. XXVIII.

Nάρθηξ Græcis, Ferula Latinis nominatur. Quemadmodum autem *Nomina*
 νάρθηξ thyrsus, virgultum, bacillum Græcis significat, ita Latinis Fe-
 rula à ferendo dicta est, quod illius scapi pedamenta fruticibus, &
 senibus baculi ac scipiones essent. Hanc sic breuiter deliniat Dio-
 scorides, Ferula caulē sæpe profert ternum cubitorum, folia fœniculo similia, lon-
 gè crassiora & maiora (codices vulgares habent & rectè quidem παχύτερα ὃ πολὺ
 καὶ μείζονα. Ruellius conuertit longè asperiora & latiora, perinde ac si legisset βαχύ-
 τερα δὲ πολὺ τε πλατύτερα) qua ab imo caule vulnerata sagapenum efficitur. Plinius, *Lib. 3. c. 75.*
 Et ferulam, inquit, inter externas dixisse conueniet, arborumque generi adscripsis-
 se: quoniam quarundam naturæ, sicut distinguemus, lignum omne corticis loco
 habent, hoc est forinsecus, ligni autem loco fungosam intus medullam, vt sambu-
 ci: quædam verò inanitatem, vt harundines. Ferula calidis nascitur locis, atque
 trans maria, geniculatis nodata scapis. Duo eius genera. Nartheca Græci vocant, *Locus.*
 assurgentem in altitudinem, nartheciam verò semper humilem. A genibus exeun-
 tia folia maxima, vt quæque terræ proxima. Cæterò natura eadem quæ anetho, &
 fructus similis. Nulli fruticum lenitas maior: ob id gestatu faciliior baculorū vsum
 senectuti præbet. Hæc breuiter Plinius, quæ Theophrastus fusiùs explicauit his
 verbis. Δελιέον ὑπὲρ νάρθηκος τε τε νάρθηκῆας. ἔτε το αὐτὸ γένος ἔστιν ἀμφοῖν, διὰφέρον τε καὶ *Lib. 6. hist. cap. 2.*
 μέγεθος, ἔτε τὸ ἔλερον, ὥσπερ τινὲς φασιν. ἡ δὲ οὐκ ὀφθαλμῶν φύσις ἀμφοῖν ὁμοία, πλὴν καὶ τὸ
 μέγεθος. ὁ μὲν γὰρ νάρθηξ γίνεται μέγας σφόδρα. ἡ δὲ νάρθηκῆα μικρά. μονόκαυλα ὃ ἀμφοῖν, καὶ
 γοναίωδη. ἀπὸ ὧν τὰ τε φύλλα βλαστάνει, καὶ καυλὸς τινες μικροί. βλαστάνει δὲ παραλλάξ τὰ
 φύλλα, λέγω ὃ παραλλάξ, ὅτι ἐκ ἐκ τῶ αὐτοῦ μέρους τῶν γοναίων, ἀλλ' ἐναλλάξ. περὶ εἰληφό-
 τα δὲ τὸν καυλὸν ἐπὶ πολὺ, καθάπερ τὰ τῶ χαλάμου. πλὴν ἀποκεκλιμένα ταῦτα μάλλον, διὰ
 τὴν μαλακότητά, τε τὸ μέγεθος. μέγα γὰρ τὸ φύλλον, καὶ μαλακὸν, τε πολυχιδνές. ὥστε εἶναι βι-
 χῶδες. ἔχει ὃ μέγιστα τὰ καὶ πρὸς τὴν γῆν, καὶ αἰεὶ καὶ λόγον. ἀνθος δὲ μηλινοειδής, ἀμυ-
 ρόχαρπον ὃ, παρόμοιον τῷ ἀνήθω, πλὴν μείζον. ἐξ ἄκρου ὃ χιζέται, καὶ ἔχει τινὰς ἐμεγάλους καυ-
 λούς, ἐν αὐτῷ δὲ τὸ τε ἀνθος, τε ὁ χαρπός. ἔχει δὲ καὶ ἀνθος χαρπὸν, καὶ ἐν τοῖς παρακαυλίζουσι δι-
 ὀλκ, καθάπερ τὸ ἀνήθον. ἐπετετεὶ ὁ καυλὸν δὲ καὶ ἡ βλάστησις τῶ ἡρος, πρῶτον μὲν τῶν φύλλων,
 ἔπειτα τῶ καυλοῦ, καθάπερ τῶν ἄλλων. ῥίζαν δὲ ἔχει βαθεῖαν. ἔστι ὃ μονόρριζον. ὁ μὲν οὐκ νάρ-
 θηξ τοιοῦτος. Id est, Dicendum de ferula & ferulagine, siue idem est vtriusque ge-
 nus, & magnitudine duntaxat differant, siue diuersum, vt quidam putant. Perspi-
 cuum est igitur vtriusque naturam similem esse, præterquam magnitudinis ratio-
 ne, Ferula enim valdè grandis assurgit, ferulago humilis. Sed vnicaulis vtraque, &
 geniculata, ex geniculi folia & cauliculi erumpunt: ac folia alternatim exeunt, di-
 co alternatim, quod non in eadem geniculorum parte, sed ex aduerso sita sint, cau-
 lem magna ex parte amplexa, vt in harundine, nisi quod hæc inclinata magis sunt,
 mollitie, magnitudinisque causa, est enim folium ferulæ magnum, molle, & mul-
 tum incisum, vt capillaceum ferè sit, maxima sunt inferiora & terræ proxima, &
 sic deinceps proportionè, flos est melinus, semen fuscum, anetho simile, sed ma-
 ius, ferula in cacumine finditur, & cauliculos quosdam habet, in quibus flos & se-
 men, gerunt autem adnati cauliculi & florem & fructum veluti anethum, annuo
 caule constat. Vere germinant primùm folia, deinde caulis, vt & cæterorum, pro-
 fundam agit radicem & singularem. Talis ferula est. Ex his liquet duo ferulæ ge-
 nera esse, vnum νάρθηκα, alterum νάρθηκῆαν, quam ferulaginem vertit Gaza. Sunt
 etiamnum hodie, inquit Pena, duæ in herbariorum hortis huius crassiss, naturæ &
 similitudinis plantæ, quas idcirco ferulagines vocant. Eæ videntur tantum dista-
 re cultura, statura, elegantia, & succi copia, vt nocte fuerint radices aruum aridum,
 magisque excoctum, sub cælo sudo & feruidiorè, vt in Africa, Media, Cyrene, &
 alibi,

In Ad. fol.
348.In ca. p. 75.
lib. 3.

FERULA, Matth.



In Ad. fol
348.

NARTHECIVM, Theophr.

Ferulago Gaze.



alibi, ferulam ex Matthiolo hîc pictam damus, cuius Apulia maximè ferax est, inquit, frequens etiam prouenit in agro Romano, Thyrreni maris cōtermino, præsertim apud Centumcellas, & in vniuersis Hetruriæ maritimis. E quibus prima tantum germinatione corculum quoddam pastores eximunt, oui luteum induratum referens, quod sub cineribus assatum, prius tamen charta aut linteo conuolutum, deinde pipere & sale conspersum, non modo gustui gratissimus est cibus, sed etiam ad excitandam uenerem valentissimus. Plurima etiam & procerâ, auctore Pena in Gallica prouincia & Narbonensi Gallia, præsertim illis rupibus præruptisque saxi prope subterraneas cryptas, via qua Monspelio Frontignacum itur, itidem in celsis squallidisq; saxorum sinubus, qui soles æstiuos feruidos exceptos totum ferme fouent diē. Quinûm cubitorum caulis est, radix magna, recta, & altè in saxorum commissuras hiantes descendens, euulsu difficilis, candida, lacteo pinguiq; succo turgida, odorem vehementem vibrans, folia fœniculo maiora, pinguiora, crassiora, ut & caulis: umbellæ prægrandes anethi, Iunio & Iulio flosculis luteis defluentibus. Semen foliaceum, compressum, oblongum, rotundum, angelicæ ferme, duplo maius Νάρθηκιον Theophrasti, ferulago Gaze, in iisdem locis nascitur, in quibus & ferula. Ad hominis altitudinem ea crescit, radice dodrantali, pro magnitudine plantæ totius exigua, & graciliore candida, parum fibrata, gustu subacri, nō nihil odorata cum manditur: caule fœniculi, striato, ramoso, inani, folio fœniculi, ampliore, minore quàm in ferula, ad ramorum exortus prodeunte, alternis nunc ex hac, nunc ex illa parte, gustu subdulci & suaui: flore luteo in umbellis, amaro & subacri, odorato: semine oblongo. Peruenustam plantam Lobellius ostendit Galbaniferam ferulam, quæ orta est in Belgicis hortis, semine copioso, lato, foliaceo, aromatico, reposito Antuerpiæ in galbani lacryma. Tota facie ferulam refert: folia exilia: flosculi in umbellis hilarioribus: radix crassa, succo prægnans. Hæc Lobellius. Scribit Dioscorides ferulæ adhuc viridis medullam potam sanguinem spuē-

tibus & cœliacis prodesse, & contra viperarum morsus dari in vino, & sanguinis è naribus eruptiones inditam sistere. Semen potum torminosi auxiliari: mouere & sudores si cum oleo illinatur. Caules si edantur, capitis dolorem facere, muria condiri. Plinius ferulæ duo genera in peregrinis fruticibus diximus. Germen eius

*Vires &
Temper.*
Lib. 19. c. 9.

GALBANIFERA

Ferula, Lobell.



eius in Italia cibus est. Conditur quippe duratq; in vrceis, vel anni spatio. Duo eius genera: caules & racemi. Corymbiam hanc vocat, corymbosque quos condiunt. Et alibi, ferula semen simile anetho habet. Quæ ab vno caule diuiditur in cacumine, femina putatur. Caules eduntur decocti, commendanturq; musto ac melle, stomacho vtiles. Sin plures sumpti, capitis dolores faciunt. Radix denarij pondere in vini cyathis duobus bibitur aduersus serpentes. Et ipsa radix imponitur. Sic & torminibus medetur. Ex oleo autem & aceto contra sudores immodicos, vel in febribus proficit. Succus ferulæ aluum soluit fabæ magnitudine deuoratus. E' viridi ferula ramusculus vtiles est ad omnia ea vitia. Ad sanguinem sistendum decem grana seminis bibuntur in vino trita, vel medulla. Sunt qui comitialibus morbis dandum putant luna quarta, sexta, septima, ligulæ mensura. Natura ferularum murænis infestissima est, tactæ siquidem ea moriuntur. Castor radice succum & oculorum claritati cõferre multum putauit. Vt autem murænis infestissimam esse ferulam scripsit Plinius, sic asinis

Lib. 27. 23.

Lib. 24. c. 1.

Lib. 8. sim.

gratissimam, Ferulæ, inquit, asinis gratissimæ sunt in pabulo, cæteris verò iumētis præsentaneo veneno, qua de causâ id animal Libero patri assignatur, cui & ferula. Galenus eius vires generatim & breuiter sic declarat, ferulæ semen excalfacit & attenuat. Cæterum medulla adstringentis qualitatis particeps est, quo nomine sanguinem spuentibus & cœliacis conuenit.

THAPSIA

CAP. XXIX.



Thapsia Græcis, ita *Thapsia* Latinis nominatur, Arabibus *Iantum*, & *Driz*. Dicta est autē *Thapsia* quasi *Apsia* auctore Dioscoride, quod in *Thapso* eiusdem nominis insula primū inuenta sit. Potuit etiam dici *Thapsia*, inquit *Pena*, propter flāmeum calorem quem corpori admora inurit, adeoq; eminus, præsertim aduerso flatu spectanti. Tota natura ferulæ similis est, ita describente Dioscoride, gracilior tamen ipsius caulis est, folia fœniculo similia, in cacumine vmbellæ singulis furculis insident anetho similes, in quibus flos luteus, semen latiusculum, ferulæ simile, sed minus, radix intus cādida, foris nigra, magna, crasso cortice, acris. Ex hac vulnerata succus colligitur, vel ex eadem contusa exprimitur, quidam etiam folia simul exprimunt, sed debiliior est hic succus. Qui succum colligit stare debet non obuersus vento, aut potius cum dies apricus est, & à vento silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, & nudæ partes pustulas contrahunt. Quare liquidis ceratis adstringentibus nudas partes ante illinere oportet, & ita ad opus accedere. Plinius his consensanea scripsit. Semen ferulæ *Thapsiam* quidam vocauere: decepti eo quoniam ferula sine dubio est *Thapsia*, sed sui generis, foliis fœniculi, inani caule, nec excedente baculi longitudinem. Semen quale ferulæ, radix candida, incisa lacte manat, & contusa succo: nec corticem ab dicant, omnia ea venena. Quippe etiam fodientibus nocet si minima aspiret aura, intumescunt corpora, faciēque inuadunt ignes sacri: ob id cerato prius illinunt. Matthiolus tradit *Thapsiam* plurimā nasci in Apulia, præ

Nomina

Lib. 4. fol.

151.

In Ad. fol.

350.

Lib. 4. c. 151.

Forma.


Lib. 13. c. 22

Cap. 151.

lib. 4.

*THAPSIA, Matthioli.*In cap. 151.
lib. 4.In Ad. fol.
350.

Ibid.

Lib. 4. c. 151.
*Vires &
Temper.**THAPSIA Pena, vera.*

Lib. 13. c. 22.

lia, præsertim Gargano monte, inter permultas alias ferulacei generis plantas, atque etiam in maritimis Hetruriæ, ferulæ adeo similem, vt non nisi à peritis herbariis vna ab altera vix discernatur, spectari etiam hodie in hortis. Sed hæc vulgatio est thapsia Officinarum verior existimata, auctore Pena, & veræ thapsiæ radice non parum adsimilis. Tamen certum est longius à Dioscoridis descriptione abesse. Est enim foliis potius Carotæ, siue Dauci agrestis quàm ferulæ, ex Italia iandiu hortis Belgicis & Francis vulgaris notitiæ. Genuinam verò hæc depinxit ille, valde similem toto habitu & viribus ferulæ, tametsi vsu multo præstantiore, atque purgatrice vi. In Aquitaniæ macilentioribus montosisq; & squallidis inuenit præstantissimus medicus Rondelletius, propè vadum quâ traicitur in Hispaniam, tum ad radices Pyrenæorum, non procul Perpignano vrbe. Crassior est radice cortex, fusco foris colore, intus albido, succoq; multo manat lacteo, gummeo: caulis Peucedani, gracilior quàm ferulæ, folia fœniculo latiora, breuiora, in umbellis semen ferulæ minoris, oblongum, angustius, mōtani Sileris. Huius plantæ vires tum perutiles, tum noxias his verbis explicat Dioscorides. Vim purgandi habent tam cortex radice quàm succus, & lacryma in aqua mulsæ pota. Nam sursum ac deorsum bilem purgāt. Dantur radice oboli quatuor cum feminis anethi drachmis tribus: succi oboli tres, lacrymæ obolus vnus, quod amplius assumitur periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit asthmaticis, laterum diuturnis doloribus, sanguinis reiectionibus. At his qui difficulter vomunt in cibis & obsonio exhibetur. Tam radix quàm eius lacryma ex omnibus simili facultate præditis, vel maximè vim habent corporis miscellam transmutandi, vbi quid ex alto attrahere oportet, aut meatuum statum immutare. Vnde alopecias illitus succus, aut radix viridis affricta replet. Sugillata item liuorésque tollit radix trita, aut succus cum pari portione thuris & ceræ. Sed non vltra duas horas sinere oportet, postea aqua marina calida fouere. Delet quoque maculas à sole contractas cum melle illitus

succus, lepras tollit, tubercula rumpit cum sulphure perunctus. In diuturnis affectionibus pulmonum, laterum, pedum, articularumque vtiliter illinitur. Valet ad præputia inducenda iis qui non ex circumcissione curti sunt, tumorem excitans, qui cum perfunditur, & pinguibus emollitur, præputij defectum explet. Hæc Dioscorides. Quibus ferè consentiunt quæ scribit Plinius. Quibusdam tamen morbis

morbis auxiliari dicunt medici (radicem thapsiæ sub.) permistam aliis. Item in alopeciiis, fugilatisq; ac liuentibus, ceu verò remedia desint, vt scelera contrectent. Sed ista prætexunt noxio instrumento : tantùmque impudentiæ est , vt venenum artis esse persuadeant. Thapsia est in Africa vehementissima. Quidam caulem incidunt per messes, in hoc dissidet à Dioscoride, qui radicem tantùm incidi scripsit, & in ipsa excauant radice, quo succus confluat, arefactumque tollunt. Alij folia, caulem, radicem tundunt in pila , & succum in caule coactum diuidunt in pastillos. Nero Cæsar claritatem ei dedit initio imperij , nocturnis grassationibus conuerberatam faciem illinens sibi cum thure cerâque : & secuto die contra famam cutem sinceram circumferens. Ignem ferulis optimè seruari certum est, easq; in Aegypto præcellere. Et alio in loco, Ad lichenas & thapsiæ radice vtuntur trita cum melle. Theophrastus quoque de thapsiæ viribus hæc tradit. ἡ θάψιας ῥίζα ἐμελική. ἐάν τις χαλασῇ, καθαίρει καὶ ἄνω ἔκαστω. δύναται ὅτι τὰ πελιδνία ἐξαίρειν, ὑπόπια ὅ ποιεῖ τ' ἄλλα ἐκλυγὰ. ὁ δ' ὅπως ἰχυρότερος αὐτῆς. καθαίρει ὅτι ἔκαστω καὶ ἔκαστω. σπέρματι ὅ οὐ χεῖνται. γίνεται ὅ καὶ ἄλλοι μὲν, αὐτὰρ ἔν τῇ Ἀττικῇ. καὶ τὰ βοσκήματα ταύτης οὐχ ἀπύεται τὰ ἐγχώρια, τὰ δὲ ξένα βόσκειται, καὶ διαφόροι αὐτοῖς γίνεται, ἢ διαφθείρεται. Quæ sic conuertit Gaza. Thapsiæ radix vomitoria est , & si quis continuit tam superius quàm inferius purgat. Ad hæc liuida tollere potest. Suppurationes tamen alias exalbidas facit (Græcè legendum, ὑπόπια τ' ἄλλα ἐκλυγὰ, Id est, sugillata alia alba reddit), Succus eius validior est , & quidem tam superius quam inferius purgat. Nullus seminis vsus. Nascitur tum alibi , tum in terra Attica , in qua pecudes incolæ eam non tangunt, peregrinæ verò depascunt, & aut alius soluitur, aut intereunt. Galenus breuius & accuratiùs de iisdem scripsit. Thapsia, inquit, acrem habet, ac valenter excalfacientem facultatem cum humiditate cōiunctam, quamobrem ex alto violenter extrahit, & quod extrahit, digerit. Verum plusculum ad ea efficienda tempus postulat , vt quæ larga humiditate impleta est, cuius etiam vitio fit vt celeriter corrumpatur. Meritò desiit , inquit Petrus Pe. ex istius succo purgandi antiquorum consuetudo, vt quò multum noceatur præcipuis visceribus , & tormina dira interdum excitentur. Idem tamen ex triplici Officina- rum turbith , id quod cineritium dicitur à colore , vulgaris thapsiæ radicem esse censet.

Lib. 26. c. 4.

Lib. 9. hist. cap. 22.

Lib. 6. sim.

In Ad. fol. 350.

P S E V D O C O S T V S.

C A P. XXX.



SCRIBIT Matthiolus esse impostores qui ex Gargaro Italiae monte quotannis deferunt pseudocosti cuiusdam radices amari saporis, quæ facie quadantenus rhodiam radicem representant, easque pro legitimo costo pharmacopœis rei herbariæ ignaris vendunt, foliis est pastinacæ domesticæ maioribus, densioribus, crispis & asperioribus, humi accubantibus, caule rotundo, fœniculaceo, geniculato, bicubitali, è geniculis ramuli oriuntur in vniuerso caule, in quorum summitatibus umbellæ spectantur melino colore, nudo semine , & subrotundo. Radice nititur vegeta, crasso cortice carnosoque vestita, colore cinereo splendente. Commendant hanc herbarij qui ex Apulia deuehunt , ad omnes capitis neruorumque affectus frigidos, ad pectoris vitia, ventriculi cruciatus, viscerum omnium obstructions, & ad renum, vesicæ, & vteri morbos. Quare diuturno capitis dolore affectis , vertiginosis comitialibus, stupidis, veternosis, conuulsis, resolutis , asthmaticis , tussientibus , ictericis, hydropicis plurimum conferre pseudocosti radicem affirmant. Præterea flatu expellere , vermes necare , vrinas & calculos eiicere , menses , secundas , & partus educere , siue bibatur ipsa radix , siue decoctum eius, aut si in fomentis,

In cap. 15. lib. 1.

Forma.

PSEUDOCOSTVS,

Matthioli.

In Ad. fol.
34.38.

Nomina

Lib.1.c.3.

Forma.

Li. 20.c.23.

In Ad. fol.
347.

Lib.2.c.84.

Ca.85. hist.

balneis, aut decessionibus addatur. Præferunt eandem ad coli cruciatus, decocto eius clystere infuso, & aduersus articulorum morbos, & coxendicum dolores. Nam cum amara sit, nonnihil odorata, & acrimonia quadam prædita, hæc omnia præstare posse credibile est. Hanc nouam & perelegantem plantam nouit Pena, ab herbariis Illyricis sæpius ostensam, quæ nihil Costo dignum habet, sed potius facie est elaphobosci. Costum Illyricum hodie vocant. Folia sunt lineamentis Pastinacæ maioris, terram fermè radentia, & in ramulis caulem sesquicubitalem, fœniculaceum amplexa, umbellæ summæ in congerie ramulorum, lutei flores sunt, radix pollicem crassa, admodum amara.

MEVM CAP. XXXI.



Μῆον & μεῖον Græcis, Latinis Meum similiter dicitur, Arabibus *Me*, Officinis *Meu*, quod describitur à Dioscoride caule & foliis anetho simile esse, sed crassius anetho, ad cubitos duos assurgēs, sparsis tenuibus radicibus, obliquis & rectis, longis, odoratis, linguam excalfacientibus. In Hispania & Macedonia plurimum gignitur. Plinius, Meu, inquit, in Italia non nisi à medicis feritur, & iis admodum paucis. Duo genera eius. Nobilius Athamanticum vocant, illi tanquam ab Athamante inuentum, hi quoniam laudatissimum in Athamante reperiatur, foliis aniso simile (corrupta hæc videtur lectio, anetho enim legendum pro aniso) & caule aliquando bicubitali, radicibus multis & obnigris, quibusdam altissimis. Mei veri plurimas plantas sæpissime se vidisse affirmat Pena in Germaniæ, Galliæ, Italiæ, Hispaniæq; locis alpinis. Radix est odore suaui, spicæ, vel angelicæ, caule & foliis anethi, umbella candida. Iunio & Iulio floret, semen hippomarathri, odoratum. Eadem reperitur in celsissimis montium iugis, sterilis Seuena, loco præsertim cui nomen Gallicè *Lesperon*, Latinè Calcar, monticolis Sistræ nuncupata vernaculo nomine, vti Platearij & Pandectarij æuo, cui nulla doctorum omnium suffragio deest nota veri Mei Dioscoridis. Hanc Dodoneus perperam libanotidis primum genus facit, *Beoruurtz* Germanis dictam, propter capillatam radicem, inquit Fuchsius, aut quia vteri dolorem qui iisdem *Bernuter* appellatur, sanat. Matthiolus in postremis commentariis eandem plantam herbariorum quorundam diligentia repertam esse scripsit, quæ legitimum Meum refert, quibus assentitur, sed inuitus, quod huiusce plantæ radices odorem non vsque adeò gratum spirent, sed quadantenus grauiter oleant, nec tenues sint, vt vult Dioscorides, nec folia anetho similia, sed potius asparago. Hanc Apuli Imperatricem vocant. Hæc Matthiolus. At Imperatricis nomine, inquit Pena, vbiq; fermè locorum ignara herbarum plebs solita est alicuius incognitæ plantæ eximium & gratum odorem & vires insignes signare. Sic enim vulgò etiam Angelicam Imperatricem vocant: alioqui angelicæ aut Imperatoriæ cum Meo nihil est affinitatis, nisi odoris, qui in Meo perinde iucundus est. Et sunt folia situ & similitudine anethi, non asparagi, vt asserit, cui etiam si similia essent, tamen asparagum ipsemet fœniculo assimilat,



assimilat, & anethum adeò simile Fœniculo suo capite asserit, vt plerumque col-
 ligentes fallat. Idem Matthiolus scribit in secunda cōmentariorum editione plan-
 tam secundo loco appictam (eius tamen pictura in omnibus editionibus omissa
 fuit) à quibusdā pro Meo vsurpari, quod magis Anethum quàm altera referat, quo-

*Meum
 aliud.*

MEVM, Aliud.



rum sententiam nō improbat, quia priori po-
 tius Asparagi quàm Anethi folia insunt. Hanc
 plātam cuius picturam à Matthiolo diximus
 omissam fuisse, ex Lobellio hīc exhibemus, quę
 superiori Meo, inquit ille, facie non est absi-
 milis, sed folia, caules cubitales, umbellę, cras-
 siora & habitiora, subuirosi odoris. Radix
 item maior, foris pulla, Peucedani facie & con-
 cretione, tetri & iniucundi cūm odoris, tum
 saporis. Meum spurium Italicum vocat Lobel-
 lius. Sunt herbarij qui Meum aliud hīc depi-
 ctum pro genuino habeant, quod in Allobro-
 gum & Sequanorum montibus frigidissimis &
 altissimis nascitur, radice dimidio pede lon-
 giore, foris nigra, dauci cretici modo, intus cā-
 dida, brachiata, odorata: cauliculis multis, ner-
 uosis instar fœniculi, tres aut summū quatuor
 digitos altis, foliis breuibus, capillaceis, fœnicu-
 lo similibus, flore candido in umbellis densis,
 semine minutissimo, amaro & suauiter olente.
 Radices Mei, auctore Dioscoride, coctæ in a-
 qua vel tritæ citra coctionem & potæ præclu-
 forum renum, & vesicæ vitia mitigant. Vrinæ

Locus.

Forma.

Ibid.

*Vires &
 Temper.*

difficultati subueniunt, stomachi inflationibus, torminibus, vteri affectibus, articu-
lorum doloribus. Pectoris fluxionibus trita cum melle in eclegmate auxiliantur,
sanguinem pellunt per menses defensionibus decocta. Infantium publi illita vri-
nas mouent. Quod si plus quam deceat ex his bibatur, capitis dolorem inducunt.
Plinius eundem vsum medicum docet, sed is quoque corruptus est: sic enim legi-
tur in vulgatis exemplaribus. Ciet vrinam in aqua potum, radice trita vel decocta.
Inflationes stomachi mirè discutit, item tormina, & vesicę vitia, vuluarumque ar-
ticulis cum melle, infantibus cum apio illitum imo ventri vrinam mouet. Qui sic
integer legi debet, vuluarumque, & dolentibus articulis prodest. Thoracis item
fluxionibus cū melle, infantibus cum apio, &c. Mei radices ait Galenus, sunt cali-
dæ tertio ordine, siccæ secundo, quare vrinam mensēsq; ciere volentes hoc vtun-
tur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capitis dolorem mouet, vtpote cum plu-
sculum sit calidum quàm siccum, quippe cū humiditatem crudiūsculam etiam-
num & flatuosam caliditatem ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat lædatque.

MYRRHIS.

CAP. XXXII.

Nomina

Lib. 4. c. III.

Forma.

Li. 24. c. 16.

Lib. 26. c. II.

In cap. III.
lib. 4.

Υρρῖς vel μύρρα vocatur, Latinis Myrrhis, recētoribus cicutaria dici-
tur, quod cicutæ simillima sit. Nam caule & foliis cicutam refert, vt
scribit Dioscorides, radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo
non insuauis. Plinius eadem ferè tradit. Myrrhis quam alij Smyrni-
zūsam, alij Myrrham vocant, simillima est cicutæ caule, foliisque, & flore, minor
tamen & exilior, cibo non insuauis. Alio in loco cum Geranio odore confundit
his verbis Geranium aliqui myrrhin, alij merthrida appellant. Similis est cicutæ,
foliis minutioribus, & caule breuiori, rotundo, saporis & odoris iucundi. Matthio-

MYRRHIS, Matthioli.

Cap. 198. hi
stor.

lus scribit nasci plantam in multis Italiæ locis
cicutæ specie, minorem tamen, minimèque
græuolentem, cicutariam vocatā, à quibusdam
pro legitima myrrhide censerī. Alios pro myr-
rhide angelicam vsurpare, alios, vt Manardum,
illud oleris genus, quod cerefolium vocant.
Tandem concludit, si myrrhis in Italia proue-
niat, nullam sese offerre plantam, quæ propius
illa referat quam hæc cuius effigiē hīc damus.
Fuchsius eam myrrhidem esse censet, quæ re-
centioribus, vt diximus, Cicutaria, Gallis *Ci-
cictaire*, & *Persil d'asne*, Germanis *Vuildercoffel*,
Belgis *Vildeckeruel*, id est, siluestre cerefolium
nūcupatur. Est enim foliis & caule cicutę qua-
damtenus similis, folia minutissimè incisa sunt
quandoque, albis maculis signata, caules rotun-
di, bipedales aut tripedales, in quorum cacu-
minibus vmbellæ rotundæ, & in iis flores can-
didi, semen magnum & longum, radix subest
rotunda, longa, gustu ferè pastinacæ. Tota her-
ba & prima præsertim folia breui quadam la-
nugine vestiuntur, sūntque & odore & sapore
cerefolio proxima. Passim in hortis & pratis
nonnullis prouenit. Maio mense, loca in quibus prouenit, huius floribus quasi
candicant. His assentitur Pena scribens odoratam hanc siue salubrem & esculētam
posse vocari cicutam, quam myrrhidem, siue myrrham, propter suaueolentiam
quiddam

In Ad. fol.
3. 3.



quiddam myrrhæ respicientem dixerunt. Nec hæc perinde frequens aut procera occurrit, sed rarior, & in pratis vel graminosis marginibus, etiã olitoribus ad vescendum, in Belgio multa colitur & esitatur in iusculis cerefolij vice, cuius nomen

MYRRHIS Lappa,
Dalechampi.



apud Germanos asciuit, vt dictum est, quod odore saporisq; suauitate cerefolium imitatur, etiam facultatibus diureticis: facie verò est cicutæ, albicantibus ramis & foliis tenella hirsutie, pastinacam satiuam aut agrestem referente, radix prægrandis, altè depacta, prolixa, nec facilis euulsu, ferulæ, aut pastinacæ esculentæ, quam sapore & odore, sed magis medicato, & ad smyrnium accedente representat, semen admodum longum, cerefolij duplò maius, striatū, angulosum, fuscum, odorum. Lobellius Myrrhidem alteram parua ostendit, quæ Daucoides minor est cordi Cicutariæ odore siue Myrrhidis affinis admodum foliis & ramosis vmbellis minoribus, delicatioribus tamē semine oblongo, Dauci Cretici, exiliore, non hirsuto, nec ita dissimili sapore. In Geneuæ & Salenę vicinis montibus reperitur. Hæc Pena. Radix myrrhidis auctore Dioscoride, pota cum vino punctis à phalangiis auxiliatur. Purgat menstrua & secundas educit. Eadem cocta tabidis vtiliter in sorbitionibus exhibetur. Aiunt eandem in pestilentialibus cōstitutionibus bis tēve die potam in vino, à morbo seruare incolumes. Plinius eadē & quædam alia addit. Ciet menstrua & partus cum vino. Aiunt quoq; eandem potam in pestilentia salutarem

Vires &
Temper.
Lib. 4. c. 111.

Lib. 24. c. 16

esse. Subuenit & phthificis in sorbitione. Auiditatem cibi facit. Phalangiorū morsus restringit. Vlcera quæq; in facie aut capite succus eius in aqua triduo maceratus fanat. Myrrhis, inquit Galen. radicem habet odoris iucundi & dulcem, quæq; menses moueat, tum ea quæ thoracē ac pulmonem degrauant purget. Itaq; ex secundo ordine fuerit calfacientium admista quadā partium tenuitate. Dalechamptio Myrrhis lappa nominatur ea herba, quæ in frumentariis agris, pingui vliginosoq; solo nascitur, radice candida, apio hortensi simili, cum manditur: suauiter olente, modice fibrata, foliis coriā dri aut caucalidis, plerumq; latioribus, caule terete, cubitali, nonnunquam breuiore, læui, flore in vmbella candido, suis flosculorum fertis velut continuata, non vt in fœniculo dispersa, sambuco palustri, quem ille ob fragilē mollitiem Thraupalum Theophr. esse putat, simillima, inæqualiter flores edente: nam qui exteriorem vmbellæ partem occupant, panduntur & explicantur, compressis reliquis in medio iacentibus, fructum fert rotundum, exigua claua nō dissimilem, instar pilularū platani spinosum, & cum inaruit asperitate sua prætereuntium vestibis adhærescentem, flos tritus myrrhæ odorem validum ac iucundum naribus afflat, huic plantæ peculiarem, quam ob causam myrrham vocant. Hunc florē saccharo conditum rosarū violarumq; modo Rondeletius sæuiente peste dabat, quotidie ieiunis iuglādis magnitudine prospero successu, fœminæ quoq; ex utero suffocate eo remedio statim reuocantur. Suppressi virginū menses, ac propterea languidarū ac pallidarum eodem remedio aliquot diebus manē sumpto cientur.

LAPPA BOARIA. CAP. XXXIII.

Lib. 26. c. 11

Lib. 21. c. 17.

Lib. 7. hist.
cap. 14.



ANC plantam herbarij lappam boariam esse volunt à Plinio memoratam, hac ratione ducti quod huius fructus vestibis adhæreat, quemadmodū aparines, quam lappā vertit Plinius, quo loco hæc ex Theophr. interpretatur. Notabile & in lappa quæ adhærescit, quoniam in ipsa flos nascitur nō euidēs, sed intus occultus, & intra se germinat velut

LAPPA BOARIA,
Plinij.



Forma.

animalia quæ in se pariunt. Quæ sic Theophrastus. ἰδιον ὃ καὶ τὸ περὶ τὴν ἀπαρίνην, ἢ καὶ τῶν ἰμυλίων ἀντέχει διὰ τὴν βραχυτέραν, ἢ ἔστι διυσαφαίρετον. ἐν τούτῳ γὰρ ἐγγίνεσθαι τῷ τραχεῖ τὸ ἄνθος, οὐ παρὶόν, οὐδὲ ἐκφαῖνον, ἀλλ' ἐν ἐδυσίῳ πετρίομενον καὶ σπερμιογονόν, ὥστε παρόμοιον εἶναι τὸ συμβαῖνον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν γαλέων καὶ κρηνῶν (corruptè κρηνῶν pro ἐχιδνῶν) ἐκείνα τε γὰρ ἐν ἐδυσίῳ ὡτοκῆσθαι ζωογονεῖ. καὶ αὐτὴ τὸ ἄνθος ἐν ἐδυσίῳ κατέχευσα, καὶ πέτρεσσα καρποιοκεῖ. Id est, Propiū & hoc est Aparinæ, quæ asperitate sua vestibis adhærescit, vt difficile auellatur, flos enim in eo quod asperum est, nascitur, nō exiens, neque euidens, sed intus maturescens & semen pariens, vt illi simile sit quod galeis & viperis euenit. Illa enim cum oua intra se pepererint, animalia gignunt. Et hæc florem in se continens cōcoquensq;, fructum deinde parit. Nascitur hæc herba in agris pinguibus & stercoratis, radice apio hortensi non dissimili, odorata cum manditur, caule palmū alto, foliis coriandri, per obliquum valde & crebro incisus, flore in vmbella ex albo & subluteo subrubescente, fructu oblongo, spinoso, prætereuntium vestibis inhærescente, semine nigro, ad fructus figuram formato, gracili.



LIBANOTIS Græcis, Libanotis & Rosmarinum Latinis dicitur, Arabibus *Xaier Almeriem*, *Aspinalfach* & *Calchala*. Λιβανώτις στεφανώμα-
τον, Latinis Rosmarinum coronarium, Arabibus *Elkiolgeber*, Gallis
Romarin, Italis *Rosmarino*, Hispanis *Romero*, Germanis *Roskmarin*. Liba-

notis autem nuncupata est, quod odorem thuris habeat: λιβανός enim Græcis thus est. Dioscorides & Galenus tres statuunt Libanotides, duas fructum ferentes, vnā sterilem: quibus addunt Libanotidem coronariā, quæ propriè Romanis Rosmarinum dicitur, de quo alio loco dicemus. Plinius duas, & Rosmarinum. Duo genera eius, alterum sterile, alterum cui & caulis & semen resinaceum, quod cachrys vocatur. Foliis odor thuris. Theophrastus itidem duas, vnam sterilem, alteram fructiferam. Primum genus fecundum siue fructiferum est, cuius semen vocatur canchrys, siue cachrys, folia fœniculo similia ferens, vt describit Dioscorides, sed crassiora & latiora, in rotæ speciem per humum sparsa, odorata: caulem cubitalem aut maiorem, multas alas habentē, & in summo vmbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylion simile, rotundum, angulosum, acre, resinam olens, dum manditur gustum adurens. Radix est alba, admodum magna, thus redolens. Altera huius species supradictæ omnino similis semen fert latum, nigrum vt sphondylium, odoratum, non vrens linguam, radicē foris nigram, intus si frangatur albam. Tertia Libanotis quæ sterilis nominatur, superioribus planè similis est, sed neque caulem, neque florem, neque semen profert. Nascitur in petrosis & asperis locis. Theophrastus, τὼν ὁ λιβανώτιδων, inquit (διότι οὗτοι εἰσιν) ἡ μὲν ἀκαρπία, ἡ δὲ καρπία. καὶ ἡ μὲν καὶ τῷ καρπῷ, καὶ τῷ φύλλῳ χρησίμη. ἡ δὲ μόνον τῇ ῥίζῃ. καλεῖται ὁ ἀκαρπὸς καρχαῦς. ἔχει δὲ αὐτὴ τὸ μὲν φύλλον ὅμοιον σελίῳ ἐλπίῳ, μετῴον δὲ πολὺ, καυλὸν δὲ μέγεθος πῆχους, ἢ μετῴον, ῥίζαν δὲ μεγάλην τε παχέαν, λευκὴν, ὅρουσιν ὥστερ λιβανώτις: καρπὸν δὲ λευκόν, τραχὺν, πορομήκη. φύλλον δὲ μάλιστα ὅπως ἀνὰ χυμὸν χωρὶα, ἢ τε πειρώδη. ἡ δὲ ἀκαρπία ἔχει τὸ φύλλον ὅμοιον θειδακίνης τῷ πικρῷ, τραχύτερον δὲ καὶ λευκότερον, ῥίζαν δὲ βραχεῖαν. φύλλον δὲ ὅπως περὶ πλεῖστην ἐρείκη. Id est, interprete Cornario, Libanotidum (duæ enim sunt) altera infrugifera est, altera fructifera. Et altera etiam semine & folio utilis est, altera solum radice: vocatur autem semen cachrys. Habet fructifera folium simile apio palustri, sed multo maius, caulem cubiti magnitudine, aut maiorem, radicem magnam & crassam, albam, velut thus olentem: semen album, asperum, oblongum. Nascitur maximè vbi squallidi ac petrosi sunt loci. At infrugifera folium habet simile lactucæ amaræ, sed asperius & candidius: radicem autem breuem. Nascitur vbi erica plurima. Nam mendosè legitur in vulgatis exemplaribus εἶρη), quæ secutus Gaza vertit. Nascitur id quoque prædicto solo vberrimè. Legendum autem esse non εἶρη), sed ἐρείκη, vt animaduertit Hermolaus, perspicuè docet Dioscorides, hunc Theophrasti locum citans his verbis. Θεόφραστος δὲ ἰστορεῖ μετὰ τῇ ἐρείκης λιβανώτιδα θειδακίαν, τῇ πικρῷ ὅμοια φύλλον ἔχουσαν φύεσθαι, ῥίζαν δὲ βραχεῖαν, Id est, Theophrastus narrat cum erica nasci Libanotidem lactucæ agresti, amaræ similia folia habentem, radicem autem breuem. Plinius succinctè admodum hæc de Libanotide tradit. Libanotis odorem thuris (reddit suba.) Myrrhis myrrhæ. Et mox. Libanotis locis putribus & macris ac roscidis seritur semine: radicem habet olusatri, nihil à thure differentem. Vsus eius post annum stomacho saluberrimus. Quidam eam nomine alio Rosmarinum appellant. Quæ nam autem sint Dioscoridis & Theophrasti Libanotides scitu perdifficile est. Nam diuersi admodum generis plantæ Libanotidis appellationem sortitæ sunt, ob odorem quem spirant, thuris quadamtenus æmulum, cuiusmodi primæ Libanotidis radicem olere Dioscorides est auctor (Theophrastus quoque eundem odorem radici frugiferæ tribuit, Plinius

Nomina

Lib. 3. c. 72.

Li. 7. simpl.

Genera

Li. 24. c. II.

Lib. 9. hist.

ca. 12.

Lib. 3. c. 72.

Forma.

Lib. 9. hist.

cap. 12.

Embl. 76.

lib. 3.

Li. 19. c. II.

In Ad. fol.

31.

foliis. Idem Dioscorides priorem frugiferam folia fœniculi habere tradit, huic alteram frugiferam & sterilem in omnibus similes. Theophrastus sterilem folia habere lactuæ amaræ similia, sed candidiora & asperiora, radicem breuem. Primam

Ca. 71. li. 3. Dioscoridis fertilem Libanotidem ex Matthiolo hîc pictam damus, quam Vene-

LIBANOTIS, siue Ros-
marinum, Matth.

Lib. 2. c. 84.



CACHRYS Verior,
Libanotis Galeni.



Li. 2. c. 84.

Ca. 85. hist.
Ibidem.

tiis se vidisse ait, quæq; satis frequens nascitur in agro Goritienfi suprâ Salicanum in monte Gargaro. Alias duas neque depinxit, neque descripsit. Extot Ferulaceis, quæ vulgò Libanotides putantur, nullam Pena arbitratur melius conuenire descriptioni, ea quâ Patauinus hortus olim habuit, caule quinûm & senûm interdum cubitorum, fœniculi aut ferulæ nitidum, obscurè virentem, alis multis diuisum, è nodosis geniculis exeuntibus: foliis crebris, fœniculi crassioribus, Cotulæ maioribus, auersa parte in viridi cæsiis, umbellis per æstatem latioribus, ferulæ aut Thapsiæ: floribus luteis, semine fraxini, foliaceo, oblongiore quâ ferulæ, & cucumeris semine maiore, cōpressiore, striato, aceroso, resinaceo: thuris odore dum friatur, dum manditur os Rosmario & thuris sapore complente, acriore: reliqua planta tenera, calidiuscula, sed nō ingrato oleraceo Smyrni gustu, quo facile dignoscitur à ferula: alioqui lacte turgēt vt ferula, sed candidiore & feruido minùs, aut graui odore, imo potius odor. Est potius, inquit Lobellius, Rosmarinum alterum ferulaceum Dioscoridis. Cachrys verior semine est tereti, oblōgo, nucleo pini subpari, bipartito ferulæ ritu, gustu aromatico selseli Æthiopici resinaceo, caule cubitum & sesquicubitū æquante. Folia fœniculo crassiora, pallide virentia. Quidam Selseli Massiliense statuerunt: & sanè facultates respondent, vti & Rosmarino fœcundo, cuius semen Cachrys dicitur, & appositè substitui possunt. Belgis hortense est. Hæc Lobellius. Dodonæus primû Libanotidis genus id esse perperam existimauit, quod Meum esse paulò ante ostēdimus, quodq; Fuchsius Daucû Creticû Dioscoridis esse credit. Secundum Libanotidis genus Dodonæus id depinxit, quod Fuchsius tertium Dauci genus facit, Germani *Schunartz hirtzuurtz*, idest, radicem ceruinam nigram vocant, descripsitq; his ferè verbis. Caule est procero, nodoso velut fœniculi, foliis cerefolio, aut cicutæ non absi-

milibus, maioribus tamen, latioribus, & carnosioribus. In caulium cacumine umbellæ flores candidos ferunt, deinde semē odoratum, latiusculum, ferè angelicæ: radix foris nigricat, intus candicat, superiore parte capillata, resinam aut thus redolens. Est Lobellio Libanotis minor. Idem Dodonæus Theophrasti Libanotidē frugiferam

Li. 2. ca. 84.

LIBANOTIS II. Dod.

Dauci III. Fuchf.



frugiferam hanc exhibuit, quam diximus à Cap. 27. de
Matthiolo pro Sefeli Æthiopico priore loco Sefel.
depictam. Caulem fert rectum, inquit Dodo-
næus, geniculatum folia apij palustris, maiora,
flores in umbellis sicut in supradictis semen
longum, crassum, asperum, acre, radicem cras-
sam, spissam, candidam, summa parte villosam,
thuris aut resinæ odore. A qua sententia haud
valdè alienus est Pena. Hæc scribens. Non mul-
tum videtur abesse à Theophrasti Libanotide, In Ad. fol.
313.
planta foliis hipposelini, paucioribus, parum
in ambitu ferratis, semine in umbella foliaceo,
lato, oblongo, odore & sapore angelicæ, radi-
ce ferulæ, quæ comam promittit villosam, fur-
uam, Peucedani fermè vel Dauci, alba intus,
foris pulla, odorata, medicata, fermè siluestris
angelicæ. Ea Dauci alterum genus est Fuchfio,
quæ Germanis dicitur *Veiszhirtzuurtz*, idest, ra-
dix ceruina alba. Libanotis Theophrasti Lo-
bellio. Sterilis Libanotis Theophrasti foliis
lactucæ siluestris, orba caule, flore, & semine
vix cuiquam hodie nota. Aliam Libanotidem
Theophrasti maiorem monstrat Lobellius, fo-

liis magis carnosius, rotundioribus, amplioribus, nitetibus, semine cristato: cætera
similia & reuera eadem superiori. Hæc secundū est Ligusticū Matthioli. Herbarij
quidam Libanotidem aliam quam minimam vocant, statuunt, hîc depictam, quæ
iisdem in montibus & locis in quibus thlaspi montanum, prouenit, radice crassa,

LIBANOTIS III.

Dodonæi.

DAUCI Alterum
genus, Fuchf.

in multas

LIBANOTIS, *Theoph. maior*,
Ligusticum 11. *Matth.*

LIBANOTIS
minima.



in multas partes diuifa candicāte, supernè capillata, odorata, thus redolente, foliis circa radicē densis, humi stratis, tenuibus, fœniculaceis, paucis in caulibus, tribus aut quatuor, læuibus, palmū altis, per interualla nonnihil foliosis, flore in umbella candido, semine exiguo, suauiter olente, acri. De istarum plantarum viribus variis & eximiis quibus quæq; partes præditæ sunt, auctores hæc tradunt, ac primū Dioscorides. Trita omnium herba, inquit, & imposita cōmuniter hæmorrhoidas sistit, sedis inflammationes & condylomata mitigat: strumas concoquit, & abscessus, qui ad maturationem ægrè perducuntur. Siccæ radices cum melle vlcerā purgant, torminibus medentur, contra serpētium morsus cōueniunt cum vino potæ, menses & vrinas cient. Discutiunt & veteres tumores impositæ. Tam radicis quā herbæ succus cum melle mixtus & illitus visum exacuit. Semen potum eadē præstat. Auxiliatur comitialibus & antiquis thoracis affectibus: regio item morbo, si cum pipere & vino dētur: sudores mouet cum oleo perunctum. Confert & ruptis, conuulsis, podagrisq; tritum impositum cum loliacea farina & aceto. Vitiliginēs quoque deterget permixtum cum aceto acerrimo. Semine in potionibus vtendū est eius Libanotidis quæ cachryn non fert: acre enim illud est, & arteriam exasperat. Eundem vsum medicum Plinius docet his verbis. Radix vulnera sanat viridis imposita, & sedis procidentia, condylomata, & hæmorrhoidas. Succus & fruticis & radicis morbum regium, & ea quæ repurganda sunt. Oculorum aciem exacuit. Semen ad vetera pectoris vitia datur potui: & ad vuluas cum vino & pipere. Menses adiuuat. Podagris illinitur cum ærina farina: purgat & lentigines, & quæ excalfacienda sunt, aut cum sudor quærendus, illitum: item conuulsis. Auget & lac in vino potum: item radix. Ipsa herba strumis cum aceto illinitur: ad tussim cum melle prodest. Galenus tres Libanotides esse scribit, vnam sterilem, duas fructum ferentes, omnes verò eiusdem facultatis emollientis & digerentis. Succum tum radicis tum herbæ mixtum melli, obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine emendare. Cachrys semen vim habet calfaciendi & vehementer exsiccandi, anctore

Viresc.
Temper.

Li. 24. c. 11.

Li. 7. simpl.

auctore Dioscoride: quare smegmatis commodè admiscetur. Contra oculorū fluxiones capiti illinitur, & tertio die defricatur. Dicitur autem canchrys quod cum vrentis sit facultatis, similem inurit escharam cuti atque pilula canchrys: ita enim vocatur pilula, inquit Plinius, in medicina vrendi vim habens. Est igitur nomen id multis commune, id quod & testatur Plinius scribens, Cachrys multa genera habet, ut diximus, Sed hæc quæ ex rore supradicto nascitur, si fricetur, resinosa est. Aduersatur venenis & venenatis præterquam anguibus. Sudorem mouet, tormina, discutit, lactis vbertatem facit. Hæc Plinius: qui cum dixit cachryn resinosa esse, vertit vocem *ρητινίζων* apud Dioscoridem, ut & paulò ante cum dixit semē resinaceum, quod de odore intelligendum est. Theophrastus fructiferæ Libanotidis radicem vtilem esse tradit ad vlcera, & ad menses ducendos potam in vino austero nigro. Semen ad vrinæ stillicidia, & ad aures & argema, & lippitudines, & ut lac mulieribus inducat. At sterilis radix purgat, sursum ac deorsum. Quod enim ad germen est purgat sursum quod ad terram, deorsum. Prohibet etiam vermes vestibis interposita.

Ibidem.

Lib. 16. c. 8.

Li. 24. c. 11.

Lib. 9. hist. ca. 12.

CRITHMUM MATTHIOLI. CAP. XXXV.

K P I Θ M O N & *Κριθάριον* Græcis, Latinis Crithmum & Crithamum, vel Crethmum & Crethamum, & Batis Plinio. Fruticosa est herbula, ut depinxit Dioscorides, quamuis herbulae nomen parū conueniat cubitali plantæ, ac fruticosa: vndique foliosa, cubiti ferè altitudine, nascens in petrosis & maritimis locis, foliis referta pinguibus & subalbicantibus, portulacæ foliis similibus, latioribus tamen & longioribus (vetus codex habet nō *παχυλέποις*, sed *παχυλέποις*, idest, crassioribus: quæ lectio maximè conuenire videtur fœniculo marino, si id Crithmum est, quia folia habet præpinguia, albicantia, & portulacæ foliis similia, multò tamen crassiora, strictiora & longiora, falso gustu. Flores habet albos, & fructum ceu Rosmarini, odoratum, mollem, rotundum, qui siccatus rumpitur, & intus semen habet, ceu granū tritici (veteres enim & recentes Dioscor. interpretes *ὡς τριπὸν* legunt, conuerterunt enim ut triticū & tritici modo, & tritici figura. Plinius tamen *τριπῶδες* legisse videtur, conuertit enim semen feruens. Et si quis *τριπῶδες* legat, ut ferè Græca exemplaria habent, & fuluum semen accipiat, etiam sic ad tritici semen similitudo aliqua fuerit: quamquam ad tritici fracti candorem referendam eam similitudinem pleriq; putant, ex eo quod Plinius intus nucleum candidum dixit. Radices digitali crassitudine tres aut quatuor, odoratas, iucundas. Eadem est & apud Plinium & clarissima huius pictura. Eadem vis Crethmo ab Hippocrate admodum laudato. Est autem inter eas quæ eduntur siluestrium herbarum. Hanc certè apud Callimachum apponit rustica illa hecale: speciesq; eius est Batis hortensis. Caulis vnus palmum altus, semen feruens, odoratum, ceu Libanotidis, rotundum, siccatum rumpitur: habet intus nucleum candidum, quem aliqui cachryn vocant. Folia pingua albicant veluti oliuæ, crassiora & falso gustu: radices digiti crassitudine tres aut quatuor. Nascitur in maritimis petrosis. Istud Crithmum Matthioli, Dodonæi, & plerorumq; aliorum sententia planta ea esse cēsetur, quæ Officinis Creta marina, voce ex Crethmo corrupta, dicitur, Gallis *Crete marine*, *Bacille*, & *Fenouil marin*, Italis *Finochio marino*, & *Herba di Sanpetro*, Germanis *Bacillen*, Hispanis *Perrexil de la mar*, Empetrum Rondelletij. A quibus dissentit Pena: nam si attentius expendamus herbarum descriptiones ab antiquis traditas, videbimus hîc fruticosam dici plantam à Dioscoride, foliis pinguibus, longioribus, & latioribus quàm portulacæ, albicantibus, falsis, &c. Cui descriptioni portulaca marina melius congruit quàm fœniculus marinus, cunctis fermè herbariis hodie Crithmum putatum. Verùm fœniculus marinus neutiquā portulacæ

Nomina

Li. 2. c. 122.

Forma.

Cor. Emb. 115. lib. 2.

Lib. 26. c. 8.

CRITHMVM *Math.**Batis Plinij.**Vires &
Temper.*

Lib. 26. c. 8.

portulacæ similis est vt Dioscoridi placet, sed potius facie tota & umbellis fœniculo, vt inspectio ipsa vulgus ignarū vocare docuit, nec folia albent, sed virent porraceo colore: nec quia muria conditur, & passim esitatur, ideò est Crithmum habendum. Etenim non pauca aliæ sunt maritimæ, quæ in acetariis expetuntur, & muria seruantur, & iisdem fœniculo marino facultatibus pollere creduntur. Quare Herbariorum quidam, quod & Pena censuit, putant marinæ portulacæ, quā pro Halimio depinxit Matthiolus, historiam, Crithmo longè magis congruere, quàm fœniculo marino, Pliniumq; deceptū, hortensem Batidem, quæ fœniculus marinus est satius, existimasse Crithmi speciem. Semen Crithmi, inquit Dioscorides, radix & folia in vino cocta & pota, vrinæ difficultati & regio morbo auxiliantur. Mouent menses, estur crudum coctūve oleris modo. Conditum quoque muria seruatur. Eadem & quædam alia Plinius tradit. Estur crudum coctūve cum olere, odorati saporis & iucundi.

Seruatur etiam in muria præcipui vsus ad stranguriam folio, vel caule, vel radice ex vino. Colorem quoque corporis gratiorem facit: verum æquo largior inflationes. Aluum soluit decocto, vrinamque, & à renibus humorem trahit. Galenus Crithmum scribit falsum esse cum paucula amaritudine: quamobrem vim eius esse exsiccatoriam & absterforiam: vtramq; tamen in eo imbecilliolem esse quàm in amaris. De duobus aliis Crithmi generibus à Matthiolo traditis diximus in libro de Maritimis.

STRATIOTES MILLEFOLIA. CAP. XXXVI.

Nomina

ΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ὁ χιλιόφυλλος Græcis, Stratiotes millefolia, & militaris millefolia Latinis dicitur, Gallis *L'herbe militaire* à *Millefeuilles*. Stratiotes verò Græcis, idest, militaris dicta est, quod vulnera ferro fanet, atq; ideo in militia & castris multus eius vsus sit. Dioscorides aliquot nomine affines plantas militares, siue millefolias cōstituit. De Stratiote militari aquatico diximus inter palustres, de reliquis agimus hoc capite: ac primū de Stratiote millefolia nostra, quam describit ille fruticem esse paruum, palmi altitudine, aut etiam maiorem, folia habentem pennis auicularum similia. Alij pro νεοτὸν ὡλερῶν, legunt νεῶ τῇ ὡλερῶν. Idest, recenti ac tenellæ filici. Sunt autem exortus foliorū valdè breues & fissi: maximè verò similia sunt folia breuitate & asperitate cumino agresti, atque etiam breuiora: umbella huius densior est ac plenior: in cacumine etiam festucas paruas habet, in quibus umbellæ sunt anethi modo, flores parui, albi. Nascitur in agris asperis, & maximè circa semitas. Hanc Stratiotem terrestrem Matthiolus & periti alij herbarij plantam esse censent, quæ Officinis & vulgò Millefoliū nuncupatur, Gallis *Millefeuille*, Germanis *Garben*, & *Tausentblatt*, & *Scaffripp*, longè diuersam à nigriophyllo de quo paulò post dicemus. Dodonæus Achilleæ, Fuchsius Stratiotæ millefoliæ nomine exhibuit. Matthiolus scribit huius Millefolij genus quoddam nasci in agro Goritiensi, Saluatino monte, quod superius vincit magnitudine, sicut ex effigie hîc picta videre licet, vt meritò Millefoliū maius appeller.

Genera
Cap. 4.

Li. 4. ca. 98.

Forma.

Ca. 98. li. 4.

Li. i. c. 100.
Cap. 277.
hist.
Ibidem.

Pena

STRATIOTES Millefolia
maior, Matth.



STRATIOTES Millefolia
minor, Matth.



siluestris, & fœniculi. Alium Stratiotem aquaticum ἀδζωδῶν pingit Dodon. cap. 99. lib. I. & nos in lib. de palustribus, ut diximus. Aliud est nomine quidem affine, sed re diuersum Millefolium, dictum Græcis μυερόφυλλον, à numero decem milliū foliorum, & μαραθρόφυλλον teste Dioscoride, idest fœniculifolium, quod ita ab eo-

Pena priorem Millefoliam, Stratiotē, siue Millefoliam terrestrem Dioscoridis cū multis esse credit, quæ fideritidi Achilleæ tum figura, tum effectū valdè affinis est, inquit, tamen terrestris Stratiotes minor est, furculis rectis, foliis verò alatis, pennatisve inter filicē, atque filipendulā, sed minoribus multò, & quā Achilleæ breuioribus. Umbellæ ex disparibus ortu furculis, gracilibus circinantur atque cōflantur, plurimū & passim pratorum & aruorum marginibus candidæ: sed præter hæc etiam purpurascētes, & luteo aspectu micantes umbellæ in Narbonensis Galliæ montosis, squallidis, editis, sed æstuosis se inuenisse affirmat, & ad Magdalenaæ saxum specum prouinciæ Galliæ, & Italiæ Genuensis asperis, vbi cinereo colore & lanugine pubet tota. Idem Pena ingeniosè admodum subodoratus est mutilam, aut deprauatam fuisse capitis de Stratiote millefolio lectionem, quæ Dioscorides modo folia Stratiotis millefolij pennis auicularū comparat, modo foliis cumini siluestris, suspicatusq; est Stratioten Millefolium, à fluuiatili Aëizoeide diuersum duplicem hîc proponi ex confusa vel anticipiti descriptione, nempe vnum terrestre, filicis folio, & alterum aquaticū, cumini siluestris, duabus fortè plantis vnā in descriptionem congestis. Quamobrem cū diligentius perpendisset, tandem visum illi fuit hanc repetitā foliorum Stratiotis myriophylli cum cumino siluestri collationē, aptius nulli quadrare posse, quā alteri Stratioti myriophyllo, in aquis nascenti, eiusdem cum terrestri speciei & figuræ, cuius folia quā plurima à medio ad imum scitè exprimunt cuminum siluestre, aut coriandrū: superiora verò sunt fœniculi, sed tenuiora, delicatiora, molliora, ut aptè etiam quadam habet lectio, nō amaraci (ut falsò legūt) sed marathri: reliqua minora, sed similia supernè floribus millefolij. Hunc Matthiolum Stratioten aquaticum semperuiuo simile fecit postremis commentariorū editionibus, eoq; nomine perbellè pinxit, cū tamen perspicuum sit neutiquam esse foliis semperuiuo maioribus, magisq; refrigerantibus, sed potius coriandri aut cumini

Ibidem.

Ca. 97. li. 4.

Li. 4. c. 110.
Forma.

STRATIOTES Millefolium
aquaticum, Matth.

Locus.
Li. 24. c. 16.



multa sunt folia, lævia, fœniculo similia, vnde nomen accepit. Caulis ipse subfulvus est, varius, veluti de industria delineatus. Nascitur in locis palustribus. Eadem omnino Plinius habet. Myriophyllum quod nostri Millefolium vocant, caulis est tener, similis fœniculo, plurimis foliis: vnde & nomen accepit. Nascitur in palustribus, magni vsus ad vulnera. Hæc planta, neque vulgi, neque Officinarum est Millefolium, quod multis à radice caulibus profiliat, foliis constet à fœniculo multum distantibus, nascaturq; in pratis & incultis, non autem in paludibus. Sed genuinum Myriophyllū istud est, quod ex Matthiolo depinximus, sæpè à se visum in vallis Ananiæ paludibus, vnico tantū caule, innumeris foliis referto, capillaceis, fœniculi modo, odore non ingrato. Idem sentire videtur Pena. Myriophyllum siue Maratrophylum palustre facile est, inquit, à cæteris dignoscere: sæpius enim id reperias in aquis leniter fluentibus & palustribus, innumeris foliorum capillamētis, exilibus, è nervis per æqua interualla pinnatim exeuntibus, teneritudine

& diuisura fœniculi pullulantis, aut corrudæ, mollioribus, colore ex viridi fusco, molliusculo, teneroq; caule in aquis fluitante, eq; radice exigua, euulsu facili, pallidula: lutea umbella emicat, gustu quadamtenus palustris equiseti. Myriophyllum alterū ex Matthiolo hîc appinximus, quod idē est cū Viola aquatica Dodonæi,

MYRIOPHYLLVM.
prius, Matthiol.



MYRIOPHYLLVM.
alterum, Matthioli.



à nobis

à nobis depicta & descripta in lib. de palustribus. Singularum vires nunc sunt expendendæ. Stratiotes millefolia, auctore Dioscoride, valde utilis est ad sanguinis eruptionem, ad vlcera vetera, recentiaq; & ad fistulas. Stratiotes terrestris, inquit Galenus, nonnihil habet adstrictionis: quare & vlcera glutinare potest, & vulneribus esse utilis. Sunt qui eo ad sanguinis eruptiones vtantur, & ad fistulas. Scribit Matthiolus dari vtiliter Millefolij succum ad sanguinis reiectiones. Idem præstare sicci farinam ex symphyti maioris, aut plantaginis, aqua potam. Eandem naribus inditam sanguinem inde fluentem compescere: dysentericis vtiliter infundi cum ipsius succo. Herbam recentem tusam, & suppositâ, pubiq; illitâ mensium profluvia cohibere. Eandem, cui candida inest vmbella, cum floribus tusam, & cum suis ipsius aqua, aut caprino lacte potam: guorrhœam in viris, in fœminis alba vteri excrementa sistere: idq; valentius efficere, si cum corallio, succino, & eboris scobe propinetur. Mirum in modum conferre eiusdem farinam ad sanguinis mictum, si vnciæ pondere cum armenia terre drachma ex vaccino lacte potui detur ieiunis, diebus tribus continuis. Commanducata folia præsertim recentia, dentium dolorem mulcere: idem efficere commanducatam radicem, & diu sub dolente dente retentam. Dari herba decoctum cum labruscæ floribus vtiliter porandum contra vomitum. Myriophyllum verò tradit Dioscorides, vulnera recentia ab inflammatione liberare, vel viride, vel siccum ex aceto impositum. Bibitur etiam ex aqua & sale ad casus ex alto. Myriophyllum, inquit Galenus, vsque adeo deficcatoriæ facultatis est, vt vulnera glutinet. Plura Plinius tradit. Cum aceto bibitur ad difficultates vrinae, & vesicae, & suspiria, præcipitatisque ex alto: efficacissima eadem ad dentium dolores. Hetruria hoc nomine appellat herbam in pratis tenuem, à lateribus capillamenti modo foliosam eximij vsus ad vulnera. Boum neruos abscissos vomere solidari ea, rursusq; iungi addita axungia affirmans. Pinximus & alterum Myriophyllum ex Matthiolo, sed non vmbelliferum, quod Dodonæo secundum genus est Potamogetonis, & quorundam herbariorum iudicio, Potamogeton Castoris apud Plinium, ca. 8. 26. folio tenui, velut equinis setis, thyrsologo, & læui, in aquosis nascens. Stratiotes alia à Clusio pingitur & describitur palmari magnitudine, duobus tribusve ab eadem radice cauliculis, quos folia vulgaris Stratiotis foliis similia ambiunt, molliora multò & tenuius incisa, flores in vmbellis alteri forma similes, sed lutei: radix vnica, dura, furculi tamen alterius Stratiotis & chamæmeli modo serpunt, & radices agunt. Crescit in Murciano regno, & supra Auenionem itinere Nemausensi lapidoso & sterili solo. Floret Maio & Iunio. Potest & ad Achillæam Dioscoridis referri, quia flore luteo inueniri scribit, vt sit minus eius genus.

Vires & Temper.
Li. 4. ca. 8
Li. 8. simpl.

Ca. 98. li. 4.

Li. 4. c. 110.

Li. 7. simpl.

Li. 24. c. 16.

STRATIOTES

Lutea, Clusij.



Nomina

Lib. 4. c. 32.

Forma.



ΧΙΛΛΕΙΟΣ, & ἀχιλλεῖος σιδηρίτις Græcis dicitur, Latinis Achillea, & Achillea sideritis, ob id sideritidis generibus à Dioscoride subdita, Plinio Millefolium. Virgas fert palmi altitudine, ita describente Dioscoride, aut etiam maiores, fusorum effigie, & circum ipsas foliola tenuia ex obliquo crebras

ACHILLEA Sideritis,
Matthioli.

Lib. 25. c. 5.



Ca. 32. li. 4.

ACHILLEA Montana, Pena.

Lib. 4. c. 32.



L. 13. Impl.

incisuras habentia, coriandro similia, subfulua (legitur in veteri codice non ὑπόπυρρα, sed ὑπόπικρα, idest, subamara) viscida, odoris multi, non iniucundi, sed medicati: umbellam in cacumine rotundā, flores albos, purpureos, & aureo colore. Prouenit læto solo. Plinius sic descripsit. Inuenit & Achilles discipulus Chironis, qua vulneribus mederetur, quæ ob id Achilleos vocatur. Hac sanasse Telephū dicitur. Alij primū æruginē inuenisse vtilissimā emplastris, ideoq; pingitur ex cuspide decutiēs eā gladij in vulnus Telephi. Alij vtroque vsum medicamento volunt. Aliqui & hāc Panacem Heracleō, alij Sideritim, & apud nos Millefolium vocāt, cubitali scapo, ramosam, minutioribus quā fœniculi foliis vestitam ab imo, &c. Quibus verbis, Plinius Stratiotē myriophyllū de quo proximo capite diximus designasse potius videtur, quā Dioscoridis Achilleā. Videtur & Millefolij nomēclatura suasisse quibusdam vulgare nostrū Millefoliū Achilleā esse, quæ sententia facilē refelli potest, quod Millefolium vulgare neque coriandro similia folia habeat, neque fœniculo minutiora. Vera autē Achillea ex Matthiolo hīc proponitur, quā in Hetruria prouenire scribit, & in Goritienī agro, scapis ferē cubitalibus, foliis coriandro proximis, odore quadamtenus graui, non tamen ingrato, umbella in cacumine rotunda, amplaq; colore in purpura albicante, punctis quibusdam aureis picta. Coma huius trita, vt tradit Dioscorides, cruenta vulnera glutinat, & inflammationem arcet, sanguinis eruptiones inhihet, & eas quæ ex vtero fluunt apposita in pessa. Sed & decoctum ipsius paratur ad infessus mulieribus fluxione laborantibus. Bibitur ad dysenteriam. Et Galenus. Quidam, inquit, vocant Achilleon Sideritim, quæ propositæ quidē viribus est nō dissimilibus, cæterum adstrictione exuperat. Quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebre profluuium congruit. Achilleam aliam Pena depinxit, montanam, Artemisiæ tenuifoliæ facie, perelegantem, & parum frequentem, nisi celsioribus Calcaris & horti Dei montium Narbonensium

bonensium iugis. Radice est pusilla, senecionis: cauliculis multis, pedalibus, gracilibus, foliis quàm superioris tenuioribus, habitioribus, succulentioribus, viridioribusq; umbellis in summitate Millefolij aureis: semine oblongo, tanacetij, aut abrotonij. Floret Iulio & Augusto.

B O L B O C A S T A N V M.

C A P. XXXVIII.

ALEXANDER Trallianus empyematicis victus rationem præscribēs, inter permulta alia Βολβοκαστανων meminit. Quo loco Goupylus vocem hanc depravatam fuisse à descriptoribus annotavit, quod castanea, neque ex bulborum genere sint, neque bulbis simile quicquam habeant, ex glandium enim genere sunt, ex quo coniicit veterem scripturam fuisse. Βαλβνοκαστανων. Sed cum natura plantas proferat habitu & figura radice, bulbos, sapore gustuque castaneas scitè exprimentes, visum est Dalechampio Tralliani lectionem non immutare, & plantas hinc expressas Bolbocastana ab eo nuncupari, sexu discreta, ut vnum sit mas, alterum foemina. Bolbocastanum mas in pratis vdis & riguis nascitur, radice bulbosa, nobis extuberante, extrinsecus in nigro rufescente, intrinsecus candida, gustu castaneæ. Prælongum quoddam & gracilè veluti filum ex se mittit, sæpius intortum, paulatim crassescens in


Lib. 7. ca. 2.

Nomina
Genera.

Forma.

B O L B O C A S T A N V M

mas, Tralliani.



B O L B O C A S T A N V M

foemina, Dalechamp.



caulis originem: caulis cubito maior est, rotundus, in quo folia pauca, fœniculo similia, veluti & caulis, ex articulis prodeuntia. Umbella in summo candida, semen oblongum, apice gemino conspicuum, subacre. Dodonæo est Bunium Dioscoridis, in Historia stirp. in Bolbocastanum in Purgant. Historia, Lobellio Nucula terrestris perperam Oenanthe Matthiolo. Bolbocastanum foemina in siccanis pratis oritur, radicibus multis, bulbosis, his auellanarum, modo rotundis, illis

BOLBOCASTANVM
grandius, Dod. Bunium.



Lib. 5. c. 23.

oblongis, dulcibus, castaneæ sapore, fibris quibusdam inter eas & ex iis nascentibus, caule anguloso, cubitali à radice mox crassiusculo, non tenui filo, ut in altero genere cum radice connexo, rubro, foliis fœniculi, paucioribus quàm in mare, & minùs densis, sed carnosioribus, umbella candida, semine paruo, coaceruato, cùm nouellum est, rubescente, subacri, extantibus in singulis seminum apicibus, binis tanquam aculeis. Potest & planta alia hîc picta Bolbocastanum grandius rectiùs appellari, quàm Bunium, ut Dodonæus vocat, quod caule est læui, anguloso, cubitali. Folia ima apij vulgaris folia referunt, nisi quod minora sunt, & minutiùs incisa, quæ in caule sunt anethi foliis haud absimilia. Flores candidi in umbellis anethi similibus, semen exiguum, odorù, cumino, aut fœniculo non multum dissimile, sed minùs radix rotunda est parui mali instar, fusca foris, intus cãdida, gustu Pastinacæ. Locis multis Hollandiæ & Zelandiæ crescit intersata & secus vias, & copiosius in Anglia. Iunio flores & semen profert.

B V N I V M.

C A P. XXXIX.

PRIMUM Lector mouendus est in quibusdam etiam veteribus Græcis Dioscoridis exemplaribus libro secundo capiti de lampſana, caput de Bunio non rectè subditum fuisse à descriptore, nominum *τῆς βενιάδος*, idest napi, & *τῆς βενίς* similitudine decepto, cùm tamen re ipsa diuersissimæ sint plantæ. Nam præterquã quod absurdum fuerit eiusdem plantæ historiã diuersis libris à Dioscoride conscribi, certè raporum, raphani, naporum, & cæterorũ id genus olerum descriptio, & natura, à Bunio & pseudobunio herbis insigniter medicatis omnino dissidet, nec rectè cõiungi potest. Quare ex vetustiorum etiam codicum fide rectè Bunij & pseudobunij Historia in librum quartum reiecta est. Eadem nominum affinitas multis etiam doctis herbariis erroris causa fuit: primũ Plinio qui Bunium napi genus facit his verbis. Naporum duas differentias, & in medicina Græci seruant. Angulosis foliorum caulibus florentis, & quod Bunium vocant, &c. Deinde Ruellio qui capite de pseudobunio *φύλλα βενίω ὅμοια*, folia napi conuertit: item Oribasij interpreti, qui *βένιον* napum interpretatus est. Huc etiam impegit Matthiolus, Bunium napum siluestrem vocans, cùm napus siluestris *βενιάς* sit, non *βένιον*. At Bunium neque Bunias est, neque eadem figura, neque iisdem viribus,

B V N I V M, Dalechamp.



Li. 20. ca. 4.

Li. 4. c. 120.

aut

aut classe, cum buniade. Verum autem buniū Dalechampij iudicio hīc pīctum est, quod locis saxosis, asperis, & à sole illustratis prouenit, radice candida, furculosa, odorata, festucis in summo villosa, foliis proximè radicem tam facie similibus apio hortensi, ut spectantes fallant, tenuioribus ad coriandri folia accedentibus, caule quadrato, procero, minimi digiti crassitudine, flore umbellæque anethi, semine odorato, quàm in hyoscyamo minore. Est hīc obseruandum nec in nostris exemplaribus Græcis, nec in Oribasio in bunij caule ramulos minutis foliis ac floribus scaterere, item folia apio quidem similia legi, sed non proximè radicem. Quare necesse est aut verba hæc redundare, aut Ruellium alio exemplari quàm nostro vsum. Pena verum buniū esse bolbocastanum suspicatur. Buniū, ut tradit Dioscorides, vrinam ciet, excalfacit, secundas educit, spleni, renibus, & vesicæ vtile. Tam humidi quam ficci, expressique fucci caulibus, foliis, radicibusque vsus inualuit ex aqua mulsâ. Galenus buniū, inquit, adeò excalfacit, ut & vrinam moueat, & menses prouocet.

Forma.

In Ad. fol.

71.

Lib. 4. c. 19.

Vires &

Temper.

Lib. 6. sim.

E L I C H R Y S V M. C A P. X L.



Ἐλίσχυρον Dioscoridi, Theophrasto ἑλετόχρυσον, aliis ἡλιόχρυσον, Gale-
no ἀμάραντον, Latinis quoque elichrysum, eliochrysum, & Heliochry-
sum nominatur. ἑλίχρυσον verò & ἑλετόχρυσον, quod locis aquosis &
palustribus, quæ Græcis ἐλη dicuntur, proueniat. ἡλιόχρυσον quod ad
solis qui ἥλιος Græcis est, percussum aurea luce flores huius plantæ fulgeant, quâ
ob causam Aureliam vertit Theodorus. Elichrysum quo deorū simulacra coro-
nabant, tradit Dioscorides, ramulum habere candidum, virentem, rectum, solidū,
folia ex interuallis angusta, ad abrotoni folia accedentia, comam aureæ lucis, in
orbem, umbellam rotundam velut corymbos aridos, radicem tenuem. Nascitur
in asperis & torrentium alueis. Plinius inter vernos flores elichrysum recenset,
paulò post ait, Heliochrysos florem habet auro similem, folium tenue, cauliculum
quoque gracilem, sed durum. Hoc coronant se magi: atque si vnguenta sumantur
ex auro, quod apyron vocant, ad gratiam quoque vitæ gloriâque pertinere arbi-
trantur, quod & repetit aliquanto post. Heliochrysum quod alij Chrysanthemū
vocāt, ramulos habet candidos, folia subalbida, abrotono similia, ad solis percus-
sum aureæ lucis in orbem veluti corymbis dependentibus, qui nunquam marce-
scunt. Qua de causa Deos coronāt illo, quod diligētissimè seruauit Ptolemeus Rex
Aegypti. Nascitur in frutetis. Quæ omnia ex Theophrasto mutuatus est hoc
præsertim loco. ἐνδοξεί ὅτι καὶ ἐάν τις τῶ ἐλιοχρύσου τῷ ἀνθῷ σφρανῇται, μύρω βαίνων ἐκ
χρυσῆς ἀπύρου. ἔχει δὲ ὁ ἐλετόχρυσος τὸ ἀνθος χρυσοειδές, φύλλον ὃ λευκόν. (Plinius legit
λεπρὸν, conuertit enim tenue, Dioscorides στενὸν, id est, angustum,) καὶ τὸν καρπὸν δὲ
λεπρὸν (legendum καρπὸν pro καρπὸν, iisdem auctoribus, quod Theodorus non
animaduertit) καὶ σκληρὸν. ῥιζαν δὲ ἐπὶ πόλαιον ἔλεπρην. χρῶνται ὃ αὐτῷ πρὸς τὰ διακεῖ-
ν ἐν οἶνῳ, καὶ πρὸς τὰ πνεύματα, καὶ ἀχρυσάντες ἐμίσαντες μέλιτι. Id est, Qui etiā elichry-
si flore coronantur, vnguento ex auro ignis expertè insperso gloriam & famam
bonam assequuntur. Habet elichrysum florem auro similem, folium tenue, cau-
lem tenuem & durum, radicem per summam terram vagantem & tenuem. Hoc
vtuntur aduersus serpentium morsus in vino, & ad ambusta igni, si cumentur, &
melli misceatur. Sunt qui plantam quæ Officinis Stœchas citrina nominatur eli-
chrysum Dioscoridis esse volunt, sed proculdubio hallucinantur. Nam folia illi te-
nuia, abrotoni modo non sunt, sed longa, albicantia, & hirsuta, caules palmares
aut maiores, lanuginosi & incani, in quorum summitatibus flores quidē sunt au-
rei, sed globosi, odorati, & in umbellæ diuulsæ modum sese pandentes. Dodonaus
eliochrysum Theophrasti ab elichryso Dioscoridis permultum distare existimat,

Nomina

Lib. 4. c. 52.

Forma.

Lib. 21. c. 11.

Cap. 25.

Lib. 6. hist.

c. 7. & lib. 9

cap. 21.

Matth in

c. 52. lib. 4.

Lib. 1. c. 60.

illudq; stœchadem citrinam Officinarum esse, minimè verò Dioscoridis elichrysum.

ELICHRYSUM,
Matthioli.



ELICHRYSUM Italicum,
Matthioli.



*Vires &
Temper.*

Lib. 4. c. 52.

Lib. 21. c. 25.

Genuinum autem elichrysum siue eliochrysum, Matthiolus id esse putat, quod copiosè provenit in Hetruriæ pratis, gracili solo, incultisque locis ac sitientibus collibus, nec non etiam in fluminum alueis, caule constat recto æquali, & lignoso, cubitalem longitudinem non excedente, foliis per intervalla emergentibus, abrotoni æmulis, comantibus in cacumine floribus, aureo colore fulgentibus, & in orbem in umbella coherentibus, corymbacea facie, qui exsiccati colorem aureum diutius retinent. Quare commodè hyeme cum flores defunt, puellæ siccum elichrysum coronis suis inferunt. Idem approbare videtur Pena his verbis. Eliochochryso aurei floris decus coronamentis, ut Theophrastus innuit, addi solitum, & ad radiorum solis repercussum coruscantem lucem intuentibus vibrantes corymbi, nomenclaturam speciosam reliquerunt, nobisque signarunt certissima illius cognoscendi indicia, qualia in isto vulgari cernuntur, umbellæ corymbaceæ multis è bullis extantibus circumdata, & aureo aspectu micantes, tanacetum & ageratum diuturnam coloris gratiam servantes in rectis virgibus, gracilibus, virentibus pedem & cubitum altis, duris alis & foliis per intervalla, abrotoni, vel artemisiæ tenuifoliæ, exili & lignosa radice. Nicæ ad Thyrrenum mare, Genuæ Ligusticæ, & in Gallicæ provincie asperis, macilentis conuallibus, & desertis incultis fruticat. Pollet multum ad podagras & vlcerum maligna, humorum impetum illuc ruentem reprimendo, lotium deriuando, & copiam humorum vehementius impellendo, & eadem fermè quæ millefolium promittit. Hæc ex Pena. Dioscorides verò tradit contra serpentium ictus, coxendicum dolores, vrinæ stillicidia, ruptaque commodè comam è vino potam auxiliari, ciere menses, grumos sanguinis in ventre aut vesica liquare cum vino mulso pota, cohibere quoque defluxiones è capite triū obolorum pondere ieiunis datam in vino albo diluto. Inferi etiam vestibis, ut eas ab erodentium iniuriis tueatur Plinius eundem usum medicum partim ex Theophrasto, partim ex Dioscoride descripsit. Ciet vrinas è vino pota & menses. Duri-

tias & inflammationes discutit. Ambustis cum melle imponitur, contra serpentium ictus & lumborum vitia bibitur. Sanguinem concretum ventris aut vesicæ absumit cum mulso, folia eius triū obolorum pondere sistunt profluvia mulierum

ELICHRYSUM Creticum
Matthioli.



in vino albo. Vestes tuetur odore non ineleganti. Sed quod Dioscorides dixit, ἰχθυήνιον & ἰχθυήνιον, Plinius tantum ad fœminarum profluvia contraxit, quod mirum videri potest: nam quamvis ἰχθυήνιον communis quidem defluxionibus omnibus sit appellatio, tamen propriè defluxionem siue destillationem ex capite in os & gulam, & hinc in ventriculum significat. Galenus elichrysum non habet, sed amarantho tribuit, quod Dioscorides elichryso. Amaranthum, inquit, facultatis est incidentis & extenuantis. Coma igitur eius cum vino pota menses educit. Sed & grumos sanguinis liquare ac soluere creditur non solum in ventre, sed & in vesica. Sed tunc potius cum vino bibenda Et omnes simpliciter fluxiones pota desiccant, stomacho infesta. Est altera planta, inquit Matthiolus in Italia nascens, quam Elichrysum alterum vocare voluit, quod folia illi sint etiam angusta, & aurei in summitate flores. Addit & Elichrysum Creticum sine vlla descriptione.

Lib. 6. sim.

AGERATVM.

CAP. XLI.



Ἄγρος Græcis, Latinis etiam Ageratum dicitur, quasi non senescens. Ex eo enim nomē accepit, teste Dioscor. quod flos diu in sua specie perseveret. Herba est fruticosa, vt idem describit, palmi altitudine, humilis, simplex, maximè similis origano, vmbellam gerens in

Nomina
Lib. 4. c. 54.
Forma.
Ibid.

AGERATVM, Matth.



qua flos aureis bullis similis, minor elichryso. Plinius non multum à Dioscoride dissidens, Ageratum, inquit, ferulacea est, duorum palmorum altitudine, origano similis, flore bullis aureis. Huius vltæ nidor vrinam ciet, vuluamque purgat, tanto magis insidentibus. Causa nominis non hæc, sed quoniam diutissimè nō marcescit. Dioscoridis Ageratum Matthiolus cum multis herbariis eam esse herbam censet, quæ Italis Herba *Giulia* dicitur, quæque à Mesuæ Eupatorij nomine delineatur. Passim nascitur, inquit, in Hetruria, foliis origano proximis, floribus aureis, in vmbella micantibus elichrysi modo. Huic sententiæ subscribit Pena ex floribus aurea gratia senectam non sentientis, vmbellisque corymbaceis, elichrysiæ mulis nostrum Ageratum esse Dioscoridis genuinum iudicās. Quin & decoctum & folium Narbonensis Agerati gustanti valde acre & amarum sentiri asserit, & ad ciendas vrinas intro sumptum, forisq; suffitum admodum efficax esse, odorem etiam suauem quadantenus Romani chamæmeli fragrantia

Lib. 27. c. 4.

In cap. 54.
lib. 4.

Lib. 2. sim.
cap. 25.

In Ad. fol.
207.

AGERATVM, secundum
& tertium, Matth.



AGERATVM, Aliud
quorundam.



Lib.2.c.4.

Lib.4.c.54.

Lib.6. sim.

grátia, indicem certiolem esse facultatis emolliendi vuluæ duritias, vrinasque odore eliciendi, quas Dioscorides in Agerato suo requirit. Præterea, inquit, collatio cum origano hîc valde oportuna est, siue totum fruticem & umbellas, vt Dioscorides, siue etiam reliquam plantæ faciem perpendas, sunt enim bullatæ umbellæ elichrysi & origani, quas inter se confert Dioscorides, qui tamen hîc foliorum non meminit, vti neque chrysocome, quam hyssopo assimilat, hyssopum autem origano. Quod si etiã origano foliis assimilasset, propterea istud nostrum in Ageratũ periisset: neque enim adeò procul absunt folia ab origano, quinimo quibusdam Narbonæ locis, & Hetruriæ squallidis, sed depressis, videri ait Agerati fruticis exigui, folia multò minora, & tantillum crenata, rigida, dura, pluraque virgulta, origanis variis ibi fruticantibus, toto habitu non dissimilia. Ageratum etiam spectari interdum illic specioso candore nitentibus florum bullis, haud tamen cætera ab illo diuersum. Præterea cultu humidior adhibito, vel cælo septentrionali algidiore, valde variare quod colunt vireta Gallica, Germanica, Belgica, latius proceriusque fruticans, maioribus ramis, latioribus, longioribus foliis, & altius multò crenatis, flaccidis, ad Galli cristam herbam accedentibus. Sed Angliæ hortis viuacius nihil isto etiam Narbonensi semine sato, ramis caducis, magisque serratum foliis, diu persistans, admodum diuersum. Quæ varietas, opinor, fecit vt quam Dodonæus Balsamitam minorem vocat, Itali herbam Iuliam, Ageratum Dioscoridis, & Mesues eupatorium esse neget. Tam multa de Agerato Pena, in quibus mirum ab eo scriptum de Chrysocomes foliis nihil à Dioscoride proditum fuisse, cum is disertè & apertè tradit ei plantæ comam esse κορυμβοειδῆ, corymborum bullis insignem, hyssopo similẽ. Herbariorũ quidam collationem Agerati cum origano, ad ramulos tantum non ad folia pertinere iudicant, qualem cap. de Symphyto petraeo legimus, vt foliorum similitudo minimè sit requirenda. Scribit Dioscorides decoctum Agerati vim habere feruidam, ipsam herbam suffitam vrinas ducere, & duritias circa vterum

mollire. Eadem Plinius tradidit, vt diximus. Galenus verò Ageratum esse διωάμεως διαφοριστικῆς, ἢ ἀτρέμα πῶς. Legunt quidam ἐπιπλεγμάντης, leuiter vrendi, & inflammandi, quod conuenit voci Dioscoridis πυρωτικῆς.) ἀφλεγμάντης, id est, vim habere discutiendi, & leuiter inflammationes arcendi. Quæ vis contraria videtur ei quam

Diosco

Dioscorides *πρωτικήν* dixit, id est, feruidam & inflammantem. Quidam legendum censent *πρωτικήν*, ad fatus utilem. Matthiolus postremis editionibus vero Agerato alia duo adiunxit, secundum candidis floribus hîc etiam picta: quibus aliud etiâ addunt herbarij, quod aridis gaudet, feréque semper è parietum rimis prorumpit, radice candida, tenui, breui, capillata, ramulis multis, pedalibus, canis, folio stechadis citrinæ, angustiore, longiore, ex interuallis per caulem emergente, albicante, corymbis in caulium & ramulorum vertice aureis, qui tandem in molles pappos abeunt. Agerata alia duo à nobis alibi descripta sunt.

Lib. quæ in
Asper. c. 56.

STOËCHAS CITRINA. CAP. XLII.

QUAE in Officinis Sticas citrina, siue Sticados citrinum dicitur, quibusdam Tinearum & luteus amaranthus, Germanis *Mottenblumen*, & *Rheinblumen*, Dodonæo Theophrasti Elichrysum, & Dioscoridis Ageratum esse creditur, cuius sententia neque Matthiolo, neque multis aliis placet. Cauliculos fert graciles, duros, candicantes, lanuginosos, palmum altos, aut maiores, folia parua, angusta, hirsuta, mollia, figura & similitudine foliorum hyssopi vulgaris. In cauliculorum verticibus flores sunt aureo colore fulgentes, globosi, umbellæ diuulsæ modo sese pandentes, odorati, amariusculi, haud facile marcescentes, radix est brevis, gracilis, subnigra. In asperis & montosis squallidisq; prouenit. Iunio & Iulio floret. Hanc stœchadem Pena & Lobellius veram & hactenus herbarijs incognitam Dioscoridis Chrysocomê, cui conspicua florum corymbaceorum aurea coma nomen dedit, esse autumant, quam etiam luteum amaranthum vocarunt Græci à colore & fulgore penè immarcescibili, cuiusmodi in istius plantæ floribus esse quiuis agnosceret. Hanc illi sententiam suam confirmât collatione corymbaceæ comæ hyssopi veræ Dioscoridis, quam Pena se ostendisse putat, cum corymbis stœchadis citrinæ. Præterea reliquis descriptionis & virium notis sic à Dioscoride traditis ex Ruellij conuersione. Chrysocomæ palmi altitu-

Nomina

Lib. I. c. 60.

Forma.

Chrysocomæ vera.

In Ad. fol. 212.

Lib. 4. c. 50.

STOËCHAS Citrina, Matth.

STOËCHAS Citrina, altera



dine

dine fruticat, coma specie corymborum, hyssopo simili, radice hirsuta, veratri nigri modo tenui, cyperum æquante, gustu non iniucundo, ex dulci subaustero. In petrosis opacisq; nascitur. Radix calfacit & adstringit, his conueniens quos iecur aut pulmonis inflammatio malè habet: contra purgationes vuluæ decocta cum hydromelite assumitur. Hæc Dioscorides quæ stæchadi citrinæ optimè quadrât. Sunt enim huius corymbaceæ umbellæ rotundæ, multifq; quasi florum bullatis glomis sparsim tumultuarieq; conditæ, origani non absimiles, aut hyssopi Dioscoridis ab ipso Penadata, lucente nitenteq; per maturitatem coma aureo fulgore, & molliusculo vellere, pusillo intus semine maioranæ, sed exiliori, ruffo, acri, odorato, in cauliculis rectis, albidis, non nihil incanis, palmum & sesquipalmum altis, foliis oblongis, angustis, leui hirsutie incanis, stæchadis, vel linariæ ofyridis, quam doctiores minùs rectè Chrysocomen autumarunt, radix fibrosa, gracilis nigra foris, gummi elemnium, vel ciperum rotundum Syriacum redolens, vti flores & tota plâta, gustu etiam aromatico, medicato, acuto & feruente non nimio feruore, subadstringente. Iam verò quam vim Chrysocomæ tribuit Dioscorides, eandem admodum insignem sese expertum fuisse testatur, nempe ad iocinoris ex glutinosis succis, ac vaporib⁹ crassis intra tunicas discursantibus diuturnos affectus, pulmonibus verò inflammatis non impunè dari, sed affluxu pituitæ acidæ, serosæ vel salis calefactis, vel erosis. Quare Ruellium melius conuersurum fuisse ἡπιδικοῖς & πνευμονικοῖς ἀρμόζουσιν, hepaticis & pulmonariis vel peripneumonicis, quam iis quos iecur aut pulmonis inflammatio male habet. Præstantiorem autè esse & speciosiore Narbonensis Galloprovinciæ, & Hispaniæ aridis & petrosis, vbi odoratissima & plurima, æstate, radice perenni. In Germania ad Rhenum, reliquaq; Gallia paucior, & inefficacior. Quapropter nihil quominus hæc stæchas, vera chryscome statuenda sit, obstare videri, nisi verbum vnum aut alterum, quibus subesse mendi quidpiâ Monspelienfes Doctores, qui hanc chryscomen vocabant, iamdiu subolsfecisse ait, ex Pliniana & codicis calamo exarati cōiectura. Sic enim legunt, ῥίζαν διασείαν, λεπτὴν ὡς ἑλλεβορὰ μέλαιναν, id est, radicem densam tenuem, & nigram vt ellebori, &

Lib. 21. c. 8. nigra sane est foris, & ita Plinius habet. Chryscome siue chrysitis non habet Latinam appellationem, palmi altitudine est, comantibus fulgore auri corymbis, radice nigra, &c. Mox Dioscorides κυπέρω ἀρμόζουσιν, vel ὁμοίῃσα ἐν τῷ γλυκὲι ὑπαὺς ἡρῶ, id est, cypero respondentem gustu, ex suauis austero, quæ tam odori & saporis huius

Stæchas citrina altera Penæ. quam quod ne maximè congruere illis visâ fuere. Idem Pena Nemausi & Monspelij se vidisse affirmat alteram superiori similem, sed graciliorem totam, nigriorem, squallidiorem, cineritiam, pluribus cauliculis viticeis pedalibus, radice exiliore, minusq; fibrata quia rarò nisi in rimosis rudibus & maceris vrbium victitet, fusca foris, minimum odora: florū corymbi singuli in singulis caulibus, nec aggregati vt superiores: semen tamen simile, exile, fuscum. Rariùs hæc alia multo eodem Pena auctore occurrit in ilicetis cocciferis inter *Sommieres* & *Mōspelium*, tota pulchella, facie stæchadem citrinam præferens, folia tamen sunt latiora, incana, vti tota planta: cauliculis palmaribus, in quibus flores itidem stæchadis alterius citrinæ, grâdiores, longiores, lactucæ agrestis quadâtenus, radix nō magna, lignosa, inodora tota: minùs nota, peruia aut inuentu facilis, ideò nondum vires cognoscuntur. Prolixè quidem & copiosè Pena hæc omnia disseruit, quorum summa est, stæchadem citrinam Officinarum, esse chryscomen Dioscoridis, Hyssopo similem corymbis, non vulgari quidem nostro, quod Hyssopum minimè veterū est, sed Maioranæ Anglicæ quam verum Hyssopum esse credit: qua in re primū examinandum est, an Hyssopum nostrum vulgare legitimum sit, deinde qua sui parte Hyssopum chryscome referat, & an stæchas flaua sit. Hyssopum nobis duorum generum cognitum est ac frequēs, alterū satium, amarius, flore cæruleo spicato alterū sylvestre,

sylvestre, minus amarum flore, puniceo. Qui Hyssopum esse negant hac ratione mouentur, quod vtriusque folium oblongum, & angustum origani generibus simile non sit, nēpe minimē rotundum, & ab Amaraco, Pulegio, Dictamno, quorum folia cum origanis comparant, valde discrepet. Hic sanē scrupus molestus, & difficilis herbariorum ingenia multorum torquet, quibus nondum innotuit tertium Hyssopy genus à me depictū & descriptū in libro de Odoratis, quod reliquis generibus simile, foliorum figura rotunda, & origano Amaracōve simili, hyeme etiam florem caruleum gignens, spicatum, vt reliqua duo genera. Hyssopi species illa si omnibus hoc argumentum tractantibus comperta fuisset, euocāda non erat ē Britannia planta quæ Hyssopi veri locum vsurparet, cum ea suum iam habeat, vt quæ origani sylvestris genus sit, satū & cultu nonnihil mutatum ab eo quod passim occurrit. Verū nullis corymbis, imo potius florum aceruo cumulado, vt in origano sylvestri sponte nascente, cui corymbos nemo vnquam assignauit. Extricato hoc nodo sequitur, vt dispiciamus an stœchas citrina chrysocome sit. In hac planta nulla sese offert similitudo foliorum cum alterutro Hyssopo, siue quod rotunda folia mittit, siue quod oblonga: præterea coma, nempe foliorū ramulorūque vagus & luxuriens proiectus nō est κορυμβοειδής, corymbis insignis, visenda, & onusta, in cacumine tantum aureis bullis emicantibus: quinetiam radix, nec desis, sic διασείων verito, nec tenuibus furculis heret, Veratri nigri modo, nec Cyperū æmulatur; nec sapore est ex subaustero dulci, quæ omnia chrysocomes historia postulat. Ego in euoluēda hac ambiguitate olim monui rei herbariæ studiosos, plantam quam Galli *Targon* vocant, Itali *Dragoncello*, & quam Ruellius vulgi fabulis persuasus ē semine Lini cepē indito, & ita defosso gigni credidit, chrysocomes descriptioni valde cōgruere, coma plurimis corymbis nitente, foliis hyssopo vulgari & macrophylo similem, radice furculosa Veratri nigri modo, Cyperi colore, gustu non insuaui, qui ex subaustero dulcescit, & ea qualitate hepaticis, atq; pulmonum inflammationibus prodest, in petrosis & opacis nascentem. Id quod valde probabile

In Horto.
cap. 56.

STOEC HAS

viridis, Dalech.



mihi visum est, tacitū nolui in chrysocomes natura declarāda, doctioribus iudicādi arbitrium liberū esto. De primæ stœchadis citrinæ facultatibus ex Dioscoride, & Penæ & aliorū experientia diximus quibus assentitur Plin. scribens. Chrysocomę radix calfacit & stringit. Datur potui ad iocinorū vitia: itē pulmonum, vuluę dolores in aqua mulsā decocta. Ciet mēstrua, & si cruda detur, hydropicorū aquam. Eadem tradit Galenus. Chrysocome vocatur & Chrysites. Radix vincentes habet acrē simul & adstringentē qualitates: quare nō multi vsus est. Vsuī tamen est decocta in melicrato peripneumoniis & morbis hepaticis. Sed & mēstruę purgationis prouocāde vim quandā habet. Addūt recentiores decoctos flores aut in vino maceratos iocinoris obstructions aperire, quare darivtiliter eorū decoctum, aut dilutū, regio morbo, aut malo habitu affectis, idē potum interaneorū vermes necare, totā plantam mederi omnibus cerebri morbis à frigida causā proueniētibus, nēpe pituitosis fluxionibus, diuturnis doloribus, comitialib⁹, resolutis, & id genus aliis, siue eius decoctū sumatur in potu, siue herba ipsa in puluerem trita ex rhodomelle bibatur, aut oxymelite. In lixiuio addita non solū supradictis morbis subuenit, si eo caput abluatur, sed furfures etiā absterget, & pediculos necat. Datur cum herba ipsa, tum eius decoctū ad vrinę suppressiones: renes enim expurgat, & vrinam pellit. Adduntur flores fomen-

Lib. 21. c. 20

Lib. 8. sim.

Matth in
c. 52. lib. 4.

næ suppressiones: renes enim expurgat, & vrinam pellit. Adduntur flores fomen-

tis, quæ ad vteri morbos frigidos & obstructions paratur. Addo stœchadem viridem à Bauhino missam, quæ tota iucunda viriditate nitet, foliis per intervalla in caule multis, duobus lōgis, aliquot aliis multò breuioribus, capitulo in caulis summitate longo, rotundo, cum duobus in summo foliolis, ex quo lutei flores exeunt.

OENANTHE.

CAP. XLIII.

Nomina
Cap. 2. & 5.
Cap. 118.



Ivάνθης nomine prisci tria designarunt: primū labruscæ florē, deinde plantam flore cōmendatā, quā memorat Theophrastus cap. vlt. lib. 6. Historiæ, tū herbā de qua Dioscor. lib. 3. & nos hīc tractamus. Cum autē ἰβάνθη dicta

FILIPENDVI A. œnāthe multorū.

fit ἀπὸ τῆς ὄνως idest, vino, & ἰβάνης idest, flore, quasi flos vinosus, sic illæ plantæ nūcupatæ sunt, quod florū decore, odore & quadantenus colore non sint viti dissimiles. Dioscoridis verò œnanthen quidam etiam dictam putant, quod cum vite floreat, leucāthon verò (sic enim etiā appellari scribit Dioscorides) à florū quos producit candore. Hanc sic ille deliniat, folia habet pastinacæ, flores albos, caulē crassum, palmi altitudine, semen velut atriplex, radicē magnam, capita multa rotunda habentē. Nascitur in petris. Plinius, Oenanthe herba, inquit, nascitur in petris, folio pastinacæ, radice numerosa. Herbari; varias plantas, ex quarum radicibus capita multa pendent, pro œnāthe aut eius generibus proponunt. Fuchsius & recentiorū pleriq;, eam quæ vulgò filipēdula vocatur à numerosis illis & rotundis in radice capitibus tuberibusve, quæ quasi ex filo quodam pendere videntur, Gallis *filipende* & *siipendule*, Germanis *Rotsteinbrech*, id est, Saxifraga rubra. Quorū sententiæ refragatur Matthiolus, quod filipendula, inquit, nusquā magna radice nitatur, quæ rotundis extuberet capitibus, quod semen nō ferat atriplicis, quod deniq; nō in petris, sed in pratis & lēto ubiq; solo proueniat. At si, inquit Pena, filipendulæ radicē & flores etiam suauius multò spirantes quàm vitis siluestris germinationes, præsertim tractibus quibusdā Linguagotticis & Aquitanicis, sæpius naribus admouisset: præterea si verba Dioscoridis accuratiùs expēdisset, & locis aridis petrosisq; plurimam eruiisset, illorum sententiam haud reprehendisset. Nam in Anglia nō procul Bristoia, ad Vincētij rupes & cautes deuexas, etiā in Germaniæ aridis plurimā Iunio & Iulio mensibus reperiri asserit, floribus cādiddis, exiguis, stellatis, cōfertis, bryoniæ & rutæ situ, semine muscoso, squamoso, rotundo, pimpinellæ, cui foliis etiā similis sit, pastinacæq; siluestris diuisura, caule cubitū & sesquicubitū alto, radice nō altè infossa, sed latè sparsa & ampla, è pēdulis fibris multis, pilularū cyperi, aut pæoniæ fœminæ, aut asphōdeli modo, quæ perbellè delineationi Dioscor. cōueniunt.

Fuch. cap.
211. hist.

Lib. 3. c. 118.
Ibid.

Forma.
Lib. 21. c. 24

Cap. 211. hi.

In cap. 118.
lib. 3.

In Ad. fol.
325.



OENANTHE. I. Matth.



ΟΕΝΑΝΤΗΕ. ΙΙ.

Matthioli.



ΟΕΝΑΝΤΗΕ. ΙΙΙ.

Matthioli.



ueniunt. Nam μεγάλην ῥίζαν, radicem magnam, amplam, fusamque ex rei cognitione, & aliis collatis locis Pena interpretatur, καυλὸν παχὺ, caulem crassum sanè habet pro altitudine sui, quam palmarem facit, cuiusmodi est filipendula nonnullis glareosis & montosis. Denique κεφαλὰς ἔχουσα τρογγύλας, id est, capita multa rotunda habens, cuiusmodi planè hæc sunt. His adde

ΟΕΝΑΝΤΗΕ. ΙΙΙΙ.

Matthioli.



quod filipendula easdem quas œnanthe vires habeat, vt dicemus. Idem Matthiolus quatuor œnanthes genera post filipēdulam hīc expressa pinxit. Quorum primum quod tuberosa est radice, multis notis genuinam Dioscoridis œnanthen referre putat, cætera radicibus & umbellis filipendulæ cognata. Verùm Pena illud primum genus aristolochiæ rotundæ & adultæ perquam similem specie radicem tantum ab œnanthe distare putat, quantum bunium à filipendula. Neq; enim tuberosam œnanthes radicem, sed capita multa rotunda habere scripsit Dioscorides. Secunda & tertia Matthioli œnanthe, filipendulæ nomē etiam sunt assecutæ, inquit Pena, quæ vt œnanthes non ita dissimiles, ita hīc cōmodè referendæ. At si natalia spectes, minimè œnanthen dicas. Alterum quippe plurimum solo vliginoso & pratensi, tamen Matthiolus istis nomē adscripsit œnanthes, filipendulæ ademit, quæ præterquam quod viribus, etiam natalibus montosis & saxeis, vt diximus, magis quadrabat, etiam recentiorum consensu.

In cap. 118.
lib. 3.In Ad. fol.
325.

Ibid.

Tertia quæ minor, & veræ œnanthe similior, radicibus amplis, globulis oblongis, prolaxis fibris pendulis, turiones promit, imâque folia apij hortensis, teneriuscula, saturè virentia, cubitalem & sesquicubitalem caulem, geniculatum, alis, foliisque & umbellis anisi vel coriandri: flores sunt albidis, pusilli, æstate in conuallibus her-

*OENANTHE, sue filipendula
altera montana, Pena.*



*OENANTHE, alia Pena
Cicutæ facie.*



bidis, & verrucis pratensibus Angliæ. Monspelij etiam propè pontem Cellæ nouæ, Magalonæ inter narcissos, & circum Granuntiam siluam. Hæc Pena, qui rariorem multò hîc depictam filipendulam à nullo scriptore hætenus memoratam in lucem protulit. In cellorum montium verticibus, vt Narbonæ ad Veganiû in Dei paradiso vocato, calcari contermino hanc ipse eruit. Radix non æquè fusa aut ampla, aut cirrhosa, sed proximè caulem bulbosis, teretibus, longiusculis, æqualibus ferè processibus, modicè protuberantibus, corrudæ annotinæ paribus, pæoniæ modò radicata. Caule assurgit sesquipalmû alto, crassiore, rotundo, nonnihil striato & sulcato, imo medioq; sui folia alterno situ emittente, inter filipendulæ folia millefolij, media, exigua, cornu cerui diuisura, extremum florum thyrsus, album, spinosum amplexa cuculatis galericulis, crebris, spissis cõflatam, in Cristæ galli, vel Cynosorchis, vel nappelli speciem. Aliam idem Pena hîc quoq; pictam exhibuit, neque etiam admodum notam nisi borrealibus præsertim Angliæ, vbi erûpit riuis, lutulentisve & riguis ripis, vbi paludarium, cui foliis non absimilis, vel rutæ pratensis similior, multo pullulatu, viro tetro, colore & facie cicutæ. Caules bicubitales spargit è radice in pares asphodeli albi bulbos multiplicata, & quasi brachiata, nullius fibræ vinculo aut interuentu (secus Matthioli) cõtinuos, teneros, gustu acres & ingratos, succo lacteo primùm, deinde flauescente viroso & exulcerante prægnantes, umbella cicutæ, cui affinem autumant, qui maleficio parem se expertos asserunt. Vfos namq; in acetariis nihil factum fuisse propius, quàm vt interirent, aiunt: alios qui esitassent vertigine tenebricosa palantes, nutantes, attonitos, & in gyrum se versantes vidisse. Et certè tam non est œnanthe quàm ab ea distat ruta pratensis vel cicuta. Hæc Pena. Præterea annotauit Dodonaus sij min⁹ genus in hortis vel alibi nō in loco palustri satum à Matthiolo quartam œnāthen fieri, ab œnanthe tamen multum differentem, id quod etiam lib. de Palustribus cap. 78. indicabimus. Alias duas œnantes species Dalechamplus exhibuit, quarû prior Scrophularia

OENANTES Species,
Dalechamp.

OENANTHE, Myconi.



vas in folliculo relinquit ferè rotundum, quo semen coërcetur, minutum, in nigrū vergens. Radices habet candidas, quandòque rufescentes, rotundas, ex radice fibris pendulas, modo plures, modo pauciores, vt quandòque viginti inueniantur, digiti longitudine, crassitudine minori. Harum sapor subdulcis, & nonni-

ria vocatur à quibusdam. Haud procul Monspelio nascitur, radice multa, rotunda, & oblonga, nigra capitula habente: caule crasso, anguloso, pedali, folio pastinacæ agrestis, flore in umbella candido, semine oblongo, nec lato, minime atriplicis simili, qua nota ab œnanthe Dioscoridis distat, cæteris satis aptè cōgruentibus. Altera eiusdem œnanthe in Monspelicæ agri asperis gignitur, radice magna, non numerosa vt Plinius ait, sed numerosa multave capitula habente, folio pastinacæ agrestis, caule crasso, palmum alto, semine atriplicis modo lato. Perdoctus & bonus Myconus medicus Barcelonæ sis tot œnanthes generum numerum quoque auxit, duobus aliis ex Hispania missis, quarum nec nomina nec vsus adhuc innotuerunt. Hæc in montibus & petrosis nata, folia propè radicem per terram spargit, minuta, incisa, læuia quadantenus hederæ modo, multò tamen minora, vt foliorum hîc depictorum magnitudinem vix excedant, inter se coniuncta & congesta, atq; ideò coriandri foliis aut pastinacæ similia, è longis pediculis pendentia, caule enatis cubitali, ab imo rubescente, paucis geniculis cincto, terete, læui, fere striato, & aliquantulum cauo. Radices subsunt multæ vt in asphodelo, septem aut octo, quandòque pauciores, coniunctæ crassæ, foris luteæ, intus cādicantes, ex quarum extremis radiculæ tenues & longæ producuntur. In summo caule flores velut in umbella pendent, candidi, ex quinque foliolis constantes, in medio muscosi, quibus pereūtibz, in vasculis seu siliquis semen maturescit, foliorū & caulis sapor subdulcis, item radicum cum leui quadā adstrictione, corticis verò earum amarus. Altera in altissimis montium iugis, frigidisque, solo tamē pingui, sed inter saxa provenit: folia habet alia humi strata, alia in caule surrecta, minuta, variè incisa, pastinacæ satiuæ, aut potius filipendulæ: eius enim folia ita refert, vt quod ad ea attinet, hæc ab illa vix internoscas. Caules profert quandòque duos, sæpius vnicū, dodrantalem aut maiorem, rotundum, solidum nonnihil hirsutum. In eius vertice flos è folliculo veluti ex vesicula quadam prodit, extrorsum se exerens è candido purpurascens, qui defluens

OENANTHE Alia,
Myconi.



Viresc.
Temper.
Lib. 3. c. 118.

Lib. 7.

Fuch. c. 211.
hist.

hil acrimoniæ primo occurſu dum guſtatur, habens, quæ ſtatim euaneſcit: foliorum in caulibus ſubacris, nonnihil adſtriſtionis præ ſe ferens, floret Iunio menſe. Hanc Myconius filipendulæ genus eſſe indicat ex foliorum & radicis ſimilitudine, eodẽmque ſapore. Nunc œnanthes & filipendulæ facultates inter ſe conferamus. Oenanthes fructus, inquit Dioſcorides, caulis & folia cum vino mulſo bibuntur ad ſecundas eiiciendas. Radix è vino vrinæ ſtillicidio conuenit. Additur in veteri codice *ἰκτερός*, id eſt, & ictero, ſicuti & legit Paulus, verba hæc Dioſcoridis ſic tranſcribens. Dioſcorides aliam deſcribit œnanthen contrariis duntaxat viribus, vnde ſecundas eam eiicere, & vrinæ ſtillicidio, morboque regio mederi tradit. Filipèdula amara admodum eſt, ita vt non temerè hanc recentiores calidam & ſiccam eſſe in tertio ordine ſtatuunt, expertiſq; ſint eam in lotij ſtillicidio & vrinæ remoratu, neque non renum doloribus, atque lapide eorundem conuenire. Eamdẽ ſtomachi inflationes diſcutere, mederi ſuſpirioſis & anhelantibus, & omnibus morbis quos cauſa frigida concitauit: farinam eiũdem cibus comitialium inſpergunt.

PIMPINELLA SAXIFRAGA.

CAP. XLIIII.

Nomina

Lib. pal. ca.

70.

Lib. quæ in
aſper. c. 8.

Genera.

Forma.

Locus.

In Ad. fol.

321.

PT Pimpinellæ & ſaxifragiæ nomina de multis plantis dicuntur, vt ex ſuperioribus intelligere licet, in quibus de Pimpinellis ſanguiforbis, & ſaxifragis aliis diximus. Hic de Pimpinella quæ ab odore, vt volunt, hircina cognominatur, & Officinis ſaxifraga ſeu ſaxifragia, ab expellendorum è renibus calculorum facultate, Simoni Ianuenſi *Petra ſindula*, Gallicis *Saxifrage*, Germanis *Bibernell* & *feldmorem*. Eam herbarij duplicem ſtatuunt, maiorem & minorem. Maior caulem proferit longum, cauum, geniculatum, folia ex atro viridia, quæ ex foliolis multis in vno pediculo conſtant, paſtinacæ ſatiuæ ſimilia, toto ambitu ferrata, flores candidos in umbellis, ſemen exiguum, apij horteniſis ſeu vulgaris, calidius, & magis linguam vellicans: radicem vnicam, longam vt in apio horteniſi guſtu acrem, & linguam zingiberis modo excaſfacientem. Pimpinella ſaxifraga minor ſuperiori caulibus, foliis, floribus & ſemine ſimilis eſt, ſed omnibus partibus minor, maiore verò & acrimonia & feruore. Radix huic etiam eſt longa, ſimplex, guſtu acris, & linguam vrens. Thaliètrum Rondelletij, Natrrix Plinij, Guiland. & Anguillaræ. In ſiluis, inquit Pena tota maior & umbroſis pratis, ſed minùs acris feruidaque quàm minor, & folio longo propiùs exprimit apium quàm Pimpinellam. Creberrimus vſus apud Belgas vtriuſque ſeminis & radicis calculo frangendo, lotioque proliciendo: vehementiùs ſiquidem vtrumque præſtat. Herbariorum quidam eſſe volunt pseudobunium Dioſcoridis, quod palmi altitudine in Creta fruticat, foliis Bunij, non Napj, vt vertit Ruellius, cuius quatuor ramuli ex aqua poti ſanant tormina, vrinæ ſubſtillum, & laterum dolores: ſtrumas quoque diſcutiunt cum vino & ſale tepentes impoſiti. Alij potius eſſe credunt Phellandryon Plinij, de quo ſupra dictum eſt capite de

PIMPINELLA Saxifraga
maior, Matthiol.



PIMPINELLA Saxifraga
minor, Dodon. ff. Lobelij.



de Angelica, & ca. 78. lib. de palustribus. Hircinā autem neutiquam à viroso odore hircūmq; olente sic dictā esse scribit Pena. (Dauci namq; pastinacæ, vel ligustici quiddā nec insuaue redolet,) sed quia illa, vt adulti hirci, eo quo docent practici modo sanguis & caro, eximiū sit calculosis præsiū, etiamq; ictericis & hydropticis. Petrifindula verò vocatur etiā eadē prærogatiua. Minor autem hircina Pimpinella, seu Bipinella, vt idē tradit, sic dicta est quod foliis Pimpinellæ adeò similis exit, vt eadem planè putetur: nec eas semper pilis discernere licet, inquit, vt putat versificator, Pimpinella habet pilos, Saxifragia non habet villos. Nam eodem proximè loci tractu se vidisse ait Saxifragiā foliorum interna superficie pilosa, nullos tamē in Pimpinella sanguisorba, vel hortensi, videri: An ne, non foliis innatos, inquit, sed inter frangendum tractos villos, tenuissimave & fermè araneosa stamīna innuit, qualia in scabiosa animaduertas? In caule rotūdo, glabro, cauo, geniculato, flores in vmbellis albi, dauci semē acre, vel cari, sed calidius, acrius: radice multò acriore, candida, dauci siluestris, Germaniæ, Belgii, Galliæ, Angliæq; in pratis siccis & secus sepes. Hæc Pena, his cōsentanea quæ ab aliis herbariis de iisdē stirpibus literis mādāta sunt: nimirū Saxifragā hanc cū acrimoniā non exiguā in gustu præse ferat, haud dubiè in secūdo ordine calidā & siccā esse, imo ad tertiū vsque accedere. Semē eius & radicē, aut eorū decoctū cū vino potūciere vrinā, renum & vesicæ calculū cōminuere, earūdem partium obstructionibus, & vrinæ difficultati summopere auxiliari. Radix menstrua ciet, secūdas & fœtum mortuum expellit eodē modo sumpta. Eiusdem siccæ farina cum saccharo ventriculum calfacit & roborat, concoctionem iuuat, torminibus ventris & colico dolori medetur, flatus discutiendo. Radix & semen mirum in modum profunt cōuulsis, apoplecticis, & iis qui febribus diuturnis à frigida causa excitatis vexantur, iisq; qui venenum aliquod hauserunt, aut à serpētibus cōmorsi sunt. Cum vino & aceto pota pesti medetur, ore retenta eius arcet cōtagia, & putrido aëri resistit.

Ibidem.

Temper.
Fuch. f. cap.
221. hist.

Vires.
Dodon. li. 2.
ca. 88.

Commanducata phlegmatis multi, crassi & visceri copiam à cerebro trahit, dentium dolorem mulcet, & apoplexia detentis vocem restituit, foliorum succis faciei maculas omnes exterit, cutemq; nitidam reddit, vlceribus putridis inditus ea terget. Eadem præstant folia trita & imposita. Aqua eius stillatitia aut sola, aut cum aceto instillata oculis, eorum caliginem discutit.

Nomina.



ΩNEION Græcis, Cicuta Latinis dicitur, Arabibus *Sucaram*, Germanis *Vurtzerling*, *Schirling*, & *Vuetterich* quasi tyrannus, quod hominem interficiat, si intra corpus sumatur, Gallis *Cigue* & *Cocue*, Hispanis *Ceguda*. Nominatur autem κώνιδον, παρὰ δ' κώνιν διὰ τὸν γινόμενον εἰλεγμένον καὶ σκότον τοῖς πίνουσι, idest, à circumuertendo, quod vertiginem & imaginem earum rerū quæ aspiciuntur tanquam circumagantur, ac tenebras inducat iis qui eam biberunt, vt fusiùs declarat Nicander. Cicuta, ita describēte Dioscoride, caulem profert geniculatum, vt fœniculum, grandem, folia ferulæ similia, sed angustiora & graueolentia, in cacumine adnascentes ramulos & umbellas gerit, florem subalbum, semen aniso simile, sed candidius. Radix caua est & nō profunda. Plinius, Cicuta quoque venenum est, inquit, publica Atheniensium pœna inuisa, ad multa tamen vsus non omittendi. Semen habet noxium. Caulis autem & viridis estur à plerisq; & in patinis. Lewis hîc & geniculatus, vt calami, nigricans, altior sæpe binis cubitis, in cacuminibus ramosus: folia coriandri teneriora, graui odoratu: semen aniso crassius: radix concaua, nullius vsus. Hæc Plinius. Notissima

In Ale-
xiph.

Li. 4. c. 74.

Forma.

Li. 25. ca. 13.

Locus.

C I C V T A, Matth.

In Ad. fol.
326.

Li. 4. ca 74.

Vires &

Temper.

Lib. 25. c. 13.

Embl. 67.
lib. 4.

omnibus hæc planta passim in pratis, locis incultis & umbrosis, circa sepēs & dumeta fruticat, omniumq; regionum indigena est, inquit Pena. Figura cerefolij, siue pastinacæ agrestis, aut myrrhidis. Iulio mense flores & semina profert. Dioscorides eius vim exitiosam, & multū in medicina vsum sic declarat. Cicuta in letalibus est medicamentis, sua frigiditate necans. Remedio est meraci vini potus. Succus exprimitur ex eius cacuminibus confusis, priusquā semen & coma areseat, expressusq; in sole siccatur. Multus aridi ad medendi rationem vsus est. Miscetur vtiliter collyriis, quæ leuandi doloris gratia adhibentur. Herpetas & erysipelata illitus restinguit. Herba cū coma trita, & testibus circumlita, libidinum in somno imaginationibus auxiliatur, sed genitalia illita resoluit, lac extinguit: mamas in virginitate increcere prohibet: puerorū testiculos tabescere facit. Pleraq; his cōsentanea tradit Plinius, his verbis. Semini & foliis refrigeratoria vis, quæ si enecat, incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est prius-

quam perueniatur ad vitalia, vini natura excafactoria. Sed in vino pota irremediabilis existimatur. Succus exprimitur foliis floribusq;: tunc enim maximè tempestiuus est. Succus trito semine expressus. (Melior semine trito expressus, Cornarius emendat ex veteri codice,) & sole densatus in pastillos necat, sanguinem spissando. Hæc altera vis. Et ideo sic necatorum maculæ in corporibus apparent. Ad resoluenda medicamenta vtuntur illo pro aqua. Fit ex eo ad refrigerandum stomachum malagma. Præcipuus tamen est ad cohibendas epiphoras æstiuas, oculorumq; dolores sedandos circumlitis. Miscetur collyriis, & alios omnes rheumatismos cohibet. Folia quoque tumorem omnem doloremq; & epiphoras sedant. Anaxilaus auctor est mamas à virginitate illitas, semper staturas. Quod certum est, lac

est, lac puerperarum mammis imposita extinguit, veneremq; testibus, circa pubertatem illita. Galenus, Cicuta, inquit, quod extremè refrigerantis sit facultatis, omnes norunt. Sed non ubiq; similiter perniciosam esse tradunt auctores. Plinius, Maxima vis, inquit, natæ Sufis Parthorum (Cornarius legit, Finibus Parthorum. Sufa enim vrbs fuit inter Persidem & Babyloniam sita, non vrbs Parthiæ. Tamen Theophrastus scribit Thrasyam Mantinensem ad venenum conficiendum censuisse sumendum Cicutam, $\chi\theta\epsilon\nu\epsilon\lambda\upsilon\chi\alpha\nu\epsilon\nu$, ἀλλ' ἐκ σέσωων, idest, non vndelibet, sed ex Sufis. Et paulò ante dixerat Homeri testimonio, $\kappa\acute{\omega}\nu\delta\omicron\nu\alpha\lambda\epsilon\iota\sigma\omicron\nu\epsilon\iota\nu\alpha\iota\ \pi\epsilon\rho\iota\sigma\epsilon\sigma\sigma\alpha$, καὶ ἐν τοῖς ψυχροτάτοις τόποις. Idest, optimam esse Cicutam circa Sufa, & in frigidissimis locis) mox Laconicæ, Creticæ, Asiaticæ: in Græcia verò Megaricæ, deinde Atticæ. Matthiolus non adeò exitiosam esse in Italia tradit: eamq; si in Hetruria Asini depascantur, profundissimo somno & torpore corripì, vt non tantum stupidi, sed planè mortui videantur. Id quod aliquando rusticos fefellit, nam dum asinis quos mortuos credebant, pellem detraherent, accidit, quod in medio ferè operis asini sint experrecti, non sine magno excoriantium terrore, & ingenti spectantium risu.

Li. 25. ca. 13.
Ibidem.Lib. 9. hist.
ca. 17.

Cap. 15.

CICVTARIA.

CAP. XLVI.

ASIMILITVDINE quæ huic plantæ est cum Cicuta ab herbariis Cicutaria nomina est, quàm duplicem faciunt. Prior in pratis montium frigidorum luxuriat, radice candida, ramosa, fœniculi modo carnosæ, nunc cocta, nunc in furculos diuisa, odorata, acri: foliis oblongis, in ambitu valde incisís: caule cubitali, anguloso, ramoso: flore candido in umbellis: semine longo, nigro, gemino, filis duobus prætexis munito, acri, odorato. Cicutaria altera quæ rubra dicitur in pratis etiam montium vliginosis ad fontium scaturigines, & riuorum margines fruticat, radice crassa, nigra, geniculata, confi-

Nomina

Genera.

Forma.

CICVTARIA Alba.



CICVTARIA Rubra.



brata:

*CICVTARIA Maxima**fœtida, Lobellij.**CICVTARIA Latifolia**fœtidissima cum flore, Lob.*

brata : foliis quàm in superiore latioribus, pallidioribûsque : caule pedali, ferulaceo : flore ex albo rubente, in umbella compressa : semine similiter oblongo, nigro, gemino, fila duo tenuia protendente, acri, & suauiter olente. Cicutarias

*CICVTARIA Altera**latifolia fœtidissima, sine flore, Lobell.*

alias profert Lobellius, Cicutariam maximam fœtidam, cuius caulis ad hominis proceritatem assurgit, crassitudine est quatuor digitorum, foliis, semine & radice Seselis Peloponnesis longè maioribus. Fortasse est Thapsia tertia Salmaticensium à Clusio descripta quidem, sed non picta. Profert etiam Cicutariam latifoliam fœtidissimam, perperam Seseli Peloponnesis quorundam, qui nondum inuento gemino Peloponnesi Seseli folio Cicutæ latiore & crassiore (cuiusmodi huius sunt) Seseli Peloponnesis folio Cicutæ dixere. Facultates tamen reclamant. Vniuersa namque planta simul, ac tangitur, virus halat, qua nota à Peloponnesi discernitur. Radice crassa & tota facie Myrrhidem odorem vescam quadamtenus exprimit : sed folia latiora, longiora, nigriora, & semen breuius Angelicæ vel maximæ Cicutariæ fatuæ, par in umbellis latis excusso candido flore. Caulis alis brachiatus, sesquicubitus & duos cubitos æquans. Florem, semen, caulem seorsum depinxit.

PERFOLIATA Altera.

CAP. XLVII.



ANTHRISCVS, Plinij.



HÆC ad cubiti altitudinem attollitur, caule rotundo, folio deorsum mutante & incuruo, crasso, venoso, pallido, perfoliatæ prioris simili, per cuius imam partem & caulis & rami traiciunt, sicuti ferè in priore perfoliata, hoc dempto: quod non sic folium rotundo alueo caulem vndiquaque ambit, sed veluti infernè fissum per rimam transmittit, flore in umbella, prodeunte ex cauo plantæ vertice, foliis, quæ alibi simplicia sunt, illic geminatis, & tanquam lacunam efficientibus: semine paruo, nigro, rotundo. De Perfoliata priore tractauimus in lib. de iis quæ in vmbrosis proueniunt.

Cap. 55.

ANTHRISCVS. CAP. XLVIII.

Lib. 21. c. 15.

PLINIVS Anthriscum inter vulgares apud Aegyptios in cibis herbas numerat cum phōdrylla, hypochœri, caucalide & scādice. Alibi de scandice scribens, ait. Eadem erat Anthriscus, si tenuiora folia, & odoratiora haberet. Anthriscum plantam esse hîc pictam contendunt herbarij quidam, quorum sententiæ nec refragor, nec suffragor. Gignitur in pratorum marginibus, præsertim si gelidis aquis rigantur, & ad riuorum præterfluentium alueos, radice fœniculi, intus alba, odorata, acri, foliis api, per oras oblique dissectis, in singulis pediculis ferè semper quinis, caule cubitali & interdum proceriore, anguloso, flore in umbella candido, semine oblongo, gemino, apicibus duobus præfixis, exilibus, acri & odorato. Quidam pertinaciùs contendunt esse Chærephyllum nostrum.

Li. 22. c. 22.

Locus.

Forma.

HISTOR



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER SEPTIMVS,



*In quo describuntur & ad vinum depinguntur
Planta, quæ flore placent.*

DE FLORIBVS ET CORONIS, CAP. I.



Lib. 6. hist.
cap. 7.
Flos quid.

Plin. li. 17.
ca. 25.

VM VMBELLAE flores sustineant plantis umbelli-
feris eas quæ flore placent meritò subiungemus, quas
ἀνθινὰ vocasse videtur Theophrastus, & floribus dica-
ta conuertit Theodorus. Est autē θ' ἄνθος, Latinè flos,
veluti iuuenescientium plantarum quasi vernatio, vel
futuri fructus indicium, & gaudium herbarum arbo-
rumq;. Concipiūt enim variis diebus, & pro sua quæq;
natura grauida partus gerunt, quod germinatio ideo
vocatur. Pariunt cum florent, flōsque ruptis constat
vtriculis. Sed educatio in fructu est. Quamquam flo-

rere quasdam arbores tradunt, fructum tamen nullum edere: ac contra fructiferas
esse quasdam flore omni destitutas. Cerasi quidem genus est, quod florem rosæ
modo foliolis multis stipatum, ideoq; formosum profert, nullum tamen fructum
præbet, velut exhausta secuturi fructus materia in floris ornatum, & dēsam folio-
rum congeriem. Ilices verò fructu onerantur, quem nullus flos antecedit. Est &
genus violæ flammæ & chamæmeli leucanthemi, quod florem densum & multi-
plicem edit, nec semen gignit. Præterea tristes quædam sunt plantæ, quæ nullo
flore à natura decorantur, vt adiantum, hemionitis, polypodium, filix, trichoma-
nes, Medium, quibus tamen floris loco quidpiam natura concessit, vt filici & tri-
chomani pensiles in auersa foliorum parte vermiculos. Flores Theophrastus an-
ni partibus quibus emergunt, distinxit, vt sint ἀνθη ἐαρινὰ, θερινὰ, μεσοπωρινὰ, idest,
Flores verni, æstiuui, autumnales, rigida hyeme, nullo flore celebri. Vernos flores
hos recenset. Τῶν δὲ ἀνθῶν θ' μὲν πρῶτον ἐκφαίνεθ' θ' λαυκοῖον, ὅπερ μὲν ἀπὸ μαλακώτερος,
εὐθύς τ' ἔχει χλωῖνος, ὅπερ δὲ σκληρότερος, ὑπερον. ἐνιαχθ' τ' ἦρος. ἅμα δὲ τῶν ἰσθ' ἢ μικρότερόν τι
γέρων τ' θ' φλογινὸν χαλκόμενον, θ' ἄγριον (quem locum deprauatissimum esse vel ipsi
asterisci indicant. Quare legit Gaza, ἅμα ὃ τῶν ἰσθ' ἢ μικρόν τι ὑπερον θ' πορφυρεῖον) ταῦτα γὰρ ὅτι φεφανοπλέ-
κοι χρωῖν), πολὺ ἐκτρέχει τῶν ἄλλων. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ νάρκισσος, καὶ θ' λείριον, τ' θ' τῶν βόλβων
κώδιον. ἐμπλέκονται γὰρ ἐνίοι καὶ τὸ εἰς τὰς φεφάνους. ἐπὶ ὃ τῶν οἰνάνθη, τ' θ' μελάνιον. καὶ
τῶν ἀγρίων, ὅτε ἐλφύκρυσος, τ' τῆς ἀνεμώνης ἢ λευκωνία χαλκόμενη, τ' θ' ξίφιον, καὶ ὑάκινθος, καὶ
χεδὸν ὅσοις ἄλλοις χρωῖν) τῶν ὀρεῖων. τὸ δ' ῥόδον, ὑπερεῖ τῶν τῶν, καὶ τελαβίασιν μὲν φαίνεθ',
πρῶτον

Lib. 6. hist.
cap. 7.
Florum di-
uisio.
Verni flo-
res.

πρῶτον ὃ ἀπολείπει τῶν ἐαρινῶν. ὀλιγοχρόνιος. καὶ ἡ ἀνθησις, ὀλιγοχρόνια καὶ τῶν ἀγρίων τὰ
 λοιπὰ, πλὴν τῆς ὑακίνθου καὶ τῆς ἀγρίας καὶ τῆς παρρηΐας. αὐτὴν δὲ διαμένει, καὶ δὲ λευκοῖον, καὶ ἔτι
 μᾶλλον δὲ φλόγινον. τὸ δὲ μελάνιον ὡς περ εἴρηται, διὰ ἐνιδμῖς, θεραπεύει τυγχάνον. ὁσάκις δὲ
 καὶ οἰάνθη. καὶ καὶ δὲ ἀνθικὸν μὲν, ποῶδες ὃ τὴν φύσιν (lege ἐυῶδες non ποῶδες vt legit Gaza)
 εἰάν τις ἀποκνίξῃ, καὶ ἀφαιρῇ δὲ ἄνθος, καὶ μὴ ἔῃ περμαλίσσῃ, καὶ ὅτε (non ὅτι, vt in vulgatis)
 τόπον δὴ ἦλον ἔχει, περμαλίσσον διαμυδῖ (hæ duæ voces postremæ ipso sensu & Gaza mo-
 nentibus sunt addendæ) τὸ δὲ ἄνθος βοτρυῶδες, καὶ λευκὸν καὶ θάπερ τῶν ἀγρίων (Gaza legit
 καὶ θάπερ ἀμπέλους τῆς ἀγρίας, vertit enim vt labruscæ) ταῦτα μὲν οὐκ ὡς περ ἐαρινὰ φαίνεται).
 Id est, Primum inter flores Leucoium se ostendit (Gaza Leucoium violam albam
 conuertit, Plinium, opinor, secutus : alij Leucoium luteum intelligunt, (quibus
 quidem locis aer tepidior est, hyeme statim, vbi verò inclementior, postea. Vere
 alicubi cum viola, aut paulò post Lilium exit, & Phloginū siluestre. Hæc aliis qui-
 bus coronarij vtuntur longè præcurrunt. Post hæc Narcissus & Lirium exeunt.
 Ad hæc bulbi κώδιον, id est, caput: quidam enim & id coronis intexunt. Sequuntur
 Oenanthæ, nigra viola, & ex siluestribus eliochrysum, & anemones genus quam
 pratensem vocant: idem gladiolus, hyacinthus, & quibuscumq; ferè aliis mōtanis
 vtuntur. Rosa ferior iis est, & nouissima quidem erumpit, prima autem inter ver-
 nos flores definit: breui enim tempore durat florum eius prouentus. Nam & re-
 liqua in siluestrium genere parum durant dempto hyacintho, tam siluestri quàm
 satiuo. Is enim diu durat, & leucoium, diutius etiam phloginum. Nigra autem vio-
 la, vt dictum est, annū durat, si cultus adhibeatur: similiter œnanthe, nam ea quo-
 que flore commendatur, natura suauiter olens: Si enim florem auellas auferasque,
 nec semen parere sinas & locum aprium nata sit, plurimū durat. Flos autem
 racematim coit candidusq; est vt labruscæ. Et verni quidem flores hi sunt. Plinius
 horum magnam partem ex Theophrasto descripsit his verbis. Florum prima ver-
 nuntiantium viola alba: tepidioribus verò locis etiam hyeme emicat : postea quæ
 appellatur purpurea: proximè flammea quæ & phlox vocatur, siluestris duntaxat.
 Codiaminum (legendū bulbi codium ex Theophrasto) bis anno, vere & autum-
 no: æstates hyemesq; fugit. Seriores supradictis aliquanto narcissus & lilium trans-
 maria: in Italia quidem, vt diximus, post rosam. Nam in Græcia tardiùs etiam num
 anemone. Est autem hæc siluestrium bulborum flos, aliaq; quàm quæ dicetur in
 medicinis. Sequitur œnanthe, melanium, ex siluestribus eliochrysos. Deinde alte-
 rum genus anemones quæ limonia vocatur. Post hanc gladiolus comitatus hya-
 cinthis: nouissima rosa: eademq; prima deficit, excepta satiuæ. E cæteris hyacinthus
 maximè durat, & viola alba, & œnanthe: sed hæc ita si deuulsa crebrò prohibeatur
 in semen abire. Eundem Theophrasti locum citans Athenæus, alios supradictis
 flores vernos addit, nisi mendosi sint codices. Πρῶτον δὲ τῶν ἀνθῶν ἐκφαίνεται φησὶ
 Θεόφραστος δὲ λευκοῖον, ἅμα δὲ ὁσάκις καὶ τὸν φλόγινον καὶ ἄλκιμον τὸν ἀγρίον (Alij ex Theophra-
 sto legunt, τὸ φλόγινον καὶ ἄλκιμον δὲ ἀγρίον) ἐπὶ τῇ νάρκισσον, καὶ ἱερῶν, καὶ τῶν ὀρείων ἀνεμώνης
 γένος δὲ καὶ ἄλκιμον ὄρμον, καὶ δὲ τῆς βολλῆς κώδιον. συμπλέκσιν καὶ καὶ τῶν ἐνίοις εἰς τεφάνους. ἐπὶ
 τῶν τοις ἢ τε οἰάνθη, καὶ δὲ μελάνιον καὶ τῶν ἀγρίων ὅτε ἐλίχρυσος, καὶ δὲ ἀνεμώνης ἢ τε λεμονία
 καὶ ἄλκιμη, καὶ ἑξίφιον, καὶ ὑακίνθος. τὸ δὲ ῥόδον ὑπερεῖ τῶν. καὶ τελευσίαν μὲν φαίνεται), πρῶτον
 δὲ πᾶσι. Id est, omnium primum cerni leucoium Theophrastus tradit, vnάque
 cum illo verbas cum agreste, postea narcissus & iridem, ac ex mōtanis anemones
 genus, quod montanum vocatur, & bulbi caput: nam etiam hoc quidam coronis
 implicant. His accedit œnanthe, nigra viola, & ex siluestribus eliochrysum, & ane-
 mone limonia dicta. Hinc Gladiolus, hyacinthus. Rosa horum tardissima est,
 postremaq; cernitur, at prima definit. Æstiuæ & autumnales flores hi sunt Theo-
 phrasto. Τὰ δὲ περὶ μᾶλλον ἢ τε λυχνίς, καὶ δὲ διὸς ἄνθος, καὶ δὲ μέλινον, καὶ δὲ ἱερῶν, καὶ δὲ
 ἀμάρακος ὁ φρύγιος, ἔτι δὲ ὁ πόθος καὶ ἄλκιμος. ἔτος δὲ ἐπὶ διττῶς. ὁ μὲν ἔχων τὸ ἄνθος ὁμοίον

Lib. 21. c. 11.

Lib. 5. dipn.

Lib. 6. hist. ca. 7.

τῇ ὑακίνθῳ, ὃ ἕτερος ἄχρες, λαλὸς. ὃ χρεῶν) περὶ τὰς τὰ φῶς. καὶ χρονώματος ἔτος. ἄνθε
 δὲ, καὶ ἡ ἱεὶς τῶ θέρους καὶ τὸ εὐρύθειον χαλαρῶν, τῇ ὁψὲ χαλὸν τὸ ἀνθος, ἄσμιον δὲ, μελοπώρῃ
 ὃ τὸ λείπον τὸ ἕτερον, καὶ ὁ κρόκος ὅτε ὀρθνός, ἄσμιος, καὶ ὁ ἡμέρος. Idest, Æstivi flores sunt,

Lib. 21. c. 11.

Li. 15. dipn.

Lib. 21. c. 11.

lychnis, Iouis flos, cerinthum, iphyum (Plinius legit pro cerintho, alterum genus lilij, & pro iphyum, Tiphyum) & amaracus phrygius, atque pothos duplex, vnus cui flos hyacintho similis, alter decolor, albus, quo circa sepulcra vtuntur, hîc verò diuturnior est. Floret etiam iris æstate, & struthium, flos quidem aspectu pulcher, sed sine odore. Autumno verò florent lilij alterū genus & crocus, tam montanus inodorus, quàm satiuus. Athenæus hunc Theophrasti locum citans ab eo nihil variat. Ex eodem Theophrasto hæc descripsit Plinius. Succedunt illis æstivi, lychnis, & Iouis flos, & alterum genus lilij: item tiphyum & amaracus quem phrygium cognominant. Sed maximè spectabilis pothos. Duo genera huius: vnum cui flos hyacinthi est, alterum candidius, qui ferè nascitur in tumulis, quoniam fortius durat. Et iris æstate floret. Abeunt & hi marcescuntq; . Alij rursus subeunt autumno. Tertium genus lilij, & crocum, in vtroque genere vnum hebes, alterum odoratum. Hîc est, vt diximus, ex Theophrasto ortus florum temporum ratione distinctus ordo: quamquam, inquit, nullum intermittitur tempus, nec ipsa hyems floribus orbata est. Nam etsi propter immodicum frigus sterilis videatur, tamen flosculos habet, autumnalibus prorogatis. Quod si ipsa clementior fuerit, multò magis. Verū enim uerò in Græcia dūtaxat, atque dum Theophrastus viueret, præclarosq; illos de plantis libros conscriberet, supradicti illi flores coronarij habebantur, hoc sæculo multò plures gratissimi iucundissimiq; celebrantur, quos oratione prosequemur, vt delicias nostras posteritas agnoscat, nec dedignetur, iis interim non omisis quos Theophrastus recensuit, & quorum præsertim vsum retinuimus. Atque vt à vernis exordiar. Primus omnium flos consiliginis, quam Pseudoelleborum nigrū vocant, herbaceus in hortis nostris profilit statim à bruma & Ianuario ferè toto durat, non odoris suauitate, non coloris venustate expetitus, sed hoc nomine tantum, quod vel inuito brumæ rigore existat, atque erumpat, & alios omnes anteciat. Huic proximum est leucoium bulbosum, Ianuario & Februario florens, mox leucoium flammeum, bulbus vomitorius, viola purpurea: caltha quæ hyemauerit, primulæ veris genera, belides satiuæ, leucoia candida, purpurea, punicea, anemone limonia, bulbina, chelidonium minus, fumaria bulbosa. Ianuarij, Februarij, Martij ineuntis hæc plerumq; fœtura est. Progrediente Martio luxuriant phlox, vinca peruinca, œnanthe, hyacinthi, lunaria odora & inodora, narcissus duplex, alter orbiculo medijs floris rubro, suavis odoris, alter grauius olens, luteo, chamæleuce, siue farranum Plinij, cardamine minor (has enim fertis & coronis non excludunt) flore violæ, è puniceo candicante, nam & altera minor humiliorq; est, flosculo candido, exiguo, inutili. Deinceps Aprilis hos largitur cynorrhodi læuis, pæoniæ, iridis maioris cæruleæ & candidæ, gladioli, eliochrysi, violæ matronalis, cuius flos vt leucoiorum, candidus, puniceus, purpureus spectatur, herbæ Catrachio similis quæ Galli *Bassinetz* vocant. Florent & hoc mense oxyacantha, & smilax aspera, quorum flore coronarios vti scripsit Theophrastus. Ex hisce floribus perenniores sunt phlox, quæ tota ferè æstate florere non desinit, viola flammea, leucoia, violæ matronales, viola purpurea multiplex. Aprili succedit Maius suorū quoque florum opibus & agmine diues: nam eo flores suos expandunt hemerocalles siue lilium fuluum, lilium candidum, lilium martagum nuncupatum, melanthium rubrum, caltha veris principio sata, rosa corneola, iasminum luteum, cyamis maior, purpureus, cæruleus, candidus, orcheon & ranūculorum genera, phalangium flore niueo, caryophyllum syluestre, satiuum, candidū, rubrum, puniceum, vermiculatum, polyschides, viola barbata, flos Africanus, polygona

Verni flores nostri.

Lib. 6. hist. cap. 7.

polygonatum, iris parua, myrtus, asphodelus, asperula, Iouis flos siue Aquilegia candida, purpurea, punicea, pseudomelanthium. Minus fugaces ex iis sunt, caltha fatiua, Iouis flos, flos Africanus, caryophylla, pseudomelanthium, cyanus, rosa corneola, melanthium rubrum. Quædam enim floris prouentū in duos trēsve menses prorogant: quædam etiam in totam ferè æstatem, vt melanthium rubrū & caltha: quædam etiam bis florent, vt rosa corneola, quæ autumnno etiam floret, & ad Octobris vsque exitū flores producit. Iam verò flores æstiuī (sic enim nominantur & iure quidem, ij quos Iunius & Iulius menses fundunt) sunt, melanthiorum tria genera, lychnis fatiua, rubra, candida, lauandula, spica, spartium, & ipsum biflorum, quoniam sub autumnni finem florem etiam præbet, si cœlū nō repugnauerit, cuminum siluestre geminū, alterum flore rariū dissecto, alterū densius cumulato, equitis calcaribus simili, maiorana, iasminum duplex, malua hortensis, alba, rubra, purpurascens simplex, multiplex: ex siluestribus rapūculum maius trachelia duo, campanula alba & cærulea, dactylis lutea & rubra, silybi flos, quod leucacantham vocat Tragus, à puellis Germanis coronis addi solitus, Alcea veneta. Ex his diutius durant lauandula, spica, lychnis, maiorana, cuminum siluestre, quod in fasciculos coaceruatum & suspensum siccatur, minimeq; marcescente floris purpura, hyeme floribus aliis omnibus destituta, cum amaraco & thymo fertis ac coronis inferitur, vt elychryfos sic asseruatus. Augusti verò & Septembris munera sunt, amaranthus purpureus, petilius maior Plinij, blitum maius, cyclaminus flore violæ, purpureo, odorato, &, vt audio, Tulipa rubra, calathiana Plinij autumnalis: sunt enim aliæ duæ, hæc verna, illa æstiuæ, crocus siluestris inodorus, fatius odoris non iniucūdi, cui simillimus colchici flos in pratis nudus. post foliorū iacturam, adeo vt incautos & ignaros fallat. His quoque mensibus halicacabi fructus maturescit & fuluescit, quem folliculi tunica detracta coronarij in ferta cū cumino siluestri, amaraco & thymo colligant, cerasum vocantes, ob magnam cū cerasi fructu coloris & rotunditatis affinitatem. Hactenus flores coronarios recensimus: præter quos in coronis locum sibi vendicant plantæ multæ, vel foliorum varia pictura insignes, vel ramulis frondeq; suauem odorē spirantes. Sed de iis libro de odoratis plantis tractabimus. Nunc de florum vsu dicendum nobis est: qui quidem latissimè patet. Nam flores summæ hominum tum voluptatis, tum vtilitatis causa creauit natura. Horum enim illecebris non parum visus & olfactus capiuntur, vt pote cū miros efflent odores, inenarrabilemq; colorum varietatem representent. Nec enim in vllis rebus aliis lasciuiens natura magno fertilitatis gaudio tam variè lusit, siue floris cuiusque priuatum colorem spectes, vt lilij niueum, calthæ luteum, siue in singulis quibusdam varietatem, vt in eo quem trinitatis florem appellant, vna parte luteo, altera satura purpura nitēte, alia candido vel cæruleo, siue figuræ diuersitatem, siue appendicum, staminum, foliorum formā, numerum, picturam multiplicem. Iam verò quanta in medendi arte ex florum odore & facultatibus insignibus calfaciendi, refrigerandi, reprimendi, corroborandi, digerendi, d. scutiendi, resoluendi, aperiendi, attenuandi, leniēdi, atque aliis infinitis percipitur vtilitas, quis facilè explicare possit? Quæ enim corporis pars male affici potest, cui non ex floribus remedia adhiberi possint? quis morbus sine florum remedio tuto curari potest? quæ medicamentorum, quæ antidotorum compositiones, quibus flores non admisceantur? In cataplasmata, malagmata, empl. stra, vnguenta, fotus, balnea admittuntur: rara sunt sine floribus enemata: olea, permulta ex floribus cōponuntur, serapia, tragemata. Elicitur ex ipsis liquor: vino, mellis, aceto induntur, vt in eis vires suas relinquunt. Sed de florum vsu medico in singulorum tractatione dicetur. Nunc ad eorum vsum redeo, qui deliciis maximè cernitur. Veteres floribus in coronas potissimum nexis utebantur puellarum virginumq; orna-

Æstiuī flores nostri.

Autūnales flores nostri.
Lib. 21. c. 8.

Florū vsus.

menta, quod Strabo tradit apud Vibonem in Brutiis repertum, in eumq; locum propter flores migrasse Proserpinam. Hæ & conuiujs adhibebantur, & amantibus in delicijs erant, *τέφανος* Græcis corona dicta est, & *τέφος* & *τέμμα* à cingendo, Athenæo teste. Corona verò Latinis à choro dicta videtur, etiam si citra aspirationem nunc scribatur: tamen Apion in libro de lingua Romana, vt scribit Athenæus, choronam cum aspiratione diu appellatam fuisse tradidit, quia chori ductores ea antiquitus in theatris vterentur. Nostros non solum flores in coronarum vsum venere, sed etiam in ferta digeruntur, quæ ferentes & intueantur, & naribus obiciant: aut in fasciculos componuntur, quos in vasis aut vrceis encaustro picturatis & aqua plenis merfos, super cœnaculorum abacis, cubiculorum mensis, fenestrisque asseruant ad pascendos recreandosq; oculos. Coronis ac fertis herbarum flores ferè inseruiunt, arborum minimè, præterquam mali aureæ, citriæ, punicæ, & myrti. Fasciculis verò & arborum, & siluestrium herbarum obuios quosque flores immiscent, modò vel forma, vel colore arrideant, vt malorum, pyrorum, achradum, oxyacanthæ, vacciniorum, persicorum, padi, thraupali, tetragonix, violæ calathianæ, sisymbrij siluestris, & reliquorum id genus nullo ferè dempto. Sed coronas prisca non tantum capiti imposuere (hoc ipsarum vsum reperto, auctore Athenæo, ob dolorem capitis cum post liberaliorem meri potum his fortè veluti vinculo capiti adhibitis, eius grauitatem, vel sublatam vel leuatam sensissent, præsertim si hedera, myrto, lauro, rosâ caput cingerent) sed etiam collo adalligauere in pectus demissas, *ὑποθυμίδας*, vel *ὑποθυμιάδας* dictas. Athenæus. *ὑποθυμὶς δὲ καὶ ὑποθυμιάδες τέφανοι παρ' αἰολῶσι τε ἴωσιν, ὅς περὶ τὴν τραχήλῃς περιετίθεντο, ὡς ἄφῳς ἐπὶ μαθεῖν ἐκ τῶν ἀλχημίστῶν ἀνακρέοντος ποιήσεως.* Id est, Sunt etiam hypothymis & hypothymiades coronæ quædam apud Aeoles & Iones, quas circum colla gestabant, vt ex Alcæi & Anacreontis poemate discere licet. Has autè ita gestasse tradit Athenæus, quod cor vitæ sedes cum in pectore sit, non solum coronis hanc principem corporis partem ornandam esse iudicauerunt, sed etiam vnguentis pretiosis illinendam ac exhilarandam. Et hypothymides, siue hypothymiades dici videntur, quod earum θυμιάσις, id est, halitus & odor in nares expiraret. Morem eum Sequani etiamnum retinent, sæpius ex indusiorum lineorum deiectis vinculis ferta florum suspendentes, quàm gestantes manu. Ad hæc non omnes eadem de causa coronas sibi aptabant, neque eandem earum deligebant materiam, sicut neque nos nostro sæculo, neque texendarum coronarum eadem omnibus occasio. Religionis causa & oraculi iussu Cares vitice coronabantur auctore Athenæo, Lacedæmonij calamo ἐν τῇ τῶν πορομαχίων ἑορτῇ, id est, in festo antesignanorum, & palma, auctore Sosibio, quæ in Gymnopodijs festo Laconico monimentum erat victoriæ ad Tyræam partem. Naucraticæ myrto, Ægyptij papyro, quam ideo coronariâ vocabant, quod eius flore deos coronabant, Plinio teste. Samiæ Iunonis æditui, sacerdotes lauro, quæ cæteri Græci utebantur, vt ait Philonides, ad discutiendam post immodicum potum capitis grauitatem, Romani verò triumphantes bellicæ virtutis insigni. Præterea non religione tantum moti homines sibi coronas aptarunt, sed deorum etiam simulacris, quod hodie quoque fit diebus festis laribus publicis & priuatis, manibus & sepulcris. Mitto celebres illas Græcorum coronas ex apio, pinu, populo, oleastro publicis ludis Græciæ in virtutis præmium viris fortibus dari solitas, & Romanorum triumphales, obsidionales, ciuicas, murales, vallares, nauales, ouales, & laureas, aureas, gramineas, iligneas, querneas, myrteas, utpote quæ ad florum & plantarum naturam ac contemplationem nihil conferant: item sutiles, quæque ex assuto malabatro nardove fiebant, vel serico pingebantur opere phrygio, natiuos flores imitante serici tinctura & varietate. Dicamus hîc potius de patilibus coronis, quarum summa fuit auctoritas, sic nuncupatis, quod ex floribus & herbis

herbis coronariis compactæ essent, Græci *τρεπλὰς* & *ἐλικλῆς*, idest, tortiles, & *φιλυ-
ενὰς* vocarunt, quod philyræ, idest, tilia cortici in tancias dissecto flores impinge-
rentur. Fuerunt etiam *ἀνθίνοι* coronæ ab Ægyptiis appellatæ è loci flore ibi nascentis
æstatis tempore in stagnis, cuius duo reperiuntur colores, alterius candidus ro-
sæ specie ex qua componuntur coronæ Antinoiæ propriè nominatæ, alterius cæ-
ruleus, ex qua textur coronæ *λολίνας*. Fuerunt & *ἀκίνοι* coronæ ex Acino plāta nexæ,
quarum meminit Andron medicus apud Athenæum. Floribus coronariis suprā
memoratis prisca alios adnumerarunt teste Athenæo, vt cosmosandalum, Thesiū,
philadelphium, chelidonium fronde albesciente. His adde veteres necendarum &
gestandarum coronarum adeò curiosos fuisse, vt quo tempore flores terra negat,
cornuum ramenta in florom speciem tingerent, quemadmodum & nostri homi-
nes hodie pennis auium lignorum ramentis & charthis artificiosè dissectis tin-
ctisq; vernos flores ementiuntur in hybernas coronas: ex medulla quoque iuncor-
um gypso illita auiculas formantes, quas fertis & coronis addunt lemniscorum
vice, quibus & laneis & aureis veteres vsi sunt. Hactenus de coronis & floribus co-
ronariis vniuersè. Deinceps de singulis dicendum, non illis quidem supradictis
omnibus, quorum plantæ aliæ aliis libris descriptæ, aliæ aliis libris describendæ, ne
similes à similibus dissociarentur, sed de iis quæ maximè placent nobis & arridēt,
hodieq; vsu frequentiore vsurpantur quarum loci natales, ortus tempora, tum exi-
miæ præstantissimæq; in medendi arte potestates singillatim explicabuntur. Atq;
ab his quæ omnibus notiores sunt & vulgatiores exordiemur.

Lib. 15.

Ibidem.

VIOLA PURPUREA.

CAP. 11.

NON Græcis & *ἰὼν μέλαν* Theophrasto & *μελάνιον*, Dioscoridi *ἰὼν πορ-
φυρεῖν*, Latinis viola nigra, & purpurea, & viola Martia, Officinis vio-
la, herba ipsa violaria, Arabibus *Seneffigi*, *Sonofrig*, siue *Benifefigi*, Italis
Viola porporea, & *Viola mammola*, Germanis *Merizen-viole*, Hispanis
Violeta, Gallis *Violette de Mars*. Nicander in Georgicis, vt Hermolaus refert, Ion
vocatam credit Violam, quia Nymphæ quædam Ioniæ florē eum Ioui primū de-
dere muneri. Alij Græci *ἰὼν* dictum putant, quod cum Io in vaccam à Ioue cōuer-
sa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit, vt Latini quoque detrita, t, li-
tera Violam quasi Vitulam imitatione Græca videri possent appellasse. Eadem
occasione Seruius Violam Latinis etiam vaccinium dici refert, locum hunc enar-
rans Vergilij.

Nomina

Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.

Ecl. 2.

Vergilius tamen alio in loco vaccinium à viola differre ostendit.

Et nigra viola sunt, & vaccinia nigra.

Ecl. 10.

Li 7. archi.

Vitruuius quoque Violam à vaccinio distinguit. Nam ex Viola Silis attici colorē,
ex vaccinio purpuram elegantem fieri memoriæ prodidit. Petrus Pe. *ἰὼν ἀπὸ τῆς
ἰένης*, quasi ire aut prouenire, aut primū prorumpere dictum putat: veris enim
præuia est Viola, purpura autē nigricans, seu in nigro purpureus color causa fuit
cur Viola purpurea Theophrasto, Græcisq; aliis scriptoribus & Vergilio nigra di-
ceretur. Nec solū ex saturata purpura lucent Violæ, sed etiam quædā sunt albæ,
eæq; vulgatiores, frigidis & viginosis locis nascētes, nullo aut sanè languido odo-
re. Vtriusque alia est satiuæ, alia siluestris. Præterea Viola purpurea satiuæ, tum can-
dida in hortos trāsata, maximè loco aprico insolata, flore q; sæpius vulso, alioq;
cultu, denso foliorum stipatu ferè globosa fit, ideo duplex Gallis dicta, *Violette de
Mars double*, quā olitores delitiis alunt. Pena tradit nusquam in Europa cultu lu-
culentiores, magnitudine, fragrantia, colore, prouentu spectari, quā in Antuerpiæ
Officinis quæ parant cæruleum violaceum syrupum ex pluribus infusis saccharo

Genera

Ca. 117. li. 4.

In Ad. flo.
266.Li. 4. c. 117.
Forma.

addito, soli viginti aut triginta dies expositis. Sed is florū luxus Violas semine priuat, fraudato seminis genio, quæ si rursus negligentur, nec frequentius transplantentur, ad ingenium redeunt. Matthiolus arborecentem Violam è Baldo monte ad se missam depinxit, nempe Matrem Violarum, à nobis describendam paulò post fusiùs, quæ ad duorum cubitorum altitudinē adolescit, multis ab vna radice sublatis ramis, flore regalis consolidæ floribus ferè simili. Ea nihil aliud est, inquit Pena, quàm Viola purpurea in nemorosis, vmbrosis frigidarum regionum, qualis Anglia, Belgium, vel calidiorum montibus arduis, quales Veganiij, & Narbonēses alij montes, ramosos cauliculos emittens, sesquipalmares, teneros, & ex interuallis folia oblongiora, altiùs serrata, siliqua sç; in tria dehiscētes, longiores: flores cōcolores, inodoros, non nihil toto ortu & positu Violam Gammeam imitata, neque tamen specie aut natura à Viola purpurea diuersa, quā sic descripsit Dioscorides.

VIOLA Purpurea, Matth.



Folium habet minus tenuiusq; quàm hēdera, nigrius tamen, nec dissimile: cauliculus statim à radice medius profilit, in quo flosculus suauiter olens, purpureus. Nascitur in asperis & vmbrosis locis. Hanc nostram esse Violam Martiā nemo ambigit, tum floris venustate, tum suauissimo odore plebi & Officinis frequentissimam & vsitatissimam, ad delicias & summas vtilitates. Hæc enim humilis per terram repit fragariæ modo, folia fundens à radice multa, lata, venosa, per ambitum leuiter serrata, hederæ foliis minora, rotundiora, tenuiora, nigrioraq; præsertim parte superiore, inter quæ medijs exeunt pediculi tenues, teneriusculi, singuli singulos flores ferentes, pulchros, odoratos, colore in nigro purpureos, nonnunquam pallidiores, nonnunquam candidos, ex quinque foliolis cōpositos, ac deinde pensilles folliculos, vasculave rotunda per maturitatem in tres partes dehiscētia, semen minutum, album, in rotunditate oblongū, miliaceum, medullosum complectētia: radices tenues sunt & fibratæ.

Lib. 21. c. 6.

Locus

Tempus.

Viresc.

Temper.

Li. 4. ca. 117.

Hanc solam Plinius Græco nomine Ion appellari tradit his verbis. Violis honos proximus. Earum plura genera, purpureæ, luteæ albæ: plantis omnes vt olus satæ. Ex iis verò quæ sponte apricis & macris locis proueniunt, purpureæ latiore folio statim ab radice carnosâ exeunt, solæq; Græco nomine à cæteris discernūtur, appellata Ia, vt ab his ianthina vestis. Locis opacis iuxta dumos, muros, agrorū, hortorumq; margines pingui solo plurima frequensq; emicat. Multiplex hortensis est, quæ floribus est pallidioribus, minusq; odoratis. Nascitur etiam locis opacis, ac secus vias & margines agrorum, verū arido steriliq; solo. Floret perpetuò, vt diximus ex Theophrasto, si cultus adhibeatur, sed vere præsertim, & inter vernos flores ferè prima. Folia verò toto anno virent. Viola refrigerandi vim habet, Dioscor. auctore. Folia eius per se & cum polenta illita stomacho æstuanti, oculorum inflammationibus, sedisq; procidentis auxiliantur. Præterea id quod in flore purpureum est, cum aqua potum angina correptis, & comitali in pueris morbo mederi affirmant. Quam postremâ sententiam quidam hinc expungunt tanquā supposititiâ, nec eam Ruellius conuertit, quod eadē capite de Astere legatur. Alij cōtra Plinium & eos auctores ex quibus illa descripsit, sequēdos iudicant, idq; de Viola

Viola purpurea rectè legi, & à Dioscoride scriptum esse censent, capitiq; de Astere Attico falsò adiecta, quod neq; Plinius, neq; Græcus alius auctor ea de Astere memoria prodiderit. De viola verò hæc Plinius. Violæ siluestres sunt & satiuæ. Purpureæ Lib. 21. c. 19. refrigerant, cōtra inflāmationes illinuntur, stomacho ardenti imponuntur, & capiti in fronte. Oculorū priuatim epiphoris, & sede procidente vuluāve, & cōtra suppurationes. Crapulā & grauedines capitis impositis coronis olfactūve discutiūt. Anginas ex aqua potæ. Id quod purpureū est ex iis, comitialibus medetur, maximè pueris in aqua potū. Semen violæ scorpionibus aduersatur, contrā flos albæ suppurata aperit, ipsa discutit. Hæc Plinius. Et sanè hoc ex violis purpureis auxiliū videtur non manifestis ipsarum qualitatibus aut facultatibus, sed φυσικῶς, & cæco effectū anginis & epilepsiæ mederi. Violæ folia, inquit Galenus, aqueam & subfrigidam substantiam superatē possident. Quare tum per se, tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi æstuanti, & oculis. Mesues multò accuratiùs violæ vires declarat his verbis. Viola recens frigida est & humida, siccata minùs tum frigida tum humida. In recente enim excrementosa in superficie humiditas purgatrix lubricando, caliditatem obtundit, perfectionis ipsius & formæ causam. Hæc cum siccando resoluta fuerit, caliditas priùs obrupta emicat, & ab ea sapor amarus, sitq; trahendo purgatrix. Viola recens refrigerat, narcoticorum ritu dolores calidos sedat, inflāmationes omnes extinguit, asperam arteriam & thoracē lenit, expūrgat bilem flauā, & ab ea calorem extinguit, & cephalalgiam à causā calida: somniferæ sunt, conferunt vuæ, cynanchæ, præter cæteras verò pleuritidi, & cæteris tumoribus thoracicis: phlegmonen hepatis, obstructionem eius siccam, icterum valde iuuant, & febres symptomaticas, seu inflāmatorias: sitim sedant, sed coryzam excitant. Melior est viola matutina, cuius virtutem neq; solis calor resoluit, neq; pluuia dissipauit. Cum imbecilliter purgēt, additur à quibusdam violarum parti dimidium turbith, ab aliis scammonium, & finguntur trochisci. Violæ & oleum violarū, vt medicamentorum violentiam retundant, ipsis adduntur. Succus violarum & syrupus leniendo soluit. Violæ melle conditæ magis tergent, minùs refrigerant, cum saccharo cōtrā. Oleum sit omphacinum aut amygdalinum, in quo oleum violatū fiet. Hactenus Mesues, sit hodie quoque syrupus ex violarum recentium diluto, in quo illæ sæpius maceratæ fuerint quemadmodum ex rosis rosaceus, quo deiciendæ alui gratia medici in pleuritide vtuntur, vncias quatuor aut quinque propinantes, violarum deiectionem vim Galenum & cæteros veteres Græcos nō nouisse perspicuum est. Gignitur viola hîc depicta, ab herbariis mater violarum dicta, in nemoribus & dumetis, radice nigra, multis fibris capitata, caulibus multis, sesquipedalibus, nodosis, teretibus, foliis violæ martiæ longioribus, ad caulium & furculorum nodos exeuntibus, flore violæ purpureæ longo pediculo nixo, vt in supradicta viola, semine eodem, quadrangulis vesicis incluso. Caules primū recti stant, deinde humi

Lib. 6. sim.

Lib. 2. c. 11.

*MATER Violarum,
Dalechampi.*



procumbunt, floret hæc planta diutissimè: nam dilapso flore in eius locum alius atque alius subnascitur.

*Mater
violarū.*

NominaLib.6. hist.
cap.7.

Lib.2.c.31.

Genera.In cap. 117.
lib.4.**Forma.**

V AE hîc pingitur viola à florum tricolori varietate Viola tricolor, & herba siue flos trinitatis nuncupatur, ab aliis Iacea, ab aliis Viola flammea, quibus phlox Theophrasti esse videtur, quam violam flammeam Plinius & Gaza interpretati sunt, quamquam nostra exemplaria non φλώξ, sed φλογονὸν habeant, quod idem esse puto. Phloga Theophrastus scribit vere cum viola, aut paulò pòst exire, siluestrem esse, plurimùmque durare, quæ de tricolori viola verè dici possunt. Est enim silvestris, inodora, vere aut paulò pòst erumpens. Alij contendunt phloga herbam esse à Dodonæo pro heranthemo demonstratam. Anguillara amaranthum purpureum esse putavit. Sed is nec vernus, nec coloris flammei. Viola hæc Gallis *Pensees*, & *menues pensees* vocatur, Germanis *freyscampkraut*, quæ cum silvestris sit, in hortis tamen hodie colitur. Eiusdem duo obseruavit & depinxit genera Matth. alterum maius, alterũ minus. Viola flāmea foliis constat exiguiis, initio rotundiusculis, deinde oblongioribus, per ambitum serratis, caulibus angulosis, infirmis, tenuibus, geniculatis, reptantibus, ex quibus inter folia exoriuntur pediculi longiusculi, quibus flores insident purpureæ violæ forma & magnitudine ferè pares, similiter in quinque foliola diuisi, singula triplici colore variegata, purpureo videlicet, luteo, candidoque vel cæruleo, summis foliolis purpureis, mediis candidis, infimis luteis nigris intercurrentibus lineolis. In hortis hos flores etiam cum pallido, cæruleo, purpureo, luteo promiscuos videmus, ea colorum varietate ob solam venustatem, nulla odoris gratia commendata. At in Vellauuorum montosis pascuis propè cœnobium, quod monasterium Diui Chafredi vocāt, hîc flos totus luteus spectatur copiosissimus insigni prorsus de hac re historia. Montibus enim altissimis frigidissimis, niue sex ferè menses opertis, eo potissimum iugo vnde manat Ligeris fons, per æstatem tanta copia is

VIOLA FLAMMEA siue
Tri-olor maior, Matth.



VIOLA FLAMMEA Minor,
seu Iacea altera, Matth.



flos prodit, ut terre conspectum intuentibus eripiat: collectum verò & in faccis conditum incolæ Mafsiliam perferunt, unde post nauibus in Alexandriam & Aegyptum vehitur. Eum fama est Aegyptios comparare, ut in aqua, quam solam bibere per religionem fas est, macerantes, & coquentes, salubriorem potum conficiunt, ad caducum morbum pulmonisque & thoracis vitia decoctum id prodesse arbitrantur: tam procul ad eos morborum sitisque remedia nos mittimus. *φλόγω*, quasi flammeam dictam volunt ab huius sylvestris luteo colore, quem Flammeum appellarunt veteres, & qui in hortis cultu mutatur. Semē exiguis & rotundis folliculis coercetur, quæ eo maturo dehiscunt, radices multis fibris constant. Minoris huius violæ flores, inquit Matthiolus, minores sunt, & duobus tantum coloribus splendentes, nempe cæruleo ac candido, aut luteo & albicante. In aruis multis locis nascitur, & sitientibus pratis sua sponte, atque in hortis silvestri speciosior & elegantior. Vere cum viola purpurea aut paulò post emicat, æstate deinde tota, & maxima autumnii parte, nonnunquam etiam hyeme floret. Dodonæus in stirpium historia violam flammeam siccam, calido frigidoque temperatam esse tradit, in libro de floribus frigidam quidem obscuram habere qualitatem, sed humidam manifestiorem, lenti glutinosique succi, ut malua participem, emollientis ea de causa facultatis, verum minus quam illa, prodesse, ut recetiores aiunt, febrecitibus maximè pueris & infantibus, quorum conuulsionibus ac comitialis morbi accessionibus subuenire creditur, commendatur item ad pulmonis pectorisque inflammationes, & ad scabiem corporisque pruritus: vlcera quoque glutinare fertur. Pena calidam, gustuque totam subacrem esse asserit.

Locus.

Tempus.

Lib. 2. c. 2.

Cap. 2.

In Ad. fol. 266.

LEUCOIVM.

CAP. IIIII.

Λευκοίς nomen, quamuis Græcis albam violam significet, si eius vocabuli compositionem spectes, aliarum tamen violarum præter melania cuiuscunque coloris sint, naturam indicat, etiam lutearum quas Arabes nunc *Cheiri* vocant nunc *Alcheiri*, præposito articulo, Germani *V-vysuail*, Hispani *Violetas amarillas*, Galli *Gyrosfiers jaunes*: & candidarum, & cærulearum, & purpurearum, ut quatuor sint in totum hæc genera sola florum varietate discrepantia, autore Dioscoride. Alia enim candida, alia lutea, alia purpurea, alia cærulea quamquam multi de cærulea dubitent, putentque leucoium cæruleum in Dioscoridis græcis codicibus ascititium esse, etsi in cunctis pariter legatur, tum quod nusquam leucoium cæruleum viderint, tum quod Marcelli egregiæ antiquitatis & fidei Latinus Dioscorides Lōgobardis literis scriptus, tres tantum colores illos omnibus notos numerat, quartus hîc cæruleus nullus in eo sit. His addit Fuchsius Plinij auctoritatem, qui violæ genera enumerās, purpureæ, luteæ, albæ duntaxat meminit: neque plures leucoij differentias recenset Oribasius, neque Serapio hoc Dioscoridis caput ad verbum describens. Minimè tamen hîc violam purpuream aut candidam intelligas eam quam *λευ* Græcis propriè vocatam diximus, Latinis violam, quam diximus etiam esse purpuream & candidam: Homines enim illorum florum capti venustate & fragrantia, inquit Pena, ut vsum ad coronamenta, sic nomen commune sanxere, posteaque magis consuetudinem, aut florum similitudinem quam rationem secuti, multos & varios flores violas nuncuparunt, idem nomen variis atque longè diuersis plantis, quales sunt violæ & leucoia imponentes. Hæc enim ab illis qualitate facultatibusque differunt: ideo Dioscorides locis atque familia disiunxit. Est & apud Theophrastum leucoium bulbosum. Quæ omnia suis locis declarantur. Leucoium album ut Dioscoridis ætate, sic etiam hodie vulgò notum, non à florum candore, neque enim semper candi-

Nomina

Genera

Lib. 3. c. 121.


Cap. 173. hi.

Lib. 21. c. 6.

Lib. 7. hist. cap. 15.

Forma.

dos ha



dos habet, sed à foliorum canitie cinericiove colore dictum, caulem habet bipedalem aut tripedalem, durum, rectum, ramosum, rotundum: folia oblonga, candida, mollia, & veluti lanuginosa verbasci ritu: flores odoratos, ex quatuor foliolis congestos in superiore cauliculorum parte, ex pediculis exeuntes, aut candidos aut ru-

LEVCOIVM Aureum,
Matthioli.

Iib. 2. c. 4.
& hist. flo.
cap. 3.

Cap. 117.
hist.

Tempus

Locus.

Leucoium
luteum.

Forma.



bêtes, aut ex purpureo puniceos, aut cineri candidiori proximos: siliquas angustas, oblongas, in quibus semen latum & rotundum: radices validas, fibratas. Hoc minus leucoium ponit Dodonæus, quod non forma sed magnitudine sola differt, caules foliæque similia gerit, sed minora, flores etiam vel candidos, vel rubentes, vel puniceos, siliquas & semina similia. Fuchsius violæ matronalis nomine depinxit. Purpureum huic planè simile est caulibus, foliis vtrique parte canescentibus, solo florum colore distat. Quare Matthiolus vtrumque eadem pictura expressit. Leucoia ista vere florent, & tota propemodum æstate. In hortis & cultis locis proueniunt. Leucoium luteum, Græcis λευκόιον, & λευκόιον μέλιον, Plinio viola lutea, Arabibus & Officinis propriè Keyri, Gallis Gyroflée iaune, vel Violier iaune, Germanis Geel veiel, Italis Viola lalla, caulibus est ramosis, lignosis, virentibus, foliis oblongis, angustis, in viridi nigricantibus, glabris, numerosioribus, longioribus, magis in acutum desinentibus, quàm superiora. Flores bene lutei, venusti, valde odorati summos

summos ramulos ornant: deinde siliquæ minores, in quibus semen compressum, luteum. Sponte è rimis peruetustorum murorum saxorumque apricis, & radiorum solis re percussu incalescentibus emicat, atque etiam è ruderibus, feritur etiam & colitur in hortis. Sed illud mense Febuario & Martio floret, præsertim hyeme

Locus.

VIOLA LUTEA,
multiplex.



LEUCOIVM,
Puniceum, Fuch.



clementiore, hortensè seriùs. Leucoium luteum verius dici ^{τον φλογινόν} Theophrasti, quàm florè trinitatis, periti herbarij autumant, quod totus flos flammei sit coloris, idest, lutei: luteum enim florem flammeum à Latinis dici declarant hec Plinij verba. Lutei video honorem antiquissimum, in nuptialibus flammeis totum fœminis concessum. Flamma enim in humido flaua est: in sicco verò rubra fit, & à flammeo flauove colore discedens rubra cum splendore cernitur. Sui similis & vna dūtaxat, inquit Pena, quæ plurimùm albos, sæpe purpureos, interdum, præsertim annotina flores exoleti coloris in caruleum vinaceum languescens fert, cornicula quanta & cuiusmodi cornuti papaueris: geminum autem seminum ordinem membranula secundum ordinem intercurrit: folia accedunt ad calendulam albicantia è radice lignosa. Hæc nō perinde feruet gustu. Alia viola lutea hîc proponitur spectanda verè polyanthes vel multiplex cognominanda, flore nimirum densissimis foliolis stipato & congesto, præstantissimi atque suauissimi odoris, nullis siliquis, nullo semine, abeunte nimirum in floris amplitudinem eo succo, quem siliquarum & seminis materiam esse oportebat. Cultu & mangonio talem euadere aiunt, præsertim si tenellæ plantæ antequam floruerint sæpiùs transferantur. Præterea leucoium puniceum hîc appinimus, rectius sic appellatum quam violam matronalem puniceam, quo nomine Fuchsius pinxit. Dioscorides lutei leucoij præcipuum in medicina vsum esse tradit. Huius aridos flores decoctos in defersionibus valere contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellere: cerato exceptos rimas sedis sanare, cum melle feruida oris vlcera, semen ipsius duarum drachmarum pondere cum vino potum, aut cum melle appositum menses, secundas, partus extrahere, radices cum aceto impositas lienem reprimere, & podagricis prodesse. Plinius eadem habet. Viola alba & lutea extenuant, menstrua, vrinam ciēt, minor vis est recentibus: ideòq; aridis post annum vten- dum. Lutea dimidio cyatho in aquæ tribus, menses trahit. Radices eius cum aceto illitæ sedant lienem: item podagram, oculorum autem inflamma

Lib. 21. c. 8.

In Ad. fol. 141.

Viola lutea.
Forma.

Cap. 117. hi.
Lib. 3. c. 121.
Vires & Temper.

Lib. 21. c. 19.

inflammationes cum myrrha & croco, folia cum melle purgāt capitis vlcera cum
 Lib.7. sim. cerato rimas sedis, & quæ in humidis sunt, ex aceto verò collectiones sanant. Gale-
 nus eadem distinctiùs explicat his verbis. Leucoij frutex vniuersus extergentem
 facultatem habet, ac tenuium partium, plus tamen flores: & inter hos qui sunt sic-
 ciores magis quam virides, adeò vt & oculorum cicatrices crassas extenuent, tum
 menses quoque eorum decoctum mouet, & secundas partumque emortuum eli-
 cit: ac si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum vt si quod aliud, ama-
 rum. At si quis virium eius vehementiam multa aqua admista retundat, aut id ge-
 nus aliquo, habebit & ad phlegmonem non malum medicamentum. Sic decoctum
 eius si non merum fuerit vteri phlegmonas identidem perfusum sanat, potissimum
 quæ diuturno tempore ad scirrhi modum induruerit. Sic cum cerato vlcera ægrè
 ad cicatricem peruenientia curat. Sunt etiā qui cum melle ad aphthas adhibeant.
 Semen cum eiusdem sit facultatis, aptissimum est duarum drachmarum pondere
 potum: tum mensibus ciendis impositum conuenire creditur, partumque viuen-
 tem interficere, ac mortuum eiicere. Radices similis quoque facultatis, nisi quod
 crassioris sunt essentia, & magis terrenæ, cum aceto lienes induratos sanant. Non-
 Lib.3. anti. nulli verò & phlegmonas in articulis induratas iis curant. Mesues oleum de Key-
 ri, id est, ex floribus lutei leucoij conficit vt chamæmelinum, quod tenuat, digerit:
 ob id dolores thoracis, renum, neruorum, mensurarum sedat.

VIOLA MATRONALIS. CAP. V.

Nomina

Lib.21. c.7.



VIOLA matronalis vel viola damascena & marina, Gallis *Violette de damas*, & *Gyrofflee de damas*, vel *violette & Gyrofflee des dames*, Germanis *Vuinteruiolen*, hoc est, viola hyberna siue hyemalis. Quidam ob odoris præstantiam violam moschatellam vocant, alij Hesperida Plinij, noctum magis olentem, inde nomine inuento. Dicitur autem viola matronalis quod.

VIOLA Matronalis, alba.



VIOLA Matronalis, purpurea.



eam matronæ colere soleant. Damascena tanquam ex Dàmasco delata. In floribus huius differētia est. Vnam Fuchsius depinxit floribus candidis, alteram purpureis nomine leucoij albi & purpurei. E' radice fibrata, densa, ampla, caules emittit re-
ctos, cubitales & sesquicubitales, ramosos, in quibus folia longa, lata, subnigra, per
ambitum leuiter crenata, crebra, drabæ, aut erucæ, minùs laciniosa, in caulium sum-
mitate flores pulchri, quadrifolij, odorati, leucoiis similes, sæpius candidi, aliquan-
do rubelli, aliquando dilutæ purpuræ, semen in siliquis oblongis & rotundis coër-
cet, paruum, acre, fuscum aut rufescens. Quamuis marinam & damascenam tan-
quam exoticam vocitent, inquit Pena, tamen in Nitiobrigum montosis, & Vega-
nij siluosis, etiámque in pratis Angliæ fruticat, vnde horti habuerunt, in quibus
culti floret Aprili, Maio, & Iunio mensibus, folia gustu acria & calida sunt, quin
potiùs erucam, thlaspi, aut Rapunculum gustu tota sapit, quibus idcirco affinis na-
tura & facultatibus proxima putatur. Prouenit & sponte in Sequanorum vallibus,
qua ænus fluit, sub sepibus.

Genera.
Cap. 173. hi.
Forma.

Locus.

Tempus.
Temper.

VIOLA LATIFOLIA.

CAP. VI.

CVM HVIVS plantę floribus magna sit cum violæ & leucoij floribus
affinitas, eam herbarij violarum ambitu comprehenderunt, & vio-
lam latifoliam, aut peregrinam nominarunt. Diximus enim nomine
Græco *τῆ βου*, & violæ Latino, plantas multas intelligi, quas florum
similitudo potius quàm ratio similes fecit. Quidam atque etiam Officinæ voce

Nomina

VIOLA, Latifolia.



barbara *Bulbonac* ceu *Bolbonac* rectiùs videntur
appellasse à radicibus bulbosis: recentiorum
plerique Lunariam, alij Lunariam Græcam vo-
cant, alij perperã Rhaphanum siluestrem, Bra-
banti *Percininkblæmen*, id est, florent nummi, à si-
liquarum figura nummum quadantenus refe-
rente. Hæc planta caules profert duros, rotun-
dos, surculosos, folia oblonga, latiora multò
quàm violæ matronalis, virentia, in ambitu pa-
rum crenata, flores Leucoij purpureos & sub-
cæruleos, quos sequuntur latæ, planæ, & prope-
modum rotundæ siliquæ, vel orbes foliacei, ex
membranis tenuissimis veluti laminis compa-
cti, pellucidi, semina quaterna aut quina com-
plexi plana, lata, obscuri coloris, forma quo-
dammodo *δισχολος* lunæ, inter quæ media ia-
cet tertia membrana, radices sunt bubosæ, ob-
longæ, cæcidæ prorsus, carnosæ, sparsæ, quadan-
tenus asphodeli, aut pæoniæ, sed minùs protu-
berantes. Hæc, inquit Pena, in Alpini Gallo-
prouinciæ, conterminisq; Pedemontij oritur,

Forma.

In Ad. fol.
137.

Locus.

Tempus.

De flo. c. 6.
fol. 137.

apud Frācos verò Flandros & Anglos in hortis tantum colitur, radicibus hîc exi-
lioribus quàm illic, flaccidioribus, minùsque protuberantibus, sed similibus. Primo
vere floret, in hortis Aprili mense, altero à quo sata est anno. Huic aliam similem
esse tradunt Dodonæus & Pena, foliis latis, & siliquis planis ac rotundis, vtrisque
paulò minoribus, caulibus durioribus, breuioribus, floribus dilutioribus, radice pe-
renni ac hyeme non marcescente, fibrosâ, non autem bulbosâ, quæ in hortis repe-
ritur, ac floret æstate. Viola latifolia calido acríque gustu est, præsertim semē, quod

Temper. siccum est, radices acrimoniæ cuiusdam, sed non multæ participes sunt. Lobellio abstergit, modicè calefacit, vrinas cit vt rapunculus. Eduntur in acetariis, vt rapunculi, & aliæ nonnullæ. Dodonæo & aliis quibusdam veterum thlaspi secundum esse videtur, quod & sinapi persicū dicitur, & thlaspi Crateuæ. Nam, vt Dioscorides scribit, Alterum thlaspi tradit Crateuas *πλάτυφυλλον, καὶ μεγαλόριζον*, id est, latifolium & magnis radicibus, qualis viola hæc latifolia esse videtur. Quæ sententia Petro Pe. non placet, quoniã huius radices non perinde acres sint, vt Crateuæ thlaspeos radices traduntur, quarum vsus ischiadicis utilis, illarum acrimonia inefficacior. Idem neque istam, Armoraciam, siue siluestrem raphanum Dioscoridis esse putat.

CARYOPHYLLI NOSTRATES. CAP. VII.

Nomina



Vlco celeberrimi & notissimi florum elegantia, & suauissimo caryophyllorum exoticorum odore, caryophylli dicuntur, seu caryophyllei flores, quibusdam Ocellus, à floris specie, & Ocellus Damascenus, & Ocellus barbaricus, & Barbarica, Gallis *Gyroffles*, & *Oeilletz* similiter ab odore & forma, Italis *Garofoli*, Germanis *Negelbluomen* etiam ab odore, & *Graszbluomen*. Fuchsius betonicæ alterius speciem facit, & Betonicam alteram, seu Vetoniam coronariam vocat, quod eius in coronis penè nimius sit vsus. Matthiolus cum aliis Vetoniam coronariam, Officinæ detractis duabus prioribus à betonica literis, Tunicam seu Tunicem, tamẽ Bernardus Gordonius Tunicam polemonium esse tradit. Dodonæus Vetoniam altilem & coronariam appellat. Pena Cantabricam, quam Plinius in Hispania inuentam refert per D. Augusti tempora à Cantabris repertam, nasci vbique caule iunceo, pedali, in quo sunt flosculi oblongi veluti calathi, in his semen perquam minutum. Alij cantabricam potius esse volunt Hispanorum *Scorzoneram*, contra venena omnia famosissimam, de qua nos alibi. Alij iphyum Theophrasti, quod esse ait herbæ graminivæ simile, siccum esse, radice lignosa, semine feri, æstate florere. Est autem à Tiphyo seu Tiphysis diuersum, quod animaduertendum est diligenter, ne tanta vocum affinitas imprudentẽ fallat. Iphyum enim coronariũ est. Tiphya verò in coronarum vsu nō veniunt. Præterea Tiphysis hoc ferè peculiare, quod prima statim germinatione ante foliorum ortum florem promant, quod in Bechio ac petasite videmus accidere, vt non immerito quidam existiment à Theophrasto ea Tiphya nominari. Anguillara luteum asphodelum iphyum esse suspicatus est. Alij cum Ruellio caryophyllos nostrates veteribus incognitos fuisse existimant, mirum creditu tam celebrem florẽ, tam iucundum, fuisse à veteribus silentio prætermisum, qui amplitudine, pulchritudine, varietate rosā non inferior videri possit. Caryophyllus alius satiuus, alius siluestris, hic minor, ille maior, qui foliis est longis, carnosus, duris, angustis, in extremo acuminatis, incanis, cauliculis multis, iunceis, rotundis, geniculatis, læuibus, cubitalibus aut altioribus, coëuntibus pyridatim internodiis, in quorum & iis adnatorum cacuminibus calices sunt longi, teretes, glabri, orbiculo superiore denticulati, è quibus flores omnium speciosissimi prodeunt, ex senis foliolis, qui simplices sunt, ex multò pluribus multiplices, per extremas oras scitè fimbriati, caryophyllorum odoratu, sed longè suauissimo, colore alias purpurascẽte dilutiùs, alias intensiore rubore nitente, aliàs candido. Sunt & non pauci albi & purpureis punctis aspersis versicolores qua coloris varietate & odoris suauitate cum rosis de principatu certant, ex flore medio staminei exeunt gemini apices candidi: semen in oblongis vasculis minutum & nigrum, radix promissa, simplex, geniculata. Minor siue siluestris caryophyllorum species, priori simillima est caulibus, sed humi stratis foliisq; sed dum colitur in areis hortorum, latioribus, vtrisque tamen minoribus, ex

*Genera
Forma.*

Cap. 132.
hist.
In Cap. 153.
lib. 2.

Lib. 2. c. 7.
Lib. 25. c. 8.
Pet. Pe. fol.
188.

Lib. 2. c. 149

Lib. 6. hist.
cap. 7.

Lib. 1. cauf.
cap. 10.
Lib. & c. 6.
hist. cap. 7.



bus, ex oblongis quoque paruis & teretibus calicibus flores promit minores, non ita foliosos, per ambitum quoque dissectos ac fimbriatos, candidos aut purpurascens, nec odore perinde fragrantis ac superiores. Caryophylli maiores in hortis coluntur, speciosissimi in fictilibus vasis. Seruntur frequentius auulsis exiguis cum foliis surculis, semine rariùs. Nam è semine nati ad naturam agrestem redeunt, florèsque, minores & simplices, etiamsi prius multiplices fuerint, producant. Siluestris caryophyllus plurimus vbiuis reperitur in saxosis, montosis & siluosis marginibus calidarum & frigidarum regionum, seruntur etiam in hortis. Non desunt qui olitores credant surculis stylo perforatis caryophylla aromatica inseruisse, quo iucundum illum odorem flores illicerent, & caryophyllorum suauitatem expirantes naribus repræsentarent, vt ex flore minùs odoro quàm odoratissimũ, & ex fera siluestriq; herba mansuetam facerent, quæ iucundo odore caryophylli suauitatem mentiretur. Quod si verum est, siluestris à satiuo nisi cultu & mangonio differt, quod tamen nonnulli inficiantur. Florent tota æstate & autumnò, viuace horum planta, multisque annis durante, si hyeme à frigoris iniuria defendatur. Sæpe, inquit Ruellius, in cellis vinariis tota planta fruticare visa hyeme, fauente loci tempore, & flores interdum parere. Aliud tradit non omittendum, sæpe visam herbã vno anno florem parere candidum, altero purpureum, tertio colorum varietate promiscuum: & quod mirabilius videri possit, ramum eundem niueum & vermiculatum proferre florem, tam prona huius herbæ natura, vt flos albus in purpureum, & purpureus in candidum studio cultus, aut vbertate commutantis soli degeneret. Calidum siccumque esse odor & sapor amariuscule demonstrant. Tradunt recentiores flores præsertim purpureos ad animi deliquia, & cordis tremorẽ valere, ad vertigines, epilepsiam, paralysem, conuulsiones, ex betonicæ vel amaraci decocto potos: Saccharo conditos perinde ac rosas, vtiles non solum ad supradicta, sed etiam aduersus venena omnia, & venenatorum animalium morsus, & ictus. Dari etiam ad interaneorum animalia necanda, & ad pestis contagia. Valentiùs tamen succum id præstare ex tota planta expressum: haustum enim quatuor vncia-

*Locus.**Tempus.*

Lib. 2. c. 149

Temp. & Vires.

rum pondere, à morbo qui iam inuaserit liberare. Siluestrium radices trium drachmarum pondere haustas ex mero, à vipera demorsos sanare. Eorumdem succum calculo atterendo & educendo, nec non comitiali morbo laborantibus vtilem esse, fit ex altium floribus detractis vnguibus acetum iis in eo insolatis, quo naribus illito reuocantur animi deliquio consternati. Idem quoque vtile est pestilenti auræ arcendæ, naribus, arteriis, manibus quotidie eo irroratis.

ARMERIA.

CAP. VIII.

Nomina

Lib. 2. c. 149

& Lib. 3. c. 77

Lib. 2. c. 7.

Forma.

Cap. 19.

Cap. 132. hi.

Ibid.

Armeria

Dodo.

Forma.

CARYOPHYLLORVM siluestrium siue minorū species videntur esse, quæ Gallis *Armoiries*, Ruellio *Armerie* & *Armerij* flores dicuntur. Primam Dodonæus *Vetonicam* coronariam seu altilem minorem vocat, Germanis *Mut-vuillen*, quidam *Hochmut*, id est, Superbam, Belgæ *Pluymkens* à florum foliolis fimbriatis & plumarum ritu dissectis. Caryophyllo altili caulibus, foliis, floribus similis est, sed multò minoribus, folia sunt longiuscula, angustiora, cauliculi tenues, nodosi, pedales & cubitales, in quibus flores odoris suavis, superioribus similes, sed simplices, ex quinis, aut senis foliolis, altioribus & angustioribus crenulis fimbriati, candidi, aut purpurei, deinde siliquæ acuminatæ semen comprehendentes. Elegantiæ & odoris causa in hortis habetur. Hanc idem Dodonæus in florum historia caryophylleum minorem, atque etiam *Vetonicam* altilem, seu coronariam minorem vocat, Fuchsius *Betonicam* siluestrem alteram. Primum verò armerium florem Dodonæus in florū Historia eum facit, quem Germani *Dondernegele*, *feldtnegele*, Belgæ *Keykens*, quasi dicas fasciculum florum, in quibusdam Picardiæ locis *Cuydereles*, vocant, qui cauliculos habet rotundos geniculatos veluti caryophyllei flores, circa inferiora genicula sæpius rubêtes, cubito breuiiores, folia oblonga, sed aliquanto quàm maioris caryophylli latiora, colore herbaceo virentia, flosculos in summis cauliculis paruulos, exiguis caryophylleis similes, verum minores, plures simul in quandam veluti vmbellam congestos, particu-

ARMERIA VETONICA,
Coronaria.ARMERIA Prima Dodonai, siue
Caryophyllus minor siluestris, Lob.

latim

latim frequentius prodeuntes, & semper ferè cocci rubore splendentes, punctis interim candidis circa medium interdum variegatos, rarissimè candidos. Ornat hic flosculus Belgicorum hortorū areas, apud Italos & alibi locis incultis & aridis exit. Istam, in stirpium historia Dodonæus, Vetonicā veram, seu herbam Tunicā nuncupat. Fuchsius Betonicam siluestrem vnam. Armeria secunda siue siluestris Dodonæo est siluestris Vetonicæ species, Gallis *Armoiries sauvages*, Germanis *Gauchblum*, id est, flos cuculi, Belgis *Craczenblæmkens*, id est, cornicis flores. Armeriæ seu Vetonicæ altili affinis est, cauliculis geniculatis, foliis breuioribus, latioribus, & multò magis candicantibus quàm caryophylli, aut armeriæ primæ folia, flores frequentius rubent, interdum candidi sunt, altiùs crenati, simpliciores, inodori, semē in oblongis siliquis continetur. Exit passim in pratis vliginosis, & locis riguis herbidisque, Maio & Iunio mensibus. Quibusdam odontitis Plinij cap. 12. 27. inter scœni genera: cauliculis densis, ab eadē radice, geniculatis, triāgulis, nigris. In geniculis folia par-

Lib. 2. c. 7.
Cap. 132. hi.
Armeria
silue.
Lib. 2. hist.
cap. 7.

Nomina
Forma.

Tempus.

*ARMERIA Secunda siue
siluestris, Dodon.*



*MISCIPLA siue
Armeria altera.*



ua habet, longiora tamen quàm iolygonon. Semen in alis hordeo simile: florem purpureum, pusillum. Nascitur in pratis. Decoctum cauliculorum eius in vino austero, quantum manus capiat, dentium dolori medetur, ita vt contineatur ore. Hanc venenis cōmendant, inquit Pena, qui putant Tunicem esse, nec prorsus falluntur, quia nō frustra opem experiuntur, & nonnullis practicis Arabibus etiam Tunix vocatur, non secus atq; polemonium Belgarum, siue Ocimastrum, quod est Gordonij Tunica. Tertia quædam est Dodonæo in florum Historia, Armeriorum florū species, cauliculis rotūdis, geniculatis, tactu glutinosi, pedis altitudine: foliis ex singulis geniculis binis, oblongis, angustis, acuminatis, in virore candicantibus & quasi cæsis: floribus in umbella similiter pluribus, simul congestis, pulchris, Armeriis similibus, verū minoribus & rubentis dilutæ purpuræ colore: semine in oblongis vasculis pusillo: radicibus tenuibus & fibratis. Seritur in Hortis: floret à Maio aut Iunio mense in autumnū vsq;. Quidam volunt Limonij, aut Behen vulgò nunc dicti speciem aliquam esse. Est Lobellio Lychnis siluestris altera, & Behen rubrum

Locus.

Vires.

Salamanticum Clusij. Dicitur etiam à Lobellio Muscipula seu Armoratia altera, fortasse flos Constantinopolitanus alter minor Gesneri.

VIOLA BARBATA MAIOR. CAP. IX.

Nomina

Genera.

Forma.



SIMILITVDINE floris violas appellant herbarij plantas hîc depictas, easque duûm generum. Vna enim viola barbata latifolia, alia viola barbata angustifolia dicitur. Viola barbata latifolia radicibus nititur longis, nigricantibus; tenuissimis fibris capillatis, huc illuc repentibus, surculosis, caulis in cubiti altitudinem assurgit, nonnunquâ breuior proceriorve, pro soli pinguis macrive natura, geniculatus, septem plerûmque aut octo internodiis constans, rotundus, folia bina ex singulis internodiis exeunt, latiora quàm in cæteris huiusmodi violarû generibus, venosa: in caulis cacumine quindecim aut sexdecim, interdum etiam plurium vaginalarum coaceruatur fasciculus, extantibus vndiq;

VIOLA Barbata, Latifolia.



Locus.

VIOLA Barbata, Angustifolia.



veluti barbæ pilis elegantissimè ornatarum, vnde violæ barbata nomen positum fuit. Hæ particulatim florent sub finem Aprilis, vt ex tanto numero quinque aut sex dûtaxat dehiscât, flos puniceus, albis punctis plurimis & minutissimis distinctus, quinque foliolis constat, eminentibus, in medio tenuibus filis propemodum cæruleis, eximiaq; sui pulchritudine oculis intuentium arridet. Semen in oblongis, vasculis maturefcit.

Sponte in pratis humidis, & riguis pascuis

nascitur, colitur etiam in Hortis ob floris venustatem. Viola barbata angustifolia radice est breui, candida, modicè fibrata, foliis gramineis, sed longioribus, nigrioribus, aliquantùm hirsutis, propè radicem multis, in caule paucis, binis per interualla, ad caulis nodos alarum modo iunctis, caule nunc singulari, nunc multiplici, geniculato, pedali, surculis ex alarum sinu non binis ex aduerso, sed singulis ex altera tantùm parte prodeuntibus, in quorû fastigio caliculi multi, longi & graciles in multos veluti barbæ pilos extremo orbe diuisi, vnde barbatam appellarunt. Flos est puniceus, elegantissimus, sed minimus, coloris tamen nitidissimi, & imprimis viuidi. Sabulosis, macris, lapidosis, sed apricis gaudet. Floret Maio & Iunio mensibus.

Locus.

Tempus.

CALTHA

CALTHA HORTENSIS. CAP. X.



VÆ Calendula recentioribus dicitur, quod singulis ferè mensiū 'calendis floreant, Italis eadem de causa *Fior d'ogni mese*, Hetruscis, Matthiolo teste, à floris colore *Fior raucio*, Germanis *Ringelblumen*, ab in-torto, & in circulum acto semine, Gallis *Soulfi*, idest, Solisequiū, quod sub vespërâ flos contrahatur, non est tamen heliotropium, multò minùs scorpioi-des, sed veterum præsertim Poëtarū Caltha, dicta fortasse à calathos, qui quasillus Latinis, Seruio teste, poculum & calix est, cuiusmodi ostendant calendulae florum

CALTHA Poëtarum.



pocula flaua. Caules tres aut quatuor gerit striatos, fungosa intus medulla, in quibus folia oblonga, ex angusto in latius se expandentia, mollia, nonnihil lanuginosa, flores in summis caulibus pulchri, cum grauitate quadam odorati, qui Occidente Sole contrahuntur, manè eodem Oriente explicantur, singuli in medio sui orbem circinatum vmbonemve gerunt luteum croceumve permultis foliolis luteis, vel aureis stipatum (vnde Chrysanthemū Dioscor. vocat Lobellius) in medio multa, breuia, simul compressa, lutea vel subnigra stamina: semen à singulis floribus numerosum, recuruum: radices fibratae. Cur autem hanc herbam Caltham esse credant herbarij, facit imprimis Plinius, qui Caltham odoris grauis esse scribit, deinde Vergilius, qui de ea sic cecinit.

Mollia luteola pingit vaccinia caltha.

Et Collumella,

Candida Leucoia, & flauentia lumina caltha.

Quæ de Calendula rectè dicuntur, cum grauitate quadã odorata, & auri luteo colore splen-

dente. In hortis & cultis copiosissimè, & in multis aruis Galloprovinciæ & Narbonæ & incultis fruticat. Calendulae flos calidus est secūdo propemodū ordine, præsertim exsiccatus. Creditur cor roborare, venenis resistere, & aduersus pestilētes febres quoquomodo sumptus efficax esse. Fuchsius ex vino potum menses cire, & suffitum secundas elicere, item ad capillos flauos reddendos conducere scripsit. Herbae folia calidiora sunt, acrimoniam enim quandam feruidam habent, sed quæ propter humiditatem ei coniunctam non protinus se exerit, ob quam in olere sumpta aluum mouent & leniunt. Fuchsius succum dentium dolores sedare tradit, si os eo colluatur. Alij ad idem puluerem foliorum cum xyli-no dentibus admouent. Sunt etiam qui herbam acetariis admisceant. Calendula auctore Matthiolo, excalfacit, extenuat, aperit, digerit, & prouocat, quamuis gustu adstrictione non carere deprehendatur. Constat sexcentis fœminarum experimentis eandem valere plurimum ad menses ducendos, præsertim epoto eius succo, aut herba ipsa recente diutius deuorata. Datur quoque succi vncia addita lumbricorum terrestrium pulueris drachma vtiliter morbo regio laborantibus. Sunt qui dicunt herbae huius vsu acui indies oculorum aciem. Constat autem stillatitiam floride plantæ aquam oculorum ruborem & inflammationem arcere, si oculis instilletur, aut si linteola in ea macerata superponantur. Quidam Caltham, esse Theophrasti Cérinthum, quasi *κρηανθή*, cereum florem, à Cérinthe Plinij diuersum, credunt:

Nomina

In cap. 186. lib. 4.

Forma

Lib. 21. c. 6.

Ecl. 2.

Lib. 10.

Locus.

Temper.

& Vires.

Dodon. de

flo. ca. 17.

Cap. 14. 2.

hist.

Ibidem?

Ca. 186. li.

conueniente colore floris, ac florescendi tempore. Nam circa Februarij exitum fata, ineunte Iunio florere incipit, florem in hyemem vsque prorogans, ac si hyemis rigorem pertulerit, siluestris præsertim, cum Leucoio bulbofo & Viola flamma, siue cheiri, florem renouat.

MELANTHIVM.

CAP. XI.

Nomina



ΕΛΑΝΘΙΟΝ Græcis & Μελάνσπερμον teste Plinio, Gith Latinis, Officinis Nigella. Melanthium autem & Melanspermum, & Nigella à nigro seminis colore hæc herba dicta est, Arabibus *Xanim*, *Snnis*, seu *Sunizi*, Gallis *Poyurette* & *Nielle*, Germanis *Schuuartz Rommich*,

Genera.

& *Schuuartz kumel*, Hispanis *Negnillia*. Apud Dioscoridem & alios veteres vnus duntaxat Melanthij mentio extat. Posteriores quatuor eius differentias obseru-

Forma.

runt. Nigellam satiuam vulgarem, Romanam, odoram, & Nigellam à citreo seminis colore citrinam Officinis vocatam, alioqui illi persimilem: cui persimilem pinxit Lobellius solo floris amœna duplicatione distantem: Nigellam siluestrem duplicem. Melanthium satium frutex est paruus, ramulis tenuibus, altitudine palmorum duorum, vel maior, foliis paruis, senecionis herbæ similibus, multò tamen tenuioribus, capitulo in cacumine exiguo, ceu papaueris, oblongo, quod interius membranas intercurfantes habet, quibus semen includitur, nigrum, acre, odoratum. Qua descriptione Dioscoridis, Melanthiū satis apertè nobis innotuit. Caulem enim fert in hortis nostris surculosum, pedalem, folia dissecta, fumarix ferè, sed magis virentia. Flores in ramulorum verticibus coloris cærulei diluti, singulos in quinque foliola diuisos rotæ parux instar, iis discussis capitula in summo corniculata, singula intrinsecus quînis aut senis loculis discreta, in quibus semen continetur cepearum semini simile, acre, odoratum. Eadem planè est Nigella citrina, si seminis colorem exceperis. Eadem folia, capitula, membranulis intersepien-

Lib. 3. c. 78.

MELANTHIVM

satiuum, Matth.



NIGELLA Citrina, flore albo multiplici.




ribus

MELANTHIVM

Silueſtre prius, Matth.



MELANTHIVM Silueſtre prius, Matth. ſecond. Edition.



MELANTHIVM

Silueſtre alterum Matth.



tibus diſtincta, flores purpurei pallētes, ſemen multum, odorum. Idem odor, ſapor, vis, vſus. Melanthium ſilueſtre duū generū caulibus eſt hortenſi ferē ſimilibus, quemadmodum & floribus diſſert tantū foliis tenuioribus, multifidis, capillaceis, & odoris præſtantia, acrimoniaq; vincitur, ſed in ſilueſtri ſecundo loco depiſto flores & capitula ſunt, quā in ſatiuo maiora, in eo quod priore loco depiſtum eſt, longiora, & veluti in quinque cornutas ſiliculas diuiſa, cornibus in ambitum repandis retrōve flexis cuiuſmodi Aquilegia fert. Melanthium ſatiuum non niſi in hortis ſatum prouenit. Nigella citrina ex Syria aliisq; Orientis emporiis adueſta, Anglicis iam & Germanicis hortis copioſior eſt quā Italicis, vbi quæ cæteris antecellit, Romana vocatur, alioqui Romæ vel in hortis pauca. Silueſtria Melanthia inter ſegetes, & in agris aliis proueniunt. Iunio menſe florent, Iulio & Auguſto ſemen edunt. Melanthij ſemen panibus inſpargitur, vt ſcribit Dioſcorides, capitis doloribus illitum fron-

Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 78.

Vireſc.

Temper.

ri, & incipientibus ſuffuſionibus cum irino tritum & naribus infuſum prodeſt. Tollit lentigines, lepras, œdemata vetuſta, duritiaſq; cum aceto illitum: circūſcariſicatos clauos excutit cum vetere vino impoſitum. Dentium doloribus cum aceto & teda decoctū, ſi eo colluantur, ſuccurrit: rotundos ventris lumbricos expellit ex aqua vmbilico illitum: tritum autem & in linteo ligatum & olfactum catarrho laborantes

Li.20. c.17.

Li.7. simpl.

Fol.329.

laborantes adiuuat. Pluribus diebus potum vrinam, menses, & lac prouocat: difficultatem spirandi cum vino potum. Finit (Andr. lac legit in antiquo codice, *ωνόμῳ δὲ πλείους ἡμέρας, ἐμμηνα, καὶ ὕδα, καὶ γάλα, ἔλμυνθας ἀγῶ. πάντ' δὲ καὶ δύσπνοιαν μετὰ νίτρος ποθεῖν*). Idest, Potum autem pluribus diebus, menses, vrinam, lac & lumbricos educit: quod si bibatur cum nitro, sedat respirationem difficilem) Phalangiorum morsibus drachmæ pondere cum aqua haustum auxiliatur: suffitu serpentes fugantur. Tradunt largiùs potum enecare. Eadem ferè Plinius tradidit. Gith ex Græcis alij Melanthium, alij Melanspermum vocant. Optimum quàm excitatissimi odoris, & quàm nigerrimum. Medetur serpentium plagis & scorpionum. Illini ex aceto & melle reperio, incensoq; serpentes fugari. Bibitur drachma contra araneos. Destillationem narium discutit tusum in linteolo olfactum. Capitis dolores illitum ex aceto, & infusum naribus mitigat. Cum irio oculorum epiphoras & tumores lenit: dentium dolores coctum cum aceto. Ulcera oris tritum & commanducatum. Lepras & lentigines ex aceto tritum emendat: difficultates spirandi addito vino potum: duritias tumoresq; veteres, & suppuraciones illitum. Lac mulierum auget continuis diebus sumptum. Colligitur succus vt hyoscyami. Oculos purgat, vrinam & menses ciet. Similiter largiùs venenum est, quod miremur, cum semen gratissimè panes etiam condiat. Quinimò linteolo alligatis tantum granis triginta, secundas trahi reperio. Aiunt & clavis in pedibus mederi tritum in vrina: culices suffitu necare, item muscas. Galenus eius temperamentum & vires accuratiùs distinxit his verbis. Melanthium excalfacit & desiccatur tertio ordine. Videtur etiam tenuium esse partium: hoc enim nomine catarrhos sanat in linteo admotum, atque assiduè olfactum. Quinetiam si intrò in corpus sumatur, vel maximè flatu extinguit: vnde constat ipsum essentia esse tenuis, & ad vnguem à caliditate elaboratæ: propterea sanè etiam amarum est. Itaque mirum non est si lumbricos interimat, non esum modo, sed etiam foris impositum. Neque sanè etiam mirandum si lepras, clauos, myrmecias eiiciat. Sic verò etiam orthopnoeam iuuat, & menses prouocat, qui ob crassitudinem aut viscedinem retenti fuerint. In summa vbi incisione, extersione, desiccatione, excalfactione est opus, præstantissimum id remedium est. Hæc Galenus. Symeon Sethi his addit, si cum melle fermentetur, & ex calida aqua hauriatur, calculos in renibus & vesica minuere, vrinam ciere, menses ducere, & veluti remedium contra venena esse, si quis ipsum ieiunus assumat. Scribit Petrus Pe. Melanthij semen pingue oleo efficacissimo reddendo aptum quo puerperæ mulierculæ excludendo partui, atque symptomati histerico propellendo multum vtuntur, vocitantq; vulgi persuasione Nardinum, nempe odoris suauitate & efficacia haud dispari. Istud oleum prælis expressunt, nigro, sed limpidò colore, pauca quantitate haustum splenis tumores duritiesq; demollitur, sicq; foris illitum. Citrina Nigella Itali multum vtuntur etiam in condimenta, in placentas, sinapiq; addunt. Siluestrium seminum nullus vsus, quia meliorum copia suppetit.

LYCHNIS.

CAP. XII.

Nomina



VAM Græci Lychnida vocant, Gaza Lucernulam vertit, Athenæi interpretes modo Ballariam, modo Genicularem, alij Vallariā. Hæc multis aliis nominibus tamen inter notha relatis nuncupatur, ἀθάνατος enim dicitur, idest, immortalis, quod diutius venustatem suam retineat: item ἀκυλόνιον, βαλλάριον, γερανοπόδιον, idest, gruis pes, κορύμβιον, & hanc esse corymben Ruellius esse iudicat, cuius Columella hoc senario meminit.

Lib.3. c.37.
Lib.10.

Nunc veniat quamuis oculis inimica corymbe.

Coronis enim inserta igneo micans aspectu oculorum aciem obtundit. Iam & Lychnis

Lychnis ista Taurion dicitur. Alia tamen, inquit idem Ruellius, quæ Taura, siue Tora vulgò dicitur venenata herba est. Nominatur præterea & σκῆπτρον, item μαλδίον. Dioscorides Lychnides duas breuiter perstrinxit, & σφαιρωμαλίκην, idest, coronariam, & ἀγρίαν, idest, siluestrem. Herbarij plures adnumerant, omnes à floribus flammeo colore, lucidave, aut sanguinea purpura fulgentibus, quasi lucidos luculentosve flores dicas, vel quod tomentosis earum foliis veteres ad lucernarum usum pro ellychniis vterentur, λύχνος enim lucernam, & ἐλλύχνιον lucernæ funiculum significat. Lychnis sativa siue coronaria, Ocellus, Gallis *Oeillet* dicitur, & *Oeillet Dieu*, Parisiis *Passerofes*, Germanis *Frunuenroszlin*, *Marienroszlin*, & *Himmelroszlin*, idest, dominarum rosa, mariana rosa, Cæli rosa, & cæli flos, Belgicè *Christus ooghen*, idest, oculus Christi. Lychnis silvestris, Gallis *Oeillet sauvage*, Germanis *Margenroszlin*, & *Vuildemargenroszlin*, Belgis *Ienettekens*. De utraque Lychnide succinctè hæc Dioscorides. Lychnis coronaria flos est leucoio similis, sed purpureus, qui in corollas necitur. Lychnis silvestris sativæ prorsus similis est. Plinius de rosa tractās,

Lib. 3. c. 97.
Genera.

Lib. 3. c. 98.

Lib. 21. c. 4.

LYCHNIS Coronaria,
Matthioli.



Cap. II.

Forma.

Est & quæ Græca, inquit, appellatur à nostris, à Græcis Lychnis, nō nisi in humidis locis proveniens, nec vnquam excedens quinque folia, violæ magnitudine, odore nullo. Idē aliquanto post de floribus singulorum anni temporum agens, inter æstivos flores Lychnida recenset ex Theophrasto, ut initio diximus. Ex hac Lychnidis cum rosæ & violæ floribus collatione, peritorum herbariorum cōsensu Lychnides veræ sunt, quas hīc pinximus. Ex his sativa caules profert cubitales, teretes, canos & lanuginosos, geniculatos, ramosos, folia oblonga, magnitudine foliorum leucoij vel salviæ, flaccida, incana, tomentosa, uti Æthiopis in singulis cauliculis & ramulorum summitatibus: flores emicant ex calicibus crenatis, Pseudomelanthij emulis, aspectu pulchri, sed inodori, violæ matronalis floribus maiores, rosea purpura rutili atque nitore splendentes, oculorumq; aciem interdum præstringētes Pyropi, aut Lychnidis lapidis modo, vnde nomen utrique cōmune fuit, ex quibus sæpius, rariùs ex senis foliolis congesti, in quorum medio apices sunt acuti & pungentes. Radix longiuscu-

la, tenuis, fibrata. Reperitur etiam in hortis cui flores candicant, aut dilutè rubent, sed rariùs, & illic neglectæ. Sed illa, ut omnium pulcherrima, inquit Pena, ita sedulo colitur sola, ideoq; flores adeò confertos & multiplices fert, ut postea semine orba sit, exhausta nimirum formæ vi, & pabulo in florum cōmodum absumpto, ut de viola Martia diximus. Sunt qui hanc Lychnidem, διὸς ἄνθος, idest, Iouis florē esse credant, qui facilè Theophrasti auctoritate refelluntur, inter æstivos flores separatim Lychnida & διὸς ἄνθος recensentis, quod & facit Plinius eadē Theophrasti verba referens. Lychnis silvestris geniculatis caulibus, foliisque mollibus supradictæ Lychnidi satis similis est, minùs tamen cana & lanuginosa, foliis item angustioribus, & caulibus gracilioribus, tenerioribusq; ac magis furculosis: floribus etiam minoribus, candidis, aut rubentibus, magis infectis, nullis in medio apicibus, calicibus tamē maioribus, rotundis, hirsutis, alioqui similibus: radix longa est, & digiti

Locus.

Lib. 6. hist.
cap. 7.
Li. 21. ca. 11.

LYCHNIS Siluestr.
purpurea, Dodon.

Lib. 3. ca. 9.
hist.



Locus. planta plurimùm differt. Siluestris duæ priores iuxta pratorum aruorumq; margines, & iuxta fatorum sepes exeunt. Transuectæ verò vtriusque in hortos cultu,

Fol. 142.

LYCHNIS Multiflora
Anglica, Pena.



& digiti sæpè crassitudine. Huic alia prorsus similis est, auctore Dodonæo, atque eadem foret, nisi minor esset, & radix breuior, flores semper purpurei. Istam Lichnidem, ocinoides purpureū multi esse putant: superiorē item Ocinoïdes album. Alia Lychnis siluestris ex Dalechampiō hīc proponitur nō ei dissimilis, quæ post hac tertia Clusij est, radice breui, candicante, modicè fibrata, foliis circa radicem multis, in orbem humi stratis, oblongis, angustis, acuminatis, nigricantibus, lanuginosis, plantaginis minoris propemodum figura, caule nunc singulari, nunc multiplici, palmum alto, nodoso, villoso, foliis per caulem semper geminis, pari interuallo exeuntibus, gustu fatuis, & subausteris, flore Lychnidis satius minore, purpureo, semine copioso in folliculis turbinatis, qui multis lineis virgati sunt, & lacteo viridiq; colore distincti. A Lychnide siluestri purpurea Dodonæi, quod ocinoides purpureum multi esse autumant, hæc

inquit Pena, flores adeò fœtura luxuriant, vt maximū Africanū florem, vel rosam æquent, vel superent. Lychnidem aliam siluestre ex Mycono hīc proponimus, quæ radice est fibrata, palmum longa, nigricans, neruū intus habens, in profundum acta, sapore dulci cum adstrictione. Ex ea ramulos fundit multos, rotundos, villosos, incanos, vix palmum excedentes, in quibus folia angusta, pilosa, incana, per cauliculos incerto ordine distributa, leuiter adstringentia in summo caulium vertice flores exeunt campanellæ similes, quales in conuoluulo, rotundi, ex candido nonnihil purpurei. In montibus & locis maximè siccis prouenire Myconus ait, nec alibi à se visam quàm in montibus D. Mariæ à Monteferrato. Floret Maio mense. Lychnidis speciem idem Myconus appellauit à foliorum figura, & florum quadam similitudine: quamquam non tam calida sit ac reliquæ Lychnides à Dioscoride & Galeno explicatæ. Sunt plures Dodonæo Lychnides siluestris, præter quas aliquot alias obseruauit Clusius, quas ex eodem

describemus. Prima geniculatos habet cauliculos, in multas calas diuisos, pedales aut maiores: folia in singulis geniculis bina, ternave, interdum plura, angustiora quàm reliquarum, in virore candicantia & quasi cæsia: flores in summis ramulis, ex quinis, non pluribus foliis bisulcis congestos, interiore parte candidos, exteriorē purpurascētes aliquantulum, & antequam omnino tabescant, sese contrahentes & circumuoluentes: calices duros admodum, breues & subrotundos, semen paruum,

LYCHNIDIS Siluestris
species, Myconi.

LYCHNIS Siluestr. I. Clusij
Behen album & almontinū.



LYCHNIS Siluestr. alte. Clusij,
Papauer pumū quorundam.



paruum, rotundum papaueris rhæadis, sed cinereum continentes: radicem satis crassam, candidam, multifidam, sed non perennem. Altera caulibus est superiore crassioribus, rotundis atque etiam genicularis: foliis per genicula semper binis, ordine dispositis, superioribus colore similibus, sed multò maioribus: floribus pluribus in umbella congestis, pulchris, rubris, quinquepartitò etiam diuisis, non tamen bisulcis, semen in vasculis tenerioribus superiori simile continetur: radix crassior est, magisq; fibrosa, hyeme tamen vt illa perit. Tertiae caulis est geniculatus, sed paucioribus alis concavus: folia etiam bina ex singulis geniculis prodeunt, sed superioribus magis virentia, & firmiora, flos in singulis alis, secundæ similis ferè, sed maior & obsoletioris coloris, cuius etiam foliola bifida sunt: calix crassior quàm in superioribus, tunica siue membrana dura & valde striata tegitur, cinerei coloris, in quo semen cinereum reliquis maius: radix est singularis, non admodum fibrosa, quæ etiam hyeme perit. Quarta ex singulis geniculis pe-

dales ramos profert, geniculatos, folia priori ferè similia, sed aliquantulum latiora, & intenso virore ferè nigricantia: flores ex quinque etiam foliolis constantes, rubentes: semen in caliculis simile superioribus, sed minus & subnigrum: radix crassior secundæ similis, hyeme etiam perit. Quinta multi caules ex vna radice pro-

LYCHNIS Siluestr. III. Clusij
Cauliculis striatis.

LYCHNIS Siluestris
III. Clusij.



LYCHNIS Siluestris
V. Clusij. Hirta Leb.



deunt etiam geniculati & rotundi, sed lanuginosi, longiores, infirmiores, & in terram procumbētes: folia in singulis bina, oblonga, mollia, & lanugine quadam canescentia, inter quæ flores alternatim secundum ramulorum longitudinem enascuntur, superioribus forma similes, sed maiores & dilutiore colore rubescētes: semen in valuulis superioribus simile, subrufum: radix crassa, & fibrosa. Sexta omnium minima, cauliculo assurgit circiter palmum alto, geniculato, tenui, lanuginoso: foliis ad singula genicula binis, oblongiusculis, exiguis, lanuginosis: flores inordinati, & alternatim ex singulis geniculis prodeunt, parui & pulcherrimo rubro colore purpurascētes, & caliculo oblongo lanuginosoq; insidentes: radix tenuis & inutilis. Nascuntur sponte quatuor priores in aruis, & inter segetes pingui solo, plerisq; castellæ veteris locis. Belgij in hortis florent à mense Maio in Autumnum vsque. Omnes cum adoleuerint, lento quodam & glutinoso humore superiore parte illitæ videntur: quarta maximè, cui plerumque culices, muscæ & for-

mica tanquam visco captæ adhærent. Quinta in marginibus quorundam agrorum istic inuenitur: floretq; quo reliquæ tempore. Sexta collibus Salmanticæ vicinis inter saxa prouenit, & Maio mense floret. Duas priores Salmaticenses Behen appellabant, albū videlicet & rubrum, tertiā ocimoides. Sed omnes ad Lychnidis siluestris

LYCHNIS *Siluestris*
minima, V l. Clusij.

florent. Lychnidis sativæ semen, auctore Dioscoride, cum vino potum à scorpione ictis auxiliatur. Siluestris semen duarum drachmarum pondere potum biliosa per alium ducit, ictis à scorpione conuenit. Aiunt huius herbæ appositu scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi. Galenus Lychnidis coronariæ semen scribit calidum esse secundo quodammodo ordine, aut iam etiam tertio, siccum sanè eodem modo.

siluestris genus commodius referri posse Clusius existimat, cui valde similes sunt, notisq; ferè omnibus conueniunt. Sunt qui alteram & quartam inter Armerios flores numerant: semen tamè Lychnidi simile & minimè planū, aliāq; notæ eorum sententiam conuellunt. Quinta Lychnidi Myconi satis similis. Sexta ad Saponariam nostram minorem satis accedit, de qua paulò post dicemus. Hæc ex Clusio. Lobellius Lychnidem siluestrē alteram incanam cauliculis striatis pictura hac expressit. Papauer spumeum quorundam. Dodrantalis est herbula, Lychnidi marinæ facie proxima, (nusquā nisi in Galloprovinciæ & Italiæ campatribus & vinetis se reperisse ait) quinis & senis sesquipalmaribus ramulis & foliorum gemino positu, effigie & hortu, humile Nigellastrum apprimè refert, sed quini striati confertim stipati semen claudentes florum caliculi, Lychnidis marinæ. Vniuersa planta albicat, gustu præsicco, & nonnihil calido. Videtur quarta esse Clusij suprà descripta. Siluestres plurima æstatis parte, & in autumnum vsque

Tempus.

Vires.

Lib. 3. c. 98.

Li. 7. simpl.

FLOS CONSTANTINOPOLITANVS.

CAP. XIII.

LYCHNIDIS generibus, est planta illa Chalcedonica miniata, siue Constantinopolitana, quam Constantinopolitanum florem vocant, alij Hierosolomitana, alij Creticum: cui caules sunt multi, bicubitales, graciles, teneri, geniculati, asperi, ex singulis geniculis folia bina, neruosa, alarum instar caulem amplectentia, in acutum desinentia, latiora propè caulem, nullo pediculo subuecta, oblonga, quodatenus Lychnidis siluestris, sed nonnihil viridiora, hirsutiora, asperiora, flores in latis umbellis multi simul congesti, quinque bifidis foliolis constantes, colore floris calendulæ, vel lilij purpurei, aut cocci, sed viuidiore, aspectu pulcherrimi, cæterum inodori, adeò vt quemadmodum multi alij coronarij, florū voluptate duntaxat arrideant, & merito Lychnis omnium pulcherrima sit habenda: Semen in oblongis & acuminatis vasculis exiguum, & nigrum: radices oblongæ, in radículas multas diuisæ, gustu aliquantum acres. Peregrinus est flos, qui scribitur in hortis. Iunio & Iulio mensibus floret altero à satione anno. Esse & huius alteram & minorem speciem refert Dodo. cubitalem aut paulò altiore, rarioribus floribus, quæ primo anno flores profert, Gesnero teste. Hæc plantā struthium siue

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

De flo. c. 21

FLOS Constantinopolitanus.



lanariam, Arabum *Condifi* non esse (id quod tamen nonnullis visum fuit) demonstrant Theophrastus & Plinius, qui struthium spinosam siue aculeatam esse stirpem tradunt, qualis huius floris stirps non est, neque isti radix magna, nec oleæ folia vti struthio sunt. Lanæ tamen expurgat saponariæ ritu. Dodonæus in eorum sententiam inclinare videtur, qui florē hunc *ωθον* veteribus dictum esse suspicantur, quod *ωθον* florem Theophrastus, Plinius, Athenæus inter æstiuos recenseant, duorumq; esse generum referant, vnum hyacintho similem, alterum *ἀρχεω*, idest, non coloratum siue candidum. Constantinopolitanus autem æstiuis mensibus floret, & colore vel hyacinthum quem purpureum lilium vocant, proximè refert, vel candidus est. Quæ magnam floris Constantinopolitani cum potho similitudinem ostendunt.

AQUILEGIA. CAP. XIII.

Nomina

Forma.



AQUILEGIA, Aquileia & Aquilina recentioribus dicitur, veteribus ignota, alioqui coronaria illis futura. Est enim nō vulgari nec inuenusta florū elegātia, Gallis *Ancolye*, Germanis *Agley*, & *Ageley*, quibusdam Columbina. Aquilegia folia fert ampla, lata, chelidoniij maioris, paulo tamen rotundiora, duabus tribusve incisuris, toto reliquo ambitu crenata,

AQUILEGIA, siue Aquilina.



candidiora, & veluti ex viridi cærulea, quæ vulnerata, nec luteum, nec vllum alium succum emittunt: caulem cubitalem, tenuem, rubentem & leuiter hirsutum, in cuius & surculorum verticibus flores erumpunt, qui duplici foliorum genere constant, quinis videlicet foliolis paruis & angustis, in stellæ modum radiatis, & quinis aliis ex inferiore parte, vt in consolida regia, corniculis cauis, sursum reflexis, gracilitate ceruicem & rostella columbarum referentibus, vnde Columbinæ nomen: quod de simplicibus intèllige. Nām in hortis culta hæc stirps multò pluribus densioribus & nitidioribus, corniculis: flores multiplices stipantur, colore aliàs albi, aliàs purpurei, aliàs cærulei, aliàs rubentes, nonnunquam varij, & cæruleo candidoq; permixtis relucētes exeuntibus è medio staminibus, à quibus parui apices dependent: siliquæ recurvæ vt in melanthio, coniunctæ post singulos flores surgunt, in quibus semen paruum, nigrum & lucidum: radices subsunt crassæ fibratæ viuaces. Eandem cum

cum multiplici hortensi Aquilinam Lobellius pictam dedit, plenis & multiplis aspectu suauissimis floribus inuersis. Frigidiusculos meridionalium tractus amat, inquit Pena, pratensis etiam est Franciæ & Angliæ, sed squallidior, minusq; hilari aspectu non culta. In Germania teste Dodonæo, & alibi in apricis collibus, siluosis montibus, & pinguibus pratis gignitur. In Belgij & Galliæ hortis plurima. Maio & Iunio mensibus flores vigent. Scribit Tragus semen drachmæ pondere cum croci obolo in vino potū iocinoris obstructione & morbo regio laborantibus vtiliter dari, sed eum qui assumpsit, diligenter opertum in lecto sudare oportere. Petrus Pe semen hoc gustu esse tantillum astringente, temperatæ ex calore siccitatis, ideoq; ad faucium, pharyngis, & tracheæ incendium & vlcuscula eo vul-

Locus.
Fol. 339.

Tempus.
Li. 2. c. 42.
Vires.

AQVILINA, Plenis & multiplis floribus, Lob.

AQVILEGIA Minor, Dalechamp.



gus vti. Multi Aquilegiam hanc Theophrasti *διὸς ἄνθος* esse putant, idest, Iouis florem. Aquilegia minor ex Dalechampio hîc exhibetur, radicibus multis, tenuibus, candidis, tenerrimis ac maximè fragilibus. foliis Aquilegiæ, minoribus, supra terram parum extantibus, densis, cauliculis exilibus, quaternorum digitorum altitudine, flore violæ, candido, suauissimi iucundissimiq; odoris. In vmbrosis, nemonum recessibus, ad primum fauonij flatum cum hyacinthis inter saxa & lapides ineunte vere prouenit, vt haud procul Gratianopoli, in querceto qua itur Herbesum Episcopi Gratianopolitani arcem.

Forma.

Locus.

SAPONARIA.

CAP. XV.



VLGVS Saponariam vocat herbam hanc ab extergendi potestate, qua Saponis ritu pannos eluit purgatq; , nihilominus in coronariis habenda, ob floris tum suauissimum odorem, tum summam pulchritudinem. Virgas fert multas, teretes, graciles, glabras, crebrò genicu-

Forma.

latas cubitales, & sesquicubitales: folia lata, venosa, crassa, pingua, cruciatę aut plantaginis latifolia foliis similia, è singulis geniculis bina, deorsu reflexa: flores in summo cauliculorum, & circa superiora genicula multi, odorati, colore alias pulchro roseo rubētes, aliàs dilutę purascentes, aut candidi, qui ex oblongis & teretibus cauliculis Lychnidis modo, aut floris Cōstātinopolitani exeūt, ex quinque foliolis cōpositi, è quorum medio exigua quādā stamina: radices crassę, longę, obliquę serpentes, quibus fibrę quādam adhærent. Secus herbidas annuum conualles, & depressos vdorum apricorum margines fruticat. Colitur in hortis regionum Septentrionalium, vbi non perinde sponte obuia fit, in quibus diutius durat. Iunio & Iulio mensibus floret. Hęc saponaria calida est & sicca temperie, facultate autem abstergerendi non exigua prędita, à qua etsi Saponaria hęc & quādam alię struthia vocari possint à verbo $\sigma\pi\sigma\theta\iota\zeta\epsilon\iota\varsigma$, quod Gręcis lanas purgare & candidas facere significet, tamen nostram Saponariam antiquorum struthium non esse,

Locus.

Tempus.

Temper.

& Vires

SAPONARIA

Maior.



PSEVDOSTRUTHIVM,

Matthiol.



Lib. 6. hist.
ca. 3.
Li. 19. ca. 3.

neque Arabum *Condisi*, tum ex Theophrasto & Plinio liquet, quemadmodum supra ostendimus, ex iis quę sequuntur. Struthium Gręcorum, Latinorum Radix siue radícula: in Syria vbiuis colitur, ideoq; Columella Syriacam radicem, ac eius semen Syrium vocat, Gaza Lanariam herbam. Gignitur & ibidem sponte in asperis & saxosis locis. Radix magna, gustu acris & feruida sternutationes irritat. Folium oleę, spinosum: caulis lanuginosus, tenuis, ferulaceus, indigenarum cibus expetitur, tingens quidquid sit cum quo decoquitur: flos aspectu grarus, inodorus, æstate prodit. Carere semine Plinius tradit. Semen edere Columella testatur hoc versu in Horto,

Iam Sifer: à Sirioque venit quę semine radix.

Ac rursus cap. 3. II. cum præcipit Rapi, Napi, Radicis Syriacę Februario semen obrui, si æstius fructus expectetur. Serapio ex Dioscoride refert Struthij radicem esse

esse acrem, longam, & teretem, quæ in nostris exemplaribus desiderantur. Arabes *Condēs*, *Condifum*, & *Aslengi* nominant. Bellunenſis radicem eſſe ſcribit, planta foliis ſpinoſæ carduorum modo, craſſitie pollicis, intus ſubſtāuam, nigram foris, odore & guſtu acrem: eius decocto lanæ, laneoſque pannos ſordidos abſtergi Damascenos ſeplariarios eius decoctum immiſcere confectionibus paratis è melle ac ſapa, idque candoris tantum conciliare, vt ex Amylo & ſaccarho puriſſimo conſtare videantur: quinetiam ſic durare, vt tenaciores ſint, & vix morſu diuellantur. Conſtat eius radice in globos coacta ſyros veſtium, linteorum, induſiorum ſordes ac inquinamenta eluere, ſaponis aut lixiuij modo. Ab hoc igitur Struthio ſiue Arabum condifo Saponaria tum facultatibus, tum notis multis

STRUTHIVM,
Fuchſij.



SAPONARIA Minor,
Dalechampij.



differt: eam tamen Fuchſius pro Struthio depinxit. Saponariam aliam à quadam ſimilitudine cum ſuperiore hîc depictam facit Dalechampius, & minorem cognominat, quæ in aſperis & ſaxoſis fruticat, radice craſſa, longa, nodosa, brachiata, è ruſo nigricante, ramulis multis, amplum terræ ſpatium occupantibus, gracilibus, nodosis, prolixitate ſua & copia terram operientibus, foliis ad geniculorum interſtitia prodeuntibus, aſinæ ſimilibus, acutioribus, villoſis, flore violæ aut ſaponariæ, puniceo, numeroſo, procul intuenti nitente, ſemine copioſo in vaſculis oblongis, ocimoidis minoris figura, floret Maio mēſe. Totius plantæ ſapor amarus eſt.

Cap. 299.
hiſtor.
Forma.

Nomina



INTER stirpes quarum flores calathi siue campanulæ effigiem expriment, nulla sanè est quam hæc coloris venustate non superet, quæq; iustiore de causa inter coronarias sit habēda, Calathiana viola Plinio dicta peritorum herbariorum sententia, & viola autumnalis, Gallis

Lib. 2. hist. c. 151.

CALATHIANA, Viola.

In c. 3. lib. 3.

Forma.

Lib. 21. c. 6.

CALATHIANA Verna,
Dalechamp.

violette d'automne, Germanis *Blauvulielieken*, id est, cæruleū lilium. Cordi Pneumonante, quam à Germanis *Lungenblumen* vocari refert. Eadem Ananienſibus vulgò *Pettimborsa* vocatur, Matthiolo teste, cum *Mettimborsa* dicere debuissent, quod tot viribus polleat, vt non aliter quàm gemma crumenis sit asseruāda, aut quod tot viribus præſtet, vt ex eius vſu medici auri & argenti copiam in crumenis reportent. Eam is graphicè depinxit, & gentianæ minoris speciē facit, gentianam minimam appellans. Caules edit dodrantes, tenues, geniculatos, folia oblonga, angusta, bina ex aduerſo ſita, ex quorum ſinubus, idq; in verticibus cauliculorum, ſpecioſi flores exeunt, longi, caui retroflexi, ſuſum hiantes, inferius anguſti, ſuperius latiuſculi, calathi ſeu campanulæ ſpecie, in cæruleo ſaturato purpurei, alicubi candidi, duobus tribuſve ſtaminibus candidis: ſemen exiguum in rotundis & oblongis capitulis. Radices tenues, longæ, numeroſæ, & in plures diuiſæ. In totum verò ſine odore, inquit Plinius, minutòque fo-

CAMPANULA,
Pratenſis.

lio calathiana, munus autumnī, ceteræ veris. Nascitur campestribus vliginosissq; *Locus.*
 locis, & in pratis, atque etiam in excelsorum montium siluis carentium, opacis, ac
 meridionali sole non illustratis partibus, sine Augusti mensis & Septembris flor- *Tempus.*
 ret. Calathiana viola calida est, gentianæ cuius species videtur, facultate quodam-
 modò similis, multò tamen imbecillior. Recentiores efficacem esse aiunt aduer- *Temp. &*
 sus pestilentes morbos, & ad virulentorum animalium morsus & ictus. Huic iun- *Vires.*
 ginus ex Dalechampsio istam, quæ calathiana verna iure dici debet, siue Thylaci- *Calathia-*
 tis, à floris figura, *θύλακον*, id est, saccum culeum, folliculūve referente. In pratis *na alia, seu*
 editissimorum iugorum iuræ montis prouenit, radice breui, gracili, candida, pa- *Thylacitis.*
 rum fibrata, caule singulari, palmum alto, nodoso, foliis paucis, centaurio minori *Locus.*
 similibus, paulò longioribus, binis semper caulem ex aduerso complectentibus, ve-
 luti cauo alarum sinu anagallidis modo, ex interiore sinu pediculus vnus, inter-
 dum geminus prodit, florē sustinens, calathio vel folliculo similem, è caruleo pur-
 purascentem, albis intrus staminibus, floret Maio & Iunio mensibus. Ad idem ge-
 nus referenda Campanula pratensis, in pratis & riguis locis proueniens, radice bre-
 ui in fibras multas diuisa, è luteo subfusca. Cauliculis multis fruticat, pedalibus: fo-
 lia longa & angusta ex iis prodeunt, ex aduerso inter sese ordine disposita, alarum
 modo explicata, quod in aliis Campanulæ generibus non conspicitur: flos purpe-
 reus violaceus in caulium vertice micat, sæpius simplex & vnicus, interdum gemi-
 nus, aliis campanulis similis: sapor vt & in aliis egregiè amarus.

MARIANA VIOLA CAP. XVII.

BELGAE plantam hanc violam marianam, vulgò *Mariettes* appellāt, *Nomina*
 & *Violettes de marie*, quod illi muneri, inquit Pena, elegantiae florum *fol. 137.*
 causa, primi dederunt Mariæ Hungaricæ heroinæ illi bellicis facino- *In Hort.*
 ribus nobilitate: vel, vt scribit Gesnerus, hoc nomine recenti sic nun-
 cupata est, à Diua virgine propter pulchritudinem floris confecto, folia primū
VIOLA Mariana,
Medium Dioscoridis.



habet longa, lata, aspera nonnihil hirsuta, vul- *Forma.*
 garis buglosi foliis nigriora, minora, minúsque
 aspera. Caules deinde profert secundo anno
 culta in hortis rotundos, rectos, ramosos, ali-
 quantum etiam hirsutos, circa quos folia simi-
 lia, sed minora, flores in summis virgis erum-
 punt oblongi, caui, venusti & suaues per oras
 incisuris quinque diuisi, colore sæpius ex caru-
 leo purpurei, nonnunquam candicantes, in qui-
 bus duo triūve stamina candida, hi priusquam
 dehiscant quinquangulares sunt, subnascuntur
 capitula rotunda, breuia, aspera, quinque etiam
 angulis constantia, concaua, superiore parte
 latiora & retusa, in quorum medio semen con-
 cluditur exiguum, colore castaneæ, radices sunt
 longæ, crassæ, candidæ, obliquas radículas spar-
 gentes, non ingrati saporis. Nasci in aridis, sa-
 xosis, & opacis locis testatur Matth. calidio-
 ribus Italia, & Gallia inferioris infrequens est.
 Belgæ in hortis colunt. Iunio, Iulio & Augusto
 mensibus flores producit, semen interea matu-
 rescit, neque enim simul, sed particulatim flor-
 ret. Matthiolus cum multis aliis plantam istam
 Medium

Locus.
 In cap. 8.
 lib. 4.

Tempus.

Medium Dioscoridis esse existimat, qui in vulgatis Dioscoridis & Plinij codicibus falsò folia iridis legi in describendo Medio censent, cum in aliis codicibus & Lib. 4. c. 18. Oribasio seridis folia legerent. Medion, inquit Dioscorides, in petrosis & opacis nascitur, folia habet ὅμοια σέριδι (sic legitur in veteri codice teste Andrea Lac.) id est, similia seridi, caulem tricubitalem, florem grandem, purpureum, rotundum, semen cnici, minutum, radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbam. Eadem prorsus Oribasius habet. Ex qua descriptione sic emendata, violam marianam, ut si quæ alia planta, medion referre censent, cui lectioni & sententiæ Pena lubens assentitur. Nostra enim memoria, inquit, cultu hortensi florum calathis longè speciosissimis tantam magnitudinem hæc viola assequitur, ut instar calicis aut poculi poturis voluptatis causa vinum contineant. Sunt namque nolæ oblongæ effigie, nonnullis laciniosis crenis, cærulei, aspectu venusti, interdum purpurascens, interdum dilutiores & candicantes, emergentes ab imo calice, quibus reflexis aut elapsis, in vtriculis aut florum basi rapunculo aut trachelio simili, clauduntur triquetra semina, numerosa, acetosæ colore, figura & magnitudine. Bicubitales caules toti, & alæ hirsutæ ab imo folia habent longiora, latiora, quàm Tunica, villosa, rigida minùs quàm Lycopsis aut pulmonaria vulgaris, intybi seu seridis potiùs domesticæ quàm silvestris, quæ laciniosa est. Radix autem tenera candida, esculenta, palmū longa, rapunculi similitudine, uti semen & flores, sed duplò maior, nec gustu multum dispari: siquidem in acetariis rapunculi modo esitatur. In Belgij & Angliæ siluosis frequens nascitur, sed minor & strigosior culta in hortis passim eo postea incrementi progreditur, ut longè maior, adultior, suaviórque edendo sit. Calidioribus Italiæ & Galliæ inferioris infrequens magis figura ad Medium quàm facultatibus alludit, siquidem dulcis acriusculaque est, minimèque adstringens percipitur. Dodonæus descriptioni Medij, violam marianam non admodum respondere arbitratur, ac potiùs verum Dioscoridis Rapum silvestre videri.

CAMPANVLA CÆRULEA. CAP. XVIII.

Nomina

Forma.



VLGVS Campanulam vocat, quidam *Belvedere*, quamquam ab Italo- rum *Belvedere* prorsus distet, Germani *Blauuullokxkens*, id est, cæruleam campanulam, Galli *L'herbe aux cloches bleues*. Campanula hortensis, folia promit circa radicem & imum caulem oblonga, angusta, obscure virentia, inter quæ caulis surrigitur striatus concavus, bicubitalis, tricubitalisve, circa quem folia & flores ad vertices in singulis pediculis singuli, similes, sed maiores & patentiores quàm rapunculi, calathi vel cāpanulæ specie, ambitu & quasi vnico folio constantes, sexangulo, sæpius cærulei, interdum candidi, in quibus & candida aliquot stamina. Capitula succedunt rapunculi capitibus satis similia, sed parvis foraminibus peruia, in quibus semen perexiguum: radices candidæ, tenues, fibratæ. Cauliculis & foliis vulneratis lacteum succum remittit. Est huic planè similis Campanula silvestris, nisi minor omnino esset, & prima folia terræq; proxima lata essent & pauca, violæ nigræ foliis satis similia, non tamen tam magna, alia verò folia oblonga & angusta, flores similes, cærulei, radices tenues. Lac quoq; hæc copiosius fundit. Campanula minor rotundifolia à Lobellio & Pena dicitur, atque ita expressa est. Prior in hortis voluptatis causa, & ad coronas seritur, altera iuxta aruorum incultos margines & sepes nascitur. Illa Iunio & Iulio mensibus floret, hæc etiam Augusto. Campanula hortensis Iasione Theophrasti videtur esse, sic enim is scribit de florum differentiis tractans. Ἐνια δὲ καὶ μονόφυλλα φύεται, διαγραφὴν ἔχοντα μόνον τῶν πλεόνων, ὥσπερ δὲ τῆς ἰασιώνης. Ἐγὰρ κεχώρισται ταύτη ἐν τῷ ἀνθεῖ τὸ φύλλον ἕκαστον, ὃ δὲ δὴ τοῦ χεῖρος (lege χωρίς) δὲ ἄνω μέρος, ἀλλ' ἐκ τῶν ἄκρων ἀποφύ


Campan. silvest.

Forma.

Locus.

Tempus.

Lib. 1. hist. cap. 21.



ἀποφύσσις γωνιώδης. Id est, nonnulli flores etiam vnico folio natura constans, de-
lineationem tantum plurium ostendentes, vt flos Iasionis. Non enim singuli flo-
res in folia diuiduntur neque sanè conceptaculi pars inferior distinguitur, sed ex
superiore parte proiecturæ angulosæ exeunt. Quæ Plinius non satis perspicuè con-

LACTESCENS *Campanula*
maior, Lobell.

uertit his verbis. Iasione vnum folium habet,
sed ita implicatum vt plura videantur. Qui-
dam legunt, Iasione vnum folium in flore ha-
bet, & cætera. Theophrastus enim non ait Ia-
siones folium implicatum esse, sed indiscretis
foliis sic designatum, vt plura videantur, quam-
uis vnicum sit, qualis figura floris est in cam-
panulis, trachelis, digitalibus, & voluuli ge-
neribus, cuius speciem esse quidam ideò suspi-
cantur, quod eodem Plinio auctore, Iasione
olus siluestre habeatur, in terra repens, cum
lacte multo, florem fert candidum, conci-
lium vocant. Sed hæc etiam campanulæ com-
petunt. Nam eius flos vnico folio absoluitur,
quamuis plurium similitudinem præferat, &
huius superior pars angulosa est, præterea olus
esse potest cum sit edulis: repunt & in terra ra-
dices, quare citissimè stirps vna propagatur.
Iam verò hortensis florem interdum candi-
dum esse diximus, siluestris verò vt horten-
sis candidum esse posse quis negauerit? Mat-
thiolus campanulam pro phyteumate pinxit,
quod id, semen, campanula verò capitula per-
forata

Lib. 21. c. 17.

Lib. 22. c. 22

In Cap. 12;
lib. 4.



CAMPANULA Lutea
Linifolia, Pena.



forata habeat. His duas alias campanulas subiungemus ex Lobellio & Pena. Prior est Campanula lactescens maior, Pyramidalis Lutetiana, quod plus aliis omnibus lactis fundat lactescens meritò dicta, cuius ima folia Solani hortensis, & Violæ martiæ media læuia, ex atro virentia, radix fibrata, Violæ marianæ, turgida lacteo succo, adeò viuaci, vt vel tâtillo frustulo infosso repullulet. Caules emittit tenues ternûm & quaternûm cubitorum, à medio summo tenus foliis angustioribus, longioribus, copiosis, floribus amœnis, ceruleis, campanulæ ceruleæ maioribus, nolas item exprimentibus cinctos, in acumen Pyramidis ritu fastigiatos, vnde Pyramidalis dicta. Belgio est hortensis nullius vsus adhuc comperti. Hæc Lobellius. Alia est Campanula Penæ, linifolia, palmaris herbula, perelegans, in deuexis montis Lupi, qua ad Septentrionem vergit, folio lini aut polygalæ: flore luteo peramœno, volubilis, maior quàm pro plantæ magnitudine. Rara est herba, & digna cognitu. Hæc Pena.

GENTIANELLAÆ.

CAP. XIX.

Nomina

Forma.



GENTIANELLA,
Minima latifolia.

ENTIANELLAS has à facie & facultatibus gentianæ similibus Dalechampus appellauit, alteram latifoliam, quæ quorundam est Helleborine siue Epipactis, alteram angustifoliam. Potest & hæc thylacitis minor dici, illa thylacitis maior, quæ radículas mittit, breues, ex albo in luteum vergentes, fibratas: cauliculos humiles, angulosos, ex vna radice multos, folia centaurij minoris, aut Anagallidis, maiora, nonnunquam gentianæ aut veratro albo in ea paruitate non absimilia, vnde Gentianellæ & elleborines nomen: florem speciosissimum, ianthinum, calathi figura, ad plantæ portionem amplum, lineis quibusdam velut æratis intus virgatum, apicibus vt in liliis, extantibus, sed purpureis, obeliscum candidum cingentibus, minutis seminibus plenum, ac eius supremum tegumentum pileo simile sustinentibus. Crescit in aridis, niuosis, perflatis, montosis. Amarissimus est totius plantæ sapor, ideoque iocinoris vitiis nempe regio morbo & obstructionibus auxiliatur, pari cum gentiana facultate, cui amaritudine non cedit. Allobroges Reperet nominant, vt & proximè describendum, aiuntque etiam nolentes pedere qui sumperint, vi efficaci ad flatus discutiendos, quod & de asinis onopordo pastis tradit



Locus.

GENTIANELLA

Angustifolia.

tradit Plinius. Gentianellæ angustifoliæ radix Lib. 27. c. 12
latius spargitur, & furculosior est, folium ob-
longum, angustum oleæ simile: flos ex oblon-
go & herbaceo calice profertur angustior &
breuior quàm in superiore, foris cæruleus, al-
bis lineis virgatus, in quinque foliola diuisus,
ambitu serrato. Cæterum idem sapor, ama-
rissimus scilicet, idem nomen, *Reperet* enim
vt superiorem vocant, eadem vis ac facultas:
ad colicos enim dolores, ad tormina, regium
morbum, cachexiam à rusticis laudatur, flo-
ret vtrâque mense Aprili. Eandem esse opi-
nor, quæ à Clusio Gentianella verna minor
nominatur, à quibusdam cantabrica.

TRACHELIVM. CAP. XX.



N IIS quoque numerandæ plan- *Nomina*
tæ hîc depictæ, quæ flores campa-
nulæ siue nola specie habent, & ob
venustatem coronis inseruntur, à

veteribus silentio prætermisâ, à recentioribus Trachelij nomine designatæ. Est
autem Trachelium Germanis *Halskraut*, id est, Ceruicaria, à ceruicibus collique
partibus vicinis, internis & externis, quibus tumefactis & vlceratis multum opitu-
latur, vnde Vuularia ab vua etiam dicitur, à Fuchsio Campanula, ob florum simi-
litudinem, qui campanam planè referunt, quibusdam Archangelica, Gallis *Gante-*
lee, vel, *Gans de nostre dame*. Est autem trachelium duplex, maius, & minus. Maius

Cap. 16.
hist.

Forma.

Dod. lib. 2.

cap. 20.

Forma.

TRACHELIVM,
Maius.

caulem profert quadrangularem, hirsutum,
rubescens: folia oblonga, hispida, rigi-
da, ad imum latiora, supernè acuta & ambi-
tu crenata, vrticæ habitu & superficie: flores,
secundum caulem calathi aut campanæ figura,
rapunculo similes, aut violæ marianæ, minores,
per ambitum quinque simpliciter incisuris, sed
profundioribus diuisos, intus aliquantulum hir-
sutos, candidos plurimum cæruleos, interdum
dilutè purpureos, in medio luteum quid pro-
minens obtinentes. In summo caulis vertice
primi flores apparent, deinceps versus imum
exoriuntur, quibus marcescentibus semen in
rotundis capitulis exiguum & cinericium pro-
uerit vt in rapunculo. Radix est candida, & va-
rie intorta. Trachelium minus caule superio-
ri simile est, sed breuiori: folia sunt longiuscu-
la, minora, candidiora, nec tam altè crenata, ra-
punculi aut saluæ, pilosa: flores pulchelli, cala-
thi aut campanulæ figura, ianthini, & dilutè
pupurei in summitate caulis exeunt, magis con-
gesti quàm in superiore, rapunculi sapore, pri-
mòque vere acerariis etiam adduntur. Trache-

TRACHELIUM,

Minus.

Locus.

Tempus.

Temp. &


Vires.

Dod. lib. 2.

cap. 20.

Fuch. 1. ca.

163.



Nomen

Lib. 30. c. 2.

CYNOCEPHALVS,

Plinij.

Locus.

Forma.



lium vtrumq; gignitur in aridioribus locis secus pratorum margines; & crebrò fenticosis locis. Seritur etiam in hortis florum gratia. Iunio, Iulio, & Augusto mensibus floret. Gustu adstringit, atque ob id exsiccandi vim illi inesse coniiciendum. Quare decoctum ipsius in aqua vnicè ad dolores & inflammationes colli & faucium internas, & ad oris exulcerationes, aliàque eiusdem mala quæ adstrictione indigent, confert. Vtilis etiam haud dubiè ad alia quævis vlcera ob insignem quam obtinent in exsiccando facultatem.

CYNOCEPHALVS.

CAP. XXII.

PLANTAM hanc cynocephalum ideò vocant herbarij, quòd seminis conceptaculum caluam canis cute & carne exutam representet, siue ea sit cynocephalia à Plinio memorata, qua ad euocandas mortuorum vmbras utebantur, ob id fortasse, quòd caput canis apud Aegyptios sanctissimi & loco numinis habiti, seminis huius plantæ locus, vt diximus, referat, ac propterea diuinam ea gens existimaret, & ad incantationes, & contra omnia veneficia valere crederet, siue alia quævis herba à veteribus non descripta. In agri Monspeliensis sepibus, dumetis, aggeribus, parietinis nascitur, radice fibrata, caulibus multis, cubitalibus, teretibus, ramosis, ex interuallis rami subiecto latiore folio è caule prodeunt, folia in furculis temerè & nullo ordine disposita, nigricantia, longa, angusta, acuminata, sed minimè pungentia: flos calathio similis aut labro, luteis seminibus plenus, sic fissus vt superior pars quasi duorum foliorum coalitum ostendens, inferiore productior appareat: color floris venustus, & in roseo candicans, qualis in maluæ & alceæ flore spectatur. Vasculo copiosum semen continetur, antrosum oblongo, retrorsum lato, duobus veluti narium foraminibus, & tanquam porrecto rostro, eaq; figura caluam canis prorsus exprimente, vnde & nomen. Quidam antirrhinum verum esse volunt.

DIGI

DIGITALIS.

CAP. XXIII.



ETERES plantæ huius non meminisse id indicio est, quod Græco Latinoque nomine destituta sit, quamobrem Fuchsius Digitalem appositè nominavit, quod digitalis, siue munimenti digiti in suendo speciem flores præbeant, Germanis *fingherbuet*, & *fingherkraut*, Gallis

Nomina

DIGITALIS, *Purpurea*.

Digitale, *Gant nostre dame*, & *Doigtier*, nonnulli campanulam siluestrem, & nolam siluestrem. Duûm est generum. Vna purpureos flores habet, quæ digitalis purpurea, altera luteos, quæ digitalis lutea nominatur. Duas alias species, addidit Dodonæus, digitalem floribus candidis, aliam floribus sublu-
teis, seu pallentibus. Vulgatissima est digitalis purpurea, folia habens longa, lata, ambitu serrata, dilutè virentia, verbasci quodammodo similia, minora tamen, minúsque lanuginosa: caulem rectum, rotundum, cubitalem, aut bicubitalem, à cuius medio sursum versus vno ex latere duntaxat eleganti serie flores multi deorsum versus dependent, calathi oblongi figura, dactylotheceis propemodum similes, ex rubro purpurei, punctis quibusdam candidis picti cælativè, quos vascula sequuntur rotunda, in quibus semen, gustu ingrato, & odore putridiusculo. Radix fibrata est, viscida, nigricans. Huius digitalis feracissimæ sunt regiones, quæ ad Aquilonem sunt: meridianis calidioribus ferè deest. Sed in Francia, Belgio, Anglia ubivis nota, in mōtibus umbrosis & saxosis locis proveniens. Seritur etiam

Genera.

Fuch.c.342

De flo.c.ii.

Forma.

Locus.

Pena

fol.245.

Tempus.

DIGITALIS *Purpurea*,
aut *alba* Lobelij.DIGITALIS,
Lutea.

Tempus. in hortis. Floret Iulio potissimum mense, deinde semen producit. Digitalis lutea
Digitalis folia habet angustiora, venosa, glabra, saturato virore nigricantia, auersa tamen
lut. parte candidiora, per ambitum nonnihil ferrata, flores luteos, forma superioribus
Forma. ferè similes. Non desunt qui digitalem verbasci speciem faciant, & *θηραλλίδα*
nominent, quæ & *λυχνίτις* dicitur. Sed Lychnitis siue Thryallis folia habet pin-
guia, crassa, & hirsuta, ad ellychnia in lucernis apta qualia minimè digitalis, quæ
tam crassa & hirsuta non habet, vt in lucernis ellychnij vice esse possint, cum per-
Temper. quàm amara sit hæc herba, calidam siccamque esse & abstergentam perspicuum
& Vires. est, ita vt vbi opus est extenuatione, absterfione, purgatione, obstructionis libera-
tione, efficax esse possit. Hodie tamen nullus huius in medicamentis est vsus. Flos
solus sola venustate & forma placet.

VINCA PERUVINCA.

CAP. XXIIII.

Nomina

V AE vulgò vinca peruinca, Officinis peruinca, Gallis *Pèruenche*,
Italīs *Prouenca*, Germanis *Ingrien*, quòd semper vireat nominatur, à
peritis herbariis ea esse existimatur quæ Dioscoridi clematis prior,
& clematis Daphnoides, aliis myrsinoides, & polygonoides di-
citur. Clematis quidem, vt & cæteræ clematides, à viticularum sobole sarment-
tosa, quæ *κλήματα* Græci vocant: Daphnoides à foliorum lauri, quam folia eius ha-
bent, figura: vinca peruinca, quòd humi serpat, & se in modum funiculi porrigat,
vicina quæque vinciens, auctore Fuchfio. Vix tamē reperias hanc viticulosis vir-
gis obuias plantas irretire. Plinius clematida Aegyptiam appellat. Alibi vincam-
peruincam, & alio nomine chamædaphnem dici tradit, quòd scilicet humilis vi-
deatur laurus, vt nomen sonat. Non est autem cur eam chamædaphnem putes, in-
quit Fuchsius, quæ Romanis Laureola aut Laurago dicta est. Hæc enim à vinca-
peruinca genere & facultatibus diuersa est, & seorsum illam chamædaphnem de-

Lib. 24. c. 15.

Lib. 21. c. 11.

Cap. 134. h.

Lib. 24. c. 15.

VINCA PERUVINCA.

Lib. 4. c. 6.

Forma.

Lib. 24. c. 25

Embl. 6.
lib. 4.

pingit Plinius, vt sit illi duplex chamædaphne, vna Dioscoridis & aliorum chamædaphne, al-
tera quam alio nomine vincamperuincam ap-
pellant. Clematis daphnoides, vt describit Dio-
scorides, sarmenta habet exigua, iunci crassitu-
dine, (*μικρά* vulgata exemplaria, Oribasius &
Paulus, alij *μακρά* legūt, id est, *λόγα*: & Plinius cle-
matidem hanc longam tenuemque dixit, quam
lectionem etiam prouerbiū approbat, quo cle-
matis Aegyptia ioco dici solebat in eos qui cor-
pore præter modum procero & gracili, atque
atro colore essent) folium paruum, lauro figura
& colore simile, sed multò minus. Plinius. Est &
alia clematis, inquit, Aegyptia cognomine, quæ
ab aliis daphnoides, ab aliis polygonoides vo-
catur: folio lauri, longa, tenuisque, aduersus ser-
pentes, ac præsertim aspides, ex aceto pota effi-
cax. Aegyptus hanc maximè gignit. Ex quibus
postremis verbis colligit Cornarius legendum
esse in Dioscoride, *φύεται ἐν αἰγύπτῳ*, id est, nasci-
tur in Aegypto, & non *φύεται ἐν εὐχρίσῳ*, vt pu-
blici Dioscoridis codices habent. Nam alio-
qui temerè repeteret Dioscorides in fine capi-
tis,

PERVINCA Maior,

Lobellij.



tis, φέται ἐν χέρσοις, id est, nascitur in terrenis incultis. Hanc plantam nostram esse vincam peruinca, etiam mulierculis notam tum facies, tum facultates testantur. Multas enim tenues, longas, teneras, flexiles, virentes viticulas humi spargit, & huc illucque serpit, folia laurea, sed minora, semper virentia, ex interuallis bina ex aduerso promit, flores cærulei ex cauliculis quinis foliolis distinguuntur, borraginis floribus quadantenus similes, sed maiores & inodori, aspectu tamen multò gratiores, idcirco in coronas præsertim hybernas adnectuntur, radix fibrata flauescit. Est & Clematis siue Peruinca maior, quæ peramœna florum duplicatione, inquit Lobellius, & incremento, coloris ex purpureo rubentis in Belgij hortis variat. Nemorosis vmbrosisq; tractibus, & senticetis, atque agrorum marginibus gaudet. Perpetuo virescit, Martio tamen & Aprili potissimum floret. Clematidis folia cum caulibus in vino pota, auctore Dioscoride, alui profluvia & dysenterias sedant, subdita in pello cum lacte & rosaceo aut cyprino

Locus.

Tempus.

Lib. 4. c. 6.

Vires &

Temper.

Lib. 7. sim.

Lib. 7.

Cap. 134. hi.

dolores vulvæ sanant. Ipsa commanducata dolorem dentium finit. Imposita venenatarum bestiarum morfibz opitulatur. Narrant & demorsis ab aspide auxiliari. Galenus eadem omnino tradit. Clematis daphnoides, quam quidam myrsinoides, alij polygonoides appellant, profluuiis alui & dysenteriiis cum vino pota prodest, dentiumque dolores mansa mitigat, tum vteri quoque doloribus in pello admota vsui est. Paulus siccandi facultati id tribuit, quod diarrhœam dysenteriamque sanet, & dentium dolores mitiget, & contra venenatorum morsus rectè imponi tradit. Easdem esse peruinca facultates gustus demonstrat: gustanti enim amara est, nonnihil calida, adstringens. Quare siccata mordicationem, & vt ex codice manuscripto citat Fuchsius, sanguinis ex naribus profluuium mirum in modum prodest: item iis qui sanguinem vomunt, aut spuunt. In summa omnem sanguinis fluxum sistere asserit. Quibus accedit pictura & descriptio eiusdem, quæ vtraque ad amussim peruinca nostræ respondent.

PRIMVLÆ VERIS.

CAP. XXV.

QUOD primo vere erumpant & floreat primulæ veris Officinis dictæ sunt, & herbæ paralytis, & Arthetica, cum arthritica dicendum esset, Gallis *Brayes de cocu*, *Prime vere*, Germanis *Schlusselflumen*, Italis *Bracche di cuculo*, & *fior di primavera*. Harum species & varietates multæ. Est enim quæ flores luteos profert, odoratos, Germanicè *Geelschlusselflumen*, *Himeschlusselfl*, & *Sanctus Peters schlusselfl*. Est & quæ pallidos in luteo, odoris expertes, Germanicè *Vuciszhimelschlusselfl*, & *Schlusselflumen*. Hæ in hortos translata & cultæ florum multiplicata foetura & magnitudine variant. His addit Dodonæus aliam, primulam veris minorem. Pena & Lobellius silvarum primulam. Primulæ veris priori folia candicant, rugosa sunt, betonica

Nomina

Genera.

Lib. 1. c. 81. fol. 244.

Forma.

PRIMULA Veris
prior, Matth.*PRIMULA Veris*
altera, Matth.

similia, sed maiora, nec ambitu incisa, digitalis purpureæ vtcunque similia, humi ferè strata, aut parum surrecta, è quibus mediis scapus erigitur tenuis, rotundus, nudus, incanus, palmaris & sesquipalmaris, in cuius nutante vertice flores è caliculis denticulatis vmbellæ instar depèdent, lutei, odorati, ceræ nouæ odorem & colorem referentes: deinde capitula, in quibus est semen. Radix candida est & fibrata. Huic similis est primula veris altera, nisi foliis esset grandioribus paulò, & latioribus, floribus iisdem, sed in album pallescentibus, aut ferè, albis, odoris nullius. Sed quæ, inquit Pena, in hortis Anglicis & Northmanicis colitur, florum maiorum proventu & fœtu multiplici, triplò aut quadruplò omnium primularum magnitudine & elegantia prima est. Hanc Lobellius sic exprefsit. Primula siluarum ex superioribus facile dignoscitur, differt enim floribus duntaxat, qui singuli languido pallore, pusilli, palmò breuiore, singulis cauliculis summis insunt, folia, sapor, odor, vsus non dissimilia. Sæpius nemorosis, & vmbrosis conuallibus gaudet, in Anglia, Delphinatu, Sabaudia, Belgis & Gallis hortensis. Eadem huic est, aut certè simillima, quæ Verbasculum minus Dodonæo dicitur, seu Primula veris minor, foliis paruis, albidis, primulæ veris alteri prorsus similibus, è quorum medio cauliculi erumpunt singuli singulos

PRIMULA Hortensis Anglica,
Lobell. & Pen.

fol. 244.

fol. 244.



gulos flores ferentes, odore, figura, colore eidē Primulæ similes. Aliam Primulam silvarum Lobellius ostendit, floribus obscure virētibz, fimbriatis, rugosisq; plicis, Londini hortis frequentē, alioqui cæteris similem. His inferenda ex Lobel. Primula veris flore gemino, altero alteri innato. Præterea silvarum Primula veris flore specioso, multiplici, à Lobelio etiam depicta. Dioscorides verbasci differentiis quem φλόμων Græci vocant, subiicit. Sunt (inquit) & phlomides duæ hirsutæ, rotundis foliis, similes: quas Ruellius Primulas veris putauit. Ruellij iudicium sequuntur, Dodonæus & Fuchsius,

Lib. 4. c. 99
 Lib. 3. c. 12.
 Lib. 1. ca. 81.
 Cap. 326.
 hist.

SILVARVM *Primula floris*
obscuri, Lobellij.

SILVARVM *Primula veris*,
flore multiplici.



quibus Matthiolus haudquaquam assentitur, quod istarum Primularum folia non sint hirsuta, inquit, nec etiam rotunda, sed alteri lævia, alteri crispa, lactuæ aut dipsaci modo. Adde quod florum quos phlomides proferunt, neque Dioscorides, neque veterum ullus meminit, qui verbasci genera recensent, id quod in herba paralyfi Dioscorides non prætermisisset, cum hæc omnium prima aureis floribus emicet, verq; nouum nuntiet. At harum omnium folia, inquit Pena, cum sint ambitu rotundiore quàm maioris verbasci, & caulis nonnullarū foliaq; sint hirsuta, cur neget ille phlomidæ esse? Certè vires & tota facies planè thapsi contra suadent, consensuq; experimenti apud omnes regiones, quæ modo vnâ quampiâ harum habeant, paralyfis herbam vocant, quo nomine propter insignes facultates fuit etiam phlomis donatus. Igitur & hæc phlomides. Ea quæ luteos flores habet gustu non ingrato, in olere, placentulis, & acetariis admodū vtilis capiti, nervis, & humorum ex decubitu putredini, aut inflammationi, eoq; vulnerariâ habetur. Hæc ex Pena. Verisimile est quod arbitrantur quidam hanc plantam esse verbascum sylvestre, ex Theophrasto memotatum ab Athenæo, lib. 15. inter flores vernos, vt Anemonen montanam, Anemonen pratensem, Herculis flammam, & Lychnida, quam interpretes genicularem vertit. Recentiores, inquit Fuchsius, verbasculis hos effectus assignant. Trita imponuntur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto vesicæ renumq; obstructions soluantur. Succus herbæ propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata, & liuentia. Quod verò hæc eadem possint, temperamentum eorundem palam docet: parum enim adstringunt: si gustaueris, amara, & modicè acria sunt, vt hoc nomine desiccandi & detergendi facultatem quam illis Galenus adscribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiam temporis herbarij calida & sicca esse statuunt. Mulieres formæ studentes, succo è floribus illorum expresso faciem illinunt, qui maculas rugasq; & alia eiusdem vitia mirificè deterget. Primulis adnumeranda, quæ Sanicula à sanandis vulneribus, quibusdam Auricula vrsi, veriùs Arthritica, vel Paralytica nominanda, Lunaria arthritica Gesneri, Britanica Anguillaræ, Paralytica Alpina Sanicula Penæ & Lobellij, maximè, inquit Pena, propter peculiarem vim ad affectum Arthriticum quæ amolitur. Amat hæc summa montium præcella, & præruptarum rupium supercilia petrosa, qualia sunt in D. Claudij cauitibus, Clauenæ & Oeniponti finitimis, vbi ferè totam æstatem perennat nix, qua inuita exacto verè mittit in singulari cauliculo, flores euctos pediculo molliore & inflexo, ferè puniceos, aut ex roseo albicantes, visum exhilarantes, suauiterq; spirantes: folia albida, virentia, crassiuscula, carnosa, & læuiora quàm Primulæ veris, nōnihil repanda, & limbo crassiore tantillum fimbriata ac circinata: radix multum fibrosa, & cognata Primulæ: gustu pariter multum exsiccatè & adstringente, vulnerariis potionibus expetitur, & foris vulnera glutinat. Hæc in montibus arduis calidarum regionum

PRIMULA Veris Pachyphyllos, siue Auricula vrsi, Matth.



cauliculos & folia emittit maiora, interdum longè minora, specie tamen aut naturaminimè diuersa. Qui hanc bene norit, sequentes duas facillè cognosceret. Prior


Paralytica

PARALYTICA Alpina
angustifolia, Lobel.

PARALYTICA Alpina
minor, siue media, Lob.



AVRICULA Urfi
Myconi.



Paralytica alpina Sanicula angustifolia maior, folia Gnaphalij mōtani longiora profert: flores multiplici fœtu umbellæ instar in pedali- bus & dodrātalibus mollioribus pediculis pur- purascētes, aut ex roseo & albo cōfusus micān- tes. Sanicula Alpina minor siue media, folio est minore, tantillum crenato, floribus nō dispa- ribus in cauliculo palmari & dodrātali: radix multum fibrata. Est & Sanicula Alpina omniū minima, vix vnciam & sesquiunciam æquans, foliis itē carnosiss, sedi folij cotyledonis mino- ribus, summis oris fimbriatis & denticulatis. Flos purpurascit. Hæc Lobellius. Diuersam ab his plantā Auriculam urfi vocauit Myconus à foliorum figura pilis multis obsitorum eamq; pinxit & delineauit his ferè verbis. Radices multas emittit tenues, ferè capillaceas, fuscas, petris inhærentes, gustu adstringentes; circa quas folia per humum repunt, borragini qua- damtenus similia, in ambitu nonnihil lacinia- ta, aspera, rugosa, crassa, neruosa, pilosa maximè prope radices: ex iis enim ad foliorū exortum magna pilorum congeries tomento cuidam &

Forma.

veluti iubæ adsimilis enascitur. Eadē folia tam supernè quàm infernè villosa sunt atque etiam in ambitu pili vbique rufescunt. Ex foliorū medio duo aut tres cau- liculi emergunt, rotundi, dodrantaes, hirsuti, solidi, succosi, purpurascētes, cum dulcedine adstringētes, in quorum fastigiis flores sunt cærulei, ex quinque folioli composit

compositi, & in horum medio stamina lutea, veluti ex vasculo grani hordei figura, sed maiore, in imo floris posito, exeuntia. Nascitur in vmbrosis montosisq; locis, nonnunquam etiam humidis. Aqua ex hac planta per organū vitreum destillata, ad frangēdum calculū siue in vesica, siue in renibus valde efficax est. Id quod Myconus vir bonus & doctus se experimento confirmasse asserit. Eadem aqua Hispani aduersus tussim vtuntur: quam ob causam plantam hanc *Terna Tussera* nuncupant: alij à foliorum copia, *Peluda*.

LILIVM CONVALLIVM.

CAP. XXVI.

Nomina **Forma.** **Locus.** **Tempus.** **Pena fol.** **Lib. 2. c. 26.** **Lib. 6. hist.** **cap. 7.** **Lib. 6. hist.** **cap. 7.** **Tempus.** **Lib. 6. hist.** **cap. 7.** **Fuchf. cap.** **ca. 88.**

LANTAE istius aspectu pulcherrimæ flores, tum odorati, tum venusti meritò inter coronarios locum sibi vendicant. Lilium conuallium à natalibus recentiores vocant, Galli *Grand muguet*, quasi *Muguet*, Germani *Meyenblumle*, & *Meyenrysz*, ab iisdem natalibus. Folia bina, aut terna promit virentia, læuia, latiuscula, lilij foliis similia, sed minora, caulem tenuem, palmarem, circa quem à medio sursum flores parui, rotundi, hiantes, per summas oras denticulati, ac reflexi. Arbuti Palmæq; flori similes, candidi & odorati, relinquentes fructus rotundos, rubentes, non dissimiles baccis asparagi, sed minores, in quibus semen durum, & subamarum: radices tenues, longæ, aliquantulum geniculatæ, repentes. In senticosis nemoribus, & vmbrosis conuallibus sponte prouenit. Hortis etiam expetitur. Circa calendas Maij mensis floret, Iulio fructus profert. Non desunt qui sentiant Lilium conuallium esse ephemerū Dioscoridis nō letale, nullis profecto ephemerī à Dioscoride descripti notis huic Lilio conuenientibus: eo tamen nomine Fuchsius id depinxit ac descripsit. Nonnullis Hemerocallidam faciunt, sed perperam. Alij putarunt esse Lilium inter spinas memoratum à Solomone, propter suauissimum odorem, etiamq; florem Lilij, qui niueus & pulchellus, Lilio similis quadātenus est, & odore suauissimus. Dodonæus vernum Theophrasti Lilium, quod statim post violā purpureā floret:

ἐνιαυτὸ τῷ ἥρως, inquit, ἀμα δὲ τῷ ἱω, ἢ μικρὸν ὑστερον τὸ κέλινον, καὶ δὲ φλόγινον, &c. Sic enim

Gaza legit. Verè nonnunquam cum viola aut paulò post Lilium exit, & viola flammea. Quidam ænanthen Theophrasti à Dioscoridis ænanthe diuersam esse censent, flore albo, racemoso, instar labruscæ, suauiter olente, quam cum Theophrastus inter vernos flores numerasset, subiungit: ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ οἰνάνθη, καὶ τὸ τῷ ἀνθικὸν μὲν, ὡς δὲ τὴν φύσιν. Sic enim legendum, vt diximus, non ὡς δὲ, vt legit Gaza. Idest, similiter ænanthe quoque ex florum genere est, suavis odoris natura. Et mox, τὸ δὲ ἀνθος βοτρυῶδες καὶ λευκὸν καὶ ἀπὲρ ἀμπέλου τῆς ἀρχίας. Idest, flos ænanthes racemosus, albus vt labruscæ. Lilij conuallium flores & fructus calidæ siccæq; qualitatis participes sunt. Aiunt flores aduersus apoplexiā, neruorū resolutiones, vertiginem, morbū comitialē, atque alios ex cerebri frigida humidaq; intemperie morbos plurimū prodesse: cor roborare, iecur, cerebrum. Hinc est quod eius herbæ succū aut decoctum syncope, vertigine, morboq; comitiali correptis, attonitis & phreniticis exhibeant



beant. Cæterum incipienti elephanto, ne latius serpat, & altius radices agat, viam præcludere scribunt. Ocularij medici ad oculorum caligines discutiendas ea etiam vtuntur. Quin & ictis & commorſis à venenatis animalibus præbent: item ægrè parturientibus. Sunt qui recentes flores vino macerent, & in vitreo vase diu infolent, additis lauandulæ, & roſinarini floribus, aliisq; nonnullis aromatis, ex quibus omnibus stillatitiam aquam vitreis organis eliciunt, qua ad ſupradictos omnes corporis affectus vtuntur.

Matthi. in
ca. 120. li. 3.

CARYOPHYLLVS INDICVS.

CAP. XXVII.

ASIMILITVDINE nostri Caryophylli altilis, flos hîc exoticus Caryophyllus Indicus appellatur, & flos Indicus, Germanis *Indianisch blumen*, & *Indianischnegelim*, idest, Indicus flos, & Indicus Caryophyllus, Gallis *Oeillet d'Inde*, cum veriùs flos Africanus Tuncetanùsve dicendus sit, aut Caltha Africana, vt Gesnerus nominat, cognomine Indici nō probato, quoniam, auctore Dodonæo, primùm ad nos allatus sit ex Africa, cùm Carolus V. Tuncetum traieciſſet: vnde Brabantis Flandriſq; vulgò *Thunisbloemē* vocatur, Punica lingua Pedua, vt tradit idem Gesnerus. Cordus Tanacetum Perunianum nuncupat, à ſimilitudine florum tanaceti, & nomine Peru Americae prouinciæ, ex qua primùm in Europam illatus eſſe à Germanis creditur. Itali Othōnam. Huius ſpecies ſunt duæ Trago, maior, & minor: Matthiolo tres, floribus tantùm diſtantes. Maiori caulis eſt procerus, bicubitalis aut tricubitalis, rectus, ſtriatus, è nigro ruſcens, nodosus ramosuſq;: è ſingulis nodis bini exeunt ſurculi, foliis denſis, reſerti, oblongis, anguſtis, per totas oras ſerratis, Tanaceti, propemodùm pennarum inſtar expaſis, & ex aduerſo ſitis, quæ ſoli aut lumini obiecta cribri modo perforata cernuntur: quamobrem Othōnam Dioſcoridis quidam eſſe coniectantur.

Nomina

De flo. c. 18.

In Hort.
Germ.
Lii. pl. c. 17.

Genera.

Li. 2. ca. 145.
In cap. 186.
lib. 4.

Forma.

CARYOPHYLLVS Indicus
maior, Matth.

CARYOPHYLLVS Indicus
minor, Matth.



Flores in ſummis ramulis ex lōgis calicibus ampli, rotundi, numeroſiore foliolorū ſtipatu cōfertiores quàm in roſa, inferiore parte pallidè lutei, ſuperiore flauo ſiue aureo

aureo colore rutilantes, luteis in medio staminibus: semen villosum, nigricans, oblongum, compressum: radices fibratæ, per summam terram vagantes. Flos Africanus minor, superiori prorsus similis est caulibus, foliis, floribus, semine, sed omnibus partibus minor, & pedem aut cubitum vix excedens: flores duplici aut triplici foliolorum ordine saturè flauis, siue crocei, sic coloratum holosericum villosum æmulâtes. Tertium genus omnium minimum flores superiori similes edit, sed longè minores. Omnium flores & folia, denique, vniuersa planta tetræ cominus odorem vibrat, sed manè minus foetet. In Africa, ut diximus, sponte prouenit. In Italia, Gallia, Germania, cunctisque, ad Septentrionem hortis colitur ad delicias & coronamenta, præsertim maior, qui non nisi Augusto mense & Autumno floret. Minor Maio & tota æstate. Fuchsius artemisiæ genus Tanacetum facit, corrupto nomine pro Tagete dictum, & huius generis esse putat herbam, quæ elegantissimos flores profert, Caryophyllos Indos vocatos, nullaque in re nisi floribus, qui sunt elegantiores & maiores ab illa distare, nisi quod hæc odore vincit: quare Tagetem Indicam appellat. Hoc Tragus non probat, tum artemisiæ seu Tanaceti non solum forma, sed etiam odor & sapor reclamant. Multo etiam minus tagetes, inquit, apud Apuleium fuerit, cum eius historia nulla apud eundem auctorem extet. Sunt qui velint florem Africanum, Petilium esse florem Plinij. Sed Petilius flos est Autumnalis, inquit Plinius, circa vepres nascens, tantum colore commendatus, qui est rosæ siluestris, foliis paruis, quinis, calice paruo, versicolore, luteum semen includente.

TAGETES Indica, Fuchs.



Li. 2. c. 178.

Li. 4 simpl.

Mirum est in eo flore inflecti cacumen, & non nisi retorto folia (floris nimirum) nasci. Andreas Lacu. & Itali, florem Africanum maiorem aurei fulgoris, & tanto pulchriorè, quiq; minus aut perparum tetri odoris spirat, Othonnæ Dioscoridis esse censent, quibus haud assentiuntur multi periti herbarij, quod cum illius descriptione flos iste minus conueniat. Est enim Othônæ, inquit Dioscorides, foliis erucæ, perforatis cribri modo, & velut à tineæ erosio, flaccidis, paucis, flore croceo, latifolio. At floris istius folia multa sunt, Tanaceti quàm erucæ similiora, non verè perforata, sed quæ tantummodo soli obiecta, talia appareant. Galenus Lycopersij cuiusdam herbæ meminit, cuius succum Centurio quidam ex Barbarica, circa Ægyptum regione cõportauerat, odore adeo graui, atque inamæno, ut ne gustare quidem ausus fuerit ipse Galenus, sed letale esse coniiceret. Vtebatur autem eo Centurio ille ad ingentes articularum dolores, atque ipsis etiam ægris refrigerandi facultate pollere visus est. Est autem, ut

Galenus ait, colore subflauo, odore tam graui quàm cicutæ, nisi quod leuem quandam instar aromatum adferat gratiam. Nomen herbæ ex qua succus hîc exprimitur, Lycopersium esse dicebat: quali autem præterea sit forma, Galenus non addidit. Quare an flos Africanus Lycopersium sit, decerni non potest. Videtur tamen illi si non idem, certè simillimus, inquit Dodonæus, quod folia & præsertim flores graui admodum & tetro præditi sint odore, & qualitate venenata, cicutæ proxima, quod experimentis nonnullis sibi constare, idem Dodonæus, asserit, ut in puero qui flores mandere incœperat, labia & os inflata se vidisse, sicuti crebro iis accidit

qui

Cap. 18. de flor.

Ibidem.

qui cicuta fistulas ludentes, aut modulantes intra labia aliquandiu continuerint: Feli etiam flores recentes cum calicibus recenti caseo permistos olim dedisse, quæ mox valde inflata, & paulò post mortua fuit: mures quoque qui semen arrosuerunt mortui feruntur reperti. Ex eiusdem esu porcis intumuerunt rostrum ac fauces, & nonnullis exitio fuit. Quæ omnia venenatam & deleteriam huius herbæ facultatem esse demonstrant, ut audiendi non sint, qui hanc tanaceti vel artemisiæ speciem, aut innoxiam stirpem esse autumant.

Pena fol.
318.

PYROLA.

CAP. XXVIII.



Vlgo à Pyri folio herba hæc Pyrola nominatur, Gallis *Pirole*, Germanis *Uuintergruen*, quæ vox hyemis virorē significat. Quippe æterno virore, inquit Pena, pene atra, aduersus brumæ rigores perstat, & *Holtz mangolt*, & *Vualdmangolt*, idest, Beta siluestris, quoniam hortensi Betæ primum erumpenti haud dissimilis sit: ob id limonium quidam esse autu-

Nomina

Fol. 112.

PYROLA.



mant, eoque nomine descripsit & depinxit Fuchsius. Alij Britanicam esse arbitrantur. Folia aliquot in imo profert, septena, octona, nouena, denaue, Betæ quadatenus similia, rotundiora tamen & minora multò, Pyro propiora, viridiora, nigriora, caulem dodrantalē aut pedalē, floribus pulchellis, in summitate ornatū albis, & odore ad flores lilij conuallium accedentibus, è medio stamina apicēve emittentibus: radix est exigua, tenera, subrufa, repens. Montosis, siluosis, & frigidis vdis gaudet, hortosque & mitiora viridaria aspernatur. Superiori & inferiori Germaniæ, adeoq; vniuerso Septentrioni nota, rarior Italis, & Gallis meridionalibus. Perpetuò viret: flores tamen Iunio & Iulio mensibus emittit. Tertio ordine siccā & secundò frigidam recentiores esse tradunt. Omnes enim eius partes adstrictionis vehementissimæ & euidentis refrigerationis esse sentiuntur. Quare eius decoctum interna & externa vulnera potum sanat, item fistulis, atque aliis malignis vlceribus medetur.

Cap. 173.
hist.

Forma.

Locus.

Tempus.

ANEMONE.

CAP. XXIX.



NEMŌNH Græcis, similiter Latinis Anemone, quibusdam herba venti, Arabibus *Iackaiak*, *Anahamen*, & *Sakaikanheamen*. Plinius Phænon dici tradit, fortasse à splendore quem longè de se fundit, quam exemplaria etiam vetusta magna ex parte Fremium, & non Phænon habent, voce nihil, ut arbitror, significante: & Theodorus apud Theophrastum Anemonem vbique Fremium conuertit. Dicta autem est Anemone ἀπὸ τοῦ ἀνέμου, idest, à vento, quod flos nunquam se aperit nisi spirante vento auctore Plinio. Tamen cum hiare patereq; flantibus ventis per æstatem floribus multis vsuueniat, potuit non inconcinnè dici Anemone, quæ eius flos caducus facilè vento decutiatur, quemadmodum & papaueris rhœadis, cui affinis est. Ouidius Adonidis florem Anemonem vocare videtur his versibus.

Nomina

Lib. 21. c. 23.

Metam. 10.

Sic fata, cruorem

*Nectare odorato sparsit, qui tactus ab illo
Intumuit, sicut fuluo pellucida cælo
Surgere bulla solet: nec plena longior hora
Facta mora est, cum flos de sanguine concolor ortus,
Qualem quæ lento cælant sub cortice granum
Punica ferre solent: brevis est tamen usus in illo.
Namque malè hærentem, & nimia leuitate caducum,
Excutiunt iidem qui perflant omnia venti.*

Li. 2. c. 172. *Genera.* Dioscorides Anemonem duplicem statuit: vnam siluestrem, alteram satiuam (sic enim τὸ ἄνερον melius vertas, quàm in cultis nascens, vt Plinius & eū secutus Ruelius interpretati sunt: nam siluestres plantæ etiam in cultis locis sponte, non satiu, nascuntur.) Satiua quædā puniceos fert flores, altera subalbidos, aut lactei coloris, alia purpureos. Plinius ex Dioscoridis sententia eadem genera tradidit his verbis.

Lib. 21. c. 23. Anemonas coronarias tantum diximus: nunc reddemus & medicas. Sunt qui Phænon vocent. Duo eius genera. Siluestris prima, altera in cultis nascens, vtræque fabulosis. Huiusque plures species: aut enim Phœniceum florem habet, quæ & copiosissima est, aut purpureum, aut lacteum. Sed coronarias Anemonas non rectè

Lib. 21. c. 11. distribuit Plinius, & in conuertendo Theophrasti loco, quo Anemones meminit, lapsus est. Nam in Græcia, inquit, tardius etiānum Anemone. Est autem hæc siluestrium bulborum flos, aliāque quàm quæ dicitur in medicinis. Sequitur ænanthe, melanion, ex siluestribus heliochrysos: deinde alterum genus Anemones, quæ limonia vocatur. At Theophrastus vnus tantum Anemones hîc meminit. Et paulò ante non Anemonem sed bulbi codion coronis inferi dixit, ex quibus duobus diuersissimis ineptè duplicem Anemonem Plinius statuit. Locum cum Plinij absque dubio corruptum quidam sic restituunt. Florum prima ver nuntiantium viola alba. Tepidioribus verò locis etiam hyeme emicat. Proximè flammea, quæ & flox vocatur, siluestris duntaxat. Bulbi codion bis anno, vere & autumnò: æstates hyemisque fugit. Est autem siluestrium bulborum flos. Senior supradictis aliquanto

ANEMONE I. Matth.



Forma.
Ibidem.

Narcissus, & Liliū Theophrasto Lirium trans maria: in Italia, vt diximus, post Rosam. Nam in Græcia etiānum tardius Anemone (nempe Limonia, siue pratenfis Theophrasti,) aliāquàm quæ dicitur in medicinis. Postea viola quæ appellatur purpurea. Sequitur ænanthe, &c. Recentiores quoque herbarij complures Anemones species agnoscunt. Anemones folia, auctore Dioscoride, coriandro similia tenuioribus incisuris, in terram inclinata, cauliculi lanuginosi, tenues, in quibus flores veluti papaueris, & media capita nigra aut cærulea, radix magnitudine oliuæ aut maior, velut geniculis distincta. Siluestris per omnia maior est satiu, & foliis latioribus, ac durior: habet & caput oblongius, florem puniceum, radices tenues, & multas. Quibus descriptionibus satiuam à siluestri discreuit Dioscorides, primum radice in satiu tuberosa, velut geniculis distincta, in siluestri multis radicularum fibris capillata: deinde quod satiu minor foret, angustiore & teneriore folio, capite breuiore, flore vario: siluestris

ANEMONE II. Matth.



siluestris autem procerior, latiore & duriore folio, capite longiore, flore tantum puniceo. Ex iisdem colligere licet Anemonem Theophrasti, quam Pulsatilem esse volunt, à Dioscoridis Anemone diuersam esse. Ille enim hanc inter *ἐπιφύλλα* reponit, idest, quæ propè terram & circa radicem tantum folia mittunt, in caule nulla, cuius notæ Dioscorides non meminit, omnesq; Anemones species quotquot ab herbariis proponuntur, statim ab radice & in caule & ramis foliosæ sunt. Plinius breuius sic descripsit. Harum trium folia apio similia sunt, nec temerè semipedis altitudinem excedunt, cacumine asparagi. Flos nunquam se aperit nisi vento spirante, vnde & nomen acceperunt. Siluestri amplitudo maior, latioribusq; foliis, flore Phœniceo. Præterea quoniâ Anemonarum genera papaueri rhœadi & argemonæ floribus similia sunt, Dioscorides ideo diligenter harum differentias discreuit, hoc modo. Papauer & argemone colore puniceo minùs saturato spectantur, & vtraque tardiùs floret. Adhæc argemone, croceum succum gustu admodum acrem reddit, Rhœas verò candidiorem & acrem. Insuper argemone & rhœas in medio capitula habent siluestri papaueri similia, verum Argemonæ caput supernè aliquanto crassius est, rhœadis subangustius. At Anemonæ neque succû remittunt, neque

Lib. 7. hist. ca. 9.

ANEMONE III.

Matthioli.



ANEMONE IIII.

Matthioli.



ANEMONE V. *Matth.*

Ca. 172. li. 4

ANEMONE *Hortensis*
Tragi.

Lib. I. c. 49.

ce recta, læui, & digitum minimum crassa, caulem erigit teretem, & instar been albi, vt vocant, geniculatum, foliis herbacei coloris, iisq; plurimum dissectis instar camomillæ vulgaris, aut cotulæ ad fastigium vsque, quod flore rutilo & quasi aureo forma argemonem planè referente nitet, vestitum. Dodonaus alias & diuersas descripsit & pinxit Anemonas. Prima folia habet pauca, sed in lacinias diuisa, ranunculi

codia siue calices habent, sed quasi asparagi cacumen. Quæ cum Græcè legantur, στα δρον ἀνιάσι, &c. Andr. Lacu. δρον non succum, sed lacrymam conuertit: nam succus, inquit, siue χυλός propriè dicitur is qui ex herbis tuis vi exprimitur, vt δρον vel lacryma, liquor ille qui ex plantis vltro destillat. Quare fieri non potest vt hic Dioscorides intelligat Anemonas nullum succum, ex se remittere, quum superius dixerit Anemonarum succum infusum naribus, conferre purgando capiti: manare verò ab ipsis lacrymam, vt defluit à papauere opium, hic insiciatur. Hæc quamuis satis luculenta & distincta sit Anemonarum delineatio, tamen varij varias proponunt & cōfingunt Anemonas. Matthiolus quinque depinxit genera. Primum, inquit, folio prouenit coriandro simili, sed frequentioribus incisuris, caulibus lanuginosis, tenuibus, striatis, in quibus tenuiora per interualla sunt folia, floribus siluestris papaueris magnitudine, quæ sena circum distinguunt folia, purpurascens, capitulo umbilico tenuis emergente, nigro colore, nigrisque capillamentis stipato, perinde vt in papauere: radix illi oleæ magnitudine, subrotunda, fibrataq; & sapore acri. Secundum foliis assurgit maioribus, & frequentius lacinjatis cynoctoni aconiti modo, caulibus alteri similibus, sed aliquantò crassioribus, inanibus, & in rectum spectantibus; quibus flores insunt dilutiore purpura nitescens, capitulo circumquaque comato, perinde vt alterum: radicem habet breuem, rapunculi ferè figura, fibris adnatis multis, acri etiam gustu. Tertium foliis crescit ranunculi primi æmulis, caulibus tenuibus, sesquipalmaribus, rotundis, in quorum cacuminibus flores exeunt albi, quinque tantum foliis distincti, rosarum magnitudine, & nonnunquã tenui quadam purpura respersi, inferiore præsertim sede: radicem habet fibratã ac tenuem. Nascuntur in collibus. Sunt & Anemones genera alia duo, foliis laciniatis, floribus in altero purpureis, in altero aureis. Tragus Anemonis genus esse existimat plantam hîc pictam Anemonem hortensem appellans, quæ ex radi-

*ANEMONE I. Dodon.
latifol. I. Lob. & Clus.*




*ANEMONE II. Dodo.
tenuifol. III. Clus. siue Ge-
raniifolia, Lob.*



ranunculi hortensis foliis satis similia, sed minora. Flos in breui & palmum alto pediculo emicat ex vndecim aut tredecim foliolis angustis, oblongis, acuminatis, in quorum medio capitulum aliquot circumseptum staminibus, quod exili incanescit piloso flore, cui subest semen. Radix initio oliuæ magnitudine, sed tempore adaugetur, & grandior facta, veluti geniculis articulatur, obliqua, non rectè descendens, fibris aliquot adhaerentibus. Color floris elegans est, in dilutiore purpura rubens, qui quandoque ab vtraque, aliàs ab interiore tantum relucet parte intensior, exterius remissior & inalbicans. Huius generis & albidus sunt flores, sed rariores. Clusius Anemones latifoliae alterius pinxit. Lobellio Anemone tuberosa bolbocastani radice. An Anemone lutea Galeni. Secunda folia fert ranunculi hortensis similia, sed minora, trigemina cohærentia: flores ex tredecim aut quatuordecim foliolis, sed haud acuminatis, ac repandis compositos, colore caruleos, & cyaneo flori cōcolores, staminibus luteis medium orbiculū amplectētibz, quod nullis canescit pilis, sed veluti ranunculi, Asparagi æmulatur germen. Radix obliqua, crassa, genicula tuberaq; multa habet. Hanc Matthiolus non pinxit. Tertiæ Anemones folia maiora sunt crebrioribus ac tenuioribus etiam incisuris diuisa: pediculus similis, flos maior, cum papaueris rhœadis flore magnitudine ferè certans, septem aut octo foliorum tantum, pulchro violæ nigrae purpureo arridens colore, paulò tamen dilutiore: capitula huius pubescunt vt primæ: radix oblongior, crassior, similiter obliqua, crebrius geniculata, puniceo colore subnigricans. Etsi verò Anemone secundæ Matthioli videtur vtcunq; similis, tamē multum differt. Est huius rubens quoque species, flore phœniceo, & vt rhœadis colorato: item tertia etiam candida. Quarta Anemone tertiam foliis, cauliculis & radicibus refert: flos mediocris quoque magnitudinis, Rhœadis colore, rubens, densis & frequentibus stipatus foliolis, multiplex, quorum decem aut duodecim exteriora maiora, interiora verò reliqua, exigua. Quinta species foliis


Li. 4. purg.
ca. 7

ranunculum refert hortensem, sed tamen minoribus, flos paulò maior senis ferè constat foliolis, candidus aut è purpura rubens, sed modò dilutiore, modò intensiore colore: capitula aspera, parua, nuda: radices tenuiores, sed obliquæ quoque, nihil aut parum geniculatæ, demissis deorsum aliquot fibris. Sexta quintæ similis

*ANEMONE III. Dodo.**Angustifolia, Clusij.*

est, foliis tantummodo floréque minor, eoque luteo, Ranunculi floribus concolor, radix similis quintæ. Ranunculus nemorosus, quartus Fuchsi lacteus & luteus, cuius meminimus in libro de Palustribus, cap. De Ranunculo. His adiicit aliam quandam tametsi foliis differentem. Neque enim coriandro aut ranunculo similia habet folia, sed potius Trifolij instar: cohærent enim terna, non magna, lata, acuminata, indiuisa, margine tantummodo crenato. Cauliculus palmum altus, cui flos insidet candidus, formam florum ranunculi æmulatus, qui marcescens nonnihil purpurei coloris contrahit. Radix etiam obliqua in propagines quasdam extuberat, non absque capillamentis fibrosis subnatis. Anemones quintum & sextum genus, inquit Dodonæus, in pratis & siluis, præsertim locis humidioribus ac vmbrosis in Germania ac Belgio reperiri possunt. Reliquæ peregrinæ sunt. Omnes autem ad *hæpseros*, idest, satiuas, referendas esse censet. Silvestris enim species ab his differt, ut ex Dioscoride diximus. Clusius quoque ali-

quot Anemones genera obseruauit, non modò florum colore formæque, sed ipsis etiam foliis inter se dissimilia. Vnum foliis constat satis amplis, circinata ferè rotunditatis, per ambitum ferratis, duris & firmis, longoque pediculo fultis, supernè

*ANEMONE Latifolia**prima, Clusij.**ANEMONE IIII. Dodonæi.**Multiplex rubra, Clusij.*

intensius

*ANEMONE Quinta & sexta, Dodonai.**ANEMONE Tri-
folia, Dodonai.*

intensiùs virentibus, infernè verò plerumque purpurascens Cyclamini ferè modo, feruidissimi gustus: radice tuberosa, oblongiuscula, Tormentillæ vulgaris æmula, fibris aliquot dependentibus, foris nigra, intus alba, solida, ingrati admodum saporis, quæque nauseam mouens quodammodo strangulet, deinde linguam

*ANEMONE Latifolia,
flore multiplici, Clusij.*

aliquantulum vellicans. Lapidosis quibusdam Lusitaniæ collibus iuxta Tagum, atque etiam inter vepres Clusius se reperisse ait. Exilit Decembri & Ianuario. Alteram Anemonem latifoliam facit quam nuper diximus à Dodonæo primam statui. Tertiam tenuifoliam, quæ Dodonæus in Historia purga. secundam ponit. Quartam Anemonem tenuifoliam alteram, quam tertiam Dodonæi esse supra indicauimus. Aliam multiplicem rubram, quæ quarta est Dodonæi modo dicta. Alio in loco idem Clusius ad Anemones genera refert plantas duas minimè silentio prætereundas, quod elegantes sint admodum. Prior multa ex vna radice promit folia, Anemones latifoliæ flore purpureo, aut Saniculæ haud multum dissimilia, dura, neruosa, in tres lacinias profundiores diuisa, deinde per ambitum serrata, supernè nigricantia, infernè candidiora, sapore feruidissimo, & si gustentur, ilicò linguam vrente, ante hyemen etiam germinantia, quemadmodum in reliquis Anemones generibus. Inter hæc caulis vnus aut alter prodit palmaris, nonnunquã

ANEMONE Tenuifolia
flore multiplici, Clusij.



etiam pedalis, nudus subhirsutus, qui circa cacumen tria exigua folia, ab eodem fere exortu prodeuntia, & simul caulem amplectentia pro fert, deinde in summo magnum ac latè expan- sum florem, numerosis foliis constantem, quo- rum externa & maxima dena aut duodena co- lore viridi sunt, interna verò minora & angu- stiora, dilutiore purpura nitentia, circa umbili- cū simul glomerata. Radix crassa & in aliquot capita extuberans, Anemones latifoliae purpu- reæ modo, foris nigra & scabra, intus alba & solida, gustu ingrato & fauces coarctante, mul- tis tenuibus fibris capillata. Altera quina, se- na, aut plura habet folia multifida, in multas tenues lacinias diuisa, dilutiore colore quàm su- perioris virentia, caulem etiam pedalem prio- ri similem, sed non æquè crassum, quem etiam circa summum tria tenuius incisa ambiunt fo- liola, florem etiam, quemadmodum in omni- bus Anemones generibus, antequam aperiatur occulenta, qui summo cauli insident, succe- scente caule explicatur in dena aut plura folia hirsuta, latiuscula, & maiuscula cocci modo ru-

bentia, quæ numerosa tenuiaque foliola Bellidis multiplicis flori perquàm simi- lia, & colore coccineo saturatiore, amplectuntur. Radix non admodum à supe- riore discrepat, oblongior paulò, foris etiam rugosa, nigricans, & tenuibus capil- lamentis fibrata, intus verò candida, & eiusdem cum superiore gustus, vtraque vere floret cum aliis Anemones generibus, quarum viribus etiam respondent. Constantinopoli delatas fuisse ait, Giul Catamer nomine: lingua autem Turcica Catamet siue Catemer plenum siue multiplicem significat. Anemone quædam folia producit nigra, & est acrior, inquit Dioscorides, vim habet vtraque acrem, quare succus radice ipsius naribus infusus ad capitis purgationes utilis est, com- manducata radix pituitam trahit, decocta in passo, & imposita, oculorum inflam- mationes sanat, eorumdem cicatrices & visus hebetudinem abstergit, expurgat sordida vlcera. Folia autem & caules cum ptisana decocta, & in cibo sumpta lac attrahunt: in pessa apposita menses cient: imposita lepras eximunt. Plinius eundem vsum medicum tradit his verbis. Profunt anemonæ capitis doloribus, & inflammationibus, vuluis mulierum, lacti quoque. Et menstrua cient cum ptisa- na sumptæ, aut vellere appositæ, radix commanducata pituitam trahit, den- tes sanat decocta, oculorum epiphoras & cicatrices. Anemonæ omnes, auctore Galeno, extrahendi & attrahendi, & ora vasorum referandi facultatem habent. Itaque radix commansa pituitam euocat, & succus ex naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida vlcera anemonæ purgant, & lepras detrahunt, mensesque appositæ educunt, & lac trahunt.

Lib. 2. c. 172
Vires &
Temper.

Lib. 21. c. 23.

Lib. 6. sim.

PULSATILLA.

.CAP. XXX.

Nomina



ARBARI pulsatillam nuncuparunt, quod huius comosi & tremuli feminum pappi huc atque illuc vel lenissimo quoque flatu pultarentur, id est, pellerentur, plerique herbam venti dixere, anemonem aut eius genus esse suspicati, & sanè merito: neque enim multum visa fuit

PULSATILLA, Matth.

PULSATILLA Alba,
Lobellij.

abesse à siluestri anemone quibusdam doctissimis. Quippe foliis est anomones tuberosæ, bulbocastani, aut coriandri, rigidioribus, hirsutioribus, nigricantibus, crassioribus, caulem palmarem, & sesquipalmarem, hirsutum, geranij amplexis, in quibus flores papaveris rhœadis, aut potius anomones, quinis aut senis foliis in purpura cæruleis, è quorum medio exeruntur apiculi, staminave luea, Aquilegiæ, aut herbæ trinitatis, siue Trifolij hepatici, à quorum delapsu se prodit cæsaries villosa, cirris crebris, & cincinnis calamistratis pēnas delicates fericeas pulli coloris implexas, aut carminatum bombacis pensum referentibus, cuiusmodi in caryophyllata, Scotino, & spongia Bedeguari, quibus conditur semen exiguum, asclepiadis: radice digitum crassa, non admodum acris nec feruida. Hac maior est; inquit Lobellius, foliis, maiorique elegancia floris albi peramœni. Huiusmodi pulsatillam flore candidam pallentem in Minden montibus & Aruerniæ nasci Pena auctor est, sicut in Taurinensibus interdum luteam. Rubram etiam pictam dat Lobellius, qualem se habuisse ex Alepo Syriæ scribit Pena. Matthiolum Fuchsum, erroris insinuat, quod anemones purpureæ loco Pulsatillam depinxerit, cui nulla cum anemone cognatio, inquit Matthiolus, illa etenim cum primum erumpit, folia emittit admodum hirsuta, minutimq; laciniosa, quæ sapore sunt perquam acris, adeo ut non minus exulcerent quam ranunculus & flammula. Flos in stellæ modum, similiter hirsutus in eunte vere dehiscit, antequam folia erumpant, nigricanti splendet purpura, è cuius medio quidam aurei flosculi eos referentes qui rosis innascuntur, in quorum umbilico floccus purpureus visitur, sericinum referens opus. Exteriori verò parte in caulis cacumine circa floris basin villosus alter circumquaque se pandit floccus colore cinereo, sericino stamini mollitia ac lauore minimè cedens. Semen capillato incanoque capitulo iuglandis ferè magnitudine cōtinetur. Radix illi subest pedali lōgitudine exesa nigri chamaeleonis modò, cui sapor quidam subdulcis, non autem acris veluti foliis & caulibus.

In Cap. 172
lib. 2.

PULSATILLA
Rubra, Lobel.

Lib. 4. c. 6.

Locus.

Forma.



libus. At hanc initiò dixit acrimonia esse ranunculi aut flammulæ. Dioscorides verò vult vtranque anemonem acrem esse, & acriorem illam cui folia nigra sunt, qualia sunt huius pulsatillæ, quæ crustas emarginat admotis foliis, quemadmodum de anemone dicit Dioscorides, qui intrò sumenda folia cum ptissana elixat, quo deponant acrimoniam, ipsa verò radice, vt pote mitiore, cruda mansa pituitâ extrahit. Hac Pena. Hic etiam alteram Dodonæi adiungendam censuimus, cuius hæc sunt verba. Apud Gallos locis incultis, inquit, gigni Ruellius scribit, nouoq; vere iis montes florere. Belgæ in hortis habent, apud Germanos satis frequens locis asperis & lapidosis, & subinde in ipsis rupibus, & quidem flore purpurei ex cæruleo coloris: qui p locorū ratione aut intetior aut remissior. In syluis siquidē ac vmbrosis dilutiore colore quasi inalbicat flos, in Apricis coloratior est: Albidi floris Auerniæ & Narbonensis Galliæ montes suppeditant: lutei Taurinenses Allobrogū: rubri floris ex Alepo Syriæ vrbe se habuisse Petrus Pena & Matthias Lobellius referunt. Galli *Coquelourdes*, Germani *Kueckenschell* nominant: vulgò Pulsatilla, & à nonnullis Apium risus

dicitur. Nec est tamen herba Sardoa quæ propriè Apium risus dicitur. Nec etiam Ranunculi, neque Anemones species, vtrisque tamen, & præsertim facultatibus accedit. Est enim, vehementer acris quamcunque contigerit corporis partem si trita imponatur. Caterū siue Pulsatillam inter anemones genera collocemus, siue plantam sui generis esse placeat, ab anemone discrepantem, ex Alpiū latissimis pascuis, propinquis montium verticibus, & ob roscidos cæli madores multò plus herbæ aut fœni præbentibus, quàm si iuges aquas biberent. Dalechampius

PULSATILLA
Altera, Dodo.*PULSATILLA. I. Alpina,*
Dalechampi.



tria pulsatillæ genera, luteo flore conspicua produxit. Primum radice crassa, nigra, *Forma.* exesa, foliis apij modo dissectis, inter hæc tria genera latissimis, hispidis. Secundum radice tenuiore, breuiore, minùs atra, foliis hortensi apio similibus, paulò latioribus, hirsutis, radicem ambientibus, nullis in caule dōdrantali, lanuginoso, media sui parte villoso glomo pubescente, ex quo prodit floris aurei pediculus. Tertium radice quàm in superioribus graciliore, folio pastinacæ siluestris, apicibus in medio flore coaceruatis, luteis, quos in seminis conceptaculum tandem formatos spissa lanugo vestit. Hæc tria genera in monte Muræ, oppidulo Allobrogum vicino, reperiuntur.

P H A L A N G I V S.

C A P. XXXI.

GRÆCIS φαλάγγιον & φαλαγγίτης, Latinis similiter Phalangiū & phalangites herba dicitur, quòd, Galeno auctore, demorsis à phalangiis auxilietur. Eam describit Dioscorides, ramulos duos aut tres aut plures habere, à sese distantes, flores albos, lilio similes, cum multis incisuris, semen crassum, nigrum, velut lentis dimidium (In Græcis exemplaribus legimus non πλατὺ, id est, latum, vt ex Plinio conuertit Ruellius, sed παχύ, hoc est crassum, & in quibusdam non ὡς περ φακὸς ἡμῶν, sed ὡς περ φακὸς ἡ μετρίον, id est, lentis magnitudine aut maiori, quæ lectio videtur probabilior) multò tamē gracilius, radiculam paruam, tenuem, viridem, dum à terra extrahitur, postea enim contrahitur. Nascitur in collibus. Eadem ferè Plinius tradit. Phalangites à quibusdam phalangium vocatur, ab aliis leucanthemum, vel vt in quibusdam exemplaribus inuenio, leucacantha. Ramuli sunt ei nunquam pauciores duobus, in diuersa tendentes: flos candidus lilio rubro similis, femine nigro, latò ad lenticulæ dimidiæ figuram, multò tenuiore, radice tenui, herbacei coloris. Istud phalangium Dalechampus esse censet herbam hîc expressam, quam reperit in terrenis collibus quâ Lugduno

Nomina

Forma.
 Lib. 3. c. 105.

Lib. 27. c. 12

PHALANGIVM,

Matth.



Lugduno Viennam itur, radice breui, carnosâ, in multas radículas diuisâ, cùm eruitur pallida, vel sublutea: sic enim $\chi\lambda\omega\rho\acute{o}\nu$ vertit ille, & non viridem, aut herbaei coloris, vt Plinius, & eum secutus Ruellius, postea autem cùm herba seruatur, albescente, quam notam à Dioscoride traditam Ruellius omisit: sic enim habent Græca exemplaria. $\rho\acute{\iota}\zeta\acute{\iota}\omicron\nu\mu\acute{o}\nu\ \mu\acute{\iota}\kappa\rho\acute{o}\nu\ \lambda\epsilon\pi\acute{\iota}\omicron\nu\mu\acute{o}\nu\ \chi\lambda\omega\rho\acute{o}\nu\ \acute{\alpha}\mu\alpha\ \tau\acute{\omega}\ \acute{\epsilon}\lambda\kappa\upsilon\omicron\theta\eta\eta\nu\alpha\iota\ \acute{\epsilon}\kappa\ \tau\eta\varsigma\ \gamma\eta\varsigma\ ,\ \acute{\upsilon}\tau\epsilon\rho\omicron\nu\ \gamma\acute{\alpha}\rho\ \acute{\epsilon}\kappa\lambda\epsilon\upsilon\kappa\acute{o}\mu\eta\nu\epsilon\tau\alpha\iota\ ,\ \text{non}\ \sigma\omega\acute{\epsilon}\lambda\kappa\epsilon\tau\alpha\iota\ ,\ \text{vt in vulgatis, folia à radice multa, longa, gramine similia, latiora, virgata: caulis pedalis, nudus, in tres aut quatuor ramulos diuisus, florem sustinentes lacteum, lilio albo, non rubro, vt Plinius ait, omnino similem figura & colore, & croceis intus staminibus floris folia multis lineis in lōgum productis incisa conspiciuntur. Eandem plantam pro phalangio Pena & Lobellius representarunt. Eandem etiam Matthiolus quantum ex eius icone sola colligere licet: nam de plantæ habitu ac forma verbum nullum fecit. Ei aliud Lobellio Phalangium, quod ramosum nominat, Dodon. lib. 4. Hist. Stirp. Moly alterum Plinij, non satis rectè, vt multi censent: folia graminis habet humi strata, inter quæ caulis erigitur rotundus, læ-$


PHALANGIVM,

Dalechampj.



PHALANGIVM

Ramosum, Lobell.



uis, gracilis, circa summum in multos ramulos diuisus, quibus insident flosculi candidi, cariophyllis haud multum absimiles, sed multo minores: radices sunt longæ, graciles, valde fibratæ. In hortis colitur. Phalangium tertium Cretæ Salonensis Pena & Lobellius statuunt plātā superiori nō dissimilem, quæ copiosa nascitur

in Gallo

in Galloprouinciæ planitie illa quæ vocatur *Craux de Salin*: cuius meminimus in Libro de Bulbosis inter Asphodelos. Phalangij folia, inquit Dioscorides, semen, flos cum vino pota contra scorpionum & phalangiorum ictus auxiliantur, tormina quoque discutiunt. Eadem prorsus Plinius tradit. Huius folio, vel flore, vel semine auxiliantur contra scorpionum phalangiorumque & serpentium ictus: item contra tormina. Galenus, Phalangites sic appellata est, quòd morsis à phalangiis auxilietur. Est autem facultatis tenuium partium desiccatis, quamobrem & tormina patientibus succurrit.

Lib.3.c.105

Lib.27.c.12

Lib.8.simp

BELLIS.

CAP. XXXII.

HIC DE bellide fertis & coronis frequentissimè intertexta dicendum ex Plinio. Dioscorides enim, Galenus, atque alij veteres eam silentio præterierunt. Ab eodem Plinio etiam Bellius nominatur, à recentioribus Consolida minor, & Herba margarita, à nonnullis Primula veris, præsertim ea quæ minor est & siluestris, Gallis *Marguerites* & *Pasquettes*, Germanis *Masylieben*, & *Massuselen*, Italis *Primo fiore*, & *fior di primavera*. Potuerunt autem Belides funestæ illæ Beli Danai Regis filiæ quinquaginta, quæ totidem nuptæ maritis, eos qualibet suum iugularunt, his floribus nomen dedisse, quia multi visuntur vna gregatim & belluli, vnde vocantur vulgò *Marguerites*: sunt enim glomeruli multi florum quasi vniones siue margaritæ. Harum differentia aliquot reperiuntur. Fuchsius & Dodonæus species duas statuunt, alteram maiorem, alteram minorem: quam iterum in hortensem & siluestrem partiuntur. Matthioli maior, mediam & minorem, atque huius differentias aliquot. Bellis, inquit Plinius, in pratis nascitur flore albo, aliquatenus rubente. Ex quibus per paucis persuaferunt sibi herbarij eos flores, qui primo vere in pratis abundè erumpunt, bellides esse. Nec obstat, inquit Fuchsius, quod Plinius alibi bellio luteum

Nomina

Pet.Pe.
fol.199.Genera
Cap.53.
Lib.2.c.19.In cap.132.
lib.3.Lib.26.c.5.
Lib.21.c.8.

BELLIS Maior,
Fuchsj.



florem esse tradat, quia non ad ambitum, sed ad discum medium floris, quod sanè luteum est, respexit. Præterea locus hic Plinij adeò corruptus est, vt in eo emendando frustrà hæctenus desudarint docti viri. Sic enim in vulgatis legitur. Luteus & Bellio pastillicantibus quinquagenis quinis barbulis coronatur, pratenses hi flores, & cætera. Vetus lectio habet teste Hermolao, Alij & Bellio pastillicantibus quinquagenis quinis barbulis coronantur: pratenses hi flores. Legitur à quibusdam, Luteum & bellio, vt subaudiatur vox semen, quæ præcedit. Perottus non pastillicantibus, sed patulicantibus legebat, hoc est, aperientibus se, quod Hermolaus non probat. Sed ad Bellidum delineationes reuertamur. Bellis maior, consolida media vulnerariorum folia profert ex angusto in latum desinentia, subrotunda, crassiuscula, virentia, circumquaque crenata, circa radicem humistrata, in caulibus oblongiora, senecionis similia, caules à radice multos, graciles, teretes, lignosos, pedales & cubitales, in quorum summitatibus flores exeunt in medio lutei, in ambitu foliolis quamplurimis venustis, & candidis ornati, anthemidis similes, sed

Forma.

*BELLIDIS* Minoris species tres, Matth.

maiores, & inodori. Radix est sparsa multifidâque, & fibrata. Bellis media foliis est minoribus, nec tam altè incisis, sed leuiùs serratis, in terra iacentibus, cauliculis tenuibus, flexilibus, rotundis, palmaribus, floribus superiori similibus, sed minoribus, radice tenuiore, tamen multifida. Bellidi minori hortensii folia sunt longiuscula, in summo subrotunda, leuiùs serrata, per humum in orbem strata, erumpentibus è medio pediculis crebris, teneris, pilosis, palmaribus, qui flores ferunt colore & magnitudine differentes. Est enim in quibusdâ flos medio luteus, foliolis ambitu cãdidis, anthemidis, interdum saturatè rubentibus, in aliis versicoloribus, cãdidis scilicet & rubetibus, quæ frequentiores sunt & vulgatiores. Quosdam medio rubros,

BELLIS *Siluestris,*
minor.

dio rubros, ambitu aut albos, aut versicolores esse tradit Matthiolus, radix candida est & fibrata. Huic bellis siluestris minor persimilis est foliis: flosculi similiter ex radice exeunt pediculis breuibus, in medio lutei, toto ambitu foliolis candidis decori vt in bellide maiore, sed multò minores & inodori. Ab hac quæ in hortis coluntur ad coronamenta, non differunt nisi cultu, inquit Pena. Annuæ enim & frequenti transplantatione maiores, habitiores confertiores, duplicati & triplicati, & elegantiores euadunt flores. Quinetiam præter magnitudinem tanta fertilitate luxuriant, vt ex primo flore pediculi surrigantur, quibus insideant alij & secundi flores. Galli ὑποκορεσκῶς vocant *Margaritons*. Idem & in Rosæ purpureæ flore aliquando prope Gratianopolin contigisse Dalechampus obseruauit, pediculo è floris medio prodeunte, qui alterum florem post nascentem sustineret. Idem etiam vidit in eiusdem Rosæ flore, Lugduni in horto

fol. 199.

Rouillij. Est & Bellis Lutea, de qua diximus Libro de Umbelliferis. Bellis maior & minor in pratis nascitur, locisque aliis herbis & palustribus. Iam & in hortis feritur. Minor primo statim vere apparet, tota ferè æstate durat. Maior Maio potissimum mense floret. Bellidem vtrâque calidam siccamque esse ex Plinio colligi Fuchsius tradit, qui illarum ad discutiendas strumas vsum esse scribit. Acidus tamen sapor quem in gustu minor præferret, aliquam frigiditatis portionem in ea esse monstrat, quamquam bellides exsiccare euidentissimū est. Omnes vulnerariam herbam esse nouerunt, valereque potissimum in fracturis capitis admotam. Succus etiam herbæ à vulneratis vtiliter bibitur. Laudatur etiam herba ad membrorum resolutionem, itémque ad podagras, ischiada, & aduersus strumas. Hæc Fuchsius. Dodonæus easdem facultate frigida siccamque esse scribit. Alio in loco bellidis minoris folia humectandi, refrigerandiq; vi prædita esse, & humectare quidem, ordine secundo intenso, refrigerare verò eodem remisso. Quod non probat Lobellius: constat enim temperaturæ frigida & sicca potius esse. Dolores omnes articulares, ac podagricos ex calido siccoque humore mitigare cum butyro recenti & insulso trita, ac locis dolentibus imposita, potissimum additis maluæ foliis. Eadem oleribus addita facilem aluum facere, (hoc Lobellio suspectum) & in caustionide febre, ac in intestinorum inflammationibus magna vtilitate clysteribus admisceri.

Locus.

Tempus.

Cap. 53 hi.

Temp. &

Vires.

Lib. 2. c. 19.

De flo. c. 71.

PÆONIA.

CAP. XXXIII.



RAECIS παιονία, γλυκυσίδα, seu γλυκυσίς, & πενόροβος dicitur, ab Apuleio σελήνιον, διχομήνιον, θεοδόνιον, σεληνόγονον, Aglaophotis, Latinis Pæonia, ab Apuleio Herba casta, Arabibus *Feonia*, Gallis *Piuoine*, Italis *Peonia*, Hispanis *Rosa del monte*, *Rosa albandeira*, Germanis *Peonienblum*. Pæonia verò ab eius inuentore medicinæ peritissimo Pæone appellata est, glycyfida à Theodoro dulcisida, quod grana mali punici acinis similia habere videatur. Nam sidia mali punici grana à Bæotis nominantur. Ab eodem granorum cum eruo similitudine πενόροβος Est enim ὀροβος eruum, quamquam & Græca Dioscoridis, & Latina Plinij exēplaria reperiuntur, in quibus non pentorobon, sed pen-

Nomina

PAEONIA Mas,
Matth.

PAEONIA Mas,
Dalechampij.



Genera. toboron dubie lectionis & sententiæ vox habeatur. Huius duo genera Dioscoridi,
Lib. 3. c. 140 mas & fœmina. Dodonæus his pæoniam fœminam alteram addit. Pæonia mas fo-
De flo. c. 31. lia fert iuglandis, radice nititur digitali crassitudine, palmi longitudine, intus alba
Forma. & odorata, altè descendente, bifida aut trifida, gustu adstringente, caulis altitudine

PAEONIA Fœmina
prior.



Lib. 25. c. 4.

sesquipedali adolescit, comitâtibz multis stolonibus, qui, vt caulis, rubescût. In summo caule flores emicant egregio rubore insignes, puniceis magnis rosis similes, extante in medio veluti corniculo, flosculis illis luteis capillis annexis circumuallato, quibus succedunt siliquæ foris lanuginosæ, amygdalis similes ternæ aut quaternæ, in quibus cum dehiscunt, multa grana exigua, rubra, acinis punici mali similia inueniuntur, & in medio nigra, purpurea, quinque aut sex. Fœminæ folia Smyrni modo diuisa sunt, superiore parte viridiora, inferiore magis albicantia: radix nigra, cui appendices veluti glandes septem aut octo inherent, vt in asphodelo: flores vt masculæ pæoniæ colore, aliàs valde rubri: aliàs dilutè rubentes: semen in similibus siliquis & simile. Plinius in discutienda Pæoniæ vtriusque historia à Dioscoride dissidet. Vetustissima inuêtu pæonia est, inquit, nomenq; auctoris retinet: quam quidam pentorobon appellant, alij glycyfidem. Hæc quoque difficultas est, quod eadem aliter alibi nuncupatur. Nascitur opacis montibus, caule inter

inter folia digitorum quatuor, ferente in cacumine veluti græcas nuces quatuor aut quinque. Inest iis semen copiosum, rubrum, nigrumque. Et alio in loco. Glycy- Lib. 27. c. fide, quam aliqui pæoniam aut pentorobon vocant, caulem habet duorum cubitorum, comitantibus duobus aut tribus, subrutilum, cute lauri: folia qualia Isatis, pinguiora, rotundioraque & minora: semen in siliquis, aliud grano rubente, aliud nigro. Duo autem genera sunt. Fœmina existimatur cuius radicibus seu balani longiores, circiter octo, aut sex adhærent. Mas plures habet, quoniam non vna radice nixus est, palmi altitudine, candidaque. Ea gustu adstringit. Fœminæ folia myrrhæ redolent, & densiora sunt. Nascuntur in siluis. Hæc Plinius, quorū alia vt deprauata, corrigenda, alia ex vera plantæ historia ponderanda. Primum id falsum esse mærem fœmina plures habere radices, quoniam vnica nixus est, quod omnium qui pæoniam descripserunt testimoniis comprobatur. Hoc emendari negatione solum transposita debet hoc modò. Mas plures non habet, quoniam vna radice nixus est. Quod verò sequitur, fœminæ folia myrrham redolent, & densiora sunt, in magna suspitione versatur, ne *σμύρναν* pro *σμύρνιον* agnouerit. Dioscorides enim, *ἡ δὲ θήλεια ἀπέχισται τὰ φύλλα ὥσπερ σμύρνιον*, inquit: nisi quis dicat cum smyrnium myrrham redoleat, perinde esse vtro modo dicas, vel fœminæ folia myrrham redolere vel smyrnium, densiora verò esse non sine ratione addit Plinius, etiamsi in Dioscoride id non legatur, quod fortasse suprapositis eiusdem verbis sit subdendum, *ἀλλὰ πυκνότερα ἔχει*. Præterea non sibi constat Plinius, qui priore loco pæoniam caule inter folia digitorum quatuor esse scribit, posteriore caulem habere duum cubitorum, cum ad sesquipedem aut palmos duos tantum assurgat auctore Dioscoride, id quod & planta ipsa testatur. Sequitur comitantibus duobus aut tribus subrutilum, &c. Legendum foret comitantibus multis stolonibus ex Dioscoride scribente *παραφυάδας ἔχων πολλὰς*. subrutilum caulem verè scripsit, quod tamen à Dioscoride prætermisum est, alij librariorum vitio id euenisse existimant, legendumque, *καὺλος ὡς δισπιθαμαῖος, ὑπέρυθρος φύεται*. cauli verò cutem lauri falsò

PÆONIA Fœmina
altera, Dodon.



tribuit, vt alicubi *φλοιὸν ἔχειν δάφνης*, pro *δάφνης* *φλοιὸν* legisse videatur, cum caulium pæoniæ cortex daphnoidi multò similior sit quàm lauro. Quod autem folia pæoniæ Isatidis esse ait, ex Dioscoride & plantæ effigie iuglandis reposito, illius enim folia iuglandis foliis haud dissimilia sunt, aliquāto rotundiora, minora & pinguiora. Pæonia fœmina altera caules habet & folia priori fœminæ similia, sed in virore candidiora, auersaque parte etiam albidiora: flores minores, dilutius rubentes, radices quoque glandulosas, sed singulas multò longiores ac tenuiores. Hæc pæonia, mare nōdum reperto, à nonnullis herbariis mas credebatur, inquit Pena, quam promiscuam, quasi vtriusque particeps esset, & neutram appellant. Quippe quantum à solo extat si perpendas, marem didas: si erutas radices intueare, fœminam iudices, nisi quia pleniores & habitiores. His adiungitur à Lobellio Pæonia fœmina polyanthes, Belgij hortis specioso florum incremento, qui duplicatione & fœtura, vti papauera, maximum Althææ hortensis florem æquant,

Locus.

P A E O N I A Fœmina

Polyanthes, Lobell.

fol. 307.

Vires &
Temper.

Lib. 3. c. 140



& interdum superât. Nascitur pœonia, vt scribit Dioscorides, in altissimis montibus & præruptis: vt Plinius, in opacis montibus, & alio loco, in siluis: vt Apuleius in Cretæ & Sicilia montibus. Hac ætate in hortis colitur, & vulgarissima quidem fœmina prior, deinde altera, mascula rarissima. Penamarem & fœminam Geneuæ Alpinis, & Narbonæ arduis Viganij culminibus, & ibidē siluosis, nō procul alio celebri monte Lupi vocato se eruisse asserit, vere florentem, & ineunte æstate, ibique peræq; frequentem vtrâmq; hortis, tamen notiozem fœminam, eoque vsu frequentiozem. Fœminis à partu non purgatis datur radix, auctore Dioscoride, cit menses amygdalæ magnitudine pota. Ventrîs doloribus cum vino pota auxiliatur, regio morbo correptis prodest, renum ac vesicæ doloribus. Decocta in vino & pota aluum sistit, rubra grana decem aut duodecim in vino austero & nigro pota, rubentem fluxionem sistunt. Stomachicis & erosionibus comesta profunt.

A pueris pota & comesta initia calculorum

eximunt. Grana nigra nocturnis suppressionibus, ephialtas nominât, vuluæ strangulationibus, & vteri doloribus in aqua mulsa aut vino quindecim pota auxiliantur.

Lib. 25. c. 4.

Eundem ferè vsu pœoniæ medicum tradit Plinius, his verbis. Hęc in edetur & faunorum in nocte ludibriis. Præcipiunt erueri noctu, quoniam si picus martius videat, ruendo in oculos impetum faciat. Et posteriore loco. Tradunt noctu effodiendas, quoniam pico martio impetum in oculos faciente, interdium periculosum sit.

Lib. 27. c. 10

Radix verò cū effodiatur, periculosum esse ne sedes procidat: magna id vanitate ad ostentationem rei fictum arbitror. Vsu in his diuersus. Rubra enim grana rubentes menses sistunt quindecim ferè pota in vino nigro. Nigra grana vuluis medentur, ex passo aut vino totidem pota. Radix omnes vëtris dolores sedat in vino, aluūmq; purgat: sanat opisthotonum, morbum regium, renes, vesicam: matricem autem & stomachum decocta in vino: aluum sistit: estur etiam contra malū mentis: sed in medendo quatuor drachmæ satis sunt. Grana nigra auxiliantur & suppressionibus nocturnis in vino pota, quo dictum est numero. Stomachi verò erosionibus & esse ea, & illinere prodest. Suppurationes quoq; discutiuntur recētes nigro semine, veteres rubro. Vtrunq; auxiliatur à serpente percussis: & pueris contra calculos incipiente stranguria. Quæ Plinius faunorum in nocte ludibria vocat, eadem posteriore loco nocturnas suppressiones appellat, Dioscorides τῶν ἐφιαλτῶν

Lib. 3. c. 5.

πνιγμύς. Quid autem sit ephialtes, Latine incubus Paulus Aegi. declarat, aduersus quem epilepsiæ nuntium cum plurimum valeat pœonia, ephialtion hanc vocauerunt antiqui.

Lib. 9. hist.

cap. 9.

Quod de pico martio tradit, Theophrastus sic declarat. Ἀλλὰ & τοιαῦτα ὥσπερ ἐπιθεῖα & ὠρόρωθεν, οἷον τὴν παγονίαν, οἷδε γλυκυσιδὴν καλεῖσι, νύκτωρ κελεύουσιν ὀρύττειν. ἐὰν γὰρ ἡμέρας, καὶ ὀφθῇ τὸ ὑποδρυοκολάπτου, τὸν μὲν χερπὸν ἀπολέγων κινδυνεύει τοῖς ὀφθαλμοῖς. τὴν ὃ ρίζαν τέμνουσιν φασὶν ἐκπίνειν. τὴν ἑδραν. Id est, Gaza interprete, At illa veluti adiectitia, & è longinquo ducta appareant, castam enim quam alij dulcidam vocant, noctu effodiendam præcipiunt: nam si interdium, & à Pico martio visus quisquam sit, fructum quidem legens oculis periclitabitur. Radicem autem

secanti

fecanti sedes procidet. Sed vanissima sunt hæc: nā pæonia fructus & radix quauis hora diei & noctis sine periculo colligi & euelli possunt. Id annotasse præstiterit locum Plinij corruptū esse quo in vulgatis exemplaribus legitur, Sanat opisthotonum, morbum regium, &c. quem ex veteri codice sic restituit Cornarius. Sanat opisthotonum, morbum regium, renes, vesicam, arteriam, & stomachum decocta in vino: aliumq; sistit: estur etiā cum alimētis. Sed in medendo quatuor drachmæ satis sunt. Sed & præter codicis illius fidem, inquit Cornarius, Plinius nusquam alias matricis voce hac significatione, qua etiam hodie vulgus vti solet, vsus est: nec vsquam malum mentis pro aliquo peculiari morbo dixit. Alij insaniam, siue melancholiam morbum interpretantur. Præterea scribit Plinius, sanguinis profluuium sisti herbæ pæoniæ semine rubro. Eandem & in radice vim. Et aliquanto post, Muliebribus morbis mederi maximè in vniuersum pæoniæ herbæ semē nigrum ex aqua mulla. Eandem & in radice vim, menses ciere. Galenus de eiusdē facultatibus ita differit. Pæonia radicem habet leuiter astringentem cum quadam dulcedine, ac si plussculum dentibus mandas, acrimoniam quampiam subamaram, subesse percipies. Quare menses ciet ex melicrato amygdali pota quantitate. Expurgat etiam iecur obstructum ac renes: sed hæc efficit quā acris & subamara est: quā verò quiddam etiam adstrictorium obtinet, in ventre prouenientes fluxiones sistere potest. Cæterum eam in vino quopiam austero decoctam potare conuenit. Est porrò omnino & desiccatoria: quapropter haud desperauerim eam ex colo pueris suspensam meritò morbum comitiale sanare. Equidem vidi puelum quandoque octo totis mensibus morbo comitali liberum, ac postea fortè cum quod à collo suspensum erat decidisset, protinus denuò conuulsione correptum, rursusq; suspensio in locum illius alio, inculpatè postea egisse. Porrò visum est mihi satiùs esse rursus id collo detrahare certioris experientiæ gratia: quod cum fecissem, ac puer iterum conuulsus esset, magnam recentis radicis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus. Rationi consentaneum itaque erat, aut partes quaspiam à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas affectos ita locos curare: aut aërem à radice assidue alterari & mutari. Hæc Galenus. Seleucus vetus auctor, apud Athenæum interprete Hermolao, glycyfiden pomi genus specie fici tradit, quod mulieres maximè deuitant infatuationis metu: ita enim, inquit, μαλαίσμον interpretor. At Dalechampius Pæoniæ radicem μαλαίσμους ποιεῖν, idest, τῶν τοκῶν φθορὰν, abortum facere, interpretatur: ideoq; fœminas ab ea consultò cauere: quod verisimile est, cum purgationes à partu, mensesque cieat Dioscoridi.


Embl. 142.
lib. 3.Li. 26. c. 12.
Cap. 15.

Li. 6. simpl.

Lib. 3.

ASTER ATTICVS.

CAP. XXXIIII.

 ΣΤΗΡ ἀττικὸς Græcis & βελώνιον, Aster atticus Latinis, idest, Stella attica, & Inguinalis. Est autem huic herbæ Asteris nomen à foliorū in floribus figura stellæ modo radiatorum, quā Græci Astera vocant: non quia noctu & in tenebris stellarum modo fulgeat. Adiecerunt illi ab Atheniensi agro notam veteres Græci, quod illic ob soli tenuitatem frequentior aut melior fortè nasceretur. Bubonium ab iisdem dicta est, quod Inguinibus quæ bubonas illi vocant, tam præsentī remedio medeatur, vt alligata tantum medicinam in eo malo homini faciat. Aster atticus, vt describit Dioscorides, virga est lignosa, florem habens in cacumine purpureū luteūmve. (Sic enim habent vulgata exemplaria, tamen Matthiolus legendum censet ἀνθος πορφύρεον καὶ μῆλινον, idest, florem purpureum & luteum,) velut anthemidis capitulum, in

Nomina


Li. 4. ca. 115.
Forma.

Lib. 27. c. 5. ambitu incisuris diuisum, foliola stellæ similia: quæ verò circum caulem sunt fo-
 lia, oblonga & hirsuta. Breuiter sic Plinius. Aster ab aliquibus Bubonium appel-
 latur, quoniam inguinum præsentaneum remedium est: cauliculus foliis oblongis,
 Ca. 115. li. 4. duobus aut tribus: in cacumine capitula stellæ modo radiata. Matthiolus legiti-
 mum Asterem atticum hîc depictum, floribus intus luteis, in ambitu purpureis,
 eundemque Vergilianum Amellum esse censet: quem duplicem floris colorem
 etiam innuit Dioscorides in fine capitis, his verbis, πορφυρεῖον τὸ ἔνθους, idest, pur-
 pureum in flore, vt & doctissimus Marcellus interpretatur, scribens herbæ huius
 purpureum & luteum florem ad diuersas floris partes referendum esse: sunt enim,
 inquit, purpurei coloris folia, quod verò medium inter ea folia capitulum est cha-
 mæmeli modo lutescit. Asterem Italorum flore purpureo luteo vocat Lobellius:
 Matth. ibi. in Galloprouincia, Narbonensi Gallia & Longobardia reperitur. Herba ista cau-
 les ab radice mittit rectos, solidos, ac lignosos, colore fusco lutescente: è quibus
 circa cacumen ramuli oriuntur, in quorum summitate flores spectantur stellæ mo-
 do radiati, vt in anthemide, medio lutei, comantibus circumquaque foliolis dilu-
 ta purpura nitentibus. Folia profert oblonga, acuminata, oleæ figura, minora ta-
 men, hirsuta, aspera, nigricantia, subamaro sapore, in caule minora sunt: radicem
 habet multifidam, odore non ingrato, & nonnihil caryophylli resipientem.
 Locus. Nascitur in collibus, & nonnunquam in pratis & siluis. Floret æstatis fine, aut prin-
 cipio autumnii, vt Augusto mense & Septembri: durantq; in magnam autûni partem
 eius flores, qui tandem flaccescunt, & in pappos abeunt, semine paruo, oblongo,

ASTER Atticus, Matth.



ASTER Atticus alter, Matth.



intybo non multum dissimili. Matthiolus Asterem atticum alterum ostendit, Narbonensi agro prope pratorum margines & fluenta frequentem, auctore Pena, qui Monspeliensium Asterem vocat, quo nulla alia planta melius Asterem Dioscoridis designat. Florem enim edit æstate aureum, circinata, compressa, nec admodum extuberantis rotunditatis Bupthalmi, aut Chrysanthemi, quem ambiunt quina senave foliola, angusta, mucronata, rigida longiuscula, stellam marinam, piscem

piscem ita nominatum non parum referencia : caules pedales , ternos aut quaternos, duros, hirsutos, quibus totis insunt folia oblonga , Lychnidis aut verbasci Salui folij tenuioris, hirsuta, rigidiuscula, viridia, in fusco obscura: radicem capillatam sparsam, sapore astringente, amaricante, non acri, nec ita ingrato: semen Anthemidis, Augusto vel Septembri maturum. In Francia, Belgij, Germaniæ, Galliæ hortis tantum prouenit. Purpurascunt quibusdam in locis florū foliola subtus. Eandem

ASTER Purpureus montanus.



plantam pro Astere attico Lobellius pinxit. Prodest æstuati stomacho imposita, inquit Dioscorides, oculorum inflammationibus, bubonibus, & procidenti sedi. Tradunt, quod in flore purpureum est, si bibatur ex aqua angina correptis, & puerorum comitialibus opitulari. Recens inguinum inflammationibus illita prodest. Sicca sinistra manu dolentis decerpta, inguini adalligata doloribus liberat. Plinius non eadem omnia habet. Bibitur, inquit, & aduersus serpentes. Sed ad inguinum medicinam sinistra manu decerpi iubent, & iuxta cinctus adalligari. Prodest & coxendicis dolori adalligata. Galenus, Aster atticus siue bubonium, non ob id tantum quod illitum, sed etiam quod suspensum bubones sanare creditur, habet quiddam digerens, & præterea quidpiam non minimè refrigerans, ac reprimens, ut mixtæ sit potetia, quemadmodum rosa, verum id non adstringit. Merito etiam Aster dicendus, cognomento purpureus montanus, qui in sabulosis, aridis, & perflatis montium tumulis, ac cliuis gignitur, radice nigricante, lignosa ac dura, fibrata, foliis circa eam multis, humi repentibus, oblongis, angustis, in ambitu non

Vires & Temper.

Li. 27. c. 10.

Li. 6. simpl.

ASTER Atticus supinus, Clusij.



ASTER Conyzoides, Gesneri.



crenatis

crenatis:caulibus dodrantalibus,parum foliosis : flore in caulis vertice anthemidi cæruleæ quam eranthemum vocant, simili, foliolis cæruleis purpureisve, luteum veluti oculum stellatim ambientibus. Hîc addendi Asteres duo. Prior erit Conyzoides Gesneri, facie, foliis, & surculis dodrantalibus Conyzæ minimæ similis, flore Asteris obsoleto luteo. In pappos euanescente. In Anglia, Belgio, & agro Louanienfi reperitur. Alter est Aster humi iacens Clusij, radice perenni, cauliculis multis ab vna radice exeuntibus, per terram magna ex parte sparsis, hirsutis: foliis Asteri secundo Matthioli ferè similibus, sed paulò viridioribus & numerosis. Singuli rami durum & foliosum sustinent caliculum, in quo flos luteus circinata rotunditatis, Buphthalmi aut Chrysanthemi æmulus, quo euanescente caliculi illi indura adeò & lignosa capitula euadunt, vt vngue vix frangi possint, & semen quod in eis continetur & firmiter hæret, erui. Inuenitur quibusdam Castellæ nouæ locis.

BUPHTHALMVM.

CAP. XXXV.

Nomina

Forma.

Diosc. li. 3.
ca. 139.

Lib. 25. c. 8.

BΟΥΦΘΑΛΜΟΝ Græcè, Buphthalmū Latinè, & Oculus bouis dicitur, Arabice *Bihar*, Gallicè *Oeil de beuf*. Cauliculos profert teneros tenuésque, folia fœniculo similia, flores luteos, maiores quàm Anthemis, oculi speciem referentes, vnde nomē traxit. Circa oppida nascitur, & in caëstribus. Eadē ferè Plinius tradit. Est & Buphthalmos similis oculis, folio fœniculi, circa oppida nascens, fruticosa caulibus, qui & manduntur decocti. Quidā Cachlan vocāt. De vero Buphthalmo variæ sunt recetiorum herbariorū sententiæ. Nōnulli putant herbā in pratis & agrorū marginibus nascētem, quam Bellidem maiorem diximus, Buphthalmum esse, quod florescit intus luteo, foris

BUPHTHALMVM,

Matthioli.

Ca. 52. hist.

Ca. 339. li. 3.



albis foliolis circundato, anthemide maiore. Alij in quibus est Fuchsius, eam quæ Officinis Cotula non foetida dicitur, cui, vt superiori, flos totus luteus non est, cuiusmodi Buphthalmo esse debet, sed toto ambitu candidus. Matthiolus aliud Buphthalmum, quod legitimum esse censet, depinxit, toto flore luteo. Dalechampius ab his diuersum ad Rhodani ripam propè fossas marianas proueniens, radice breui, tenui, candida, capillata, caule palmum longo, tereti, gracili, subrubro, foliis fœniculi per ramulos, è caule prodeuntes sparsis, flore anthemidis, prorsus luteo, media sui parte velut exculto & cauo, oculi figura, vnde & nomen ei positum. Idem videtur esse Chrysanthemū Valentinum Clusij, quod ipsemet ad Buphthalmi genera potius referendum censet, nisi quis Achillææ speciem esse malit. Lobellius etiā Buphthalmum tenuifolium Narbonense vocat. Dodonæus stirpem aliam pro genuino Buphthalmo proponit, cui cauliculi exeunt è radicibus, tenues, tres, aut quatuor, aut plures, pedales, vel altiores, circa quos folia virentia, tenuiter dissecta, similitudine foliorū fœniculi, sed multò quā illius minora, flores in summo cauliculorum magni, calendulæ satis similes, colore luteo magis dilutò, staminibus in medio luteis, quibus capitulū succedit ex multis seminibus simul congestis commissum: radices tenues sunt & fibratæ, veratri nigri radicibus similes. Nascitur plerisque Germaniæ & Bohemiæ locis incultis. Alibi hortensis est.



BVPHTHALMVM
Alterum, Pena.



Maio mense aut Iunio floret. Sunt qui velint stirpem hanc veratri nigri speciem esse, nonnulli consiliginem, quidam Sesamoides, alij Elleborastrum: cui nulla harum appellationū conuenire potest vt perspicuè docet idem Dodonæus, sed solum Buphthalmi nomen, vt ille existimat. Pena idem Buphthalmum exhibere videtur, quod ex Dalechampsio hīc pictum damus. Alterum addit folio & facie Cotulæ foetidæ, repertum secus Arantiorum lucos Olbię in Galloprovincia maritima. Caules promit flexuosos, cubitales, & duos pedes altos, quos ambiunt folia tenella Anthemidis, latiora, Cotulæ foetidæ paria. Flores sunt radiati, lutei Chrysanthemi aruorum, aut Calthæ sponte nascentis. Hanc etiam se reperisse, ait in agro Romano. Buphthalmi flores, auctore Dioscoride, cum cerato triti œdemata & duritias discutiunt. Aiunt si statim post exitum à balneo bibatur, bonum colorem morbo regio affectis ad tempus aliquod inducere. Breuius Plinius, hæc cum cera scirrhomata discutiit: vbi suo more cum cera dixit pro σὺν κηρῶν, idest,

De flo. c. 62

Lib. 3. c. 139.
Vires & Temper.

Lib. 25. c. 8.

Li. 6. simpl.

cum cerato. Galenus, Buphthalmum, inquit, sic appellatum est à floribus, qui figura quidem boum oculis videantur adsimiles, colore autem anthemidis floribus simillimi sunt, sed multò tum maiores, tum acriores, quare & vehementius digerunt, adeo vt & duritias sanent cerato misti.

APHYL

Nomina

Li. 21. ca. 6.



HEOPHRASTVS inter ἐπιγδοφυλλὰς, idest, plantas quæ circa radicē folia fundunt, recenset ἀφύλλανθες: quo loco Gaza φυλλανθὲς legit, vertitq; fraudiflorā, deceptus fortasse deprauata Plinij lectione. Cum verò in omnibus ferè plantis ea sit florum constructio ac figura, vt foliorum certo numero quisq; flos constet ambitum floris occupantium, & medios apices velut circumuallantium, vt in leucoijs omnibus, & aliis ferè innumeris, nunc varia figura stamina, fila, & id genus alia in medio extantia amplexantium, vt in voluulo, lilio, & similibus, paucis id contigit, vt florem in foliola non explicatum & expansum sortita sint, quod genus Aphyllanthes Græci vocauerunt, quia flores foliis careant. Aphyllanthis species tres ex Dalechamptio hîc depinguntur, & describuntur. Aphyllanthes primum radice constat breui, candida parum fibrata, cauliculis multis, interdum cubitalibus, sæpius humilibus, angulosis, infernè rubentibus, hirsutis, foliolis multis per caulem totum sparsis, oblongis, angustis, gnaphalio vulgari similibus, flore in caulis fastigio singulari, caruleo, non ex foliolis, sed ex apicibus, seu staminibus caesis, densius congestis compacto, scabiosæ florem æmulante, sapore in caulibus & foliis principio cum herba manditur, nullo, deinde


APHYLLANTHES, I.



Genera.

Forma.

APHYLLANTHES, II.



APHYLLANTHES, III.



subdulci

subdulci. In aridis & squallidis prouenit. Floret Iunio mense. Hanc plantam Dodonæus tertium scabiosæ genus facit. Aphyllanthes secundum radice est parua, breui, candida, foliis propè radicem multis, saluix, aut betonicæ, longo pediculo nixis, parum dissectis, caule pedali nonnunquam altiore, paucis in eo foliolis, flore in summo caulis vertice cæruleo, ex apicibus multis coagmentato, deorsum nutante, sine vllis foliolis. Caulis & folia cum franguntur lacteum succum reddunt. Quidam morsus diaboli genus esse putant. Gignitur in pratis montosis. Tertium radice est parua, fibrata, alba, foliis circa radicem multis, humi stratis, ex viridi nigricantibus, subrotundis, bellidis, in caule paucis aut nullis, caulibus duobus aut tribus pedalibus, rotundis, flore in cacumine cæruleo, aliis generibus supra descriptis simili, paulò latiore, corymbi forma, sapore in tota planta amaro. Hanc Bellidem cæruleam vocat Pena, quæ à florum glomis globisve Globularia à recentioribus nominatur, præsertim à Monspeliensibus.

Locus.

Tempus.

Lib. I. ca. 7.

O N A G R A.

CAP. XXXVII.



ΝΑΓΡΑ, ὀνοθήρα, ὄνυξις Dioscoridi, ὀνοθήρα Theophrasto, ὄναρον, ὀνοθήρα, ὀνοθις Galeno, Latinè similiter Onagra, siue potius Oenagra, & Oenothera, Oenotheris, Oenuris à vino dicta. Frutex est arboris specie, ita describete Dioscor. admodum magnus, folia habes amygdalæ similia, sed latiora, & lilij foliis similia, flores rosarum specie, magnos, radicem albam, longam, quæ siccata vini odorem reddit. Nascitur in montanis locis. Eadem Plinius tradit. Et œnothera, siue onuris hilaritatem afferens in vino, amygdalaceo folio, flore rosaceo, fruticosa, longa radice, & cum siccata est vinum olente. Hæc in potu data feras quoque mitigat: Quæ ex Theophrasto descripta sunt: ἡ δὲ τῆς ὀνοθήρας ῥίζα, inquit, διόθεν ἐν οἷνῳ παρότερον ποιεῖ τὴν ἰλαρώτερον τῷ ἥθει. ἔχῃ δὲ ὁ ὀνοθήρας τὸ μὴ φύλλον ὅμοιον ἀμυγδαλῇ, πλεονότερον δὲ τὸ ἄνθος ἐρυθρὸν ὥσπερ ῥόδον. αὐτὸς δὲ μέγας ὡς γάμος, ῥίζα δὲ ἐρυθρὰ καὶ μεγάλη. ὅρφ δὲ ἀνανθήσεως ὥσπερ οἶνος (corruptè: legendum enim ex Dioscoride & Plinio, ὅρφ δὲ ἀνανθήσεως ὥσπερ οἶνος) φιλεῖ τὸ ὅρφνὰ χεῖρα. Idest, Gaza interprete. Contra radix œnothere data in vino mitiores hilarioreſq; mores

Nomina

Lib. 4. c. 13

Li. 26. c. 11.

Lib 9. hist cap. 21.

O N A G R A.



reddit. Constat œnothera folio amygdalæ, verum maiore, flore rosaceo: loca adamat mōtosa. Omisit Gaza, αὐτὸς δὲ μέγας. &c. Oenothera magnus est frutex, radice rubra & magna, quæ siccata vinum olet. Stirpem hanc diu & multum quæſitam fortasse nondum repererunt herbarij: tamen eruditi quidam ex coniectura hanc exhibent, quæ frutex est prægrandis, ad hominis enim altitudinem affurgit, folio amygdalino, sed latiore longioréque, siue saligno, quam ob causam quidam Salicariam appellarunt, caules inæqualiter distinguente, flore in summis caulibus rosaceo Dioscoridis & Theophrasti sententia, quorum hic ἄνθος ἐρυθρὸν ὥσπερ ῥόδον requirit, ille ἄνθη ῥοδοειδῆ, quod de floribus expansis intelligendum: nam initio conclusi veluti spicatim coaceruantur: semen minutulum siliquis includitur, lanugine obductum. Radice niritur crassa, longa, furculosa, cortice è nigro rubescente, intus candida. Qua ratione Theophrastum cum Dioscoride conciliabis, qui radicem candidam

Locus.
Vires.
 Lib. 4. c. 13.
 Li. 24. c. 17.
 Li. 26. c. 14.
 Li. 8. simpl.

describit, Theophrastus rubrā. Nascitur in montibus. Aqua in qua radix maduerit in potu data auctore Dioscoride, feras mitigat, & cicures reddit: illita quoque maligna vlcera mulcet. Adiecit Crateuas, inquit Plinius, ænotheridem, cuius aspersu è vino feritas omnium animalium mitigaretur. Et, per se ænothera efferantia sese vlcera sanat, ita *ῥηρώδη ἔλκη* Dioscoridis exponens. Huius radix, inquit Galenus, arefacta vinosum quiddam redolet. Sed & facultatis vini est maximè.

LINARIA RUBRA.

CAP. XXVIII.

Nomina
 Lib. 25. c. 9.
 Lib. 3. c. 84.
Forma.
 Ibidem.



LANTA hæc herbariorum quorundam iudicio Therionarca est Plinij, fruticosa, foliis subuiridibus, flore roseo, at Delphinium Dioscoridis. Radicem mittit longam, subluteam, lignosam, singularem: caules multos, rubentes, ramosos: folia Linariæ, longa, angusta, candicantia, seu ex viridi pallentia, densius stipata, gustu acerbissima: flores violæ similes, puniceos, quatuor foliolis constantes, quæ totidem apicibus eiusdem coloris à sese dirimuntur: è medio fila extant pallida: semen paruum in siliquis longis, tenuibus, pappo plenis abditur. Eiusmodi planta cum hæc sit, à plerisq; an Delphinium sit Græcorum non sine causa ambigitur, quod huius folia incisa non videantur, qualia Delphini à Dioscoride describuntur. At si diligenter notas à

LINARIA Rubra.



Locus.
 Li. 24. c. 17.

Dioscoride memoratas expendamus, à Delphini historia parum distat, siue natales spectemus, siue caulium numerum & magnitudinem, siue folia *ἑπεχομενία*, idest, diuisa, non per ambitum insecta, sed ex vno veluti tuberculo multa exeuntia, deinde in longum pectinatim diffissa Pinastris modo, quo vocabulo in ea notione Theophrastus vtitur, siue florem leucoij purpurascentem, siue cum siliquis semen milio proximum. Similitudinem cum Delphino quidam in foliis obseruandam censent, Delphini rostrum acutum & oblongum imitantibus: Alij foliorum colorem Delphino similem esse interpretantur, quod glauca sint eius piscis modo. Fortasse quidem absurdum non fuerit Therionarcam Plinij & Delphiniū Dioscoridis eandem esse plantā existimare, præsertim cum eadem vtriusq; facultates ab illis auctoribus tradantur, vt deinceps dicetur: nec alibi Delphini mentionem Plinius faciat. Planta ista prouenit in asperis & apri- cis, sicut & Delphinium Dioscoridis. Plinio in Cappadocia & Mysia Therionarca Magica, (non Nostras quæ ab ea differt) nascitur. Therionarca Magica omnes feras torpescere, nec nisi hyænæ

Li. 24. c. 17.
 Lib. 25. c. 9.

vrinæ aspersu recreari auctor est Plinius. Et alio in loco, Serpentes necat, inquit, & cuicumque admota feræ torporem adfert. At cum Therionarca dicatur, quod sit *τῶν ῥηρώων νάρκη*, hac admota non feras omnes torpescere, & serpentes necari, sed venenatas tantum bestias, & morsu ictuue noxias, melius fortasse dixisset Plinius. De Delphinio verò scripsit Dioscorides, semine nihil vtilius bibi posse à scorpione percussis. Aiuntq; obiecta herba scorpiones resolui, atque ignauos torpescere: semota verò ea sese recolligere.

HELENIVM.

CAP. XXXIX.

HÆ'NION, Latine Helenium & Inula, Apuleio Inula Campana, Officinis Enula cāpana, Arabicè *Iasin*, siue *Kafen*, Italicè *Lella*, *Enola* & *Enoa*, Germanicè *Alant*, Gallicè *Aunee*. Ab Helenæ lacrymis Helenium dictum esse volunt, ex quibus natum fabulantur. Alij quod contra serpentes ex eo primum ab Helena remedium inuentum sit. Alij ab Helena insula, vbi longè optimum luxuriat. Folia habet, vt describit Dioscorides verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibusdā in locis non emittit: radicem subalbidam, interdum subrufam, odoratam, subacrem, vegetam, magnam, ex qua agnatæ propagines liliorum aut ari modo feruntur. Montanis vmbrosis & siccis prouenit. Vulgati codices habent *ἀνέμοις*, idest, succis, alij *ἐνέμοις*, idest, humectis, idq; rectius Hæ notæ omnes in Inulam vulgatam prorsus competunt, nisi quod folia ille comparat verbasco *τενοφύλλω*, nostræ autem Inulæ folia non solum sunt verbasci *τενοφύλλω*, sed etiā *πλεόφυλλω* multò latiora, vt hoc loco Græcus codex mendosus sit, & non solum hoc, sed aliis etiam huius capituli locis, teste Marcello Florentino, affirmante se habuisse vetustissimum & probatissimum Dioscoridis codicem, in quo multò plura legebantur, quàm in cæteris omnibus Græcis exemplaribus. Quod igitur de floribus & aliis partibus illic deesse, hîc ampliøre delineatione suppleri sic potest. Helenium folia profert grandia, lata, verbasci latifolij latiora, longiora, hirsuta, in acutum desinentia, dorso prominente: caulem inter hæc, duos, tres, interdum quatuor cubitos procerum crassum, hirsutum: in summo florem luteū, siue aureū, stellatum Chrysanthemi modo, sed maiorem: semen verbasculo simile, tactu pruritus faciens: radicem vegetam, grandem, tortuosam, exterius nigricantem, interiùs candicantem, sapore amaro, subacri, ex qua agnatæ propagines feruntur. Sicca multò acriore est odore & sapore, magisque aromatico, quàm cum recens adhuc est. Loca amat vliginosa, in montibus etiam vmbrosis nascitur, & in siluis. Iunio & Iulio mensibus floret, Augusto semen maturefcit. Potum radice decoctum, auctore Dioscoride, menses & vrinas ciet. Ipsa in eclegmare ex melle prodest tussi, orthophnœæ, ruptis, conuulsis, inflationibus, & serpentū morfibus. In summa excalfacit. Folia eius ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinuntur: radix & stomacho vtilis est in passo condita. Trita potaque ad cruentas excreationes efficax est. Plinius non vno loco Inulæ meminit. Breuior his est, sed

Nomina

Forma.

Lib.1. c.27.

HELENIVM, Matth.



hirsutum: in summo florem luteū, siue aureū, stellatum Chrysanthemi modo, sed maiorem: semen verbasculo simile, tactu pruritus faciens: radicem vegetam, grandem, tortuosam, exterius nigricantem, interiùs candicantem, sapore amaro, subacri, ex qua agnatæ propagines feruntur. Sicca multò acriore est odore & sapore, magisque aromatico, quàm cum recens adhuc est. Loca amat vliginosa, in montibus etiam vmbrosis nascitur, & in siluis. Iunio & Iulio mensibus floret, Augusto semen maturefcit. Potum radice decoctum, auctore Dioscoride, menses & vrinas ciet. Ipsa in eclegmare ex melle prodest tussi, orthophnœæ, ruptis, conuulsis, inflationibus, & serpentū morfibus. In summa excalfacit. Folia eius ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinuntur: radix & stomacho vtilis est in passo condita. Trita potaque ad cruentas excreationes efficax est. Plinius non vno loco Inulæ meminit. Breuior his est, sed

Locus.

Tempus.

Lib.1. c.27.

Vires &

Temper.

Lib.19. c.5.

Lib.20. c.5.

Lib.6. simpl.

Et mox illustrata maximè Iuliæ Augustæ quotidiano cibo. Superuacuum eius semen: quoniam oculis ex radice eius excisis, vt arundo feritur. Et Inula quoque à ieiunis commanducata dentes confirmat, si, vt eruta est, terram non attingat. Condita tussim emendat. Radicis verò decoctæ succus tineas pellit: siccata autē in vmbra farina tussi, & conuulsis, & inflationibus, & arteriis medetur. Venenatorum morsus abigit: folia ex vino lumborū dolori illinuntur. Galenus de eadem

ita scripsit, Helenij radix maximè utilis est, nō primo statim occurſu excalfaciēs, ac proinde non dicenda calida & sicca exquisitè, ceu piper tum atrum, tum candidum, sed cum recrementitio humore. Quapropter eclegmatis, quæ faciunt ad educendos ex thorace & pulmone crassos lentosq; humores idoneè commiscetur. Rubrificant quoque ea partes frigidis ac diuturnis vexatas affectibus, cuiusmodi sunt ischiades, & exiguæ assiduæq; articulorum procidentia ac luxationes. Hæc Galenus. Vinū quod ex Helenij radicibus passim in Germania paratur, frequenter in potu sumptum, mirificè visum acuit. Arida radicis farina denarij pondere diebus aliquot ex vino vetere hausta spleniticos iuvat, Helenij radicū succus cum pari hyssopi succi pondere, & aquæ stillaritiæ tussilaginis triplicato pondere, saccharique quantū sat fuerit, ad mellis spissitudinem decoctus, magnopere asthmaticos iuvat, si frequenter vtantur. Sicca radix foris utilis est, sin intro sumas humente adhuc, atque recenti vtendū, præsertim in pulmonis chronicis affectibus. Aliud à superiore Helenij genus in Ægypto gigni Crateuas tradit, auctore Dioscoride, quod plantæ hîc depictæ aptius competere quàm ulli alij quidā existimant. Est enim radice palmum longa, supernè crassa, infernè gracili, multis fibris capillata, lignosa, cortice nigro subrubente, intus pallida, cauliculis plurimis, rotundis, humi quaquaversum fuis, serpilli modo, cubitalibus, foliis lentis serpilli, sed maioribus, longioribus, amplioribus, circa ramulos crebris, nonnihil villosis, flore violæ aureo, quinque foliolis constante, multis in medio filis extantibus, pallidis, antequam dehiscat corticoso loculo abdito. In aridis agris, lapidosus & sabulosus nascitur. Ab hoc Helenio secundo quod descripsimus Helenium Theophrasti *φρυγανώδες* vt odoratum multum differt, quod Marum nostrum quidam esse putant, vulgò *Mastich*.

*HELENIVM Minus,
Dioscorid.*



HELIANTHE.

CAP. XL.

HELIANTHEN Plinius inter magicas recenset. Helianthen, inquit, vocat in Themiscyra regione & Ciliciæ montibus maritimis, folio myrti. Hac cum adipe leonino decoctā addito croco & palmeo vino perungi Magos & Persarum Reges, vt fiat corpus aspectu iucundum: ideo eandem Heliocallidam nominari. Ex qua breui declaratione iudicare difficilè est quænam hodie sit hæc planta. Plerique tamen Helianthen siue Helianthemum, id est, Solis florem esse putant, eam quæ hîc picta est, interdum humi repens, interdum erecta, si pedamenta quibus fulciatur nacta fuerit: cauliculis numerosis, tenuibus & gracilibus: foliis oblongis, carnosiss, hyssopi hortensis ferè aut ledi, sed breuioribus, leuiter hirsutis, quibus lentus inest succus. Flores in cacumine exeunt exigui, veluti paruulæ quædam rosæ, sed minores, pares forma & magnitudine floribus Argentinæ siue Potentillæ dictæ, in vna candidi, in altera lutei: radices tenues, lignosæ rufescentes. Nascitur in asperis, siccis & apricis, tam campestribus quàm montanis locis. Æstiuus mensibus floret. Dodonæus & Tragus

Hyssopum

Marth. in
ca. 27. li. I.

Li. I. ca. 128.

Forma.

Locus.

Li. 24. c. 17.

Nomina


Forma.

Locus.

Lib. 6. hist.
ca. 12.

Hyssopus nemorensis, Dod.

Species Pena.



Hyssopum nemorensem vocant, Germanicè *Heyden yso*p, & *Feld yso*p, pleriq; Latine Gratiam Dei. Est tamen & alia herba Gratiola à recentioribus dicta. Cordus & pleriq; vt diximus, Helianthemum & Solis florem appellant. Clusius Cisti humilis nomine depinxisse videtur. Dodonæus quoque in florum historia ad Cisti ledi genus refert. Monspelij etiam Cisti parui speciem fecerunt. Quidam Chrysocomem, eam, scilicet, in cuius floribus luteus, siue aureus color relucet: cui tamen Chrysocomes historia parum competit. Alij Helenium secundum Crateuam. Matthiolus plantam eandem Solis florem à recentioribus appellatam, quæ folium habet oblongum hyssopi ferè modo, surculos multos, tenues, lignosos, florem pentaphylli, sed maiorem, aureo colore, radicem lignosam, rufescentem, gustu adstringentem, à quibusdam pro Panace Chironio censerì refert. Sed cum Panaci Chironio Dioscorides tribuerit folia amaraco similia, radicem gustu acrem, illorum sententiæ non subscribit. Florem itaque Solis in Symphytorum genere esse censet: quoniam facillè vulnera glutinat, & sanguinem manantem sistit: oris & pudendorum vlcera sanat: in vino decocta, si eo vlcera abluantur. Datur potui ad cruenta sputa, & ad dysenteriam vnà cum radicibus contritus: præterea ad mensium abundantiam. In summa vbi agglutinare, cohibere, & roborare opus sit, ea omnia perinde præstat, ac cætera Symphytorum genera, Matthiolo auctore. Aliam Helianthes speciem raram pingendam curauit Pena, ex iugis arduis môtis D. Bonauenturæ, non procul Aquissextiis erutam, radice lignosâ, paulum inflexa, superne & inferne nodosâ, è qua emergunt, viticulæ palmares, iunceæ, rectæ, flexiles, albidæ, foliolis lentis aut colutæ scorpioidis, ex glauco virëtibus ab imo summo tenus stipatæ, floribus aureis & caliculis Helianthes supra descriptæ: semine item non dispari, pusillo, Cisti ledi, amaro gustu.

Lib. I. c. 73.

Li I stirp.
Hispa. c. 35.

Cap. 50. li 3.

Vires.

Dodon.

Nomina

Forma.

Locus.

ASPERULA Carulea, Lob.

Tempus.

Vires &

Temper.



V M florum venustate, tum grato totius plantæ colore inter coronarias hæc meritò recensenda, quæ Latinis Asperula, tamen non nisi semine aliquantum aspera, & Aspergula, & Spergula odorata, & Herba stellaris, Gallis *Muguet*, Germanis *Hertzfreydt*. Quorumdam iudicio Alysson Plinij ab Erythodano foliis tantum differens & minoribus ramis: ab Alyssso Galeni, lib. 2. de Antid. etiam distans, quod est Marrubio simile, asperius, spinosius circû globulos: floris colore ad cyaneum vergente. Cauliculos multos edit quadratos, geniculatos: circa singula genicula septena vel octona folia, stellatim radiata, aparin e, latiora, magisque virentia, non aspera. In summis caulibus flores candicant, odore suavi, vt & tota planta: semen rotundum & nonnihil asperum. Rarò alibi quàm in hortis, vbi odoris commendatione colitur: alioqui locis opacis gaudet, & parietinis vdis. Maio mense floret, odoréque tunc est præstantiore. Caloris & siccitatis particeps est, gallio facultatibus proxima. Vulnera cicatrice obducere aiunt, & vino iniectum cor recreare, & iecur malè affectum roborare. Carulea in Flandriæ hortis, teste Lobellio, interdum in agris visitur, sed inodora, foliis hirsutis Aspergulæ. Semen item & flores non dissimiles, sed carulei summis stellatim digestis foliolis procumbunt: radice rubente, tenui & oblonga Perperam Alysson Galeni.

AMARANTHVS PURPUREVS. CAP. XLII.



LOS eximiæ venustatis, & non solum recens, sed & exsiccatus diutius purpureum & flammeum colorem conseruans, ideo ad corollas etiam hyeme conficiendas aptissimus, huic

herbæ nomen Amaranthi dedit, quod non marcescat, herbariis quibusdam nostræ ætatis, ex amore & anthos dictionem cõponi credentibus, flos amoris vocatur, à Germanis hanc appellationē vsurpantibus, *Flor amor*, aliàs *Samarblum*, Gallis *Passenelours*, indicantibus eo nomine, inquit Ruellius, sericum coccineum, quod Carmesinum nuncupant, cum quo de coloris principatu certat, superari: Italis *Fior veluto*. Caule est cubitali, altiore, striato, prope radicem rubescente, læui, ramoso: circa quem folia oblonga, lata, acuminata, mollia, glabra, virentia, aut in virore nonnihil rubentia. inter quæ secus ramulos pro floribus exeunt spicæ aspectu gratissimæ, sed inodoræ, in purpura splendentes, coccum saturatum qui in holo


serico

AMARANTHVS Purpureus, Matth.

serico villosio micat, referentes, ac quodammodo coloris gratia superantes, attritu simili ferè colore succum reddentes, quæ decerptæ diutiùs pulchritudinem suam retinent, aliquot etiam annis non marcescentes, vnde & nomen inuenit. Semen maturatis spicis insidet paruum, nigrum, & multum splendens. Radices breues sunt & fibratæ. Docti herbarij censent hunc esse a maranthum Plinij sic scribentis. Amarantho non dubiè vincimur. Est autem spica purpurea veriùs quàm flos aliquis, & ipse sine odore. Mirum in eo gaudere decerpi, & lætius renasci. Prouenit Augusto mense: durat in autumnum. Alexandrino palma, qui decerptus asseruatur, mirumque, postquam defecere cuncti flores, madefactus aqua reuiuiscit, & hybernas coronas facit. Summa eius natura in nomine est, appellato, quoniam non marcescat. Hæc Plinius. Est hæc planta Trago Circæa, phlox siue flamma Theophræ. Anguillaræ. Lobellius alium pinxit Amaranthum simplici spicata panicula, ab imo ad summum vsque singulis spicatis floribus coccineis, saturatè pun-

Lib. 21. c. 3.

cantibus luxuriat, omnia superiori non dissimilia, sed folia angustiora, exiliora. Item alium holosericeis, sanguineis, reticulatis floribus, hilariore aspectu. Is eximie venustatis & rarior in hortis Italicis colitur, vbere florum prouentu, eorum summis in arcum curuatis, colore rubro, vegeto, & planè cruento: semine copioso.

AMARANTHVS Angustifolius, Lobellij.*AMARANTHVS Holosericeus, Lobellij.*

Locus. A mulierculis magna diligentia in hortis & fictilibus colitur. non solum ad ferta & coronas factitandas, sed etiam ad matricis renūque profluvia sanguinea, vlceraque sanie manantia. Aiunt enim recentiores facultate frigida siccaque esse, quare florem eius epotum celiacis & dysentericis prodesse, mensium abundantiam cohibere, & albas vteri fluxiones. Præterea cruenta expuentes iuuare, præsertim cum in pectore aut pulmone vas aliquod ruptum fuerit, nec id sine ratione: nam Amaranti omnes, auctore Lobellio, refrigerant, adstringunt & siccant.

Matth. in
c. 52. lib. 4.

FRAXINELLA.

CAP. XLIII.

Nomina

Forma.



LORES quoque speciosi & suauissimè redolentes, imò totius plantæ pulchritudo hanc nobilitarūt, nec à Græcis, nec ab Arabibus fortasse cognitam, quæ à foliorum Fraxini similitudine Fraxinella dicta est à recentioribus, à nonnullis pumila fraxinus, ab aliis Dictamnium album. Caulem edit sesquicubitalem & bicubitalem, rotundum, asperum, folia Fra-

FRAXINELLA, Seu
Dictamnium album.



Locus.

Tempus.

Lib. 4. c. 44

Dod. lib. 3.

cap. 21.

Pena fol.

410.

In cap. 44.

lib. 4.

In cap. 33.

lib. 3.

Vires.

xini, in caulis cacumine flores citrei mali non absimiles, odore cum quadam graueolētia iucundo, in purpura albicātes, vt in malua, è quorum medio staminula quædam pendula porriguntur, radicibus nititur multiplicibus, albicātibz, mutuo amplexu hærentibus, minimum digitum crassis. Singulos flores delapsos quaternæ aut quinquæ excipiunt siliquæ scabro exterius cortice, tactu viscidæ, grauis odoris, ferè hircini, in quibus semen nigrum, læue, pellucidum. Nascitur in collibus cliuosis & saxosis. Iunio & Iulio mensibus floret. Pena Tragium prius à Dioscor. descriptum lentisci facie, huic planè quadrare asseuerat, cum magnis rationibus, frustra dissentiente, vt is putat, Matthiolo. Cæterum videtur repugnare quod lacteū succum non mittit, id quod historia Dioscoridis postulat. Huius radicibus non temerè vsi sunt practici, eodem Matthiolo auctore. Attenuant enim, aperiunt, prouocant, abstergunt. Adduntur vtiliter antidotis quæ ad venena & venenatorū animalium ictus parantur, necāt interaneorum vermes drachmæ pondere haustæ.

Dantur contra frigidos vteri morbos, menses, secundas, & mortuum fœtum educunt, tum suppositæ aut cum pulegio suffitæ, tum ex vino meraco potæ drachmarum duarum pondere. Valent ad alui tormina, & ad renum calculos eiiciēdos eodem pondere. Miscentur commodè potionibus internorum vulnerum, & foris admotæ vi epispastica præditæ sunt. Quidam iisdem vsi sunt ad morbum hispanicum drachmam quotidie præbentes ex Gaiaci decocto, non sine magno ægrorum commodo. Datur quoque comitialibus, & in aliis frigidis cerebri affectibus. Præstant contra pestilentie contagia, quocūque modo sumantur. Siliquæ & flores tactu pruritum excitant, & in calidioribus regionibus cutem vlcérant.

CHRYSANTHEMVM *Matthioli.* CAP. XLIIII.

CVM multæ sint plantæ aureis floribus decoræ, idè Chrysanthemum appellatione dignæ, difficile admodum iudicatu est, quamnam plantam verum Dioscoridis Chrysanthemum referat, præsertim quum quæ Dioscorides capite de Chrysanthemo refert, eadem omnia capite de

Lib. 4. c. 53.

CHRYSANTHEMVM,
Matthioli.CHRYSANTHEMVM,
Miconi.

buphthalmo tradiderit. Præterea Plinius Chrysanthemum seorsum non meminit, nisi quod elichrysum quibusdā Chrysanthemum vocari dixit. Nec Galenus, nec Aegineta quasi Chrysanthemum foret buphthalmū, aut nominetenus distarent, vspiam Chrysanthemum meminērunt, sed buphthalmum iisdem quibus Dioscorides verbis posteritati mandarunt, penèque persuaserunt commentitium vel spurium caput de Chrysanthemo esse, vel cuiuspiam librarij industria nominis & ordinis quadam consecutione illecti, illuc inter chrysogonum, chrysocomē, heliochrysum & ageratum apud Dioscoridem adscitum, eodemq; penè orationis filo & viribus quibus buphthalmum. At id negat Matthiolus, & discrimen inter buphthalmum & Chrysanthemum, & particulares vtriusque notas has ostendit. Primum inquit, folia buphthalmi sunt fœniculo similia, quæ planè capillacea sunt, Chrysanthemo verò tenera, multifida, minutimq; per ambitum lacinata. Deinde Chrysanthemum caules in cibis manduntur cæterorum olerum modo, quod de buphthalmo scribens ille omisit. Ad hæc flores buphthalmi anthemidis floribus comparauit, Chrysanthemum verò luteos, & vehementer splendentes esse dixit. Iam verò buphthalmi flores cum cerato triti tumores duritiæque discutere tradidit in vniuersum, Chrysanthemum verò flores steatomata discutere priuatim dixit. Cum igitur hæc sint plantarum discrimina caput de Chrysanthemo hoc pacto legendum censet Matthiolus. Chrysanthemū herba est tenera, fruticosa, læues proferens caules, & folia multifida, flores luteos, admodum splendentes. Eius caules manduntur olerum modo, flores cum cerato triti steatomata discutere produntur. Cui descriptioni nulla prorsus reclamatur nota inquit ille, huius plantæ quæ legitimum Chrysanthemum esse censet, quod frequentissimū prouenit in Senensi agro, præterea in Bohemia, Moravia, & Austria, idq; in campis cuius foliis, infima plebecula in Hetruria pro olerum vescitur. Eandem Chrysanthemum segetum nomine pinxit Lobellius. Dodo-

Lib. 3. c. 149

Pena fol. 345.

In Cap. 3. lib. 4.

- Nomina** nœus etiam Chrysanthemum vocat. Alterum Chrysanthemi genus vocat Myconus hîc depictum, à sapore, odore, figura florum, & naturalibus iisdem cum Matthioli Chrysanthemo. Castellani apud quos frequens nascitur. Giralda nominant,
- Forma.** fruticosa est herba, multos ex radicibus proferens caules, cubitales, rubescentes, solidos, lineis per longitudinem ceu striis distinctos, furculosos, in quibus folia longa, lata, digiti amplitudine, neruosa per ambitum serrata. In caulium summitatibus visuntur flores in ambitu lutei, pulchri, tam interna quàm externa parte Chrysanthemi superioris floribus similes : Radices subsunt candidæ lignosæ, multis capitamentis fibratæ, per summa terræ sparsæ. In pratis & campestribus passim prouenit. Floret Maio & Aprili. Sapor idem qui Chrysanthemi.
- Locus.**

CHRYSANTHEMV M PERVNIANVM.

CAP. XLV.

- Nomina** **L**ANTAS omnes aureo flore ornatas tum pulchritudine, tû magnitudine superat planta, quæ (Chrysanthemum Perunianum nominatur, quod in Peru aliisq; quibusdam Americæ prouinciis repertum fuisse dicatur, & inde ad nos delatum:) planta maxima dicitur ab aliis Solis flos, Sol Indianus, Lusitanis Gigante. Est enim procera admodum stirps, vt quæ in Hispania vsque ad viginti quatuor pedes adolescat. Qualem autem vidi
- Locus.**

CHRYSANTHEMV M Perunianum,
sive Planta maxima.

SOLIS FLOS
Minor, Lobell.



- Forma.** Lugduni in horto Rouillij, talem hîc describo. Ad duodecim fere pedes accreuit, caule recto, rotûdo, valde crasso, nodis multis referto, ex quibus pediculi enascuntur, præsertim à medio caule vsq; ad summum, digitum crassi, pedem longi, sustinentes folia in exortu pedem lata, pedem & dimidium longa, acuminata, aspera, supernè ex atro virentia, infernè pallida. Caulis summitas in rotundum & tuberosum capitulum desinit, quod gliscente flore in scamas multas, densius congestas, veluti in cinara crassas, ex nigro virentes, valde acuminatas sed non pungentes dehiscit,

dehiscit, quæ florem circumplectuntur ex innumeris foliis densius stipatum, longis, crassis, acuminatis Liliij purpurei maioris quodammodo similibus, sed maioribus, & auri luteo colore splendentibus: quæ prorsus aperta & expansa discum, siue orbem ostentant pedem latum, initio luteum, deinde rufescentem. Totus flos deorsum valde nutat. Est & flos Solis alter minor, caule alis brachiato, foliis similibus, & florem minorem foliis in stellæ morem cingentibus

POLYANTHEMVM. CAP. XLVI.

Pολύανθεμον, & Latine Polyanthemum à nonnullis batrachium dicitur, id est, ranunculus, quod ranunculo persimilis sit, Gallis *Bassinet*, Germanis *Schmaltzblum*. Duum est generum, simplex, & multiplex. Hoc caules habet graciles, folia nigricantia, incisa, ranunculi, tamen latiora, flores densos & duplices, auri obryzi colore nitentes, ob quam floris gratiam in coronariarum herbarum numerum ascita fuit: radicem multum fibratam. Denique ranunculum aureum prorsus referret, si folia nigris maculis signata haberet, & si ranunculi modo linguam vreret. In campestribus herbis crescit, in hortis etiam colitur. Aprili *Temper.*

Nomina

Forma.

POLYANTHEMVM
Multiplex, Dodon.POLYANTHEMVM Simplex,
Dodon. Chrysanthemum, Fuch.


menſe floret, ac deinde tota ferè æſtate. Polyanthemum ſimplex caules habet graciles, nudos, folia nigricantia, incifa, ranunculi non multum diſſimilia, latiora tamen, nec tam altè incifa, flores auri colore nitent, ranunculi aurei floribus prorsus ſimiles: radix eſt fibrata. Calida ſiccàque eſt facultate, non tamen æquè ac ranunculus. Dodonæus Plinij Polyanthemum eſſe putat, de quo hæc ſcribit. Polyanthemum, quam quidam batrachium appellant, cauſtica vi exulcerat cicatrices, & ad colorem reducit. Eadèmq; vitilignes concorporat. Dodonæus tamen ſcribit plantam iſtam batrachij modo linguam non vrere.

Temper.

Lib. 3. c. 74.

Lib. 27. c. 12

CHRY



CHRYSAEAM hanc vocant Herbari; ob floris aureum splendorem. Nascitur in montium pratis, radice subnigra, fibris multis capillata, caulibus multis, cubitalibus, geniculatis: foliis Solani, longioribus, acuminatis, per ambitum laciniatis, per intervalla ex caule erumpentibus, ex quorum sinu furculi vel florem sustinentes, vel foliis vestiti prodeunt: flore medio quodam ex albo velut tuberculo candicante, cætera prorsus aureo, sex foliis constante, quorum primum corniculo simile est: huic subiecta sunt duo alarum modo expansa, quibus & alia duo minora, rotundiorave subsunt: sextum violæ foliis simile oppositum corniculo ex aduerso marginem claudit, elegantissima certè & admiranda peculiarique structura. Hæc Dalechampus

FLOS COCCINEVS.

CAP. XLVIII.



IN HORTIS feritur planta hæc voluptatis tantum causa. Radice assurgit breui, gracili, tenuibus fibris capillata: caule singulari, prope modum cubitali, foliis paucis ex intervallo per caulem dispositis, neruosis, alarum modo caulem amplexantibus, propè ipsum latioribus, paulatim in acutum finientibus, nullo pediculo subiectis, sed cauli adhærescentibus perfoliata modo, gustu amaris: flore in summo caule densius congesto, quinque foliolis bifidis constante, qui cocci splendore rutilat: quam ob causam florem Coccineum vocauerunt: semine minutulo, nigro, splendente, vasculis oculioidis instar concluso, floris venustas ad herbam alendam olitores inuitauit.

HISTO



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER OCTAVVS,

*Qui Plantarum Odoratarum exactam & dilucidam
delineationem continet & complectitur.*

DE PLANTIS CORONARIIS. CAP. I.



ON SOLVM flores prisca fertis & coronis intexuerunt, sed etiam plantas quasdam totas, vel foliis picturatis insignes, qualis est Symphonia Plinij, vel ramulis frondeque suauem odorem spirantes, στεφανωτικὸς id est, coronarias Græcis dictas, quas Theophrastus τῶν φρυγανικῶν, id est, suffruticum generis esse tradit. Horum genus aliud silvestre, aliud satium esse cū dixisset, subiungit.

Lib. 6. hist.
Cap. 1.

ὀλίγον γὰρ τὸ ἡμέρον αὐτῆς (τῆς φρυγανικῆς ὁσίας subaudi.) ὅπερ σχεδὸν ἐν τοῖς στεφανωτικοῖς ἐστὶ. οἷον ῥοδωνία, ἰωνία, δινὸς ἄνθος, ἀμάρακος, ἡμεροκάλλες. ἔτι δὲ ἔρπυλλος, σισύμβρυον, ἐλένιον, ἀβρότονον. ἀπάντα γὰρ ταῦτα ξυλώδη, καὶ μικροφύλλα, διὰ καὶ φρυγανικὰ. ἐπὶ τῶν λαχανηρῶν δὲ ὁμοίως, οἷον ῥαφανίς, πῆγανον, &c. Id est, Pars enim exigua huius generis (suffruticum subaudi.) satia est, quæ coronariis ferè constat, ut rosa, viola, Iouis flos, amaracus, hemerocalles: item serpyllum, sisymbrium, helenium, abrotonum. Omnia enim hæc lignosa sunt, & parua folia habent, suntque suffrutices. Idem in oleraceorum genere similiter obseruatur, qualia sunt raphanus, ruta, &c. Deinceps de silvestribus differit, quorum alia aculeata, alia non aculeata. Aculeatorum multa genera declarat. Non aculeatorum infinitā & inexplicabilem esse naturam ait, sed hæc discerni foliorum diuersitate, magnitudine, paruitate, figura, & aliis id genus, ut cistum (nam pro κισσὸς in Theophrasto lege κίσσος) melothrum, erythrodanum, smercam, cneorum, origanū, thymbram, sphacelum (non phacum, ut in Theophrasti vulgatis codicibus legitur) saluiam, marrubium, conyzam, pulicariam vertit Gaza, melissophyllum, & quasdam alias, quæ neruoso & ferulaceo genere constant, ut marathrum, hippomarathrum, ferulam, ferulaginem, myophonium. Deinde ad satiuorum suffruticum naturam explicandam redit. Τὰ δὲ ἡμέρα, inquit, βραχὺς τινὰ ἔχει γεωρίαν, ἔπερ ἐν τοῖς στεφανωτικοῖς ἐστὶ. τὰ δὲ χαθόλου πεπρατέον περὶ στεφανωμάτων εἰπεῖν. ὅπως ἅπαν περληφθῇ τὸ γένος. ἡ γὰρ στεφανωματικὴ φύσις ἰδίαν τινὰ ἔχει ἰσχύιν. ἐπιμυγνυμένη δὲ, καὶ μὴ τοῖς φρυγανικοῖς, καὶ τῶν ποώδεσι. διὰ αὐτὴν συμπερληπτόν, ἐπιμυγνυσκομένους ὥς ἂν ἡ ὁ καιρὸς, ἀρξαμένους πρῶτον ἀπὸ τῶν φρυγανικῶν. διχῆ δὲ ἡ ταύτων διαίρεσις, ἡ καὶ τὴν χρεῖαν. τῶν μὲν γὰρ τὸ ἄνθος χρήσιμον μόνον. καὶ τούτων δὲ μὴ ἔυσομον, ὥσπερ ἰόν. τὸ δὲ ἄνοσμον, ὥσπερ δινὸς ἄνθος, φλώξ. τῶν δὲ καὶ οἱ κλώνες, καὶ τὰ φύλλα, καὶ ὅλως πᾶσα φύσις ἔυσομος, οἷον ἔρπυλλου, ἐλενίς, σισυμβρύς, καὶ τῶν ἄλλων. Id est,

Lib. 6. hist.
Cap. 6.

Satiua verò breui quadam explicatione egent: coronariorum enim numero comprehenduntur. Vniuersè autem de coronamentis dicendum, vt totum genus complectamur. Coronariorum enim natura ordinem proprium habet, permixta quidem partim suffruticibus, partim herbaceis, quapropter illa quoque comprehendenda, horum mentionē faciendo cū occasio se obtulerit. Nunc à suffruticibus ordiemur. Diuiduntur illi bifariam vsus ratione, quorundam enim flores tantum vsui sunt, & horum alius odor, vt viola: alius inodorus, vt Iouis flos, phlox. Aliorum rami & folia, denique vniuersa horum natura odorata est, vt serpylli, helenij, sisymbrij. Ex quibus hæc quæ sequuntur de coronis Plinius mutuatus esse videtur. Et ferè peractis colorum quoque celeberrimis, transeat oratio ad eas coronas, quæ varietate sola placent. Duo earum genera, quando aliæ flore constant, aliæ folio. Florem esse dixerim genistas (namque & iis decerpitur luteus) item rhododendrum, item zizipha, quæ & Cappadocia vocantur, his odoratus similis olearum floribus. In vepribus nascitur cyclaminum, de quo plura aliàs, flos eius colossinus in coronas admittitur, folia in coronamentis similacis & hederæ, corymbique earum obtinent principatum. Et mox. Ergo in coronamenta folio venere melothrum, spiræon, trigonon, cneorum, quod Casiam Hyginus vocat: & quod cunilaginem quæ conyza, melissophyllum quod apiastrum, melilotum quod fertulam campanam vocamus. Coronas ex hac antiquitus factitatas, indicio est nomen fertulæ, quod occupauit. Et paulò post folio coronat & trifolium. Tria eius genera, &c. Vtuntur è ferulis & corymbis, & hederæ flore purpureo. In qua Plinij oratione pro trigonon reponit origanum ex eodem Theophrasto, pro spiræon Theophrastus habet smeræam, deprauatè pro spiræam. Deinde perperam hederam melothrum, spiræon siue spiræam, origanum, cneorum, conyzam, melissophyllum in coronariis numerat, quæ neque coronariæ sunt, neque in earum numero à Theophrasto recensentur. Triphylli verò genera ne in suffruticum quidem, neque in coronariorum generibus collocat. Præterea his plâtas addidit quarum Theophrastus non meminit, rhododendrum, & zizipha Cappadocia tum cyclaminum, melilotum, sed hanc non sine ratione: veteribus enim Græcis & Latinis ea gratia commendabatur. Nam & ex Cratino coronas Melilotinas Athenæus refert, & à fertis fertulam Romani vocarunt.

Lib. 6. c. 22. Et Theophrastus odorem in meliloto etiam cū exaruit, pertinacem esse tradit, vt in iride. At in eo reprehensione carere non potest Plinius, nec eum secutus

Lib. 21. c. 9. Gaza, quod cum in Theophrasto pro $\kappa\iota\tau\omicron\varsigma$ legisset $\kappa\iota\sigma\omicron\delta\varsigma$, scripserit hederæ folia in coronamenta venire, eiusque corymbos in coronis principatum obtinere, coronariumque esse hederæ florem purpureum, in alio eius genere siluestribus rosis similem, quæ non de $\kappa\iota\sigma\omicron\omega$, id est, hederæ, sed de cisto Theophrastus tradidit: duo nimirum esse cisti genera, marem & fœminam, alteri folium maius, durius, pinguius: florem purpurascentem, vtriusque tamen siluestribus rosis similem, sed minorem & inodorum, quæ omnia de cisto vero dici, Dioscorides, & plantæ ipsius inspectio apertè demonstrant. Plantis illis coronariis à Theophrasto & Plinio enumeratis, permultas aliàs odoratas addere possumus, quarum etiam hodie in fertis & coronis vsus est frequentissimus, videlicet libanotidem coronariam, origanum tam satium quàm siluestre, tragonum, calaminthen, thymum, ocimum, chamæmeli genera, sampsuchum duplex, atque alias complures, de quibus omnibus hîc non agemus: harum enim quædam aliis locis magis idoneis explicantur, sed de iis potissimum quæ odore aliquo commendantur, à notioribus, vt semper fecimus, exordientes.

SALVIA.

SALVIA etiam ex imperita multitudine nota est non solum facie, sed etiam certissimis remediis herba Græcis ἐλελίσφακος, Latinis & Officinis Salvia vocata, Arabibus *Aeliphacos*, & *Eliphacos*, Italis *Salvia*, Germanis *Salbey*, Gallis *Sauge*. Quæ cum retorrída semper & exucca videatur, factum est ut Græcis Elelísphacon siue Elelísphacos, quasi in tabem reducta, vel in syderationem flaccescens dicta sit, ἐλελίσειν & σφάκος vocibus in vnam coalescentibus appellationem. Est autem ἐλελίσειν intorquere, contrahere, & σφάκος, seu potius σφάκελος malum in plantis, quum per æstatem, & ardentissimum canis æstus vi solis altius penetrante, humoréque quo nutriuntur deficiente, languent & arescunt. Latini syderationem nominant. Potuit tamen æquè scitè dici, inquit Pena, à medendis sphacelo penè demortuis partibus, quibus calorem naturæ roburque insitum reuocaret, qua pollet familiari facultate nostræ vitæ primordiis benefica, vnde Salvia Latinis dicta, quod saluos homines & incolumes efficiat. In nothis Dioscoridis & Apuleio legimus Saluiam Becion appellari. Et Galenus in confectionibus dolorem sedantibus, quæ tabescentibus & sanguinem reiicientibus sunt commodæ, βελίς βολάνης meminit, & βελίς simpliciter, quam herbam Cornarius Saluiam conuertit, & βηχίς pro βελίς substituendum censet, ut sit βήχιον vna aliqua appellatio ἐλελίσφακος, quam nos Saluiam dicimus. Et Plinius alteram bechij speciem saluiam appellari testatur. Saluiam vnicam Dioscorides descripsit: nota tamen sunt etiam vulgo duo eius genera. Salvia maior, Gallicè *Grande sauge*, & Salvia minor, quæ & Salvia nobilis, Gallicè *Sauge franche*, & *Sauge menue*. Theophrasto totidem sunt. σφάκελος ὅ, inquit, καὶ ἐλελίσφακος διαφέρουσιν. ὥς ἂν ὁ μὲν ἡμερον, τὸ δὲ ἄγγελον. λειότερον γὰρ ὁ φύλλον τῷ σφακέλῳ καὶ ἐλαττον, ἢ ἡττον αὐχμηρότερον (legendum esse αὐχμηρον sensus docet) τὸ δὲ τῷ ἐλελίσφακῳ βαρύτερον. τραχύτερον lege ex Dioscoride. Id est, Sphacelus & Salvia inter se differunt, quod vnum sativum sit, alterum silvestre, sphacelo foliū læuius, minus, & non tam squallidum, salviæ scabrius. Dodonæus species tres statuit, maiorem, minorem, & silvestrem. Hic accedit salvia bacifera Cretensis. Saluiam maiorem sic descripsit Dioscorides: frutex est oblongus, ramosus, virgas quadrangulas & subalbidas habens, folia malo cotoneæ similia, longiora tamen, asperiora, & crassiora (Serapio legisse videtur καὶ σφενότερα, addit enim & structiora) quæ sensim attritarum vestium modo hirsuta, subalbida, vehementer odorata, sed virosa sunt: semen in summis caulibus silvestris homini modo habet. Nascitur in asperis locis. Atque hinc in hortos translata, & ab omnibus culta Salvia maior vocata fuit, quæ nunc quoque, in vinetis Aquitanicis, inquit Pena, Linguagothicis, & Pedemon-

Nomin.

Li. 7. med. locat.

Lib. 26. c. 8.

Genera

Lib. 6. hist. cap. 2.

Lib. 2. c. 65. & 66.

Lib. 3. c. 14.

Forma.

Locus.

fol. 239.


SALVIA MAIOR.



tium sit, alterum silvestre, sphacelo foliū læuius, minus, & non tam squallidum, salviæ scabrius. Dodonæus species tres statuit, maiorem, minorem, & silvestrem. Hic accedit salvia bacifera Cretensis. Saluiam maiorem sic descripsit Dioscorides: frutex est oblongus, ramosus, virgas quadrangulas & subalbidas habens, folia malo cotoneæ similia, longiora tamen, asperiora, & crassiora (Serapio legisse videtur καὶ σφενότερα, addit enim & structiora) quæ sensim attritarum vestium modo hirsuta, subalbida, vehementer odorata, sed virosa sunt: semen in summis caulibus silvestris homini modo habet. Nascitur in asperis locis. Atque hinc in hortos translata, & ab omnibus culta Salvia maior vocata fuit, quæ nunc quoque, in vinetis Aquitanicis, inquit Pena, Linguagothicis, & Pedemon-

SPHACELVS Verus,
Theophrast.

SALVIA Baccifera,
Cretensis.



Lib.2. hist. cap.66. longa, angusta, subalbicantia minùs scabra, & minora multò quàm superior, ad imum aurita siue pinnata, quod Sphacelo peculiare est, cætera verò huic eadẽ quæ superiori, videlicet purpureus flos secus cauliculos, in aquilini rostri speciẽ falcatuſ: ſemen nigricans, radix lignoſa. Salvia agreſtis Dodonæi Saluiam hortenſem

SALVIA AGRESTIS,
Sphacelus, Dodonæi.



Pen.inAd-
uerſ.

Lib.21.c.26

ſpecie & odore ferè refert, cauleſ profert quadratoſ, nigricanteſ, tenui lanugine obſitoſ, folia Saluiæ maiori ſatiſ ſimilia, ſed paulò latiora, breuiora, & tactu leniora: floreſ item ſimileſ ſecus cauleſ vno tantum latere ad ſummum uſque exoriuntur, quibuſ ſuccedit ſemẽ rotundum, nigricanſ. Radix eſt fibrata. Iuxta ſepeſ & in agrorum marginibuſ prouenit. Sphacelum Theophrasti vocat. Salvia Cretenſiſ baccifera perpulchra, noſtrati proriſ ſimiliſ eſt figura, odore, ſapore, & lignoſiſ ſurculiſ. Sed hi inſtar gallarum rotundiſ excrementiſ piſtaciolorum magnitudine, forma, ſapore minùs calido, magiſ adſtringente, non inſuaui donãtur. Pliniuſ vocis parũ lentem ſignificantis affinitate deceptuſ, eleliſphacum lentis ſilueſtriſ genus facit. Eſt eleliſphacoſ, inquit, dicta Græciſ, ab aliis phacoſ. Eſt ea ſatiua lente læuior, & folio minore & ſicciorẽ, & odoratioe. Eſt & alterum genus eiſ ſilueſtriſ, odore graui, hæc mitior. Folia habet cotoneæ mali eſſigie, ſed minora & candida, quæ cum ramis decoquuntur. Menſeſ ciet & vrinaſ, & paſtinacæ marinae ictuſ ſanat

nat. Torporem autem obducit percusso loco. Bibitur cum absinthio ad dysenteriam. Cum vino eadem commorantes menses trahit: abundantes sistit decocto eius potu. Per se imposita herba vulnerum sanguinem cohibet. Sanat & serpentium morsus. Et si in vino decoquatur, pruritus testium sedat. Et mox post hæc quasi alia esset veterum, alia sui temporis herbariorum elelisphacos, subdit hæc verba. Nostri qui nunc sunt herbarij, elelisphacum Græcè, Latine Saluiam vocant, menthæ similem, canam, odoratam. Partus emortuos ea apposita extrahunt, item vermes aurium ulcerumque. Foliorum & ramorum Saluiæ decoctum, inquit Dioscorides, potu urinam ducit, menses & foetus extrahit, pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur, capillos denigrat. Vulneribus herba utilis est, sanguinemque compescit, terra ulcera purgat, pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum cum vino, si eo abluantur, sedat. De eadem fusiùs Aetius differit. Tradunt quidam suffitâ Saluiam menses immoderatè fluentes, & omne muliebri profluvium compescere. Agrippa sacram herbam vocavit, quam prægnantes mulieres, si fluidæ laxæque fuerint, utilissimè comedunt. Continet enim conceptum, vitalémque reddit, si succi huius heminam cum modico sale quarto postquam à viri cōcubitu abstinuerit die, mulier potauerit, deinde viro misceatur, proculdubio concipiet. Aiunt in quodam Aegypti loco post sævas pestilentias, ab his qui supersunt ad eum bibendum succum mulieres cogi, plurimòsque inde produci foetus. Dato, inquit Orpheus, sanguinem expuentibus succi Saluiæ cyathos duos ieiunis cum melle bibendos, sanguis illicò cohibebitur. Tabidis pilulæ in hunc modum parantur. Spicæ nardi, zinziberis singulorum drachmas duas, seminis Saluiæ assati, triti & cribrati drach. octo, piperis longi drach. duodecim, cum succo Saluiæ pilulas conficito, & manè ieiunis drachmam vnam exhibeto, eodémque modò vesperi, ac postea aquæ puræ quidpiam propinato. Elelisphacos, inquit Galenus, euidenter excalfacit, ac leui-

Lib. 3. c. 34.
Vires &
Temper.

Lib. 6. sim.

MAIORANA.

CAP. III.



Quæ Maiorana Romanis dicitur, Gallis *Mariolaine*, Arabibus *Mersangius*, seu *Mersangius*, Hetruscis *Perfa*, cæteris verò Italis *Maiorana*, Germanis *Meyeron*, & *Meyram*, Græcorum *Sampsuchum* & *Amaracus* permultis esse creditur. Dicta est amaracus ab Amaraco Cynaræ Regis Cypri puero, qui casu lapsus dum ferret vnguenta, fregit alabastrum, deinde cum nimio dolore contabuisse, versus est in sampsuchum, quæ ex eius nomine cœpta est appellari Amaracus. Sed sampsuchi & amaraci vocibus eandem rem significari, testis est Dioscorides, sampsuchum, inquit, optimum est Cyzicenum & Cyprium, secundum locum tenet Aegyptium. Appellatur autem à Cyzicenis & Siculis Amaracum. Item Plinius, Amaracum Diocles medicus & Sicala gens appellauere, quod Aegyptus & Syria sampsuchum. Et aliquantò post. Sampsuchum siue Amaracum in Cypro laudatissimum, & odoratissimum. Sed an Maiorana nostras sit sampsuchum siue amaracum, non æquè constat, quod ex descriptionibus ponderandum. Sampsuchum, inquit Dioscorides, herba est ramosa, per terram repens, folia habens hirsuta & rotunda, similia foliis calaminthæ tenuifoliæ, valde odorata, calfaciendi vi prædita, & quæ etiam in coronas necitur. Maiorana verò humilis & fruticosa est stirps, candicans, & suavis admodum odoris, sesquipal-mum aut pedem alta, surculis multis, tenuibus, fragilibus, quos folia penè rotunda tenella, incana, & leuiter villosa vndiquaque ambiunt, in quorum cacuminibus flosculi perpusilli ex spicis candidi emergunt, exiguis videlicet, oblongis, & squa-matim compactis semen minutissimum, rufescens radix subest lignosa, multiplex

Nomen

Lib. 3. c. 40.

Lib. 21. c. 11.

Ibid. ca. 22.

Forma.

Lib. 3. c. 40.

AMARACVS siue *Maio-
rana*, Matth.

AMARACVS siue *Maiorana*
tenuifolia, Matth.



Cap. 296.
simpli.

& superuacua. Serapio describens eam ex Dioscoride, herba est, inquit, multas virgas habens extensas super faciē terræ in ortu suo. At hæc non repit, sed in rectum & altum assurgit. Hoc quidē verum est, si crebrò tondeas, & luxuriātem coërceas, sed ea neglecta humi procumbunt & serpunt flexili mollitie nutantes surculi, &

in terram curuantur. Quare tūc hanc sampsuchi speciem esse credunt, tum eam quam maioranam minutam, seu moschatam vulgus nostrum vocat, *Mariolaine menue* & *musquée*, Hetrusci *Persa Gentile*, superiori surculis, foliis, floribus similem, sed tenuiorem, delicatiorē, odoratiore. Passim in hortis & fictilibus colitur. Gaudet autem locis vmbrosis, aqua, & fimo. Iulio & Augusto mensibus floret. Sunt qui maioranam Dioscoridis Marum esse arbitrantur, quod negat Pena. Sed vt maioranam sampsuchi speciem esse, ita aliā se vidisse rariorem multò, & humi serpentem, quæ veriùs amaracus dici debet, asseuerat. Ea non rectis erigitur aut fruticat ramulis, vti superior, sed in cespitē caducis serpilli modo, cui alioqui persimilis folio, effigie & magnitudine est. Fuchsius Sampsuchi delineationem à Dioscoride traditam Maioranæ vulgo dictæ fauere scribit. Est enim, inquit, surculis lentè rubentibus, foliis pilosis & rotundis, iucundo odore, semine copioso, quod bullulis quibusdam continetur, flore candido & exiguo. Serpit etiam per terram: verū id non

AMARACVS,
Fuchsi.



Maiorana
tenuifolia.
Locus.

Tempus.

fol. 213.

Amaracus
repens.
Pena.

id non vbique fit: interdum enim recta surgit in altum. Eandem pinxit Dodonæus, sed quia non serpit, inquit, id quod de Sampsucho scripsit Dioscorides, Marum potius videri quam sampsuchum. Theophrastus Amaracum, quem sampsuchum semper vertit Gaza, in censu *φρυγανικῶν*, siue suffruticum satiuorum & coronariorum recenset, & ὁ δὲ ἀμάρακος, inquit, ἀμφώρως φύει, καὶ ἀπὸ παρασάδος, καὶ ἀπὸ σπέρματος: πολὺ σπέρμον δὲ, καὶ δ' σπέρμα, ὕσμον. ὁ σμὴν μαλακώτερα, διωάει δὲ καὶ μετὰ φύει. Id est, Amaracus utroque modo prouenit, & auulsione, & semine: semen multum gignit, quod suauis est odoris, quum & ipsa planta suauiter oleat, quæ & transferri potest. Præterea ex æstiuis esse scribit, & vnguentis misceri. Sampsuchus calfaciendi vi pollet, inquit Dioscorides, decoctum ipsius potum incipientibus hydropicis, vrinæ difficultati & torminibus conuenit. Sicca folia cum melle imposita sugillata tollunt: menses trahunt in pefso apposita: contra scorpionis ictum cum aceto & sale imponuntur. Ad luxata verò & tumores cerato excepta, sed & ad oculorum inflammationes cum polentæ pollinæ illinuntur. Miscentur & acopis & malagmatis ad calfaciendum. Plinius eundem hunc vsum, sed non tam perspicue interpretatur. Scorpionibus aduersatur ex aceto ac sale illitum. Menstruis quoque multum confert impositum. Minor est eidem poto vis. Cohibet & oculorum epiphoras cum polenta. Succus decocti tormina discutit. Et vrinis & hydropicis vtile. Mouet & aridum sternutamenta. Fit ex eo oleum, quod Sampsuchinum vocatur aut amaricinum, ad excalfaciendos: emolliendosque neruos. Vuluas calfacit. Folia sugillatis & luxatis cum melle & cera profunt. Sampsuchum, inquit Galenus, tenuium partium & digerentis est facultatis: exsiccat enim & excalfacit ordine tertio.

Temper.
& Vires
Lib. 3. c. 40.

Li. 21. c. 22.

Li. 8. simpl.

MARVM.

CAP. IIIII.

QUOD Græci *μάρον*, Latini quoque Marum vocant. Sunt, inquit, Pena, qui Regi Thraciæ, cui nomen Maroni esset, Mari herbæ appellationem acceptam ferant. Verumtamen potuit etiam ab amaraco per apocopen dici, utpotè cum amaraci species videatur Marum. Scribit Dioscorides herbam esse vulgò cognitam, surculosam, flore origano similem: folia tamen huius multò calidiora esse, & florem odoratiorem, nasci quæ plurimam circa Magnesiā & Tralles. Semel tantum mari (modò huic illud idem sit) Plinius meminit. In Ægypto nascitur & Marum, peius quàm Lydium, maioribus foliis ac variis. Illa breuia ac minuta, & odorata. Galenus, Paul. Aetius in simplicium censu præterierunt. Et habuisse se testatur Marcellus Græcum & Latinū vetustissimos Dioscoridis codices, qui nullum hoc loco, neque alibi Marū ostendunt. Quare fortasse non absurde quis putarit, inquit Ruellius, hoc Marum Dioscoridis historiæ accreuisse, auxit quæ suspitionem, quòd prima Dioscoridis verba postremis parum videantur respondere, qui tradat omnibus cognitam, cum tamen non in nostro orbe, sed in Magnesiā & Lydiæ Trallibus plurimum nascatur. Accedit huic opinioni insolens auctoris modus, qui cum semper cōgeneres herbas simul vno loco recenseat, hanc tamen ab origani familia disiunxit, & inter nostrates alias odoratas herbas, ut meliloton, acinon baccarem numerauit, etsi ad Magnesiā & Tralles nasci dicat. Galenus in Hedychroi cōpositione, lib. de antidotis Mari meminit, his verbis. Aliæ hedychroi descriptiones reperiuntur, inquit, quæ neque amaracum, neque Marum prorsus habent. Quædam alterutrum tantum continent: neque enim duo hæc norunt vnguentarij, eo quòd herbas solū è Creta aduectas emant cum seminibus & succis. Ego verò & easdem herbas scio in Asia nasci, ac in aliis quidem regionibus raras esse, in Cyzico autem frequentes.

Nomina
Fol. 213.

Lib. 3. c. 43.

Li. 12. c. 24.

Lib. 3. c. 36.

Li. 1. Antid.

In Italia vt & alias quasdam herbas, ita & amaracum vidi, quæ odore multum à Maro superatur. Marum enim valde redolet, putaretq; aliquis sola nominis appellatione ductus, vnguentum amaricinum quod in Cyzico faciunt, amaraci plurimum capere, sicq; forsitan ab antiquis vnguentum conficiebatur, sed nunc solū Marum imponunt. Hanc herbam cum ipse aliquoties degustassem, & amarā quidem plurimum, acrem verò parum deprehendissem, hortatus sum quemdam eorum qui amaricinum conficere solent, vt amaraci tantum compositioni immitterent, quantum & Mari. At mihi visum est ad vnguentum minus quidem odoratum, nihil autem viribus inferius. Hæc Galenus. Quibus declarat Marum ab amaraco parum differre, sed odoratius esse & gratius, Quæ res multis suasit Marum nostram esse maioranam, vt diximus. In hac est sententia Dodonæus, quam confirmat maioranæ nomine, quod à Maro videtur deriuatum, sed apertius ipsa Mari supra posita descriptione, quam exquisitissimè conuenire putat. Et substitutam sampsocho maioranam alienum videri non debere, quando & ipso Galeni tempore Marum sampsochi loco in amaricinum vnguentum fuerit immissum, vt ex Galeno modò diximus, quod præbuit occasionem posteris, vt Marum siue maioranā sampsochi loco habuerint, eiusque nomine appellauerint. Eorum sententiæ suscriberet Matthiolus, qui Marum amaracum illam præsertim esse arbitrantur, quæ vehementiorem odorem spirat, maioremque amaritudinem gustu præfert, foliisq; est minoribus, candidioribus, & tenuioribus, nisi aduersaretur Galenus, inquit, qui loco iam citato testatur se in Italia amaracum vidisse, nulla, quod illic Marum viderit facta mentione, sed tantum quod in aliis ab Asia regionibus rarum oriatur. Ex quo colligere licet Marum in Italia non nasci. Quare

MARVM, Matthioli.



plantam aliam pro Maro depinxit, à Cortuso missam, quæ legitimum Marum prorsus referat, quod foliis sit quàm origani candidioribus, odoratis, gustu acutis, amariusculisq; , ramis tenuibus, lignosis, floribus subpurpureis, odore eximio fragrantibus. Planta est peregrina, quæq; in Italia non proueniat, nisi aliunde translata. At plantam istam Pena & Lobellius tragoriganum alterum faciunt, quia feruidior & acrior est, quàm vt Marum deceat, vt dicetur suo loco. Quidam, teste etiam Dodonæo, Marum esse existimant id plantæ genus, quod ille origani speciem statuit, quam olitores colunt, & Amaracum Britannicum, siue Amaracum crassum vocant, Galli *Mariolaine d'Angleterre*, & *grosse Mariolaine*. Humilis est herba, origano siluestri haud dissimilis, folio minore, rotundo, nigricante, non hirsuto, sed læui & glabro, flore purpureo, velut in muscariis coaceruato: radice lignosa. De hac plura dicemus, Cap. de Hyssopo. At Pena & complures alij genuinum Marū censent eam esse odoratam herbam, quam Galli præsertim Andes & Ce-

nomani *Mastic* appellant, vel quoniam lentore quodam interdum madescit, auctore Ruellio, maxime si pinguibus locis lætiùs assurgat, vel quod iucundum mastiches odorem spiret, Surculis multis, tenuibus, ramosis, rotundis, lignosis fruticat, circa quos folia tenella ferè maioranæ: in summis cauliculis ex hirsutis calicibus

Lib. 2. c. 56.
& de flo. c.
75.

Ca. 42. li. 3.

Fol. 211. &
213.

Lib. 2. c. 58.

Fol. 213.

Marū ve-
rum.
Lib. 3. ca. 25.
Forma.

MARVM Quorundam.



calicibus flores perexigui exeunt, albidi: radices tenues sunt & lignosæ. Tota herba odoratior est & gratior quàm origanum, aut sampuchum, vt Galenus vult, marum. Quod si cui hæc minùs videatur maro congruere, saltè non respuat, inquit Petrus Pena, Syriacam, quæ gratissimò & vegeto est odore, imò & facie tota maioranam præfert, aut origanum, sed gracilioribus, nò breuioribus, pedalis & sesquipedalis sarmentis, minoribus capitulis & foliis, etiam decimum fermè annum, ex quo Venetiis Alepo Syriæ se habuisse ille affirmat, odoris fragrantiam retinentibus. Hoc Marum Syriacum ex Lobellio hîc pictum damus. Superiorem Ruellius Tragoriganum Dioscoridis, & Heracleum origanum Plinij esse censet. Dodonæus Dioscoridis Clinopodium, cui tamen parùm congruit, Penæ iudicio, vt dicitur. Non desunt qui eandem Helenium *φρυγανίδες* & odoratum Theophrasti esse credant. Marum auctore Dioscoride, vim habet sisymbrio similem: subastringit enim, & modicè calfacit. Qua de causa impositum nomas sistit, & in calida vnguenta additur.

Lib. I. Anod.


Fol. 213.
Marum Syriacum.

Lib. 3. c. 25.

Lib. 3. c. 57.
De flor. ca.

77.
Fol. 213.
Lib. 3. c. 42.
Vires.

MARVM Verum, vulgò Mastice.



MARVM Syriacum, Lobellij.



ORIGA

Nomina



RÆCIS ὀρίγανος, Latinis Origanus vel Origanum, in Officinis nomen suum retinuit, Mauritanis *Faudenigi*, *Fudenegi*, seu *Faudenegi*, Gal-
lis *Origan* & *Mariolaine bastarde*, Germanis *Volgemuth*, quasi dicas
animi bonitatem aut lætitiā, & *Rottkosten*, siue *Castentz*, Italis *Origa-
no*, Hispanis *Oregano*. Origanum verò, quòd cliuosos, editos montososq; natales
amaret, nomen apud Græcos inuenit, ἀπὸ τῆς ὄρεος montem, & γάνος gaudium signi-
ficante, vel quod visum illustret & acuat, παρὰ τὸ ὄραν, & γανού, idest, τὸ λαμπρύνειν.
Vel à ῥιγῶ fit ῥίγανον, & redundante, ο, ὀρίγανον per antiphrasim, natura enim calidum
est. De hoc tam diuersa auctores prodidere, vt difficile sit certi aliquid cōstituere.

Lib. 6. hist.
cap. 2.

Genera.

Li. 21. ca. 10.

Li. 20. c. 17.

Cap. 16.

Lib. 25. c. 4.

Li. 20. c. 17.

Theophrastus, τῆς ὀρίγανος δὲ, inquit, ἡ μέλαινα ἀχαρπος, ἡ δὲ λευκὴ χαρπιμὸς. Idest,
Origani genus quidem nigrum sterile est, candidū fructiferum. Ex quo hæc trans-
scripsit Plinius, cum duo cneori genera posuisset nigri & candidi. Totidē & Ori-
gani in coronamentis species, inquit, alterius enim nullum semen. Id cui odor est
Creticum vocatur. Et alio in loco, Origanum quod in sapore cunilam æmulatur,
vt diximus, plura genera in medicina habet: onitin vel prasion appellant, non dis-
simile hyssopo. Et paulò ante hunc locum. Est alia cunila Gallinacea appellata no-
stris, Græcis Origanum Heracleoticum. Idem alibi de panacis generibus agens.
Alterum, inquit, genus Heraclion vocant, & ab Hercule inuentum tradunt, alij
Origanum Heracleoticum siluestre, quoniam & origano simile, radice inutili: de
quo Origano diximus. Et Heraclium quoque tria genera habet, nigrius, latioribus
foliis, glutinosum: alterum exilioribus, mollius, sampsucho non dissimile, quod ali-
qui prasion vacare malunt. Tertium est inter hæc medium minùs quàm cætera
efficax. Optimum autem Creticum: nam & iucundè olet: proximum Smyrnæum,
deinde Heracleoticum, ad potum vtilius, quod onitin vocant. Cæterum in tanta
tum nominum, tum historiæ ambiguitate vnicum sequi Dioscoridem satius est,

ORIGANVM Heracleot.

Matthioli.

Lib. 3. c. 28.

In Theri.

In Theria.



qui Origani genera seu potius cognomina tria
esse statuit, nempe Origanum Heracleoticum,
siue Heraclium ab Herculea Ponti ciuitate,
quod illic probatissimum nasceretur, alterum
Onitin, siue Onitida, quod ab asinis comeda-
tur. Quare Nicander ὄνοπεζάλφον Origanum co-
gnominauit, idest, asinifolium, quod ipsis gra-
to cibo carperetur. His adde siluestre, quod si-
ne cultura & sua sponte prouenit. Hoc aliqui
teste Dioscoride Panaces heracleū, alij cunilā
vocant, ex quibus est Nicāder, πάνακας ὄνοπεζάλφον,
ἢ ὡς καὶ ἡρακλεῖον ὀρίγανον ἀμφοτέρωσι.


Hoc est. *Panaceamq; Cunilam.*

Quàmque vocant quidā Heracleō Origanū inde.
Origanum heracleoticum folium habet simile
hyssopo, umbellam non in rotæ speciem, sed
diuisam, semen in summis virgis, non densum.
Onitis candidiore est folio, & hyssopo simi-
lior, & semen velut corymbos coniunctos ha-
bet. Siluestre folia habet Origano similia, ra-
mulos dodrantaes, tenues, & in his umbellas
anetho similes, flores candidos: radix tenuis est
& inutilis. Hæ igitur tres Origani species ab
hyssopo

hyssopo non differunt nisi magnitudine & umbellis. Heracleoticum illud est Hispanicum, inquit Pena, quod in Flandriam quotannis saccis plenis deferri, & ab infestoribus distrahi solet. Utuntur enim vulgò piperis & satureiæ ritu in obsoniis. Belgæ hanc plantam colunt pedem altam, foliis & virgultis maiorem maioribus, quibus summis non in umbellam circinatam collecti sunt flores, sed in parvis

In Aduers

ORIGANVM Onitis.

ORIGANVM Vulgare
silvestre.

thyrsis spicatis, ternis, hinc inde dissipatis, ut thymi, odore maioranam prouocantibus, præsertim in Lusitania & Lucania. Origani onitidis circa Monspelium, & in Galloprovincia notissima sunt duo genera, maioris & minoris discrimine duntaxat discrepantia, nisi quod minori amaraci facies & folia, sed minora & rotundiora, heracleotici fermè. Caules recti, pedales, fruticosi, ramulis & fastigiis breuibus, coactis, spicatis, confertim in umbellam collectis, floridum corymbum imitantibus, & per æstatem purpurascētibus, admodum glutinosi. Maius fruticosius est, hirsutius, sed viribus, sapore & odore ignauius, alioqui perquam simile, & passim occurrens. Agrioriganum vocat Lobellius, hinc depictum Origani vulgaris nomine. Siluestri Origano longè optimo Veneti Pharmacopœi & medici è Syria aut Creta vtuntur, cui cauliculi exiles, folia parua, capitula numerosa, collecta, ambitu umbellam imitantia, onitidi proxima, sed non perinde accumulata, albi flosculi. Herba est gustanti tota grata & aromatica, dictani & piperis acrimonia. Origanum heracleoticum calfacit, auctore Dioscoride. Vnde decoctum eius cum vino potum venenatorum moribus prodest, cum passo autem iis qui cicutam, aut meconium, cum oxymelite iis qui gypsum aut ephemerū hauserunt. Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico manditur. Aridum acetabuli mensura potum cum aqua mulsā atros humores per aluum ducit, mensesq; ciet. Linctum ex melle tussibus medetur. Prurigines, scabies, regiumq; morbum decoctum eius cum in balnea descensum est, iuuat. Succus eiusdem adhuc virentis tonsillas, columellas, orisque vlcera sanat. Per nares cum oleo irino infusus mucum trahit. Cum lacte aurium dolores mitigat. Conficitur ex eo & capis & rhu obsoniorum medicamentum vomitorium, omnibus iis in aëre cyprio sub canis ardenti æstu per quadraginta dies insolatis. Herba verò substrata serpentes fugat. Eadem vis onitidi, sed multò inefficacior. Siluestre priuatim foliis & floribus cum vino potis venenatorum moribus auxiliatur. Origanum
Heracleo

Li. 3. ca. 28.

Temper.

Vires.

Li.8 simpl. Heracleoticum, inquit, Galenus, efficacius est onitide, sed agreſte valentius vtroque eſt. Omnia verò incidendi & tenuandi, & exſiccandi, calfaciendiq; facultatem habent, hæc q; tertio exceſſu.

TRAGORIGANVM.

CAP. VI.

Nomina



ΠΑΓΟΡΙΓΑΝΟΝ Græcis, & Latinis Tragoriganum, quaſi hircinum origanum dicas, quod pabulo gratum ſit hircis, vt onitis aſinis, potiùs quàm quòd hircum fœteat. Grata enim & mitis Tragorigani potio Dioſcoride teſte: qui & eius genera duo deſcripſit, prius

Genera.

Lib.3. c.29.

Forma.


Li.20. c.17.

Ca.29. li.3.

Fol.212. & 217.

Trago.
Dodo.Tragor.
Monſpel.Tragor.
Nothum.

fruticem paruū, origano aut ſerpyllo ſilueſtri ramulis & foliis ſimilem. Quibuſdā in locis lætius virentiùſque inuenitur, & latioribus foliis, ſatis glutinoſum. Alterum exilibus ſurculis & tenuibus foliis, quod aliqui praſium vocauere. Tragoriganum, inquit, Plinius, ſimile eſt ſerpyllo ſilueſtri. Cæterum quod Dioſcorides Tragoriganum à nonnullis praſion vocari dixit, id nomen Plinius ad Onitin retulit, vt ſuperiore capite diximus. Pro Tragorigano plantam hîc pictam Matthiolus exhibuit, quæ in Foroiulienſi agro frequens naſcitur, foliis ſerpylli æmulis, ſed guſtu pulegij: quam Pena non Tragoriganum, ſed calaminthæ ſpeciem alteram eſſe ait. Tragoriganum alterum ex Dodonæo hîc depicturn eſt, ſurculis multis, lignoſis, rubeſcentibus, foliis latiuſculis, nigricantibus, vulgaris ſerpylli maioribus, parum aſperis & lanuginoſis, floſculis purpureis in umbellis cauliculorum ſummitates occupantibus. Per multis Tragorigani ſpecies hæc creditur, quæ in agro Monſpeliienſi plurima naſcitur, foliis origani ſilueſtris, guſtu acribus, ſuauiſter olentibus, umbella floribus purpureis comante, in rotæ ſpeciem nō prorſus circinata, ſummis caulibus inſidente, vt in noſtrate origano, præter quàm flores inſuper caulem verticillatim ambiunt vt in calamintha. ex interuallis qua folia prodeunt. Iſtud quoque Tragoriganum Nothum Herbariis dicitur, quod in

TRAGORIGANVM,
Matthioli.TRAGORIGANVM,
Dodonai.

maritimis

TRIGORIGANVM,
Monspeliense, Dalech.



TRAGORIGANVM
Nothum, Dalech.



maritimis fruticat, radice nigricante, lignosa, parum fibrata, cauliculis multis, dodrantalibus, in summo furculosis, foliis per caules & ramos inæqualiter dispositis, longis, angustis, candicantibus, hyssopi ferè, ad maiorum exortum pusillis aliquot congestis, flore purpureo, specioso, in summis caulibus ex corticoso loculoprodeunte, semine minutulo. Pena inter multas plantas quas Tragorigano aptare licuisset, nullas reperit sequentibus duabus veriùs aut commodiùs illi quadrare. Prius erit Cretense apud Venetos Tragoriganum, quod furculis dodrantalibus, & foliis paulò quàm thymi Cretensis maioribus, densis & rigidis, floribus per interualla & verticilla purpureis clinopodij modo fruticat: sapor illi feruens piperis aut thymi. Alterius Tragorigani effigiem & facultates nulla meliùs videtur exprimere, quàm herbula illa fruticosa, capite, De Maro depicta, quam à Cortuso accepta Matthiolus mari nomine donauit. Vide ca. 4. huius. Nam frutex est paruus, sesquipalmũ altus, albidus, multis cauliculis tenuibus, serpylli foliis, vel illius Tragorigani proximè descripti, flosculis subter foliis purpurascentibus, saporis acerrimi, odoris fragrantissimi atque vrentis: tritum namq; digitis eminùs non secus ac flammula percellit nares, & cerebrum ferit. Hæc Pena. Clusius duobus Tragorigani generibus à Dioscoride traditis duas persimiles plantas se vidisse ait. Vnam pedis aut semipedis altitudine fruticantem, multis tenuibus & lignosis furculis, circa quos folia minora sunt quàm in maiorana, mediæ inter origanum & serpyllum siluestre magnitudinis, incana omnino, odoris iucundi, & gustu acri: flores verticillatim extremos furculos ambiunt candidi, exigui: semen minutum, nigrum, calyculis suis occultatum. Floret cum Thymo & Stœchade. Tota odorata est & perpetua coma. Alteram furculis minoribus candidioribusq; foliis tenuioribus & longioribus, aliquantulum incanis, acri gustu, sed odore minùs iucundo quàm prior: flores etiam verticillatim circa summos ramulos nascuntur ex calyculis prodeuntes, maiores aliis, & aliquo modo galeati, candidi. Radix alteri similis, lignosa, dura, multifida. Eius genus neque forma, neque magnitudine differens inuenitur, sed furculis nigrioribus, foliis hispidioribus & atrioribus, flore purpureo. Vtraq;

Fol. 211.

Ca. 42. li. 3.

Lib. I. stirp.
Hispan. c. 63.
Forma

perpetuo virens. Prior multis Hispaniæ locis prouenit solo arido & petroso cum stœchade permista. Alterius vtramque speciem solo Valentino agro obseruauit Clusius, Martio florentem & sponte nascentem. Quæ flore est purpureo, etiam in hortis Belgicis colitur. Auctor est Dioscorides Tragorigana omnia excalfacere,

Locus.

Lib. 3. c. 28.

Temper.
& Vires

TRAGORIGANVM

11. Clusij.



Embl. 30.
lib. 3.

Li. 20. c. 17.

Li. 8. simpl.

cùm de origani viribus dixisset, subiunxit, Tragoriganum habet astrictio-
etiam quidpiam.

PVLEGIVM.

CAP. VII.

Nomina

Li. 20. c. 14.

Li. 1. de Di-
uinat.

Li. 12. epig.
32.

Li. 20. c. 14.

Fol. 2. 4.

Lib. 3. ca. 30.

Genera

Li. 20. c. 14.

Forma.



VLEGIVM Latinis & Officinis dicitur, quod Græcis γλήχων & βλήχων, Mauritanis *Alnam*, *Alnegen*, seu *Alnegen*, Italis *Pulegio*, Germa-
nis *Poley*, Gallis *Poulliot*. Nominatū autem Plinio videtur Pulegium,
quod flos recentis incensus pulices necat odore. Dicitur etiam Pu-
leium extrita, g, litera Ciceroni. Nam & musculorum iecuscula bruma dicuntur
augeri, & puleium aridum florescere ipso brumali die. Et Martialis:

Quadrina nigri, nec corona Pulei.

Blechon autem quod gustatum à pecore caprisque balatum concitat, Plinio &
Dioscoride auctoribus, vel etiam, ut scribit Pena, quod pulmonibus pituitam craf-
sam farctamque extundat. Dioscorides Pulegij genus vnum, idq; sativum facit.
Plinius fœminam & marem: illam flore purpureo, hunc candido. Neuter verò ut
herbam vulgo & omnibus notam descripsit. Vulgatum Pulegium hodie Regiū
nominatum. Herba est humi repens, caulibus gracilibus, fragilibus, dodratalibus,
foliis quadamtenus rotundis, ferè maioranæ, paulò maioribus viridioribus, nigri-
cantibus: Flores præsertim hortensis purpurei, eius verò qui in campis provenit
candidi, in toto caule per intervalla propè foliorum exortus verticillatim pro-
deunt: radix gracilis, capillata, per humum sparsa. Nascitur humecto & vliginoso
solo. Tota planta odorata est, & gustu acris, non sine quadam amaritudine. Quo
magis mirum vulgare istud Pulegium à quibusdam pro legitimo respui, & secun-
dam calaminthes speciem haberi, cùm omnibus facultatibus, iisdemque efficacif-
simis præditum sit, quas Dioscorides Pulegio suo tribuit. Extenuat, inquit, calfa-
cit, concoquit: potum menses, secundas, fœtus eiicit, educit & ea quæ in pulmone
hærent, cum Aloë & melle potum: (quem locum vitiatum corrigi debere censet

Cornarius

PULEGIUM Regium.



Cornarius, etiam si à nemine adhuc sit animaduersus, cum falso *μετὰ ἀλόνης*, pro *μετὰ ἀλός* legatur, quem Plinius ita expressit. Hepaticis cum melle & sale bibendum datur: pulmonum vitia excreabilia facit. Esse autem aloën ineptā ad hoc, ut aliquid ex pulmone sursum educat, utpotè adstringendi & siccandi vi præditam, satis clarum est. Contra salem cum melle ad id præstandum aptissimum esse experientia constat) & conuulsis auxiliatur. Nauseas etiam & stomachi rosiones siue morsus cum posca potum mitigat. Atram bilem per aluum educit. Cum vino potum venenatorum morsibus succurrit: defectos animo cum aceto naribus obiectum recreat. Siccatum & in puluerem tritum crematumq; gingiuas firmat. Illitum cum polenta inflammationes omnes mitigat. Podagris per se confert, usque dum rubescat cutis. Cum cerato varos tollit. Lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius pruriges si eo lauentur, sedat. Inflationes, duritias & conuersiones vuluæ in defensionibus sedat. Plinius

Embl. 31.
lib 3.

Li. 20. c. 14.

eundem medicum vsum fusiùs exponit his verbis. Magna societas cum mentha ad recreādos defectos animo Pulegio, surculis in ampullas vitreas aceti vtriusque deiectis. Qua de causa dignior è Pulegio corona vertigini, quàm è rosis, cubiculis nostris pronuntiata est. Nam & capitis dolores dicitur leuare. Quin & olfactu capita tueri contra frigorū æstusq; iniuriam, & ab siti traditur: neque æstare eos, qui duos è Pulegio surculos impositos auribus in sole habeant. Illinitur etiam in doloribus cum polenta & aceto: scæmina efficacior Est autem hæc flore purpureo: mas candidum habet. Nauseas cum sale & polenta in frigida aqua pota inhibet. Sic & pectoris ac ventris dolorem. Stomachi autem ex aqua item rosiones sistit, & vomitiones cum aceto & polenta. Intestinorum vitia cum melle decoctum & nitro sanat. Vrinam pellit ex vino: & si amminæum sit, & calculos, & interiores omnes dolores. Ex melle & aceto sedat menstrua & secundas: vuluas conuersas corrigit. Defunctos partus eiicit. Semen obmutescens olfactu adhibetur. Comitibus in aceto cyathi mensura datur. Si aquæ insalubres bibendæ sint, tritum aspergitur. Salsitudines corporis (pruritus à salsa pituita concitatos: vel suspicari licet in exemplari Græco fuisse *ἀλύκας*, idest, anxietates, quas Hippocrates Apho. 56. lib. 7. discuti ait, vino pari aquæ potione diluto: eamque vocem ineptè à Plinio Salsitudines versam fuisse) si cum vino tradatur, minuit. Neruorum causa in contractione cum sale, aceto, & melle confricatur, & in opisthotono Bibitur ad serpentium ictus decoctum, ad scorpionum in vino tritum. Maxime quod in siccis nascitur, ad oris exulcerationes, & ad tussim efficax habetur. Flos recentis incensus pulices necat odore. Xenocrates Pulegij ramum lana inuolutum in tertianis ante accessionem olfactandum dari, aut stragulis subiici, & ita collocari ægrum, inter remedia tradit. Pulegium, inquit Galenus, cum acre sit & subamarum, valde tum calefacit, tum extenuat. Porro quod excalfaciat abundè, magnum est testimoniū, quod illita rubore tingit, & si quis diutiùs toleret, exulcerat quoq; Extenuare satis indicat, quod humida, crassa, lenta ex thorace & pulmone excreatu facilia reddit, & menses mouet. His assentitur Symeon Sethi. Pulegium,

Li. 20. c. 14.

Li. 6. simpl.

inquit, attenuat & calfacit vehementer: quapropter in humidis & crassis auxiliatur, & in pulmone humida glutinosaq; detergit, & vt excreentur efficit. Cū vino albo coctum & calidè potum, sincerum menses prouocat. Extrinsecus illitum ischiadicis, & aliis partibus frigore affectis auxiliatur. Hæc ille. Mos olim fuit asseruare Pulegium in carnariis, ad multos annos, in coronæ circulum nexum: vnde quadrimam Pulegij coronam dixit Martialis. Et de eadem re Plinius hæc tradidit. Floret ipso brumali die suspensa in tectis arentis herba Pulegij. Et rursus. Miretur hoc qui non meminerit, ipso brumali die Pulegium in carnariis florere:

Lib.2. c.41.

Li.18. c.26.

Li.19. ca.8.

PVLEGIVM Ceruinum.



Locus.

Forma.

Vires. etiamsi magna superioris copia suppetat, vtuntur Monspelienses medici, quod viribus sit, vt putant, efficacioribus, & probatoribus.

adeò nihil esse occultum natura voluit. Et ferendi igitur hoc signum dedit. Atque alio in loco. Congruit Pulegio, cuius natura in carnariis reflorescens sæpius dicta est. Huiusmodi Pulegium quod in tectis ac carnariis in fumum suspensum est, Aetius *σαλαῖον*, idest, vetus ac inueteratum vocare solet: item *γλήχονος πεισιώην*, idest, Pulegium de superiore anno: quod tale non est, *ἀγαπνον*, idest, fumo non siccatum. Pulegium alterum faciunt Monspelienses & Ceruinum cognominant: quod vt in agro Monspeliensi vbique obuium est, vliginosus potissimum & stagnantibus locis, ita rarò occurrit in Italia, aut Germania, aut aliis Galliarum regionibus: ideò paucis innotuit. Est autem radice longè latèque serpente, fibrata, candida, tenera, geniculata: caulibus multis, cubitalibus, genicularis, & quàm alterius rectioribus & rigidioribus, foliis minoribus, oblongis, densissimè congestis, hyssopo non dissimilibus, acris & iucundi gustus, odore Pulegij regalis, flore purpurascente, & colore & situ florem Pulegij regalis imitante. Hoc,

DICTAMNVM ET PSEVDODICTAMNVM.

CAP. VIII.

Nomina

Dictamnus & *Dictamnion* Græcis, vel *διδάμνος* & *διδάμιος*, & *γλήχων ἀγρία*, similiter Latinis *Dictamnus* & *Dictamnion*, vel *Dictamnus* & *Dictamnion*, & pulegium siluestre, Arabibus *Miscatremfir*, *Anegen*, *Araba*, siue *Bari*, Italis *Dittamo*, Gallis *Dictā*. Vni Cretæsis Idæ môtis portunculæ, quam *Dictæam* vocât, debetur *Dictamni* nomenclatura, inquit Pena, vel *ἀπὸ τῆς τριῶν* dici videtur, auctore Cornario, quod *τὰς ὁσίων γυναικῶν βοηθεῖαν* promittat, aut vt Dioscor. ait, *δὲ ὑποκρίνεται*. Tria ille *Dictāni* genera tradidit: *Dictānum* verum, *Pseudodictamnus*, & *Dictamnion* aliud. *Dictamnion* herba est Cretensis, inquit, acris, læuis, pulegio similis, sed maiora *τοῖς ἄλλοις*; lanuginosa folia habet, & in ipsis spissos villos: neque florem, neque fructū profert. *Pseudodictamnus* multis in locis nascitur, antedicto simile, sed minùs acré. Adfertur è Creta altera *Dictamni* species, foliis *Sisymbrium* similibus, sed ramis maior, in quibus flos origano siluestri similis, niger, mollis. Odor foliorum inter *Sisymbrium* & *saluiam*

Fol.214.

Embl.32.li.

3.

Lib.3. c.31.

Genera.

Forma.



saluiam iucundissimus. Plinius eadem habet. Dictamnium, vt indicauimus, ostendēre ceruæ vulneratæ, pastu statim decidentibus telis. Non est alibi quàm in Creta, ramis prætenue, pulegio simile, feruens & acre gustu. Foliis tantum vtuntur. Plos nullus ei, aut semen, aut caulis. Radix tenuis ac superuacua. Et in Creta autem non spatiosè nascitur: mirèq; capris expetitur. Pro eo est & Pseudodictamnium, multis in terris nascens, folio simili, ramulis minoribus, à quibusdam Chondris vocatum. Minoris effectus statim intelligitur. Dictamnium enim minima portione accendit os. Qui legere ea in ferula vel arundine condunt, præligantq; ne potentia euanescat. Sunt qui dicant vtraque, nasci multifariam, sed deteriora in agris pinguibus, verum quidem dictamnium non nisi in asperis. Est & tertium genus Dictamnium vocatum, sed neque facie, neque effectui simile, folio sisymbrij, ramis maioribus, procedente persuasione illa, quicquid in Creta nascitur, infinitò præstare cæteris eiusdem generis alibi genitis. *Quæ*

flos

Plinius ex Theophrasto transtulit. Τὸ δὲ δίκταμνον ἴδιον τῆς κρήτης, ἡ δὲ φάρμακον δὲ τῆς διωάμης, καὶ πρὸς πλείω χρήσιμον, μάλιστα δὲ πρὸς τὰς τόκους τῶν γυναικῶν. ἔστι δὲ μὴ φύλλον παρόμοιον τῇ βληχώνι. ἔχει δὲ τι κατὰ τὸν χυλὸν ἐμπερές. τὰ δὲ κλάνα λεπτότερα. χρωρὶ δὲ τοῖς φύλλοις, ὡς τοῖς κλωσίν, ἔτε τῷ καρπῷ. χρήσιμον δὲ πρὸς πολλὰ μὴ δὲ ἄλλα, μάλιστα δὲ, ὡς περ ἐλέχθη, πρὸς τὰς δυστοκίας τῶν γυναικῶν. ἢ καὶ ὁ τοκεὶν φασὶ ποιεῖν, ἢ πᾶσιν γε τὰς πόνους ὁμολογεῖν. διδορὶ δὲ πίνειν ἐν ὕδατι. σπάνιον δὲ ἔστι, καὶ καὶ ὀλίγος ὁ τόπος ὁ φέρων. καὶ τέτον αἱ αἴγες ἐκνέμονται, διὰ δὲ φιληθεῖν. ἀληθὲς δὲ φασιν εἶναι δὲ πρὸς τῶν βελῶν, ὅτι φαγεῖται ὅταν τοξολῶσιν, ἐκβάλλουσιν. δὲ μὴ οὐδὲ δίκταμνον τοῖς τοξοῖς, καὶ τοιαύτας ἔχει τὰς διωάμης. τὸ δὲ ψευδοδίκταμνον, τῷ μὲν φύλλῳ ὅμοιον, τοῖς κλωνίοις δὲ ἑλαττον, τῇ διωάμῃ δὲ πολὺ λεπτότερον. βοηθεῖ μὴ καὶ πρὸς τὴν αἰσθησιν, καὶ πρὸς τὴν ἀποπνευσιν. ἔστι δὲ ὁμοῖος ἐν τῷ σωματι φανερά ἢ τῷ δίκταμνῳ διωάμης: θερμαίνει καὶ ἀπὸ μικρῆς σφοδρῆς. τιθέασιν δὲ καὶ τὰς διωάμης ἐν νάρθηκι, καὶ κατὰ μῶ, πρὸς δὲ μὴ ἀποπνευσιν. ἀσθενέστερον καὶ ἀποπνευστικόν. λέγουσι δὲ τινες, ὡς ἡ μὲν φύσις μία ἢ τῷ δίκταμνῳ, καὶ ἢ τῷ ψευδοδίκταμνῳ. διὰ δὲ δὲ ἐν διγαστέροις φύεται τόποις, χεῖρον γίνεσθαι, κατὰ περ ἄλλα πολλὰ, πλείω τέτων κατὰ τὰς διωάμης. τὸ καὶ δίκταμνον φιλεῖ χώραν τραχεῖαν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον δίκταμνον, ὡς περ ὁμώνυμον, οὕτως τὴν ὀψιν ἔχον, ἔτε τὴν διωάμιν τὴν αἰσθησιν. φύλλον τε καὶ ἔχει ὅμοιον τῷ σισυμβρίῳ, τὰς δὲ κλάνας μετὰ ζῆς. ἔστι δὲ τὴν χρεῖαν καὶ τὴν διωάμιν ἐκ ἐν τοῖς αἰσθησιν. τέτο μὲν οὐδὲ, ὡς περ ἐλέχθη φάρμακον ἅμα δὲ ἴδιον τῆς νήσου. φασὶ δὲ τινες ὅλως τῶν φύλλων, δὲ τῶν γάμων, καὶ ἀπλῶς τῶν ὑπὲρ γῆς, τὰ ἐν κρήτῃ διαφέρειν. Id est, Dictamnium Cretæ proprium est, admirabili facultate, & ad multa utili, maximè ad mulierum partus. Folio est pulegio simili, sapore haud ab simile, ramulis tenuioribus: vsus est foliorum, non ramorum, neque seminis. Ad multa quidem valet, sed maximè, vt dictum est, ad difficiles partus mulierum: aiunt enim vt facile pariant efficere, aut proculdubio dolores finire. Dantur bibenda ex aqua. Rara est hæc herba: locus enim qui eam producit, angustus. Eam capræ summa cum voluptate depascuntur: verum esse aiunt quod de telis fertur, eas Dictamno deuorato sagittas quibus ictæ fuerint eiicere, Tale est

Lib. 2. hist. cap. 16.

Dictamnium, & his viribus prædium. Pseudodictamnium illi simile est folio, sed ramulis minoribus, & viribus multum infirmioribus. Tamen ad eadem confert, sed multo inefficacius atque debilius. Vis Dictamni in ore statim percipitur. Excalfacit enim vehementer parua quantitate. Manipulos eius ferula aut arundine includunt, ne expiret: debilius enim redditur cum expirauerit. Existimant quidam naturam Dictamni & Pseudodictamni eandem esse, sed quia pinguioribus locis nascatur, deterius fieri, quemadmodum & alia multa, quæ loci ratione vires mutant in deterius: Dictamnium enim locis asperis gaudet. Est etiam aliud dictamnium velut homonymum, neque facie, neque viribus iisdem. Folium habet sisymbrio simile, ramos maiores. Vfus & vis non iisdem competunt. Hoc igitur, ut diximus, mirum, simul & proprium est Cretæ Insulæ. Affirmant in vniuersum quidam herbas, frutices, denique omnia quæ ex terra oriuntur in Creta præstantiora esse. Hæc Theophrastus. Quæ ferè omnia à Plinio expressa vides, nisi quod illic de ceruis dixit, & alio in loco, Dictamnium herbam extrahendis sagittis cerui monstrauere, percussis eo telo, pastuque eius herbæ eiecto, id Theophrastus de capris, & hoc prior etiam Aristoteles his verbis: καὶ ἐν Κρήνῃ φασι τὰς ἀγὰς τὰς ἀγρίας ὅταν τοξοῦσθωσι, ζῆλιν ὁ δὲ δίκταμνον. διόκει γὰρ τὸ τοξοῦσθωσιν εἶναι τῶν τοξομασίων ἐν τῇ σῶματι. Id est, ferunt in Creta capras agrestes telis ictas dictamnium quærere, quod eo tela è corpore eiiciantur. Quos secutus Dioscorides, scripsit in Creta capras sagittis percussas dictamni herbæ pastu eas excutere. Id quod etiam cecinit Vergilius his versibus.

*Hic Venus indigno nati concussa dolore,
Dictamnium genitrix Cretæa carpit ab Ida,
Puberibus caulem foliis, & flore comantem
Purpureo, non illa feris incognita capris
Gramina, cum tergo volucres hæfere sagittæ.*

Præterea quas Theophrastus dictamni vires ad difficiles mulierum partus efficaces prodidit, eas etiam Dioscorides, & alias complures his verbis. Præstat omnia quæ satium pulegiū, sed multo efficacius: non enim potū modò, sed appositū & suffitum mortuos foetus expellit. Purgandi vim habet succus eius illitus, aut cum polenta tritus. Herba ipsa apposita infixos pedibus, aut reliquo corpori aculeos extrahit. Facit & ad lienis dolorem, ipsum enim minuit. Radix eius gustu calfacit, & partus accelerat. Succus eius cum vino potus contra serpentium morsus prodest. Tanta huius herbæ vis est, ut olfactu abigat, & contactu perimat bestias venenum iaculantes. Vulneribus ferro illatis, & venenatorum morsibus infusus succus simulque in potu acceptus statim sanitatem adfert. Pseudodictamnium eadem præstat, sed multo inefficacius. Tertia Dictamni species ad eadem quoque valet, ad quæ præcedens, sed minus nares ferit. Miscetur etiam emplastris & theriacis compositionibus. Eadem Plinius sparsim tradidit. Dictamnium potu sagittas pellit, & alia tela extrahit illitu. Bibitur ex aquæ cyatho foliorum obolus. Proximè Pseudodictamnium. Vtraque etiam suppurationes discutit. Et aliquantò post de dolore vuluæ & strangulatu loquens. Sed præcipua dictamni vis est, inquit, menses ciet, partus emortuos vel transuersos eiicit. Bibitur ex aqua foliorum obolus: adeò ad hæc efficax, ut ne in cubiculum quidem prægnantium inferatur. Nec potu tantum, sed & illitu & suffitu valet: proximè Pseudodictamnium. Sed menses ciet cum mero decoctum pondere denarij. Et in fine capitis. Partus accelerat scordotis pota: dictamni folia præclarè dantur ex aqua. Constat vel oboli vnius pondere: vel si mortui sint in vtero infantes, protinus reddi sine vexatione puerperæ. Similiter prodest Pseudodictamnium, sed tardius. Galenus scribit dictamnium

Lib. 8. c. 27.

Lib. 9. hist.
Animal.Lib. 3. ca. 31.
Vires &
Temper.

Li. 26. C. 14.

Ibid. ca. 15.

Li. 6. simpl.

dictamnium tenuiore essentia constare quàm pulegium, cætera illi simile esse. At Pseudodictamnium ad omnia imbecillius dictamno esse. Hæc Galenus. Verùm dictamnium maioribus nostris incognitum fuit. Non paucis enim ab hinc annis cum suo flore perrarum & charum erat: quippe perpaucum olim, idque floribus orbatum ex Creta adferebatur. Idcirco floribus carere Dioscorides, & veterum quidam credidere, non autem Theophrastus, qui fructum proferre innuit, ergo & florem, neque Vergilius, vt ex versibus supra citatis liquet. Galenus etiam in Emplastro ex dictamno, quod acceptum refert Damocrati, dictamni florem habentis meminit. Hodie magna eius copia ex Creta Venetias deferitur, vnde emunt Officinæ omnes, floribus ornatum speciosis, purpureis, multis, qui elucidis squamis spicarum & concoloribus emergunt. Quinimo Pisana oræ & Ligusticæ asperis deuexis satum creuisse audiit Pena, & floruisse exili semine in plantam paris pulchritudinis, qualem ipse vidit, tertio tamen, vel quinto post anno in spurium abiisse. Pseudodictamnium Pisis à clarissimo medico Luca Guino ad

Lib. 5. cōp.
med. gene.
cap. 10. 5
Petrus Pe.
fol. 214.

PSEVDODICTAMNVM,
Matthioli.



PSEVDODICTAMNVM,
Dodonæi.



Matthiolum missum caule est dodrantali, lanuginoso, albicante, folia ex caulibus erumpunt ex interuallis bina, dictamni tomento pubescentia, è quorum omnium exortu flores purpurei prodeunt, marrubij vel melissophylli modo, sapore pulegij, minùs tamen acri. Pseudodictamnium aliud depinxit, & descripsit Dodonæus, caulibus rotundis, lenibus, villosis, geniculatis, è singulis geniculis folia bina exeunt, quadantenus rotunda, candida, lenia, hirsuta, facie pulegij foliis haud absimilia, nisi quod maiora sunt, prorsus candida, villosa, tactu mollia, non secus quàm verbasci folia, inodora, gustu minimè acria, sed amara: flores dilutè cærulei cauliculos verticillatim coronant, vt in Pulegio & marrubio.

Lib. 2. c. 75.

THYMBRA ET SATVREIA. CAP. IX.

Nomina

Lib. 19. c. 8.



QVÆ Θύμβρα Græcis dicitur, Latinis etiam Thymbra, & Cunila quibusdam, & Satureia Plinio auctore. Thymbram, inquit, Cunilam: subaudi, vocant. Hæc apud nos habet vocabulum & aliud, satureia dicta in condimentario genere. Seritur mense Februario organo æmula. Nusquam utrunque additur, quippe similis effectus. Sed cunilæ ægyptium organum tantum præfertur. In quibus Plinius eandem herbam thymbram, cunilam, & satureiam facit. Columella verò à thymbra cunilam quam satureiam vocat distinxit: sic enim ait. Tum etiam thymbræ, vel nostratis cunilæ, quam satureiam rustici vocant. Et paulò post, & nostras cunila quam dixi satureiam. Rursus in carmine.

Et satureia thymi referens thymbræq; saporem.

Lib. 10.

Si igitur alia est thymbra Dioscoridis, alia satureia, videtur hæc hortensis seu sativa esse, herba vulgo nota, Gallis *Sarriette*, *sadree*, *Sauoree*, Italis *Sauoreggia*, *coniola*, *Peuerella*, Arabibus *Sabater*, seu *Sabatar*. Satureia à saturando fortè dicta, quòd eduliis frequenter indatur & incoquatur. Alij à satyris nomen ei positum fuisse putant, quòd venerem stimulet. Martialis non satureiam, sed satureia dixit in plurali neutra voce, dum ait.

Improba nec profunt iam Satureia tibi:

Quamuis aliqui legant,

Prodest iam Satureia tibi:

Lib. 3. 38.

Sicut Aetius & Θύμβρα. Verum ut Cunilæ vox quæ de multis plantis usurpatur, minus pariat ambiguitatis & tædij, lectorem monendum censeo, Cunilam sine epitheto, Plinio cap. 8. 19. Columellæ cap. 4. 9. vocari Satureiam, siue sativa sit, siue sylvestris, cuius utriusque meminit Plinius cap. 16. 20. deinde, organum Heracleoticum Plinio cap. 16. 20. appellari Cunilam gallinaceam: organum verò sylvestre, Cunilam bubulam, assentiente Dioscoride, tametsi hæc organi genera vocari cunilas tradat, absq; epitheto. In hac Cunilæ appellatione, Crateuas falsus est, auctore Plinio, cap. 8. 19. & cap. 15. 20. qui ligusticum, ab aliis Panaces dictum, Cunilam bubulam nominaverit. Præter has Plinius cap. 10. 32. Cunilam capitata memorat, quam Cephaloten vocavit Serenus. Ea meo iudicio Polycnemon est, Cunilæ nomen adeptum, quia folio simile sit organis, Cunilæ generibus, adiecto epitheto Capitata, quia caput suavis & acris odoris habet, corymbi specie. In Cunilorum explicatione vitio vertendum Plinio, quod cap. 16. 20. dum bubulam describit, ex historia Polycnemi deprauata eam prodat, semen habere Pulegij, utile ad vulnera, commanducatum, & impositum, ut quinto post die solvatur, cum Polycnemon Dioscoridi, cui plus tribuendum, caulem edat Pulegio similem, non semen, & agglutinandis vulneribus, recens, vel aridum, cum aqua efficaciter illinatur, ut tamen quinto die solui debeat: quibus locis ad hunc modum collatis apparet hæc perturbata Plinium confudisse. Idem scriptor Cunilaginem Conyzam nominat, distinctis etiam illius generibus, eodem prorsus modo quo apud Dioscoridem discernuntur. Is thymbræ genera duo posuit, hanc sativam, illam silvestrem, & utramque paucis notis delineavit. Silvestris gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, sed minor, & tenerior, ferens spicam floribus plenam, coloris herbacei. Sativa silvestri prorsus minor est. Harum neutra satureia nostras dici potest. Quare ex Matthiolo alterius imaginem hinc pinximus, quam Thymbræ Dioscoridis maxime congruere putat. Hæc enim foliis ac cauliculis thymum adeò repræsentat, inquit, ut non desint qui pro thymo eam recipiant. Præterea thymo gracilior, longeq; tenerior est. Verum capitula thymi modo non profert siquidem cauliculi in spicatos processus desinunt, in quibus flores emicant parvi, sed purpureo colore. At hanc minime veram esse thymbram Dioscoridis Pena existimat: videri etenim

potius

Genera.

Forma.



potius polium fœminam recentiorum : nec enim vlla spica donatur , aut in cibis commédatur : deniq; nullam nisi vagam & incertam est sortita notam. Genuinam autem sic depinxit, & hisce descripsit verbis. In Thyrrheni maris asperis, & salebrosis S. Iuliani Hetrusci, magno prouentu oritur, aspectu perquam elegans herbula, quam nullus non fatetur satureiam veram: Pisanis etiam vernaculo idioma-

SATUREIA, Durior.



te *Thymbra di Santo Iuliano* dictam. Virgultis est exilibus, palmum altis, sarmentosis, lignosis, foliis ab imo crebris, thymi Cretici, sed angustioribus, longiusculis, spica in summis cauliculis tereti, flosculo copioso intertexta, gustu acri & odoro, quæ tota ex obsoleta purpura albicat, thymo maiore minor, minori ferè par. Hæc Dioscoridis germana videtur. Matthiolus plantam ostendit, cui notæ omnes *Thymbrae* Dioscoridis maximè conueniunt. Etenim foliis ac cauliculis *Thymum* ita refert, vt nō desint qui eam pro thymo vsurpent: cauliculi enim in spicatos processus desinunt, in quibus flores emicant parui, subpurpurei. Præterea, vt Dioscorides ait, non solum sponte nascitur, sed etiam satiuæ est. Altera (si *Thymbra* aut *Satureia* rectè dici potest) maior fruticosiorque est, & in hortis frequentior, quæ ex eodē Matthiolo hîc quoq; exprimitur. Sequuntur cæteræ duæ, etsi non spicatae, vsu tamen satureiæ nomen adeptæ vulgo, quarum vsus in condimentis & lucanicis loco piperis est, eius præsertim, quæ in montosis & saxosis

saxosis Narbonensibus & Pedemontanis copiosè prouenit, Satureia durior à Dalechampsio nominata, radice breui, fibrata, nigra, dura, caule lignoso, fragili, furculoso, foliis thymo lōgioribus hyssopo vulgari ferè æqualibus, dēsius stipatis quàm in satureia hortensi, in qua bina ferè ex aduerso sita sunt. Nam in hac quaterna sæpius conspiciuntur, minoribus duobus ex maiorum veluti sinu consurgentibus

THYMBRA, Dodonæi.

Lib. 2. c. 52.



THYMBRÆ, Effigies, Dodonæi.



per interualla: inde flores promuntur copiosi, dilutè purpurei. Tota odoris est suavis, sed validissimi, gustus feruidi, & acris, ideò piperella quibusdam dicta. Thymbram non satureiam vocat Dodonæus, hîc ab ipso & à nobis appictam, furculis multis, lignosis, gracilibus fruticantem, foliis paruis, angustis, flosculis purpureis aut cādidis inter folia secus cauliculos exeuntibus, ab imo cauliculorum ad summum, qui dilapsi in spicarum viridiū speciem vertuntur, quibus semen valde minutum includitur, radix lignosa. Satureiam hybernā vocant, quod hyemem toleret, floret Octobri. Satureia nostra vulgaris raro ruri, frequentissimè in hortis visitur, herba æstiuā, tenera, superiore maior ac fruticosior: ramulis multis furculosis, in orbem sese diffundentibus, gracilibus, rotundis, nigricantibus, in quibus folia per interualla molliora & angustiora, pauciora quàm in superiore, hyssopi vulgaris foliis quadatenus similia, sed minora, ex quorum sinu flores pauciores emergunt, in cādido purpurei, odoris suavis: semen nigricat, radix tenera

SATUREIA, Vulgaris hortensis, Matth.



SATUREIA Lutea,
Dalechampij.

est & fibrata. In hortis omnibus quotannis feritur, & moritur: Iunio mēse floret. Huc referenda quæ à nonnullis Satureia lutea nominatur, in vmbrosis lucorum & siluarum marginibus & cliuis proueniens, radicibus paucis, exiguis, breuibus nigris: caule dodrantali, quadrato, in ramulos paucos brachiato, è foliorum alato sinu emergentes: foliis oblongis, angustis, minimè crenatis, angustis, hyssopo aut satureiæ similibus: flore paruo, oblongo, infra candicante, supra aureo, velut aperto quodam rictu & hiante, gustu subamaro & austero, floret Maio & Iunio. Thymbra siluestris, auctore Dioscoride, eadem potest quæ thymum, si similiter sumatur. Non aptus eius sanis vsus. Satiua propter mitiorem acrimoniam commodior est in cibis. Huius Galenus in simplicium censu non meminit. Paulus eadē prorsus quæ Dioscorides de vtraque scripsit. Satureia nostra vulgaris calida est & sicca ordine tertio. Farina eius in vino pota, vt ex antiquo herbario refert Fuchsius, medetur pulmonis, thoracis, & vesicæ vitiis, ciet vrinas, menses pellit. Herba ipsa cum floribus lethargicos

Vires & Temper.

Lib. 3. c. 38.

Cap. 13. hi.

excitat olfactu, aut coronæ modo capiti imposita. Succus cum rosaceo auribus infunditur: cum triticea farina coxendicibus illinitur. Satureiæ vsus marcescentes coitus stimulat, quare à satyris traxisse nomen putant. Stomachi concoctiones adiuuat: fastidia discutit: hebetes oculos exacuit.

THYMMVM.

CAP. X.



GRÆCIS θυμός & θύμον dicitur, Latinis Thymus & Thymum, Arabibus *Hasce*, *Alasce*, Gallis & Germanis *Thym*, & *Rhomischquendel*, Italis *Thimo*, Hispanis *Tomilho salsero*. Thymus autem Græcis ab excitando, quod θύειν dicunt, nomen inuenit. Nonnullis placet potius hoc etymum, vt thymos quasi thyæmos, quod est sanguinem impellens dicatur. Dioscorides thymi vnus historiam tradidit. Sunt tamen qui credunt in epithymi historia thymum aliud agnouisse, quod illic θυμόν σκληρότερον, id est, thymum durius vocat. Plinius species duas recēset. Totidem & thymi, candidum ac nigricans. Floret circa solstitium, cum apes decerpunt, & augurium mellis est. Prouētum enim sperant apiarum largè florescente eo. Læditur imbribus, amittitq; florem. Semen thymi non potest deprehendi, cum origani perquam minutum, non tamen fallat. Sed quid interest occultasse id naturam? In flore ipso satis intelligitur, satóque eo nascitur. Quid nō tentauēre homines? Mellis Attici in toto orbe summa laus existimatur. Ergo translatus est ex Attica thymum, & vix flore, vt dicemus, satum. Sed alia ratio naturæ obstitit, non durāte Attico thymo, nisi in afflatu maris. Erat quidē hæc opinio antiqua in omni thymo, ideóque non nasci in Arcadia. Tunc oleam non putabant gigni nisi intra CCC. stadia à mari. Thymo quidem nunc etiā lapideos campos in prouincia Narbonensi refertos scimus, hoc penè salo reditu, è longinquis regionibus pecudum millibus conuenientibus, vt thymo vescantur. Is locus ex Theophrasto transcriptus est, cuius declarandi gratia, ipsa Theophrasti verba

Nomina

Lib. 3. c. 37.

Genera

Lib. 4. c. 172

Lib. 21. c. 10.

Lib. 6. hist.

cap. 2.

adscribam. καὶ θύμον δ' μὴν λευκόν, τὸ δὲ μέλαν, εὐανθές δὲ σφόδρα, περὶ τροπᾶς ἀνθεῖ
 γερνᾶς, ἀφ' ἧς καὶ ἡ μέλιτι λαμβάνει τὸ μέλι. καὶ τοῦτο φασι οἱ μελιτῖδες οἱ δὴλον εἶναι πό-
 τερον εὐμελιτιοῦσιν, ἢ ὁ. χαλῶς γὰρ ἀπανθήσαντος, εὐμελιτῖς. βλάπτει δ' καὶ ἀπάλλουσι τὴν
 ἀνθησιν ὕδωρ, εἰς ἐπιγένηται. σπέρμα δ' καρπιμὸν ἢ μὴν θύμβρα, καὶ ἔτι μάλλον ἢ ὀρέγανος ἔχει
 φανερὸν. τὸ θύμβρα δὲ ἔκ' ἐστὶ λαβεῖν, ἀλλ' ἐν τῷ ἀνθεῖ ὥς ἀναμεμήχθαι. σπεύρουσι γὰρ τὸτο,
 καὶ ἀναβλαστάνει. ζῆλῳσι δ' ἔλαμβάνουσιν οἱ ἐξάγειν Ἀθήνησι βυλόμενοι δ' γένος. ἴδιον δὲ ἔχει
 καὶ πρὸς ταῦτα, ἔχει δὲ πρὸς τὰ ἄλλα, καὶ καὶ τὸς τόπους. ὁ γὰρ φασι δύνασθαι φύεσθαι καὶ
 λαμβάνειν ὅπως μὴ ἀναπνοὴ διῶκεται ἢ ἀπὸ τῆς θαλάσσης. διὸ ἔδ' ἐν Ἀρχαδίᾳ γίνεσθαι θύμβρα
 τε, καὶ ὀρέγανον. καί τοι τοιαῦτα πολλὰ, καὶ πολλαχῶς. παραπλήσιον οὖν δ' συμβαῖνον τῷ καὶ
 ἐπὶ τῆς ἐλαίας. ἔδ' γὰρ ἔδ' ἐκείνη δοκεῖ τετρακοσίων σταδίων ἀπὸ θαλάσσης ἐπάνω φύεσθαι.
 Id est, Thymum aliud candidum, aliud nigrum. Serò id admodum floret (non
 εὐανθές vt in vulgatis codicibus exaratum est, sed ὁψιανθές legit Gaza, ad sensum ac-
 commodatius: mox enim sequitur ratio seræ florum productionis) Nam circa sol-
 stitium æstiuum floret, à quo mel apes colligunt, atq; ex eo præfagiri aiunt, an lar-
 gior futurus sit mellis prouentus: nam si flos læsus fuerit, mellis copia deficit, læditur
 autem & perit flos superuenientibus imbribus. Semen quidem fœcundum thym-
 bræ & origani perspicuè cernitur, Thymi verò nullum videre licet, sed quodāmo-
 do floribus ipsis permiscetur: flores enim ferunt, atque ita oritur. Quærunt autem
 atque inueniunt qui istud ex Athenis deferre volunt. Est etiam præter hæc ipsa, &
 reliqua omnia, peculiaris thymo natalium conditio. Nam quo flatus è mari ne-
 queat peruenire, illic nasci durareque posse omnino negant, quare neque thym-
 bram neque origanum in Arcadia prouenire, quamquam talia multa & multis in
 locis gignuntur. Simile igitur quod & oleæ vsuuenit: nec enim ea trecentis à mari
 stadiis nasci posse videtur. Hæc Theophrastus. Repetit thymi genera Plinius ali-
 quantò post. Thymum colligi oportet in flore, & in vmbra siccari. Duo autē sunt
 genera eius, candidum, radice lignosa, in collibus nascens, quod præfertur: alterum
 nigrius, floribusq; nigri. Hos auctores secuti herbarij recētiore duo thymi statuerunt
 genera. Vnum Creticum cognominatum, quod in Creta copiosum nascitur, &

THYMV M, Creticum.



Lib. 3. c. 37.

Lib. 4. c. 172

Forma.

κεφαλῶν vocatur à capitulis spicatis. Hoc ma-
 ius est, & candidum, foliis & furculis tanquam
 lanugine siue puluere obductis & candicanti-
 bus: alterum vulgatum, minus, & nigrum di-
 ctum, quia saturo colore herbaceo virens ferè
 nigriceat. Prioris Cretici & candidi duntaxat
 Dioscorides meminit, non solùm de thymo,
 sed etiam de epithymo tractans, doctorū her-
 bariorum sententia, qui thymū nigrum Theo-
 phrasti & Plinij serpyllum, zygidia Dioscoridis
 esse non sine ratione opinantur, vt dicemus.
 Thymum Dioscoridis frutex est paruus, furcu-
 losus, foliolis multis & angustis circumdatus,
 habens in summo capitula floribus purpura-
 scentibus referta. Thymum vulgare humilis
 est herba, furculis multis, fragilibus, lignosis,
 foliis perpusillis, gustu acribus, superiori tum
 facie, tum sapore haud absimilibus, sed non ita
 candicantibus. Flores verò nō in capitulis aut
 spicis, sed iuxta foliola purpurascunt, radices te-
 nues sunt & lignosæ. Ex quibus perspicuum
 est Plinium apertè hallucinatū fuisse, qui cū
 legisset

THYMV M *Vulgare siue*
Durius, Dodon.



legisset apud Theophrastum, alterum thymi genus nigrum esse, quod herbaceo virore & obscuro ferè nigricet, scripsit loco iam citato id floris esse nigri, qui flos in vtroque purpureus est, sed in Cretico saturatiore, in altero dilutiore purpura. Thymum Creticum gracili solo & petroso provenit, non solum in Creta, sed etiam in Græcia & Syria, vnde Venetias asportatur: Nigrum frequens in Narbonæ maritimis collibus, & aliis incultis Narbonensis provinciæ locis, vt eius lapideis campis, quod ait Plinius, vulgò *La crau de Prouence*, atq; etiam in Hispania. Frigidioribus regionibus studiosè colitur in hortis. Thymum, auctore Dioscoride, potum cum sale & aceto puita per aluum ducit. Decoctum eius cum melle orthopnoicis & asthmaticis prodest. Lumbricos ventris, menses, fœtus, & secundas pellit. Vrinam ciet. Mixtum melle in eclegmate excreabilia facit thoracis vitia. Recentia œdemata cum aceto illitum discutit, sanguinis grumos dissoluit. Thy-mos & verrucas pësiles tollit. Ischiadicis cum vino & polëta impositum auxiliatur. Vtile est

Lib. 21. c. 21.

Locus.

Lib. 3. c. 37.

Vires &

Temper

etiam pro condimento in sanitatis vsu. De eadem re hæc multò fusiùs tradidit Plinius. Vtraque oculorum claritati multum conferre existimantur, & in cibo, & in medicamentis. Item diutinæ tussi eclegmate faciles excreationes facere cum aceto & sale. Sanguinem concreescere non pati è melle. Longas faucium distillationes extra illita cum sinapi, extenuare: item stomachi & ventris vitia. Modice his tamè vtendum est, quoniam excalfaciunt, quamuis sistunt aluum: quæ si exulcerata sit, denarij pondus in sextarium aceti & mellis addi oportet. Item si lateralis dolor sit, aut inter scapulas, aut in thorace Præcordiis medentur ex aceto cum melle, quæ potio datur & in alienatione mētis, ac melancholicis. Datur ex comitialibus, quos correptos olfactus excitat thymi. Aiunt & dormire eos oportere in molli thymo. Prodest & orthopnoicis, & anhelationi, mulierumque mensibus retardatis, vel si emortui sint in vtero partus, decoctum in aqua ad tertias. Et viris verò contra inflationes cum melle, & aceto. Et si venter turgat, testèsve, aut vesicæ dolor exigat. E' vino tumores & impetus tollit impositum. Item cum aceto callum, & verrucas. Coxendicibus imponitur & articularibus morbis, & luxatis tritum, ac lanæ inspersum ex oleo. Dant & potionem articularibus morbis trium obolorum pondere in tribus aceti & mellis. Et in fastidio tritum cum sale. Quibus qualitatibus hæc efficiant Galenus docet his verbis. Thymum incidit, & calfacit vehementer, ob id & urinam & menses prouocat, fœtum euellit, viscera potum expurgat, educendis ex pulmone & thorace confert. Itaque in excalfaciendo exsiccandoque, in tertio ordine statuendum est. Præter quas vires, alias quoque ei tribuit Aetius sic scribens. Hæc experientia de thymo comperta sunt. Dato ieiunis articulari morbo laborantibus, thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyathobilem enim reliquosque humores, atque acrem saniem euacuat, facit & ad vesicæ affectus. Ventre autem inflato, vbi scilicet intumescere cœperit, drachmam vnam dato ieiunis cum cochleari aquæ mulsæ. Ad lumborum coxendicumque dolorem, laterisque, thoracis, ac hypochondriorum suspensiones, & inflationes, pon-

Lib. 21. c. 21.

Lib. 6. sim.

Lib. 1.

dere trium drachmarum cum oxymelite temperato, mensura cochlearij ieiunio exhibeto. Similiter etiam & melancholicis, & mente turbatis, timoreq; detentis drachmas tres cum oxymelitis temperati cochleari præbeto. Dato item ieiunis, & ante coenam, aduersus lippitudines, & vehementem oculorum dolorem. Præterea contra podagram, etiam quæ motum omnino interceperit, cum vino utilissimè propinatur. Postremò ad tumefactos testes ieiunis trium drachmarum ponere exhibetur. Verum ab atro thymo abstinere oportet: corrumpit enim temperamentum, bilémque gignit. Eligendum quod purpureo flore est: præstantius tamè quod album habet. Ex thymo manat oleum aurei coloris, inquit Matthiolus, quod una cum aqua elicitur, dum per calentis aquæ balneum herba recens viridisq; distillatur. Hoc citreum malum resipit, gustu acerrimum est, & ad ea omnia utile, quæ vehementer exalferi postulant.

SERPYLLVM.

CAP. XI.

Nomina

Lib. 3. c. 39.

Ibid.

Genera.

Lib. 20. c. 2.

Ibid. 6. hist.

Cap. 7.

Ibid.

Lib. 3. c. 39.

Forma.


In cap. 39.

lib. 3.

Sερπυλλος & ἑρπυλλον Græcè, Latinè Serpyllum, Officinæ Latinum nomen retinuerunt, Arabicè *Hemen*, Italicè *Serpillo*, Germanis *Querdel*, & *Hener Roel*, Hispanicè *Serpollo* & *Serpam*, Gallicè *Serpollet*. ἀπὸ τῆς ἑρπειν, auctore Dioscoride, nomen à Græcis inditum est, id est, à serpendo. Varro quoque auctor est ab eo quod serpat, tam Græcis quàm Latinis dictum esse, quoniā si qua eius particula terram attingat, ibi radices demittit. Dioscorides duo serpylli genera esse scripsit, hortense odore sampsuchum referens, & idem coronarium, quod serpit: ac sylvestre, zygis appellatum, quod fortè eo iugarentur vites. ζυγεῖν enim Græcis interdum idem quod Latinis ligare, & vincire significat. Istud non serpit. Plinio de iisdem generibus cum Dioscoride conuenit, minimè verò in eo quod de proserpendo tradunt. Verba eius hæc sunt. Serpyllum à serpendo putant dictum. Quod siluestri euenit, in petris maximè. Satium non serpit, sed ad palmi altitudinem increscit. Pinguius volūtarium, & candidioribus foliis, & ramis. Quod itaque Plinius de siluestri, id Dioscorides de hortensi dixit. Theophrastus vtriusq; etiam serpylli meminit, sed hortense non aliud illi videtur esse quàm silvestre in hortos translatum. Sic enim ait, καὶ γὰρ ἑρπυλλος ἔστιν ἀγριος, ὃν κομίζοντες ἐκ τῶν ὄρων φυτεύουσι, καὶ ἐν συκιῶνι, καὶ ἀθήνησιν ἐκ τῆς ἡμετέρας παρ' ἄλλοις ὅλως ὄρη πλήρη, καὶ τόποι, καὶ γὰρ ἐν τῇ θράκη, καὶ σισυμβριον ὃ καὶ τ' ἄλλα διρμύτεραν ἔχοντα τὴν ὁσμὴν. Id est, Etenim serpyllum est silvestre, quod deferentes ex montibus ferunt, vt Sycione & Athenis ex Hymetto. Apud alios verò, vt in Thracia, montes & alia loca serpyllo scatent, & sisymbrio, & reliquis acriori odore præditis. Rectius quàm Gaza, qui vertit, serpyllo scatent, sed sisymbrio reliquisq; odor acrior est. Quātum verò serpyllum, & quomodo serpere possit, declarat Theophrastus his verbis, τῆς δὲ ἑρπύλλου ἰδίας ἢ ἀυξησις ἢ τῶν βλαστῶν. δύναται γὰρ ἐφ' ὅσον ἐν παροιέναι καὶ μέγας, χάρακα λαβάν, ἢ πρὸς αἵμασιν φυτευθεῖς, ἢ κατὰ καθεύμενος. Id est, Ramulorum serpylli proprium quoddam est incrementum, quippe cum possit in quantam volueris longitudinem trahi, arrepto pedamento aliquo, aut si prope sepes planteretur, aut ex loco altiore demissum. Serpyllum hortense sic describit Dioscorides. Folia habet & ramos origano similes, (vel vt quidam legunt, tragorigano: nam Tragorigani folium cum serpyllo sylvestri idem confert) sed candidiores: ad sepes demissum multò procerius assurgit. Silvestre non serpit, sed rectum ramulos emittit tenues, surculosos, foliis refertos rutæ similibus, vel, vt rursus legunt, Tragorigano: τραγοειγάνω, non πηγάνω. tamen subangustis, oblongioribus, durioribus: flores gustanti acres, iucundè olentes: radix inutilis. Nascitur in petris. Matthiolus serpyllum hortense in Hetruria haud negligi, sed in hortis feri, & diligenter coli tradidit. Silvestre duorum esse generum, vnum flore candido, odore citrij mali: alterū flore purpureo, gustu perquam acri, satureiæ simili.



SERPILLVM, Matthioli.



Saxifragæ Dioscoridis respondere putat. Lobellius pinxit. Narbonense Serpyllum foliis & facie perpusilli angustifolij Thymi nostratis, quod rarius est, in Ericetis

simili. Vtrumq; copiosissimè nasci apud Goritenses, in Saluatino mōte latissimū, & odoratissimū. Duo quoq; serpylli genera agnoscit Pena: quoddam satiuū, quod habitius & grandius est, quoddā siluestre incultis marginibus, sterilib⁹, & collibus gaudēs. Facies vtriq; thymi nostratis vulgaris: flores & folia similia, sed maiora, in cauliculis gracilibus, duris, lignosis, reptantibus: flosculi in capitulis, thymi vulgaris purpura rubentes, nonnunquam albicantes. Serpyllū vulgare Dodonæus libro de floribus non tam serpillo quā

fol. 181.

Egidij pagi, vulgò *S. Gilles*, agri Monspeliensis, Thymi angustifolij facie proueniens, lignosis & durioribus furculis repens, cuius radix & flores similes nostrati. Serpyllum quidem certè pauci hodie aut ferè nulli in hortis serunt, cum vbique copiosissimum nascatur, nec ideò tamen despicitur. Nam ex eo cum floribus siccato & trito à permultis puluisculus fit, quem vocant *du Pouffet*, quo iuscula condiunt. Serpyllum verò zygida Dioscoridis, periti quidam thymum nigrum esse putant, quo Narbonensis scatet Gallia, & quod etiam hodiè Monspelienses *Serpolet* appellant, Auenionenses & accolæ, *Farigoule*, Parisienses *Thym*. Nam thymi nomine Dioscorides albi tantum & Cretensis meminit, stœchadis modo capitula spicata gerentis, vt diximus. Hanc etiam plantam, quia naturā thymo proximam habet, à Theophrasto serpyllum *θυμῶδες* dictam volunt, non thymum penitus redolens, vt conuertit Gaza, sed thymo figura, folio, rectis virgulis, flore, odore, viribus ac facultatibus simile, quas sic declarat Dioscorides. Serpyllum siluestre satiuo efficacius est, magis excalfaciens, & ad medicum vsum aptius. Menses extrahit, & vrinas cit potu. Torminibus, ruptis, vulsis, iocinoris inflammationibus auxiliatur, aduersus serpētes potū & illitum. Capitis dolores mulcet coctū, adiecto rosaceo, & aceto mactū. Maximè verò lethargo & phrenitidi cōuenit. Sanguinis vomitus sedat succus eius quatuor drachmis cum aceto potus. Plinius eadem ferè habet. Aduersus serpentes efficax, inquit, maximè cenchrin, & scolopendras terrestres ac marinas, & scorpiones, decoctis in vino ramis foliisq;. Fugat & odore omnes si vratur. Et cōtra marinorum venena præcipuè valet. Capitis doloribus decoctū in aceto illinitur temporibus aut fronti cum rosaceo. Item phreniticis, lethargicis: contra tormina & vrinæ difficultatem, anginas, vomitiones drachmis quatuor datur. Ex aqua bibitur & ad iocinorum desideria. Folia obolis quatuor dantur ad lienem ex aceto. Ad cruētus excreationes teritur in cyathis duobus aceti & mellis. Serpyllū, auctore Galeno, vsq; adeò excalfacit, vt & menses & vrinas moueat, gustu multum est acre.

C A L A M I N T H A.

C A P. X I I.

Nomina



Καλὰ μίνθη Græcis, Latinis Calamintha, Officinis & Arabibus *Calamentum* dicitur, Italis *Calamento*, Gallis *Calamente*. Nominata verò est calamintha quasi vel bona vel utilis mentha: namq; odore suo serpentes fugat: quod testatur etiam Aristophanes his verbis. *σὺ δ' ὄρεϊς καλὰ μίνθης ὄρεως ἐλατ' κ' εἰς*. vel quasi elegantiore aspectu, odoreq; delatiori esset quàm mentha, certè habitiore nitidioreq; habitu esse nullus inficiabitur, inquit Pena, qui

Lib. 3. c. 36.

Genera.

Lib. 20. c. 14

In fine ca.

Lib. 3. c. 36.

Forma.

1. Calam.

In cap. 36.

lib. 3.


Vincentinam & Veronensem viderit. Nisi quis putet à *καλίου*, hoc est ligno, quasi lignosam appellari mentham. Dioscorides tria calaminthes recenset genera, calamintham montanam, alteram Latinorum nepetam, tertiam mēthastri similem. Plinius prima duo genera in vnā menthastri speciem confudisse videtur his verbis. Menthastrum siluestris mentha est, differens specie foliorum quasi figura ocimi, pulegij colore, propter quod quidam siluestre pulegium vocant. Quo loco falso pulegij colore, pro pulegij odore legitur, vt ex Dioscoride intelligere licet. Postea nepetæ vires seorsim exponit. Calamintham montanam describit Dioscorides foliis esse ocimi, subalbidis, ramulis & furculis angulosis, purpureo flore. Alteram pulegio similem, sed maiorem, quam ideo siluestre pulegium vocarunt, quod odore ipsi similis sit. Nepetam Latini vocant. Tertiam menthastro similem, foliis oblongioribus, caule & ramo superioribus maiorem, sed viribus inefficaciorem. Calamintham montanam sæpius à se visam scribit Matthiolus in excelsis vallis Anania montibus, foliis albicantibus, ocimo similibus, caule quadrāgulo, flore in purpurea rufescente. Hanc Lobellius Calamintham montanā vulgarem vocat, mediam odoris

CALAMINTHA Montana,

Matthioli.


CALAMINTHA Altera;

Matthioli.



odoris suauitate & magnitudine inter suauiolem Calaminthā & Nepetam. Quadrato enim cubitali & ampliore, alarum multis ramulis concauo caule fruticat, foliis rotundioribus nigrioribus, Nepetæ similibus, sed maioribus, hirtis nitidioribus, & iucundioris odoris fragrantia, flosculis non disparibus. Cliuosis Angliæ, Germa-

CALAMINTHA Montana
præstantior Pen. & Lobell.



niæ, Galliæ, Italiæ sponte oritur, vnde in viretis Belgicis alitur ad vsus medicos. Calamintham aliam montanam præstantiorem ostendunt Pena & Lobellius. Officinis omnibus nondū notam, quæ eius vice cattaria vtuntur. Non obuia est omnibus ista montana præstantior, nec nisi in Narbonensis Ceuenæ vmbrosis, saxosisq; cliuis frequens, & in Romano Patauinoq; agro virgis quadratis, nitidis, cubitum altis, & quam menthæ gracilioribus, folia edetibus ocimi aut melissophylli, sed minora, speciosiora, hirsutiora, flore item melissæ, sed purpureo, quauis calamintha maiore, aspectuq; hilariore, semine portulacæ minuto, odore amaraci, mentha suauiore. Alterius calaminthæ frequētior est vsus, quæ Romanis Nepeta nuncupatur. Hæc inculto solo prouenit, vt scribit Matthiolus, secus itinera & sepes, atq; etiam in collibus: foliis subrotundis, aliquatū hirsutis, in ambitu minutim insectis, caulibus cubitalibus, angulosis, hirsutis, floribus paruis purpurascens, à medio caule vsq; ad summum verticillatim erumpētibus, vt in pulegio, sed in cacumine copiosioribus,


In cap. 36.
lib. 3.

radicibus tenuibus & numerosis. Hæc est quã pulegio similem facit Dioscorides. Est enim foliis regalis pulegij, vt ait Pena, aliquantò maioribus, albidis, variegatis maculis, minoribus quàm superioris calaminthæ ex pullo porraceis, odore pulegio simili, sed vehementiore ingratioreq; præsertim feruidioribus tractibus, squalidus, cliuosus Italiæ, Narbonæ, & Galloprovinciæ, vbi nomine calaminthæ seu nepetæ Officinis vsurpatur, & in reliqua Gallia Lugdunensi præcipuè, vbi etiam totam æstatem flores purpurantes pallentesq; verticillatim virgas cubitales amicientes fundit. Est etiam Lobellij Calamintha altera, odore graui pulegij, foliis maculosis, Nepeta Dioscoridis, quam sic etiam vocasse debuit Matthiolus. Huius alteram speciem Calamintham secundam incanam ex Italiæ collibus attulit, & pinxit Lobellius, gustu pulegij, foliis maioranæ duplò minoribus, candicantibus, vti tota planta in cubitalibus & pedalibus furculis. Exiliores flosculi calaminthæ siue Nepetæ Dioscoridis, odoris grauis pulegij. Cautibus Linguagotticis calidarumq; regionũ oriunda, floribus albis ex collibus Picardiæ & Gallobelgij delatam calaminthã secundam vidit Lobellius. Tertia calaminthæ species Gattaria non est, vt scribit Matthiolus, sed illa quæ in aquosis locis reperitur, menthastri æmula, magis tamẽ subalbidis foliis, & gustu acrioribus, cuius hanc Matthiolus picturã ostendit. Quidam non calaminthæ speciem, sed mēthastrum album appellant. Pena & Lobellius Polycnemum esse suspicantur, de quo in hoc libro tractabimus suo loco. Alij scordotim alteram Plinij, de qua ille: Scordotis est, inquit, & alterius generis, latioribus foliis, menthastro similis. Plurimos vtraque ad vsus per se, & inter alia in antidotis. Alij Scordotim Plinij Saluiam agrestem Officinarum, siue Saluiam bosci esse aiunt, quam Dodonæus Sphacelum Theophrasti esse credit: alij, quorũ sententia probabilior, Gallitricum Officinarum: alij Stachyn earumdem. Pena & Lobellius aliã mēthastri foliis aquaticam, hirsutam, calamintham tertiam Dioscoridis esse censent, cuius facilis dignotio menthastrum intuenti, inquit Pena, vtraque enim aquosis viret marginibus factorum aut pratorum. Huius caulis cubitum & sesquicubitum æquat, folia menthastri aut sisymbrij edit, incana: flores mēthæ spicatos purpura obsoleta, odoris grauis sisymbrij, nec gustu nimis calfaciente. Quidam sylvestre Sisymbriũ Dioscoridis esse putant. Hanc videtur Tragus nomine quartæ nepetæ agrestis depinxisse,

CALAMINTHA *Aquatiqua,*
Matthioli.



Lib. 27. c. 6. **CALAMINTHA** *Secunda*
incana, Lobellij.



lidiis, cliuosus Italiæ, Narbonæ, & Galloprovinciæ, vbi nomine calaminthæ seu nepetæ Officinis vsurpatur, & in reliqua Gallia Lugdunensi præcipuè, vbi etiam totam æstatem flores purpurantes pallentesq; verticillatim virgas cubitales amicientes fundit. Est etiam Lobellij Calamintha altera, odore graui pulegij, foliis maculosis, Nepeta Dioscoridis, quam sic etiam vocasse debuit Matthiolus. Huius alteram speciem Calamintham secundam incanam ex Italiæ collibus attulit, & pinxit Lobellius, gustu pulegij, foliis maioranæ duplò minoribus, candicantibus, vti tota planta in cubitalibus & pedalibus furculis. Exiliores flosculi calaminthæ siue Nepetæ Dioscoridis, odoris grauis pulegij. Cautibus Linguagotticis calidarumq; regionũ oriunda, floribus albis ex collibus Picardiæ & Gallobelgij delatam calaminthã secundam vidit Lobellius. Tertia calaminthæ species Gattaria non est, vt scribit Matthiolus, sed illa quæ in aquosis locis reperitur, menthastri æmula, magis tamẽ subalbidis foliis, & gustu acrioribus, cuius hanc Matthiolus picturã ostendit. Quidam non calaminthæ speciem, sed mēthastrum album appellant. Pena & Lobellius Polycnemum esse suspicantur, de quo in hoc libro tractabimus suo loco. Alij scordotim alteram Plinij, de qua ille: Scordotis est, inquit, & alterius generis, latioribus foliis, menthastro similis. Plurimos vtraque ad vsus per se, & inter alia in antidotis. Alij Scordotim Plinij Saluiam agrestem Officinarum, siue Saluiam bosci esse aiunt, quam Dodonæus Sphacelum Theophrasti esse credit: alij, quorũ sententia probabilior, Gallitricum Officinarum: alij Stachyn earumdem. Pena & Lobellius aliã mēthastri foliis aquaticam, hirsutam, calamintham tertiam Dioscoridis esse censent, cuius facilis dignotio menthastrum intuenti, inquit Pena, vtraque enim aquosis viret marginibus factorum aut pratorum. Huius caulis cubitum & sesquicubitum æquat, folia menthastri aut sisymbrij edit, incana: flores mēthæ spicatos purpura obsoleta, odoris grauis sisymbrij, nec gustu nimis calfaciente. Quidam sylvestre Sisymbriũ Dioscoridis esse putant. Hanc videtur Tragus nomine quartæ nepetæ agrestis depinxisse,

plantam

NEPETA 1111. Tragi,
Calamintha menthastrum
 folio, Pena.



CALAMINTHA
 11. & 111. Dioscor.



plantam grauiſſimi odoris, circa humida loca
 prouenientem, folia habentē origani, incana,
 gustu impensē feruentia & amara, flores ru-
 bros caulem circundantes. Calaminthæ se-
 cundæ siue Nepetæ genuinæ ramulum, & Ca-
 lamintham tertiam Dioscoridis, hîc expresi-
 mus ex Dalechampio. Ac secundæ quidem pu-
 legio similis foliis & albis notulis signatis
 delineatio, satis ex supradictis perspicua est.
 Tertiam verò sic descripsit. Nascitur ferè sub
 sepibus, in locis editis & pinguibus: radicibus
 multis, tenuibus, subnigris: caulibus tribus aut
 quatuor nonnunquam pluribus, quadrangulis,
 rubris, villosis, cubitalibus: foliis primæ Cala-
 minthes, sed longioribus, & ad menthastrum
 accedentibus, per interualla binis, lanuginosis,
 ex quorum alis interdum foliosi furculi pro-
 deunt. In caulium vertice, & eorūdem discre-
 tis spatiis verticillatim congeries, vt in Prasio,
 asperæ & hirtæ, ex quibus flos exit, non confer-
 tim, sed vicissim oblongus, supernè latus infer-
 nè angustus, nitidi ruboris. Gustus plantæ to-
 tius amarus principio, tandem subacer: odor
 grauis & ignauus. Omnium Calamintharum
 folia, auctore Dioscoride, gustu feruētia admo-
 dum & acria sunt: radix inutilis. Pota aut illita
 folia demorsis à serpente opitulantur. Deco-
 ctum potum vrinas & menses pellit. Ruptis,
 conuulsis, orthopnœæ, torminibus, cholerae,
 rigoribusque auxiliatur: præsumpta in vino
 venenis resistit. Regiū morbū expurgat. Lum-
 bricos & ascaridas cū sale & melle pota enecat.
 Nec secus cruda cocta; & trita, elephanticos
 esitata adiuuat, si postea serum lactis bibatur.
 Folia trita & apposita menses ducunt, & fœtus
 interimunt. Accensa aut substrata serpētes, fu-
 gant: nigris cicatricibus candorem reddunt in
 vino cocta & illita: sugillata tollunt. Ischiadicis
 imponitur, vt humorem ex alto euocet, mea-
 tūsque transmutet summam cutem exurens.
 Vermes necat succus auribus instillatus. Quæ
 omnia distinctiùs & fusiùs declarat Galenus
 his verbis. Calamintha essentia est tenui, & ca-
 lida sicca; temperie, tertio quodammodo or-
 dine vtraque qualitate. Horum manifesta sunt
 indicia partim gustu apparentia, partim expe-
 rientia cognita. Gustu siquidem acris, & palam

Matthi. in
 ca. 121. li. 2.

Lib. 3. c. 36.
 Vires &
 Temper.

Li. 7. simpl.

calida est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet. Periclitantibus autem & cor-
 pori admoventibus extrinsecus imposita, primum quidē valde calfacit, & non nihil
 mordet, cutemq; rodit, postremo etiā vlcus efficit. In corpus autē intrò assumpta

tum ipsa per sese sicca, tum etiā cum melicrato, perspicuè calfacit, & sudores ciet, omneq; corpus tum digerit, tum exsiccat. Ea ratione ducti quidā contra corporis concusiones, rigoresq; per circuitū repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo incoctam toti corpori inungentes cum frictione non segni, intro verò assumētes, sicut dictum est. Quinetiam & coxēdicibus eam quidam in ægritudinibus ischia-
dicis tanquam strenuum remedium illinunt: trahit enim quæ in profundo hæ-
rent ad superficiem, totumq; articulū excalfacit, cutemq; nō obscure adurit, men-
sesq; tum epota, tum apposita admodum efficaciter prouocat. Bonū etiam est ele-
phanticorū remediū, non eò tantum quòd strenuè tenues humores digerat, verū
etiam quòd extenuet & incidat valenter crassos, qui talem morbū procreant. Sic
& cicatricibus atris colorē reddit, & fugillata digerit. Præstat autē in huiuscemodi,
vbi in viño ipsam decoxerimus, emplastri ritu imponere, & viridem magis quàm
siccam. Quippe arefacta vehementior redditur, & ad vrendum promptior. Porro
talis cum sit ad venenatarum bestiarum morsus assumitur, velut etiam cauteria, &
quæcūque medicamenta calida sunt, & acria, tenuiumq; partium, quæq; facile ex
alto ad sese circumiacentem omnem humiditatem possunt attrahere. Cæterū, quæ
illi inest amaritudo, planè exigua est, verū ad quædam tam efficax, quàm quæ va-
lentissima, nimirū cum coniuncta sit vehementi calori cum tenui essentia. Quare
& ascaridas & lumbricos succus eius aut infusus aut epotus necat. Eadem ratione
aurium vermes, aut si alicubi in corporis parte sinuosa aut rugosa quæ putredine
tentetur, talis prouenerit affectus. Sic conceptum seu pota, seu admota interimit
& eiicit. Igitur incidendi quidem ei vis inest propter calorem eius, tenuitatem, &
amaritudinem, abstergerendi verò propter vnicam amaritudinē. Itaque asthmaticis
ob omnia antedicta prodest: ictericis verò potissimū ob amaritudinē, sicut om-
nia ferè alia amara, vtpotè abstergentia & expurgantia in iocinore prouenientes
obstructiones. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

CATTARIA.

CAP. XIII.

Nomina

HERBA Felis, Matthioli.

Genera.
Forma.

QUÆ Cattaria, siue Menthacatti
vulgò dicitur, Gallis *l'Herbe au*
chat, Italis *Gattaria*, siue *Herba*
Gatta, Germanis *Katzenuurtz*, Ne-
peta non est antiquorum, neque alia calamin-
thæ species, sed veluti inter calaminthā & me-
lissam, antiquis fortè ignorata, tamen præstans
viribus. Cattariā verò plebs vocauit peramœni
spectaculi argumento. Vix dum enim conspe-
ctam vbi olfecerit Cattus, amplexatus & dis-
suauitatus fuerit, lasciuiēdoq; illi iam accedēdo,
iam recedendo sese vtriusq; pedibus diu & mul-
tum affricuerit, colludendo tādē miris gesti-
culationibus vniuersam auidē ligurit: sed aui-
dius si ea ex agris in hortos fuerit translata: te-
nerior enim tunc est, odorēque non perinde
vehementi. Est enim hortensis & agrestis,
ambæ similes, caulibus quadratis, numerosis,
rectis, incanis. Foliis per interualla binis, inca-
nis, melissæ aut marrubij æqualibus, mollibus
& subcandicantibus, præsertim auersa parte:
floribus intra & circum superiorum foliorum
exortus

M E N T H A Cattaria
Peregrina latifolia, Lobel.

M E N T H A Cattaria
angustifolia, Lobellij.



exortus ramulos ambientibus, & extrema spica caudata decorantibus, menthæ aut menthastrî: radicibus multifidis & fibratis. Nascitur in agrorum marginibus, secus vias, vliginoso etiam solo quemadmodum menthastrum. Menthâ duplicem peregrinam hîc ex Lobellio proponimus, Latifoliam & Angustifoliam. Priori folia Cretici marrubij proxima, incana, flores candidi, copiosi Cattariæ vulgaris, verticillatim caulem etiam quadratum ambientes, multis concavum alis, eiusque summum decorantes. Magis intensus eius odor, grauior vires etiâ acriores quam Cattariæ. Altera dūtaxat angustioribus minoribusq; foliis variat, alioqui re ipsa vna & eadem quæ superior. Vtraque semine Hispano sata. Strenuè excalfacit & attenuat. Quare valet ad omnes capitis, pectoris, vetriculi, & vteri morbos, à pituitosis excrementis aut flatu genitos. Ideò diuturno capitis dolore affectis, vertiginosis, veternosis, stupidis, resolutis, conuulsis, comitialibus, asthmaticis & suspiriosis auxiliatur. Item medetur ventriculi torminibus à flatu prouenientibus. Tota planta menses elicit tam pota, quàm in desseffionibus addita. Eius vsus steriles reddit fœcundas, si sterilitatis frigiditas humiditasq; causa sit: valenter enim vterū excalfacit. Succus naribus infusus pituitæ copiam expurgat & visum acuit.

Locus.

Temper.
& Vires.
Matth. in
ca. 36. lib. 3.

SCORDIVM.

CAP. XIIII.

ΣΚΟΡΔΙΟΝ Græcis, Latinis Trixago palustris, Plinio Scordotis, Officinis ferè incognita, Germanis allusione quadam ad Romanam appellationem aptè *V-vasser Batenig* nominatur, Gallis *Scordion* & *Chamarraz*. Scordium autem à Græcis dictum fuit ab alliis, quia folia eius affricta allij, quod Græcis σκόροδον vocatur, odorem referunt. Ab eodem mali & ingrati odoris sensu iisdem etiam δύσσομον appellata fuit. Vt verò palustris trixago dicta sit, tum similitudo fecit, tum natalium locus, Trixagini enim quæ Græcis chamædryd dicitur, similis est, & in humentibus ac palustribus locis nascitur. Scordiū, vt depinxit Dioscorides, folia chamædryj similia habet, maiora tamen, nec sic in ambitu incisa, odore aliquantum allium referencia, gustu adstringentia & amara, caules quadran

Nomina

Li. 3. ca. 108.
Forma.

Lib.25.c.6. quadrangulos, in quibus flos subrubescens. Lenæus apud Plinium Mithridati ipsum adscripsit his verbis. Ipsi Mithridati Crateuas adscripsit vnam Mithridation vocatam. Et mox, Alteram Lenæus Scordotim siue Scordiū, ipsius manu adscriptam, magnitudine cubitali, quadrangulo caule, ramosam, quercus similitudine, foliis lanuginosis. Reperitur in Pōto campis pinguibus, humidisque, gustus amari. Hæc Plinius. Quod dicit quercus similitudine, de chamædri accipiendum videtur, cuius similia esse Scordij folia Dioscorides dixit, chamædryos autem quercui. Hæc herba tum allij tetro odore, tum alexipharmaca vi apud veteres celebris, patrum nostrorum memoria Medicis & Sepiasariis ignota fuit, ei tam salutari atque omnibus putridis marcoribus, vt Galenus ait, aduersanti, siluestre allium substituentibus. In hunc autem errorem incidisse tum vicinitate nominū deceptos, quia Scordium à Scorodo, quod Græcis allium significat, non distinguerent, tum interpretis Auicennæ imperitia constat, qui in altera theriacæ compositione Scordium, in altera siluestre allium indiderit, quæ interpretatio fecit, vt Scordium & siluestre allium nihil inter se differre existimarint. Hodie verò recentiorum & peritiorum herbariorum opera omnibus verum innotuit, quod hîc pictum est, nec aliud in theriacos pastillos inferendum, iis nimirum viribus præditum quas

SCORDIVM, *Matthioli.*



Pena fol.
210.

Li.1. Antid.

Lib.1.c.108.
Temper.
& Vires

Li.1. Antid.

Li.8. simpl.

Dioscorides illi assignat his verbis. Calfaciendi vim habet, vrinam cit. Viride tritum & aridum cum vino decoctum contra serpentium morsus & venena letalia bibitur. Ad stomachi rosiones, dysenteriam, & vrinæ difficultatem pondere duarum drachmarum cum hydromelite. Purgat crassa, & purulenta è thorace. Facit ad veterem tussim, rupta, conuulsa cum nasturtio, melle, & resina in ecligmate aridum commixtum. Hypochondriorum vetustas inflammationes cerato exceptū lenit. Succurrit podagris cum acri aceto circumlitum, aut ex aqua illitum. Menses suppositum mouet, vulnera glutinat, vetusta vlcera purgat, & cum melle ad cicatricem perducit. Siccatum carnem excrecentem reprimit. Succus præterea ex eo expressus ad prædicta vitia bibitur. Galenus tradidit scriptum esse à viris grauissimis, cum in bello interemptorū cadauera multos dies insepulta iacuissent, quæcumque supra Scordium fortè fortuna ceciderant, multò minùs aliis cōputruisse, ea præsertim parte qua herbam contigerant. Ob quā rem omnibus sanè persuasum est, tam putrefacientibus animalium venenis, quā medicamentorum deleteriis Scordiū aduersari. Præterea alibi de facultatibus scribens, ex diuersis tum saporibus, tum facultatibus ait constare. Nam amarum quid obtinet, & acerbū & acre, maximè Scorodo, hoc est, allio similis eius acrimonia, vnde sanè nomenclaturam sortitū est. Expurgat igitur, simulq; excalfacit viscera, tum menses vrinamq; mouet. Præterea conuulsa ruptaq; & laterū dolores ab obstructione & frigore natos sanat epotū. Deniq; viride quidē illitū magna vulnera cōglutinat, sed sordida purgat, & maligna ad cicatricē ducit, illitum aridū. Scordiū alterū Plinij quidam volunt esse Saluiam agrestem, quā Dodonæus facit Sphacelum Theophrasti, Cordus Scordianam vocat. De hac egimus capite secundo libri huius.

ALLIARIA.

CAP. XV.



T odore non ita facie nec facultatibus planta hæc scordium æmula-
tur, quod folia eius trita ingratum ac planè Alliatum odorè referant,
Alliaris siue alliaria dicta, à Pandectario Pes asini, à Gallis *l'Herbe*
aux aulx, à Dioscoride fortassè præterita. Propter sepes & in agrorū
marginibus passim nascitur, foliis cū primū erumpunt, subrotundis, violæ si-
militudine, aliquantò tamen maioribus, quæ cū adoleuerint in angulos exeunt,
per ambitum serrata, melissophylli aut vrticæ quadamtenus similia, sed læuora,
nec ita rugosa, & à pediculo latiora, quæ digitorum attritu gustatuq; Allij odorem
& saporem reddunt. Caulem profert bicubitalem, rotundum, flores albos, semen
nigrum, minutum, tenuibus siliquis inclusum, radix alba, longiuscula, eiusdem
cum foliis odoris. Huius plantæ delineationem non pessimè quadrare Plinij Ale-
ctorolopho scribit Pena, quippe folia per initia circinata, hederæ terrestri-
s, lon-
giora, altiusq; serrata euadunt, fimbriata, acutis in ambitu denticulis, tota planta

Nomina

Locus.

Forma.

Fol. 228.

ALLIARIA, Matthioli.



ALLIARIA, Dodonei.



vrticam referente, præterquàm siliquis, napi semine plenis nigricante, vt vult Pli-
nius. Flores multi, albidi, irionis: alba radix multos caules bicubitales fundens.
Tota gustu calidiusculo, humente, melioréque odore & gratiore quàm Allij: quo
fit vt mulierculæ, præsertim Angliæ, folia succulenta tusa, salsamentis & intincti-
bus frequenter misceant, multum ad incolumitatem annuam tuendam primo ve-
re commédantes. Erysimum aut erucam facultate refert: quare tussientibus pro-
derit, vt placet Plinio, de cuius Alectorolopho alibi diximus. Ex huius vi calfa-
ctoria & exsiccatoria colligi potest, crassos illam humores extenuare, & lentos in-
cidere. Aiunt semen emplastri modo impositum, vuluæq; admotum mulieres vte-
ri strangulatione oppressas liberare, & excitare.

Lib. 27. c. 5.

ACINVS

Nomina
Li. 21. ca. 15.
& 27.

Lib. 7. hist.
cap. 8.
Lib. 21. c. 15.

Forma.
Lib. 3. c. 43.
Lib. 21. c. 27

Lib. 3. c. 36.
Lib. 2. c. 60.
De flor. ca.
85.

DIOSCORIDI ἄκινος vel ἄκονος herba dicitur, item Plinio Acinos atque etiam epipetron, quam nunquam florere scripsit. Vnde suspitio oritur Acinon eandem esse, quæ in Theophrasto epimetron deprauatè pro epipetrō (Acini enim nulla apud eum mentio) nominatur his verbis ἐνιαυτὸς οὐκ ἔχει ὄλως ἀμάνθη, καὶ θάπερ καὶ τὸ ἐπιπέτρον. Id est, quædam omnino non florent, quemadmodum epipetron: quæ sic transtulit Plinius. Acinos quam epipetron vocant, quæ nunquam floret. Censent tamen peritiores eas, duas & diuersas esse, ac sic legendum: Acinos: & quam Epipetron vocant, &c. Ex quibus coniicias Acynon per, y, legendum esse, id est ἄτοκον sterilem. Est autem Acynos auctore Dioscoride, herba tenuium surculorum, coronaria, ocimo similis, sed hirsutior & odorata. A quibusdam in hortis colitur. Plinius eadem ferè tradit. Acinum & coronarum causa & ciborum Ægyptij ferunt: eademq; erat quæ ocimum, nisi hirsutior ramis ac foliis esset, & admodum odorata. Hanc à quibusdam siluestre basilicum dici scripsit Ruellius, Latinis ocimastrum, Gallis *Basilic sauvage*. Dodonæus eandem plantam ocimastrum nomine descripsit & depinxit. Et certè non solum persimilis, sed etiam congener ocimo videtur Acinos, vt verè ocimum siluestre censerì possit, etiam si obstat mutila historia, si codex integer est, quæ illi flores adimit, quos inesse Dioscorides non negat. Quare fieri potuit, vt quod Plinio in Bechio, & Dioscoridi in Dictamno contigit, idem vsuenerit Plinio, nempe vt nullum agnosceret florem in Acyno: quæ si coronaria fuit, verisimilius est flores habuisse. Sed quemadmodum Bechio & petasitidi, quia præproperè florent, & citissimè deflorescunt, deesse florem quidam putarunt, sic fortè Acino, quia obscurius & serius flores promit, ac sæpius interdum cum emerferunt amittit, intempestiua autumnì qualibet minima sæuitia, sicuti videre est in nonnullis pusillos &

ACINVS, Siue Clinopodium silvestre.



ACINVS, Matthioli.



ferotinos

serotinos flores edentibus. Quare Acinos illa quam pinxit Lobellius, Pena descri-
psit, huic loco admodum congruam, flosculis purpureis, verticillatis, ramulis qua-
dratis, siccis & exilibus, foliis hirsutis, lanuginosis, ocimi, multa secus sepes viuax
fruticat, nonnihil aut perparum odora, gustanti multò siccior quàm ocimum,
tantillo odore subadstringente vt betonica. Eam infra pro Clinopodio primo
Matthioli exhibuimus. Cum igitur iis quas diximus qualitatibus prædita sit, posse
sistere menses, si ob partium imbecillitatem fluunt, posseq; igni sacro mederi
perspicuum est, cum moderatè repellat digerendo, quas vires acyno Dioscorides
assignauit. Aluum, inquit, & menses potu sistit. Panos & erysipelata imposita sa-
nat. Contraria verò Plinius: Ciet, inquit, menses & vrinas. Dioscoridi Paulus as-
sentitur scribens, Acynos ocimo similis mediocriter adstringendi vires habet:
ideoq; aluum & menses pota sistit. Imposita verò panos & erysipelata persanat.
Matthiolus ab aliis liberius dissentiens, reiecto ocimo siluestri, pro Acino cala-
mentum illud inodorum viarum, ubiq; frequens, & contemptum, à Manardo
iamdiu adductum, profert, illiq; sine vlla probatione præfert. At qui acrius, men-
struisq; ciendis aptum calamentum istud norit, neutiquam assentietur.

Vires.

Li. 21. c. 27.
Lib. 7.

Ca. 43. li. 3.

ASARVM.

CAP. XVII.

ASAPON Græcis & *νάρδος ἀγρία*, Latinis Asarum, & Nardus silue-
stris, quibusdam vulgago, Arabibus *Asaron*, Italis *Asaro* & *Baccara*,
Germanis *Häseluurtz*, Hispanis *Asarabacchara*, Gallis *Cabaret*. Asarum
autem vocitari dicit Plinius, quoniam in coronis non addatur, vel
dici potuit quasi *ἀσάριον* quod in ornatum non veniat: aut velut *ἐκ σφραγίδος*, idest,
coronarum nexus *ἐκ ἐλθόν*: quibus refragatur Dioscorides scribens herbam esse
ὠδὴν τετρανωμασίαν, idest, odoratam coronariam: id quod plantæ ipsius natura
confirmare videtur, cui semper virentia sunt folia, vitiles ramuli, flexiles pediculi,
flores purpurei, odore nardi. Quare cum Asarum coronarium fuisse negat Pli-
nius, intelligere potuit, inquit Pena, ex hac nullas aptari scopas lustrales verren-
dis deorum aris, quales colligebantur ex verbenis, verbascis, & similibus comosis,
firmioribusq;. Asarum Dioscorides scribit folia habere hederæ, minora multò &
rotundiora (Ruellius legit *μικρότερα*, antiquum exemplar *πικρότερα*, idest, densiora,
vtrobique deprauatè: etenim Asari folia, neque densiora, neque minora sunt he-
deræ foliis: quare *μαλακότερα* legendum censet Fuchsius, idest, molliora: quod par-
tim Plinij testimonio, partim ipso iudicij sensu comprobari potest) flores inter
folia ad radicem purpureos, odoratos, hyoscyami cytino similes, in quibus semen
Acino nō dissimile, radices multas, geniculatas, tenues, obliquas, gramini similes,
longè tamen graciliores, odoratas, calfacientes, & linguam vehementer morden-
tes. In montibus vmbrosis prouenit, sed plurimùm in Ponto, Phrygia, Illyrico, &
Italiæ Iustineni agro. Breuius sic Plinius. Nardi vim habet & Asarum, quod &
ipsum aliqui siluestre Nardum appellant. Est autem hederæ foliis rotundioribus
tantùm mollioribusq;, flore purpureo, radice Gallici nardi: semen acinosum, sapo-
ris calidi ac vinosi. Montibus in vmbrosis bis anno floret. Optimum in Ponto,
proximum in Phrygia, tertium in Illyrico. Foditur cum folia mittere incipit, & in
sole siccatur, celeriter situm sentiens ac senescens. Istud Asarum plantam esse om-
nibus Officinis Asari nomine notam nullus ambigit. De eo verò frustrà rixantur
recentes quidā rei herbariæ scriptores Baccar siue Baccarem, & Asarum à Plinio,
& Baccaram siue Baccarem & Asarum à seplasiariis pro eodem haberi, atque ab
illis & nomina & res ipsas confundi. Sed illi nominum affinitate falluntur. Nam
Baccar si Plinio sit Asarum, & Baccara, Baccarus, Baccaris Officinarum, atque
etiam Italorum, Hispanorumq; *Baccara*, & Gallorū *Cabaret*, leuiuscula metathesi à

Nomina

Lib. 21. c. 6.

Lib. 1. ca. 2

Fol. 167.

Lib. 1. ca. 9.

Forma.

Cap. 3. hist.

Locus.

Lib. 12. c. 13.

ASARVM, Matthioli.

Lib. 3. c. 43.

Fol. 262.

Temper.
& Vires
Lib. I. ca. 9.

Lib. 21. c. 19.



Lib. 2. c. 22.

Cap. 9. li. I.

Li. 6. simpl.

Lib. 7.

Baccara deductum, & scripturæ dissimilitudine & re differt ab herba, quæ Dioscoridi *Βάκχαρις*, Latinis Baccharis dicitur. Consimilis error est in Calsia, quæ *καλία* est Græcorum cum duplici sigma: cum simplici verò, Casia, herba est coronaria, cuius meminit Vergilius. Hæc autem nominum similitudo diligenter animaduertenda & distinguenda est, ne fraudi sit nostræ cognitioni. Asarum verò Baccaram siue Baccarum fortè vocatum putat Petrus Pe. quod exiguis vaccis aut vacciniis lagenulas similes ferat: illam alteram *Βάκχαριν* siue *βάκχαριν* propter odoris commendationem. Asari vires nunc propiùs inspiciendæ: vis est Asaro calfactoria, auctore Dioscoride, & vrinâ ciens, conueniens hydropicis & coxendicum morbo diuturno: radices cum aqua mulsa potæ pondere drachmarum sex ducunt menses, & veratri albi modo purgant. Asarum, inquit Plinius, iocinorum vitiis salutare esse traditur, vncia sumptum in hemina mulsi misti. Aluû purgat ellebori modo. Hydropicis prodest &

præcordiis, vuluîsq; ac morbo regio. In mustum si addatur, facit vinum vrinis ciendis. Eiusdem inter medicamenta purgantia meminit Mesues his verbis. Asarum calidum est secundo, siccum tertio ordine. Tenuat, resoluit, obstructa aperit hepatis, lienis, & horum duritiem soluit, & affectus alios inde natos, febres putridas, & diuturnas, icterum, hydropem præsertim vino infusum. Purgat vomitu & deiectione & vrinis bilem, sed pituitam manifestiùs, etiam ex ilibus, ischio, & aliis articulis: ob id harum partium dolores mitigat præsertim infusum, vel aliter exhibitum. Oleum Asari cum ladano spinæ illitum sudores mouet, & rigorem febrilem inhibet: vrinâs mouet, semen auget. Valentiùs agit cum sero lactis, spica, & hydromelite. Mustum his radicibus conditum post tertium mensem hydropas & splenem sanat. Mediocriter coqui & teri potest: quò tenuiùs est tritum, eò magis vrinâs mouet, minùs autè, aluû ducit. Datur infuso ab aureis duobus ad drachmas quatuor: puluere autem à drachma vna ad aureos duos. Hæc Mesues. A quo fortasse edocti in Germania rustici, inquit Matthiolus, tertianam febrem & quartanam curant, epoto Asari ex vino decocto, melle, maci, cinnamomo, & id genus aromatis additis. Bibunt enim huius decocti calidi cyathum vnum, alij quotidie, alij alternis diebus, & sic aluum subducunt, quandoque bilem aut pituitam vomitionibus reddunt: accedente autem paroxysmo dorsi spinam, & plantas pedum inungunt oleo calido, in quo Asarum diu fuerit insolutum: deinde in lecto se componunt calido: sic enim horror minuitur, & sudor copiosus funditur. Ab his omnibus dissentit Galenus, scribens Asari radices vtilis esse, facultate similes radicibus acori, intensiore tamen, itaque ex his quæ de illis dicta sunt huius faciendam coniecturam. Eum secutus Paulus, ait Asarum similem acoro vim habere, sed magis intensam. At cum nulla acori radicibus purgandi facultas insit, & Asarum, Dioscoride & Mesue auctoribus, quotidiana etiam experientia suffragante, veratri modo purget, & bilem pituitamq; infernè ac supernè propellat, permirum sanè cur acori facultatibus Asari vires, Galenus & Paulus comparauerint. Asaro congenerem plantam scribit Matthiolus in Bohemiæ montibus nasci, quam ideo Asarinam



Asarinam vocat. Repit humi, folio Asaro rotundiore ac scabriore, leuiter in ambitu ferrato: cauliculis villosis, floribus melinis Anthemidis modo, sed longè minoribus, non inodoris. Radices habet tenues, longas, per summa terræ repentes, acri gustu cum leuiuscula amaritudine: id quod calidum siccumq; earum temperamentum esse indicat. Vim habet abstergēdi modicā, sed attenuādi incidēdi aperienti maiorē. Pota drachmæ pondere ex mulso vel oxymelite aluū exoluit, ducitq; crassam pituitam & atros humores. Datur vtiliter hydropicis & regio morbo laborantibus. Sunt qui comitialibus & resolutis propinent, aut herbam per se aut eius decoctum. Cit vrinam & menses: vermes intestinorum necat. Legitur autumno, & siccat in vmbra cum radicibus. Aliam Asarinam sterilis Seuena Narbonensis agri ostendit Lobellius, cuius folia & flores dilutè purpurascens hederæ terrestri conueniunt, sed maiores & longiores. Rupibus & cautibus Venganio conterminis Seuena oritur. Cit vrinam.

BACCHARIS.

CAP. XVIII.

B X T A T apud Dioscoridem, Paulum, Oribasium ab asaro seorsum tradita Baccharis, aut *πάγχαις*, sic dicta, vt libenter credit Pena, propter eximiam fragrantia gratiam in radice cinnamomum redolente ex qua cum multa alia, tum vnguentum conficiebant, etiam Baccharis apud Comicos nominatum, auctore Athenæo. Galenus quidem in simplicibus Baccharim præterit, sed in Glossis Hippocraticis *βάκχαριν λυδίον τι μύρον* exponit. Vsurpat id Hippocrates, *καὶ παρθέσθω βάκχαριν, ἢ ἔλαιον λυδίον*. Baccharis autem, vt describit Dioscorides, plāta est odorata, coronaria, cuius folia aspera sunt, magnitudine inter violam & verbascum media: caulis angulosus, cubitalis, subasper, adnatas propagines habens: flores purpurei, albicantes, odorati, radices veratro nigro similes, odore cinnamomo proximo. Asperum squallidumq; solum amat. Oribasius iisdem planè verbis descripsit. Eandem herbam Baccharim etiam Vergilius, ex qua ferta & coronæ texebantur tanquam ἀπὸ τρόπιον fascini ex nimia

Nomina

Lib. 15.

Lib. de nat. mulieb.

Lib. 3. c. 44.

Forma.

Locus.

Lib. 11.

laude. Sic enim canit.

*At si ultra placitum laudarit, Bacchare frontem
Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.*

Quare vehemēter errant qui Dioscoridis caput de Bacchare spurium, atque ideo expungendum censent, frustra; probare nituntur Baccharem & asarum eādem esse plantam, quia quæ de Bacchare diximus ex capite de asaro exscripta sint, ut vtriusque descriptio paucis quæ irrepsere demptis, eadem sit. Huius erroris causam quamvis superiore capite declarauerimus, tamen hinc euidētiore omnibus esse potest, quod asaro folia sint hederæ, multò molliora, calfactoriam vim habentia, urinam cientia, vetusto coxendicum dolori vtilia: Bacchari media inter violā, putā nigram, & verbascum, aspera, adstringentia, inflammationibus & erysipellatis conuenientia, somnifero odore: radices huic veratro nigro similes, cinnamomi odore: illi geniculatæ, gramine proxima, longè tamen graciliores. Adhæc asarum in vmbrosis montibus, Baccharis in aspero squallidoque solo provenit. Non parum etiam discrepant Plinio auctore, Bacchar quoque, inquit, radice tantū odorata est, à quibusdam nardum rusticum appellatum. Unguenta ex ea radice fieri solita apud antiquos, Aristophanes prisce comædiæ Poëta testis est. Vnde quidam errore falso barbaricam eam appellabant. Odor est ei cinnamomo proximus. Gracili solo nec humido provenit. Et mox. Sed eorum quoque error corrigendus est, qui Bacchar, rusticum nardum appellauēre. Est enim alia herba sic cognominata, quā Græci asaron vocant, cuius speciem figuramque diximus in nardi generibus. Quinimo asarum inuenio vocitari, quoniam in coronas non additur. Cum igitur Baccharis peculiaris quædam herba sit ab asaro diuersa, quæ nam ea sit nūc inquirendum. Leonicens & eum secutus Brasauolus Baccharin esse putant plantam illam quam herbarij Sclaream siue Scarleam vocant, alij Matrisaluiam. Hos reprehendit Matthiolus, eorūque Bacchari aliam substituit in Romanis agris nascentem ab Andrea Lacu. missam, quam pro vera & genuina ab eo pictam hinc exhibemus. Sed ne hanc quidem pro legitima habent Pena & Lobellius: quinimo

BACCHARIS, Matthioli.



hanc verbascum odoratum esse cēsent, cui interdum flores lutei, interdū purpurei ut blattariæ. Romæque cum valde is cupidus & fretus fide Matthioli complures sciscitaretur rei herbariæ peritos, nihil aliud esse quā verbascum respondisse affirmat. Quare aliam is adfert, eamque omnium maximè descriptioni Dioscoridis conuenientem, quam olim Barbarorū doctissimi genuinam putabant: multò enim propius quā illam Matthioli speciem verbasci odorati, ad Baccharem accedere certum esse. Etenim fruticosa est, appendicibus multis, foliis asperis, nigricantibus, primulæ veris, vel saluæ latifoliæ magnitudine, caule bicubitali, floribus purpura obsoleta glomeratis, in pappos abeuntibus cardui modo. Radix summo cespite spargitur, diffusis fibris, caryophyllatæ modo, cuius odorem præsentissimū habet, vel cinnamomi, cui contulerunt antiqui Baccharis radicem, qui caryophylla non nossent. Planta valde frequens, valdeque isto nomine nota circum Monspelium, & alibi non paucis locis.

BACCHARIS *Monspeliensis*, *Conyza Maior*,
Matthioli.



locis. Hanc Matthiolus Conyzam maiorem fecit, non sine errore: ut iam monuimus in palustribus. Eius enim radix odorem spirat non tetrum, sed aromaticum qualis caryophyllorū, folia sunt primule veris aut verbasci, non oleæ, glutinis nihil penitus habentia: flores purpurascunt. At Conyzæ maiori Dioscoridis, ut & cæteris conyzæ generibus flos luteus, odor gravis, folia pingua. Quamobrem illa nihil penitus conyzæ simile habet, omnia verò Bacchari valde similia, cuius vires nunc sunt exponendæ. Radix in aqua cocta ut tradit Dioscorides, auxiliatur conuulsis, ruptis, ex alto delapsis, spirandi difficultati, tussi veteri, urinæ difficili. Menses pellit, & contra serpētium morsus vtiliter datur in vino. Vna ex teneris radicibus apposita foetus extrahit. Puerperis eius decoctum in defensionibus prodest. In diapsmata vtiliter inferitur, quia multam odoris gratiam habet. At folia adstringendi vi prædita, imposita capitis doloribus profunt, oculorū inflammationibus, ægilopiis incipientibus, mammis à partu inflāmatis, & erysipelatibus. Odor somnum inducit. De eadem re hæc Plinius. Bac-

Ca. 19. li. 3.

Lib. 3. c. 109.

Lib. 3. c. 44.

Vires &

Temper.

Li. 21. ca. 19.

char & in medicinæ usu est. Aliqui ex nostris Perpensam vocant. Auxiliatur contra serpentes, capitis dolores feruorēque: item epiphoras. Imponitur mammis tumētibus à partu, & ægilopiis incipientibus, & ignibus sacris. Odor somnum gignit. Radicem decoctam bibere spasticis, euersis, conuulsis, suspensiosis salutare est. In tussi vetere radices eius tres quatuorue decoquuntur ad tertias partes. Hæc portio mulieres ex abortu purgat. Laterum punctiones tollit, & vesicæ calculos. Conditur cum diapsmate (deprauatē: est enim ex veteri codice recta lectio, Tunditur in diapsmata. Sunt autem *διαπασματα*, quæ in puluillum deturuntur, ut commodè inspergi possint:) vestibus odoris gratia inferitur.

STOECHAS.

CAP. XIX.

ΣΤΙΧΑΣ Græcè & *στίχας*, Latinè Stœchas & Stichas, Arabicè *Asthochados*, Germanicè *Sticaskraut*, Italicè *Stechade*, Gallis *Stichedes*. Arabicæ factionis auctores pat. iam Stœchada reliquis omnibus prætulērunt. Hinc sequaces illo um atque Officinæ gentili cognomento Arabicam cognominarūt. Stœchas nomen accipit, Dioscoride auctore, à Stœchadibus insulis Galliæ è regione Mafsiliæ sitis, in quibus nascitur. Idem tradit Plinius. Stœchas in insulis tantū eiusdem nominis gignitur. Quæ verò sint insulæ Stœchades, declarat his verbis. Tres Stœchades à vicinis Mafsiliensibus dictæ propter ordinē: quas item nominant singulis vocabulis, Proten & Mefen, quæ & Pomponiana vocatur, tertia Hypæa. Verior tamen lectio sic habet. Stœchades à vicinis Mifsiliensibus dictæ propter ordinem quo sitæ sunt. Nomina singulis Prote, Mese, &c. Galenus contra Stœchada multam vbique terrarum nasci dicit, sed plurimam in Creta, & insulis Stœchadibus in Iberico mari sitis, à quibus etiam nomen habet. Est autē plenior, inquit, & melior quæ in insulis prouenit, quā Cretica. Stœchades verò insulæ non è regione Mafsiliæ, ut perperam scripsit Dioscorides (bidui enim itinere & litore

Nomina

Lib. 3. c. 27.

Li. 27. c. 10.

Lib. 3. ca. 5.

Pena in Aduers.

STOECHAS, Matthioli.

Lib. 3. c. 27.
Forma.

Li. 27. c. 12.

Fol. 84.




STOECHAS Capitulis foliatis.

Viresc.
Temper.
Lib. 3. c. 27.

Li. 27. c. 12.

Li. 8. simpl.

Li. 2. med.
pur. cap. 13.

gniores vires eidē assignat. Tenuat, inquit, terget, purgat, resoluit, aperit hepatis & lienis, & aliorum viscerum obstructa, putredinē prohibet, omnes internas partiū intemperies, præsertim cum materia, corrigit: cerebrū, nervos, cor, & alia viscera, partēsq; omnes internas vi parum adstringēte roborat. Purgat autē bilem atram, & pituitam etiam ex cerebro, nervis, & sensuum instrumētis, easq; partes roborat: omnibus frigidis affectibus est salubris, fotu, balneo, potu. Oleū quoq; Stœchadis cerebrum

inde absunt) sed è regione Olbiæ sitæ sunt, vulgò Hyeres, oppidulo olim tam lauto quàm nobili, à quo etiam hodie insulæ Stœchades nomen retinent. Stœchadem breuiter perstrinxit Dioscorides. Herba est, inquit, tenuibus furculis similem thymo comam habens, sed longiore folio, gustu acris, & quodāmodo subamara. Breuius sic Plinius. Stœchas est odorata herba, coma hyssopi, amara gustu. Eam sic fusiùs & clarius delineauit Pena. Ex radice lignosiore cauliculos emittit cubitales, & sesquicubitales, lignosos, in quibus foliola oblonga, satureiæ hortēsis, lōgiora, albicantia, incana, angustiora & minora quàm lauandulæ, aut rosmarini coronarij: capitula spicata in summis virgis, thymi Cretensis, sed maiora, è quibus flores purpurei aut è cæruleo purpurei exeunt, summis capitulis eminent foliola, siue quædam veluti membranæ ligulæ cæruleæ aut purpureæ, interdum admodum longæ, sapissimè breuiores, præsertim in Hispania. Et summi cauliculi interdum foliis stipantur in Gallia Narbonensi, interdum nudi cōspiciuntur. Semen subfuscū, vrticæ, aut lauādulæ. Non solū Stœchades insulæ, sed etiam colles Narbonæ, asperiq; tractus Galloprovinciæ tātō prouētū Stœchade simul & spica lauandula, thymo, & satureia duriore scatent, vt etiam clibanis calfaciendis satis suppetant. Stœchadis decoctum auctore Dioscoride, hyssopi modo ad pectoris vitia efficax est. Antidotis commodè miscetur. Liberat ab obstructione, attenuat, extergit, & corroborat viscera omnia, & totum animantis habitū. Menses ciet potu, inquit Plinius, pectoris dolores leuat. Antidotis quoq; miscetur. Qua de re distinctiùs hæc Galenus. Stœchadis gustu quidē qualitas amara est, & mediocriter subadstringens. Cæterum temperies cōposita, nempe ex terrena essentia frigida, exigua, vnde sanè adstringit, & extenuata altera terrena copiosiore, à qua amara est: ob vtrorumq; verò conuenientiam & coitum, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; tū viscera omnia, tum totum corpus ea potest. Mesues plures & insi-

cerebrū & nervos calfaciēdo, ceu vitā illis restituit. Sumpta stœchas cum scilla, vel aceto scillite, epilepsiā & vertiginē iuuat. Cum lapide cyaneo aut sale indo, aut aliis valentibus, cōfert melācholicis affectibus, quibus timor & mœror comes adest. Cū succo buglosi aut pomorū dulciū, affectus cordis melācholicos iuuat: dolorē nervorū, articularū, muscilorū sedat quouis modo adhibita: suffitu nariū obstructionē expedit. Syrupō vel alia forma stœchas sumpta, quartanis & reliquis diuturnis febribus pręsertim pituitosis succurrit. Calidis, siccis, biliosis, pręsertim quibus multa bilis flaua in vētriculo redūdat est noxia, quia turbat vētriculū, & sitim, vomitū, ardorēq; molestū excitat: ac quoniā imbecilliū purgat, ipsi additur pars sexta salis cōmunis & salis gemmę: additur & myrobalanus nigra, aut capula, vt valētior fiat eius vacuatio itē scilla, pręcipuē in capitis affectibus. Eadē sero lactis macerata, vel incocta fit potētior: cum vino autē, passis purgatis, succo pomarū dulciū cocta innocētior. Oleum vetus stœchade & pauca spica imbutum est magnarum virium. Pars stœchadis potior flos, paucam decoctionem sustinet, longiorem verò eius folia floribus ignobiliora. Potatur stœchadis decoctum ab vnciis quinque ad vncias septem: puluis autem à drachmis tribus ad drachmas quinque.

LAVANDULA.

CAP. XX.



DORATA & coronaria stirps quę Officinis & vulgò herbariorum Lauandula siue Lauendula, politioribus *Λευάνδαρος* Gręcē, & Pseudonardus Latine dicitur, quòd non sit vera nardus, cuius Dioscorides, & alij veteres meminerunt, Italis *Lauanda*, Gallis *Lauande*, Germanis, *Lauander*. Lauandula autem nominata est, quod balneis & hominum laua-

Nomina

LAVANDULA, Fœmina.



cris expetatur, elotāque omnia, si permisceatur, odoris suauitate commendet. Hanc duplicem statuunt pseudonardum siue lauandulam: marem, quę & spica à spicatis floribus, & Nardus Italica nuncupatur, Italis *Spigo*, Gallis *Aspic*. Pseudonardum fœminam quę lauandula vulgaris est, Gallis *Lauande femelle*. Hęc ramulos siue virgas profert tenues, quadrangulares, geniculatas, cubitales aut longiores, folia circa singula genicula bina, oblonga, carnosā, vtraque parte albicantia, rosmarini coronarij foliis multò longiora, latiorāque, & in summo spicas oblongas, tenues, floribus refertas purpureis, aut cæruleis, interdum albis, benè odoratis, & odore caput replentibus: radices lignosas, in fibras diuisas. Huic simillima pseudonardus mas, siue spica à superiore differt, quod foliis sit maioribus, crassioribus, longioribus, & latioribus, stœchadis, fragrantia maiori, & grauiori, illa magis aromatico, & gratiore. Vtraque in Gallia Narbonensi & Hispania plerique montes & campi deserti referti sunt, in reliqua Gallia, Ger-

Genera.

Forma.

Locus.

mania, & alibi in hortis seritur. Iunio & Iulio flores exeunt. Existimatur à quibusdam esse Cneorum album Theophrasti, & Higini Casia herba, odorata, cuius aliquoties meminit Verg. vt in Bucol. Tum casia atque alijs intexens suauibus herbis.

Tempus.

Mollia luteola pingit vaccinia caltha.

Præter Lauandulas vulgares Clusius inuenit aliud genus rarum admodum & planè nouum. Cubitali interdum assurgit altitudine, ramulis quadrangulis & hirsu-



tis, quos multifolia tenuiterque incisa ambiunt folia, lanuginosa, cinereique coloris, gustu acri & odore iucundo: flores in summis virgulis quadrangulis, nudis & lanuginosis, spicatum ut in Lauandula congesti, colore cæruleo, odorati: spica autem aliquantulum contorta est, & in quatuor veluti versus aut ordines digesta, alia interdum ex alia nascens: radix dura, lignosa, multifida. Primum eam nascentem inuenit in colle quodam Malacæ vicino, Februario mense florentem: deinde circa Murciam Martio, nec alibi præterea. Odor multò mitior, neque ita caput ferit, uti Lauandulæ præsertim Spicæ. Quare credibile est eam non esse tanto calore præditam. Vtraque calida siccaque est ordine secundo absoluto, vel incipiente tertio, tenuium item partium, & ex multis aëreis spirituosissq; partibus constat. Quare frigidis capitis morbis quouis modo adhibita cōfert, iis præsertim qui non ex copioso humore, se ex sola potissimum qualitate originem ducunt. Proinde & stillicitius eius liquor odoratus, & temporibus & frōti illitus, catalepsi, leuiori hemiplexia, comitiali morbo, & syncope laborantes reficit. Sed ubi humorum copia adest, præsertim sanguini permistorum, non satis tutus huius vsus est. Lauandula in vino cocta potaque vrinam & menses ciet, secundas & fœtum expellit. Datur decoctum ex folis floribus, aut cum cinnamomo, nuce moschata, & catiophyllis incoctis, vtiliter potandum cordis tremore, & morbo regio affectis. Lauandulæ fœminæ semen & folia affectibus matricis magis commendantur tum fotu infusione, tum pulueribus dilutis, intrò sumptis, ad suffocationem, ex ascensu putridi vaporis natam, & ad partus accelerandos.

NARDVS,

CAP. XXI.

Nomina



ΑΡΔΟΣ & νάρδος ἄχυν Græcis, Nardum siue Nardus Latinis & Nardispica, Auicennæ & Arabibus *Cembul*, id est, spica, & *Cembul Indi*, id est, *Spica Indica*. Quod corruptè Matthæus Siluaticus *Simibel* & *Sumbel* profert, Italis *Spigonardo*, Hispanis *Azumbar*, *Espigasil*, Gallis *Aspic d'outre mer*. Dioscorides duo nardi genera esse tradit. Vnam Indicam, alteram Syriacam, & Indicæ aliam esse speciẽ quæ Gangitis nominatur à fluuio Gange apud quem nascitur montem, præterfluente. Est etiam quædam Sampharitica à loco sic dicta.

Lib. I. c. 8.

Genera

dicta. Syriaca nardus appellata est, non quòd in Syria inueniatur, sed quòd montis in quo nascitur altera pars ad Syriam conuersa est, altera ad Indos. Hæc nardus Syriaca melior, quæ recens & leuis est, multas gerens comas flauæ coloris, valde odorata, cyperum redolens, paruam habens spicam, saporis amari, & linguam resiccantis, quæ satis diu in sua odoris gratia permaneat. Indica gangitis viribus imbecillior, quòd in aquosis locis proueniat, procerior est plurisque spicas habet, ab vna radice comas, & circumplicatas, ac grauiter olentes. Indica verò montana odoratiores, spicis mutila, odore cyperi cæteris Syriacæ dotibus. Sampharitica valde mutila ac brevis, magnas spicas habet, & caulem medium aliquando candidiorem, hircinum virus supra modum redolentem, quam improbare oportet. De nardo aliter scripsit Plinius his verbis. De folio nardi plura dici par est, vt principali in vnguentis. Frutex est graui & crassa radice, sed breui ac nigra, fragilique, quamuis pingui, situm redolente, vt cyperi, aspero sapore, folio paruo densoque, cacumina in aristas se spargunt: ideo gemina dote spicas ac folia celebrant. Alterum eius genus apud Gangem nascens, damnatur in totum ozænitidis nomine, virus redolens. Et mox In nostro orbe proximè laudatur Syriacum, mox Gallicum, tertio loco Creticum, quod aliqui agrium vocant. Dioscorides radicis tantum Syriacæ & Indicæ nardi faciem & naturam exposuit, Sampharitici verò fruticis & caulis formam. Plinius fruticis radicem, folia, cacuminum aristas depinxit. Idem, & Syriacam nardum in Syria nasci putauit, non vt Dioscorides ait, in montis Indiae parte quæ ad Syriam flectitur: hoc enim absurdum videtur. Nam cum India à Syria longissimè distet, multaque inter has interiectæ sint regiones, deserta Arabia, Persis, Carmania, Gedrosia, Darangia, aliæque nonnullæ, qui fieri potest, vt mons ille ad Gangem situs, altera parte Syriam tam facile respiciat, vt nardus in ea proueniens, Syriaca dici possit? Hanc ob causam Matthiolus eam potius à Syraestene regione quæ ad Indum fluuium est dictam suspicatur, quàm à Syria. Nam, si Ptolemæo credimus, mons est in India, qui à Gange fluuio ad Syraestem extenditur. Galenus non solum Syriacæ nardi, sed etiam Creticæ meminit. Pena asserit legitimam è plerisque locis Aegypti & Syriæ in Europam afferri, non modò radicem qualem Galenus vult, sed etiam alias distinctas partes, nimirum radicem, spicas comasve, festucas & folia ipsa. Ima radix Nardi, exili & arido stamine à radícula siue

Forma.

Lib. & c. 12.

In cap. 6. lib. 1.

Lib. 8. sim. Lib. 9. c. 4. me. loc. In Aduers.

SPICA NARDI,
Indica.




torulo exit, cui innituntur spicatae comæ confertique glomi quasi per cirros, torulos, nucleosve distincti, & conflati capillamentis vt in Meo, è quorū spatiis mediis emergunt nonnulla iuncea folia, marinae algæ modo, tametsi minora multò. Hæc siccas inter ingentes fasciculorum strues se vidisse refert Venetiis in ædibus periti Pharmacopœi Alberti Martinelli ad Angeli symbolum idè Pena, & his similes à nonnullis aliis studiosis Lugduni fuisse animaduersas. Huic veræ nardo aliam, simillimam, tamen spuriam, Narbonensem subiungit, quæ Gangitis meritò cognominanda est. In Gallia Narbonensi, inquit, à Gange oppidulo septem plus minùs miliaria disitus est mons perquàm amœnus & celsus, her-

fol. 43.

barum præstantiorum feracissimus, cui idcirco vulgò nomen, Dei Paradisus, inditum. In eius cliuo quæ ad meridiem maris mediterraneum vergit, hæc vberi prouentu erumpit, muscosis & vdis tractibus, infima radix pusilla, exilibus fibris, duris & raris, quæ subsunt spicatis comosisque torulis, minimum digitum crassis, colore pallefcientibus ex fusco, ferè palmum altis, non valde mucronatis, sed quadantenus

NARDVS SPVRIA

Narbonensis, Pena.



Cap. 33.

tenus per extrema recisis: folio est viridi, rigido, iunceo, vix pedem alto, numerofo, quod ab ima radice ortum trans spiccam comam innum caulem ambientem sese exerit: multæq; plætæ quasi vno cespitis ambitu implexæ, vnius effigiæ præferunt. Tota inodora est præter capillamenta spicea, multò crassiora quàm Indicæ, odore musci querni, vel terrestris. Garcias, in Aromatum Indicorum historia, refert nardum Indis vocari *Cahzaçara*, nasci; in Mandon & Chitor prouinciis, Regnis Delli, Bengala, & Decan vicinis, iuxta fluuium Gangem, quem incolæ Ganga appellant. Præterea non esse diuersa nardi genera, sed vnicum duntaxat sibi notū esse nardi genus, id scilicet quod ex memoratis locis adfertur. Prouenire quidem in monte quodā qui altera parte Orientem spectat, altera Occidentem, ad quē scilicet Occidentem sita est Syria, multis regionibus ab India discreta. Sed tamē multis aliis regionis locis satum prouenire, nec facillè sponte nasci, neque vnam præstantiorem esse altera, spicamve habere aliā altera multò longiorem. Radix, inquit, spargit supra solum breuem virgulā,

siue caulem, circiter tres palmos longum, cum longissimis, atque alias insuper virgulas multò breuiiores: in summa radice spicæ producuntur, item aliæ per virgulas. Tali enim modo venditur in Cambaiete, Asurate, & Gogua, aliisq; portubus marinis, vnde mercatores Arabes & Persæ petunt, potissimā tamen partem ad indigenis absumi ferunt. Inuenitur interdum sordida & puluerulenta, villis ipsius plætæ in pollinem redactis. Emitur tamen ab iisdem mercatoribus. Eo puluere manus ablui Garcias intellexit. Hac vnica nardo, inquit ille, quæ iuxta Gangem nascitur, quamq; in Occidentem exportant, vtuntur medici tum Indici, tum Turci, Persæ, & Arabes. Nam quod ex ingenti pretio, quo antiquitus, teste Plinio, emebatur, colligere quidam volunt nostram nardum non esse legitimam, hîc Garcias respondet, Indias nunc magis apertas esse, regionēsq; aromata gignētes, longè cultiores quàm veterum tēpore fuerint, ideò multò plura aromata, maioriq; copia, & multò minùs adulterata ad nos adferri, viliusq; emi quàm antiquitus: in quorum numero nardum reponit, quæ legitima & sine mangonio ad nos importatur, licet interdū aut maris humore sibi ascito situm contrahat, aut senio suaueolentiam illam amittat, qua initio prædita fuit. Cæterum fabulosum esse omnino indicat, quod Andreas Lacu. suis in Dioscoridem commentariis scribit nardi vsum apud Indos esse periculosum, quoniam ex ea fiat veneni quoddam genus mortiferum, quod non modò haustum, sed etiam cuti in sudoribus inspersum, hominem statim necat, idque toxicum Pison vocari. Nam cum multis in India annis medicinam exercuerit, & non modò versatus sit cum omnis generis medicis Asiaticis, sed etiam Regibus & Principibus familiaris fuerit, nunquam tamen hoc Pison vidit, aut eius nomen audiit. Id genus quod *Sepulueda Satiach* aut *Satiach* appellat, id esse putat, quod ex Satigua adfertur, celeberrimo regni Bengala portu, & emporio ad fluuij Gangis ostia. Hæc Garcias de nardo literis prodidit. Ex quibus & aliis suprā memoratis intelligere licet nardum cuius vsum est in medicina, radicem tantum & non aliam plantæ partem, eiusque radicis partes spicas appellari, quas hîc Dioscorides *ῥάχυν* vocat

Lib. & ca.
12.

Lib. 2. c. 146

vocat, in alij radicibus ex multis particulis coagmentatis ῥᾶγας, & ἄγλιθας, Theophrastus γέλις, Plinius nucleos, Columella spicas, Græci item ὄνυχας, & σκελλίδας vocant. Id confirmat Galenus sic scribens. Iubet Andromachus adiciere nardum Indicam, ea verò est quam spicam vocant, non quòd spica sit, radix etenim est, sed quòd spicæ formam referat. Præterea hos de Philonio antidoto veris

Lib. I. Ant.

Et drachmam dicta falsò radicis, ab ipsa

Terra, pissæo qua Ioue clara manet,

sic declarat. Quin & nardi drachmam coniiciendam iubet, quam radicem falsi nominis appellat, quoniam spica nardi nominatur. Vult autem eam Creticam esse, quum ait *ab ipsa Terra, pissæo qua Ioue clara manet*, quandoquidem fabularum scriptores Iouem in Dictæo Cretæ monte educatum aiunt, occultatum ibidem à matre Rhea, ne & ipse à patre Saturno deuoraretur. Apposuit autem Ioui epithetum Pissæi, quemadmodum multi extra poëticā vulgò dicere solent, per Aesculapium pergamenum, per Dianam Ephæsiā, per Delphicum Apollinem. Quidam verò non Creticam terram, sed Indicam indicatam fuisse aiunt, ex qua ebur adfertur: ex hoc enim statuam Iouis in Pissa factam fuisse. Iam verò de eiusdem temperamento & facultatibus scribens perspicuè radicem nuncupat. Nardi spica, inquit, excalfacit ordine primo, desiccatur secundo iam completo. Composita est ex adstringente mediocriter substantia, & acri calida non multa, & quadam leuiter amara. Ex his constat facultatibus radix, & ad iecur & ad stomachum non sine ratione conuenit tum pota, tum extrinsecus imposita. Vrinam ciēt, morsus stomachi sanat. Ventre ac intestinis consistentes fluxiones desiccatur. Ad hæc & eas quæ in capite & thorace. Valentior est Indica, quæ nigrior est, quàm Syriaca. Nardus, auctore etiā Dioscoride, vim habet calfaciendi, siccandi, urinam ciendi. Quare pota aluum sistit, & fluxiones ex vtero, ac serofos humores apposita cohibet. Auxiliatur etiam nauseis cum frigida aqua pota, & stomachi moribus, & inflationibus, item hepaticis, ictericis, & nephriticis. Aquæ verò incocta, & pro fotu ad infessum adhibita vteri inflammationibus medetur. Valet etiam ad oculorum palpebras largo humore manātes, cilia adstringens, & densiora reddens. Humidis corporibus inspergitur. Miscetur & in antidota. Reponitur ad ocularia medicamenta in vase nouo non picato, in puluillum detrita, ac cum vino in pastillos coacta.

Lib. 8. sim.
Temper.
& Vires.

NARDVS CELTICA. CAP. XXII.



ΑΡΔΟΣ κελτική Græcè, Latine Nardus Celtica, & Nardus Gallica, aut potius hodie nuncupanda Ligustica, quòd, vt olim Dioscoridis tempore, ita nunc quoque in Liguria Alpibus nascatur, eodem teste patrio nomine Saliunca dicta: perperam enim in excusis codicibus ἀλίγγα pro σαλίγγα legitur, atque eo corruptius vbi scribit, ἢ νάρδι κελτικῇ ἢ ἐνίοις σερίνην ἐκάλεισαν. Id est, aut nardo Celtica, quam serinen aliqui vocauerunt. Dubium enim nō est, quin σαλίγγαν pro σερίνην scripserit Dioscorides. Nam Scribonius de eiusdem veneni remediis scribens, saliuncam habet. Adiuuantur, inquit, iam læsi ab eo saliunca, id est, nardo siluestri quamplurima ex vino sæpius data. Arabes *Cembul Rumim* vocant. Nardus hæc, vt describit Dioscorides, frutex est exiguus, qui vnà cum radicibus in fasciculos manuales colligitur. Folia habet oblōga, subflaua, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat vsus est, & odoris suauitas: ideo pridie aqua respersis fasciculis, & terra separata, in pauimēto humecto charta subiecta ipsos reponere oportet, postridie verò purgare: sic enim quòd vtile est cum aceroso & alieno non excutitur, quia propter humorem firmum est. Secretos igitur caules ac radices, foliis abiectis, si reponere voles, tere, vino excipe, & digere in pastillos,

Nomina

Lib. I. c. 7.

Lib. 2. me.
leta. ca. de
pharico.

Cap. 195.

Lib. I. c. 7.

Forma.

NARDVS CELTICA,

Matthioli.

Lib. & c. 12.

Locus.

In c. 7. lib. 1.

fol. 132.



NARDVS CELTICA,

Altera Pena.

fol. 132.



pastillos, quos nouo testaceo vase diligenter operto serua. Optima est recens & odorata, multarum radicum, non facile fragilis, plena. Quadam horum Plinius habet. Ex iis Gallicū (suba. nardum) cum radice vellitur, abluiturq; vino. Siccatur in vmbra, alligatur fasciculis in charta, non multum ab Indico differens, Syriaco tantum leuius. Pretium xiiij. In his probatio vna, ne sint fragilia & arida potius, quam sicca, folia. Prouenit, vt ex Dioscoride diximus, in Liguria Alpibus, atque etiam in Istria. Hodie quoque in Genuensibus Liguriæq; alpinis non procul Sauona vrbe. Eiusdem magnus habetur proventus, auctore Matthiolo, in Stiria, Austria, Carinthia, vbi Indemburgenses rustici è suis montibus quotannis innumeros comportant faggos fasciculis plenos, quos mercatoribus vendunt, qui in Syriam & Aegyptum merces conuehūt, quod Siriis & Aegyptiis nardus hæc maxime expetatur ad balnea quibus frequenter vtuntur. Vera Celtica nardus ex Matthiolo hinc depicta est, cui similem depinxit & descripsit Pena his verbis. Pusilla herbula est, aliquantum proserpens, deinde se surrigens, cauliculo palmum & sesquipalmum alto, ad quem imum folia cespites summos conflant, exigua, tenuia, gnaphalij montani, aut gentianellæ minimæ, pallida & sublutea, infernè angusta, qua radice ceruici squarosæ, aut squamulis tuniceis obsitæ, spicatum digestæ innituntur, subter quæ multæ fibræ fuscae villosæq; propagines, asari odore, & modo, in terram sparguntur, gustu acri, subamaro aromatico, spicam nardi spirante. Aliam multò elegantiolem, & multò similiorem gentianæ cruciatæ foliis, à se repertam scribit Pena prope cœnobium quoddam inter Dei viridarium, & calcaris montes, in agro Narbonensi magni & vulgati nominis. Radice est valerianæ maioris, paulò minore, geniculis doronici modo distincta, humistrata, acri sapore, erodente, aromatico & amaro, nardi æmulo, foliis saponariæ vulgaris, flaccidis ex flauo pallescentibus, senis, septenisve, gentianellæ adeò cognatis, vt primo intuitu eandem putes. Caulis cum maximus, cubitum altus, mediocris sesquipalmum: flore radiato, aureo, bupthalmi æmulo. Hanc

Rondeletius nardi Gallicæ speciem esse coniiciebat, ex cuius Mei; radicem decocto paratam potiunculam cuidam ex illo cœnobio dysuria laboranti cum dedisset, Vires & vrinæ copiam elicuit. Nardus celtica, vt tradit Dioscorides, eadem potest quæ Syriaca, magis tamen vrinam mouet, & stomacho utilior est. Prodest etiam inflammationibus

Lib. 1. c. 7.
Vires &
Temper.

mationibus hepatis, & ictericis, & stomachi inflationibus cum absinthij decocto. pota, item aduersum lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus ex vino. Miscetur etiam in malagmata, & poriones ac vnguēta calfacientia. De eiusdem viribus eadem ferè Plinius tradit. Cōtexemus & Gallici nardi remedia in hūc locum dilata in peregrinis arboribus. Ergo aduersus serpentes duabus drachmis in vino succurrit. Inflammationibus coli vel ex aqua, vel ex vino. Item iocinoris & renum, suffusisq; felle, & hydropicis per se & cum absinthio. Sistit purgationū muliebrium impetus. Nardus Gallica, inquit Galenus, Indicæ facultatibus quadantenus similis est, sed ad omnia imbecillior, præterquam ad prouocandā vrinam: siquidem calidior illis est, sed minùs adstringit. Haud dubium est quin hæc in Liguriæ alpibus vernacula voce saliunca dicta, sit illa quam hi Maronis versus innuunt,

Puniceis humilis quantum saliunca rosetis,

Iudicio nostrò tantum tibi cedit Amyntas.

Quam etiam hodie Valesij *Selliga* vernaculè quasi saliuncam vocant. Quibus aduersari videtur Plinius, qui cū de nardi gallici virib⁹, quæ suprà citauimus, dixisset, aliquantò pōst, eodem tamen capite, Saliunca radix, inquit, in vino decocta sistit vomitiones, corroborat stomachum, tanquam saliunca sit à celtica nardo diuersa, quam etiā seorsum à nardo gallica depinxit his verbis. Saliunca foliosa quidem est, sed breuis, & quæ necti non possit, radici numerosæ cohæret, herba veriùs quàm flos, densa veluti manu pressa, breuiterq; cespes sui generis. Pannonia hanc gignit, & Norici, Alpiumq; aprica: vrbiū Eporrhedia, tantæ suauitatis, vt metallū esse cœperit. Vestibus interponi eam gratissimum. At Plinius diuersas apud diuersos auctores nomenclaturas secutus, de nardo celtica & saliunca diuersis locis tractauit, tamen omnia de vna & eadem nardo celtica intelligi debent, quæ etiam saliunca nominatur, cuius Pliniana delineatio nardo celticæ bellè quadrat. Quod verò dixit, tantæ suauitatis vt metallum esse cœperit, vix dicas quomodo accipendum sit, & quomodo metallum esse cœperit, quidā tamen exponunt, propter odoris suauitatem metalli loco expeti, vel vt metallum conquiri, quasi non sit minoris indicaturæ & pretij. Vetus Cornarij Plinianus codex habet, vt melatum esse

Lib. 21. c. 20

Lib. 8. sim.

Eclo. 5.

Petrus Pe. fol. 132.

Lib. 20. c. 7.

Embl. 7. lib. 1.

Lib. 21. c. 10

HIRCVLVUS, Veterum.



cœperit, quæ lectio etiam si nihil nobis significet, corruptum tamen locum esse indicat, vt mel atticum esse cœperit legēdum esse Cornarius suspicetur. Mellis enim attrici, inquit idem Plinius, in toto orbe summa laus existimatur. Quidam exponunt in vectigali & reditu publico censeri, non aliter quàm metalli fodina.

HIRCVLVUS CAP. XXIII.



IOSCORIDES refert nardū celticam adulterari herba simili, quæ vnà cum ipsa euellitur, quā ob odoris grauitatē τράγον appellat, id est, hircum, sed facilis est dignotio. Est enim herba sine caule & candidior, & minùs oblonga folia habet, neq; radicem amaram, neq; aroma redolētem, quemadmodum vera nardus celtica habet. Idem prorsus Plinius tradidit. Cum Gallico nardo semper nascitur herba quæ Hirculus vocatur à grauitate odoris & similitudine, qua maximè

Nomina
Forma.

Lib. & ca. 12.

adulteratur. Distat quòd sine cauliculo est, & quòd minoribus foliis, quòdque radicis neque amaræ, neque odoratæ. Hactenus Plinius. Huius rarissimæ plantæ, & vix dum vlli visæ cognitionem Carolo Clusio cognitionem acceptam referre oportet, qui in suis Aromatum Indicorum historiæ à Garcia medico descriptæ versionibus eam depinxit, & descripsit his verbis. Antuerpiæ inter aliquot nardi celticæ fasciculos plantulas quasdam inueni, quæ adamussim quadrabant cum Dioscoridis Hirculo, quem describit, eoque nardum celticam adulterari refert. Nam plátula est nardo celticæ similis, candidior tamen, & veluti ex viridi cinerea, sine cauliculo, minoribus breuioribusque foliis, villosa admodum secundum radicem & nigricans, nulla odoris iucunditate. Folia præmāsa nullum aromaticum saporem reddunt, sed lenta & viscida sunt. Nardi verò celticæ folia calida sunt, cum aliqua tamen adstrictione, & odore saporéque iucundo. Hæc ille, qui hirculi iconem hanc exhibuit.

NARDVS MONTANA.

CAP. XXIIII.

Nomina

Lib. I. c. 8.

Forma.

NΑΡΔΟΣ ὀρεῖνῃ Græcis, ab aliquibus ὄρεῖνῃς, & ὄρεῖνῃς dicta, Galeno πνεῖς, Latinis Nardus montana. Nascitur, inquit Dioscorides, in Cilicia & Syria, ramulos & folia eryngio similia habens, minora tamē, non aspera, neque spinosa: radices subsunt nigrae, odoratæ, duæ aut plures ceu asphodeli, sed graciliores & longè minores. Neque caulem, neque fructum, neque flores fert. In qua historia sibi ipse repugnat Dioscorides, initio scribens nardum hanc caule & foliis eryngio similem esse, in fine capituli neque caulem, ne-

NARDVS Montana,
Matthioli.


In cap. 8.
lib. I.

In Aduer.

que fructum, neque florem ferre. Quem errorem Marcellus scriptorum incuriæ adscribit, qui vocū vicinitate decepti κέρυλλος pro κλάδος, vel κλώνος scripserunt. Verum cum hæ duæ voces ramos vel furculos designēt, qui arboribus potius quàm herbis conueniunt, sintque rami iidem arboribus, qui caules herbis, videtur locus is ne sic quidem à mendo expurgatus. Quare legendum censet Matthiolus, ὅτε δὲ κέρυλλος, οὔτε καρπὸς, οὔτε ἄνθος συμφέρει. Id est, neque caulis, neque fructus, neque flos confert. Etenim radicis, quæ odorata est, vsus est duntaxat, non aliarum partium. Sed neque ex Cilicia, neque ex Syria nardus hæc ad nos adfertur, tamen nardum montanum hîc depictam Matthiolus esse putat, quæ etsi folia eryngij non habeat, cum tamen cætera respondeant, præsertim radices odoris fragrantia à cæteris nardi generibus nō discrepantes, ab hac sententia haud abduci potest. Pena de ista nardo Anguillara iudicium & descriptionem sequitur, istamque plantam montanam esse putat, quam inuenit tum in montibus Mindeno conterminis, tum Vega-

niis arduis, & accliuibus. Natura paruula est, valerianæ minori persimilis flore & folio, sed purpurascens, erucæ diuifura & valerianæ maioris: radici bulbi bini, oblongique subsunt orchis ritu, è quibus caules sesquipalmum alti. Nardi montanæ radix efficax est ad omnia, quibus nardus celtica conuenit.

Vires.



V AE Græcis Φῆ, & ἄγριος νάρδος vocatur, Latinis quoque Phu, & filuestris nardus, Arabibus *Pu*, Officinis & herbariis Valeriana maior, à multis quibus valet facultatibus, & Valeriana horrensis, & Theriaca-ria, Gallis *Grande valeriane*, Germanis *Groß Baldrian*, Italis *Valeriana maggiore*. Phu, folia habet, inquit Dioscorides, hippofelino aut elaphobosco simi-
lia, caulem cubitalem aut maiorem, laeuem, tenerum, in purpuram vergentem, cauum,

Lib. I. c. 10.

Forma.

P H V, Magnum.



geniculis interceptum, flores ad narcissi flores accedentes, maiores tamen & teneriores, & ex albicante purpureos. Radix superior digiti parui crassitudine est, adnascentes etiam radículas obliquas veluti iūcus odoratus habet, aut veratrum nigrum, inter sese implicatas, subflauas, bene odoratas, odore nardum referentes cum quadam virosâ grauitate. De quo hæc breuiter prodidit Plinius. Tertio loco Creticum, quod aliqui agrium vocāt, alij phu, folio olusatris, caule cubitali, geniculato, in purpura albicante: radice obliqua villosâque, & imitante auium pedes. Ex quibus delineationibus perspicuum est, valerianā nostratem hortensem siue maiorem, Dioscoridis esse phu. Caulem enim emittit cubitalem & bicubitalem, glabrum, concauum, & que geniculis folia prælonga, altiùs sinuata edētem, erucæ aut pastinacæ diuifura. Flores sunt non inuenusti, in summis ramulis vmbellatim collecti, purpurascens per initia, odor: radix transuersa, humi immersa, crassa, pollicē æquat. Sola florum narcissi collatio obstat, qui in phu

Lib. & ca. 12.

Penain Ad uer.

narcissi florum effigie esse debent, nō autem vmbellæ vel muscarij, vt in valeriana maiori, quamquam flosculi per se omnes qui vmbellam conficiunt, forma narcissinos referāt, in purpura albicantes, deinde longè narcisso magnitudine cedunt, quos tamen maiores esse Dioscorides ait. Sed hīc mendum esse rectè Ruellius coniicit, quod in magnitudinis designatione frequēs apud Dioscoridē & Theophrastum esse solet, vt μακρὰ pro μικρὰ, ἡσσονα pro μείζονα legi debeat, vt & hoc loco, quum reliqua omnia sic adamussim respondeant, vt nulla prorsus nota dissentire videatur. Apud Plinium floris nulla fit mentio. Quidam apud Dioscoridem non inconsideratè pro νάρχιδος, legunt κιδος, id est, hederæ. Est enim Valerianæ flos hederæ flori specie similis. Idem obseruarunt, quod est apud Dioscoridem, phu πλάγια ἐπιρρίξια ἔχειν, καὶ θάπερ χίνον ἢ ἑλλέβορον μέλαινα, Plinium legisse apud quēdam ex vetustis herbariis, ἢ μελανπόδιον, & ita reddidisse, quasi legisset τοὺς τῶν ὀρνίθων πόδας. Præterà facultates consentiunt. Phu enim auctore Dioscoride, vim habet calfaciendi, ciendi vrinas arida pota. Decoctum ipsius eadem præstare potest. Valet etiam ad lateris dolorem, menses cit, & antidotis miscetur. Eadem ferè Plinius tradit. Eius verò quod phu eodem loco appellauimus, radix datur potui trita, vel decocta ad strangulationes, vel pectoris dolores, vel laterum. Menses quoque ciet, bibitur cum vino. Phu, inquit Galenus, odoratum quodammodo est. Huius herbæ radix Nardo viribus similis, sed ad plerāque infirmior. Vrinam plus mouet quàm Indica aut Syriaca nardus, similiter autem vt celtica. Sic valerianæ maioris ra-

Lib. 2. c. 9.

Lib. I. c. 10.

Temper. & Vires.

Lib. I. c. 20.

Lib. 21. c. 20

Lib. 8. sim

In cap. 16.
lib. 1.

dix calidiuscula est & exsicās, lotio ciendo efficax, suaueolens nardum, sed tantilum grauitatis mixtæ prodit. Valeriana, vt tradit Matthiolus ad venenatorū ictus ex vino pota valet, & aduersus pestilentiam, non modò hausta, sed etiam olfacta. Facit ad stranguriā decoctum eius potum. Datur quoq; anhelosis & tussientibus, præsertim cocta cum dulci radice, vuis pæsis, & semine anisi. Deuorata radix flatus pellit. Tota planta virens cum radicibus contusa, & capiti dolenti admota, eius dolores, & punctiones mulcet. Facit & ad oculorum vitia albo vino incocta, deinde oculo instillata. Miscetur potionibus vulnorum internorum magna vtilitate. De aliis valerianæ generibus diximus in libro de Palustribus, & in libro de iis quæ in asperis, &c.

POLIVM.

CAP. XXVI.

Nomina



RAECIS πόλιον, Latinis similiter Polium, Mauritanis *Cahade, Iahade seu Giade*. Est autem polio nomen positum à canitie canisve capillamentis, & tomēto hirsuto, quæ nō modò capitula corymbacea, vt ait Dioscorides, sed etiam vniuersam plantam incanam reddunt, perinde ac gnaphalium. Dioscoridi duo sunt polij genera, montanum quod τεύθειον vocant: alterum maius. Prius tenuis est frutex, candidus, dodrantalis, semine refertus, capitulum in summo habens, corymbi specie, paruum, veluti capillatum, grauitè olens cum quadam suauitate. Alterum fructicosus est, nō vsq; adeò valens odore, & viribus inefficacius. De quibus hæc Plinius. Saliuncam vestibis interponi gratissimum. Sic & apud Græcos polium herbam, inclytam Musæi & Hesiodi laudibus, ad omnia vtilem prædicantium, superque cætera ad famam etiam ac dignitates: prorsusq; mirum, si modo, vt tradunt, folia eius manè candida, meridie purpurea, sole occidente cærulea aspiciuntur. Duo genera eius, campestre maius, siluestre quod minus est, quidam tenthion vocant, folia canis hominis similia, à radice protinus, nunquam palmo altiora. Quod polium vestibis interponi Plinius ait, de Theophrasto mutuatus est, sic scribente, πόλιον. τοῦτο δὲ καὶ πρὸς τὰς σήτας τοὺς ἐν τοῖς ἱματίοις ἀγαθόν. Id est, Polium quod cōtra vermiculos vestibis interpositum valet. Cæterum in eo Plinius hallucinatus est, quod polium cum tripolio confuderit. Non enim polio, sed tripolio euenit, teste Dioscoride, vt colores ter die mutet, neque id quidem à Dioscoride vt à Plinio foliis, sed floribus adscribitur. Præterea capitulum polio inest, canorum hominis instar capillatum, vt tradit Dioscorides, non folia. Quod verò de polio ex Hesiodo & Musæo citat, id Theophrastus scribit his verbis. καὶ ὡς δὴ φασι τὸ τριπόλιον καθ' Ἡσίοδον ἔμμεσάων, εἰς πᾶν πρᾶγμα σπιδάων χρησίμων εἶναι. διὸ ἔδρύτλουσι αὐτὸ νύκτωρ, σχήνην πηξάμενοι. Gaza sic conuertit. Adde polium, quod Hesiodo & Musæo auctoribus, ad omnem rem seriam, magniq; faciendā perutile prædicatur. Præterea quod addit, insuperque ad famam ac dignitates, &c. id etiam alio loco expressit: Polio Musæus & Hesiodus perungi iubēt dignationis gratia, gloriæq; audos polium tractare, colore. Polium montanū quod hīc depinximus, cādicans, foliis oblongis, leuiter

Genera.

Forma.

Lib. 21. c. 1.

Lib. 1. hist.
cap. 16.

POLIVM, Matthioli.

Lib. 4 c. 130

Lib. 9. hist.
Cap. 21.

Lib. 21. c. 20



Id est, Polium quod cōtra vermiculos vestibis interpositum valet. Cæterum in eo Plinius hallucinatus est, quod polium cum tripolio confuderit. Non enim polio, sed tripolio euenit, teste Dioscoride, vt colores ter die mutet, neque id quidem à Dioscoride vt à Plinio foliis, sed floribus adscribitur. Præterea capitulum polio inest, canorum hominis instar capillatum, vt tradit Dioscorides, non folia. Quod verò de polio ex Hesiodo & Musæo citat, id Theophrastus scribit his verbis. καὶ ὡς δὴ φασι τὸ τριπόλιον καθ' Ἡσίοδον ἔμμεσάων, εἰς πᾶν πρᾶγμα σπιδάων χρησίμων εἶναι. διὸ ἔδρύτλουσι αὐτὸ νύκτωρ, σχήνην πηξάμενοι. Gaza sic conuertit. Adde polium, quod Hesiodo & Musæo auctoribus, ad omnem rem seriam, magniq; faciendā perutile prædicatur. Præterea quod addit, insuperque ad famam ac dignitates, &c. id etiam alio loco expressit: Polio Musæus & Hesiodus perungi iubēt dignationis gratia, gloriæq; audos polium tractare, colore. Polium montanū quod hīc depinximus, cādicans, foliis oblongis, leuiter

*POLIVM Alterum,
Matthioli.**POLIVM Luteum,
Dalechamp.*

leuiter ferratis, caulem ab imo ad summum per interualla vestientibus, minoribus inter maiora subnascentibus, caulibus multis, rotundis, rectis, lignosis, albicantibus, qui in cacumine capitula gerunt florida, candicantia, thymi ferè. Tota plāta odore est suauis, acri tamen, & quadantenus graui. Alteram plantam hīc etiam pictam inter polij genera recēseri vult Matthiolus, quod quidam Iuam muscatam vocant, capitulis, foliis, floribus, odore, facultate, polium referens montanum. Ob id affirmat secundū esse polij genus à Dioscoride descriptum. Neque enim illo fruticosius est, neque minū odore & viribus præstans. Prouenit in collibus, arduis præsertim locis, foliosa herba humi procūbens, foliis rosmarini coronarij, minoribus, duriusculis, auersa parte incanis, cauliculis tenuibus, rotundis, subalbicantibus, flexilibus, capitulis in cacumine albicantibus, alterius polij capitulis haud multū dissimilibus, radice simili. Tota planta suauiter olet, & minū quā alterum Polium nares ferit. Polium aliud ex Dalechampio proponimus, luteum cognominatum. In aridis montibus nascitur, iisdemq; locis quibus thlaspi montanum. Id polio priori prorsus simile est, nisi quod florum corymbi in illo caui, in hoc

In cap. 107
lib. 3.

Locus.

Forma.

POLIVM Quartum, Clusij.

luteo colore micāt, spectatu iucundi, & validiorem suauiorēque odorem halant. Sunt & huius folia aliquātō quā huius latiora & ampliora. Clusius Polij genera aliquot recenset. Quarti iconem hīc exhibemus. Est id tenellum, ra-

Lib. 1 stirp.
Hispa. c. 65.

mulis exilibus, dodrantalibus, humi diffusis multa lanugine candida tectis, qui subinde ad nodos radices agunt: folia mediæ inter primum & secundum magnitudinis, breuiora tamen, denticulata, admodum tomentosa: quæ causâ est, vt in tenellis foliis nulli denticuli conspiciantur, nisi diligenter obseruentur, capitula superioribus paulò minora, totâque tomentosa, in quibus flos purpureus. Hoc Polium vidit ille Murciano regno tantum, solo arenoso. Vulgus *camarilla* vocat, & Chamæpityn esse putat. Ab eo quintum genus solum modò differt, quod tenerius sit eo, & flores albos proferat. Vtrumque nihil ferè nisi tomentum sunt, & odoris suauitate reliqua genera superant. Hæc Clusius. Aliud Polium montanum

POLIVM Montanum Supinum
minimum, Lobelij.

Lib. 3. c. 107

Vires &
Temper.

Lib. 21. c. 20



minimum pingendū curauit Lobellius, montano vulgari per omnia simile, sed quadruplò minus. In Allobrogum collibus & Delphinatus Galliaë prouenit. Poliorum decoctum potum, vt auctor est Dioscorides, serpentium ictibus auxiliatur, hydropicis, morbo regio, spleneticis: item cum aceto, capiti dolorem adfert, & stomacho noxium est, aluum & menses ciet, quin & substratum suffitumq; serpentes fugat, impositum vulnera glutinat. Eadem ferè Plinius tradit. Polium contra serpentes substernitur vel portatur. Medici in vino decoquunt recens, vel aridum, illinuntq; vel spleneticis propinant ex aceto, morbo regio in vino: & hydropicis incipientibus in vino decoctum. Vulneribus quoq; sic illinunt. Secundas mulierum partusque emortuos expellit. Item dolores corporis, vesicas inanit, & epiphoris illinitur. Nec magis alia herba conuenit medicamento quod Alexipharmacum vocat. Stomacho tamen inutile esse, caputque eo impleri, & abortum fieri poto, aliqui negant. Quibus postremis verbis vt dubium ponit, quod Dioscorides affirmat.

Lib. 8. sim. De iisdem hæc prodidit Galenus. Polium amarum est gustantibus, & modicè acre. Quare obstructione liberat viscera omnia, vrinamque & menses ciet: ac viride etiamnum magna vulnera glutinat, & maximè species eius quæ fruticosa, aridum cum fuerit, rebellia vlcera sanat illitum, & magis hoc præstat quod minus est. Poliū minus quo etiam vtimur ad antidota, & acrius & amarius est quàm maius, adeò vt ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo excalfacientium.

CLINOPODIUM. CAP. XXVII.

Nomina

Lib. 24. c. 15.

Lib. 3. c. 93.

Forma.

Locus.

Lib. 24. c. 15.

In cap. 93.

lib. 3.

CΛΙΝΟΠΟΔΙΟΝ Græcis, Clinopodium etiam Latinis, quasi Lectipes, quod furculi cæcti pedum effigiē referant. Dicitur etiam teste Plinio, Cleonicium, Zopyron, quibusdam ocimoides. Clinopodium, vt describit Dioscorides, frutex est paruus, furculosus, duorum palmorum altitudine, foliis serpyllo similibus, flores lecti pedum speciem præbēt, ex interuallis marubio similes. Nascitur in petris. Plinius sic deliniat. Clinopodiū alij Cleonicium, alij zopyron, alij ocimoides appellant, serpyllo simile, furculosum, palmi altitudine. Nascitur in petrosis, orbiculato florum ambitu, speciem lecti pedum præbens. Duæ plantæ, inquit Matthiolus, ab herbariis pro Clinopodio ostenduntur. Prima foliis est serpyllo haud absimilibus, tamen latioribus, cauliculis quadrangulis, tenuibus, hirsutis, floribus purpureis, caules verticillatim ambiētibus. Hanc Pena & Lobel.

CLINOPODIVM

Prius, Matthioli.



CLINOPODIVM

Alterum, Matthioli.



& Lobel. Acinon faciunt, vt suprà monuimus. Altera foliis est oblōgis, in cacumine mucronatis, in ambitu ferratis, florib⁹ inter folia subpurpureis, balauſtij effigie. At illa, inquit, lōgè magis quàm hęc Clinopodiū refert, tum quòd folia magis ſerpyllum exprimant, tum quòd flores qui in ſummis caulibus ſunt, lecti pedis baſim quadamtenus referunt. Verumtamen herbæ guſtus eum à ſententia deduxit. Cùm enim Galenus ſcribat Clinopodium ex tertio eſſe calfacientium & ſiccantium ordine, quæ qualitates in iſtis plantis haud percipiuntur, neutra verum Clinopodiū dici poteſt. Hodie notiſſima eſt herba Clinopodij nomine, vt ſcribit Pena, etiā Pharmacopœorū vulgò apud Monſpelienſes & Lugdunenſes, in qua ad veri Clinopodij expreſſionem nihil deſideres. Aridos enim & glareoſos occupat tractus, ſurculis compluribus, ſeſquipalmo longioribus, radice exigua, foliis paruis, ſerpylli foliis paribus & ſimilibus, vel calaminthæ montanæ, vel ocimi mini, nonnullis leuiuſculis in ambitu crenis: cauliculi complures ſarmentofi, crebri, ab imo ad ſummum geniculati ſunt, verticillis, & paruis alabaſtris lamio ſimilibus, quaternis, ſed multò minoribus, crura diuaticata totidē exprimētibus, purpureis floſculis calaminthæ. Calida planta calorem nō ita magnum guſtati præbet, ſed ſiccitatem, odorem ſuauiem ſpirat ſerpylli quadātenus. Huius figuram ſi propiùs intueare, quæ melius Clinopodium exprimat reperies nullam. Nam Maſtic Gallorum Maro quadrat aptiùs quàm Clinopodio, ſicuti vult Dodonæus, nec verticillis aut floribus marrubij tam cōcinnè conditis vel digeſtis, nominis argumētum, nempe lecticę vel triclinij pedem refert. Illud Penæ Clinopodiū à Lobellio depictū eſt Ocimū ſilueſtre, ſiue Acinos Dodonæi in florum Hiſtoria, perperam Calamintha mōtana Tragi, Clinopodiū alterum Matth. ſed Dodonæi & Lobellij picturæ foliis additi pili: quæ res facit vt Clinopodio Matthioli diſſimile videatur. Bibitur herba hæc, auctore Dioſ. aduerſus ſerpentiū ićtus, cōuulſa, rupta, & ſtrāgurias. Mēſes educit & foetus. Pēſiles quoq; verrucas eiicit diebus aliquot potū. Aliū ſiſtit de-

Clinopod.
Penæ.

Li. 2. ca. 57.

Lib. 3. c. 93.
Vires &
Temper.

coctū ad tertias, potumq; nō febricitātibus in vino, febricitantibus in aqua. Horū quardā Plin. habet. Bibitur ad cōuulſa, rupta, ſtrāgurias, ſerpentiū ićtus. Itē decoctæ ſuccus. Galenus tradit Clinopodiū excalfaciēdi vim habere, ſed nondū adurendi: eſſe verò eſſentiæ ſubtilis, & tertij ordinis tum excalfacientiū, tum reſiccantium.

Li. 24. ca. 15.

Li. 7. ſimpl.

Nomina

Lib. 3. c. 92.

Forma.

Li. 24. c. 14.



RAECE πολυκνήμον dicitur, Latinè Polycnemum; quasi multitibiam aut multifuram dicas, quod multis geniculis intercepta sit. Frutex est surculosus, ut breuiter describit Dioscorides: folia habēs origano similia, caulem ut pulegij, multis geniculis distinctū, non tamen habet umbellam, sed paruos in cacumine corymbos, cum acri quadā odoris iucunditate. Polycnemum, inquit Plinius, cunilæ herbæ simile est, semine pulegij, surculosa, multis geniculis, corymbo odorato, acri & dulci odore. Quæ lectio si recta est, in Dioscoride verbum ἀέρμα deest, ut legatur, τὸν δὲ χαυλὸν πολυγόνον, ἀέρμα δὲ ὡς περ γλήχωνος. Idest, caulem multum geniculatum, semen veluti pulegium, ut non in caule, sed in semine Polycnemi ad pulegiū facta sit collatio. Huic succinctæ delineationi plantam appictam satis conuenire arbitratus est Dalechampsius, quæ in aridis & æstuosis Corsicæ montibus, vnde ad eum allata est, gignitur, radi-

POLYCNEVM, Dalech.



POLYCNEVM, Lobellj.



ce breui, fibrata, nigricante, caulibus palmum altis, surculosis, crebrò geniculatis, foliis tragorigani, hirtis, odoratis, acribus, eximium ac suauem quemdam odorem spirantibus, flore nō umbellæ specie, sed in summis caulibus oblongo, ex cæruleo rubescente, ac ex vasculo longo, & herbaceo emergente. Aliud esse Polycnemum opinantur Pena & Lobellius, scilicet Calamintham aquaticam Belgarum quemadmodum capite de Calamintha iam monuimus, notis omnibus cōsentientibus. Est enim fruticosa & exigua planta, radice exigua, caule multiplici, incano, geniculato, quadrato, foliis origani vel pulegij, vnde pulegium agreste propter odorē & folia similia dicitur, floribus corymbi specie, cæsius vel pulegij, verticillatim caules & surculos ambiētibus, & in summo instar corollæ vel corymbi cōgesti ex pluribus flosculis, veluti in pulegio. Vniuersa planta suauem spirat odorem, sed acrimonia quadam nares ferientem. Inter ver nacta & fata, in marginibus agrorū & pratotum Belgij & Angliæ prouenit. Huius Iconē felicius & verius expressam, quam

quàm capite de Calamintha additis floribus & pullis è radice surgentibus, ex Lobellio hîc exhibemus. Polycnemum, inquit Dioscorides, recens vel aridũ illitum vulnera glutinat, sed quinto die soluere oportet. Bibitur cum vino ad vrinæ stillicidia, ruptaq;. Quæ sic breuiter Plinius. Polycnemum ferro factis vulneribus commanducata imponitur: quinto die soluitur.

Lib.3. c.92.
Vires.
Li.24. c.14.

HYSSOPVM VVLGARE. CAP. XXIX.

ΥΣΣΩΠΟΣ Græcis, Latinis Hyssopus & Hyssopum, Arabibus *Cyfe, Iusa*, seu *Iabes*, Italis & Hispanis *Hissopo*, Gallis *Hissope*, Germanis *Isope*. Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Vt Græca Dioscoridis Hyssopus, ita hæc Arabum & Mesuæ auctoritate dudum recepta, & in Officinas deducta, duûm est generum. Hortensis siue satiua, & montana siue siluestris. Hyssopus hortensis, quæ in hortis non solum Officinarum, sed etiam culinæ causa colitur. Hyssopus Arabum Mesuæ & Officinarum, herba est siue frutex paruus surculis multis ab vna radice prodeuntibus, lignosis, sesquipedalibus, quos totos folia vestiunt circumquaque per interualla, oblonga, duriuscula, odorata, gustu feruida & amariuscula, satureiæ vulgaris siue satiuae similia, flores surculorû summitates spicæ modo ornant in cæruleo purpurascens, radix lignosa & multifida. Eadem hortensis, vt affirmat Pena, in Anglia nullo mangonio dimi-


Nomina

Genera.

Forma.
Matth. in
ca.26.lib.3.

Fol.185.

HYSSOPVS Satiuus
vulgaris.



HYSSOPVS Vulgaris ex
Codice Casareo.



dio sui, foliis & ramulis adeò candicat sine lanugine, vt quamlibet niuem aut calcem facîle prouocet, semisse altera viridi remanente. Huic similem aliam reperiri quidam ferunt cauliculis breuioribus, & plurima parte humum versus reclinatis: foliis paulò nigrioribus ac crassioribus: flosculis verò in cacumine in brevis spicæ modum digestis, colore quoque pulchrè cæruleis, & superioris forma similibus. Verùm hac species rarissima. Hyssopum hæc passim Officinæ & vulgò appellant. Germani ac Belgæ *Isope*, aut *Isope*, Itali *Hyssopo*, Hispani *Isope*, Galli *Hyssope*. An autè veterum

veterum legitima Hyssopus sit, non parùm, nec temerè, ambigitur. Tametsi enim Hyssopum veluti omnibus cognitam, nullis notis Dioscorides exposuerit, extant tamen quædam de eius forma alibi, quæ vulgari Hyssopo nequaquam respōdent. Origanum Heracleoticum folium habet Hyssopi similitudine: Chrysocome comam habet corymboidem, similem Hyssopo. Plinius lib. 27. cap. 12. Stœchadē ait odoratam herbam, coma Hyssopi. Accedit icon ipsius Hyssopi, quæ in perquàm vetusto Cæsareæ bibliothecæ exemplari reperitur, foliis latis, Origani similibus, & capitulis in summis virgis eminentibus. Atque ex his non esse legitimam, quæ vulgò pro Hyssopo habetur, manifestum est. Cæterum quod ad facultates vulgaris Hyssopi attinet, gustabilis huius qualitas acris, cum nōnulla amaritudine coniuncta, calidam ipsam esse ostendit, & siccam tertio ordine, tenuis quoque essentia, ac expurgandi vim habere. Non inutiliter idcirco, imò efficaciter, ad omnes pulmonis ac thoracis frigidos morbos in eclegmate, aut alio modo vulgaris Hyssopus adhibetur. Obstructiones aperit, crassa incidit: lenta attenuat, & vt facilius expuantur, præstat. Cum carnibus bubulis decocta non insuauiter ex iure editur, ori ac ventriculo grata: vrinas verò etiā mouet, & ad vrinæ stillicidium vtilis est.

HYSSOPVS Montana,
Fuchf.



HYSSOPVS Arabum, flore
rubro, Lobellij.



Hyssopus montana coma & floribus, tota denique facie satiuæ similis est, folio tamen asperiore, gustu amariore, nec vsque adeo acri. Hyssopus duplex, inquit Lib. 2. c. 18. Mesues, hortensis & montanus. Ille semicubitalis, caulibus & ramis paucioribus quàm thymus, foliis thymi, sed maioribus, flore purpureo. Hic breuior, & foliis minoribus. Hyssopus prior in hortis omnibus fruticat, montanus in Saluatino monte Comitatus Goritiensis teste Matthiolo. Pena nasci ait in collibus asperis Romanæ & Veronensis tractus, præsertim secus Athesim, & angustias saxorum & arcem munitissimam, quæ Imperatoriam à Venetorum ditioe discriminat, è regione montis Baldi. Hyssopum Arabum flore rubro, & interdū albo alunt cultiora vireta Belgica, auctore Lobellio, sed floribus sapiùs vnico tantum ordine digestis.

gestis. Hyssopus, auctore Mesue, calidus est & siccus ordine secundo, vel potius tertio. Pituitam crassam & putrem purgat, sed minus quam thymum. Thoracem & pulmones partesq; alias respiratorias pituita eadem, & humoribus aliis putribus & pure expurgat, & tenuando ac incidendo, tergendoque; sputum facile reddit. Ob hæc asthmatis, tussi à materiis prædictis est salubris, & epilepsiæ pituitosæ, cæterisque cerebri affectibus pituitosis præsertim sumptus syrupo, vel decocto, cum oxymelite scillitico, & cum origano, etiam in omni ætate expertus: coctionem quoque iuuat. Propter hæc respirationem leuat, & cutis colorem floridum efficit. Coctus cum vino hepatis, lienis, & aliorum viscerum tumores resoluit sumptus, & cum ficibus & iride, & nitro admotus. Lumbricos necat cum ficibus coctus: cum aceto vel oxymelite dolorem dentium sedat: suffitu aurium tinnitum dissipat. Nam tenuat, terget, digerit, flatus dissipat. Præstantior qui odore & sapore acerrimo est, præsertim qui habitior, & quo tempore florere incipit, quando etiam colligendus. Imbecilliter purgat nisi cardamomum & ius misceatur (ex Dioscoride legendum, nisi cardamum, id est, nasturtium, & iris misceantur: quamquam vulgati Dioscoridis codices *μυγέσλος καρδαμώμης* pro *καρδάμους* habeant) miscendum autem esse cardamum res ipsa indicat, & Macri versus:

Cardama si iungas, his solues fortius alium.

Aut cum manna, vel melle, vel uvis pæsis purgatis, vel scilla coquatur. Mediocrè sustinet coctionem & trituram, ut thymum. Datur decocto à drachmis sex ad drachmas decem, puluere à drachmis tribus usque ad drachmas septem. Scribit Matthiolus hyssopum tenuium esse partium. Ideoque; incidere, aperire, attenuare, & abstergere. Aduersari serpentium icibus, si cum sale & cumino tritum ex melle vulneri illinatur: ex oleo inunctum pediculos necare, & capitis pruriginem tollere. Iuuare comitiales quoquo modo sumptum, sed valentius id efficere in catapotiis hoc modo paratis. Sumuntur hyssopi, marrubij & castorei singulorum semidrachma, radicis prœniæ drachmae duæ, assæ foetidae scrupulus: teruntur omnia, &

Ca. 93. li. 3.

HYSSOPUS Folio

Origani, Dalechamp.



cum succo eiusdem Hyssopi finguntur catapotia septem, è quibus vnum duntaxat quolibet vesperi deuorandum, cum dormitum se recipit æger. Hyssopum Dioscorides, ut herbam nulli non cognitam non descripsit, sed paulò post Origanum heracleoticum folium habere Hyssopo simile dixit tantum, de umbella enim circinata Hyssopi nulla sequitur mentio: deinde onitidem folio esse candidiore & Hyssopo similiorum. Hunc Hyssopum ex Dalechampsio hic exhibemus, folio rotundo, origani heracleotici, nihil odore, sapore, floris spica carulea diuersum à vulgari, sed ea re tantum, quod folium maioranæ pulegiæve simile ac rotundum in longum non porrigitur vulgaris modo. Lugduni colitur in hortis quibusdam. Pena longe diuersum Hyssopum genuinum Dioscoridis statuit, nimirum communem illam Maioranam, in Gallia & Belgio notam, quæ Maiorana crassa, & Anglica vocatur, quia in Anglia latior, & cibo aptior prouenit, præsertim in hortis. Quod, ut probet, ponit ex Dioscoride Heracleoticum foliis esse Hyssopi similibus, sed umbellam

Lib. 2. c. 18.
Temper.
& Vires.



bellam non circinatam vel turbinatam habere qualem Hyssopus: deinde Onitidē candidiore folio, & similiorem Hyssopo quàm Heracleotico: semen non esse quidem corymbos, sed ita coniunctum, vt speciem corymborum præbeat. Adhæc serpyllo omnibus notissimo folia & ramulos origani tribuit Dioscorides, cui origano Hyssopum assimilauit foliis & umbella. Præterea Maioranam hortensem Crateuas, Isaach, Serapio, Mesues Hyssopo similem faciunt. Quare cum communis illa maiorana Anglica siue crassa umbellā habeat circinatā turbinatāque, densam & congestam ex multis flosculis purpureis: semina frequenti pericarpiorum serie ac coaceruatione coniuncta in corymbi modum, non secus atque in Maiorana, in origano onitide & vulgari: cum folia & tota effigies, odor suauis Origani heracleotici, acrimonia nitior, vires ipsę consentiant, nullam aliam plantam tot notis exprimere genuinum Dioscoridis Hyssopum censet. Eam elegantiore pictura quàm ea quæ capite de Maro posita est, ex Lobellio hîc repræsentandam duximus. Hyssopus lutea in vmbrosis lucorum & sylvarum marginibus ac cliuis gignitur, radicibus paucis, exiguis, breuibus, nigris, caule dodrantali, quadrato, in ramulos paucos brachiato, è foliorū alato sinu emergētes foliis oblongis, angustis, minimè crenatis, Hyssopo aut satureiæ similibus, flore paruo, oblongo, infra candicante, supra aureo velut aperto quodam rictu hiantes, gustu subamaro & austero. Floret Mayo & Iunio.

ABROTONVM.

CAP. XXX.

Nomina



ABROTONON Græcis, Abrotonum Latinis nominatur, Mauritanis *Cathsum*, *Kesum*, seu *Gaiffum*, Italis & Hispanis *Abrotono*. Dictum est autē Abrotonū, vt testatur Nicandri interpres διὰ τὸ πρὸς ὀψιν ἀβρόν καὶ ἀπαλὸν φαίνεσθαι, ἄλλω γὰρ καὶ διὰ τὸ λευκῶς εἶναι, hoc est, quod cōspectu tenerum, molle, & delicatū appareat etiā, aut quod grauem acrimie, & difficilem halitum spiret. Abrotonum duorum est generum, veterū & recentiorū omnium sententia

Genera.

ABROTONVM Fœmina,
Matthioli.



ABROTONVM Mas,
Matthioli.



sententia. Mas & fœmina. Plinius marem campestre vocat, fœminam montanũ. Abrotonum fœmina Gallis *Petit Cyprez*, & *Cyprez de Jardin*, & *Garderobbe*, Germanis *Gurten Cyprez*, Italis *Santolina*. Frutex est arboris specie, subalbus, foliis circum ramulos minutim incisus seriphij modo, corymbis in summo aureis. Prouenit æstate, odoratus cum quadam grauitate, gustu amaro. Abrotonum mas, Gallis *Auronne*, Germanis *Stabuurtz*, sarmentosum est, gracili semine vti absinthium: λεπίδαρπον enim legimus in vulgatis codicibus, Ruellius λεπίδαρπον, idest, gracilibus ramulis. Plinius. Abrotonũ odore iucundè graui, floret æstate. (Cornarius legit, Abrotonum iucundi odoris est & grauis, floret æstate:) flos aurei coloris: vacuum sponte prouenit: vel, vt in vetustis codicibus legitur: in vacuis sponte prouenit. Cacumine se propagat. Seritur autem semine meliùs quàm radice, aut furculo: semine quoque nõ sine negotio plantaria transferuntur. Sic & Adonium. Vtrumq; æstate: alsiosa enim admodũ sunt: & sole tamen nimio læduntur. Sed vbi conualuere, ritu vitis fruticant. Sic enim exẽplaria vulgaria habent, cùm ex Theophrasto, vt mox dicetur, vt ruta, vel rutæ vice legendum sit, non ritu vitis: quorum postrema ex Theophrasto mutuatus est.

Li. & c. 21.

Forma.

Li. 21. c. 10.

Emb. 26. li.

3.


Lib. 6. hist. cap. 7.

Ἀβρότονον δὲ μᾶλλον ἢ ἀπὸ σπέρματος βλαστάνει ἀπὸ ρίζης καὶ παρασπάδος (sic enim legit Gaza, & rectè, vt contextus apertè demonstrat, non vt in vulgatis codicibus exaratum est, Ἀβρότονον δὲ μᾶλλον ἀπὸ σπέρματος βλαστάνει ἢ ἀπὸ ρίζης, &c.) χαλεπῶς ὅ καὶ ἀπὸ σπέρματος τρομοχόου μιν ἐν ὀστέοις, ὡς περ οἱ ἀδώνιδος κήποι. ἀπὸ τῆς γένεως. διύσειγον καὶ σφόδρα, καὶ ὅλως ἐπικτηνόν, ὅπως καὶ ὁ ἥλιος σφόδρα λαμπρὸν ἐμφανῶν δὲ αὐξηθὲν, μέγα καὶ ἰχυρον ἔδειν. δρῶδες, ὡς περ δὲ πηγανόν: πολλὴν ξυλωδέτερον πολλὴ τῆτο, ἔξηρότερον, καὶ ἀνχυλωδέτερον, Idest, Abrotonum radice aut auulso furculo potius quàm semine germinat. Semine verò difficulter exit. Fictilibus vasis depactum qualia sunt, in quibus Adonidis hortos instruunt. Seritur æstate. Est enim alsiosum vehementer, atque morbis obnoxium, etiam vbi sol splendide illucet: sed vbi conualuerit, creueritque, magnum ac robustum arborescit, instar rutæ, nisi quòd multò

est lignosius, siccius, squallidius. Quæ si recta est Gazæ lectio & interpretatio, Plinius contrariò planè sensu hæc conuertit. Præterea hæc verba, ὡς περ οἱ ἀδώνιδος κήποι, aliter legisse videtur, qui Adonium Latine reddiderit, perinde ac si herbæ cuiusdam peculiare nomen esset. Totũ cum locum Plinij corruptissimũ quidam

sic restituunt. Seritur autem viui radice, ac furculo, melius quàm semine: & semine quoque non sine negotio plantaria transferuntur: in Adonidis hortos, æstate. Vtrumque alsiosum admodum est, & sole tamen nimio læditur: sed vbi conualuere, instar rutæ fruticant. Abrotono simile odore leucanthemō, flore albo, folioso.

ABROTONVM Fœmina, Dodonæi.



Ca. 334. p.
hist.
Lib. I. c. 19.

ABROTONVM Mas, Dodonæi.



Lib. 3. c. 25.
*Vires &
Temper.*

Li. & ca. 21.

Quin Gallorum pumila siue hortensis cupressus sit Abrotonum fœmina, minimè dubitandum: tum quia notis candoris, amaritudinis, fruticis arborei habitu, corymbis aureis, foliis minutissimè scissis seriphij modo illi quadrevidetur, tum quia viribus iisdem nec ignavioribus polleat, quas Dioscorides & Galenus illi assignarunt. Non solum in hortis frequens colitur, sed etiam Galliae Narbonensis ut Nemaufensibus vinetis, & campis patentibus fruticat plurima, sesquicubitus alta, ex virore cãdida, corymbis bullatis, crebris, fuluo colore nitentibus mense Iulio, cætera hortensi similis, sed odoratior, lignosior, cuius semine lumbricos necant mulierculæ. Hanc plantam non Abrotoni fœminæ, sed chamæcyparissi Plinianæ nomine depinxerunt, & descripserunt Fuchsius & Dodonæus, quæ & Santolina nuncupatur, eiusque nullam à Græcis factam fuisse mentionem ait ille. Pro qua pictam dedit Dodonæus plantam quæ est Abrotonum silvestre, quod Fuchsius Abrotonum marem facit. Abrotonum verò fœminam, idem Fuchsius absinthij speciem, de qua paulò post dicemus. Aurone Gallica, hortis ruriq; oriunda, Abrotonum mas meritò censetur, sarmentosum duriusque, seminibus tenuibus, odorem, subalbidum, amarum, foliis fœniculi modo minutim incis, paulò latioribus ornandis hortis, & deambulacris concinnandis apta, flore luteo, absinthij, minore. Vtriusque Abrotoni semen feruefactum, ut scribit Dioscorides, itemq; crudum cum aqua potum, orthopnoicis, ruptis, conuulsis, ischiadicis, urinæ difficultatibus, & suppressis mensibus auxiliatur. Potum in vino exitialium venenorum antidotum est, cum oleo, rigentibus illinitur. Serpentes lecto instratum & suffitum fugat. Cum vino potum aduersus eorundem morsus, peculiariter autem scorpionum & phalangiorum prodest. Oculorum inflammationibus cum cotoneo cocto aut pane illitum subuenit. Tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Plinius eadem ferè tradit. Vfus est & foliis, sed maior semini ad excalfaciendum: ideò neruis vtile, tussi, orthopnoicis, conuulsis, ruptis, lumbis

lumbis, vrinae angustis. Datur bibendū manualibus fasciculis decoctis ad tertias partes: ex his quaternis cyathis bibitur. Datur & semen tusum in aqua drachmae pōdere. Prodest & vuluæ. Concoquit Panos cum farina hordeacea, & oculorū inflammationibus illinitur cum cotoneo malo cocto. Serpentes fugat. Contra ictus earum bibitur cum vino, illiniturq;. Efficacissimum cōtra ea, quorum veneno tremores & frigus accidunt, vt scorpionum & phalangiorum: & contra venena alia potu prodest, è quoquo modo algentibus, & ad extrahenda ea quæ inharent corporibus. Pellit & interaneorū mala. Ramo eius si subiiciatur puluino, venerem stimulari aiunt: efficacissimamq; esse herbam contra omnia veneficia, quibus coitus inhibeatur. Galenus de iisdem distinctiūs sic scripsit. Abrotonum calidum est & siccū ordine tertio, cuius temperiem maximè ex gustu inueniemus: est enim admodum amarum. Itaque nō instrenuè calfacit & siccāt. Nam siue comā eius cum floribus (reliqua enim palea inutilis est) cōtusam vlceri puro illinas, mordax & irritans videbitur: siue eo in oleo macerato caput aut vētrem perfundere velis, admodum calfacere reperies. Quin & si qui per circuitus rigoribus capiuntur, eos ante inuasionē rigorum hoc voles cōfricare, minūs vtique rigore concutientur: imò & sensus quidem protinus vbiadmotū fuerit, ipsum calfacere percipit. Porro quod lumbricos interimat, par est, nimirū cū sit amarum. Scies autē protinus quod & digerēdi, & incidendi quādam vim habeat: sed & quod magis quā Absointhio id magis necessario insit, in promptu erit colligere. Primū quidem ex gustu (paucissimæ siquidē acerbitalis particeps Abrotonum est, nō pauca verò absinthiū.) Deinde ex eo quod inimicū sit stomacho Abrotonum, velut etiam Seriphiū, gratum verò & amicum absinthium. Abrotonum vltum calidum siccūq; facultate est, magis etiā quā cucurbita sicca vsta, & anethi radix. Illa enim vlceribus humidis, simul & citra phlegmonē callo induratis cōueniunt: ac proinde maximè vlceribus iis quæ in pudēdorum præputiis sunt cōpetere vidētur. At cinis Abrotoni

Li. 6. simpl.

ABROTONVM Odoratum
humile, Lobellij.



ABROTONVM Inodorum,
Lobellij.



ulceribus omnibus mordax est: ac idcirco in oleo tenui, cicino scilicet, aut rhanphano, aut sicyonio, aut veteri & maximè sabino, ad alopecias accommodatur: tum barbam tardiùs enascētem cum aliquo dictorū oleorum elicit, sed nec minùs illis lentiscino maceratū. Quippe pro eo quod tenuium est partium, rarefaciendi vim obtinet, & mordax est, & calidum. Lobellius & periti alij Herbarij plantam aliam hīc appētā Abrotoni speciem statuēre: quia ei bellè quadrat. Est enim foliis nō absimilibus: sed viticulis densissimè stipatis fruticat sesquicubitalibus duorumq; pedum, tenuibus, lignosis, copiosis flosculis Abrotoni ex herbido luteis, odoratis: radice lignosa, flexuosa & prolixa. Belgis hortensis est. Item aliud Abrotonum insipidum & inodorum, figura, folio, flore & semine Artemisiæ tenuifoliæ. E collibus Gallobelgij in hortis colitur.

CHAMÆCYPARISSVS.

CAP. XXXI.

Li. 24. ca. 15.
Nomina

Forma.

PLINII Chamæcyparissus, idest, humilis seu pumila cupressus, Dalechampion ea planta esse censetur, quam Rhotomagēses, in quorum hortis plurima nascitur, *Grande Camomille* vocāt, idest, magnum Chamæmelū. Plāta est valde furculosa & sarmentosa, radice dēsa nigra, lignosa, folio crispo, tereti, minutim discisso, obscuriùs virēte, ramulos squallidos circūdante, copioso flore, aureo, in rotundis corymbis. Resinosum & pingue quidpiam tota planta olet, vt & illius plātæ flos quā pro pyretro siluestri pinxit Dodonæus. Magna quidē est huic plantæ cum Abrotono fœmina similitudo: quare ne quis hanc cum illa confundat, diligēter considerandæ sunt vtriusque notæ, quibus discernantur. Abrotonū altius se surrigit, hæc pumila, & breuitate magis coacta nō attollitur. Abrotono folia sunt lōgiora, incana, spissa, scissurisque magis hiantibus. Huic Chamæcyparisso breuiora, rariora, & ex maioribus interuallis, compressiora. Ad hæc odore discrepāt, qui validior grauiorque est in abrotono, lāguidior & imbecillior in Chamæcyparisso, nō tamē admodum suauis. Aiunt Rhotomagi floris corymbum albis foliolis coronari anthemidis leucāthemi modo, eamq; ob causam chamæmelum magnum ibi dici. Sed cum in hortis nostris satū adoleuisset, corymbum luteū absque foliolis, abrotono fœminæ similem genuit. Ad eadem omnia vtūtur Rhotomagenes Pharmacopœi, ad quæ & chamæ-

CHAMÆCYPARISSVS,

Dalechampi.

Lib. 3. c. 20.

Vires.

Li. 24. c. 15.

melo vulgari, nec fallaci successu. Chamæcyparissus herba, inquit Plinius, ex vino pota contra venena serpentium omnium scorpionumq; pollet.

ABSINTHIUM

CAP. XXXII.

Nomina

APSINTHION Græcis, & *Βαθύπικρον*, vel *Βαρύπικρον*, Latine Absinthium appellatur, in officinis appellationem suam retinuit, Arabicè *Affinthium*, Italicè *Affenzo*, Germanis *Vuermuet*, Gallicè *Aluyme*, ab amaro sapore, vt aloës, & *Absinse*, siue *Absinthe*. Nomen Absinthij Græci ab *ἀψεν*, idest, contrectando per antiphrasim deflexerunt, quod nullum animal ob eximiam amaritudinem hanc herbam attingat: quam ob causam etiam bathypicron

bathypicron, seu barypicron nominata est. Veteres Græci Comici ἀπίνθιον, quoq; simili etymo dixerunt quasi impotabilem, quòd hâc nemo propter insignē amarorem bibere possit. Similiter Germani *Vuermnot* nominarunt, quasi prohibens hilaritatem & alacritatem, ob immensam amaritudinem. Quidam tamē exponūt quasi impediens concitationem ad venerem. Absinthij tria sunt genera Dioscoridi. Vulgare, Marinum, quod & Seriphium nominant, tertium Santonicum, in Gallia ad Alpes plurimūm proueniens, quod vernacula voce Santonicum appellant, à Santonide regione ipsum producente. Totidem sunt Galeno, sic scribenti: Absinthij tres statuendæ sunt species: quarum vnam eodem cum genere ipso nomine appellant, cuiusmodi potissimum est Ponticum, alterum Santonicū, tertium Seriphium. Si verò aliud placet appellare Absinthium, aliud verò Seriphium, aliud autem Santonicū, nihil interest. Plinius, Absinthij genera sunt plura, inquit, Santonicum appellatur à Gallia ciuitate, Ponticum à Ponto. Et aliquantò post. Est & Absinthium marinum, quod quidam Seriphium vocant, &c. Fuchsius absinthium vulgare depinxit, & Seriphium, quod est Dodonæo Thaliætrum, vt diximus. Tertium Santonicum non pinxit, sed simile Absinthio esse ait, verūm non adeò copioso semine, & subamarum. Dodonæus Absinthium Ponticum, Officinis Brabantia Romanum appellatum, id primum proposuit, quod Fuchsius pro abrotano fœmina posuit: Secundum Seriphium seu marinum, cuius semen Officinis omnibus notissimum est, quod semen sanctum, semen lumbricorum, & semen contra nominatur. Tertium Santonicum, vulgare nostrum, eaq; genera non locis natalibus, sed forma ipsa & facie differre ait. Matthiolus Absinthium vulgatum primum depingit & describit: deinde aliud Ponticum, quod non solum in Ponto, sed etiam in Hungaria, Transilvania, & Bohemia nascitur, & omnibus planè notis cum Galeni Pontico conuenire scribit: tum aliud marinum siue Seriphium, planè ab aliorū Seriphio diuersum: item aliud Seriphium Ægyptiū: postremò aliud, cuius semen lumbricos necans in Officinis veditur: ab illis enim dissidet, qui semen illud Absinthij marini semen esse censent. Pena veterum diuisionem secutus, Absinthium nostrum vulgatissimum non esse aliud à Pontico & Romano censet. Id demonstrat Dioscorides, cum scribit: ἀπίνθιον γινώσκουσιν ἢ πῶς αἰετὶ δὲ ἀπὸ τῆς Βελτίων τὸ ἐν πόντῳ καὶ καππαδοκίᾳ. Id est, Absinthium herba est nota: ex quo præstantius id est, quod in Ponto & Cappadocia nascitur. His enim verbis non indicat vulgaris herba, quæq; ideò delineatione non egeat, speciei differentiam, sed nataliū duntaxat dissimilitudinem, quod cum vbique obuia sit, tamen in Ponto & Tauro Cappadocia monte, vtpote puriore calo & aëre perflato, commendatior, magisq; aromatica sit, quemadmodum Iridem Illyricam & pleraq; alia Dioscorides & Galenus eadem commendatione celebrarunt. Idē innuit Galenus his verbis. Absinthij tres statuendæ sunt species: quarum vnam eodem cum genere ipso nomine appellant: cuiusmodi potissimum est Ponticum, &c. Hic absolutè vulgare nostrū Absinthium vocat, quod in Ponto fœlicius ex Dioscoride prouenire indicat, sine vlllo speciei vel generis discrimine. Quare vulgatius Absinthium Ponticum est, antiquis à præstantia, & regione cognomine sic dictū, tum recentioribus barbaris ab adstrictione, quam illi Ponticum saporē sua non Latina voce appellant, quā laudabant in Absinthio Pontico Dioscorides & Galenus. Inter Arabes Mesues cū Romano Ponticitatem vindicasset, id est, adstrictionem siccam, & valde medico vsui oportunam, idem Ponticum & Romanum esse, nihil fortè huiusmodi meditatus, verissimè literis mandauit. Vnde Pharmacopœorum tam sedulā huius Romani conquisitio & exploratio etiānum durat. Romanum enim id est optimū, vti Romanam camomillam cæteris præstantiorem & genuinā expetunt. Et quod quidem nostro æuo in Romano agro antiquisq; rudibus passim visitur, nō aliud

Li. 6. simpl.

Lib. 27. c. 7.

Cap. 1. hist.

Lib. 2. c. 77.

Lib. 1. ca. 2.

Cap. 2. hist.

Cap. 23. li. 3.

Lib. 3. c. 23.

à nostro est, & vtrumque cum Pontico idem est. Quare id non descripsit Dioscorides, tantum indicauit quo loci præstantius nouisset. Nec itidem vllum speciei aut figuræ discrimen assignat Galenus, sed Dioscoridis fidem secutus, ut plurimum solet, vires præsentiores non diuersas Pōticum habere scripsit, nec natura, sed loci præstātia, quam etiam multis in regionibus vulgatum obtinet. Est enim vbi odore non insuauis, vbi odoratum, & vbi foetidum percipias. Idem Galenus de Pōtico alibi hæc scribit. Cum duplex in omni Absinthio facultas & qualitas sit, utiq; in Pōtico adstringendi qualitas non parua est: in reliquis omnibus, idest, Seriphio, & mōtano, amara quidem qualitas est vehementissima, adstrictio verò (quam saltem gustu agnoscas) aut planè obscura, aut planè nulla sentitur. Proinde Pōticum ad iecinoris, ventris phlegmonas eligi præstat. Porro, idest tum folio, tum flore longè quàm cetera Absinthia minore, odor quoq; huic non modò non insuauis, verum etiā aromaticum quid præse ferens, reliquis omnibus planè foedus. Quare hæc fugere cōueniet, uti autem semper Pōtico. Hic folia Pōtici minora magnopere doctos tulerunt, inquit Pena, sed legisse asserit, codice & rei exploratione fretum Rondeletium, maiora, quæ metathesis uti facilis, ita nimis familiaris fermè omnibus de plantis scribentibus. Extat sæpe in Theophrasto, sæpissimè in Dioscoride, ut capite de Helenio, Meo, & aliis interdū, & in Galeno, non suo sed ammanuensium vitio. Præterea Ὡδίας obiectioni facilè respōdet. Nam si magis odoratum, odoratum erit & alterum. Et τῇ Ὡδίᾳ non gratia odoris vel suauitas, sed fragrantia & vehementia plerūque indicatur, ut in vngue odorato, myrrha, pice, aliisque. Hactenus de primo Absinthij genere. Secundum est marinum siue Seriphium, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphosiri Ægypti: in quibus hæc ἐν τῷ περὶ χαππαδοκίαν τόμῳ ὅρι, idest, in Tauro mōte iuxta Cappadociā, aliena esse ab hoc loco, & ex superiore Absinthio huc translata ac supposita fuisse putat Cornarius: quod ostendit Plinius, qui ea particula relicta probatissimum in Taphosiri Ægypti esse ait. Tertium Absinthij genus est Santonicum, γεννώμιον ἐν τῇ χεῖρὶ τὰς ἀλπεὺς γαλιῖα πλεῖστον, ὁ ἐπιχωρίως σαρδόνιον καλεῖται. Idest, in Gallia Alpi- bus finitima plurimum, quod patrio nomine Santonicū vocant. At Geographiæ peritus nunquam Gallicas alpes in Santonum agro, vulgò *Saintonge* existere credet, vbi crescat eiusdem nominis Absinthiū. Adhæc in Aldino codice non σαρδόνιον, siue σαρδόνιον, sed σαρδόνιον legitur, hoc modo: περὶ ἀψινθίῃς σαρδονίῃς. ἔστι δὲ καὶ τρίτον εἶδος ἀψινθίῃς γεννώμιον ἐν τῇ χεῖρὶ τὰς ἀλπεὺς γαλιῖα πλεῖστον, ὁ ἐπιχωρίως σαρδόνιον καλεῖται, ἐπὶ πυνύμῳ τῇ γεννώσῃ ὡς σαρδονίδι χώρα. Idest, De Absinthio Sardonio. Tertiū est Absinthij genus, in Galatia ad Alpes plurimū proueniens, patrio nomine Sardonium nominatū, cognomine ducto à Sardonide regione, quæ ipsum fert. Tertium hoc Pena vult ad alpes Asiaticæ Galatiæ nasci, quas Sardonidas vocant indigenæ, ideò Sardinium vocatum: sic enim hodie legitur, & restituitur, facili intellectione, & proximè sequentis capitis repetitione, vbi in Galatia Asiaticā Abrotonum, utpotè cōgener, oriri dicit, ut duas Absinthij species, ex eodem Galatiæ & Cappadociæ loco cōmender Dioscorides, & nulla ratio sit hæsitationis, aut in Santonicum Gallicum deprauationis. Absinthium Pōticum, siue Romanū, siue vulgare, caule fruticat ramoso, foliis incanis, variè incis, & figura artemisiæ, flosculis rotundis, aureis, racematim cōgestis, semine rotundo, simul cohærente: radice diuulsa, firma, lignosa. Hoc absolutè Matthiolum Absinthium vocat. Dodonæus Absinthium Sātonicum. Absinthium Pōticum Matthioli folio, caule, flore, ac semine cōstat longè quàm vulgare Absinthium minoribus: sapore est amariuscule, cui non parua adstringēdi vis cōiuncta est, odore etiā est non insuauis. Aliud Pōticum ostēdit Lobellius, Tridētinum Herbariorū ex Pōti & Tauri mōtibus ipsi & Tridētinis impertitum, cuius omnium minima folia sunt, albida, aromatica, adstringentia & subamara.

Li. 6. simpl.

Li. II. meth.
ca. 16.

In Aduers.

Embl. 25.
lib. 3.

Fol. 37.

Forma.

Cap. 23. li. 3.

subamara. Absinthium marinum siue seriphium, vt describit Dioscorides, herba est pratenuibus surculis, minori abrotono similis, exiguis referta seminibus, subamara, stomacho noxia, graui odore, & cum quadã calfactione adstringens. Matthioli seriphium hîc pictû, quòd in multis, vt ille ait, tam Tyrrehi quàm Adria-

Seriphium

ABSINTHIUM

Vulgare.



ABSINTHIUM

Ponticum, Matth.



ABSINTHIUM Ponticum Tridentinum Herbariorum, Lobellij.



ABSINTHIUM Seriphium, seu marinum, Matth.



ABSINTHIUM Seriphium
Aegyptium, Matth.



Lib. I. c. 2.

Lib. I. c. 2.

In cap. 24.
lib. 3.

men contra vocant, negat Matthiolus, quod legitima semen istud proferens planta à Cortuso ad se missa, à marino absinthio permultum distet, ut ex eius pictura quivis perspicere potest. Diversum ab his seriphium Dioscoridis, abrotoni fœminæ facie ex Pena hic proponimus. Cum enim seriphium & abrotonum fœmina mutua collatione Dioscoridi assimilentur, accuratè examinatis notis quibus utrâque dignosci queat, tandem naturæ cognatione ductus, & virium exploratione,

tici pelagi litoribus nascitur, præsertim Aquileiensibus & Tergestinis, cum primum è terra erumpit, folio est absinthio simili, crassiore tamen. Sed cum adoleuerit, & caules ediderit, mutatis in longum foliolis, iis præsertim quæ caulem ambiunt, abrotonum æmulatur, foliis tamen non sic parvis. Semen exiguum, copiosumq; , abrotoni modo inter folia erumpit, in summo caule ferè racemosum, amari & adstringentis gustus. Aliam Aegyptij seriphij plantam à nostrate longè diuersam ex Aegypto allatam Matthiolus ostendit. Absinthium seriphium Dodonæi hic quoq; expressum cadicat, foliis incanis, absinthij vulgaris ferè, sed multò minoribus, tenerioribus, candidioribus & minutius incisis, flosculos multos in capitulis gerit, & semen secus furculos, uti absinthium vulgare: sesquipedali est altitudine, aut maiore, vehementi odore, salso & amaro gustu. Huius semen id esse ait Dodonæus, quod Officinæ semen sanctum, & se-

SERIPHIVM Absinth.
Dodonæi.



SERIPHIVM verum, Pena
& Lobellij.



hoc genuinum absinthiū seriphium esse statuit, quod in Gallica prouincia, montis celsi Magdalenæ accliuibus, quā S. Maximinum oppidum spectat, redeunti item Olbia maritima ciuitate, multum obuium fruticat, exilibus, leuibus surculis, pedem altis. Radix albicans & prolixa surculos statim ab humo numerosos pro-

ABROTONUM *Fœmin.*

Fuch. Absinthium Ponticum, Dodonæi.



SEMEN *Sanctum, Matth.*



mit, crebris foliolis, minutum crenatis, incanis, tene-
riuscula lanugine vti gnaphalium ad summum vs-
que obsitis, vbi extrema capitula aureis floribus bul-
lata fulgent, semine paruo, copioso referta, similitu-
dine tanaceri, sed minore. Tota candida, sapore, &
odore illius quod Romanum & Ponticum falsò pu-
tatur absinthium Belgis, adeoque simillima abroto-
no fœminæ vulgari, vt haud facîle vtramuis ab al-
tera discernere liceat, nisi quòd hæc tota minor,
odoratior, candidior, & tomentosa, id quod alteri
deest, cui folia breuiora, sapor nò adeò ingratus, aut
vehemēs. Santolina est Dodonæo. Santonicum ma-
ius Cordo. Tempore degenerat: fragrantia, tomento
& candore exuitur in Angliæ & Belgij hortis. Ab-
sinthiū Galatium siue Sardonium, perperam Santo-
nicum vulgi, absinthio simile est, vt ait Dioscorides,
non tamen ita semine refertum, sed amarum. Offici-
nis absinthium Romanum falsò creditum est, quod
pro abrotono fœmina Fuchsius depinxit. Tota plā-
ta absinthio simpliciter dicto similis est, sed minor,
minusq; candida, seminibus non adeò multis, floscu-
lis exiguis. Nōnullis Germaniæ locis frequēs, in Flan-
driæ & Angliæ hortis copiosa, & vsu multo expeti-
ta, illic vocata *Roomsche Alfene*, id est, Romanum ab-

Cap. 2. hist.

sinthium, publica persuasione, quā secutus Mat-
thiolus in Hungaria Transyluania & Bohemia
à se repertum prædicat. His addit Pena semen
contra Officinarum, siue Semen sanctum, siue
Santolinum, Gallis *Barbotine*, Italis *Semenzina*,
horum trium absinthiorū nullum videri. Nam
tametsi nonnulla amaritudinis & figuræ simi-
litudinis illis insit, non tamen adeò plenè adulta
sunt horum semina, aut horridè amara. Id semē
est parui & peregrini fruticis, atque surculosi,
tām copiosum, vt foliorum numerum superet.
Hunc ex Matthiolo hic pictum damus. His ad-
demus ex Lobellio Absinthiū arborescens Ab-
sinthium *del Comasco* Anguillaræ, vulgari non
ita foliis & flore dissimile, sed fruticis arborei
habitu. Abrotoni modo ad hominis proce-
ritatem assurgit, candidiore & minore paulò
folio, semper virente, gustu amaro, aromatico,
odore non ingrato. Item Absinthium album,
rarius in Gallia, Italia, Anglia, Belgio à nullo
adhuc scriptore memoratum, vni Clusio co-
gnitum, & à Vienna Austriæ transmissum, folio
Chrysan

In aduers.

ABSINTHIUM Arborescens,
Lobellij.



ABSINTHIUM Album,
capitulis scabris, Lobellij.



Chrysanthemi diuisura, Artemisiæ marinæ concolori, in cauliculo dodrantali: flos albus Parthenij in vmbellis è senis foliolis. Gustu subadstringit, nonnihil amaricat.

Lib. purgā. Subiiciemus & Absinthium quod angustifoliū Dodonæus appellat. Ex absinthio & lauandula confusis miscellanea quædam stirps videtur, inquit. Cauliculi eius li-

ABSINTHIUM Angusti-
folium, Dodonæi.



Lib. 3. c. 23.

Temper.
& Vires

gnosi, teretes vt absinthij, flores similes, atque eodem quidem ordine, sed minores, folia verò oblonga, incana, qualia lauandulæ, odoris est haud ingrati Lauendulam obscure referens.

Plerique absinthium Santonicum esse volunt, alij Artemisiā marinam, vt proximo capite dicemus. Nunc absinthiorum vires expendendæ.

Absinthium, auctore Dioscoride, calfacit, adstringit, bilēque stomacho & ventri inhærentem expurgat, vrinas cit.

Crapulam præsumptū arcet. Inflationibus, ventrisq; ac stomachi doloribus cū fefeli & nardo Gallica prodest, fastidia discutit, morbo regio correptos dilutū aut decoctū eius per singulos dies cyathis tribus haustum sanat.

Mēses cum melle sumptum aut appositum euocat, strangulationibus fungorum ex aceto potū subuenit. Ixiæ, cicutæ, muris aranei moribus, & draconi marino cum vino aduersatur.

Anginis cū melle & nitro inungitur. Contra epinyctidas ex aqua, sugillata verò & oculorum caligines cum melle, similiter auribus ex quibus manat sanies, illinitur.

Decocti eius vapor suffitūsve dentium auriumve dolores lenit.

res lenit. Decoctum cum passo dolentibus oculis illinitur. Præcordiis, iocinori & stomacho dolenti, ac longo tempore affecto, cum cerato cyprino tritum illinitur. Stomacho autem cum rosaceo subactum. Cum ficis, nitro, & farina loliacea aquæ intercutem lienosisq; subuenit. Præterea vestiariis arcisq; inditum absinthium, vestes ab erodētium iniuria seruat. Culices cum oleo perunctum à corporibus abigit & arcet. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Par est etiam succum hæc omnia præstare, attamen in potionibus improbatur: stomacho enim obest, & capitis dolores adfert. Absinthium marinum grauitè olet, cum quadam calfactione adstringit, per se aut cum oryza tritum, & sumptum cum melle ascaridas & lumbricos rotundos necat, leniter aluum subducit. Potest cum sapa (alij edulio conuertunt) coctum eadem præstare. Pecora maximè pinguescunt hoc pabulo. Santonicum eadem quæ Seriphiū potest. De his fusiùs hæc & quædam alia tradit Plinius. Absinthij genera sunt plura. Santonicū appellatur à Galliæ ciuitate. Ponticum à Ponto, vbi pecora pinguescunt illo, & ob id sine felle reperiuntur, neque aliud præstantius, multoque Italico amarius, sed medulla pontici dulcis. De vsu eius conuenit dicere, herbæ facillimæ, atque inter paucas vtilissimæ, præterea sacris Romanis celebratæ peculiariter. Siquidem Latinarum feriis quadrigæ certant in capitolio, victorque absinthium bibit. Credo sanitatem præmio dari honorificè arbitratis maioribus. Stomachum corroborat, & ob id sapor eius in vina transfertur. Bibitur & decoctum aqua, ac postea nocte & die refrigeratum sub dio, decoctis sex drachmis foliorum cum ramis suis in cælestis aquæ sextariis tribus: oportet & salem addi. Vetustissimè in vsu est. Bibitur & madefacti dilutū: ita enim appellatur hoc genus. Diluti ratio, vt (quisquis fuerit modus aquæ) tegatur per triduum. Tritum rarò in vsu est, sicut & succus expressi. Exprimitur autem cum primū semen turgescit, madefactum aqua triduo recens, aut siccum septem diebus. Deinde coctum in æneo vase ad tertias x. heminis in aquæ sextariis xlv. iterumque percolatum lentè coquitur ad crassitudinem mellis, qualiter ex minore centaureo quaritur succus. Sed hic absinthij inutilis stomacho capitiq; est, cum sit ille decocti saluberrimus. Namque adstringit stomachum, bilēque detrahit, vrinam ciēt, aluum emollit, & in dolore sanat. Ventrīs animalia pellit, malaciam stomachi & inflationes discutit cum feseli & nardo gallico, exiguo aceto addito. Fastidia absterget, cōcoctiones adiuuat. Cruditates detrahit cum ruta, & pipere, & sale. Antiqui purgationis causā dabant cum marinæ aquæ veteris sextario, feminis sex drachmis, cum tribus salis, & mellis cyatho. Efficaciùs purgat duplicato sale. Diligenter autem teri debet propter difficultatem. Quidam & in polenta dedere supradictum pondus addito pulegio: alij contra paraly sin: alij pueris folia in fico, sic vt amaritudinem fallerēt. Thoracem purgat cum melle sumptum. In regio morbo crudum bibitur cum opio (lege apio) aut adianto. Aduersus inflationes calidum sorbetur ex aqua: iocinoris causā cum gallico nardo, lienis cum aceto, aut pulte, aut fico sumitur. Aduersatur fungis ex aceto, item visco, cicutæ ex vino, & muris aranei morsibus, draconi marino, scorpionibus. Oculorum claritati multum confert. Epiphoris cum passo imponitur: suffigillatis cum melle. Aures decoctum eius vaporis suffitu sanat: aut si manat sanies cum melle tritum. Vrinam ac menses ciēt tres quatuorve ramuli, cum gallici nardi radice vna, cyathis aquæ sex. Menses priuatim sumptū, & in vellere appositum. Anginis subuenit cum melle & nitro. Epinyctidas ex aqua sanat: vulnera recentia priusquàm aqua tangerentur, impositum: præterea capitis vlcera. Peculiariter ilibus imponitur cum cypria cera, (legendū, Cerato Cyprino,) aut cum fico. Sanat & pruritus. Non est dandum in febris. Nauseas maris arcet in nauigationibus potum: inguinum tumorem in ventrali habitum. Somnos allicit olfactum, aut inscio sub capite

pite positum. Vestibus insertum tineas arcet, culices ex oleo perunctis abigit, & fumo, si vratur. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas à musculis tuetur: capillum denigrat absinthij cinis vnguento rosaceo permixtus. Est & absinthium marinum quod quidam seriphium vocant, probatissimum in Taphosiri Aegypti. Huius ramum Isiaci præferre solenne habent angustius priore, minusque amarum, stomacho inimicum, aluum mollit, pellitque animalia interancorum. Bibitur cum oleo & sale, aut in farinæ trimestris sorbitione dilutum. Coquitur quantum manus capiat, in aquæ sextario ad dimidias. Hæc Plinius, qui quod

Lib. 9. hist.
Cap. 18.

pecora absinthio pinguescere dixit, ex Theophrasto sumpsit, cuius hæc sunt verba, ἐπει καὶ τὸ ἀψίνθιον καὶ μὴ ἐν ταῦθα πρόβατα οὐ φασί τινες νέμεσθαι, καὶ ὃ ἐν πόντῳ νέμεται, καὶ γίνεται πικρότερα καὶ χαλλίω, καὶ (ὡς δὲ ἡ τινες λέγουσιν) ἔκ' ἔχοντα χολήν. Id est, Gaza interprete. Nam & absinthium pecora huius tractus pascere quidam negant, pontica autem nimirum pascunt, ut pinguiora atque pulchriora reddantur, & ut quidam volunt, sine felle. Quæ si vera sunt, hæc verba ad finem capitis de absinthio marino, λιπαίνεται ὃ μάλιστα καὶ πρόβατα νεμόμενα, in Dioscoride accreuisse & redundare videntur, aut ad superius absinthium ponticum referenda esse. Id verò quod Plinius dixit ponticum absinthium esse Italico multò amarius, Matthiolus reprehendit, Pliniūque Galeni sententiæ refragari ait, quod ex attributis absinthio

Lib. 6. sim.

viribus à Galeno facilius diiudicabitur, de quibus ita scribit. Absinthium adstrictoriam & amaram, & acrem simul qualitatem possidet, excalfaciens pariter & extergens, & roborans & deficcans. Proinde biliosos ventris humores per egestionem infernè propellit, ac per vrinas euacuat. Magis autem quod in venis est biliosum per vrinas expurgat. Ob hæc contentam in ventre pituitam nihil adiuuat sumptum: sic nec si in thorace aut pulmone contineatur. Nam adstringens in eo facultas quàm amara valentior est. Porro quod insit quoque acrimonia, idcirco maiori portione calidum est quàm frigidum. At si opus est generatim comprehensam eius temperiem secundum primas qualitates circumscribere ac facultates (et si anomæ omnes dissimilareque sit) calidum ipsum dixerim primo excessu, siccum tertio. Succus eius longè quàm herba ipsa calidior est. Seriphium idem scribit non æquè ac absinthium adstringere, sed plus excalfacere, amaritudinemque quandam cum falsedine resipere: ideoque stomacho inimicum esse, magis quàm absinthium lumbricos necare, siue foris impositum, siue intrò in corpus assumptum. Et sanè calfacere ipsum in secundo ordine intenso censendum, exsiccare in tertio. Si

Lib. 8. sim.

Ponticum absinthium tantoperè à Galeno laudatum ad bilem, ex Theophrasto, & aliis medicis, id potentius præstat cæteris, potentiore igitur pollet ea facultate, cuius ope potentius cæteris agit, quæ sanè est amaror. Eius enim vis est aperire, abstergere, vrinas ciere, bilem purgare, quæ quotidianis & infinitis propemodum etiam vulgi nedum medicorum experimentis scimus præstare istud nostrum intus forisque admotum. Vina hodie factitia ex absinthio optima sunt, & idcirco multis in locis Germaniæ plusquàm satis expetita, non Pontico, sed Germanico imbuta, foetorem nullus inculcat: quin potius siccum vino inditum odore est aromatico, viribusque recreandis apto. Quare ubi Galenus vtendum Pontico dicit, potius duo videtur respuisse, seriphium & santonicum, quàm istud quod simplici & absoluto nomine vocarat absinthium. Si grauitè olebat Galeno in Græcia, non foetet Romanum seu vulgare in Italia, Germania, Gallia, & Anglia. Quin cætera potius à foetore & putredine tuetur. Nec huius foetoris Dioscorides meminit aut Plinius.

Pena in
Aduers.

Lib. 2. c. 2.

Absinthij vires & vsum perspicuè declarat Mesues. Absinthium, inquit, cum sit multiplex, Romanum eligimus, foliis albis, leuibus, & planis, non asperis, odore iucundo, absinthium marinum nihil imitante, lectum in terra libera, calidum ordine primo, siccum secundo, in quo etiam calet flos. Constat substantia duplici,

vna calida, amara, nitrosa, purgante, obstructa liberante, altera terrea, styptica, partes cogendo roborante, largiore, praesertim siccatum. Cum autem substantia eius calida sit superficialiaria, ubi sumptum est absinthium, ab ea prior fit actio: à terra styptica posterior, per quam comprimendo soluere nonnulli malè sunt opinati. Bilem enim flauam & aquas à ventriculo, intestinis, hepate, venis vacuat, etiam interdum per vrinas. Pituitam enim non vacuat, aut maximè paucam, licet phlegmago gum quoque esse Auenzoar censuerit. Absinthium à putredine vindicat, praecipuè potu quotidiano vnciae vnius vel duarum vini, aut aquae cui infusum vel incoctum fuerit, vel aquae ex eo sublimatae. Siccum idem pannis interpositum à tineis vindicat, & tutos reddit. Partibus attritis aut contusis praecipuè cum melle aut vino, & paucò cymino calfactum, & appositum mirè confert. Si vino, aut aqua, aut oleo, cui absinthium & radix cucumeris agrestis incocta fuerint, spongia mersa & expressa temporibus alligatur, hemicraniam sanat. Auris quoque suffita vino aut aqua cui incoctum fuerit absinthium, dolore, tinnitu, surditate liberatur. Acetum autem aut vinum cui incoctum sit absinthium cum cortice citri, oris foetorem à gingiuarum & dentium, vel materialium in ventriculo putredine emendat. Idem praestat aqua eius distillata. Succus absinthij cum nucleis persicorum, vermes aurium & aliarum partium enecat, & educit, maximè verò hoc electuarium interficit. Absinthij vnciae duae, euphorbij drachma vna & dimidia, cornu cerui vsti vncia dimidia, mellis quantum sufficit. Ex absinthio, fumaria, passis vis purgatis, myrobalanis citreis potio fit comoda contra pruritum & scabiem. Absinthium ventriculum & hepar roborat, appetentiam excitat, obstructions tollit, & inde natos affectus, ut icterum, hydropem: febribus putridis etiam diuturnis confert. Absinthium innocèter sumitur, succo tamen laedit ventriculum, ob nitrosum saporem. Quia autem imbecilliter soluit, rosae, fumaria, serum lactis, spica, vuae passae purgatae illi miscentur, ut melius & tutius purget.

ARTEMISIA.

CAP. XXXIII.

ARTEMISIA Græcis, Artemisia Latinis & Italis, Gallis *Armoise*, & *Nomina*
L'herbe S. Iean, Germanis *Berfusz* & *S. Iohans Gurtel*, Officinæ veterum
 appellationem retinent. Nomen herbae inditum putant ab Artemi-
 sia vxore Mausoli Regis, quæ sibi hanc herbam adoptauit, cum ante
 Parthenis, id est, Virginalis, quod virgo Dea illi nomē dederit, vocaretur. Non de-
 sunt qui ab Artemide cognominatam arbitrentur, quod priuatim foeminarum ma-
 lis, quibus ἄρτεμις, hoc est, Diana praest, medeatur. Artemisiae tres sunt Dioscoridi *Lib. 3. c. no.*
 species. Vna latioribus foliis ramisque, altera tenuioribus, tertia ex quorundam sen- *Genera.*
 tentia λεπιδόφυλλος, seu λεπιδόφυλλος, quam & μονόκλωνον vocant, quod ex eius radice
 caulis vnicus assurgat. Artemisia prima herba est fruticosa, absinthio similis, maio- *Forma.*
 ra & pinguiora folia habens. Et huius quidē alia est latior speciosiorq; latiora ha-
 bens folia & virgas, alia tenuior, quæ flores paruos, tenues, albos habet, & grauer
 olet. Quidam, inquit Dioscorides, in mediterraneis nascētem tenui furculo herbā,
 caule simplici, admodum paruum, flore refertam, colore flauo, appellant artemisiā
 monoclonon, id est, vnicaulem. Est hæc iucundioris odoris quam praecedens. Pli- *Lib. 25. c. 17.*
 nius vti de inuentoribus herbarum agit, Mulieres quoque, inquit, hanc gloriam
 affectauēre, in quibus Artemisia vxor Mausoli, adoptata herba, quæ antea Parthe-
 nis vocabatur. Sunt qui ab Artemide Illithyia cognominatam putent: quoniam
 priuatim medeatur foeminarum malis. Est autem absinthij modo fruticosa, maio-
 ribus foliis, pinguibusque. Ipsius duo genera. Altera latioribus foliis, altera tenera,
 tenuioribus, & non nisi in maritimis nascens. Sunt qui in mediterraneis eodem
 nomine appellent, simplici caule, minimis foliis, floris copiosi, erumpentis cum

*ARTEMISIA, Prima
vulgaris.*

Lib. 6. sim.

In Aduers.




in Libro de iis quæ in Asperis, &c. cui Leptophyllon aliam montanam adiiciunt, quæ in montibus nascitur, radice lignosa; nigra, principio recta & simplici, deinde in tenues fibras se dirimēte, caulibus multis, infernè rubētibus, angulosis, pedalis, folio artemisiæ minore, vndique fimbriato. Tertia artemisia Dioscoridis leptophyllos, Pena.

*ARTEMISIA, Leptophyllos
montana.**ARTEMISIA Tertia
Leptophyllos, Pena.*

phyllos

ARTEMISIA Monoclonos, alia.

nuto, copioso. Est alia quibusdā Artemisia Monoclonos, aliis Ambrosia, quæ folia habet Artemisiæ vulgaris & habitioris similia, sed longiora profundius incisa, & magis acuminata. Tota ubiq; seminibus scatet. Est & Artemisia marina à Lobellio

ARTEMISIA Monoclonos quorundam, aliis Ambrosia.

phyllos seu monoclinos, Penæ videtur esse herbula sesquipalmum cubitumq; alta, foliis minutis, abrotoni maris, similiter incis, paruis, ex atro virentibus in ramulis lignosis, floribus semineq; quā plurimo refertis, paruis, & ex viridi luteolis, flarescētibus. Prope culta & oliucta Mōspelij, aliisq; compluribus Narbonæ locis multa & nota, sed vulgò quodpiā abrotoni genus credita. Hæc est, inquit ille, quam Dioscorides de quorundam sententia inter artemisias recenset, cui odor non abrotoni aut absinthij, sed artemisiæ prioris est, & prorsus eadē videtur quæ leptophyllos, idest, tenuifolia: seu leptocarphos proximè sequēti capite indicatur, quod in vetustissimis Latinorum Græcorumque codicibus desideratur, accreuitq; Dioscoridi inutiliter. Sunt tamen qui monoclonon aliam exhibent, quæ in maritimis Adriatici æquoris spontè crescit, in hortos verò translata fœliciter crevit, radice breui, tenui, modicè fibrata, caule singulari, pedali, rotundo, furculoso, foliis artemisiæ vulgaris, nigrioribus, subhirsutis, flore pallecente, in summo caule copioso, velut racematim congesto, prominentibus tuberculis extante, semine mi-

Cap. III.
lib. 3.

ARTEMISIA Marina, Lobellij.

depicta, quæ frequens in maritimis reperitur, sarmētis multis fruticat ab vna radice lignosa, fibrata surrectis, alternis interuallis, cinericio colore, muscosoque semine, simili Absinthio communi quàm Artemisiæ: flores lutei sunt & numerosi, folia ima & ferè humi strata, paucioribus sed maioribus incisuris. Media verò aut superna, angustiora, minora, interdū vna aut altera incisura portulacæ marinæ aut fœniculo marino haud absimilia, carnosæ, candicantiæ, vti vniuersa planta, quæ gratum odorem emittit, Abrotoni maris ferè sapor subsalsus, parum amarus, cuiusmodi Artemisiæ leptophylli. Hanc superiore capite pictam dedimus nomine Absinthij angustifolij Dodon. nomine, sed in ea manifestas incisuras pictor omisit. Artemisia, auctore Dioscoride, calfacit, extenuat, feruefacta prodest ad muliebres infessus, educēdos menses, secundas & fœtus. Vteri præclusionem atque inflammationem iuuat: lapides frangit, & vrinæ suppressionem tollit. Herba ipsa imo ventri illita copiosa, menses mouet. Succus eius cum myrrha subactus & admotus ex vtero elicit quæcunq; & infessio. Bibitur etiam coma trium drachmarum pondere, eorundem ducendorum gratia. Plinius vsum eiusdē medicum sic tradit. Artemisia vuluæ medetur trita ex oleo irino aut fico, aut cum myrrha apposita. Eiusdem radix pota in tantum purgat, vt partus enectos extrahat. Menses & secundas ciet ramorum decoctum infidentibus: item folia pota drachma. Ad eadem omnia prosunt vel imposita ventri imo cum farina hordeacea. Et alibi Artemisia quoq; datur contra calculos ex vino dulci, & ad stranguriam. Artemisia vtrāq; excalfacit, inquit Galenus, & modicè desiccatur, & sunt, quod ad calfactionem attinet, excessus secundi, quod verò ad resiccationē, aut primi intēsi, aut secundi remissi. Sunt autē & modicè tenuium partium. Itaque ad renum calculos mediocriter commodæ sunt, & ad fœtus vteri.

BOTRYS.

CAP. XXXIIII.

Nomina



ΟΤΡΥΣ. Græcis, Botrys Latinis nuncupatur, Officinis incognita, Gallis *Pymet*, Germanis *Trubenkraut*, id est, herba racemi. Botrys verò dicta est à semine, quod racematim ramulis adnascitur. Hanc Cappadoces Ambrosiam, alij artemisiam vocant, auctore Dioscoride, qui &

Lib. 3. c. 113.

Forma.

BOTRYS.

Locus.

Tempus.



hanc sic delineauit. Herba est tota lutea, fruticosa, sparsa, multaq; alarum caua habens, semē totis ramulis adnascitur, folia cichorio similia habet: tota valde odorata est, ideoq; vestibis interponitur. Nascitur circa profluētes aquas & torrentes. Plinius ita planè describit, vt ex Dioscoride trāscripsisse videatur. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis, semē circa totos nascitur: folia cichorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur orthopnoicis. Hæc Cappadoces ambrosiam, alij artemisiam vocāt. Hæc Plinius. In oliuetis Nemaufensib⁹, cæterisq; tepidiorib⁹ & apricis aruis agri Narbonēsis & Nitiobrigū sponte fruticat, Flandris, Germanis, & Anglis in hortis. Augusto & Septēbri mēse maximè ad maturitatem peruenit, quibus etiam mensibus, vt Ruellius annotauit, venalis herba per Parisiē sium urbem defertur, Parisiensibus matronis quàm Officinis & herbariis notior. Hanc enim odoris gratia vestimentis, pannis, ac linteis curiosè interponunt, vt odoris suauitatem cōtrahant. Botrys, inquit Dioscorides, cum vino orthopnceas

thopnceas mulcet. Ea, auctore Matthiolo, excalfacit, attenuat, incidit, expurgat, & aperit. Valet ad omnes pectoris & thoracis affectus pituitosos, & suppuratos adiuuat. Præterea asthmaticos & suspiriosos, tum herba ipsa ex decocto dulcis radicis pota, tum ipsius herbe tantum decoctum, multis diebus haustum, addito violaceo melle, aut saccharo. Purulenta expuentibus mirificè auxiliari idem affirmat. Herba ipsa recens facit ad vteri dolores, si in tegula vino Cretico irrorata calfiat, & ventri imponatur. Ideò cum parthenio & anthemidis floribus, puerperarum cruciatibus succurrit, vbi simul omnia concisa in oleo liliorum in patella parumper frignantur, deinde ouis gallinaceis excipiantur, simul misceantur, coquantur in placentæ formam, & calida ventri superponantur. Est enim hoc præsentaneum remedium. Suffiuntur eiusdem herbe vapore vtiliter fœminæ ad menses ciendos, & emortuos fœtus eiiciendos.

MATRICARIA. CAP. XXXV.

HERBARIORVM vulgò matricaria herba dicitur, Gallis *Espargoutte*, *Nomina*
Matricaire, Italis *Matricaria* & *Amarella* ab amaro sapore, Germanis
Muotterkraut, & *Meltram*. Dicta autè est matricaria, quod vteri, quem
matricem vocant, morbis medeatur. Quam verò apud veteres Græcos
planta sit, quæ huic prorsus quadret, magna est inter rei herbariæ peritos con-
tentio. Ruellius, Matthiolus, Dodonæus Partheniū Dioscoridis esse censent, eosque
hallucinari, qui cotulam fœtidam vulgò dictam parthenium esse putant. Fuchsius
secundam artemisiæ speciem λεπτόφυλλον nominatam, matricariam facit, parthe-
nium verò cotulam fœtidam, quæ lis ex Dioscoridis descriptione, & viribus par-
thenio attributis dirimenda est. Sed prius scire licet nomen hoc parthenium ho-
monymum esse, sicuti etiam tradidit Galenus in Glossematis Hippocratis, quo au-
ctore parthenium vocatur anthemis, helxine, linozostis, & amaracum, quod con-
firmat Plinius, Helxinen, inquit, alij perdicium vocant, nonnulli parthenium. Et,
Linozostis siue parthenium mercurij inuentum est. De parthenio planta alia in-
telligere etiam videtur, cum scripsit. Mulieres quoque hanc gloriam affectauere. In
quibus Artemisia vxor Mausoli, adoptata herba, quæ antea parthenis dicebatur.
De parthenio autem Dioscoridis videtur hæc intellexisse. Parthenium, alij leucan-
themum, alij tamnacum vocant. Celsus apud nos perdicium, & muraliū. Nascitur
in hortorum sepibus, flore albo, odore mali, sapore amaro, &c. Quo loco pro tam-
nacum, legendum ex Dioscoride & Galeno amaracum, & odore malo, non odore
mali, non nihil viroso: Dioscoridi. Verum hîc Plinius duas herbas in vnam confu-
dit. Nam muralium & perdicium à Celso dictum, est quidè parthenium à Græcis
appellatum, sed non hoc de quo hîc Plinius agere voluit ex Dioscoridis sententia,
& cuius historiam accuratiùs expendemus. Parthenium, inquit, alij amaracum, alij
leucanthemum vocant: folia habet coriandro similia, tenuia, flores per ambitum
albos, in medio luteos, odore non nihil viroso, sapore amaricante. Vtri hæc magis
cōpetunt: an matricariæ, an cotulæ fœtidæ? Matricariæ folia coriandro similia non
sunt, & λεπτέ, id est, tenuia: sunt enim coriandro maiora, nedum tenuiora, artemi-
siæ: & absinthio propiora, pariaq; reliquæ partes, similes, demptis floribus, qui sunt
anthemidis. At cotulæ fœtidæ & coriandri adulti in ramis media & summa folia
contemplare, & fatebere collationem benè congruentem: imò omnia coriandri
sunt: folia consimili diuisura, rami, situs, tenuitas, figura, præterquàm ima per pauca
folia, quæ latiora sunt, apij, aut cenanthes, eoq; scitè admodum λεπτέ addidit, nimi-
rum vt collationē non ad ima, sed ad media pluraq; folia faciendam innuerit. Præ-
terea si gustum consulas, cotulam senties amarore inamœno esse, & perquàm ingra-
to vt parthenium. Verum hîc nulla exuperantiæ adiectione, fœtidam non nihil vi-

Nomina

Lib. 3. c. 69.
In cap. 138.
lib. 3.
Lib. 1. c. 11.
Cap. 13. hi.
Cap. 221.

Lib. 22. c. 17

Lib. 25. c. 5.
Cap. 7. 25.

Cap. 30. 21.

Lib. 3. c. 138.
Forma.

Pena in
Aduers.

rosam, & amaricantem dixit, id est, *ωικρίζον*, quo indicat non excellere amarore, sed quo anthemis leucanthemos, sapore amaricante esse, cui etiam quia simile erat parthenium, seu cotula, idē nomen factum leucanthemi. Iam verò si facultates & vsum medicum respicias, non inficiaberis parthenium esse cotulam foetidam. Partheniū

MATRICARIA Par-
thenium, Matth.




PARTHENIVM *Σμικρό-φυλλον*, Myconi.

Forma.

Locus.

Tempus.



Lib. quæ in
vibr.
Cap. 71.

enim auctore Dioscoride, siccatum, cum aceto mulso aut sale potum, velut epithymum, atram bilē & pituitam deorsum ducit: anhelosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore calculosis & anhelosis vtiliter bibenda exhibetur. Valet decoctum eius in vtero indurato & inflammato ad infessus. Imponitur etiam erysipelatis & inflammationibus cum floribus. Sic doctorum medicorum experientia comprobatum est cotulam foetidam decoctis additā, serosos, adustos, falsos, melancholicosq; elephantiaeseos, & mali mortui humores, per inferiora educere: succum etiam purgare aliquantum per se iusculis inditum, magnoperè in syrupo laudari, quia thoracis & pulmonis farctus expedit: vrinam euidenter is ciet, tumores emollit, digerendi vi paulò quàm chamæmelū validiore. Matricaria nulla prorsus ad huiusmodi humores purgandos, sed vt artemisiæ ad menses ciendos duntaxat vis inest, ad quos non parthenium cōmendat Dioscorides, sed tantum ad vteri duritiē, & phlegmonas. Ex quibus perspicuum est parthenium Dioscoridis multò magis cotulæ foetidæ quàm matricariæ herbariorum competere: nisi dicas eam ob odorem vsumq; quibus virgineis matricis morbis opitulatur, parthenium etiam dici posse. Est autē matricaria fruticosa herba, foliis artemisiæ aut absinthij Romani, caulibus bipedalibus aut tripedalibus, in quibus flores copiosi, in ambitu albi, in medio lutei, chamæmeli, grauitè cū vniuersa herba olentes, amari, odore cotulæ, semen chamæmeli, radix lignosa, fibrosior. Fruticat in siccis passim, viarum & hortorum marginibus ac squallidis. Iunio & Iulio flores edit. Matricaria in vino cocta, & vmbilico imposita mulieribus ab vtero præfocatis multum confert. Non desunt qui cotulam foetidam non parthenium Dioscoridis, sed parthenium *σμικρόφυλλον* Hipocratis esse velint, vt alibi diximus. At Myconus egregius medicus Barcinonensis aliud parthenium *σμικρόφυλλον* esse suspicatur, quod ex Hispania missum, & hîc depictum doctis proponitur, vt de eo iudicent. Prouenit, inquit Myconus, frigidis in locis, & sitientibus, montosisq; sed imis. Herba est surculosa, sesquipalmi altitudine, radice parua,

parua, lignosa, candida, parum fibrata, ex qua cauliculi aliquot exurgunt rotundi, aliquantum rufescentes, in quibus ima praesertim, & terrae vicina parte folia sunt tenuia, foeniculacea, foliis abrotoni maris similia, ut omnino magis simile non sit. In summis cauliculis umbellae, & in iis flosculi multi, albi, compacti, quales in vulgari millefolio cernuntur, ut insipientes prima fronte facile deludant, millefolium esse iudicatu- ros. Plantae sapor amarus est, & odor grauis, similis vulgari parthenio quod matricariam vocant. Quare congeneres esse plantas Myconus putat. Sed quia huius folia parua sunt cum vulgaris parthenij, id est, matricariae foliis comparata, existimat si veteribus nota haec planta fuerit, parthenium esse *σμηρόφυλλον*, cuius meminit Hippocrates his verbis. Herba est paruis foliis praedita, cui nomen est parthenium *σμηρόφυλλον*. Haec verrucas de pudendo tollit. Quanquam id non asserit Myconus, sed doctis aestimandum relinquit. Quis enim sit eius usus, & quo nomine ab incolis nuncupetur, nondum scire potuit.

Li. devuln.

TANACETVM.

CAP. XXXVI.



FEFICINIS Tanacetum & Athanasia nominatur, Gallis *Tanaïsse* & *Athanasie*, Germanis *Reinsarn*. Fuchsius tertiam Artemisiae speciem facit, quae Monoclonos dicitur, ab Apuleio Artemisia Tragates, aut Tagetes, Tanacetumque corrupto nomine pro Tagetem nominari scripsit, & à Germanis *Reinsarn*, quod filicis ferè speciem referat, alio nomine *Vurnikraut*, quoniam lumbricos ventre pellat. Athanasia ex radice lignosa, gracili, reptante, fibrosa, caules emittit cubitales & sesquicubitales, fuscus, rotundos, striatos, geniculatos, per summa alis diuissos: in quibus folia sunt longa, quae multis fo-

Nomina

ATHANASIA, seu
Tanacetum. Matth.



liolis constant, ex aduerso sitis, & pinnarum instar expansis, incisis. In summitate cauliculorum umbellae insident, & in iis flores bullati, aurei, semenque seriphij absinthij, aut abrotoni foeminae, gustu subacre, & amaricæ, cum graueolentia. Nascitur secus vias, sepes, & margines fossarumque agrorum. Plantam etiam hic appictam Tanacetum Alpinum vocant Herbarij, Rhœti Iuâ Muscatâ, quidam Anthemidem Alpinam. Crescit in altissimis & niuosis Alpium Rhœticarum iugis, radice breui, supernè crassiuscula, in acutum desinente, fibris quibusdam exilibus capillata: foliis densis, humi iacentibus, odore, forma, sapore Tanaceto non dissimilibus, suauius olentibus, in caule paucis: flore anthemidis, intus melino, per ambitum candido. Magno in pretio est apud Rhœtos Insubriae vicinos, & ad varias aegritudines commendatur, odoris suauitate insignem quandam vim certè promittens. Est & Tanacetum aliud quod lanuginosum vocant, in saxosis & apricis propè Monspelium locis, radice crassa, ramosa, nigricante: foliis propè radicem multis, coaceruatis, Tanaceto vel potius Stratiotæ similibus, tam densa lanugine opertis, ut vix foliorum delineatio conspicitur, odoratis: caulibus multis, aliquot foliis vestitis, inaequaliter per interval- la prodeuntibus: flore aureo in corymbis nitente, summo caulium fastigio incum-

Locus.

tius Stratiotæ similibus, tam densa lanugine opertis, ut vix foliorum delineatio conspicitur, odoratis: caulibus multis, aliquot foliis vestitis, inaequaliter per interval- la prodeuntibus: flore aureo in corymbis nitente, summo caulium fastigio incum-



TANACETVM *Minus,*
candidis floribus, Lobelij.



TANACETVM *Cristatum*
Anglicum, Lobelij.



bentibus. Athanasiam calidam esse secundo ordine, siccam tertio colligunt herbarij, ex odoris eius acrimonia, & amarore. Vtuntur ea recentiores ad ventriculi & alui flatus discutiendos, item semine præsertim ad vermes necandos, & ex ventre pellendos. Vtuntur & ad frangendos renum calculos, & aduersus stranguriam, sed eam viris tantum, sicut matricariam mulieribus commodam aiunt. Speciosus Tanacetum

Tanacetum cristatum Anglicū pingendū curauit Lobellius, quod in Angliæ hortis in delitiis habetur, multò argutioribus fimbriis, minutioribus, & latioribus foliis. Ostendit & aliud Tanacetum minùs candidis floribus. Media planta est, inquit, inter Millefolium, Sideritidem Achilleam & Tanacetum. Etenim folia Tanaceto proxima odore & figura: cauliculi numerosi: radix fibrata Sideritidis. Flosculi verò candidi in vmbellis Millefolij vulgaris. Belgio hortensis est.

MELISSOPHYLLVM.

CAP. XXXVII.

MΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ Græcis, & μελίφυλλον, & μελιζαίνα, Latinis *Nomina* Apiastrum & citrigo, Officinis Melissa, Arabibus *Bederangie*, *Bederingi*, *Bederenzegum*, *Turingens* siue *Trungiam*, & *Marmacor*, Italis *Melissa*, Hispanis *Torongil*, & *Hierua Cidreira*, Gallis *Melisse*. Melyssophyllum dictū est, quia apes hac herba delectantur: neq; enim aliud quā apū foliū significat. Meliphyllum verò, qua voce Nicander vsus est, mellis folium indicat, q̄ hinc apes mellis materiam colligunt. Pari ratione Latini Apiastrum haud dubiè dixerunt, quod hæc herba apibus gratissima sit. Citraginem autē ab odore citrij, quod si nares consulas, citrium malum oleat, & cordi profit. Plinius Melissophyllum apiastrum vocari scribit ab Hygino. Ipse rursus Melissophyllum apiastrū appellat. Idem tamen inter ea quæ apibus gratissima sunt, seorsum Melissophyllū, seorsum apiastrum recenset. Varro autem apertè dicit & cytiso obseuisse & apiastro, quod alij Meliphyllum, alij Melissophyllum, quidam melinon vocant. Apiastrum folia & caules habet ballotæ similes, maiores tamen, tenuiores, non ita hirsutos, citrium malum olentes. Hac breui delineatione herbam Melissæ nomine etiam mulierculis notam, & in hortis frequentissimam Melissophyllum esse credunt permulti: tamen cū nonnullis locis lecta quiddā pectoris aut cimicū sui odoris gratiæ ascitum habeat, idcirco dubitatum est à multis verane esset, an alius speciei nostras hæc, quæ nulli regioni in hortis deest. Quod fortasse Fuchsiū impulit,

Li. 20. ca. 11.
Lib. 21. c. 9.

Li. 21. ca. 12.
Lib. 3. c. 16.

Forma.

Pena id
Ad.

Cap. 18. 9.
hist.

MELISSOPHYLLVM,
Matthioli.



vt Melissæ duò genera faceret, vnū verū: alterum adulterinum, quod Germani *Vuauntzenkraut* nominant, quia cimices olere videtur, quæ nostras est Melissa passim in hortis proueniens, & qua perperam hodie Officinas pro vera vti censet. Contra illius quam pro vera habet, & cuius picturam hîc quoque damus, tam gratum odorem esse, vt in ædibus strata eas gratissimo odore compleat. Fuchsiū secutus est Dodonæus. Sed his respondet Pena, Melissam nostratem in quibusdam Italicis & Pedemontanis hortis meram suam sibi habere gratiam, basilici, aut citrij, eximeréque quemlibet de odore scrupulum, nulliq; nō cognitum esse debere, foliis menthæ aut ballotæ, aut Cartariæ, rugosis, asperis, sed viridantibus, ramulis quadratis marrubij, edentibus orbiculatim flores albidos copiosos, in verticillis, ballotæ aut cardiacæ modo. Altera illa Fuchsi & Dodonæi Melissa est Calamintha montana præstantior Penæ & Lobellij, multò accuratius depicta, & fusiùs explicata, capite de Calamintha. Folia Melissæ cū vino pota aut illita, vt scribit

Li. 2. ca. 70.

Dioscorides

*MELISSOPHYLLVM,**Fuchf. & Dodon.*Lib. 3. c. 101.
*Vires &
Temper.*

Li. 21. c. 20.



Li. 20. ca. 11.

Li. 7. simpl.

Li. de med.
cord.

Dioscorides, contra scorpionum phalangiorū canumq; morsus profunt. Decoctū eorūdem, si eo perfundantur, idem potest. In infestationibus ad ducendos menses vtile est. Dentes eodē in dolore colluuntur. Dysentericis iniectum prodest: fungorum stragulationibus folia cum nitro pota succurrunt. Torminibus auxiliatur. Dantur in eclegmate orthopnoicis. Illita cum sale strumas discutiunt. Vlcera purgant. Articularios dolores illita mitigāt. Vsum eiusdem sic tradit Plinius. Melissophyllo siue melitana si perungantur aluearia non fugient apes: nullo enim magis gaudent flore. Copia istius examina facile cōtinentur. Idem præsentiissimum est contra ictus earum, vesparumq;, & araneorum, item scorpionum. Item contra vuluarum strangulationes addito nitro. Contra tormina è vino. Folia eius strumis illinuntur, & sedis vitiis cum sale decocta. Succus fœminas purgat, & inflationes discutit, & vlcera sanat. Articularios morbos sedat, canisq; morsus. Prodest dysentericis veteribus, & cœliacis, & orthopnoicis, lienibus, vlceribus thoracis. Caligines oculorum succo cum melle inungi eximium habetur. Plinius alibi. Apiastrū Hyginus quidem Melissophyllum appellat: sed confessā damnatione est venenatum in Sardinia, quo loco Plinius Apiastrum, non Melissophyllum ab apibus, sed Batrachium Sardonium, à similitudine foliorum Apij sic dictum significat: quam rectē, viderint perspicaciores. Melissophyllum marrubio facultate simile esse scribit Galenus, sed plurimū ab eo vinci: quamobrem nec eo vti quemquam. Superuacuum enim foret præsente marrubio, cuius tantus est vbique terrarum prouentus, velle vti Melissophyllo. Cæterū si cui forte ad manū marrubium nō fuerit, illo licebit vti ad eadem, modo quantum ab hoc superetur cognitū habuerit. Sed Melissæ alias facultates, easq; excellentiores tribuunt Mauritanii. Scribit enim Serapio Melissophylli proprium esse animum hilarem reddere, humenti ac frigido ventriculo auxiliari, concoctionem adiuuare, cerebri obstructions referare, deficientem animum reuocare, cordis imbecillitatem roborare, eamq; præsertim qua somnus frequentius noctu intercipi solet: quin & eius tremorē reprimere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ tum ab atra bile, tum ab exusta pituita gignuntur. Quibus assentitur. Auicenna scribens Melissophyllū exalfacere siccareq; ordine secundo, exhilarare, vitalesq; facultates roborare odoris fragrantia, saporis austeritate, partiumq; tenuitate. Quibus facultatibus cæteris etiam visceribus competere. Vires deiectorias habere, nec adeò imbecilles, quin atrabiliarios vapores à spiritibus & à sanguine, qui cordi & arteriis inest, educere queat, quod in cæteris corporis partibus, ac etiam in toto corpore efficere nequit. Mulierculæ, inquit Pena, teneros turiones tusos excipiunt ouis saccharo & rosacea, placentulasq; pinunt parturientibus, puerperis, & enixis, quibus vires impendio deiectæ fuerint, ac secundæ non probèeductæ. Stillatitiæ ad cardiacas confectioes multus vsus. Hic non omittendæ duæ venustæ plantæ, quarum vna Melissophyllum Turcicum, & Melissa Turcica, à Matthiolo Melissophyllum Constantinopolitanum dicitur, ab aliis Moluca læuis. Caules multos edit cubitales, circa

MOLVCA, Sive Melissa
Turcica, Dalechamp.

circa quos folia multa, in ambitu profundis incisuris crenata, supra quæ flores orbiculatim ex amplis & patentibus acetabulis exeunt, colore candidulo, lamij floribus similes, attamen paulò minores. Altera Moluca spinosa dicitur, à Turcis *Maseluc*, quæ caules similiter multos & cubitales profert, striatos, quadrangulares: folia vti prioris: flores similes ex acetabulis quoque, sed angustioribus, oblongioribusq; & eminentes duras, & acriter pungentes spinas in ambitu habentibus. A Moluccis Orientis insulis vtraque nomen habet, in quibus primū repertæ creduntur. Clusius Molucam spinosam pro Galeni Alyssō pinxisse videtur, eiusq; delineationē asserit alyssō adamussim sic quadrare, vt quin illud ipsum sit, nullus iam sit dubitationi locus. Sic igitur Alysson Galenus describit. Alysson herba est marrubio similis, asperior tamen, & magis aculeata circa orbiculos: florem ad caruleum vergentem profert. Clusius verò sic. Herba est pedali altitudine, caule quadrangulo, statim à radice in multos ramos diuisa, omnino candidos, & veluti to-

Li. 2. stirp.
Hispa. c. 51.

Li. 2. Anti.

mento obductos, circa quos per singulagenicula, bina folia inter se opposita semper enascuntur, marrubio similia, breuiora tamē & crispiora, magisq; incana, inodora & amara: caliculi per interualla verticillatim ramos ambiunt, quinque ple-

MELISSOPHYLLVM
Constantinopolitanum, Matth.*MOLVCA Spinosa,*
Dodon.

rumq;

MELISSA Moldauica,
Matthioli.

MELISSA Turcica
Alia Dalechamp.



rumq; aculeis horridi, candidi, è quibus marrubij flos exilit, sed colore ex cæruleo purpurascente: semen in aculeatis cauliculis subrufum, marrubio simile continetur: radix dura, lignosa, multifida. Primo intuitu marrubium esse diceret, nisi aculeati caliculi & flos ipse Alysson Galeni exprimerent. Vno duntaxat loco per Hispanias plantam hanc se vidisse ait Clusius, ad Elda videlicet pagum in cœmeterio, Valentino regno, florentem & semine prægnantem mense Martio. Matthioli in postrema commentariorum in Dioscoridem editione Melissophyllū aliud proponit odore Citrei mali perquàm iucundo, quod iisdem viribus pollet quibus vulgare nostrum Melissophyllum. Eius effigiem hîc expressimus.

MARRUBIVM.

CAP. XXXVIII.

Nomina

Fol. 222.

Li. 20. c. 22.

Genera.

Lib. 6. hist.

ca. 2.



Vo d Latini Marrubium vocant, Græci πράσιον, Officinæ quoque Prasium, Galli Marrube & Marrubin, Itali Marrobio, Germani Uveisz Andorn. Videtur autem, inquit Pena, Prasinus viror, aut certè virosus odor appellationem dedisse Marrubio, tam nigro foetido quod ballote dicitur quàm albo odoro. Plinius frequenter errat, cum multis locis vertit ἀνιτὸ πρᾶσις, τὰ τῶ πρᾶσις folia, idest, pro prasij, porri folia. Idem duo Marrubij genera tradit ex Castore, nigrum, & quod magis probat, candidum. Totidē sunt Theophrasto. δύο δὲ γένη καὶ τῶ πρᾶσις. τὸ μὲν ῥῆχρ ποῶδες τὸ φύλλον, καὶ μᾶλλον ἐπικεχαργμύον, ἔτι δὲ καὶ ἐντομαὶς ἐνδήλως σφόδρα, καὶ βαθείας. ὧ καὶ οἱ φαρμακοπῶλαι χεῶν) πρὸς ἔνια: τὸ δὲ ἕτερον τρογυλώτερον, καὶ αὐχμῶδες σφόδρα, καθαίπερ τῶ σφακέλι, καὶ τὰς ἐντομαὶς ἀμυρολέρας ἔχον, καὶ ἐπικεχαργμύον ἡττον. Idest, Sunt & Marrubij duo genera. Vnū folio herbaceo, magis serrato, incisurisq; profundioribus, & proinde conspectioribus: quo pharmacopolæ ad nonnulla vtuntur: alterum rotundius, & valde squallidum, vt sphaceli, incisurasq; obscuriores habens, & minùs ferratum. Quibus verbis Theophrastus prius Marrubij genus id intelligit, quo de hîc agimus. Alterum Dioscoridis Balloten, hoc ab illo discrepantem, quod plusculum ad viro

ad virorem fuscum porraceum vergit, vnde Marrubium nigrum vocatur, & odorem graue fœtoremq; vibrat. De hoc tractauimus in libro, Quæ in Vmbrosis, &c. Marrubium quidẽ ex historia Dioscoridis, frutex est ab vna radice ramosus, subhirsutus, albicans, virgis quadrangulis, folium pollicis æquale, subrotundum, hirsutum, rugosum, gustu amarum: semen per interualla in caulibus: flores asperi, verticillorum figura. Quæ delineatio adamussim Marrubio nostro respõdet. Nascitur circa domicilia collapsa, & inter rudera. Colligitur herba æstate, Iulio potissimum mense, cum semine prægnas est. Huius folia arida cum semine decocta in aqua, aut viridium succus expressus datur cum melle asthmaticis, tussientibus & tabidis.

Li. 3. ca. 102.

Forma.

Locus.

Tempus.

Vires.

Temper.

MARRUBIVM Album.



Crassa è thorace, cum iride sicca, ducunt. Datur mulieribus quæ nõ purgantur, vt menstrua & secundas pellant: item difficilè parientibus, & iis qui à serpentibus morfi sunt, & qui letale quid biberunt. Vesicæ tamen & renibus nocent. Folia cum melle illita sordida vlcera purgant, pterygia nomasq; cohibent: dolores laterum mitigant. Ad eadem pollet ex foliis contusis succus, & sole coctus. Cum vino & melle illitus oculorum claritatem exacuit. Morbum regium per nares expurgat. Aurium doloribus per se aut cū rosaceo instillatus prodest. Hæc & plura alia quàm Dioscorides, Plinius tradidit. Marrubium pleriq; inter primas herbas commendauere, quod Græci prasion vocant, alij linostrophon, nonnulli philopæda, aut philochares, notius quàm vt indicandum sit. Huius folia semenq; contrita profunt contra serpentes, pectoris & laterum dolores, tussim veterem. Et iis qui sanguinem reiecerunt eximiè vtile, scopis eius cum panico aqua decoctis, vt asperitas succi mitigetur. Imponitur strumis cum adipe. Sunt qui viridis semen

Li. 20. c. 23.

quantum duobus digitis capiant, cū farris pugillo decoctum, addito exiguo olei & salis, sorbere ieiunos ad tussim iubent. Alij nihil comparant in eadem causa Marrubij & fœniculi succis, ad sextarios ternos expressis, decoctisq; ad sextarios duos, cum addito mellis sextario, rursus decocto ad sextarios duos, si cochlearis mensura in die sorbeatur in aquæ cyatho. Et virilium vitiis tussim cū melle mirè prodest. Lichenas purgat ex aceto. Ruptis, cõuulsis, spasticis, neruis salutare. Potũ aluum soluit cum sale & aceto. Item menstrua & secundas mulierum. Arida farina cum melle ad tussim siccam efficacissima est. Item ad gangrænas, & pterygia. Succus verò auriculis & naribus, & morbo regio, minuendaq; bili cum melle prodest. Item contra venena inter pauca potens. Ipsa herba stomachum & excreationes pectoris purgat. Cum iride & melle vrinam ciet. Cauenda tamen exulcerata vesicæ, & renum vitiis. Dicitur succus claritatem oculorũ adiuuare. Castor Marrubij duo genera tradit: nigrum, & quod magis probat candidum. In ouum inane succum addit is, ipsumq; infuso melle aquis portionibus tepefactum, vomicas rumpere, purgare, per sanare promittit, illinens etiã vulnera à cane facta, tuso cum axungia veteri. De quibus explicatè sic Galenus. Prasium sicut gustu amarum est, ita si quis vtatur, conuenientem huic saponi actionem possidet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracẽ pulmonemq; expurgans, ac menses prouocans,

Li. 8. simpl.

Ca. 102, li. 3.

sed & illitum detergit, ac digerit, ponatque ipsum quispiam in caliditate quidem secundi ordinis iam completi, in siccitate tertij medij, aut completi. Succo eius ad aciei oculorum claritatem vtuntur cum melle. Quin etiam & per nares auriginem purgant, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, vtiq; in quibus obstructionē dissiicere, meatumq; ipsum, & ramos meningum expurgare est vsus. Marrubij decoctum, inquit Matthiolus, datur commodē iocinorosis, & aqua intercute laborantibus: eo quoque foliorum puluere necantur interaneorum vermes. Recentia folia cum veteri axungia trita & illita canum morsus persanant, & mammarum tumores resolunt. Lichenas purgāt, sanantque, ex aceto illita. Decoquuntur Marrubij duæ vnciæ cum buglossi, helenij, eupatorij radicum sesquidrachma, rhabbarbari drachma, & agallochi pari pondere, in vini albi generosi libris tribus ad tertias, fitq; hoc medicamentum præstantissimum ad icterum à vasorum obstructione prouenientem, si diebus decem continuis huiusce binas vncias potauerint ægri diluculo, addito sacchari tantillo, quod dulcorem addat. Verum si febris sit, ea omnia aquæ incoquenda sunt. Marrubium aliud Creticum pinxit Pena, quod caule fruticat contorto, gracili, rotundo, multis exilibus alis donato, polij montani non disparibus, & quàm prasij nostratis multò cādi-dioribus, teneriuscula lanugine obsitis: folia verò angustiora sunt, oblongiora, & leuiter serrata, in angustum desinentia, Melissæ Turcicæ æqualia: ex interuallis multò argutiora & mi-nora verticilla, sideritidis aut tetrahit non disparia: inde flosculi prætenues emicanta lbidi, Marrubij, quod odore & lanugine refert. Lobellius aliud ostēdit Marrubium candidum Hispanicū, foliis longioribus magisque carnosiss, hirtis, albis, & suauius redolentibus, in Belgij hortis varium ex Hispano semine. A superiore Cretico differre non videtur.



MARRUBIVM

Creticum, Pena.

borantibus: eo quoque foliorum puluere necantur interaneorum vermes. Recentia folia cum veteri axungia trita & illita canum morsus persanant, & mammarum tumores resolunt. Lichenas purgāt, sanantque, ex aceto illita. Decoquuntur Marrubij duæ vnciæ cum buglossi, helenij, eupatorij radicum sesquidrachma, rhabbarbari drachma, & agallochi pari pondere, in vini albi generosi libris tribus ad tertias, fitq; hoc medicamentum præstantissimum ad icterum à vasorum obstructione prouenientem, si diebus decem continuis huiusce binas vncias potauerint ægri diluculo, addito sacchari tantillo, quod dulcorem addat. Verum si febris sit, ea omnia aquæ incoquenda sunt. Marrubium aliud Creticum pinxit Pena, quod caule fruticat contorto, gracili, rotundo, multis exilibus alis donato, polij montani non disparibus, & quàm prasij nostratis multò cādi-dioribus, teneriuscula lanugine obsitis: folia verò angustiora sunt, oblongiora, & leuiter serrata, in angustum desinentia, Melissæ Turcicæ æqualia: ex interuallis multò argutiora & mi-

nora verticilla, sideritidis aut tetrahit non disparia: inde flosculi prætenues emicanta lbidi, Marrubij, quod odore & lanugine refert. Lobellius aliud ostēdit Marrubium candidum Hispanicū, foliis longioribus magisque carnosiss, hirtis, albis, & suauius redolentibus, in Belgij hortis varium ex Hispano semine. A superiore Cretico differre non videtur.

STACHYS.

CAP. XXXIX.

Nomina

Li. 3, ca. 103.

Forma.

Li. 24, ca. 15.

Ca. 103, li. 3.



STACHYS Græcis, Stachys Latinis dicitur, idest, spica, Officinis ignota. Stachys autem dicta est, quod verticillato ambitu florum, & orbibus spicarum caules cingentibus coronetur. Frutex est, vt describit Dioscorides, marrubio similis, sed altior, folia ferens plura, sed rara, hirsuta, dura, odorata, incana. Virgas ab vna radice plures emittit, marrubio candidiores. Plinius de eadem sic breuiter. Ea quoque quæ Stachys vocatur, porri similitudinem habet, longioribus foliis pluribusque, & odoris iucundi, colorisque in luteum inclinati. Pellit menstrua. Quo loco Plinio euenit, quod iam antè minuimus, vt πρᾶσον pro πρᾶσιον agnouerit. Non enim porri similitudinem habet Stachys, sed marrubij, vt Dioscorides dixit, πρᾶσιον ἐμπερῆς, idest marrubio similis. Coniectura ex caulium spicatis floribus sumpta, non tam vera, quàm solerti, Anguillara Lauandulam Stachyn esse opinatus fuit. Matthiolus aliam Stachyn verā affirmat esse, quam hîc pinximus, eamque quam legitimam antea putarat, pseudostachyn vocat.

Hanc

STACHYS, *Matthioli.*

Hanc Lobellius Stachyn facit, Scördotin Plinij, superiorem Stachyn spuriam Flandrorum, Sphacelum Guilandino. Fuchsius diuersam Stachyn proposuit, eam nimirum quam Germani *Riechenderdorn*, & *Feldandorn*, idest, siluestre marrubium vocant. Est enim fruticosa planta, marrubiique similitudinem refert, nisi quod altior est, folia quoque plura, ac rara obtinet, item hirsuta, dura, odorata, & albicantia: virgulas denique, etsi pictura id non ostendat, ab vna radice plures emit-
 tit, candidiores quàm marrubium: quibus omnibus florum purpureorum verticillatus accedit ambitus, ac orbes spicarum qui caules circumdant. Eandem Stachyn depinxit ac descripsit Dodonæus. Asperis locis, montibus. ac collibus prouenit. Floret Iunio ac Iulio mensibus. Hanc potius approbat Pena, quàm Matthioli Stachyn, marrubio: quidem non ita dissimilem, sed neutiquam spicatam, nec adeò congruam, quàm Germanorum *Ferdandorn*, idest, siluestre marrubium. Est enim marrubio persimilis, proceriore caule, quadrato, crassiore, candidiore, hirsutiore, foliis longioribus, nonnihil ad effigiem & incisuram Betonicæ vel Ballotæ accedentibus, aliquot ramulis quadratis, quos flores purpurei partim verticillato ambitu marubij aut Lamij ritudistingunt, partim superiora spicant hyssopi vulgaris aut

Cap. 292.

Li. 2. ca. 69.

Locus.

Tempus.

Fol. 228.

PSEVDOSTACHYS,
Matthioli.STACHYS,
Fuchsy.

STACHYS Lusitanica
quorundam, Lobellij.

Li.3. c.109.
Temper.
& Vires.
 Li.8. simpl.



Betonicæ modo. Hæc pæssim spontè in Narbonæ asperis non procul à pago *Peraus* & *Magalona* occurrit, interdum purpureis, aliàs luteis floribus, odoratior & multò gratior illa, quam Matthiolus priorem & genuinam ratus fuit. Stachys, inquit Dioscorides, vim habet calfaciendi acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas. Stachys, inquit Galenus, frutex est marrubio similis, gustu acri & amaro, tertij ordinis excalfacientium. Quamobrem non solum menses mouet, sed & abortum adfert, & secundas eiicit. His addit Lobellius Stachyn Lusitanicam quorundam, reptatricem Gnaphalij foliis & cauliculis sesquipalmaribus herbulam, candida lanugine stipatis & tomentosis verticillis, eiusdem coloris, perexiguus sub foliolis cinctis visum effugientibus, suauè spirantibus, vti vniuersa planta. Stachyn dixere Herbarij quidam non imperiti nonnulla de facie & viribus similitudine ducti. Hæc Lobellius.

HORMINVM.

CAP. XL.

Nomina



OPMINON Græcis, ita Latinis Horminum & Geminalis. Dictum autem est Horminum ἀπὸ τῆς ὀρμῆς, idest, impetu agi, & cieri in venerem, quod πρὸς τὴν συνστολὴν τῷ ὀρμῆ, inquit Dioscorides, idest, quod ad venerem stimulet. Id duplex est Dioscoridi, & Plinio, fatium, & silvestre. Horminum herbam describit Dioscorides foliis marrubio similem, caule quadrangulo, semicubitali, circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt, ad radicem nutantes, in quibus semen diuersum: in siluestri enim rotundum inuenitur & fuscum, in altero nigrum & oblongum, cuius est vsus. Nusquam nisi in hortis cultu herbariorum visitur. Silvestre foliis est maioribus, & aliquantum laciniatis oris, blattariæ similitudine & colore: quadratis & paucioribus virgulis, sesquicubitum altis: per interualla flores verticillati in spicas longiores abeunt, deorsum inclinatas, cæruleas, purpurascens, nigro semine, nec absimili priori glutinoso. Vtrique radix lignea. Sed illius odor nullus, huius verò sclaream redolent flores. Rudera & prata macilenta amat. Silvestre Horminum ex Matthiolo hîc apposui: item ex Fuchsio, qui Horminum Orualam esse putat. Dodonæus eum secutus in stirp. Historia: idem silvestre

Genera.

Lib.3 c.128.

Forma.

HORMINVM, Matth.

Locus.



Horminum

Horminum pinxit. At in Historia florū, id quartam Orualæ speciem posse dici tradit. Hormini semen cum vino potum ad venerem stimulat: cum melle purgat argemā, & oculorum albugines. Idem illitum cum aqua tumores discutit, & aculeos extrahit. Herba illita eadem efficit. Silvestre vehementiori vi præditum est.

HORMINVM Silvestre,
Matthioli.



HORMINVM Silvestre,
Fuchsj.



De Hormino hæc tradit Plinius. Horminum semine, vt diximus, cumino simile est, cæterò porro, dodrantali altitudine. Duorum generum, alteri semen nigrius, & oblongius. Hoc ad venerem stimulamdam vtuntur, & ad oculorum argemā, & albugines: alteri candidius semen & rotundius. Vtroque tuso extrahuntur aculei ex corpore, per se vel illito ex aqua. Folia ex aceto imposita panos per se, vel cum melle discutiunt, item furunculos, priusquam capita faciant, omnesque acrimonias. Quo in loco rursus Plinius impegit, qui *πρασιον* pro *πρασιον* legerit, & porro pro *prasio*, id est, marrubio conuerterit. Hormini Galenus in simplicium censu non meminit, sed Paulus his verbis. Horminum marrubio specie simile est, calidum mediocriter, siccum & abstergens. Venerem stimulat, & oculorum crassitiem cum melle repurgat: œdemata discutit, extrahit aculeos. Silvestre domestico est valentius.

Li.22. c.25.

Lib.7.

GALLITRICVM.

CAP. XLI.

SPECIES Hormini videtur herba quæ Officinis Gallitricum, Centrum Galli, & Matrifaluia, & Sclarea nominatur, Germanicè *Scharlach*, Belgicè *Sclardey*, quasi dicas oculum clarificans. Italicè *Schiaria*, Gallicè quadam ad horminum allusione *Orualle*, & *Toutebonne*. Attamen horminum non est, quo nomine descripsit & depinxit Fuchsius. Nam folia multò maiora edit, nempe verbasci, aspera, admodum hirta rugis, & quasi

Nomina

Cap.214.
Forma.

Locus.
Tempus.
Temper.
& Vires
In Aduersf.

verrucis nonnihil hirsuta Æthiopidis aut verbasci pube, siluestris hormini similitudine, caules quadratos, & in iis flores cæruleos & albicantes, saluix vel dictamni: semen in calicibus nigrum: radice parua, dura, & sublutea. Tota planta odorem spirat non ingratum quidem, sed tam vehementem vt capitis grauitatem faciat. Seritur in hortis, & oritur anno post, Iunio & Iulio florens. Sclarea calida siccaque est ferè ad tertium vsque gradum, menses & secundas pellit, ad venerem concitat: quare minùs quin sit hormini species refragandum. Magno est vsui, inquit Pena, quibusdam Septentrionalium, ad Zythi bieræq; confectio-nem. Nam lupuli vel penuria, vel vegetioris potionis faciundæ causa, cortinis feruentibus addunt, fitq; temetum, quo non multis depletis poculis temulenti fiunt, hilaritate propemodum insana, in nonnullis tamen risu quam miseratione magis digna. Semen inter palpebram & oculum insertum, atque diutulè reten-

GALLITRICVM,

Sive Sclarea.



COLVS IOVIS,

Lobellij.



tum, quantum est sordium illic, illicò euerit, & rapit quotidiano etiam vulgi experimento. Huc meritò adducenda planta, quam Herbarij quidam Colum Iouis vocant, summo caulis fastigio colum flauo penso obuolutam repræsentante. Videtur Oruala tertia Dodonæi in Histor. flor. (quatuor enim Orualæ differentias tradit,) quorundam Horminum siluestre pingue, à pingui folio odorato. E radice Lamij simili, inquit Pena, caules edit non multos, cubitales & sesquicubitales, quadratos, hirsutos, quibus folia verticæ aut Trachelij, albida, ad basim sinuata, latiora, læuia, Gallitrici minora: flores in verticillis lutei, Saluix, aut Gallitrici. Scaturigines vdósque siluarum margines amat, Gallia, Germania, & Italia. Gustu nonnihil calido exsiccante.

ROSMA

ROSMARINVM CORONARIVM. CAP. XLII.



R AECIS Λιβανωτὶς στεφανωματούκη, qua nectentes coronas vtuntur, Latinis & Officinis Rosmarinus siue Rosmarinum coronarium, Arabibus *Elkiageber*, Italis *Rosmarino*, Germanis *Rosmarin*, Hispanis *Romero*, Gallis *Romarin*. Virgas habet graciles, vt describit Dioscorides, circa

Nomina

L. lib. 3. c. 73.

Forma.

Locus.

Tempus.


Lib. 3. c. 73.

Lib. 7. sim.

ROSMARINVM, Coronarium.



ROSMARINVM Siluestre siue
Boemicum, Matth.



quas folia sunt tenuia, crebra, oblonga, gracilia, intus candicantia, exteriore parte viridia, graui-ter odorata, florem, quod Dioscorides omisit, in candido caruleum, radicem nigram, multis fi-bris capillatam. In Narbonensi Gallia sponte sua prouenit tam copiose, vt incolae ligni alius loco id quotidie vrant. Bis anno floret, vere & æstate. Rosmarinum, vt scribit Dioscorides, cal-facit, regium morbum sanat, si quis id in aqua decoxerit, & ante exercitia bibendum dederit: deinde post exercitia lauerit, & vinum potaue-rit. Libanotidis coronariæ quam Rosmarinum vocant, inquit Galenus, decoctum morbo re-gio laborantes potum adiuuat, omnes enim li-banotides abstergentis & incidentis facultatis sunt participes. His addunt recentiores rosma-rinum ad frigidos vetriculi affectus plurimum valere, ad coeliacum malum, & ad vomitum ci-bi, si cum pane deuoretur, aut bibatur in pulue-rem contritum, ex meraco: prodesse lienosis, & iocinatorosis, nō solum excalfaciendo, extenuan-do, & obstructions referando, sed etiam ad-stringente vi roborando: succurrere capitis flu-xionibus, & omnibus frigidis morbis, epilepsia, stupori, veterno, partium resolutioni: capitis lo-tionibus vtiliter misceri, & articulorum fomen-tis: cohibere alba vteri profluvia, si quotidie & diu sumatur: Visum acueri, si toto tempore quo floret quis ieiunus flores cum circumstantibus foliis cum pane & sale quotidie vorauerit. Man-sum oris halitum commendat. Sistit dentium & gingiuarum fluxiones in aceto & vino auste-ro feruefactum, si hoc decocto calido os collua-tur. Sicci farina recentia vulnera glutinat, verū operepretium est prius vino in quo ipsum fue-rit coctum, abluere, deinde farina inspergere. Flores saccharo cōditi valent ad omnia prædi-cta, peculiariter autem ad frigidos cordis affe-ctus, ad pectoris vitia, & ad arcenda pestilentia: contagia: quin & herbam suffitu tussim & distil-lationem sedare tradunt, tutam præstare in pesti-lentia domum, crematā nidore improbam aeris diluente perniciem. Aloisius Anguillara apud Theophrastum Cneurum nigrū esse putat, Ca-siāque nigram Hygini, apibus gratissima.

& ideò prope illarum aluearia ferendam: nulla vsquam facta coronariæ Libanotis mentione apud Theophrastum: vt & Cneorum album lauandulam, siue spicam, vt iam monuimus. Matthiolus lib. 4. in Dioscoride Cneori quod verum Theophrasti esse credit, figuram hanc monstrat. Scribit nasci in Bohemia plantam, quam siluestre Rosmarinum appellat, quia Rosmarini coronarij faciem quadantenus representet. Cubitali est altitudine, fruticosa, virgis tenuibus, lignosis, fragilibus, rufescentibus, minij ferè colore, folia Rosmarini æmula, prona parte viridia, transuersis vtrinque lineis dispari ordine ductis signata, superna verò rubescentia, & rubro appensa pediculo. In summis furculis corymbacea est coma rubra, vnde flores panduntur sublutei: radix infirma & superuacua, folia & flores Citreum malum olent, gustu etiam nonnihil aromatici resipiunt cum quadam adstrictione. Utunrur hac Bohemi aduersus blattas & tineas. Lobellius Ledon foliis Rosmarini alterum vocat.

ANTHEMIDES. CAP. XLIII.

Nomina



E Chamælo vulgaris vsus siue siluestri, in lib. De iis quæ in vmbrosis proueniunt, diximus: nunc de vero Dioscoridis & odoratiore, quæ ἀνθεμὶς nominatur, atque etiam χαμαίμηλον, Latinis etiam Anthemis & Chamæmelum, Arabibus *Debonigi*, seu *Babunegi*, Officinis corrupto nomine Camomilla & Camomilla Romana, Italis *Chamomilla*, Germanis *Camillen*, Hispanis *Mauzauilla*, Gallis *Camomille*, Belgis *Roomsche Camilblæmē*. Chamæmelū sanè id dictū est ab odore suaueolentis mali. Anthemidis genera tria proponit Dioscor. floribus tantū distantia. Totidē Plin. Anthemis, inquit, magnis laudibus celebratur ab Asclepiade. Aliqui Leucanthemida vocant, alij Leucanthemum, alij Eranthemum, quoniam vere floreat, alij chamæmelum, quoniam odorem mali habeat. Nonnulli melantheon vocant. Genera eius tria flore tantū distant, palmum non excedentia, paruisq; floribus vt rutæ, candidis aut melinis, aut purpureis. Anthemidi, vt describit Dioscorides, ramuli sunt dodrantes, fruticosi, alas multas habentes, foliola parua, tenuia, multa, capitula rotunda, flores intrinsecus auri colore, extrinsecus per ambitum albi, aut lutei, aut purpurei, magnitudine foliorum rutæ. Nascitur in asperis & iuxta vias. Colligitur vere. Hæc vt suauius multò quā siluestris aut vulgaris, de qua diximus, quiddamq; aromaticum amaraci aut abrotoni habet, ita multò ad aspectum hilarior & comptior est, eadem ratione Romana dicta, qua præstantiores plātas basilicas aut Romanas vocare soliti sunt, vti absinthium Romanum, & Basilicum asparagum. Tenellis cauliculis repit, inquit Pena, haud diuersa foliis & floribus vulgatæ siluestris, restibili item fertilitate, & perenni radice, qua sese instaurat, & fundit propagationes proculcationis contemptrices. In Angliæ hortis viret & colitur, alicubi etiam sponte oritur. In Gallia & Italia meridionalibus, tametsi Romana dicta, rarior sponte, in Belgio non nisi in hortis reperitur. Iunio & Iulio mense floret in nostris regionibus, quo tempore colligitur. Angliæ cultiores

Genera.

Lib. 3. c. 137.

Lib. 22. c. 21

Forma.

Lib. 3. c. 137.

ANTHEMIS Leucanthemos, Matth.

Locus.

Tempus.

In Aduers.

Locus.

Tempus.



ANTHEMIS *Leucanth.*
niuea Anglorū, flore multiplici.



tiores horti, vt scribit Pena, hanc eandem alunt, sed floribus adeò multiplici folio & radiata serie propagatis, vt candor eximius bullatum centrum prorsus operiat, nec alius aut odor, aut sapor illi. *Anthe-* Lib. 2. c. 29.
mis Chrysanthemos Dodonæi Chamæmelo vero similis cauliculos profert tenues & inualidos, & in terra stratos, folia quoque tenuia, sed candidiora, & paululū minora, pro floribus capitula rotunda, siue orbiculos luteos tantū, nullis circundantibus foliis, habet, radicem similem. Idem *Eranthemū* sic depinxit & descripsit. Cauliculos profert à radice multos, in alas subinde diuisos, striatos, virentes, folia tenuia chamæmeli aut potius cotulæ fœtidæ similia, flores non magnos, forma florum ranunculi, pulchros, minij colore rubentes, quos capitulum sequitur oblongum, ex multis collectum feminibus, rotundis, acuminatis, in virore subnigricantibus, radices fibrosas. Odore est herbaceo, aliquantulum graui, sed minùs quàm cotula fœtida, chamæmeli verò odori nequaquam simili. Nascitur compluribus Europæ regionibus, in aruis cum zea tritico, aut aliis frumentis. Belgæ in hortis serunt, vocantque *Bruyenettekens*. Æstiuus mensibus floret. Esse autem

Lib. 1. c. 31.
Cap. 68. de
flor.

Forma.

Locus.

anthemidis genus, quod propriè *Eranthemum* dicitur, nemo facillè affirmauerit. Nam *eranthemo*, teste Dioscoride, flos est forma chamæmeli, in medio aureus vel luteus, orbiculato verò ambitu purpureus. Istud autem florem quidem habet purpureum, sed medium eius non est luteum, quod non esse anthemidis speciem

ANTHEMIS *Chrysanthemos, Dodon.*



ANTHEMIS *Chrysanthemos, Pena & Lobell.*



ostendit.

ANTHEMIS *Eranthemos*,
Dodonai.

ADONIS *sive Anthemis*,
Matthioli.



In cap. 137.
lib. 3.

ANTHEMIS *Eranthemos*,
sive consolida regalis, *Fuchsj.*



Lib. 10. Me
tamor.

Forma.

Locus.

ostendit. Fuchsius *Consolidam regalem* *Eranthemum* facit. Sed *anthemidi* neque foliis, neque floribus, neque odore similis est: neque flores rubent, sed cærulei sunt. *Matthiolus* & *Herbarij* multi *eranthemum Dodonæi*, *Adonidis* florem nuncupant. Sed *Adonidis* flos, inquit *Dodonæus*, *anemone* esse creditur. Nam *Adonidis* florem vento excuti *Ouidius* cecinit. *Venti* autem flos *anemone* est. Aliis $\phi\lambda\epsilon\gamma$ *Theophrasti* videtur esse, à floris flâmeco igneove colore. Diuersum est à superiore *chamæmelum* *eranthemum Dalechampii*, quod hîc depictum est, foliis, ramis, capitulis grandius & amplius reliquis *chamæmeli* generibus, sed foliorum quæ capitula ambiunt orbe purpureo decorum, flos priusquam dehiscat, corticoso compactiliq; inuolucro propemodum tam crasso & euidente quàm in cyano coërcetur. Rara est hæc planta, nec herbariis omnibus nota. In asperis locis prouenit. Nunc de viribus *Anthemidum* ex *Dioscoride*. Vim habent radices, flores & herba calfaciendi extenuandique. Potu & infusione menses, foetus, calculos & vrinam pellunt.

aduersus inflationes & tenuis intestini dolores bibuntur. Bile suffusos expurgant, & iocinorosis medentur. Decocto earum vesicæ vitia fouentur. Efficacius ex omnibus generibus est, quod florem fert purpureum, cæteris maius, idque propriè *Eranthemum* vocatur. Quod verò *Leuchanthemum* & *Chrysanthemum* cognominant,

ANTHEMIS *Eranthem-*
os, Dalechamp.



minant, vehementius urinam ciunt. Aegilopis illitæ medentur. Commanducata oris ulcera sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur, terentes ipsas ad pellendos febrium circuitus, quæ in Græcis sic leguntur. Χρῶνται δὲ τινες καὶ συγκλύσμασι μὲν ἐλαίῳ, λειοτριβεύοντες αὐτὰ πρὸς ἀνασκύβην τῶν περιτοδικῶν πυρεθῶν, & intelligunt anthemidis usum esse in infusis per clysteres. Sed hos falsa lectione decipi putat Cornarius, legendum enim esse συγχεύματι, ut accipiatur unctio, siue illitio per totum corpus ad febres depellendas. Quod perspicue traditur ab Aetio, ex sententia Nichepsonis ita scribente. Nichepson Aegyptius chamemeli florē purum in summo vigore colligere iubet, & in mortario trudere, ac probe conterere, & pastillos medicos fingere, eosque in umbra diligentissime siccare, ac reponere. Usus autem tempore unum ex ipsis terere, oleo primario quod satis est affuso, indeque uniuersum corpus à capite usque ad pedes illinere in omnibus febrientibus, ac ægrum stragulis coopertum fouere. Sudor enim, inquit, mouebitur bonus in his qui euasuri

Embl. 139.
lib. 3.

sunt, & à febre liberabuntur. Ita Plinius planè ex superiorum sententia. Medici verè folia in pastillos digerunt: item florem & radicem. Dantur omnia mixta drachmæ unius pondere contra serpentium ictus. Pellit mortuos partus, item menstrua in potu, & urinam calculosque: inflationes, iocinorum vitia, bilem suffusam, agilopia. Commanducata ulcerum manantes in ore eruptiones sanat. Ex omnibus iis generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius & foliorum & fruticis magnitudo amplior est. Hoc propriè quidam eranthemum vocant. Quæ omnia accuratius Galenus declarauit. Anthemis, inquit, calfacit & siccatur primo ordine. Est & tenuium partium, ac proinde digerendi, laxandi & rarefaciendi vim obtinet. Et alio in loco. Est chamamelum tenuitate rosæ persimile, calore verò ad olei facultates magis accedit, animali familiares, ac temperatas. Quapropter lassitudinibus, ut si quid aliud confert, dolorisque mitigat. Præterea tensam remittit & laxat, quæque mediocriter dura sunt emollit, quæque constipata condensatæve sunt rarefacit. Ad hæc febres, quæ citra viceris aliquius inflammationem infestant, dissoluit: præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate gignuntur. Qua de re & ab Aegyptiorum sapientissimis Soli consecrata est, febriumque omnium remedium putatur. Verum hac quidem in re à veritate aberrant: solas enim quas diximus febres sanare potest, easque quæ iam concoctæ sunt. Iuuat autem pulchrè reliquas etiam omnes quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex visceris inflammatione ortæ. Nam & harum remedium chamamelum vel strenuissimum est, ubi iam concoctis adhibetur, quapropter & hypochondriis, ut si quid aliud, gratum est. Hæc Galenus. Anthemidis decoctum potum, inquit Matthiolus, lateris dolores sanat. Idem præstat aqua è floribus distillata.

Lib. 22. c. 21

Lib. 6. sim.

Lib. 3. sim.

In cap. 137.
lib. 3.

RUTA.

Nomina **LIB.** 3. sym. **Forma.** **Genera.** **Lib.** 3. c. 45. **fol.** 390. **Locus.** **Ibid.** **Lib.** 3. c. 46.

ΠΗΓΑΝΟΝ Græcis, Ruta Latinis nominatur, Mauritanis *Sadeb*, seu *Se-dab*, Italis *Ruta*, Gallis *Rue*, Germanis *Rautem*, & *Wueinrauten*, Hispanis *Arru-da*. Cur autem dicatur πῆγανον declarat Plutarchus his verbis. φασὶ δὲ καὶ τὸ πῆγανον ἀπὸ τῆς διωχέμενός ὀνομασθῆναι. πῆγνυσι γὰρ ξηρότητι διὰ θερμότητα τὸ σπέρμα, καὶ ὥλως πολεμὸν ἐστὶ ταῖς κύσσαις. Id est, Aiunt à facultate sua πῆγανον dictum, quod siccitate & calore coagulet & cōdenset semen. Hinc vterū gentibus inimicū est. Dioscor. duo rutæ genera primum statuit, satiuā & agrestē: deinde alio capite aliam addit rutā siluestrem, quā Harmalā quidam vocāt, Syri *Besasan*, Cappadoces *Moly*. Ruta satiuā siue hortensis, planta est perpetuò ferè virēs, foliis crassiusculis, subpinguibus, pluribus ab vno pediculo exeuntibus ex angusto exortu in latiusculum desinentibus, colore saturatè viridi. Ramos emittit copiosos, surculosos, duros, rotundos, & in horum summitate flores luteos, hyperici haud absimiles, è quibus capitula siue calices oriūtur quadrati, in quibus semē pusillum, nigrum, radix lignosa multiplexq; & intus lutea. Herba est acris & grauißimi odoris. Siluestris ruta, inquit Dioscorides, satiuę similis est, ipsa acrior. Agresti rutæ vires vegetiores, inquit Pena, & odor vehementior multò, in tantum acer afflatuq; periculosus, vt interdum vaporem olfacientis vultui afflet, aut tangētis manui inurat, qua si faciem attigeris erysipelas aut scabies excitetur. Alta cubitum est, caule hortensis, minore, foliis ferè iisdem, exilioribus, siliquula & semine non dispari. Sed frigoris est valde impatiens, nec perennat, ne in hortis quidē Gallicis & Batauis sedulò culta, flosculis herbaeis. Huic siluestri addit Pena aliam minimam, quam Peganion Narbonēse, siue Rutulam vocat, Lobellius Rutulam siluestrem, quæ maximè omnium virulenta est, angustifolia, tota pallido ferè virore albicans, empetri ferè habitu, situ, & rigiditate, cetera non nisi magnitudine multò disparia. Ruta satiuā passim prouenit in hortis: amat aprica loca, siccaq;. Matthiolus nasci ait siluestrem in Geritienfi agro copiosissimā, adeò vt qui circumstant montes ea vbique scateant, præsertim Saluatinus. Vtraq; siluestri etiam scaterere aridos Monspelienfes colles, & faxeos decliues scribit Pena. Præter rutam siluestrem satiuę similem aliam tradit Dioscorides, vt diximus, quam quidam Harmalā vocant, Syri *Besasan*, Cappadoces *Moly*, quia radicem habet nigrā, florē candidum, Mauritani *Harmel*, & *Alharmel*.


RUTA SATIVA.

RUTA Siluestris,
Matthioli.

Hanc



RUTA Canina, Herba
S. Antonij, Lobell.



Hanc Matthiolus Cōstantinopoli ad se missam depinxit, figura ad descriptionē Dioscoridis apprimē congruēte frutex est multos à radice cauliculos emittens, foliis multò quā siluestris ruta longioribus, tenuioribusq; odore graui, floribus candidis, è quibus capitula in caulium cacumine oriūtur, paulò maiora quā satiuæ rutæ, quæ tribus maximē partibus cōstant, quibus triangulū semen, sub rufo colore, & amaro gustu, includitur, multi vsus. Recētiores alteri plantę Rutæ nomen indiderūt, & Caninā & fœtidam appellarunt, Dodonæus in stirpiū Historia Galiopsim aut Scrophulariā tertiam, quidā Herbam S. Antonij. Virgulis multis fruticat sesquicubitalibus: folia Papaueris Rhœadis aut Argemones incisura, minora, crassiuscula, ex viridi nigricant, vti & flosculi, æstate inanes, Antirrhini modo. Semen in exili pericarpio Rutæ ferè aut Blattariæ ritu, sed minore. Tota grauem & virosū, & rutaceo ingratiorem odorem spirat. Raro nisi locis siccis & feruidis, satis & marginibus oritur, vt Narbonæ, Rauēnæ, Romæ. Ruta tā satiuā quā agrestis prior, vt docet Dioscorides, calfacit, vrit, exulce-

rat, vrinā mouet, mensesq; ducit. Aluū sistit pota & comesta. Letalium venenorum antidotum est, si semē acetabuli mēsurā in vino bibatur, folia per se ante cibū sumpta, & cum nucibus iuglādibus, aridisq; ficis, inefficacia venena reddunt. Cōtra serpentes similiter sumpta p̄sunt. Geniturā tam in cibo quā potu extinguit. Cocta cū

Lib. 3. c. 45.
 Temper.
 & Vires.

anetho sicco, tormina sistit, facit etiā ad lateris thoracisq; dolores, difficultatē spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendicū, articularumq; cruciatus, rigores circuitibus certis repetētium febriū, vti supradictū est, pota. Ad inflationes coli, vteri, & recti intestini decocta cum oleo & infusa. Vuluæ strangulatu liberat trita cum melle, si à genitali vsq; ad sedē imponatur, feruefacta cum oleo & pota lūbricos excutit. Articulorū doloribus cum melle, aquæ intercutē quæ hypofarca dicitur, cum ficis illinitur. Eisdē pota auxiliatur, in vino decocta ad dimidias partes, & si ea abstergatur. Cruda saleq; cōdita ac comesta, visus aciē exacuit, & oculorū dolores cum polēta illita sedat. Cum rosaceo & aceto capitis doloribus succurrit. Sanguinis narium profluvia trita & imposita sistit. Testiū inflammationibus cum foliis lauri illita, & exāthematis cum myrto & cerato prodest. Cum vino autē pipere & nitro cōfricta, albæ vitiligini medetur: cum iisdē illita thymia & myrmecias tollit. Cū melle & alumine imposita lichenibus prodest. Succus in mali corio calfactus & instillatus, auriū doloribus succurrit. Oculorū herbetudinibus cum succo fœniculi & melle inunctus subuenit. Erysipelata, herpetas, & achoras cum aceto, cerussa, & rosaceo inunctus sanat. Ceparū & alliorum acrimoniā cōmanducata domat. De iisdē proli-

xiūs Plinius his verbis. Quæcunq; ruta & per se pro antidoto valet, foliis tritis & ex vino sumptis, cōtra aconitum maximè, & viscū: item fungos siue in potu detur, siue in cibo. Simili modo cōtra serpentium ictus, vtpotē cum mustellæ dimicaturæ cum his, rutā prius edendo se muniāt. Valent & cōtra scorpionum ictus, & araneorum, apum, crabronū, vesparum aculeos, & cātharidas, ac salamādras, canisq; rabiosi morsus: acetabuli mēsurā succus ex vino bibitur, & folia trita vel cōmanducata imponūtur cum melle & sale, vel cum aceto & pice decocta. Succo verò perūctos aut eam habētes, negant feriri ab his maleficiis. Serpētesq; si vratur ruta, nidorē fugare. Efficacissima tamen est siluestris radix cum vino sumpta. Eandē adiiciunt efficaciorē esse sub dio potā. Pythagoras oculis noxiā putauit falsò, quoniā scalptores & pictōres hoc cibo vtuntur oculorū causa, cum pane quoq;, vel nasturtio satiū atq; siluestris propter visum. Vt aiunt, multi succo eius cum melle Attico inuncti discusserūt caligines, vel cum lacte mulieris puerū enixæ, vel pauco succo angulis oculorum tactis, epiphoras cum polēta imposito. Lenit autē capitis dolores pota cum vino, aut cum aceto & rosaceo illita. Si verò sit cephalæa, cū farina hordeacea & aceto. Eadē cruditates discutit, mox inflationes, dolores stomachi veteres. Vuluas aperit, corrigitq; cōuersas, illito cum melle, toto ventre, & pectore. Hydropicis cum ficu, & decocta ad dimidias partes, potaq; ex vino. Sic bibitur & ad pectoris dolores, laterumq; & lumborū, tusses, suspiria pulmonū, iocinorum, renum vitia, horrores frigidos. Ad crapulæ grauedines decoquūtur folia poturis, & in cibo vel cruda vel decocta cōditāve prodest: item torminibus in hyssopo decocta, & cum vino. Sic & sanguinē sistit interiorem & nariū indita, sic & collutis dentibus prodest. Auribus quoq; in dolore succus infunditur, custodito, vt diximus, modo. E siluestri verò cōtra tarditatē & sonitum cum rosaceo, vel cū laureo oleo, aut cumino & melle. Succus & phreniticis ex aceto trita instillatur in tempora & cerebrū. Adiecerūt aliqui & serpyllū, & laurum, illinentes capita & colla, dederunt & lethargicis ex aceto olfaciendū: dederunt & comitialibus bibendū decoctæ succū in cyathis quatuor: ante accessiones quarū frigus intolerabile est, alsiosisq; cruda datur in cibo. Vrinam quoq; vel cruentā pellit, fœminarū etiā purgationes, secundasq;, etiā emortuos par tus, vt Hippocrati videtur, ex vino dulci nigro pota. Itaq; illini & vuluarum causa etiā suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordeacea. Valet contra ileum decocta farina in oleo, & velleribus collecta. Multi verò & cōtra purulentas excreationes siccæ drachmas duas, sulphuris vnā & dimidiam summi cēsant: & cōtra cruētas, ramos tres in vino decoctos. Datur & dysentericis cum caseo

caseo in vino cōtrita. Dederūt & cum bitumine infriatā potioni propter anhelitū. Ex alto lapsis feminis tres vncias illinūt ex olei libra, viniq; sextario. Illinitur & cum oleo coctis foliis, partibus quas frigus adusserit. Si vrinā mouet, vt Hippocrati videtur, mirum est quosdā dare velut inhibentē potui, cōtra incōtinentiam vrinæ. Psoras & lepras cū melle & alumine illita emēdat. Itē vitilignes vel rugas, strumās, & similia, cum hircino & adipe suillo, ac taurino seuo. Itē ignem sacrū ex aceto & oleo, vel psymmithio: carbunculū ex aceto. Nonnulli laserpitiū vnā illini iubent, sine quo epinyctidas pustulas curāt. Imponunt & māmīs turgētibus decoctam, & pituitæ eruptionibus cum cera. Testiū verò epiphoris cum ramis lauri teneris, adeo peculiari in visceribus his effectū, vt siluestri ruta cum axungia veteri illitos rami- ces sanari prodant, fracta quoq; mēbra semine trito cum cera imposito. Radix rutæ sanguinē oculis suffusum, & in toto corpore cicatrices aut maculas illita emēdat. Ex reliquis quoq; quæ tradūtur, mirū est, cum feruentem rutę naturā esse cōueniat, fa- sciculum eius in rosaceo decoctū addita vncia aloes, perunctis sudorē reprimere, itemq; generationes impediri hoc cibo, ideò profluuiū genitali datur, & venerem crebrò per somnia imaginantibus. Præcauendum est grauidis, abstineāt hoc cibo, necari enim partus inuenio. Eadē ex omnibus satis quadrupedum quoq; morbis in maximo vsu est, siue difficilē spirātibus, siue cōtra maleficorū animalium ictus, in- fusa per nares ex vino, aut si sanguisugā exhauserint, ex aceto, & quocūq; in simili morborū genere, vt in homine tēperato. Hæc Plinius. A quo citatus Hippocratis locus, is est: *πήγανον ἔρεει αἱ μάλλον, ἢ διαχωρέει, καὶ συσπρίκτον ἔχει ἔπρος τὰ φάρμακα*. *τὰ βλαβερά αὐτὸ φέλιμον προπινόμενον.* Hoc est, Ruta vrinā magis quā aluum mouet. Ha- bet & vim quandā condensandi, & ad medicamēta noxia utilis est propinata. Sunt tamē codices qui vocem *προπινόμενον* nō habeant. Galenus breuius vtriūsq; vires sic tradit. Ruta agrestis ex quarto est ordine excalfaciētium & siccantiū, domestica ve- rō ex tertio. Est autē non solūm gustu acri, sed & amaro. Ea digerere atq; incidere crassos lentosq; humores potest. Ob eandē vim & vrinās mouet. Quin & tenuium est partiū, flatūsque, extinguit. Quare ad inflationes cōpetit, ac veneris appetitū inhi- bet, digeritq; atq; exsiccāt sanē strenuē. Est enim ex eorū numero medicamētorum quæ valēter desiccāt. Harmalæ semen, auctore Dioscoride, cum melle, vino, croco, fœniculi succo, ac gallinaceo felle tritū, contra retusam oculorū aciē valet. Vis eius inquit Galenus, tenuiū est partiū & calida tertio ordine, quare crassos & lentos hu- mores diffecat ac digerit, ac vrinam mouet. Scribit Serapio ex auctoritate Alhasari harmel purgari melācholiā & phlegma per aluum, & nullū esse aduersus epilepsiā medicamentū valentius. Ex auctoritate Abugerig, prouocare vomitū & inebriare, si potui detur vini modo, id quod maximē cōfert in eo melancholiæ genere, quod illi Eros vocant. Vt autē vomitū prouocet, sic præparandū. Coniiciūtur in morta- rium feminis eius grana quindecim prius clarissima aqua abluta, desiccātur, terun- tur in mortario, cribro transmittuntur. Deinde rursus in mortario pistillo ligneo, affusis aquæ fontanæ vnciis quatuor probè miscentur. Demum percoletur cremor, cui adduntur mellis vnciæ tres, olei sesamini aut amygdalini vnciæ duæ. Id omne propinatur melancholicis quibus excitat copiosas vomitiones.

G A L E G A.

C A P. X L V.

A B EFFECTV & viribus potiùs quā ab odore (nullus enim huic odor rutæ, sed leguminis, cui videtur similior) huic plantæ rutæ nomē indi- tū est. Est enim cōtra venena efficacissima. Dicitur autē ruta capraria, & Galega ab herbariis, ab Italis quibusdā *Lauanese*. Caule & foliis: vi- ciæ siluestri quadātenus similis est, caule sesquicubitali, & bicubitali, rotūdō, duro, in quo folia à pediculis exeunt dena aut vndena, ferè vicæ siluestris, sed lōgiora & maiora: flores in summitate cōgesti, dilutè cærulei, aut cādidi, è quibus siliquæ erū-

Nomina

Forma.

GALEGA.

Locus.

Pena in
Aduers.

Tempus.

Temper.
& Vires

Ibid.



punt longæ, graciles, rotundæ, in quibus semen cōcluditur, radix satis magna, non facilè emoritur. In scrobiū aggeribus, locisq; humētibus prouenit. In Pedemontana planitie iuxta Eridani fluēta, & Taurinū copiosè luxuriat, passimq; alibi. In frigidioribus regionibus herbarij in hortis colūt. Iulio & Augusto floret, & semē maturat. Calida siccaq; est tēperie. Huic vis est maxima nō solūm aduersus letalia venena, verū etiā aduersus ferarū omnium venenatos tum ictus tum morsus, succo eius epoto, vel herba emplastri modo vulneratis partibus imposita. Quare Veneti pharmacopœi, inquit Pena, atq; circulatorū illic fex, qui viperas stipis colligēdæ causā circūferunt, simulatq; demorfi sunt, nihil certius hac aut præstātius habent, eadē magis freti quā decantatis illis theriacis. Epotus recentis herbæ succus datur vtiliter cochlearis mensura ad necādos intestinorū vermes. Idē præstat herba ipsa in patella calfacta ex oleo amygdalarū amararum, aut è lini semine, ac vmbilico adalligata. Laudant aliqui succū sesquiunciæ pōdere

haustū pueris comitali morbo vexatis. Aduersus pestilentiam mirificè valet, quare hanc crudam quidem quotidie in acetariis vorant. Alij olerum modo coctam ex carniū iure edunt, nonnulli succum extrahunt, & ex vino hauriunt. Eiusdem succus datur in principio pestilentia affectis, aut eiusdem decoctum ex aceto, addita theriaca, aut armenia bolo. Sed ægros sudare oportet. Idem præstat ad pestilentes febres, in quibus ex anthemata emerferint, præsertim epoto herbæ decocto ex aqua cum tormentillæ radice, cardui benedicti foliis, & armenia bolo.

ARISTOLOCHIA.

CAP. XLVI.

Nomina

Lib.3.c.4.



Ἀριστολόχια Græcis, Aristolochia Latinis, Barbaris & Officinis corrupto nomine Aristologia, Arabibus *Zaraund*, *Masmocra*, seu *Zaraued*, Gallis *Sarrasine* & *foterne*, Germanis *Osterlucy*, & *Holtuurtz*. Dicta autem

est aristolochia, auctore Dioscoride, quod sit ἀρίστη τῶν τοχέων, idest, optima puerperis, nō grauidis, vt Plinius ait, quod remoratos menses, hærentes secūdas, & reliquias omnes à partu expellat. Sunt enim τοχέαι partus dolores, & ipsæ mulieres parturiētes, & τοχία partus purgamēta. Dioscorides & alij Græci aristolochiæ tria esse genera statuūt. Vna est quæ rotunda, & fœmina dicitur, altera longa & mascula, tertia clematitis, id est, farmētitia appellatur. Plinius his tribus generib⁹ quartū addit, ac pistolochiā & polyrrhizon vocat. Tria generā sic describit Dioscorides. Aristolochia rotunda, quæ fœmina vocatur, folia hederacea habet, cum acrimonia odorata, subrotunda, tenera, multis ab vna radice germinibus, sarmenta illi sunt oblōga, flores candidi, pileolis similes, quod in ipsis rubet, grauiter olet. Radix est rotunda, rapo similis. Aristolochia longa mascula appellata, à nōnullis dactylitis, folia lōgiora quā rotunda habet, ramulos tenues, dodrātales, florē purpureum graueolentē, qui cum defloruerit, piro similis fit, radix digiti est crassitudine & dodrantalis, aut etiā maior. Tam huius quā prioris radix colore est intus buxæo, gustu amaro, & odore viroso. Tertia etiā longa, quæ & clematitis vocatur, caules profert tenues foliis subrotundis refertos, (ἀεὶ ζῶς μικρὰ ἑοικόσι habent vulgata exēplaria, idest, semper uiuo minori similib⁹, sed legendū, vt annotat Dodon. ἀσάρῃς ἑοικόσι, μικρὰ,

Genera.

Lib.25.c.8.

Lib.3.c.4.

Forma.

ARISTOLOCHIA Fœmina,
sive rotunda.



ARISTOLOCHIA Longa,
Matth. Clematidis Pena & Lob.



μυρσά, id est, asaro similibus, paruis.) flores ruræ, radices longiores, tenues, cortice crassio & odorato vestitos. De iisdē & Pistolochia sic scribit Plinius. Inter nobilissimas aristolochiæ nomē dedidisse grauidę videtur, quoniā esset ἀειστὴ λοχίσσας. Nostri malū terræ vocāt, & quatuor genera eius seruāt. Vnum tuberibus radicū rotundis, foliis inter maluā & hederā, nigrioribus, mollioribusq;. Alterū masculæ, radice lōga, quatuor digitorū longitudine, baculi crassitudine. Tertiū lōgissimæ tenuitatis, vitis nouellę, cui sit præcipua vis, quæ clematis vocatur, ab aliis Cretica. Oēs colore buxæ, caulibus paruis, flore purpureo, ferūt bacculas paruas vt capparis. Valēt radice tantū. Est & quę pistolochia vocatur, quarti generis, tenuior quā proximē dicta, densis radicis capillamētis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidā Polyrrhizon cognomināt. Odor omniū medicatus, sed oblongæ radici tenuiori q; gratior: carnosī enim est corticis, vnguentis quoq; nardinis conueniens. Has quatuor aristolochias medici & pharmacopœi Monspeliēses dudum notissimas & vsu receptas habuerunt. Id quod etiā affirmat Pena. Ac primū, inquit, animaduertat rei herbariæ studiosus tantā esse trium, rotundę, longę, & pistolochię Plinianę in foliis, caule & flore similitudinē, & tam parem formā, vt ne perspicaciori quidē & exercitatiōi interdū liceat nō decipi. Nam foliū omnibus ferē rotundum, magnitudine fermē pari, ē caule lento, flexili: floribus color partim ex luteo nigricat, forma omnibus eadē. Vnde discrimē vel attentius intuenti vix patet inter tres istas aristolochias, nisi radix centiorē faceret. Rotundæ radix rapo similis, iam valde nota Italiæ & Galliæ Narbonēsi. Folia aliquantū rotundiora, & nigriora quā longę aristolochiæ, nō pistolochię, vt plurimū: nam situ mutari possunt & solent, flores itidē vt folia, obscuriores: per messes turgent lagenulæ nuci muscatæ pares, semine fusco prægnātes, ad basim cōpresso, & apice donato. Aristolochiæ lōgæ radix forma digiti cū pusilla, qualē videtur describere Dioscorides, cū verō prouecta, quadruplō maior, foris colore fusco vel atro, intus flauo, cētaurij magni colore. Pistolochiæ radix multis est fibrata capillamentis ellebori modo,

prolixioribus tamē, & ex atro flauētibus. Adhæc toto habitu aliquāto minor est: verū gratior eius odor multō, & magis aromaticus: nulla alia neq; folij, neq; florum aut pomorū differentia, vti neq; seminis. Clematidis radix est exilis, odorata, multō proceriore fruticat sarmento, viticeo, cubitali, flore luteo, caule cubitali, fructu ob-

Lib.I.Anti. longo, magnitudine parui oui, semine intus lato. Hæc in vineis plurima reperitur, & aruis frigidioribus reliquæ Gallia, ac Italia: Germania etiã & Flandria spõte natam habet. Matthiolus & Pharmacopœi genuinã longã esse cēsant. Hanc falsò mul-
 Lib.I.purg. ti crediderūt esse, quæ ab Andromacho & Galeno ἀριστολόχια λεπλή, id est, aristolo-
 Cap.I. chia tenuis dicitur, theriacis aptior, quæ est aristolochia polyrrhizos, tū suavi odo-
 Lib.2. stit. ris gratia, tum medicata efficaciorē facultate præferēda rotundæ, & longæ, nedum
 Hispa.c.23. clematidi, quæ viribus inferior est. Dodonæus Aristolochiæ species quinque cōstituit, Rotundã, Longã, clematitim, Pistolochiã, Aristolochiam Sarracenicã. Clusius qua-
 tuor. Rotundã quidē, Longam, Pistolochiã easdē, quas Dodonæus, Clematitim ve-
 rò duplicē fecit, priorē eam quæ à Dodonæo Aristolochia Sarracenicā dicitur, alte-
 rã quæ eidem Dodonæo etiã est Clematitis. Rotundæ vnicã speciē veteres fecerunt Anguillara plures inueniri scripsit. Clusius duas dūtaxat se obseruasse ait. Prior hîc picta multis ex vna radice germinibus, cubitalibusq; interdū palmitibus cōstat, qua-
 drangulis, quibus ex interuallis folia hæret mediæ inter maluã & hederã magnitu-
 dinis, mollia, venosa, ex viridi nigricãtia, breui pediculo: his incumbūt oblongi flo-
 res, cauitubẽ modo, ex purpura nigri teste Dio-

ARISTOLOCHIA Rotunda
Dodon. ff) Clusij.




scoride (ἀνθη λευχὰ, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἐρυθρὸν διυσιώδες, inquit Dioscorides, id est, flores albi, in quibus quod rubrū est grauiter olet: qui florū color sequēti rotundæ magis cōpetit) quorū labrū prominulum seu extima pars latior est quã in lōgæ aut clematidis flore, & tota nigricās. His succedit fructus rotūdus, parui melopeponis forma, q̃ multa grana cōtinet ordine disposita, lata, nigricantia, Radix ampla, tuberosa, rugosa, cortice crasso, foris nigro, intus buxæo colore. Nascitur pingui solo, in pratis, & humidioribus agrorum marginibus. Hispaniæ, & Galliæ Narbonensis, atq; etiã Italiæ. Floret in calidiorib⁹ regionibus ineunte vere, alibi Maio & Iunio. Altera ramulis seu palmitib⁹ prioris, foliis ferè Lōgæ forma & colore, sed maioribus, longioreq; quã superioris pediculo: flos longior, ex albo purpura scēs, intus nigricās, Longæ flori similis: fructus priore lōgior, & piri modo turbinatus, gracilior tamen quã Longæ, semine prioris, rufo, minore radice tubere, in reliquis superiori simili. Longam Clusius eandē quam Dodonæus & Pena,

descripsit, cui cauliculi quadrati, duos palmos lōgi, interdum longiores, multis alis brachiati, & humi vti rotundæ diffusi, folia quàm illius minora, firmiora, dilutiore colore, longiorēque pediculo, Soldanellæ ferè forma: flos oblōgus concauus, ex viridi candicās, rotundæ alterius effigie, sed extima parte colore magis herbaceo, intus vt in reliquis hirsutus, fructus piri instar turbinatus, qui per maturitatē reliquarum Aristolochiarū modo dehiscēs, semen ostēdit latū & rufum. Huius radix digiti est crassitudine Dioscoridi, & dodrātali lōgitudine, quod de triēnibus & iuniorib⁹ plātis intelligendum putat Clusius: nam adularum longè amplior est magnitudo: multas enim se eruisse asserit, quæ crassitudine brachiū, longitudine dimidiū cubitū æquarent. Adultæ verò omnes plerūque extrema parte obtusæ sunt, æquali ferè per totam longitudinē crassitie & citra extremū ramosæ: iuniores gracilescent, multasque fibras habet. Prouenit locis cāpestribus in Gallia Narbonensi. In longa etiam

*ARISTOLOCHIA**Longa, Dodon. & Clusij.*

etiam differentia quædã obseruari potest. Nam Hispanicæ (tametsi huic per omnia similis) flos diligentius inspicientibus nonihil differre videtur, quippe cuius extima pars interiore parte purpureicoloris sit, qui in alia herbaceus est: radix item huius extrema parte, non ut alterius gracilis est in nouellis plantis, sed plerumque obtusior. Nascitur inter vites in Hispania, agro Valentino frequentissima, ubi Martio floret, & semen fert: alibi frigoris impatiens. Clematidis supradictas magnitudine superat, caule firmo, rotundo & striato, supra cubitalē altitudinem assurgente: huius folia reliquis multo ampliora, ex viridi pallescentia, longo pediculo, forma Longæ referentia: flos pallidus, copiosus, Longæ propemodum forma, quo dilapso fructus subsequitur reliquis maior, exigui mali magnitudine, semen continens, ut reliquarum Aristolochiarum. Huius radix quæ reliquis cum grauitate quadam odoratior est, tenuis, & nunquam ad minimi digiti crassitudinem accedens, longè lateque serpit, & altissimè mergitur, adeo viuax, ut etiam frustulatim cōcisa facillimè renascatur.

Loca amat editiora, & nonnullis Galliarum Narbonensis vinetis adeo frequēs, ut vina ab ea ingratum saporem contrahant. Inuenitur & in plerisque aliis Galliarum, Hispaniarum, Germaniarum & superioris & inferioris locis. Floret quo reliquæ tēpore. Hac pro legitima Longa à plerisque usurpatur, Gallis *Sarrasine*, Narbonensibus *Foterne*.

*ARISTOLOCHIA**Longa, Fuchf.**ARISTOLOCHIA Sarracenica**Dodon. Clematidis prior, Clusij.*

Huc refert Clusius id Aristolochiæ genus quod circa Hispalim itinere Olysi-
ponensi, plurimisq; aliis Bætici locis, vbi *Sarza parilla* nominat, in dumetis, veprib⁹,
& vetustis quibusdā oliuetis observavit, lōgis, venosis, tenuibus, striatisq; farnētis,
quibus vicinas sepes & interdū arbusculas superat, iis sese cōvoluens & implicans
cōvoluuli, aut lupuli modo. Folia illi Aristolochiæ generibus similia, siue potius
Hederæ, firma, in extremo acuminata, supernè lævia & viridia, infernè ex purpura
albiciat, pediculo longo: flos Aristolochiæ lōgæ, recurvus, oblongus, ex purpura
niger, intus tenui lanugine plenus, longissimo omnium pediculo insidens: fructus
reliquis Aristolochiis similis, semē etiam simile: radix prælōga, farnēticia, Smilacis
asperæ modo (cui persimilis est) nunc per summa serpens, nunc altè sub terra sese
condens, colore pallido, nō ingrati saporis, sed gustu aliquantulum adstringentis
cū manifesto calore. Tota planta odorata est, semperq; istic viret, Ianuario, Februa-
rioq; florēs. Nascitur pingui solo, iis qui dicti sunt locis. Huius neminem meminisse
ait Clusius, præter Belloniū, qui in Creta se observasse scribit. Dodonæus tamen
eandē Clematidis nomine depinxit. Pistolochia Dodonæi & Clusij eadē est, quæ

Li. I. Obser.
cap. 17.

ARISTOLOCHIA Clematidis, Dodonæi.



cauliculus magna ex
parte pedales habet;
nōnunquā maiores,
angulosos, striatos,
Aristolochiæ longæ
modo ramosos, sed
tenuiores: folia lōgæ
similia, nigriora, mi-
nora, rugosiora, &
aliquantulum in am-
bitu sinuosa: florem
rotundè priori simi-
lem, minorem tamē,

PISTOLOCHIA, Clusij.



PISTOLOCHIA, Dodon.



& aliquando

& aliquando nigrū, aliquando ex herbido luteū: fructū rotundæ similitudine, sed minorem, semen etiā simile. Dēsis est radicis capillamētis, iunci, vt Plinius ait, plenioris crassitudine, buxæ colore. Prouenit in oliuetis, & petrosis Hispaniæ Galliciæq; Narbonēsis locis. Seriū floret reliquis Aristolochiarū generibus: ac hoc peculiare eius fructus habet, vt dū maturuit, ea qua pediculo adhæret parte dehiscat, Longæ verò ab extrema parte. Aristolochia rotunda, vt Dioscor. scribit, cōtra alia venena valet. Longa verò drachmæ vnus pondere cum vino pota & illita, aduersus serpentes & letalia. Menses, fœtus, & omnia in vtero cōsistentia partus purgamenta cum myrrha & pipere pota, & illita pellit. In pessa subdita eadem efficit. Rotunda ad eadē omnia ad quæ prædicta conducit, ampliusq; asthmati, singultui, rigori, lienī, ruptis, conuulsis, laterisq; doloribus ex frigida aqua pota auxiliatur. Surculos & spicula extrahit: squamas oīsiū illita educit, putrescentia circū exest, ac veluti scarificatu separat, sordida vlcera expurgat: caua cū iride & melle explet: extergit gingiuas & dentes. Creditur & Clematis ad eadē prodesse, viribus tamē inferior est. Valent radice tantū, inquit Plinius. Rotunda cōtra serpētes. Oblonga tamen in summa gloria est, si modò acōcepta admota vuluis in carne bubula mares figurat, vt traditur. Quæ polyrrhizos cognominatur, conuulsis, ruptis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua vtilissima esse proditur: semine pleuriticis & nervos cōfirmare, excalfacere. Et alio in loco. Plurimis modis Aristolochia prodest: nā & menses & secūdas ciet, & emortuos partus extrahit, myrrha & pipere additis, pota vel subdita. Vuluas quoq; procidētes inhibet fotu, vel suffitu, vel subiectu, maximē tenuis. Et vulneribus capitis medetur Aristolochia, fracta extrahens ossa, & in alia quidē parte corporis, sed maximē capite: similiter pistolochia. Sed de his distinctiū Galenus scripsit. Aristolochiæ radix ad medicationes vtilissima est, amara & subacris. Sed ex illis tenuissima est rotunda, & in omnibus efficacior. Aliarū verò duarū Clematis vocata magis odorata est. Itaq; ea ad vnguēta vtūtur, sed ad sanationes infirmior. Lōga verò minū tenuis est quā rotūda, sed nec ipsa inefficax: verū abstergēdi & calefaciēdi facultatem habet, minū tamē quā rotūda abstergit, atq; digerit, sed nō minū calfacit, imo fortassis etiā plus. Itaq; in quibus vsus est mediocriter abstergere, cōmodior est longa quemadmodū in carnis exulcerationibus, & in vteri fomentatu. In quibus autem crassum humorem validiū extenuare oportet, illic vsus est rotūda. Quapropter dolores ab obstructione aut crassitie crassorū flatuū natos magis curat rotūda, & surculos extrahit, & putredines sanat, & sordida vlcera expurgat, ac dētes gingiuasq; cādidās efficit. Auxilio est asthmaticis, singultiētibus, comitialibus, podagricis cum aqua frigida pota. Ruptis etiā cōuulsisq; vt si quod aliud medicamentū, idonea est. Paulus Æginet. Aristolochiā Clematitim inter medicamēta simplicia quæ bilē purgāt, recenset. Ætius pituitā ac bilē vacuare scribit. Cū igitur Clematidis, inquit Clusius, huiusmodi facultatibus prædita sit, & illius vsus in omnibus ferē iis morbis commendetur, quibus vtilem suam *Sarzam parillam* scribunt Hispani: Clematidis itē illa peregrina, & Clusij iudicio legitima, multis notis cum Sarzæ parillæ descriptione cōueniat, & eodem nomine ab incolis donetur, in ea ferē est sententia Clusius eam esse veram Sarzamparillam, aut illi congenerem plantam.

R H O D I A R A D I X.

C A P. X L V I I.



Græcis ῥοδιά ρίζα dicitur, à Latinis Rhodia radix ἀπὸ τῶν ῥόδων, id est, à rosis, quarum odorem spirat, vt Latine Rosea radix dici possit, Gallicè *Racine sentant les roses*, Germanicè *Rosenuurtz*. Hanc paucis perstrinxit Dioscorides, Rhodia radix, inquit, nascitur in Macedonia, costo similis, sed leuior, & inæqualis, quæ cōtrita rosas redolet. Hanc sic depinxit, & pluribus notis deliniauit Matthiolus. Caules edit rotundos, quadamtenus

Lib. 3. ca. 4.
Vires &
Temper.

Lib. 25. c. 8.

Lib. 26. c. 15.

Lib. 25. c. 11

Li. 6. simpl.

Lib. 7.

Nomina

Li. 4. ca. 41.

Forma.

Ca. 41. li. 4.

tenus cauos, cubitales, à quibus circūquaque folia prodeunt longiuscula, in acurum definentia, portulacæ aut sedi instar pinguia, minutimq; per ambitū ferrata.

R H O D I A Radix.

Locus.

*Lib. 4. c. 41.
Vires &
Temper.*



In caulium summitate umbellam profert viridem, tithymali cyparissia modo, sed quæ cū defloruerit, rubescat. Radix ei inæqualis, strumosa, crassa, qualis pseudocosto, quod ex Gargano monte aduehitur. Illa recens exterius splendescit, intus subalbida: sicca verò, intus rubra, fibris squamosa. Mansa hæc recens, aut trita, odore rosas refert, vnde meritò ei Rhodia nomen. Præterea omniū viuacissima est, quippe quæ è terra effosa, nisi locis admodum siccis reponatur, post multos menses rursus plātata repullulet. Nascitur in altissimis montium rupibus, saxosis præruptisq; locis. Vtilissima capitis doloribus, inquit Dioscorides, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur. Scribit Galenus eam quæ in Macedonia nascitur, tenuium esse partium, & discutiētis facultatis. In calefaciendo verò secūdi esse excessus, aut tertij incipientis. Cum tamē ad omnes capitis dolores valeat, à quacūque causaproueniētes, si recēs cōfracta, & aqua rosacea perfusa cū calidus fuerit affe-

ctus, aut ex amaraci aqua fronti temporibusq; illinatur, præterea cū cerebrum roboret odoris iucunditate, temperatis qualitatibus præditam esse verosimilius est, quàm secundo excessu, aut tertio incipiente calidam esse.

SALIVNCA Neapolitana.

C A P. XLVIII.



SALIVNCAE hoc genus Neapoli missum, in Apulia montibus nascitur. Quidam folium odoratū esse putant, à Malabathro diuersum, quod apertissimè monstrat Iurisconsultus, lib. 39. Digest. Titulo, de publicanis & vetigalib. Cæterum eos falli ex eo perspicuum est, quod & folium & Malabathrum Indis peculiararia sint, & ad nos inde vehi soleant. Pharmacopœi quidam Itali eam pro folio Theriacæ immiscent, quàm rectè, ij viderint. In tam exigua planta conspicua est radice crassities, rugosa, vtcūque flauescens, in nodos extuberantis, fibris capillatæ è quorū lateribus hinc inde folia prodeunt, vt ex ea figura serpere radicem, & æditis illis nodis sese propagare non abs re existimem. Folia illa oblonga sunt, angusta, plātagini vtcūque similia, in fernè arcta, supernè latiora. Sapore & odore planta ista Valerianam refert, vt non dubitem ob odoris

suauitatem, & saporis qualitatem egregiis aduersus morbos variis facultatibus præditam esse, ac folij loco substitui posse.



HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER NONVS,

*In quo planta omnes quæ in Palustribus proueniunt,
probè describuntur & ad viuum depinguntur.*

I V N C I, CAP. I.



VSTRANDIS agris potissimū per messes conceptos æstus frigidis solemur vmbis palustrium plantarum, & earum quæ in vmbrosis, vdis, vliginosis & pinguibus gignuntur, quæ magna ex parte, aut foliū in medio carinatum, & tanquā ex foliis duobus coagmentatum habent, vt Arundo, butomus, cyperus, aut intrinsecus amplo meatu pertusum, vt iuncus, animaduertendo errore nostrorum exemplarium, in quibus apud Theophrastum legitur, cap. 16. lib. 1. Histor. καὶ τὸ μέσον οἶον τρόπισ, ὅθεν τοῖς ἄλλοις, &c. cum legendum sit,

οἶον τρόπισ, ἐνδοθεν δὲ τοῖς ἄλλοις, &c. In hoc tamen secessu minimè simus otiosi, sed varias iis in locis plantas disquiramus, tum quæ à veteribus, tum quæ à recentioribus sunt obseruata, facto ab iis quæ notiores sunt initio. Quæ autem plāta Iunco notior? Dicitur is Græcis Σχοῖνος à loris & funibus, sicut Latinis Iuncus à iungendo, Arabibus *Dis*, Gallis *Ionc*, Italis *Giunco*, Hispanis *Iunco*, Germanis *Bintzen*. Dioscorides Iunci genera ponit his verbis. Iunci duo genera: vnum leuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. Vnum sterile, alterum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est Iuncus qui vocatur Holoschænos, &c. Galenus aliter ea genera distinxit. Schænos *ἑτα*, inquit, quædu oxyshænos, alia holoschænos nuncupatur (deprauatè tamen in vulgatis codicibus legitur oligoschænos) Gracilior duriorq; oxyshænos, crassior laxiorq; holoschænos. At oxyshæni duæ sunt species, altera sterilis, altera semen fert, &c. Theophrastus verò sic: ἔστι δὲ αὐτῶ (χοίνης) τρία εἶδη, καὶ θάπερ τινὲς διαίρεσιν. ὁ τε ὀξύς καὶ ἀκαρπός, ὃν δὴ καλεῖσιν ἄρρενα, καὶ ὁ ἀκαρπιώδης, ὃν μελαγκρανὶν καλεῖσιν, διὰ τὸ μέλανα τὸν καρπὸν ἔχειν. παχύτερος δὲ τὸς καὶ βαρυνέστερος καὶ τεῖτος τῷ μεγέθει, καὶ τῇ παχύτητι καὶ δὲ βαρύνει διαφέρων ὁ καλεῖσιν ὀλόχοινος. Quæ Plinius his verbis expressit. Tria genera eius (Iunci) acuti, sterilis, quem marem, & oxyn Græci vocant: reliqua fœminini, ferentis semen nigrum, quem melancranin vocant. Crassior hic & fruticosior: magisque etiānum tertius, qui vocatur holoschænos. Sunt igitur Theophrasto & Plinio, Iunci genera duo. Oxyshænos mas, Oxyshænos fœmina. Tertium holoschænos, vt non sit oxyshæni species. Ex quibus suspicari licet corruptos esse vulgares Dioscoridis codices, in quibus Iuncus in læuem & oxyshænum distribuitur: Oxyshænos in sterilem, frugiferum, & in tertium holoschænum. Hic enim tertia Iunci species statuitur

Nomina
Lib. 4. c. 47.
Genera.

Li. 8. simpl.

Lib. 4. hist.
ca. 13.


Li. 21. ca. 18.

statuitur holoschœnos, quæ diuisionis totius altera pars est. Iuncus enim læuis alius oxyſchœnos, alius holoschœnos. Quare ex Galeno qui caput de Iunco, vt alia tranſcripſit ex Dioſcoride, ſic emendanda videntur eius exemplaria. Σχοῖνος λεῖτα ἀποξυς ἐπ' ἀκρῶς. τῆς αὐτῆς διαιρέσεως εἶδος, τὸ μὲν διὰ τὴν ἀκρῶς ὀξύχοινος. τὸ δὲ ὀλόχοινος. Τῆς δὲ ὀξύχοινος δύο εἰσὶν εἶδη. ἢ μὲν γὰρ ἀκρῶς, &c. Ideſt, Iunci læuis in acutum faſti- giati duo ſunt genera. Vnum oxyſchœnos, alterū holoschœnos. Rurſus oxyſchœ- ni duæ ſunt ſpecies, altera ſterilis, &c. Vel, vt Theophrastus & Plinius diuidunt, tria intelligamus Iunci læuis & acuti genera à Dioſcoride conſtitui, ſitq; idem χοῖνος ὀξὺς Theophrasti, qui ὀξύχοινος Dioſcoridis. Igitur acuti Iunci ſiue oxyſchœni duo ſunt genera. Alterum ſterile, alterum frugiferum: tertium genus eſt holoschœ- nos, carnoſior & craſſior reliquis duobus: vt ſit holoschœnos ex τῶν ἀποξέων ἐπ' ἀκροῦ genere, cui generi Theophrastus etiam & Plinius ſubiiciunt. Hæc ſi quis cum Theophrasto conferat, maximè conſentire perſpiciet. Hanc diuiſionem Al- dinum exemplar diuerſum ab aliis quos ſecuti ſunt interpretes, videtur exprime- re: ſic enim habet: Σχοῖνος λεῖτα. Τὸ μὲν τοι αὐτῶς καλεῖται χοῖνος λεῖτα, ὃ δὲ ὀξύχοινος ἀποξυς ἐπ' ἀκρῶς. διαιρῶν δὲ καὶ ταύτης εἶδος. ἢ μὲν γὰρ ἀκρῶς, ἢ δὲ μέλανα κερπὸν ἔχῃ, πωρεφρῆ. παλύτεροι δὲ ταύτης οἱ κάλαμοι, καὶ σαρκοδέτεροι. ἔτι δὲ καὶ τρίτη πολλῶν σαρκο- δέτερα, καὶ παχυτέρα. (ſic enim legendum ex Theophrasti & Plinij locis antea citatis, non τραχυτέρα, vt habent omnia Dioſcoridis exemplaria) τοῖν δὲ δύοιν, ὀλόχοινος λε- γομένη. Ideſt, Iuncus læuis. Vnus quidem Iuncus læuis vocatur, alter oxyſchœnos in ſummo acutus: duplex autem eſt eius genus. Vnum quidem ſterile, alterum fru- ctum ferens nigrum, rotundum craſſiores huius ſunt calami, & carnoſiores. Eſt & tertium genus multò cornioſius & craſſius reliquis duobus, quod holoschœnos dicitur. Eadem planè eſt quæ apud Theophrastum diuiſio: hoc ſolū intereſt, quod Iuncum læuem & oxyſchœnum veluti duo genera illic fiunt, cum vnicum ſit teſte Galeno, vt diximus. Eſt & id minimè prætereundum pro χοῖνος λεῖτα in Dioſcoride ex Hermolai viri eruditiffimi iudicio legendum videri χοῖνος ἐλεῖτα, ideſt, Iuncus paluſtris. Cui adſtipulatur Paul. Aegi. ſic ſcribēs. χοῖνος ἐλεῖτα, Ideſt, Iun- cus paluſtris: quibus ſubiicit. Paluſtris Iuncus duplex eſt: ſed eius qui vocatur oxyſchœnos, ſemen eſt ſomnificum: holoschœni autem di- cti minus. Rectè verò iuncus paluſtris dici vi- detur, vt ab aliis ſecernatur qui in aridis, ſaxo- ſis, ſiccaneisq; locis proueniunt: qualis eſt Iun- cus Arabicus ſiue odoratus, & Hiſpanorum ſpartum, Iuncus propriè aridi ſoli. Sic & Theophrastus de Iunco tractās, ἐκ τῶν ἐνὺδρων, ideſt, ex aquaticorū genere eſſe ait. Plinius nō χοῖνον λεῖταν, vel ἐλεῖταν, ſed γαλατλίαν legiſſe vide- tur, cum ſcribit. Alterum genus Iuncorum fe- cit quod marinum, & à Græcis oxyſchœnum vocari inuenio. Nos ex Dalechampij ſenten- tia rem paulò altiùs repetentes, Iuncos ſic partiemur. Iuncorum alij in aridis locis creſ- cunt, alij in aquoſis. Horum alij in maritimis proſiliunt, alij in aquis dulcibus. Rurſum vtriuſque generis horum, alij ſunt ἀπόξυς ἐπ' ἀκροῦ, ideſt, in mucronem pungentem deſinūt, alij in faſtigiū obtuſius. Sed de paluſtribus præſertim hîc agimus. Iunci paluſtris ſiue

aquatici,

In Corall.
33. lib. 4.
Lib. 7.

I V N C U S Læuis.



Lib. 4. hiſt.
cap. 13.
Li. 21. ca. 18.

aquatici, alius est λεῖος, læuis, alius τραχύς, idest, asper : alius fastigio acutiore, alius obtusiore. Iunci palustris læuis & ἀπόξενος ἐπ' ἄκρου, idest, in fastigio: acuti alius est oxyſchænos, alius holoschænos. Iam verò oxyſchænos duplex est. Alter mas nullo semine fœcundus, alter fœmina nigrum semen ferens, Melancranis nominatur. Ad hæc genera permultæ Iuncorum palustrium species referuntur: de quorum multis hîc tractabimus. Iuncus læuis oxyſchænos, vulgaris, foliorum loco stilos, seu culmos, seu virgas profert rectas, rotundas, tenues, læues enodes, cubitū

Forma.

IVNCVS Læuis & Oxyſchæn. Dodo.



IVNCVS Melancranis.




& sesquicubitum altas, herbaceo colore virentes nitentisque, acutis cuspidibus mucronatas, candida medulla refertas, ellychnium referente, & vſu ſupplente. Radiculæ ei quàm plurimæ, tenues, fibratæ, inter ſeſe implicatæ. Mas nullum fert fructum, fœmina paulò infra cacumen edit, ab vno latere findente ſeſe Iunco, in paruis breuibſque petiolis, coherentium paruarum vuarum modo, in quibus semen nigrū, exiguū, cuspidis effigie. Huic aliud Iunci genus proximum est, paulò breuius & craſſius, ex quo medullam prorsus niueam extrahunt, tum ad lucernarum lumina, tum ad candelabra, aliaq; id genus ingenioſè conſingenda, quod facile in ſpiras duci, atque in ſe flecti & cōplicari poſſit. Hæc duo genera in quibusvis ſtagnantibus & paluſtribus aquis naſcuntur. Iuncus læuis Dodonæi ſecundo loco hîc pictus est, alba quoque

Lib. 4. c. 52.

medulla plenus, longa, ad lucernas. vtili. Iuncus oxyſchænos eiſdem priore loco depictus ſuperiore paulò aſperior & durior, parū medullæ intus habens & minùs ſolidæ atque inutilis, locis deliuiſibus & aquoſis prouenit. Iuncus oxyſchænos fœmina quam non μελαγκρανισμόν, vt corruptè legitur in vulgatis exemplaribus, ſed μελαγκρανίδα Theophrastus vocat, Gaza atriferum vertit, alij haud ſœlicius atricipitem, radices capitatas profert, capis & gethyis ſimiles, non omnino rotundas, ſed qua parte aliæ aliis adherent & incumbunt, leuiter compreſſas, cortice nigro obductas, quæ infernè & ad latera radículas emittunt, in vnum ceſpitem, ſicuti in aſparagis coaceruatas. Inde prodeunt ſcapi ſeu ſcirpi multi, ſesquicubitales, nigra tunica propè radices conſecti, qui infra cacumen pedis ferè ſpatio extumeſcentes veluti clauā conſcipiunt, deinde pariunt ouo quid ſimile. Id porrò hians petiolos multos emittit, in quorū vertice mēbranofa & rotunda vaſcula, obliquè

adnexa in quinque veluti radios fissa, fructum continent angulosum, nigrum, cuspidatum, minutissimis seminibus & luteis plenum, saporis aquei & subausteri. Hæc cum diligentissimè Theophrastus expresse- rit, non possum non eius verba adscribere, tum vt Theophrasti Melancranin à nobis hîc depictam, tum vt locum eiusdem leuiusculis aliquot mendis correctis & interpretatione nostra illustriorem factum fuisse omnes intelligant. Κορυήν ὃ δ' ἁρπύριος ἔχει (κόρυνα ὃ ὅλως ὁ ἁρπύριος falsò habent exemplaria) ἐξ αὐτῆς γραμμῶδες ἐξοιδήσας, καὶ πειρὰ ἐκείνης καθα- περ ὡς. πρὸς μᾶλλον δὲ ἁρπύριος ἔχει τὰς περιεσπυρῶδες μίχας, ἐφ' ὧν ἁκρῶν παραπλα- γίς τὰς τῶν ἀστέρων ἔχει τροχυστότητας ἐπιχαλῶσας (alij ἐπιχαλῶσας legunt) ἐν τέτοις δὲ τὸ περιμάτιον ἀκιδῶδες ἔστι, μέλαν, πορρομεφές τῷ τῷ ἀστερίσκῳ, πλὴν ἀμυνηνότερον. Quæ sic Gaza conuertit. Omnino frugifer in callum de regulari furculo ipso tumescens, mox veluti oua parit, circundantes enim spicatum pediculos Iuncu lineari affixos initio gerit: quorum summitatibus paululò laterales orbes vasculorum leuiter hi- scentes inducit. His semen exiguum, effigie cuspidis sagittarum ingerit, nigrum, non absimile semini herbæ inguinalis, verum exilius. Dilucidius verò sic. Fœcun- dus Iuncus virgato lineis fastigio extumescens, velut clauam in summo gignit, deinde quasi oua parit. Etenim ex vno principio, pediculorum virgas spicarum modo congestas profert, & in earum vertice paulum à latere hiantia vascula ro- runda, in quibus semen cuspidis figura, nigrum, asterisco simile, sed fugacius. Hactenus Theophrastus, qui de Iuncu fœmina adiicit. ἡ μὲν οὖν μέλας γκρανὶς αὐτὸς τις καὶ αὐτὸν, ὃ δὲ ὄξυς καὶ ὀλόχοινος ἐκ τῆς αὐτῆς φύον: quæ Plinius sic transtulit. Melancra- nis sine aliis generibus nascitur. Oxys autem & holoschænos eodem cespite. At quæ de holoschæno mox subiicit. Fert fructum ouorum cohærentium modo, Theophrastus non de solo holoschæno fœcundo, sed etiam de oxyschæno fru- gifero dictum esse vult. Iuncus Melancranis nascitur in aquosis & pinguibus lo- cis, sed pura & præterfluente aqua ferè madentibus. Iuncum alium fœcundum

IVNCVS Clauatus, Dalech.



hîc ex Dalechambio exhibemus, quem Claua- tum meritò nuncupauit. Radix huic genicula- ta, graminis aut arundinis modo serpit, contra Iuncorum aliorum naturam, ex qua scirpi cu- bitales exeunt, in ipso exortu cortice rubro aut subrubro contexti, fungosa medulla, sed tenui pleni, extremo fastigio exiguum veluti clauam proferentes, plantaginis flori non absimilem, sed breuiorem & multò minorem, nec ita per- spicuis granulorum notis distinctâ, quæ Maio & Iunio mensibus florem mittit villosum & candicantem. In cœnosis & stagnantibus aquis nascitur. Sapor totius plantæ aquosus & fatuus. Idem qui Lobellio Iuncus aquaticus minor ca- pitulis equiseti dicitur. Holoschænus maior, crassior & carnosior est supra descriptus: cuius- modi est qui hîc exhibetur, radice innixus cras- sa, lignosa, nodosa, infernè fibras infinitas pro- ducente, rufo cortice obducta, ex qua scirpi exeunt permulti, quæ radici inhærent capitati gethyorum modo, & ibidem rufa tunica oper- ti, duobus cubitis altiores, sæpe tricubitales, superioribus duplò crassiores, fungo- sa medulla farcti, in vertice valido mucrone pungentes, tribus digitis infra verti- cem scapi dissiliunt, petiolosque multos edunt, foris læues ac teretes, intus veluti canaliculati

Lib. 9. hist.
ca. 13.

Lib. 21. c. 18.

HOLOSCHOENVS.



HOLOSCHOENVS

Altera.



canaliculati, rotunda ferentes capitula, quibus mense Iunio flos capillaceus & candicans insidet, egregiè desiccans cum læui adstrictione. Gaudet limoso solo stagnantibus aquis operato, quod æstate siccare solet. Potest etiam verus Theophrasti Holoschænos dici, qui hîc pictus datur, radice superiori simili, crassitudine ferè cubitali, cortice nigro intacta, intus candida, dulci, gustu castanearum, præsertim si quis tenella eius germina degustet, scapis proceritatem hominis æquantibus, sæpè excedentibus, minimi digiti crassitudine, medulla refertis. In summo prorsus vertice scirpi recluduntur, patefactiq; foras extrudunt petiolos intus canaliculatos, foris teretes vt in superiore genere, summo apice multos veluti iulos sustinentes, rufos, squamatim compactos, metæ figura, nimirum internè latiores, supernè acuminatos, sæpè quinos, interdum plures, interdum pauciores, qui semen continent milij magnitudine, altera parte cōpressum, altera do- so elato prominens, subausteri saporis. In perennibus aquis, interdum in solo arenoso prosilit. Qui natate discunt, huius scirpos in fasciculos colligunt, & alis subiiciunt, quos Galli *Nageoires* vocant, quasi natantium, vel natate discantium adminicula. Theophrastus cum tam de holoschæno quam oxyschæno fœcundis, quæ suprâ posuimus, dixisset, subiicit de holoschæni radice. ῥίζαν δὲ ἐχέει μακράν καὶ παχυστέρα πολὺ τῷ ὄξυσχοίνῳ ἀλλ' ἢ δὲ αὐαίνε) καὶ ἔχει τὸν ἐνὶ αὐτῷ. εἰθ' ἐλέρα πάλιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τῷ σχοίνῳ καὶ θίε). τὸ τοιοῦτον δὲ καὶ ἐν τῇ ὁψὲ φανερόν ἰδεῖν, τὰς μὲν αὐαίς, τὰς δὲ χλωρὰς καθεμένας. ἡ δὲ κεφαλὴ ὁμοία τῇ τῶν κρομμύων, καὶ τῇ τῶν γηθύων, συμπεφυκῆα πῶς ἐκ πλεονόντων εἰς ταῦτα καὶ πλεονέκτα καὶ τῶθεν, ἐχέει καὶ κελύφη ὑπὲρ ρυθρα. συμβαίνει δὲ ἀν' ἰδίον ἐπὶ τῶν ῥιζῶν, ὅτι αὐαίνον) καὶ τ' ἐνὶ αὐτῷ, ἢ ἢ τῷ ἀνωθεν πάλιν ἢ γενέσις. Idest, Gaza interprete, Radice longa adheret, multoq; crassiore quā acutus. Hæc omnibus annis moritur, dein altera rursus à Iūci cacumine defigitur: quod vel visu percipi facile potest: quippe aliæ siccæ, aliæ virides demissæ cernuntur. Caput cepis & gethyis simile, vt pote quod in vnum ex pluribus conglobatum

Lib. 4. hist. cap. 13.

prælatumq; inferiùs, tegumentisq; subrubris intactum constet. Ergo proprium his radicibus euenit, si quidem per annos exarescant, ac desuper generentur. Quæ fortassè rectiùs sic dici possent. Radicem longam habet holoschænos, & multò crassiore Iunco acuto, quæ omnibus annis intermoritur: deinde altera rursus ex Iunci capite renascitur: id quod cuius intuenti perspicuum est, alias nimirum

radicum fibras aridas, alias virescentes esse. Caput cepis & gethyis simile, ex pluribus coagmentatum, infernè latum, rubris tunicis opertum. Ergo his radicibus id peculiare est, quod singulis annis emoriantur, & rursus supernè ex radicis capite repullulent. Horum nonnulla Plinius, & eum, opinor, secutus Gaza rectè neque intellexisse, neque conuertisse videntur. Quas enim ille ex radicum capitibus radices quotannis exarescentes repullulare scribit, Plinius ait nasci ex semetipso cacumine in terram defixo. Grandis Iuncus in lacubus & stagnis nascens, Cordo holoschœnos dictus, aliis Iuncus latus palustris, ex radice obliqua emergit, fibris permultis capillata, ex qua folia lata admodum, & scapi, in quibus folia

I V N C U S Latus.



Ca. 52. li. 4.
Dioscor.
Lib. 2. c. 18.

In Coroll.
cap. 55.
Li. 4. Dios.

Ibidem.
Li. 16. ca. 37.

alia etiam lata per intervalla disposita, quò propius ad verticem accedunt, eò minora, omnia sensim in angustum desinentia, ensis figura. In summo scapo flores eminēt, deinde semen. Hunc Iuncum Cordus Mariscum. Latinis dici putat, de quo Plinius. Similia præcipit & de Iunco quem Mariscum appellant, ad texendas tegetes. Alij eum qui proximè depingetur Mariscum esse censent. Est enim vterque prægrandis & ad texendum aptissimus, ductilis ac vietus. Hermolaus holoschœnum Mariscum à magnitudine Latinis dictū putat, quemadmodū & Mariscas ficus, auctore Festo, quæ Græci Busyca, hoc est, grandiores & fatuas ficus. Huic adstipulatur Gaza, qui Theophrasti holoschœnum semper mariscū interpretatus est. Cui verò Iuncorum generi scirpum adscribemus? Videtur, inquit idem Hermol. palustris Iuncus idem cū scirpo esse: de iis enim sic scribit Plinius. Nec in fruticū, nec in veprium cauliūmve, neque in herbarū, aut alio vllō quàm suo genere numerentur iure scirpi fragiles palustrésque, ad tegulum &

tegetes, è quibus detracto cortice candelæ luminibus & funeribus seruiunt. Firmior quibusdam in locis earū rigor. Namque iis velificāt nō in Pado tantū nautici, verū & in mari piscator Africus, præpostero more vela intra malos suspendens. Et mapalia sua Mauri tegunt: proximèq; æstimanti hoc videantur esse quo inferiore Nili parte papyri sunt vsu. Hæc Plinius. Ob quæ, inquit Hermolaus, sunt apud nos qui scirpos, interpretentur, quos Græci biblos, id est, papyros vocāt. Sed fruticosi generis sunt enodes, & sine frōde scirpi, læues proceriq; vt Festus ait: vnde proverbiū quoque natū, nodū in scirpo queri, quod in anxīū dicitur, nimisq; diligentem ac meticulosum, quo Terentius in Andria vsus est: vbi Donatus, Iunci species est scirpus, inquit, læuis atq; enodis. Haudquaquā silentio prætereundus est Iuncus ille eximius, ab aliis diuersus, quem Matthiolus à speciosis floribus Iuncum floridum appellavit, Dodonæus in Historia stirp. pro Sparganio depinxit, & descripsit, In frument. Hist. Gladiolum aquaticum seu palustrē nominavit. Belgæ *Vuatter lijsh*. Folia à radice multa emittit, acori palustris angustiora longioraq; inter quæ caulis medius exit, duos cubitos longus, læuis, æqualis, sine vllis geniculis, in cuius summo multi erūpunt flosculi, longioribus pediculis insidētes in purpura diluti, in quibus stamina exigua crocei coloris: sequūtur capitula purpurea, ferè rotūda paruarū pilularū instar, & in eis semen minutū. Radix crassa, cādida geniculata

Ca. 47. li. 4.
Lib. 2. c. 38.

IVNCVS Floridus, Matth.



IVNCVS Asper, Dodon.



culata, quamplurimis fibris capillata. Nascitur locis palustribus in stagnatibus aquis, & lente fluctibus riuulis. A Maio ad Augustum usque floret. Lobellius & Pena Iuncum Cyperoidem floridum nuncuparunt, quia ad Cyperum accedit foliis & umbella. Iuncum aliud Bombycinum memorat Pena, De quo hoc ipso libro dicemus Lini pratensis nomine. Haecenus de Iunculo laevi, deinceps de aspero dicendum. Iuncus asper merito dicitur qui hic exhibetur, foliis valde longis, tactu asperis, penè triagulis, fungosa medulla plenis: radice densa, dura, fibras plurimas producente, & surculos ex obliquo, geniculatos, ex quibus flores & nouellae plantae prodeunt. Secus amnes, & in lacubus maioribus stagnisq; provenit. Hoc Iunci genere ad stercoras & tegetes texendas sternendis hyeme cubiculorum pauperculis aduersus vim frigoris Belgae uti solent: quas tegetes illi *Matten* vocant, Parisienses *Nattes*. Dodonaeus hunc Iuncum papyri speciem, atque etiam arundinem texendis tegetibus aptam vocat. Vluæ grandioris genus quidam esse censent. Alij Iuncum Mariscum Plinij ad texendas tegetes. Alij Bryon lacustre Theophrasti, lib. 4. Hist. cap. 12. Alij Caricem Latinorum. Iuncorum usus ad nassas marinas, ait Plinius, vitilium elegantiam, lucernarum lumina, praecipua medulla, amplitudine iuxta maritimas Alpes tanta, ut inciso ventre impleat penè uncium latitudinem, in Aegypto verò cribrorum longitudinem, non alias vtiliorem. Qui locus Cornario suspectus videtur, ut desit uncium numerus, deinde quænam est ista cribrorum longitudo? Sic ergo ex coniectura restituendum iudicat: amplitudine iuxta maritimas Alpes tanta, ut inciso ventre impleant denum uncium latitudinem, in Aegypto verò cybiorum longitudinem, non aliis vtiliorē. Denum uncium, id est, pollicum latitudinem dixit. Sunt enim æquè duodecim pollices in pede Romano, sicut in libra duodecim unciae: & proclive fuit vocem penè pro denum substituere. Deinde cybiorum longitudinem implere ait (vetus Cornarij codex cimbiorum vocem scriptam habet) eamq; longitudinem non esse aliis quam cy-

Lib. 4. c. 54.

Vfus.
Lib. 21. c. 18.Embl. 42.
lib. 4.

biis videlicet, vtiliorē, nimirum ut ipsis excipiantur ac colligantur. Cybiū autē appellari cōcisam pelamidē Plinius testatur. Hermolaus vulgarem lectionem secutus penè uncium latitudinem legit, & cribrorum longitudinem non alias vtiliorem. Ob id, inquit, cribrum significaturi Aegyptij Iuncum pingūt, Horo auctore, qui & in Aegypto Iucis scribi, nec aliter affirmat. Neque aliquid immutandum aut corrigendum videtur: nam seruata vetere lectione, Plinius intelligit tam amplios Iucos, iuxta maritimas Alpes

nasce, ut inciso ventre exempta medulla impleant vncia, idest, pollicis latitudinē, & in Ægypto tam proceros esse, ut dū ex his cribra fiant, ad eorū longitudinē perficiendā Iuncorū quisque sufficiat. *πρὸς τὰ πλέγμαζα*, inquit Theophrastus *χρησιμώτερος ὁ ὀλόχαινος, διὰ τὸ σαρκαῶδες καὶ μαλακὸν*. Quæ sic Plinius expreſsit. Vtilissimus ad vitilia holoschœnus, quia mollis & carnosus est. Iūco Græcos ad funes vsos nominari credamus, inquit Plinius, quo herbā eam appellāt. Vnde etiā funābuli schœnobatæ à Græcis dicuntur. Democritus ubi reperiatur Iuncus, subesse scaturigines aquarū, ibiq; aquilegia strui posse testatur. Sed de Iunci in medicina vsu dicamus. Semen tā oxyſchœni quā holoschœni tostū, ex diluto vino potū sistit aluū, & rubra fœminarū profluuia, auctore Dioscoride: vrinā cit, capitisq; dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera cōueniēter illinuntur aduersus phalangiorū morſus. Æthiopici Iunci semine somnus allicitur: sed modus in potionē seruādus est, ne sopor fiat. Quæ postrema sic Græcè leguntur, *φυλάττω τὸ δὲ αὐτὸ ἐν ταῖς πόσει* *τὸ πλῆθος ἀεί, καὶ οἱ ὀλίαν*. Expēdere autē oportet semper quantitatem quam ex eo propinabimus: quandoquidē est maximē soporiferū. Vel, ut tranſtulit Cornarius, Æthiopicus Iuncus somniferū semē habet. Sed vitāda copia est in potionibus, ne nimium soporē inducat. Est autē Æthiopici Iunci lectio suspecta: alij Euripici legunt ex Plinio. Inuenio etiānum, inquit, vnum Iunci genus, quod Euripicē vocant: alij Tropicē legunt, ut non minū hīc, quā illic mēdosus locus esse videatur. Galenus, Paul. Aetius holoschœni semen somniferum esse tradūt, itemq; oxyſchœni, sed minū quā holoschœni. Serapio qui ad verbū Dioscoridis caput trāscripsit, nullā Æthiopici seu Euripici mentionem facit, sed, ut Galenus & alij, tertij Iuncorum generis, idest, holoschœni, his verbis. Et fructus speciei tertiæ bibitus inducit somnū, & oportet quod caueatur multus vsus eius, quia facit subet. Tot igitur, iisq; probatissimis auctoribus in ea lectione consentientibus, minimē dubitandū esse puto, quin in Dioscoride legēdum sit holoschœni semine somnū allici, nisi fortasse æthiopici holoschœni semen id magis efficiat quā nostratis: quod tamen superiorum auctorū nullus, nō solum Æthiopici holoschœni semini non tribuit, sed eius ne meminit quidem. Quæ de eiusdem plantæ viribus à Plinio tradita sunt conferamus cum iis quæ ex Dioscoride exscripsimus. Iunci radix, ait ille, in tribus heminis aquæ decocta ad tertias, tussi medetur. Semen tostū & in aqua potum, sistit aluum & fœminarū menses, capitisq; dolores facit. At qui vocatur holoschœnos, eius quæ proxima sunt radici, cōmanducatur aduersus araneorum morſus. Inuenio etiānum vnū Iunci genus, quod Euripicē vocant. Huius semine somnum allici, sed modum seruandum, ne sopor fiat. Quod de Iunci radice hīc scribitur, Dioscorides non habet: quæ mox sequuntur cōsentiunt, nisi quod in aqua potum pro *μετὰ κρέμας* Plinius dixit: est autem *κρέμα* vinū aqua dilutum. Deinde *ῥοῦν ἐρυθρον* menses, suo more interpretatur. Quod sequitur alienum est à Dioscoridis sentētia. At qui vocatur holoschœnos eius quæ proxima radici, &c. In quibus vox folia deest ex Cornario reponēda, & Dioscorides ea nō cōmanducari, sed imponi vult. Idem Plinius Iuncinum oleū è Iunco fieri scribit, quod est rosaceo simillimum. Sed de Iunci temperamēto & viribus omnium optimē differt Gal. his verbis. Fructus holoschœni somnū affert. At oxyſchœni duæ sunt species, altera sterilis, cuius quidem in medicina nullus vsus est: altera verò semen fert: cōciliat verò & huius semen somnū, sed minū quā holoschœni: quāquam tamen hoc caput tentet. Vtrumque si fructum cum vino bibatur, ventris fluxus desiccet, & muliebre profluuium rubrum sistit. Ex quibus perspicuum est quod composita eorum temperies est, ex terrena videlicet essentia leuiter frigida, & aquea leuiter calida, ut & inferna desiccare possint, & sensim frigidos ad caput vapores submittere, quibus somnolentos efficiant.




ΚΥΠΕΙΡΟΣ, Latine Cyperus & Cypirus, Plinius tamen cyperum à cypiro distinxit, qui cum Dioscoridis cypero idem esse videtur, nec Galenus, Ætius, Paulus alium vllum quàm cyperum nostrum agnoscunt. Cornelius Cels. quadratum iuncum vocat, Plinius iuncum triangulum, & iuncum angulosum: eius verò radicem oblongam Cyperida, vt mox dicetur. Gaza apud Theophrastum gladiolum conuertit. Galli *Souchet*, nominant, Germani *Vuildergalgan*, id est, siluestrem galāgam, Arabes *Saherade*. Videtur autem κύπειρος siue κύπιρος dici à radicis effigie, quæ pyxidulam aut poculum pusillum, vasculumve imitatur. Sic etiam apud Theophr. κυπερίς τῆς πτελέας, id est, folliculus vlni legitur. Cyperus Dioscoridi folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem, aut maiorem, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est vsus, cohærentes inter sese, oleis oblongis similes aut rotundæ, nigro colore, suaui odore, amaro gustu. In lacunosis & palustribus nascitur. Plinius cyperum iūci genus facit, ideoque iuncis subiunxit. Quidam etiamnum vnum genus faciunt, iunci trianguli, cyperon vocant. Et paulò pòst. Cypèrus iuncus est, qualiter diximus, angulosus, iuxta terram cādīdus, cacumine niger, pinguisq; , folia ima porraceis exiliora, in cacumine minora, inter quæ est semen, radix oliuæ nigræ similis, quam, cum oblonga est, cyperida vocant, magni in medicina vsus. Theophrastus cyperum inter orchomenij lacus plantas recenset, & ἡ ῥίζα, inquit, τῆς κυπεύρου πολύτι τῶν ἄλλων παραλάττει τῇ ἀνωμαλίᾳ, τὰς δ' μὲν εἶναι παχύτι καὶ σαρκώδεις αὐτῆς, τὸ δὲ λεπτόν τε ξυλῶδες. Id est, cyperi radix multum inæqualitate à cæteris distat, quod pars quædam crassa carnosaque sit, quædam gracilis atque lignosa. Ex his perspicuum est cyperum hunc nostrum ab illo non differre, folia enim ei sunt longa, angusta, dura, porraceis similia, longiora tamen & tenuiora: caulis cubitalis, aliquando maior, triangularis, alba intus medulla, vt in iunco, in cuius cacumine folia minora, quadantenus stellatim disposita, inter quæ semen prodit spicatum, herbacei coloris, radices subnigræ, cohærentes, oblongis oleis similes, aut rotundæ, aliquando longæ, geniculatæ, summo cespite vagantes, succulentæ, suauissimo odore, inter sese implicatæ, fibris numerosis. Nascitur in palustribus & humecto solo. Solùm est in caule & radicibus discrimen, reperitur enim caulis quandoque quadrangularis, vnde iunci quadrati nomen ei à Celso positum. Dioscorides vtramque differentiam comprehendens, nec triangulum, nec quadrangulum dixit, sed angulosum. Præterea cyperi nostratis radices oblongas oleas non referunt, nec omnino rotundæ sunt, sed longæ sibi cohæsu mutuo implexæ, & multis fibris capillatæ. Sed hoc discrimen plures cyperi species esse, quàm à Dioscoride positæ fuerint tantum arguit, minimè verò plantam à nobis hîc depictam cyperum non esse. Est enim Cyperus peregrinus siue Syriacus rotundus maior & minor, auctore Pena. Nostras, longus odoratus, longus inodorus. His ad-

CYPERVS.




men, radix oliuæ nigræ similis, quam, cum oblonga est, cyperida vocant, magni in medicina vsus. Theophrastus cyperum inter orchomenij lacus plantas recenset, & ἡ ῥίζα, inquit, τῆς κυπεύρου πολύτι τῶν ἄλλων παραλάττει τῇ ἀνωμαλίᾳ, τὰς δ' μὲν εἶναι παχύτι καὶ σαρκώδεις αὐτῆς, τὸ δὲ λεπτόν τε ξυλῶδες. Id est, cyperi radix multum inæqualitate à cæteris distat, quod pars quædam crassa carnosaque sit, quædam gracilis atque lignosa. Ex his perspicuum est cyperum hunc nostrum ab illo non differre, folia enim ei sunt longa, angusta, dura, porraceis similia, longiora tamen & tenuiora: caulis cubitalis, aliquando maior, triangularis, alba intus medulla, vt in iunco, in cuius cacumine folia minora, quadantenus stellatim disposita, inter quæ semen prodit spicatum, herbacei coloris, radices subnigræ, cohærentes, oblongis oleis similes, aut rotundæ, aliquando longæ, geniculatæ, summo cespite vagantes, succulentæ, suauissimo odore, inter sese implicatæ, fibris numerosis. Nascitur in palustribus & humecto solo. Solùm est in caule & radicibus discrimen, reperitur enim caulis quandoque quadrangularis, vnde iunci quadrati nomen ei à Celso positum. Dioscorides vtramque differentiam comprehendens, nec triangulum, nec quadrangulum dixit, sed angulosum. Præterea cyperi nostratis radices oblongas oleas non referunt, nec omnino rotundæ sunt, sed longæ sibi cohæsu mutuo implexæ, & multis fibris capillatæ. Sed hoc discrimen plures cyperi species esse, quàm à Dioscoride positæ fuerint tantum arguit, minimè verò plantam à nobis hîc depictam cyperum non esse. Est enim Cyperus peregrinus siue Syriacus rotundus maior & minor, auctore Pena. Nostras, longus odoratus, longus inodorus. His ad-

CYPERVS Longus
odoratior, Lobell.




dit Cyperum gramineum, & Veronensium Trafos, cyperi congeneres, quos Cyperos esculentos vocat, de quibus egimus in libro de Bulbosis. Lobellius tres Cyperos proposuit. Primus est Cyperus longus odoratior, Belgis & Anglis *U-vilden Galegaen*, & Galingua dictus, Hispanis *Inucia olorosa*. Is maior, habitior, carnosior, & odoratior est: radices illi longæ, inter sese implicatæ polypodij modo, suavisimi odoris. Alter est Cyperus aquaticus septentrionalis, qui in scrobib⁹ & riuulis ad Scaldæ amœnissima fluenta ponè nouam Antuerpiam urbem, iisdem foliis & iubata panicula prouenit. Radix nonnullas sed paucas, teretes, oliuares, oblongiores, instar filipendulæ emittit glandulas, gustu adstringentes, nulla odoris gratia. Tertius, Cyperus rotundus litoreus inodorus, in borealis Angliæ & Belgij fluminum litoreis lenitèrque fluentium riuulorum & maris alluionibus oritur, radicum longè latèrque sparsa sobole, multis & bicubitalibus implicatarum filamentis, cypero rotundo parium: folia angulosa sunt, caulis cubitalis & sesquicubitalis, nitidus, triquetrus, in quo racemosa iuba, congesta. Gustu subabstringit: radix frigida & sicca, odoris & saporis expers. Huc accersit Pena Cyperum Gramineum, seu Miliaceum, suadente caule natalique loco. Est enim inodori cyperi quadantenus affinis, breuioribus tamen foliis, quæ ab imo orta medio tenus fermè caulem am-

CYPERVS Aquaticus,
Lobellij.



CYPERVS, Rotundus
inodorus. Lobell.



biunt

CYPERVS Gramineus seu
miliaceus, Pena.

sesque prouocant. Hæc Galenus. Cyperi radicum farina, addita baccarum lauri eadem mensura, vrina impubis pueri excepta & illita, hydropicos mirificè iuuat.

biunt pedalem, ternis angulis asperum, coma donatum sparsa, eleganti, & maiore quàm pro sui magnitudine, copioso milij aut iunci refer-
ta semine, circum cuius imum aliquot foliola enascuntur, vt in Cypero. Collectus est ad Nec-
carũ flumen agri Heidebergenfis. Cypero ca-
lida vis inest, vt scribit Diosco. Venarum spira-
cula laxat: vrinam ciet: ad calculos, aquàmque
subter cutem vtilissimè bibitur: aduersus scor-
pionum ictus remedio est: perfrictionibus vul-
uæ & præclusionibus foru prodest: pellit men-
ses, contra vlcera oris etiam si depascant, vo-
rèntque farina efficax est, malagmatis calfacien-
tibus, & vnguentorum spissamentis benè adiaci
solet. Galenus de eiusdem viribus ita scribit. Cy-
peri radices maximè vsui sunt, excalfaciètes pa-
riter & exsiccantes absque mordacitate. Itaque
vleribus, quæ præ nimia humiditate cicatricè
difficilè admittunt, mirificè prosunt: habent
enim quiddam etiam adstringens, quapropter
vleribus, oris conueniunt. Quin & incidendi
vim quampiam illis inesse testificandum, quia
& calculo vexatis congruunt, & vrinam men-

Lib. 1. c. 4.

Temper.

& Vires.

Lib. 7. sum.

Matth. in
cap. 4. lib. 1.

ASPHODELVS PALVSTRIS.

CAP. III.



SVBIVNGEMVS iuncis plantã hîc
appinctam, ob magnam quæ ei est
cum iuncis quibusdam, præsertim
cum aspero similitudinem. Eam
vulgò anonymon, Dodonæus asphodelum pa-
lustrem vocat, quòd caulis cum floribus anthe-
rico similis asphodeli speciem esse ostendat, ta-
met si folia gladioli sint aut iridis, pulchrè viren-
tia, aliquantulum striata, iunci asperi, aut iridis,
aut gladioli similia, sed angusta & dodrante
breuiora: caulis rectus, pedalis, asphodeli satis
similis: flores è senis foliolis, exiguis stamini-
bus in medio, veluti asphodeli, minores ta-
men, colore è luteo pallentes: semen perexi-
guum, in oblongis & acuminatis vasculis, ra-
dix subest longa, geniculata, non absque fibris,
quæ serpit graminis modo. Gaudet locis humi-
dis, & palustribus. Æstiuus mensibus floret. As-
phodelus acorifolius, luteus, palustris à Lobel-
lio & Pena dicitur.

Nomen.

Lib. de flo.

Forma.

Locus.

TYPHA

NominaPet. Pen. in
Ad.

Lib. 3. c. 62.

In cap. II. 6.
lib. 3.**Forma.**

Lib. 3. c. II. 6.

Ibid.

Lib. 12.

Locus.Lib. 1. hist.
Cap. 8.**Tempus.****Vires.**

Lib. 3. c. 1. 6.

Fuch. c. 37.



Τ Φ Η Græcis, Typha Latinis, cui cylindri turbinatæque florum effigies quasi typhonis sese gyantis turbinem, aut gigantis staturam minacem signaret, nomen dedisse videtur, Galli *Masses* appellant, appositè, inquit Ruellius, quod sceptræ regum & clauas argenteas vel aureas, quæ ante primos magistratus gestantur, *masses* vulgò dictas perpolitus caulis lanosa floccorum densitate summatis fastigiatus æmuletur, Hetrusci *Mazza sorda*

TYPHA, Aquatica.



Matthiolo auctore, quod eius lanugo si in aures incidat, surditatem afferat, Germani *Mosz & Narrenkolben*. Typha hæc aquatica & palustris dicitur, ut ab ea differre intelligatur, quæ cerealibus typha nominatur, de qua inter fruges dictum est. Typha, inquit Diosco. folium edit cyperidi simile: caulem album, læuem, æquabilem: florem in cacumine ambiètem densum, qui in pappos resoluitur. Quæ descriptio plantam hanc nostram notis omnibus exprimit, foliis enim cyperidis erumpit, ab imo exeuntibus, angustis, mucronatis, dorso eminentiore triquetris, inter quæ è radice iuncea, crassa, geniculata, candida, sapore dulci, caulis emergit altior interdum homine procero, teres, rectus, lævis, glaber, enodis, non inanis, cuius fastigium densa compactæque florum congerie stipatur, & veluti spissa cingitur lanugine, sesquipalmum pedemve longa, quadam tritici turcici, vel potius clauæ rotundæ similitudine, quæ lanugo in pappos tandem euanescentis abrepta, pulla intus, foris nigricans, siue cinerea. Hunc florē ἀνθήλην à quibusdam no-

minari scribit Dioscorides, quamvis lanosam comam in milio, panico, arundine, & qualem in aruis complures herbæ, & in palustribus iunci gerunt, Græci generatim anthelen dixerint, Latini paniculam. In Dioscoridis exemplaribus Latinis legimus caulem typhæ album læuem esse, &c. At Græca omnia quæ videre licuit, vocem λολκὸν aut similem minimè habent. Sic enim in omnibus legimus. Τύφη φύλλον ἀνίησι κυπερίδι ὅμοιον, καμλὸν λεῖτον, ὁμαλὸν &c. Id est, Typha profert folium cyperidi simile, caulem læuem, æquabilem. Neque Oribasius aliter legit. Est & id annotatione dignum, quod scribit Theophrastus, cap. II. lib. 4. Histor. ἰδιώτερον δὲ πάντων ἐστὶν ἡ τύφη, ὅτι ἀφύλλον εἶναι, καὶ τῶ μὴ πολὺ ῥιζόν. Id est, Maximè peculiare hoc typha habet quod folio careat, & numerosas radices habeat. Quod cum absurdum sit, quod typha arundinis vel cyperidis folia habeat, necesse est locum hunc Theophrast. esse deprauatum. Quare legit Dalechampius τὸ ἀφύλλον εἶναι, quod flos teres, & tornatæ clauæ similis conspicitur, nullis foliis reliquorum more stipatus. Typha in iis est quæ in palustribus & stagnantibus aquis, amnibusq; leniter fluentibus nascitur, vel teste Theophrasto, ἢ ὅτι τύφη, inquit, καὶ ἐν ταῖς ἑλείων ἢ λιμναίων ὁμοίως ἀδιάφρακτα ἔσονται, καὶ θάπερ χοῖνος. Id est, Typha autem & quædam palustria & lacustria, nullo intercedente nodo qui partes diuidat, æqualia sunt, qualis iuncus est. Iulio mense eius caulis lanosa floccorum densitate obducitur, Augusto in pappos abit. Typhæ flos, auctore Dioscoride, suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Ex quibus colligi potest potissimè typhæ florem non euidenter calefacere,

neque

neque refrigerare, & modicè abstergere atque exsiccare. Typhæ lanugine, inquit Matthiolus, additis betonicæ foliis, gladioli & hippoglossi radicibus, omnibus in tenuissimum pulverem redactis, & assatis ouorum luteis exceptis vtuntur quidam fœliciter ad enterocelas, quod medicamētum quotidie exhibent ieiunis drachmæ pondere, triginta dierum spatio, eoque medicamento non modò pueros adolefcē-

In cap. 116.
lib. 3.

TYPHA Minor,
Pena.



tēsque, sed etiam eos qui ætate sunt consistente sanari pollicentur, si tamen interim optima ligatura & emplastris glutinantibus ima pubes probè muniatur. Sed id nō lanugini, verūm betonicæ, hippoglossi, gladiolo fortassè acceptū ferendum, satiūsq; fuerit hanc abesse, quæ suffocationis periculum minatur: mures enim sic enectos vel plebs nouit, & ineptiora cætera medicamenta efficit. Eadem lanugine quidam culcitras replent, & renibus, æstuantibūsq; lumbis haud parūm cōmodi adferunt puluilli thorivæ eadem farcti. In agro Gebennēsi quā confluent rhodanus & arua, Typha pusilla, siue Typhula exit, planè iunceis culmis, enodibus, rigidulis, cubitum & sesquicubitum vix excedentibus, binoque fastigiolo floristomentacei donatis: nempe in extremo, vno exiguo & semine eroso, cui adnascitur foliolum triticeum, & in-torquetur: altero autem inferiūs relicto spatio, crassiore & corpulentiore iuncum ambiente, typhæ non dissimilem, sed multò minorem vti & folia, quæ ad imum sunt aliquantu nigra: radix prolixius reptat.

Pet. Pen. in
Ad.

Pena, ibid.

ARVUNDO.

CAP. V.

ARVUNDO Græcè *καλαμος* vocatur, Arabice *Casab*, Gallicè *Canne*, vel *Roseau*, Italicè *Canna*, Hispanicè *Cannas*, Germanice *Korh*. Dioscorides quinque arundinum genera veluti notiora prodidit. Quædam *nastos* vocatur, id est, farcta & solida, ex qua sagittæ fiunt, quædam *scemina*, ex qua tibiæ linguas efficiunt. Alia *syringias*, quod fistulis addicta sit, cui multū inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia *crassa*, *concaua*, apud annes nascens à quibusdam Cypria, ab aliis *donax* appellata. Alia *phragmites* seu *vallatoria*, gracilis, candicans, vulgo cognita. Theophrastus arundinum differentias constituit, ex ipsarum corpore solido, cauo, ex breuitate, proceritate, crassitudine, gracilitate, foliorum multitudine, paucitate, natalibus siccis, aquaticis, denique ex ipsarum usu, de quibus postremis Theophrasti ordinem secuti prius tractabimus. Ac primū duo genera facit, *αὐλῆικον*, quam tibialem Plinius interpretatur, & alteram. Sed huius aliam esse *χαρακίαν*, cui nullum nomen Latinum dedit Plinius, *Gaza* vallarem seu *vallatoriam* interpretatus est, crassam & firmam, ideò vallis & sepibus hortorum & prædiorum idoneam, vnde ei nomen inditum. *Phragmitem* Plinius alicubi vocauit. Aliam *πλόκιμον*, id est, textilem, eodem *Gaza* interprete, fortassè quod ex eius foliis storeæ, tegetes, spiræ, atque alia id genus fierent. Theophrasti verba hæc sunt. Τοῦ ὃ καλαμὸς δύο φασὶν εἶναι γένη. τὸν δὴ αὐλῆικόν, καὶ τὸν ἕτερον. ἐν γὰρ εἶναι τὸ γένος τὸ ἕτερου. διαφέρειν ὃ ἀλλήλων ἰσχύι, καὶ λεπρότητι, καὶ ἀσθενείᾳ. χαλᾷσι δὲ τὸν μὲν ἰσχυρόν, καὶ παχὺν χαρακίαν, τὸν δὲ ἕτερον πλόκιμον.

Nomina

Genera

Lib. 1. c. 9.

Lib. 4. hist.
Cap. 12.

Lib. 16. c. 36.

Lib. 32. c. 10.

Lib. 4. hist.
Cap. 12.

Quæ

Lib. 16. c. 36

Lib. 16. c. 36
& Lib. 24.
cap. II.

Quæ sic traduxit Gaza. Arundinis duo genera tradunt, tibialem, & reliquam: quippe vnum genus reliquæ deprehendi, sed inter se inuicem differre firmitate, crassitate, tenuitate, exilitatēque. Crassam & validam vallatoriam vocant, alteram verò textilem. Ex qua traductione, tum ex ipso contextu perspicere licet emendatiùs hæc sic legi posse, διαφέρειν ὁ ἀλλήλων παχύτητι καὶ λεπρότητι, ἢ ἰσχύϊ καὶ ἀσθενείᾳ, id est, differre inter sese crassitudine & tenuitate, robore & debilitate. Nec hîc præmittendum est Plinium de eadem re tractantem non πολοκίμον, sed πολώϊαν legisse, scribit enim, Characian vocabant crassiorē firmiorēque, plotian verò subtiliorē. Qui locus aut mēdosus est, aut Plinius vocum affinitatē deceptus, cū hanc arūdinem legisset apud Theophrastum nasci ἐπὶ τῶν πολώδων, id est, in insulis fluitantibus, πολώϊαν vocauit, quasi fluitantē, pro πολοκίμον. Addit Theophrastus, φύεσσι δὲ τὸν μὲν πολοκίμον ἐπὶ τῶν πολώδων, τὸν δὲ χαρακίαν ἐπὶ τοῖς κόμυσι. κόμυθας δὲ χαλᾶσι οὗ ἀν' ἣ σωηθροισμένος χάλαμος, καὶ συμπεπωλεγμένος ταῖς ῥίζαις. τοῦτο δὲ γίνεται καθ' ὅς ἀν τόπας τῆς λίμνης εὐγείον ἢ χωρίον. γίνεσθαι δὲ ποιε τὸν χαρακίαν ἢ οὐ ἀυλητικὸς, μακρότερον μὲν τοῦ ἄλλου χαρακίου, σκωληκόδερον δὲ. Id est, Textilem in insulis fluitantibus (Plinio interprete) nasci, vallatoriam in comythibus (Plinius dixisse videtur in ripis expatiantis lacus.) Comythas autem vocant, vbi coaceruata arundo mutuo implexas radices habet, quod fit stagnorum locis in quibus tellus pinguis fuerit. Nonnunquam vbi tibialis, vallatoria etiam gignitur, longior quidem alia vallatoria, sed à vermibus eroditur. Deinde Theophrastus tibialis arundinis ortum, naturam, & differentias prolixius exponit, tum plures alias, vt diximus, arundinum species recenset, quæ ferè omnia Plinius transcripsit, & viginti nouem arundinis genera demonstrauit, in quibus calamus aromaticum numerat, de quo & arundine saccharifera, idoneo loco tractabimus. περὶ δὲ τοῦ ἀυλητικοῦ, τὸν μὲν φύεσθαι δι' ἐνναετηρίδος ὅπερ τινὲς φασί, καὶ ταύτην εἶναι τὴν τάξιν, οὐκ ἀληθές. ἀλλὰ δὲ μὲν ὅλον ἀυξηηθείς γίνεται τῆς λίμνης. ὅτι δὲ τοῦτο διοκτε συμβαίνει ἐν τοῖς πρότερον χρόνοις, μάλιστα δι' ἐνναετηρίδος, ἢ τὴν γένεσιν τῆς χαλᾶς ταύτην ἐποιοῦν, δὲ συμβεβηκὸς ὡς τάξιν λαμβάνοντες. γίνεσθαι δὲ, ὅταν ἐπομβρίας γενομένης διεμμένη τὸ ὕδωρ διέλῃς (non διελῇ, vt vulgò legitur) τοῦλάχιστον, ἀν' ὧν καὶ χαλλίω. τούτῳ δὲ μάλιστα μνημονεύσας γεγονότος τῶν ὕστερον χρόνων, ὅτε σωέθη τὰ περὶ χερσῶν ταν πρὸ τούτων γὰρ ἔφαθ' ἔτι πλεον βαθυωθῆναι τὴν λίμνην. μετὰ δὲ ταῦτα ὕστερον ὡς ὁ λαμὸς ἐγένετο σφοδρὸς, πλεονθῆναι μὲν αὐτὴν. οὐ μείναντος δὲ τῆς ὕδατος, ἀλλ' ἐκλελείπontos χειμῶνος, ἔτω γένεσθαι τὸν χάλαμον. φασὶ γὰρ, καὶ διοκτε, βαθυωμένης τῆς λίμνης μείναντος (non μείναντα, vt in excusis legitur) τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν, ἀδύρνεσθαι, καὶ γίνεσθαι τὸν μὲν ἀδρυθέντα ζολγίτην. εἰδ' ἂν (non ὧδ' ἂν, vt habent exemplaria) μὴ συμπαρამεῖν τὸ ὕδωρ, βομβυκίαν. Id est, Tibialium quandam nono anno prouenire quidam aiunt, & hunc esse ordinem, quod falsum est. Prorsus enim aucto lacu nascitur, sed quoniam id superioribus temporibus nono potissimum anno euenire videretur, hunc quoque arundinis ortum esse putarunt, id quod fortuito eueniebat pro ordine sumentes. Gignitur autem copiosior meliorque, cū post frequentes imbres biennio, minimum, aqua permāsit, quod maximè posteriore tempore factum meminere, quando infaustum illud Cheroniæ accidit. Antea enim aiebant annis pluribus lacum altitudine creuisse, postea verò cum vehemens pestis inuasit, impletum quidem, at cū aqua non permanisset, sed hyeme decreuisset, sic prouenisse arundinem. Fertur enim, & ita videtur, aucta altitudine lacus durante inundatione sequente anno crassiorē fieri arundinem, & crassiorē factam, fieri ζολγίτην (Caza armamentariam vertit) bombyciā verò cū aqua non permanferit. Ex quibus Plin. hæc descripsit. Tertia arundo est tibialis calami, quem auleticon dicebāt. Nono hîc anno nascebatur. Nam & lacus incremēta hoc tēporis spatio seruabat, prodigiosus si quando amplitudinē biennio extēdisset, quod notatū apud Cheroniā infausto Atheniēsum prælio, & apud Lebadiam sæpe notatur influente Cephisso. Cum igitur nono anno

anno permanſit inundatio, proficiunt in aucupatoriã quoque amplitudinem: vocabantur zeugitę. Contrã bombyciã maturiũs reciproco (ſubaudi lacu, id eſt, ripas deferente & in medium inundantes aquas recolligente, quarum profuſione arundineta vigeant & augebantur) graciles. ζεύγην igitur Plinius nunc eam quę in amplitudinem aucupatoriam, nunc ſimpliciter aucupatoriam vocat. Dalechampius iugalem potiũs latinẽ nominandam cenſet, vel quod ea vites in iugum alligarentur, quam nectẽdę vitis rationem docet Columella, ad quem uſum etiam arundineta in Italia potiſſimũ culta fuiſſe ſcribit Plinius, vel quod ex eius internodiis coniugatis compingeretur ſeptenis, vt ait Ouidius, fiſtula cannis: ζεύγη namque vocabant antiqui coniuncta arundinum paria, & μεσογόνια fabricandis muſicis instrumentis idonea. Illud tamen ſcire etiam oportet, veteres ζεύγη, ſeu ζύγες appellafſe τῶν ὀρνίθων βρόχους, id eſt, laqueos ad capiendas auiculas deſtinatos, eoſdẽmque calamis & amite in aucupiis uſos fuiſſe, verſiculo illo Martialis indicante.

Lib. 4. c. 17.
Lib. 16. c. 36

Galbula decipitur calamis, & retibus ales.

Bombycia autem dicta fuiſſe videtur, vel quod ex ea βόμβυξ tibię genus fieret, vel quod bombyciis inſectis corporis exilitate & ſtrigofa habitu, arundo hæc ſimilis ſit. Pręterea ſcribit Theophrastus, διαφέρειν τῶν ἄλλων χαλάμων ἀφορίαν τινὶ τῆς φύσεως. ἀπληθέστερον γὰρ εἶναι καὶ ἀσαρκώτερον, ἢ ὅλως διετήλην τῇ προσόψει. καὶ γὰρ ὁ φύλλον πλεονέστερον ἔχει καὶ λευκότερον. τὴν δὲ ἀντήλην ἐλάττω τῶν ἄλλων. τινὰς δὲ ὅλως ἔκ' ἔχειν. ὅς τε προσαγορεύουσιν εὐνυχίας. ἐξ ὧν ἄριστά μὲν φασι τινες γενέσθαι ζεύγη. κατ' ὅσον δὲ ὀλίγα παρὰ τὴν ἐργασίαν. τὴν δὲ τομὴν ὠραίαν εἶναι παρὰ ἀντιγενίδι, ἥνιχα ἡυλαῖ ἀπλάτῳς ὑπὲρ ἀρκίερω βοηδρομιῶνος μινός. τὸν γὰρ ὅτι τμηθέντα σύχνους μὲν ἔτεσιν ὕστερον γίνεσθαι χρήσιμον, καὶ προχαυλήσεως διέσθαι πολλῆς. συμμύειν δὲ τὸ σόμα τῶν γλωττῶν, ὁ παρὰ τὴν διακρίαν εἶναι χρήσιμον. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν πλάσιν μετέβησαν, ἡ τομὴ μελεκινήθη. τέμνουσι γὰρ διεινὴν τοῦ σκιρφοειῶνος καὶ ἐχθρον βαῖωνος. ὡς παρὰ τῶν τροπῶν μικρόν, ἢ ὑπὸ τροπῶν. γίνεσθαι δὲ φασι τριπλὸν διὰ χρήσιμον, καὶ χαυλήσεως βραχείας διείσθαι, καὶ χατὰ σπᾶσματ' αὐτῶν γλώττας ἔχειν. τοτῷ δὲ ἀναγκαῖον τοῖς μετὰ πλάσματος αὐλῶσιν. Id eſt, Differre autem à reliquis arundinibus bombyciam alimenti natiui penuria: nam macilentioſiorem, gracilioſiorem, & facie planẽ fœminam ſpectari, foliũmque latius habere & candidius, & minũs lanuginis quàm ceterę, quaſdam etiam nihil prorsus habere, quas ſpadones appellant, ex quibus iuga optima fieri quidam affirmant, pauca tamen in opere bene ſuccedere. Has tempeſtiuẽ cædi ſolitas ante Antigenem, cum adhuc ſimpliciũs tibia canerent ſub arcturo mẽſe Septembri: ſic enim cæſas multis poſt annis vtilis eſſe, multaque ſonandi exercitatione indigere, ſed ora linguarum conniuere, quod erat illis ad res populo ſignificandas vtilius. Poſteaquam verò varietas fictiõque acceſſit, cæſura mutata eſt: cædunt enim noſtra ætate mẽſe Maio & Iunio ferẽ circa ſolſtitium, aut ſub ipſo ſolſtitio, & fieri in trimatu vtilis, & breui exercitatione egere, linguaſq; decliues eſſe, & quaſi deorſum flecti, quod his neceſſarium eſt qui ſonos variẽ ſingunt. Quę Plinius paucioribus verbis ſic explicauit. Contrã bombyciã maturius reciproco, graciles, fœminarum latiore folio atque candidiore, modica lanugine, aut omnino nullã, ſpadonum nomine inſignibus. Hinc erant armamenta ad incluſos cantus, non ſilendo & reliquo curę miraculo, vt venia ſit, argento iam potiũs cani. Cædi ſolebant tempeſtiuẽ uſque ad Antigenem, cum adhuc ſimplici muſica vterentur, ſub arcturo: ſic præparatę aliquot poſt annos vtilis eſſe incipiebant, tunc quoque multa domandę exercitatione, & canere tibię ipſę docendę, comprimẽtibus ſe lingulis, quod erat illis theatrorum moribus vtilius. Poſtquam varietas acceſſit, & cantus quoque luxuria, cædi ante ſolſtitia cœptę, & fieri vtilis in trimatu, apertioribus earum lingulis ad flectẽdos ſonos: quę inde ſunt & hodie. His plura alia genera, vt diximus, ſubiungit Theophrastus differentiis vel ſenſui perſpicuis diſtincta. Quædam enim denſa tam carne quàm geniculis: quædam rara, pauciſq;

Ibid.

Ibid.

Ibid.

- Lib. 16. c. 36 geniculis: alia caua tota, quam *σύνεργα*, siue *συνεργίαν*, id est, fistularem nominant. Plinius, Calamus verò alius totus concavus, quem syringiam vocant, vtilissimus fistulis, quoniam nihil est ei cartilaginis atque carnis. Orchomenius est continuo foramine peruius, quem auleticon vocant, hic tibiis vtilior, fistulis ille. At syrinx Theophrasto dicitur non syringias, quòd natura sua caua & inanis, medulla, carne, cartilagine vacua sit fistularum modo, non autem vt Plinius exposuit, quod fistulis vtilior sit, vt auleticos tibiis. Quare mirum est Plinium scripsisse calamum orchomenium auleticon continuo foramine peruium esse, cum id syringi tantum conueniat, & Theophrastus auleтики seu tibialis naturam diligentissimè persecutus, nusquam id de ea tradiderit. Alia arundo solida, & tota penè intus repleta. Item alia brevis, alia procera, excelsa, crassaque: alia gracilis foliosaque, alia vnico folio. Multae etiam differentiae pro natura vsuq; intelliguntur, singulae enim ad singula vtilis.
- Lib. 7. c. 9. Donax (canna vocatur à Gaza, Columellae fortasse exemplo, qui degenerem arundinem cannam vulgò vocari scribit, Plinius Graecum nomen retinet) communissima arundo, còfertissima est, siue ex vna stirpe numerosa, *λαγμωδέστατον*, fruticosissimam vertit Plin. (Fruticosissimus qui vocatur donax, non nisi in aquaticis natus, quonià & haec differentia est, multum praelata arundine quae in siccis proueniat.) Quibus verbis Plinius Theophrasti sensum non rectè expresit, sic scribētis *διαφέρειν δὲ ὅμως παντὸς χαλάμου πολὺ, τὸν δὲ ἐν τῷ ξηρῷ, καὶ τὸν ἐν τοῖς ὕδασι φυόμενον*. Id est, multum in quouis arundinis genere differre quod in sicco natum est, ab eo quod in aquis creuit, vt hīc *διαφέρειν*, non praestare aut praferri, sed differre ac discrepare significet. *Τοξικὸς*, Creticam quidam appellant, sui generis est, nodis paucis geniculata, carnosior, flexumque maximè recipiens. Plinius. Suum genus sagittario calamo, sed Cretico longissimis internodiis, obsequentiq; quo libeat flecti, calefacto. Et aliquatò antè. Sed in hoc quoque, vt ceteris in rebus, vicit Italia, quando nullus sagittis aptior calamus, quam in Rheno Bononiensi amne, cui plurima inest medulla, pondusque volucre, contra flatus quoque peruicax libra. Sunt & differentiae magnae ex foliorum non multitudine aut magnitudine modo, sed & colore. Quippe quae Laconica cognominatur, versicolor est. Item ex ipso situ atq; annexu: quaedam enim ab ima parte, foliorum magnam partem ferunt, ipsaq; perinde atque è frutice se attolunt. Plinius. Differentias faciunt & folia, non multitudine, verum robore & colore. Valida Laconicis, & ab vna parte densiora: quales in totum circa stagna gigni putant, dissimiles amnicis, longisque vestitas tunicis, spatiosius à nodo scandente còplexu. Ex quorum locorum collatione intelligere licet deprauatè legi in Plinio, Valida Laconicis pro Varia, & ab vna parte densiora pro ab ima. Sic enim habet Theophrastus. *ποικίλος γὰρ ὁ λακωνικὸς χαλάμενος*. Varius est foliorum color eius quam Laconicam vocant. Et, *χαί τωθεν γὰρ ἔνιοι πλεῖστα φέρουσι τῶν φύλλων*. Id est, Quaedam ima parte folia plurima edunt. Quidam discernenda lacustrium tantum genera ferè volunt, quòd habeant vel nulla, vel pauca folia, & non nihil similia cyperi: phlei, algæ, butomi. Sic enim conuertēda haec Theophrasti verba. *χέδδὸν ὃ τινες φασι καὶ τῶν λιμναίων ταύτην εἶναι τὴν διαφορὰν, πολὺ φύλλον καὶ ὀλιγόφυλλον, ἔ παρόμοιον ἔχειν τρόπον τινὰ τὸ φύλλον τῷ τοῦ κυπέρου, καὶ φλεῶ, ἔ βρύς, καὶ βυτόμου*. Genus aliud arundinis ponit Theophrastus *ἐπίγειον*, id est, pumilum, quod non erigit caulem, sed super terram graminis modo spargitur, atque ita crescit, mascula solida est, foemina inanis. Plinius. Est & obliqua arundo, non in excelsitatem nascēs, sed iuxta terram fruticis modo se spargens, suauissima in teneritate animalibus. Vocatur à quibusdam Elegia, corruptè pro epigeios, vel Plinius legit in Theophr. non *ἐπίγειον*, sed *ἐλέγειον*.
- Lib. 7. c. 2. Idem Plinius tradit arundines esse in India tantae proceritatis, vt singula internodia alueo nauigabili ternos interdum homines ferant. Et alibi. Arundini Indicæ
- Lib. 16. c. 36 arborea amplitudo, quales vulgò in templis videmus. Nauigiorum etiam vicem praestant,


præstant, si credimus, singula internodia. Addidit piscatorias idem, & quæ chartis seruiūt arundines scriptorias, videri potest & adarcam his adnumerasse, his verbis. Est & in Italia nascens Adarca nomine, palustris: & cortice, tantum sub ipsa coma, vtilissima dentibus: quoniam vis eadem est, quæ sinapi. Qui locus sic corrigendus videtur, palustris, in cortice calamorum tantum, & sub ipsa coma nascens, &c. Id quod perspicue demonstrant eadem verba alibi repetita. Sinapis naturam effectusque eisdem habere traditur adarca, inter siluas tacta, cortice calamorum sub ipsa coma nascens. Verum Plinius adarcæ non ut arundinis, sed eius rei quæ in arundine nascitur, & ei insidet, cum de arundinibus tractauit, non absurdè meminit, eiusque naturam demonstravit ab arundinum natura planè diuersam, id quod dilucidius declarat alio in loco. Inter aquatilia dici debet & calamochnus, Latine adarca appellata, nascitur circa arundines tenues è spuma aquæ dulcis ac marinæ, vbi se miscet. Vim habet causticam, &c. Quo loco calamachnè, id est, τῶν χαλαίων ἄχυν legere oportet, nō calamochnum, ut in vulgatis exemplaribus legitur, & circa arundines tenuem, nō tenues, è spuma aquæ dulcis & marinæ, id est, salis, vbi se miscent, ut si quando in paludem lacumve foris salus sese exoneret, quod Lacui Carcassonæ oppido vicino accidit, quem incolæ Marsonetam vocant, in quo cedentibus per aestatem aquis, & sal radiis solis coctus, & adarca scirpis ac iuncis inhaerescens, aestu concreta colligitur. Ex tot arundinum generibus aliquot depingemus. Ac primum arundinem cōmunem, siue marem, siue vallatoriam

Lib. 16. c. 36

Lib. 20. c. 22

Lib. 32. c. 10

*ARUNDO Domestica,
Matthioli.*



Matthioli, quæ ad decem cubitorum proceritatem adolefcit, militaris hastæ crassitudine, robusta ac firma materia, intus inanis, compactis per interualla geniculis. Cortice vestitur squamoso, qui facile detrahitur, aspero, subalbicante. Folia illi sunt longa, milij Indici æmula, sed latiora ac longiora, aspera vbiq; superficie, & acuta. Pauculas fert seu spicas milij modo sparsas, lanosa molliq; cæsariæ nutantes ac purpurascens, quæ hyeme in auras abeunt sine vlllo seminum vestigio: radix subest alba, dura, tuberosa, cōtorta, geniculata, ut in iride, sed lōgè maior ac robustior. In vinetis feritur, in hortis ac viridariis ad vitiū palos, ad sepes hortorum, & ad topiaria opera. Hæc arundo an vallatoria esset Dioscoridis, dubitauit aliquando Matthiolus, quod ea Dioscoridi sit gracilis ac cādicans, hîc verò depicta crassior. Sed cum Theophrastus, inquit, scribat vallatoriam crassiorem esse ac firmiorem, credibile est hunc Dioscoridis locum deprauatum esse, præsertim cum septis, palis ac topiariis operibus crassæ arundines tenuibus sint aptiores. Hæc Pe-

Forma.

Lib. 4. hist.
Cap. 12.

Lib. 4. c. 55

na & Lobellius esse censent, quæ Donax seu Cypria dicitur, satiua nostras, Gallis *Canne*, Italis *Calami à far Conocchie*, nullumq; in Dioscoride mēdum esse affirmat Dodonæus, cum scribit phragmitem gracilem esse, & cādicantem (Alij legunt ὑπόλεπτον, λευκόν, id est, aliquātulum gracilem, cādidam) esseq; χαρακίαν Theophrasti crassam ac firmam, quam Gaza vallatoriam conuertit, quamquam eadem est χαρακίας Theophrasti & φραγμίτης Dioscoridis. Vallatoria Dodonæi, Penæ, Lobellij, culmum seu scapum profert lōgum, crebris geniculis cinctum: folia multa, longa, lata, aspera: in summo caule effusa exit iuba, mollis, ac veluti lanuginosa, radices subsunt longæ,


albæ, geniculatæ, ac latè serpentes. Nascitur in pigris aquis, veluti in vrbium fossis, & circa fluminum ripas, Belgio ac Germaniæ vulgaris, tenuis, candicans, præsertim vbi inaruit, non solum ad operiendas domos utilis, sed & sepimentis maximè idonea. Hæc Arundo Dodonæi est arundo palustris Matthioli, vt pictura & delineatio demonstrant. Est enim Arundo palustris Matthioli arundinis primo de-

Lib. 4. hist.
Cap. 55.
De fru. ca.
117.
In cap. 97.
lib. 1.

ARVND O Vallatoria,
Dodonæi.



ARVND O Palustris,
Matthioli.



ARVND O, Epigæos.



scriptæ modo: radices habet crassas, contortas, geniculatas, ex quibus culmi proceri, crebriorib⁹ geniculis distincti, foliis ipsos ambiētibus, longis, latis, acuminatis: coma in summis culmis lanuginosa. Quæ quarto loco depicta est arūdo calamus est, humi sparsus graminis modo, quod de arūdine epigæo prodidit Theophras. cortice fuluo cōtectus, lineis squamatim cingentibus distinctus, cauliculos alios multos vtrinque producens densa cōgerie stipatos, simili cortice, similiterq; squamoso virgatos, qui rursus & alios gignūt, pminētium veluti nodorū aut oculorum modo exertos, plures superiore parte qua terrā nō attingit, pauciores inferiore qua terræ insternitur, aspectu pulcherrima, densissima illa tenuium cauliculorum furculorumq; congerie, cū cæteræ arundines folia tantum hinc inde mittāt, nullos autem præterea vel furculos vel calamos, folium nostræ arundini simile à nodis exoritur, sed numerosius magisq; multiplex, & plures complexu inuolucro-

rum per ambitum tunicas inducit. Hæc arundo pumila in saccis magnis costo arabico & zinzibere plenis aliquando reperta veluti rara ac inusitata hîc doctis & rei herbariæ

ARVENDO, *Minima.*

herbariæ studiosis spectâda proponitur. Arundinem minimam plâtam quinto loco hîc pictam herbarij vocât: quidam gramen iunceum, alij gramen arûdinaceum. Radix ei parua, cãdida, brevis, parum fibrata: caulis singularis, teres, pedali altitudine: folia graminis, pauca, longa, acuminata, angusta, gracilia, ex magnis interuallis caulem vestiëntia, in furculos valde exiles caulis fastigium finditur, in quorum summitate semẽ est exiguum, nigrum, velut in corymbos coaceruatum. Iisdẽ in locis prouenit in quibus gramẽ aculeatum, & gramẽ stellatum alibi descripta, nõnunquam ex vno & eodem cespite. Est & Arundo seu Cãna Indica hodie nominata, quoniam ex America primũ delata fuit, & eius stolones cãnarũ seu arûdinum ritu geniculati sunt, à nonnullis quia eius flos nõdum apertus cancri chelas colore & forma refert, flos cancri, ab Hispanis & Lusitanis *Cuentas*, à numerãdo, quòd ex istius fructu vt ex tenellis & deciduis malis arantiis spherulę precatorię fiãt, ab aliis cannacorus, ambigue inter cãnas & acorum naturę. Huic primũ vnus, deinde plures stolones ex eadẽ radice prodeunt, cubiti vnus, interdum duorum aut

trium altitudine, digiti crassitudine, geniculati arundinis modo, quos circa genicula ambiũt folia multa, ampla, trãsuersis filis neruosa, foliorum Musę arboris specie, sed tenuia, herbaceo virore pallascëntia, & in extremo acuminata, quę cùm primũ erumpunt chartaceorum corniculorum modo cõuoluta conspiciuntur, & gustata herbaceum quẽdam saporem referunt primũ, qui paulò pòst nõnihil acrimonię

ARVENDO seu Canna
Indica, Clusij.ARVENDO seu Canna
Indica, Dalechamp.

admixtum habet. In summo caule sunt flores, gladioli floribus forma similes, colore phœniceo pulcherrimè nitentes, capitulo cuidam hirsuto inhærentes, quod cum flore nõdum aperto cancri seu locustæ marinæ chelam quadatenus representat, floribus dilapsis aut marcidis, capitula ista augètur, fiuntq; triangula & veluti spinosa, fructus ricini modo, in quibus semè per maturitatem fuscum & atrum, rotundum: radix nodosa, crassioribus fibris stipata, ex cuius nodis aliis adnascètibz radices

Vires.

aliæ procuratur, matri similes. In Lusitaniæ monasteriis quibusdam frequètem vidit Clusius etiam media hyeme florètem. Hodie multis aliis in locis seritur & colitur à rei herbariæ studiosis in fictilibus, aut ligneis doliis, vt soli meridiano facilius exponatur: quoniam calore & apricatu valde gaudet, altiosaq; planta borea flatu & frigore maximè læditur. Huius folia esse putant, quibus massas gummi elemni obvolutas videmus in Seplasiis. Huc inferèda Arundo Saccharifera Indica, inter miliceas & arundinaceas plantas media. Septenùm octonùmve pedum calamos profert, pollice crassiores, densis geniculis interceptos, fungosa, succulèta, valde dulci candidaque medulla farctos, folia binos cubitos æquant, angustiora tamen Dona-

ARVENDO, Saccharifera.



Locus.

cis, scabra, & secundum longitudinem striata, numerosa, stolones eiusdem cum cæteris arundinibus coloris amplectètia, angustiora iis quibus Sacchari metæ inuolutæ passim apud institutores cernuntur: flos in summo comosus, & quadatenus Melicæ. Radix ad cannæ radicem accedit, sed minùs lignosa, succulentior, dulcior: ex qua germina oriuntur quæ resecta factioni opportuna sunt. Panguntur etiam taleæ ex ima radice abscissæ, atque bello proficiunt in Gallia & Belgio, sed hyemis iniuria pereunt. Humentis solo gaudet, sed calidiore aëre, & tepidiore aura. Liquorem siue laticem fundit (Saccharum vocant) cuius satis celebrari nunquam potest tum lautitia, tum vtilitas, in culinis, in Pharmacopœorū Officinis, esu, potu, in secunda & aduersa valetudine, in quauis ætate, sorte, regione. Etsi prima, nõ tamen sola huius ferax est India, sed etiam Madera & Canariæ. Est & iam Europæ multis ad Mediterraneum Oceanumq; mare tractibus inquilina, vt Hispaniæ, Lusitaniæ, Siciliæ, atque etiam in amœnissimis

Olbiæ in Gallica prouincia viretis, nõ procul & è regione Stœchadum insularum teste Pena. Vallatoriæ arundinis radix, vt ad vires transeamus, trita per se, aut cum bulbis spicula aculeosq; corpore extrahit: luxata lûborumq; dolores cum aceto mulcet. Virètia folia tusa & imposita erysipelata & cæteras inflàmationes sanât. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanatur, lanugo arûdinum in aures illapsa surditatem inducit. Eadem etiã cypria arûdo efficere potest. Eadem & quædam alia

Lib. 24. c. 11. Plinius prodidit. Arundinis radix cõtrita & imposita filicis stipem corpore extrahit: item arûdinem filicis radix. Arundo cypria quæ donax vocatur, corticis cinere alopecias emēdat: item putrescētia vlcera. Foliis eius ad extrahendos aculeos vtuntur. Efficacius & contra ignes sacros collectionesq; omnes. Vulgaris arundo extoriam vim habet, & recēs tusa non in radice tantùm, medetur & luxatis & spinæ doloribus radix in aceto illita. Eadem recens trita & in vino pota venerem concitat. Arundinum lanugo illata auribus obtūdit auditum. Et alio in loco. Phragmitis radix

Lib. 32. c. 10

radix recens tusa luxatis medetur, & spinæ doloribus ex aceto illita. Cypriæ verò quæ & donax vocatur, cortex alopecii medetur vltus, & vlcerebus veteratis: folia extrahendis quæ infixæ sunt corporibus, & igni sacro. Paniculæ flos si aures intrauerit exurdat. Qua de re sic differit Galenus. Calami phragmitis radicem cum bulbis aculeos & stipites ex alto extrahere quidam scripsere, ceu trahendi quædam vis ei insit. Nos tamen eius rei periculum non fecimus. Verum quantum ex gustu licet coniecere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeque aciem. Quinetiam folia ipsa abstergentis sunt facultatis: cortex verò eius combustus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiunctum habens absterforium quiddam, ut exsiccat & excalfaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen desiccet quam excalfaciat. Vitandus est eius flos quæ Anthelen vocant. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter inhærens affigitur, ut auelli non possit, auditumque vitiet, quamobrem sæpissime exurdat. Hæc Galenus. Traditur à rei agrariæ auctoribus inter arundinem & filicem intestinum esse odium, quare arundinem vomeri alligatam filicem in agro destruere ac enecare prodiderunt. At eò maior arundini cum asparagis intercedit amicitia. Nam si serantur in arundinetis, ibi mirifice proueniunt.

Li. 7. simpl.

GRAMEN.

CAP. VI.

DE Gramine vulgari & multis graminum generibus diximus alibi, nunc de pluribus aliis hinc tractabimus cum palustribus & aquaticis plantis. Primum de gramine aquatico, cui radix nigra, longa, geniculata, huc illuc sese diffundens per cœnosum solum, multum fibrata: folia arundinis, angusta, quæ ex caule sesquipedali per interualla prodeunt, cyperi similia: flos in paniculis nigris pendulus, cyperi modo, gustu insipido. In locis palustribus, & riuorum marginibus crescit. Gramen aculeatum, id fortasse cuius meminit Plinius, radice nititur exili, breui, candicante, capillamentis fibrata: folia

In Ag. c. 19.
Forma.

Locus.

Li. 24. c. 19.

GRAMEN Aquaticum.

GRAMEN Aculeatum.



feît graminis similia, angustiora, tenuiora, propè radicem multa, in caule paucis: dodrantalis est, teres, in cacumine quatuor aut quinque echinos producens, oliuæ paruæ non dissimiles, aut potius xanthij fructibus: quos conuolutos olim naribus inferebant & extrahebant sanguinis ciendi gratia. In riguis nascitur inter arundines, typhos, & alias id genus aquaticas plantas. Gramen arundinaceum radice est

GRAMEN Arundinaceum.



GRAMEN Nigrum.



foris nigra, intus alba, geniculata, in obliquum serpente, supernè modicè fibrata, subdulci: foliis arundinis, non adeò latis, ad radicem multis, in caule sesquipedali paucis: flore nigro, spicato, aspero, & si præmas digitos pungente. Equis & bubus noxium esse aiunt. In humidis scaturiginibus fontium & riuorū per pinguia loca decurrentium prouenit. Gramen nigrum radículas emittit multas candicantes: folia graminis longiora, circa radicem numerosa, pauca in caulibus duobus tribusve, dodrante altioribus. Flos spicatus niger, vnde huic plantæ cognomen, & in summo caulium eminet, & ex eorūdem medio prodit variis in locis inter ipsos cauliculos & foliolum, quod ex eorūdem latere exurgit. Ad riuulorum fluentia, & fontium scaturigines profilit. Gramen triangulū radicem profert nigram, crassam, multum fibratam, cœnum olentem: folia multa, longa, vnde cūque aspicias angulos tres ostendentia, qua de causa triangulum cognominarunt, florem spicatum, subnigrum, flosculos candi-

GRAMEN Triangulum.



cantes

cantes è spicarum rimis prominentem cum deflorere incipit. In pigris & stagnan-
tibus aquis crescit. Plantam proximè appictam à similitudine quæ ei est cum gra-
mine quod à Græcis ἀγρωγίς ἐν τῷ παρνασίῳ dicitur, à Latinis Gramen Parnasium, Lib. 4. c. 53.
Dodonæus à quibusdam Gramen Parnasi nominatum fuisse tradit. Foliola mittit

GRAMEN Parnasi, Dod.



rotunda, hederæ aut asari foliis haud multum
figura dissimilia, sed multò minora, & virore
magis diluto, inter quæ duo trèsve cauliculi
eminent, graciles, pedales, in imo rufescentes, in
summo decoris floribus ornatos, candidis, qui-
bus dissipatis succedunt capitula rotunda, quæ
semen rubescens concludunt: radix est crassius-
cula, multum fibrata. Semen desiccatur & subtiliù
est partium. Graminis huius decoctum, auctore
eodem Dodonæo, potu vètriculum humidum
& imbecillum roborat, aluum sistit, nauseam
prohibet. Eiusdem in vino aut aqua decoctum
vrinas ciet, maximè eius semen: neque solum
vrinas ciet, sed etiam calculos è renibus pellit.
Folia virentia trita & imposita vulneribus re-
centibus, sanguinem sistunt, & ea glutinant. Ex

Vires.

Ibidem.

herbæ succo collyrium paratur quod visum acuit, & oculorum caliginem discu-
tit, si tantumdem vini & myrrhæ dimidium permiscueris cum piperis & thuris mo-
mento, quod ut diu integris viribus conservari possit, ætea pyxide reponendum
est. Prorsus idè in vdis Brabantini agri locis sponte oriri tradit Lobellius, sola flo-
rum duplicatione speciosa varium. Potest & gramen Parnasi nuncupari quod hîc
depictum est, radicibus plurimis, longis, capillaceis, mollibus, candidis, caulibus

*GRAMEN Parnasi duplicato
flore, Lobellij.*



*ALIUD GRAMEN
Parnasi.*



numerosis

numerofis fruticosum, dodrantalibus: foliis hederæ facie fimilibus, denfis, fed non tam craſſis, nunc prorfus rotundis, nunc tanquam in anguli acumen deſinētibus: flore copioſo, violæ ſimili, luteo. Flos folium, fruticoſa caulium congeries hiftorię Dioſcoridis reſpondent, minimè tamen radicum craſſities, numerus, ſapor prædulcis. Sed quia herbarij Gramen Parnaſi vocauerunt, mutare nomen non libuit.

Cap. 18. De alio Gramine Parnaſi, ex Matthiolo in agro diximus.

CALAMAGROSTIS.

CAP. VII.

Nomina


Forma.



ΑΛΑΜΑΓΡΩΣΤΙΣ Græcis, Latinis dicitur Gramen arundinaceum, quod mediæ ſit inter Gramen & arundinem naturæ & figuræ. Cuius hîc genera aliquot exhibentur. Prima Calamagrostis leucanthemos, à candidis floribus meritò nominatur, caules proferens longos, rotundos, læues, minimè geniculatos, in quorum verticibus elegantes & candidi floſculi emicant, forma cucurbitæ flores referentes, omni odore deſtituti. In vliginofis locis naſcitur. Altera Calamagrostis foliis veſtitur acutis, longis, in medio anguloſo neruo diſtinctis, ideóque triangularibus, herbacei coloris. Ex horum medio læues prodeunt & teretes caules, in quorum ſaſtigiis veluti pilulæ prominent, exiguis & candidis fibris vel paniculis florentes: quæ pilulæ Iulio mēſe

CALAMAGROSTIS

I. & II.



CALAMAGROSTIS

III. & IIII.




cum deſloruerint, in echinata quædam capitula nucem myriſticam magnitudine æquantia deſinunt, quæ nihil aliud ſunt quàm multorum ſeminum aculeatorum aceruus. Radix intra humum multis fibris & adnatis radiculis ſerpendo longè lateq; ſe diſfundit. In vliginofis tractibus, & humectis pratis creſcit. Hanc plantam Tragus ſparganiū Dioſcoridis eſſe iudicat. Duo alia Calamagroſteos genera, quod ad caules & folia acuminata attinet, prioribus ſimilia ſunt, ſed multò minora & floribus diſtantia, guſtu admodum ingrato, quæq; in pratis minimè cōmendentur.

CAREX.

Locus.

Lib. 2. c. 37.



CAREX Latinis ex qua mollissimæ texuntur cathedræ vliginoso & palustri loco plurima, foliis ferè est arundinis, longis, acuminatis, latiulculis, circa radicem numerosissimis, ex quorum medio exurgunt caules tenues, in summo paniculas ferentes. Radix crassiuscula est, & fibrata. Caricem veram hîc appictam Tragus nomine graminis vulgò cogniti depinxit, *Gras* à Germanis dicti. Forma. Lib. 2. c. 7.

POTAMOGETON. CAP. IX.

POTAMOGETON & fontalis, Græcis ποταμογενών, & εὐχύτης, Gallis *Espe d'eau*, Germanis *Saurkraut*. Potamogetoni nomen inditum est, quòd in palustribus & aquosis locis nascatur, auctore Dioscoride, nomen enim id fluminibus vicinam significat. Stachyites verò dicta quasi spicata, ob caulem quem ex se

mittit floribus & semine spicatum. Potamogeton, inquit Dioscorides, folium habet betæ simile *δασύ*, densum, non, vt verterunt, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Ex qua breui delineatione satis intelligi potest, herbam cuius picturam hîc damus, esse Potamogetona. Caulem namque rotundum habet, geniculis intersectum, è quibus pediculi exeunt, foliis betæ aut plantaginis vestiti, paulum supra aquam eminentibus. Flores etiam spicatos plantaginis instar profert, ac subinde semen. Radix flexuoso anfractu excurrit, è geniculis mul-

POTAMOGETON I.



tis propagans fibras, fundo aquæ immerfas, è quo alimentum fugit. Consentunt & natales: nascitur enim in lacustribus & aquosis locis. Refrigerat & astringit, vt tradit Dioscorides, pruritibus, vlceribusque, vetustis, & iis quæ pascendo serpunt confert. Astringit & refrigerat si-

militer polygono, ait Galenus, sed essentia eius crassior quàm polygoni est. Plinius de eadem hæc scripsit. Potamogeton ex vino dysentericis etiam & cœliacis, similis betæ foliis, minoribus tantum, hirsutioribusq; paulatim supereminens extra aquam. Peculiariter refrigerat, spissat. Vfus in foliis: cruribus vitiosis vtilia, & contra vlcerum nomas, cum melle, vel aceto. Vetus Cornarij codex habet: extra aquam. Vfus in foliis: refrigerant, spissant, peculiariter cruribus vitiosis, &c. Subiicit Plinius. Castor hanc aliter nouerat, tenui folio velut equinis Li. 8. simpl. Lib. 26. c. 8. Embl. 86. Li. 4. Diosc.

POTAMOGETON II.



equinis fetis, thyrsis longo & læui, in aquosis nascentem. Radice sanabat strumas & duritias. Potamogeton aduersatur & crocodilis: itaque secum habent eam qui venantur illos. Nouit & alteram Potamogetona Dalechampius, quæ in lacubus & stagnis Sequanorum gignitur, caulibus per aquam sparsis, angulosis, geniculatis, radículas exiles & albas è geniculis mittentibus, quibus obuium in ripis cœnum solumve apprehendit: ex singulis quoque articulis singula folia prodeunt, longo pediculo nixa, longiora quàm in priore Potamogetone, crassiora, & (quæ certissima nota est hanc ab illa distinguendi) transuersis lineis virgata, cum prioris folia lineis in longum ductis discriminantur. Flos spicatus rubet, longo hærens petiolo: semen copiosum, durum, folliculis inclusum.

NYMPHAEA.

CAP. X.

Nomina

NYMPHAEA Latinis, sicuti Græcis *Νυμφαία* vocatur, Arabibus *Nilofar*, *Ninofar*, & *Nilufar*, Officinis *Nenufar*, Gallis *Blanc d'eau*, & *Lis d'estang*, Germanis *Gelb, vneisz schebluomen*, Hispanis *Escudetes del rio*, & *Higos del rio*. Aquæ, lymphæ seu nymphæ antiquitus vocatæ nomen

NYMPHAEA Maior alba.



Li. 3. ca. 132.

Genera.

Ca. 132. li. 3.

Forma.

Li. 3. ca. 132.

& natales dederunt Nymphæ: aquosum enim amat locum, inquit Dioscorides: vel id nomen sibi vendicauit, ut ex veteribus aliqui fabulati sunt, à Nympha quæ zelotypia Herculis intubuit, & mortua in palustrem hanc plantam mutata est. Dioscorides duo ponit Nymphæ genera: vnâ flore albo, radice nigra: alterâ flore luteo, radice alba: quibus tertiam addit Matthiolus Nymphæam paruum, quæ in quibusdam Bohemiæ lacubus prouenit: quam alibi quàm in Bohemia sese vidisse negat. Primam igitur Nymphæam albam maiorem nominare licebit: postremam hanc Nymphæam albâ minorem. Sunt herbarij qui Nymphæam quandam luteam minorem reperiri, sed rariùs, idq; in Septentrionalibus regionibus asserunt, à superiore illa quoque discernendam, ut hæc minor, illa maior lutea sit nuncupanda. Nymphæam albam maiorem dixit Dioscorides foliis esse fabæ Ægyptiæ, minoribus, & longioribus, aliis in summa aqua, aliis demersis, pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio



lilio simili, albo, medio croceum habente: cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris caput extuberat, nigro, amaro semine, dēso & lato, lentigustus. Caulis est lævis, niger, minimè crassus, Ægyptiæ fabæ cauli similis: radix nigra, scabra,

clauæ similis, quæ Autumno secatur. Hæ omnes notæ nostro Nenufari optimè quadrant. Folio enim conspicitur orbiculato, læui, herbaceo, amplo, in stagnantibus aquis supernatante: flore candido lilio simili, cuius medium croceum est, & cum defloruerit, capite papaueris, in quo semen amarum, latum, pingue. Caulis gracilius est & lævis: radix nigra & ampla, dulcis, nodosa, clauæ formam referens. Nymphaea altera Dioscoridis foliis est ante dictæ, radice alba, scabra: flore luteo, nitente, rosæ simili. Quæ itidem notæ in vniuersum omnes alteri Nenufari, quæ luteis est floribus, respondent. Vtramque sic depinxit Plinius partim ex Theophrasti & aliorum, partim ex Dioscoridis, vel Crateuæ sententia. Nymphaea nata traditur Nympha zelotypia erga Herculem mortua. Quare Heraclion vocant aliqui, alij rhopalon, à radice clauæ simili. Ideoque eos qui biberint eam, duodecim diebus coitu genituraque priuari. Laudatissima in Orchomeno & Marathone. Bœoti Madon vocant, qui & semen edunt. Nascitur in aquosis, foliis magnis, in

Lib. 23. c. 7.

*NYMPHAEA Lutea
Minor.*



*NYMPHAEA Altera
Lutea Minor.*



Lib. 9. hist.
cap. 13.

summa aqua, & aliis ex radice prodeuntibus, flore lilio simili, & cum defloruit, capite papaveris, tenui caule. Secatur Autumno. Et mox. Est & alia Nymphæa in Thessal a amne Peneo, radice alba, capite luteo, rosæ magnitudine. Theophrastus de radicum differentia agens, ita de Nymphæa scribit. Γλυκεῖα μὲν ἡ τε νυμφαία καὶ λευκὴ. Φύει δὲ ἐν τοῖς λίμναις, καὶ ἐν τοῖς ἐλώδεσιν, οἷον ἐν τῇ ὀρχομηνίᾳ καὶ μαραθῶνι, & περὶ κρίην. Καλεῖται δὲ αὖτὴν οἱ βοιωτοὶ μάδωναίν, & τὸν καρπὸν ἐσθίουσιν. ἔχει δὲ φύλλον μέγα ἐπὶ τῇ ὕδατος. εἶναι δὲ φασὶν ἰχθυμὸν, εἰς τὴν τριψάστις ἐπὶ τὴν πλῆγην ἐπιθεῖν. χρῆσιμη δὲ καὶ πρὸς τὰς δυσεντερίας πινομένη. Idest, Dulcis Nymphææ radix, quæ nascitur in lacu-

NYPHÆA MINOR ALBA.



bus & palustribus, vt in Orchomenia & Marathone, & in Creta. Bœoti Madonain vocāt, eiúsque fructu vescuntur. Habet folia magna super aquam. Trita & plagæ imposita sanguinē sistere dicuntur: & pota ad dysenterias utilis est. Nymphæa minor alba, Morsus

ranæ Herbariorum: folio quidem Nymphææ, sed brassicæ marinæ paulò maiore: flore candido, capitibus exiguis vt in cappari: semine intus papaveris magnitudine. Nymphæa lutea minor radiculis multis vliginoso cœno affixa est, capilla- ceis, è caulium nodis prodeuntibus: foliis multis, longo, rotundo; pediculo nixis, gustu amaris, aquæ innatantibus, densis: caulibus teretibus, geniculatis: floribus lu-

NYPHÆA Alia
minor alba.

teis, flori cucurbitæ perquā similibus, quinque tantum foliolis constantibus; non, vt in lutea maiore, numerofo stipatu congestis, aut multos apices intus gignentibus, per ambitum venustissimè fimbriatis: cauliculo oblongo, lato & compresso, seminibus pleno oblongis, latis, in ambitu pilosis, atriplicis ferè modo, gustus quoque amari. Nymphæa alba maior & lutea in paludibus & stagnantibus aquis nascuntur. Nymphæa minor alba & lutea aquarum etiam sunt alumna: verum regionū maximè Septentrionalium. Lutea minor in Sebusianorū parte, quam vulgò Bressiam vocant, plurimis stagnis ac viuariis innatat, quare omnibus illic nota ac celebris est. Præterea in Sequanæ ripis ad Mantam oppidum gignitur. Græcis fortassis incognita. Septentrionales, apud quos sæpius prouenit, Morsum ranæ vocitant, cum Nymphæa parua veriùs appellanda sit: magis enim ad Nymphæas, quàm ad potamogetona, aut quamuis aliam palustrem herbam accedit, tum figura, tum natalibus. Alba minor alia radice est plurimis fibris simul coaceruatis villosa,

villosa, cubitalibus, quæ herbæ viticulas longè lateq; disiectas alunt in luto adeò profundè demersa, vt nisi validè sub cœnum brachium adigas, vix vi eruere possis, villos multos per aquam spargente, ramorum geniculis affixos, tenerrimos, qui facilè rumpuntur cùm herba vellitur: id quod multos decepit credentes nullam aliam radicem esse præter exiles eas fibras: folia multa Nymphææ modo è nodosis ramorum per aquam fluctantium geniculis prodeunt, longo pediculo hærentia, aquis innatantia, minori chelidonio au asaro simillima: quorum auersæ parti ferè semper mucosi vermiculi, ex aqua recens compacti, velut agglutinati hærent & in ea fouentur: rami per summam aquam huc illuc diffunduntur. Flos est violæ, niueus, longiusculo capite & herbaceo inclusus priusquam dehiscat, longa virgula subiecta nuda, nec ramosa, nec foliosa, vt in chelidonio minore. Floret Augusti mensis principio. Flos noctu comprimitur & sub aqua latet, inter diu patescit, & aquis sese exerit. Euulsa herba & rursus in aquam iniecta viriditatem diu retinet, & quamuis radicibus careat, reuiuiscit tamen, nouamq; sobolem gignit. Sapor idem qui & lenticulæ palustris. Vis refrigerandi & humectandi. Miretur aliquis & iure quidem, Theophrastum quo loco palustres plantas, præsertim in Orchomenio lacu frequentes, tam diligenter enumerauit & descripsit, Nymphææ lacuum & paludum ferè omnium aquis innascentis nullo modo meminisse, sed eo tantum loco quo de radicum differentia tractat, quem supra citauimus. At qui plantas Orchomenio lacui familiares à Theophrasto descriptas diligentius perpenderit, cõperiet, Dalechampij sententia, Sidæ nomine tum Nymphæam ipsam, tum ipsius semen intelligi, quod eius lacus accolæ Nymphæam Sidam nominent. Theophrasti verba hæc sunt. Πρότερον οὖν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ περὶ Ὀρχομενοῦ τό δ' ἐστὶ, τὰ φυόμενα δένδρα, καὶ ὑλήματα. ἰτέα, ἐλαίανθος, σίδη, χαλαμῶς, ὅ, τε αὐλήνικος καὶ ἕτερος, κύπρος, φλέω, τύφη. ἔτι γέ μιν μηνίανθες, ἱκμη, & χαλαμῶν ὕπνον. ὃ δ' προαγορεύσει λέμια, τὸ τοῦ πλεῖστον τὸ κατ' ὕδατος ἐστὶ. Id est, Primùm in lacu Orchomeno arbores & materiæ humiles proueniunt, salix, Elæagnus, Sida, Calamus tibialis & alter, Cyperus, Phleum, typha, meniantes, icma, ypnium. Quod enim Lemina vocatur, altiùs mergitur in aqua. ἡ δὲ σίδη τὴν μὲν μορφὴν ἔστιν ὁμοία τῇ μήκωνι. καὶ δ' τὸ ἄνω κυλινδρῶδες (Gaza κωδιῶδες vel κηλυκῶδες legit) τοῖς τὸν ἔχει, πλεὴν μείζον, ὡς κατὰ λόγον. μεγέθει δὲ ὅλος ὁ ὄγκος ἡλίκων μήλων. ἔστι δὲ ὁ γυμνὸν, ἀλλ' ὑμένες περὶ αὐτὴν λευκοί, καὶ ἐπὶ τῆσις ἔξωθεν φύλλα ποώδη, παράπλησια τοῖς τῶν ρόδων, ὅταν ἐν χαλυσίν ᾧσι, τέτραρα τὸν ἀεθμόν. ἀνοιχθῆτα δὲ τὰς κόκκους ἐρυθρὰς μὲν ἔχει, τῷ χημάσι δὲ ὅμοιους τὰς ῥίζαις. (Gaza legit. τοῖς μήκωνος, siue τῇ μήκωνι, vel potius τὰς ῥοδαῖς ex cõtextu & Athenæo, apud quem corruptè legitur δίδη pro σίδη) ἀλλὰ περὶ μὲν μικρὰς δὲ, καὶ ὁ πολλὴν μείζονος κέγχος. τὸν δὲ χύλον ὑδατώδη τινὰ, κατὰ περὶ τῶν πυρῶν. ἀδρυῖ) δὲ τὸ γένος, μίχον ὃ ἔχει μικρόν. ὃ δὲ ἄνθος ὁμοίον ρόδου χαλυκι, μείζον ὃ καὶ χεδὸν διπλάσιον τῷ μεγέθει. τὸ μὲν οὖν καὶ ὃ φύλλον ἐπὶ τῷ ὕδατος. μετὰ δὲ ταῦτα ὅταν ἀπανθήσῃ καὶ συτῇ ὃ κατὰ χάριον, κατὰ κλίνας φασὶν εἰς ὃ ἰδωρ μᾶλλον. τέλος δὲ συνάπτεται ἐπὶ τῇ γῇ, καὶ τὸν καρπὸν ἐκχεῖν. Id est, Sida specie papaueri similis est: caput enim cytini formam habet, vel vt legit & conuertit Gaza, tale etenim caput gerit, nisi quod amplius ad portionem, magnitudo mali tota amplitudo, est autem non nudum, sed candidis membranis intectum, hisq; foris folia herbacei coloris similia rosis, quæ adhuc sunt in calice, quaternæ se applicant: apertum grana rubra ostendit, figura non papaueris (sic legit Gaza, sed legendum, vt diximus, malo punico dissimile, vt totum caput malo simile sit, grana verò intus conclusa mali punici granis dissimilia, cum minora sint) sed orbiculata, exigua, nec multò milio maiora. Saporem quemdam dilutum habet vt triticum: crassatur æstate, pediculo paruo adnectitur: flos calici rosæ similis, sed maior, & ferè duplex magnitudine. Huic & folium super aquam extare affirmant, postea cum defloruerit, fructusque compactus fuerit, magis in aquam declinare: tandem

Tempus.

Lib. 4. hist. cap. 11.

terram contingere, fructumq; fundere. Hæc tam accurata Sidæ historia Nymphæam hoc nomine intelligi perspicuè demonstrat. Nymphæa enim nusquam alibi quàm in lacubus & paludibus reperitur, nec alibi flores eius foliaq; decerpuntur, quàm summa aqua: flos præsertim luteæ rosæ calicibus similis. Fructus, quem peculiariter etiam Sidam vocant, membranosis & candidis foliolis obtegitur, papaueris caput figura æmulatur, tamen grandior & amplior, nempe mali ferè magnitudine. Æstate crassescit, & cum perfectus est paulatim aquam subit, donec terram attingat, tum demum fructum fundit. Semen aperta Sida rubrum spectatur, malo punico dissimile, ut quod rotundum sit, minutum, milio non multò maius, saporis aquosi. Hæc, inquam, omnia in Nymphæa spectantur, nisi quis dicat à Theophrasto Sidæ semen rubrum, Nymphææ nigrum à Dioscoride dici. Cui facilè responderetur Nymphææ semen maturescens rubescere, siue rufescere, maturum nigricare. Præterea inter lacustres siue palustres plantas Nymphæam valde celebrem, nusquam alibi Theophrastus aut describit, aut recenset, cum tamen in Orchomeno lacu plurima nasceretur, eodem Theophrasto teste, cum ait, Dulcis est Nymphææ radix. In lacustribus nasci solet, ut in Orchomenia, Marathone, & in Creta. Hanc Bæoti vocant Madonain, fructumque mandunt: quod postremum idem de Sidæ semine dixit Theophrastus. Cibo idonea ex nascentibus in lacu Sida, & ipsa, & folia ouibus, germen suibus, fructus hominibus. Pena plantam aliam raram & perelegantem maluaceam, & Althææ congenerem, non

ALTHÆA Palustris, Pena.



abs re à quibusdam doctissimis Sidam Theophrasti existimari scribit, cui quidem, ut si quæ alia, optimè quadrat. Nam σίδη Græcis dicta fuit, inquit, à flore eiusdem cum balauftio coloris, nec absimili, qualem venustum imprimis ostendit hæc planta, florere solita in locis riguis, lacustribus agri Ferrariensis inter Patauium & Eridanum flumen. Radix hortensis maluæ, caulis cubitorum duorum, folia Althææ, sed oblongiora, laciniis acutioribus, flos purpureus, saturatus, pæoniæ aut maluæ fatiuæ, aut cytini. Iuxta & in summis caulibus visuntur tempore vindemiarum vtriculi rotundi, oblongi, pullo colore, Aristolochiæ effigie, prægnantes, semine smyrnij, aut milij colore & magnitudine. Dicitur & Althæa palustris. Radix Nymphææ sicca cum vino pota, inquit Dioscorides, cœliacis dysentericisq; auxiliatur. Eadem stomachi ac vesicæ doloribus illinitur: vitilignes ex aqua emendat: imposita cū pice alopeciiis medetur. Eadem contra veneris insomnia bibitur, siquidē ea prorsus adimit: pota assiduè aliquot diebus genitali infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ luteæ semen & radix contra fœminarum profluvia efficaciter ex vino nigro bibuntur. Plinius de Nymphææ in medicina usu sparsim hæc tradit. Radix nigra in sole siccatur, aduersaturque aluinis: quod corruptè legi affirmat Cornarius suppositum à quodam, qui cum oblitteratam lectionem assequi non posset, aduersaturque aluinis substituit ex Dioscoridis verbis κοιλιακὸς ὠφέλει, idest, cœliacis prodest: aluinos dictos putans cœliacos: cum tamen hac voce vsus Plinius non comperiatur. Nam quod alibi

Lib.9. hist.
ca.13.

Lib.4. hist.
cap.11.

Lib.3. c.131.

Lib.25. c.7.

Embl. 134.
lib.3.

Li.21. ca.27.

de Vin

de Vincaperuinca legitur, Aluinis imposita multum prodesse dicitur: hoc in vetere habetur, In aluta imposita, &c. Vetus itaque Cornarij codex habet, ac versatur, & pro aluinis alternis, vocis tam certa vestigia, ut non sit alia verior lectio exquirenda, cum & sententia ipsa ita plena reddatur. Idem Plinius vires Nymphææ ita tradit. Venerem in totum adimit, ut diximus, Nymphæa Heraclia, eadem semel pota in quadraginta dies. In somnia quoque veneris à ieiuno pota, & in cibo sumpta. Illita quoque radix genitalibus, inhibet non solum venerem, sed & effluentiam genituræ (ita *ὀνδρωγμὸν*, idest, seminis in somno effusionem reddidit: vulgati codices habent affluentiam) ob id corpus alere, vocemque dicitur. Et alopecias emendat Nymphææ & cicutæ radix, si vnà trita illinantur. Et, Nymphææ Heraclie semen cum vino potum dysentericis prodest. Tenesmo radix Nymphææ Heraclie è vino bibitur. Et, Aluum leuiter soluit & Nymphæa in vino austero. Nymphææ Heraclie radix è vino pota, & ipsa consumit lienem. Et, dolores vesicæ sedat ex vino Nymphææ Heraclie radix. Et, Nymphæa trita plagis imponitur (ad sanguinem sistendum.) Et, Vlcera manantia Nymphææ Heraclie radix sanat. Galenus verò optimè de hac re statuit his verbis. Nymphææ tum radix, tum semen desiccandi vim habet citra morsum. Itaque ventris profluvia cohibet, semenque siue per insomnia, siue alio pacto immodicè profluens retinet. Iuuat porro etiam dysentericos. Cæterum Nymphæa quæ candidam habet radicem potentioris est facultatis, ut & muliebri medeatur profluuio. Verum & hæc & ea quoque quæ nigram habet radicem ex vino nigro austero bibitur. Porro nonnullam habent quoque & abstergendi potentiam. Itaque & alphas sanant & alopecias. Cæterum ad alphas macerantur aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad hæc aptior est ea cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba. Arabes non solum Nymphæarum semine & radice vtendum præcipiunt, cum refrigerare & exsiccare sit opus, sed & floribus, cum refrigerandum & humectandum sit, de quibus Græci nihil scripserunt. Nymphææ flos, inquit Auicenna, est frigidus & humidus in secundo. Serapio. Albafari, Nenufar est frigidum in tertio gradu, humidum in secundo, subtilium partium, penetratiuum, aufert vigilias euenientes à caliditate. Rhasis. Nenufar est frigidum, inducit somnum, sedat dolores: quod de floribus intelligendum est, & certa experientia compertum. Nam syrupus ex iis calorem immodicum valde extinguit, oleum & aqua ex iis stillatitia somnum alliciunt, dolores capitis sedant à bile excitatos. Quod si hæc Græcorum inuentis addiderint, non modò non culpandi, sed laudandi sunt potius: neque propter eà existimandum eos de alia quàm de Græcorum nymphæa loqui, cui cum refrigerandi & humectandi vim tribuunt, de floribus intelligunt, sicuti Græci atque Arabes de semine & radice, cum vim refrigerandi & exsiccandi illis inesse tradunt. Sed inde maiores rixæ & conuitia neotericoꝝ in Arabes, qui Nymphæam quandam calidæ naturæ esse tradiderunt, & tenuium partium. Serapio. Est alia species Nenufarum, in qua est acuitas, caliditas & subtilitas, ita quod quando volumus calefacere in ægritudinibus frigidis, administramus eam, & inuenimus iuuamentum. Verum quid miri est cum Nymphæa inde dicta sit, quod lymphis nymphisve sit conuictrix & accola, Serapionem & ipso antiquiores palustrem aliquam plantam consimilem, calidā, tenuantemque nymphæarum generibus adscripsisse: nimirum illam fortassè quam Belgæ *Dotterbloemen* nominant, periti quidam herbarij Caltham palustrem: quippe cuius natales, folia, flores Nymphæam luteam proximè referunt, atque adeò ut hanc illi quidam substituerint. Radix acris gustu est.

Li. 26. c. 10.

Li. 25. ca. 11.

Lib. 26. c. 8.

Ibidem.

Li. 26. ca. 13.

Ibid. ca. 14.

Li. 8. simpl.

Lib. 2. c. 315.

Lib. simpl.

cap. 144.


Lib. simpl.

cap. 144.

Petr. Pe. in

Ad.

Lib.4. hist.
ca.11.
Nomen.



Forma.

LEMMA. NTER Lacus Orchomeni plantas Theophrastus Lemma recensuit, non Lemna, vt in vulgatis codicibus legitur, de qua, nisi quantum cōiectura probabili assequi possumus, nihil certi possumus iudicare. Lemma quidam dictum volunt quasi λεπίδα, idest, squamam, corticem, membranam à verbo λέπειν quod significat λεπίζειν, desquamare. Id Lemma esse cuius picturā hīc damus verisimile est. In lacubus stagnisque agri Segusiani limpidum aliquem riuulum excipientibus nascitur, longissimis & tenuissimis veluti filis ex profundo aquæ in summū emergentibus, in quorum fastigiis quaterna spectantur foliola, squamis piscium simillima, instar lenticulæ aquæ innatantia, carnosa, virgata: flos est candidus, gustus fatui. Nominis igitur etymologia, natales Lemmati satis conueniunt.

LENS PALVSTRIS.

CAP. XII.

Nomina


LENS seu Lenticula palustris Græcis vocatur φακος ὁ ἐπὶ τῶν τελευμάτων, Arabibus *Tahaleb*, seu *Thaleb*, Gallis *Lentille d'eau*, Italis *Lente de i paludi*, Germanis *Uasser linsen*, Hispanis *Lenteja dellagoa*, Officinis Lenticularia seu Lenticula aquæ. Folio est rotundo, minuto, lenticulæ simili, paruo tenuiq; inhærens capillamento Hæc si (quod nonnunquam accidit) aquarum inundationibus à pigris aquis influentes transferatur, cū litoribus inhæserit, mirum in modum propagatur: nam subnatis quibusdā capillamentis, quæ radicum vice esse videntur, sese terræ alligat, atque ita adolescens tandem crescit in plantam aquatico sisymbrio haud absimilem. Id quod naturæ operum indagatores non sine admiratione obseruauerunt. Lens palustris reperitur in sta-

Forma.
Matth. in
ca.83. lib.4.

Locus.

LENS PALVSTRIS, Matth.

Lib.4. c.83.
Vires.



gnantibus aquis, inquit Dioscorides, muscus lenti similis. Vis est ei refrigerans. Quare omnibus inflammationibus, ignibus sacris, & podagris cōuenit, tum per se, tum cū polenta imposita. Agglutinat etiam in pueris hernias intestinorum. Sic Plinius Lentem palustrem totidem ferè verbis describit. Est & palustris Lens nascens in aqua non fluente; refrigeratoriæ naturæ: propter quod collectionibus illinitur, & maximè podagris, & per se, & cum polenta: glutinat & interanea procidentia. Et Galenus, Lens palustris, inquit, humidæ frigidaq; temperaturæ est, vtrinq; ex secundo quodammodo ordine. Magnificiunt quidam, vt tradit Matthiolus, pumilæ huiusce plantulæ stillaticiam aquam

Li.25. c.22.

Li.8. simpl.

Temper.

& Vires.

LENS PALVSTRIS

Altera, Maith.

aquam ad internas viscerum inflammationes, & ad pestilentes febres. Quinetiam eandem præferunt ad oculorum ruborem, & palpebrarum phlegmonas, & ad mamarum & testiculorum collectiones antequàm augeantur: nam illita non obscurè fluentes humores repellit. Herba ipsa recens ex aquis allata & fronti adhibita, capitis dolores mulcet, qui à calore pro- uenerint. Vescuntur ea anseres & anates magna voluptate, etiam gallinæ, cùm aquis exempta furfuribus permiscetur. Sunt qui putant Ipnum plantam Orchomeni lacus à Theophrasto positam, lentem palustrem esse, & à Theophrasto siue à Bœotis sic nuncupatam quòd fauillis è camino furnove euolantibus similis sit: nam ἵπνος caminum furnumve significat, cōiectura, vt aiunt, eò probabiliore, quòd nusquam alibi huius lenticulæ herbæ frequentissimæ notissimæq; meminerit Theophrastus. Alia planta in paludibus quoque nascitur, inquit Matthiolus, quam à seminis figura lentem palustrem appellat, Caulem habet angulosum per aquā repentem, à quo per interualla multa simul oriuntur

Lib. 4. hist. Cap. II.

folia longis ac tenuibus pediculis nitentia, quæ quaterna crucis figura sese pandunt, rotundo cacumine. Semen fert racemi modo in ipso caule inter foliorum pediculos lentium ferè effigie, non tamen adeò compressum, subnigrum, longiusculis pediculis appensum, densum, durum. Hanc à Cortuso accepit.

PHLEOS. CAP. XIII.

PHLEOS quoque lacustris est planta, & Theophrasto Orchomeni lacus incola, eaque, inquit, duplex, mas & fœmina, mas fructum fert, fœmina sterilis est, ad nexus utilis, mas inutilis. An verò à diligentibus herbariis tandiu quæsitā nuspiam lacuum, paludum, aliarumve stagnantium aquarum comparebit phleos siue stœbe? eandem enim plantam esse vulgò putant. Nam phleos mas Theophrasti fuerit ea quæ hîc primo loco depicta est: Radice breui, plurimis fibris huc illuc dispersis capillata, foliorum pediculis cubitalibus, angulosis, teneris, fungosis: folio triangulari, tribus cuspidibus mucronato, virgato, è viridi subluteo, valde inciso, vt in tres cuspides & earum mucrones finiat, super aquas eminente: caule laui, cubito altiore: flore violæ in terna foliola distincto, ex albo subpunicea, extante in medio caruleorum apicum veluti glomo: fructu lato, subrubro, vel subrufo (ὑπόπυρρον enim legendū in Theophrasto, nō vt vulgati codices habent ἐπίπυρον) placentæ simili (πλακουλῶδες enim lege, non vt in vulgatis πλακωντῶδες) præter quem globosa & echinata profert capitula. Euulsa hæc planta, & aquis destituta statim flaccescit & arefcit, vt non nisi in aquis possit viuere, quod de phleo Theophrastus tradit, licet autem eam in sicco emarcuisse putes, tamen aquis reddita statim exhilaratur ac reuirescit. Gignitur frequentiùs in cœno aquarum non pigrarum quidem aut stagnantium, sed limpidarum & assiduè fluentium. Sunt quibus videatur planta secundo loco hîc apposita etiam phleos esse, vt sit vtraque mas, superior phleos angustifolia, hæc phleos latifolia,

Lib. 4. hist. cap. II.

Genera

Forma

PHLEOS Mas, siue
Stæbe Theoph. Angustifolia.

Matth.in
 c.96.lib.4.



quam herbarij sagittam, vel sagittalem, alij Plinij Sagittariam aquaticam, siue Pistanam Magonis, quidam linguam serpentis vulgò vocant. Huius folium sagittæ tricuspidis figuram proximè refert, supernè in vnam cuspidem, infernè in duas desinens: pediculo nititur triangulari, intus cauo, sesquicubitali, quandoque maiore pro aquarum profunditate in quibus viuit: caulem habet rectum, læuem, rotundum supernè in ramulos diuisum, quibus flores insident albi, ternis foliolis constantes, hærentque petiolis pari exortu à caule prodeuntibus. Ex his tandem capitula nascuntur subpurpurea, nucis ponticæ magnitudine, in quibus minutum semen concluditur, radicem habet albam, multifidam, fibratam. Temperamento est frigido & humido, & iisdem cum plantagine aquatiqua viribus. Phleo fœminæ folia sunt longa, angusta, vtrinque velut acie manum contrectantium cæsim sauciantia, sic prominente & elato dorso, vt triangula videantur. Caulis ex mediis foliis prodit, tres aut quatuor pedes

altus, globosis & echinatis capitulis circa fastigium surrectis, vt in phleo mare, nullo fructu: radice priori simili. Gignitur ferè in amnium ripis. Huius foliis tegetes & storeas olim rustici texebant, quod ex maris foliis tenerioribus & fungosis fieri nequit. Priori phleo mari & phleo fœminæ cum tribulo (terrestri & aquatico)

PHLEOS Mas latifolia.
Sagitta maior, Matth.



SAGITTA Minor,
Matthioli.



PHLEOS. *Fœmina.*

ac ononide cōmune id est, auctore Theophrasto, quòd licet spinosum folium non habeant, aculeatum tamen quippiam proferunt præter folium, nempe capitulum echinatum, vt tribulus terrestris spinosum seminis cōceptaculum, aquaticus corniculatam nucem, aculeis rigentem, ononis caulem aculeatum, licet nullius folium spinis armatum sit, vel, vt vulgata habent exemplaria, præter aculeos aliud folium gerunt, id est, nec in totum, nec foliis aculeatæ sunt. Præterea nostræ de phleo sententiæ adstipulantur, quæ sparsim de ea scripsit Theophrastus. Phleō folio esse carnosum, multipliciter inciso, numerosis radicibus, non tamen altè descendentes, ononidis & tribuli modo alibi quàm in folio aculeos habere, vt diximus, germinare circa Vergilias, quo primùm tempore terram arant, in aquis vt Sidam & Butomum fructificare: fructum mollem esse, placentem similem, subrufum, quem ἀνθήλην vocant (quo nomine etiam typhæ florem dici scribit Dioscorides) quo ad lixiuia vtuntur, partem radici proximam, quia tenera

Lib. 6. hist. Cap. 1.

Lib. 6. hist. Cap. 5.

Lib. 3. c. 16.

est, mandi à pueris, radice pecudes pasci, fœminam sterilem esse, sed commodè neci, marem fructiferum, sed ad nexus ineptum. Hæc priori phleo mari, & phleo fœmine satis benè conueniunt. Ex quibus illud mirum videri possit, quisnam fructus phlei vsus ad lixiuia esse potuerit, vt fortassè corrupti Græci codices Theophrasti videri possint, in iisque legendum non πρὸς τὰς κοινίας, id est, ad lixiuia, sed πρὸς τὰς κοινίας, id est, ad muros calce illinendos, siue tectorio opere inducendos: conuolutis enim phlei ramis fructu non detracto, muri calce diluta facilè illini possent. Quidam in lixiuii vtilem fuisse interpretantur, quòd eius caulibus subasperis linthea sordida fricarentur ac detergerentur. Iam verò, dicet aliquis, phleon foliis esse spinosis, Plinio ita scribente. Aliqua & secundum spinam habent folium, vt tribulus & ononis. Quædam in folio habent & in caule vt phleos, quod aliqui stœben appellauère. At hæc perperam à Plinio ex Theophrasto conuersa esse perspicuum est ex ipsomet Theophrasto: sic enim scribit. τὰ ὅσα παρὰ τὴν ἀχάνθαν, ἕτερον ἔχει φύλλον, ὡς περὶ τὸν ὄνωνα, τὸ τρίβοδος, καὶ ὁ φλεὼς, ὁ δὲ τινες χαλδοὶ τὸ βίβην. Id est, quædam præter aculeos aliud habent folium, vt ononis, tribulus, phleos, quam nonnulli stœben appellauère. Ad hæc Theophrastus paulò post negat folium phlei spinosum esse, cum enim dixisset capparim aculeos & in foliis & in caule habere, subiungit, nō quemadmodum phleos & hippophaes, quorum folia spinis carent. Et, τῆς δὲ ἀκανθικῆς ἐπόμενον γὰρ τοῦτο εἶπεν, ἐπεὶ δὴ διήρηται, ὅτι μὲν ἀκανθῶδες ὅλως, ὅτι δὲ φυλλοῦ ἀχάνθου, ὑπερῷον χωρὶς λεκτέον. καὶ τὸ δὲ ὅτι παρὰ τὴν ἀχάνθαν ἔχοντος φύλλον, ὡς περὶ ὁ φλεὼς, ὁ δὲ τρίβοδος τὸ ἡ γὰρ παρὰ τὸ ἴδιον ἔχει ὅτι μὴ μόνον τὴν ἐκ τῶν χαλδῶν ἀχάνθαν ἔχειν, ἀλλὰ τὸ φύλλον ἐπαχάνθιον. vel ὡς περὶ ὁ φλεὼς, τὸ τρίβοδος. ἢ δὲ κάππαις ἴδιον ἔχει, &c. Sic enim emendandos esse vulgatos codices tum locus proximè citatus, tum spinosarum plantarum diuisio alibi ab eodem auctore posita, & hîc repetita demonstrant. Sed quoniam aculeatas (id enim consequitur) distinximus in eas quæ totæ spinosæ sunt, & eas quæ spinosa habent folia, de vtrisque seorsum dicendum, & de tertio illo genere, quòd præter aculeum folium habet, vt phleos, tribulus enim & capparidis id peculiare habent, vt non solum caulem aculeatum habeant, sed etiam

Lib. 4. hist. Cap. 11.

Lib. 21. c. 15.

Lib. 6. hist. Cap. 1.

Cap. 5. lib. 6. hist.

folium,

folium vel, vt phleos & tribulus: capparitis enim id peculiare habet, &c. At ne quis miretur tribulo & cappari modo aculeos in caule solum tribui, vt ononidi, phleo, myacanthæ, hippophai, modo præter aculeos illos spinas etiam in foliis, intelligat eundem Theophrastum duo tribuli genera posuisse, vnum folio ciceris, minimè aculeato, alterum folio aculeato. Similiter capparitis nostras foliis est minimè pungentibus, sed spinosis ramis infesta, quæ verò in Ægypto, & multis Græciæ locis gignitur, & ramis & foliis aculeatis rigit. Sed si Theophrasti phleum hîc exhibuimus an propterea Dioscoridis stœben inuenimus? In ea sanè sunt sententia plerique herbarij, moti cōiectura ex Theophrasto sumpta, qui loco suprâ à nobis citato scribit Phleon à quibusdam stœben appellari. Sed levis est hæc coniectura, & parui admodum momenti ad probandum phleon & stœben eandem esse. Idem enim nomen contrariæ etiam naturæ plantis à diuersis auctoribus sæpè inditum est, quod in hac maximè perspicuum est, vel Galeno teste, qui in Antidotis stœbes meminit, acris valde & calidæ facultatis, qua doliis aggesta pater imbecilla vina conseruabat. Verba eius hæc sunt. Nascitur apud nos herba quædam fructicosa, admodum calida & acris, & quæ aromaticum quippiam habet. Vocant autem ipsam indigenæ Colymbada, quidam verò stœben, ad vina conseruanda maximè idoneam. Componunt itaque in hac herba vasa vinaria. Et alioqui per foramina calorem ex magna domo in cellarium admittunt, vt hoc tum ex adueniente calore, tum ex stœbe calefactum omne vinum conseruet, ne vnquam ace scat. Alius verò stœbes meminit in lib. simpl. cuius fructus & folia adstringendi vim habet, mordacitatis expertem. Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine incipiente, quæ eadem planè est quæ Dioscoridis stœbe, cuius semen & folia adstringunt, quapropter decoctum dysentericis infunditur, auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia, oculis ab ictu cruentis profunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent. Hic adnotandum, plantam quam pro phleo fœmina exhibemus à Dodonæo pro Butomo depingi & describi, quod folia angusta & longa habeat, vtrinque acie sua manus atrectantium vulnerantia, dorso ita eminente, vt triquetra videantur, quodque locis palustribus exeat, vt de Butomo scripsit Theophrastus. Alij acorum palustrem, Butomum Theophrasti esse volunt, vt diximus cap. de Acoro, permulti Dodonæi Butomum Sparganium Dioscoridis faciunt, de quo mox.

SPARGANIVM.

CAP. XIIII.

Nomina

Lib. 4. c. 21.

Forma.

Lib. 2. c. 38.

Cap. 115.

Lib. 4. c. 56.

Cap. 116.

SPARGANIVM & Xiphidion dicitur Latinis, vt Græcis Σπαργάνιον & Ξιφιδίων, Arabibus *Safarheramon*. Sparganium, auctore Dioscoride, folia habet gladioli, sed arctiora, & magis inclinata, in summo caule veluti pilulæ sunt, in quibus semen. Dodonæus in Histor. stirpium, pro sparganio pingit & describit plātam, quam Belgæ *Vuatterlijscha* ppellāt, ipse in frument. Historia, Gladiolum palustrem, siue aquaticum, plerique Scirpum, alij Iuncum floridum. Pena & Lobellius, atque permulti herbarij sparganium Dioscoridis, & Theophrasti Butomum esse volunt, eam quam coniecturis quibusdam adducti pro Phlæo fœmina haberi posse superiori capite indicauimus, nominis argumento id docente, inquit Pena, qui βούτομον interpretatur admodum scindens. Præterea plāta hæc in paludosis & riuis prouenit, foliis iunci & cyperi similibus, dorso prominente & carinato triquetris, acie sua vtrinq; manus arripientis fauciantibus, partim à radice graminea fibrata erectis, partim in bicubitali caule alterno situ sparsis & reflexis, in alarum cauo globulos echinatos saturatè, virentes, duros, firmos, platani pares habente, gustu subadstringente, sicciore, & insipido. Dodonæus in Hist. stirp. pro Butomo descripsit, in frument. Historia, Platanariam à fructuum cūm platani pilulis similitudine nuncupat, à quibusdam Belgis *Rietgras* dici ait, id est,

SPARGANIVM

Alterum, Lobellij.



id est, gramen arundinaceum. Sparganium esse *Vires.* negat, quod vel solus, inquit, pilularum situs ostendit, quæ non ἐπ' ἀκροῦ τοῦ καυλοῦ, id est, in summo caule modo, sed & infra eius summum multo, & alibi quoque exoriuntur. Matthiolus dubitat an eadem plâta genuinum sit Dioscoridis sparganium, quia folia habet xiphio latiora, non arctiora, sursum spectantia, non humi procumbentia. At vaga illa latioris angustiorisque folij nota, inquit Pena, sæpè non certa, sæpissimè in contrarium accipienda in Dioscoride ostèditur alibi: & vbi dicit ἐπικλινότερα, magis quàm gladioli inclinata, apertè indicat esse magis disparata & sparsa (vt fanè sunt) quàm sint gladioli, quæ plurimùm recta, & proximè caule parallela assurgunt. Alterum Sparganiũ pinxit Lobellius, radice & foliis priori similibus, caule simpliciore, alis viduo, minore, per intervalla verticillis distincto, à quo florũ globuli oriuntur molliores, minúsque spinosi & echinati. Datur, inquit Dioscorides, radix & fructus cum vino commorsis à feris, sic enim Græcè legitur, ὀλιδόζαι ἢ ῥίζα, καὶ καρπὸς σικωδίνω

Lib. 4 c. 211.

θηροδυνήτοις. Ruellius Plinium secutus vertit, contra serpentis venena radix cum vino datur. Sic enim Plinius habet. Aduersus serpentes bibitur & eius radix quæ sparganium vocatur ex vino albo. Galenus. Sparganium & ipsum desiccantis est facultatis. Matthiolus plantam istam iuncis adiunxit, & iuncum floridum appellauit, eoque nomine depinxit. Nascitur, inquit, in Bohemia iuncus circa aquas, quem à floribus speciosis quos edit, iuncum floridum vocare volumus, eiusdem cum aliis facultatis.

Lib. 25. c. 9.

Li. 8. simpl.

In cap. 47. lib. 4.

MENYANTHES PALVSTRE Theophr. CAP. XV.

HEOPHRASTVS inter Orchomeni lacus plantas Menyanthes re- tulit cum Icma & Ipno. Gaza mensifloram conuertit. At quoniam tri- phyllum asphaltodes à veteribus menyantes, auctoribus Dioscori- de & Plinio, vocatum fuit, hac verò planta triphylli modo in longis pediculis folia gerit, eam Menyanthes palustre Theophrasti esse herbarij iudicant. Sed μηνάνθος ex Gazæ translatione in Theophrasto quidam legunt pro planta lac- ustri, apud alios auctores μηνόανθες pro triphylo asphaltite. Radice est longa, can- dida, densis geniculis tuborum modo in sese farctis, modicè fibrata: foliis latis, læ- uibus, crassis, fabæ similibus, ternis simul longo pediculo insidentibus: caule ses- quipedali, læui, gracili, virente, à cuius medio sursum versus flores erumpunt, prius- quam dehiscant candidi, nonnumquam subrubentes ac rotundi: cum reclusi in quina folia diuisi, oblonga, tenuissimis & candidis filis veluti lanugine siue pube quadam elegantissima crispata, folliculi inde parui, rotundi, siue rotunda capitula, in quibus semen ex fusco flauescens, amari gustus. Nascitur in aquis & cœnosa vli- gine aquis vicina, earumque affluxu semper madescente, extra aquam eitissimè flac- cescens. Hanc hîc graphice pictam damus. Dodonæus in plantarum historia pro Isopyro descripsit ac depinxit, & à Belgis à foliorum similitudine *Bocxbonen*, id est, fabam hircinam appellari scripsit. In palustrium verò historia trifolium palustre nominat,

Lib. 4. hist. cap. 11.

Nomina

Forma.

Locus.

Lib. 4. c. 79.

Cap. 98.

nominat, & cum isopyro magnam habere similitudinem, eique esse tam simile, vt verum Isopyrum videtur, quod etiam phasiolum, propter similitudinem dici, Dioscorides auctor est, cui foliis simillima est planta hîc depicta. Sed huic Dodonæi sententiæ tum Dioscoridis, tum Plinij auctoritas maxime refragari videtur. Scribit

Lib. 4. c. 16.
Ibid.

MENIANTHES Palust. Theoph.
Isopyrum, Dodon.



ISOPYRVM, Matth.



stu. Quod verò sequitur, τὸ δὲ φύλλον ἀνίσω, folium verò aniso, perperam additum est,

MENIANTHES Palust.
Dalechampi.



enim Dioscorides. Ἰσόπυρον, οἱ δὲ φασιόλον χαλᾶσιν, ἀπὸ τῆς εἰκέναι φασιόλω τοῦ χαλᾶς ἀκρον δὲ πᾶσι δὲ ἐλάττω ἐλίκῃ φέρειν. Et paulò post, παραπλησίον μελανθίω τὴν γεῦσιν, τὸ δὲ φύλλον ἀνίσω. Id est, Isopyron quod aliqui phasiolum vocant, quia phasiolo simile est, quod in summo folia clauiculas ferant. Et, gustu melanthio similibus, at folium aniso simile est Plinius verò, Aliqui phasiolum vocant, quoniam folium quod est aniso simile, in pampinos torquetur. Quorum auctorum vulgaria exemplaria deprauata esse res ipsæ perspicuè demonstrant, nec enim phasioli folium clauiculas vllas habet, nec anisi folium, præterquàm quòd clauiculas nullas habet, vllum cum phasioli foliis similitudinem habet. Emendandum igitur Dioscoridis exemplar fuerit, hoc modo. Ἰσόπυρον, οἱ δὲ φασιόλον χαλᾶσιν, ἀπὸ τῆς εἰκέναι φασιόλω. Ἐπεισὶ δὲ κεφαλὰ ἐπὶ ἄκρῃ τοῦ χαλᾶς, λεπταὶ σπερματίων πλεῖραι παραπλησίον μελανθίω τὴν γεῦσιν. Id est, Isopyrum, aliqui phasiolum nominant à similitudine phasioli. Capitula ei sunt in summo caule, tenuia, plena seminibus, similibus melanthio in gustu. Quod verò sequitur, τὸ δὲ φύλλον ἀνίσω, folium verò aniso, perperam additum est,

est, forma enim folium isopyri anisum referre non potest, cum phasioli folio simile sit. Aliud Isopyrum Matthiolus ostendit quod Dioscoridis Isopyrum in omnibus referre ait nulla addita descriptione. Semen Isopyri, ut asserit Diosco. contra tussum & cetera pectoris vitia, ex aqua mulsa bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus utile. Isopyrum, inquit Gal. semen habet amarum & subacribum. Extergit itaque & incidit humores crassos, cum hoc ut corpora contrahat & constringat, quamobrem excreationibus pectoris conducit, & iecur expurgat, & sanguinem spuentibus non est aduersum.

Vires.

Lib 6. sim.

ALSINE AQUATICA. CAP. XVI.



FOLIORVM similitudine *Forma.*
 Alsine aquatica nuncupata
 radices multas emittit can-
 dicantes, valde tenues, bre-
 ues: caules numerosos, exiles ac iuncea-
 los, benè longos, aquarum impulsu dispersos
 & natantes: folia alsines ordine ex ad-
 uerso disposita, longiora & angustiora,
 gustus fatui, saporisque diluti: florem &
 fructum nondum vidi. In limpidorum *Locus.*
 riuulorum sabuloso fundo prorumpit.
 Aquis extracta quam citissime flaccescit.

HEPATICA PALVSTRIS. CAP. XVII.



B HERBARIIS & seplasiariis Hepatica aquatica siue palustris nomi- *Nomen.*
 nata & Ranunculus aquaticus, à Dodonæo Polyanthemum palustre,
 in iis etiam est plantis, quæ aquis innatant, cuius folia quæ in summo
 sunt pro locorum in quibus crescit varietate, varia sunt. Quæ aquis
 immersa est cauliculos fert graciles, folia minutim admodum incisa, vulgaris cha-
 memeli modo. Antequam verò aquis immerga-
 tur, & cum adhuc super extat, folia fert rotun-
 da, parum in ambitu crenata. Quæ nō in aquis, *Forma.*
 sed in aggeribus & marginibus fossarum nasci-
 tur, nulla alia habet folia, quam crebris incisuris laciniata. Quæ verò propter aquas nascitur,
 & interdum earum incrementis & inundatio-
 nibus alluitur, foliola quidem habet in summis
 cauliculis rotunda, sed multò magis crenata, quàm
 folia eius quæ penitus sub aquis latet: flores sunt
 candidi, odorati, in medio lutei, ranunculi aut
 fragariæ similes, quibus succedunt capitula aspe-
 ra, & semen ut in ranunculo. A qua florum & se-
 minis similitudine, videri potest hæc planta ra-
 nunculi aut polyanthemi species, inquit Dodo-
 næus, ut polyanthemum palustre vel aquaticum
 iure dici possit. Quidam Callitrichen Plinij esse

HEPATICA Aquatica,
siue Palustris.

coniectant, lenticulæ foliis, caulibus iuncea, tenuissimis, radice minima, gustatu
 feruentem, nascentem in opacis & humidis. Alij potiùs Callitrichen esse putant
 Nasturtium pratense minimum, alibi descriptum.

Nomina

Dodo. lib.

l. cap. 69.



PLANTAM hanc herbarij quidam millefolij speciem esse putant, Lobellius Myriophyllum Equisetifolium vocat: alij Violam aquaticam siue palustrem, Gallicè *Gyroslee d'eau*. Attentiores iudicioque præstantiores Castoris potamogætona memoratum à Plinio esse putant tenui folio, velut equinis setis, thyrsis longo & læui, in aquosis nascentem Caules

VIOLA PALUSTRIS,



profert longos, tenues, rectos, teneros: folia item oblonga, minutim incisa, sub aquis latè dispersa, semper quina, senave ex aduerso opposita, vt in rubia & galio, horum vnumquodque thanaceti aut millefolij vulgaris folio simile est nisi minus esset thanaceti, maius & amplius millefolij folio. In caulibus extra aquas eminentibus flores emittit semper ternos quaternosve, inter sese oppositos, rotæ parvæ, in quinque radios diuisæ, aut leucoij, aut buglosi vulgaris floribus similes, candidos & in medio luteos, odoratos. Radices nihil aliud sunt quàm fibræ longæ, graciles, nigrae, nisi quòd parte extrema, qua in terram defiguntur, candi-

dæ sunt, & crystalli aut alabastris modo splendentes. Tota herba ante caulis prouentum sub aquis conditur, atque tunc eis innatans nouella videtur abies, caulis verò cum excreuerit, vnà cum floribus superficiem superat, & supra aquas eminent. Gaudet lacubus & aquis stagnantibus, facultatem frigidam videtur habere & siccam, nullius tamen est in medicina vsus.

Locus.

Vires.

CONFERRA TRICHODES.

CAP. XIX.




ASIMILITUDINE Conferuæ Plinij à conferruminando dictæ, planta hæc aquatica conferua trichodes ab herbariis peritis nominata est, ab aliis Trichomanes aquaticum. Adhæret crassiore sui partè saxi aqua perpetuò madidis, & in ea demersis, nulla radice, sed suis statim filis: inde per aquam villos dispergit, longitudine cubiti, nullis foliis ornata cinctaue, sed exilibus pilis comata, viridibus, & cum aruerint, rufis, qua de causa trichoden nominarunt, gustus fatui. In gelidis purisque fontibus præcipuè nascitur. Conferua Plinij Lobellio creditur esse hæc, spongiosis, flexuosis, sesquicubitalibus & longioribus quasi ellychniis ex fusco virentibus staminibus villorum cirris lene fluentibus aquis fluitans, scitè Plinij Spongiæ aquarum dulcium veriùs quàm Muscus, aut herba, villosa densitatis. In Lacu maiore Mediolanensis agri reperitur. De Conferua hæc Plinius. Curatum ea scio omnibus ferè ossibus contractis prolapsum ex arbore alta putatorem, circumdata vniuerso corpori, aquam suam

Lib. 27. c. 8.

Nomina

Forma.



suam inspergentibus quoties inaresceret, raroque nec nisi deficiente herba mutationis causa resoluentibus conualuisse, vix credibili celeritate.

FOENICULUS AQUATICVS.

CAP. XX.



FOENICVLVS aquaticus radices *Forma.* producit multas, seu fibras potius tenues, quæ ob tenuitatem facile rumpuntur, subrufas, luto infixas: caulem vna longiorem, rotundum, geniculatum, mollem, tenerum ac fragilem, aquis innatantem ac iactatum. Ad singulos geniculorum articulos folia prodeunt longa, fœniculo similia, quam ob causam fœniculum aquaticum nominarunt herbarij. In geniculis fastigium versus tendentibus, & in summo plantæ vertice flores singulares emicant, longo & gracili nixi pediculo, in medio lutei, in ambitu candidis foliolis coronati, quibus decussis capitulum suboritur, vt in ranunculo tuberosum, gustus subacris. *Locus.* In alto vado fluminum cœnosorum, & pigre labentium, qualis est Arar, prouenit: vnde extracta herba celerimè flaccescit.

Nomina

Lib. 20. c. 8.

Lib. 2. Ali.

Lib. 4. c. 16.

Forma.**Locus.**

Lib. 21. c. 8.



Vox Græci λειμόνιον, Latini similiter Limonium vocant, inde dictum quod in palustribus pratis nascatur, quasi pratensem herbam dicas. Plinius, betam sylvestrem nominari tradit. Galenus tamen se nullam betam sylvestrem vnquam nouisse ait, nisi quis pro ea lapathum accipiat. Limonium scribit Dioscorides folia habere betæ similia, tenuiora & longiora, decem aut plura: caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, seminibus rubris refertum, gustu adstringentibus. Nascitur in pratis & palustribus. A Dioscoride paulum dissidet Plinius. Est & beta sylvestris, inquit, quam limonium vocant, alij neuroides, multò minoribus, tenuioribusque ac densioribus foliis, vndecim sæpè caulium. Minora folia dixit, Dioscorides μακρότερα, id est, longiora, postrema verò verba corrupta sunt. Legendum enim vndecim sæpè, caule lilij ex Dioscoride, vt voces vndecim sæpè, ad folia præcedentia pertineant, & caulium

LIMONIVM,
Matthioli.



LIMONIVM Alterum,
Matthioli.



In cap. 16.
lib. 4.

Ibidem.

vox, ex caule lilij corrupta sit. Nascitur in pratis & palustribus. Quam plantam seplasiæ falsò Behen rubrum vocant, eam Matthiolus Dioscoridis limoninm esse putat. Si quis enim, inquit, diligenter expendere, eam inueniet notis omnibus limonium referre, cogeturque fateri verum esse limonium, aut eius genus. Est enim herba foliis betæ tenuioribus & longioribus, decem & sæpè pluribus: caulibus tenuibus, in quibus semen rubrum, quod gustatum adstringit. Præterea in pratis præsertim vliginosis & palustribus prouenit. Iam verò experientia compertum est Behen hoc adulterinum iis præditum esse facultatibus ac viribus, quas Limonio tribuerunt Dioscorides & Galenus. Idem Matthiolus alterum depinxit limonium, sed non distinxit, nec monuit vtrum verius Dioscoridis limonium representet, vt eius verba declarant, quæ sunt huiusmodi. Non temerè me facturum putavi, si pro vero limonio hîc eas plantas depictas exhiberem, quæ in Officinis

ficinis Behen rubri nomē perperam acceperunt, quod iam mihi persuasum sit eas planè Behen illud ementiri, de quo à Mauritanis mentio facta est. Non inscite, inquit Pena, pratenſi & maritimo recepto, ſcilicet primo nomen & notio Limonij conuenit. Folia enim eius ſunt betæ nigræ magis affinia, ſemen copioſum, oblongum, ex cæruleo ruſcens, flores purpurei, caules tenues radixque rubescunt, magnitudine lapathi acuti, ad quod tota hæc planta accedit, & guſtu ſubastringit, vnde pharmacopœi Behen rubrum nuncuparunt. Huic alterum prorsus ſimile idem Pena depinxit, ſed multò minus, quod inter ſalebrosa litora & rupes montis Cetij, & alibi Narbonæ & Galloprovinciae ſaxoſis oritur frequens, & empetro ſeu fœniculo marino lubens ſe associat, foliis minoribus oleæ, aut myrti paribus, radici proximis, per humum ſparſis: circum pedales caules & cauliculos graciles inflexos muſcoſis & cæruleis floribus ſuperioris non diſſimilibus onuſtos, folia longè minora, fœniculum marinum ſiue Empetrum ſatis expri-

LIMONIVM, *Narbonenſe*
Paruum.



LIMONIVM,
Aliud.



munt. Aliud limonium herbarij alij proponunt hîc etiam depictum, quod foliis betam referat, & in riguis nascatur. Gignitur in locis riuulorum illapsu madentibus, natura tamen lapidoſis & aridis: radice ſuperiore craſſa, nigra, ſenſim gracileſcente, fibrata: foliis decem aut duodecim, betæ ſimilibus, longioribus, coſta per medium excurrente, craſſis, carnoſis, venoſis, è viridi pallentibus: caule cubitali, læui, nudo, recto: flore in vertice copioſo, luteo, ſenecioni ſimili, in pappos abeunte. Limonij ſemen tritum, inquit Dioſcorides, & ex vino acetabuli menſura potum, dyſentericis, cæliacisque prodeſt: rubra fœminarum profluuia ſiſtit. Eadem planè Galenus tradit. Limonij fructum vtpotè acerbum, in vino exhibent cœliacis & dyſentericis, hæmoptoicisque ſiue ſanguinem ſpuentibus, iuuat & profluuium muliebre. Satis eſt oxybaphi menſura. Plinius quadam alia habet. Limonij folia ambuſtis vtilia, guſtantia adſtringunt. Semen acetabuli menſura dyſentericis prodeſt. Aqua & è radice cocta maculas veſtium elui dicunt, item membranarum.

Vires.

Ibid.

Li.7.ſimpl.


Lib.20.c.8.

Nomina

Lib. 2. c. 40.

Forma.

Locus.



HERBARIJ plantam hanc linum pratense, seu lanam pratensem nominant, Germani *Mattenflachs*. Tragus Dioscoridis Gnaphalium esse indicat. Caule est terete & enodi, inq; cacumine molli, tenero & candido tomento, gossipio ipso tenuiore & molliore emicante. Atq; hic est huius plantæ flos, hoc eius semen & fructus. Huius plantæ sanè elegans lanugo si in magna haberetur copia, textorio operi non inepta foret. In humectis pratis, & viliginosis vallibus prouenit.

TETRAPHYLLVM.

CAP. XXIII.

TETRAPHYLLVM, Latine Quadri-folium, hanc plantam vocant herbarij, quòd quatuor tantum folia, nec plura habeat. Radice est parua & breui, subnigra, fibrata: caule quatuor digitos

alto, rotundo, solido & duro: foliis quatuor helxinæ similibus, læuibus, venosis, prioribus duobus quæ maiora sunt & latiora, cauli proximè adhaerentibus alarum modo: reliquis quæ minora sunt & angustiora, à caule veluti brachiato & bifido distantibus, longiusculo pediculo nixis, inter quæ nigrum tuberculum conspici-tur, pediculos veluti determinans. Gignitur in pratis montosis, viginosis, & in

TETRAPHYLLVM.

QVADRIFOLIVM, *Phaeum*
Pena & Lobellij.



quibus

quibus aqua stagnans & pigra residet. Prodit Iulio mense. Gustu planta ista valde astringit. Aliud Quadrifolium monstrant Pena & Lobellius, quod Phæum cognominant. E pratensium est genere, inquit Pena, quaternis, interdum quinis, adeoque septenis foliis Oxy Plinianæ non disparibus donata cernitur, sed colore Phæo, vel liuido, rubente: flores trifolij pratensis, candidi, reliquaque non diuersa.

RANUNCULVS.

CAP. XXXIII.

BATPAXTON Græcis, Batrachium & Ranunculus Latinis dicitur. *Nomina*
Apuleius Herbam sceleratam, vulgus herbariorum Pedem corui, & Pedem galli perperam vocat, Galli *Grenoillette* & *Basinet*, Germani *Hanensuoß*, Itali *Ranunculo*, & *Pie coruino*, Hispani *Hierua belida*. Dicitur autem Batrachium siue Ranunculus, quod limitibus humidis, opacisque marginibus ranarum more letetur, aut quod aquis ubi ranæ degunt, potissimum gaudet, aut quia inter eius frutices ranæ frequenter inueniuntur. Eadem de causa *Grenoillette* à Gallis nominatur: *Basinet* verò à floribus, quod vasis æneis tonstrinarum, in quibus barbas emolliunt, similes videantur colore ac figura. Hi ob pulchritudinem iam in coronamenta venere, & à multis florum causa coluntur, efficitque cultura, ut qui in limitibus simplici foliorum compage flores oriantur, structili quodam densoque foliorum stipatu nunc in hortis collucescant. Herba scelerata, eò quod comesta noxia sit: vel, quod magis arridet, quia validi sceleratique mendicantes sibi crura ac lacertos dilaniant, quò possint impudentius stipem extorquere, atque hac impostura pecuniolam aucupari. Nostri herbarij, inquit Plinius, Strumeam vocant, quoniam medetur strumis & panis: vel ideò forsitàn, quod strumosa conspiciatur radice. Sunt qui vocent Agreste apium, seu apiastrum, quod folio apium æmuletur: quamquam plures apiastrum pro mellyssophyllo usurparunt. Dioscorides quatuor Ranunculi genera descripsit: sed diligentes herbarij plures notarunt differentias & varietates. Primum genus, inquit Dioscorides, coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule non crasso, cubitum alto: radice alba, parua, amara, multis capillamentis, ellebori modo fibrata. Nascitur iuxta fluentia. Secundum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plurimum in Sardinia nascens, quam acerrimum, quod silvestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lactei coloris. Galenus quoque quatuor Batrachij differentias agnoscit. Plinius in totidem genera Batrachium distinxit, ut ex Dioscoride transcripsisse videatur. Ranunculum, inquit, vocamus quem Græci Batrachium. Genera eius quatuor: Vnum pinguioribus quam coriandri foliis, & ad latitudinem maluæ accedentibus, colore liuido, caule alto (vulgata exemplaria habent albo) gracili, & radice alba. Nascitur in limitibus humidis & opacis. Alterum foliosius (Dioscorides habet lanuginosius, Oribasius γοναλωδέστερον, idest, magis geniculatum) pluribus foliorum incisuris, altis caulibus. Tertium minimum

Fuchf.c.57.

Lib.25.c.13.

Genera.
Lib.2 c.171.
Ibidem.

RANUNCULVS.

I. Matthioli.



des, coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule non crasso, cubitum alto: radice alba, parua, amara, multis capillamentis, ellebori modo fibrata. Nascitur iuxta fluentia. Secundum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plurimum in Sardinia nascens, quam acerrimum, quod silvestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lactei coloris. Galenus quoque quatuor Batrachij differentias agnoscit. Plinius in totidem genera Batrachium distinxit, ut ex Dioscoride transcripsisse videatur. Ranunculum, inquit, vocamus quem Græci Batrachium. Genera eius quatuor: Vnum pinguioribus quam coriandri foliis, & ad latitudinem maluæ accedentibus, colore liuido, caule alto (vulgata exemplaria habent albo) gracili, & radice alba. Nascitur in limitibus humidis & opacis. Alterum foliosius (Dioscorides habet lanuginosius, Oribasius γοναλωδέστερον, idest, magis geniculatum) pluribus foliorum incisuris, altis caulibus. Tertium minimum

Li.6.simpl.

Li.26.ca.13.

Forma.

est, graui odore, flore aureo. Quartum simile huic, flore luteo: sic enim legimus in vulgatis codicibus. Emendati, Dioscorides, Oribasius habent lacteo. Cæterum id Ranunculi genus quod copiosissimum in Sardinia nascitur, ob id Sardoa herba

In Thyrsi. dicta, vnde Vergilius:

RANUNCVLVS

I I. Matthioli.



Li. 6. c. 14.

RANUNCVLVS

I I I. Matthioli.



In hist. pl.
cap. 37.

Lib. 3. c. 72.

Ibid. ca. 57.

Ibidem.

Imo ego Sardois videar tibi amarior herbis.

A plerisque apium risus nominatur, quod qui ipsam ederint tanquam præ lætitia ridentes intereant. Sed res aliter habet: hæc enim herba nervos contrahit eorum qui ipsa vescuntur, rictuque ora diducit, ut cum moriuntur, veluti ridentium specie pereant, quod Salustius confirmat his verbis. In Sardinia quædam herba nascitur, quæ Sardoa dicitur, agresti apio similis. Hæc ora hominum & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. Dioscorides etiam alibi Sardoniam Ranunculi genus esse scribit, quæ vescentibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictu contrahit, ut risus speciem præbeant à qua quidem affectione de Sardonio risu adagium in vulgus infausto omine manauit. His quintum Ranunculi genus addidit Matthiolus, quod foliis quidem primo Ranunculo proximis prouenit, sed inter permultas quibus nititur radices, vnam habet tuberosam, nucis iuglandis magnitudine, rapi modo albicantem, acrem & exulcerantem, qua per hyemem arefcentibus iam foliis vtuntur quidam cum partem aliquam exulcerare volunt. Fuchsius quatuor itidem Ranunculi genera assignat, sed aliter distinguit. Primum genus duplex est: huius enim generis Ranunculus quidam siluestris est, cuius iterum duæ sunt differentiæ. Vnus enim luteos flores profert, hic depictus. Alter purpureos. Prior ille Ranunculus est Auricomus Dodonæi, cui folia tribuit fere rotunda, multum incisa, in fusco viridia, maculis in medio latiusculis, nigricantibus notata: flores aureo & perpulchro colore nitentes. In pratis & vliginosis agris crescit. Quidam hortensis, qui nisi cultura accedat prouenire haud solet. Hic itidem duplex est: Vnus qui simplici florum textura constat. Alter multiplicem foliorum in floribus compagem habet, hic quoque appictus, & Ranunculus albus prior siue echinatus à Dodonæo dictus: caulibus est candicantibus, leuibus, in quibus folia itidem candicantia, profundius incisa, præcipue quæ circa cauli fastigia sunt, coriandri foliis haud dissimilia: flores in luteo pallidi, deinde semina ferè rotunda, compressa, echinata;

echinata: radix fibrata. Iisdem in locis quibus Ranunculus Auricomus provenit. Secundum Ranunculi genus est Fuchsis, quod à foliorum similitudine, quam cum apij foliis obtinet, à nonnullis σέλινον ἄγριον, idest, apium silvestre, siue apium risus nominatur. Tertium genus exiguum, quod Dodonæus Batrachium Apulei vocat. Lib. 3. ca. 73.


RANUNCVLVS IIII. Matth.

RANUNCVLVS VI.
Matthioli.

RANUNCVLVS V. Matth.

RANUNCVLVS I. Siluestris,
Fuchf. Auricomus, Dodon.

Ranunculus hortensis I. Fuchf. *Albus*
prior, siue *Echinatus*, Dod.



Lib. 3. c. 72.

Palmi vnus aut duorum altitudine crescit: crebris foliorum incisuris: floribus luteis, venustis: semine in rotundis capitulis: radice alba, rotunda, paruo napo simili, interdum nucis iuglandis magnitudine, infernè fibrata. Quartum genus Fuchsi etiam minimum est, duùm generum: vnum quidem lacteo flore, id quod à Dioscoride pingitur: alterum luteo. Prius genus folia profert tria incisa, cæterorum Ranunculorum modo, inter quæ flores eminent pallidi, aut lactei coloris: radix est gracilis, obliqua, infernè fibras producens, quibus in terram defigitur. Alterum genus floribus luteis differt. Vtrūque Ranunculum paruum siue nemorensem vocat Dodonæus. Crescunt in nemoribus, fossis, locisque vmbrosis & humidis. Sunt & alia Ranunculorum genera à Dalechampsio obseruata. Ranunculus scilicet montanus albus, radicibus quamplurimis, teneris, carnosiss, albicantibus: foliis longo pediculo innixis, Batrachio vulgari similibus, sed minimè hirsutis: caulibus multis, propemodùm cubitalibus, cauis: flore lacteo, emicantibus ex medio croceis apicibus: fructu

asparago nascenti simili, in quo semen. In riuis frigidorum montium prouenit. Ranunculus alius purpureus cognominatus radicem habet innumeris fibris capillatam: folium oblongum, latum, crassum, apij, coriandrive modo, in summo diuisum, quale cernitur in Sardonia herba, aut in eo Ranunculo, quem à Dodonæo

Ranunculus, 1111. Fuchf. *lacteus*.
Ranunc. albus nemorensis, Dod.



Ranunculus, 1111. Fuchf. *luteus*.
Ranunc. luteus nemorensis, Dod.



Echinatum

RANUNCVLVS

Montanus albus.

Echinatum vocari diximus : caule est cubitali, rotūdo, paucis ramis furculoso: flore purpureo, aspectu pulcherrimo, non foliolis quinq; tantū constante cæterorum Ranunculorū modo, sed numerosis, oblongo floris priusquam aperiatur, & fastigiato quasi alabastro. In cœno- sis & vliginosis locis nascitur: rarāque est hæc planta, nec multis adhuc visa aut cognita. Item aliud genus latifolium nuncupatum foliorum peculiarem figuram hanc habet, quod aliorum modo ea incisa non sunt, nec laciniata, nec si- nuosa, sed subrotunda marginibus tantū dif- sectis. Cæterū idem florum color, iidem na- tales, eadem vis quæ aliis Ranūculis. Postremus eiusdem Ranunculus est, qui hederaceus co- gnominatur, caūliculis multis, humi ia cētibus & serpentibus, rotundis, radulas exiles & præ- tennes, è nodulis quibusdam emittentibus, fo- liis multis, paruulis, hederæ similibus: quamob- rem hederaceum vocarunt, atra macula nota- tis, pediculis breuissimis, ad quorum exortum floris conceptus emergit, granulis tuberosus, oblongus: flore luteo, Ranunculis aliis simili.

Sapore acer est & feruidus. Nascitur in riuulis, & fluentis fonticulorum, locis fa- bulosis & macris. Dodonæus libro de deleteriis Ranunculorum genera aliter di- stinxit & descripsit. Ranunculus, inquit, alius est hortensis, alij siluestres. Horum nonnulli sunt vulgares, alij externi. Ranunculos hortenses duos pinxit, vnum

Cap. I.

RANUNCVLVS Hederaceus,
Dalechampij.



RANUNCVLVS Hortensis
prior, Dodonæi.



duntaxat

duntaxat descripsit his ferè verbis. Ranunculus hortensis folia promit in particulas aliquot dissecta, sæpiùs specie trifolij, nonnunquam quinquefolij, per margines rariùs crenata, saturatè virentia, in quibus quandoque maculæ quædã inalbicant: caules rotūdi, leniter hirsuti parùm reclinantur, radículas emittentes quibus humi sese affigant. Ij ad dodrantalem aut paulò ampliorem assurgunt altitudinem, feren-

RANUNCVLVS Hortensis
alter, Dodonai.



RANUNCVLVS Illyricus.



Lib. 3. c. 72.

tes in fastigiis flosculos quinquefolij, luteo auri colore splendentes, staminibus aliquot exiguis, eiusdem coloris, medium sepientibus orbiculum, qui auctior factus semina in globum confarcta continet, ex quibus componitur: radices tenues, fibratæ candicant. Is ad quartum Matthioli videtur accedere. Locis vmbrosis, & nonnihil humentibus, non prorsus aridis, secus vias, & in locis hortorum incultis sponte exit. In pratis quoque & non rarò iuxta agrorum margines occurrit. Nec enim quòd in hortis tantum gignatur, hortensis dicitur, sed quòd ferè præ cæteris hortis sit familiarior, atque in his creberrimè gramine permixtus reperiatur, vbi & eius flosculi quandoque multiplicatis videntur foliis. Maio deinde seriùs multò vigent flores. Ranunculi silvestris primi caules sunt, rotūdi, læues, crassi, interius vacui, in alas diuisi, folia in longis, crassis, pinguibus pediculis, lata, læuia, marginibus incisa: flosculi in cacuminibus lutei, pallidiores & minores quàm hortensis, atque inde capitula primùm erumpentis myacanthæ asparagi cacumen æmulantia: radices candidæ, multis fibris capillatæ. Tota stirps dilutè virenti resplendet colore. In palustribus & iuxta riuulos, non rarò in scrobibus ac fossis aquas habentibus, aliisq; similibus locis exoritur. Ranunculi palustris nomine Dodonaus in Historia stirp. depinxit. Est Apiū risus Fuchsi, secundum genus Ranunculi silvestris, Ranunculus palustris rotundior folio Lobellij. Vel idem est, vel proximè ad tertiū Matthioli Ranunculum accedit. Silvestris secundus caulibus ac foliis est non perinde læuibus, obscuriùs omninò virentibus, & nō rarò ex puniceo colore nigricantibus, nonnihil quoque hirsutis ac lanuginosis, sed læuissimè: folia in quinque instar pentaphylli, sed tamen dissimiles, latiores easque laciniosas partes profundioribus sectionibus diuiduntur: cauliculi omnes ad cubitalem vel etiam ampliorem accrescunt altitudinem: flores auri colore elegantes, forma & magnitudine hortensis, semen ferentia capitula vti hortensis: radices fibratæ, è quarum capitibus nerui subinde obliqui quibus propagatur. In pratis

pratis reperitur, locis paulò ab ipsis scrobibus aut fossis remotis, nequaquam tamen aridis aut irriguis. Hortensis est primus Fuchsj, flore multiplici, polyanthemus, idest, multiflorus à Lobellio dictus. Tertio Ranunculo silvestri, quem Aruensem nominant, minora ac teneriora sunt folia, sed magis ac variè dissecta, diluti

RANUNCULVS

Lusitanicus.



RANUNCULVS

Flore globofo.



viroris: cauliculi recti, rotundi: flores parui, lutei, pallentes, quibus subnascitur non asparagi cacumini similis orbiculus, sed latum, asperum & pungens capitulum, ex aliquot cōgestum seminibus maiusculis, planis, acuminatis & breuibus, minimè tamen innocentibus spinis obsitis: radix candidis quoque & capillaceis fibris constat. In aruis plerumq, locis aliosis, vbi humidius solum, gignitur. In Historia stirpium Dodonæus Ranunculum album siue Echinatū vocauit, quem modò depinximus. Fuchsj est hortensis primus, simplici flore. Externorū Ranunculorum vnus est Illyricus cognominatus, qui cauliculos fert tenues, teretes, mediocris longitudinis: folia verò oblonga, plurimis fissa incisuris, vt vtraque subcandida, & quadam tenui lanugine vestita: flores luteolos, pallidiores quàm Auricomi Ranunculi, semina verò vti illius: radices multis paruis tuberibus veluti granis, aut oblōgiusculis & paruis bulbis coherentes. Ex Illyrico primū in Italiam, atque inde in Belgium illatus fertur: cum aliis, flores seminaq, producit. Hunc Ranūculum cum secundi Dioscoridis descriptione conuenire censet. Est enim χνοωδέτερος, idest, lanuginosior, & μακροχουλότερος, idest, longiore caule, & ἐντομας ἔχων πλείους τῶν φύλλων, idest, foliorum incisuras cōplures, plerumq, in Sardinia nascens. Verisimile enim est, nō modò in Illyrico, verū in Sardinia quoque reperiri: vtraque enim regio Mediterranei maris vndis alluitur. Secundus Ranunculus externus à Dodonæo non pictus, folia habet oblonga, angusta, nequaquā fissa, sed graminis aut tritici æmula, è diluto & albicante cæruleo colore virentia: cauliculi breuiiores palmum aut sesquipedem tantū alti: folia seminaq, vti Illyrici, sed radices multis tenuibus confibratæ. Circa Narbonam in pratis reperiri fertur, inquit Dodonæus, fortassè veteribus incognitus. Ranunculus gramineus dici potest. Tertius externus Ranunculus est Lusitanicus, reliquis humilior, foliis exit latis, venosis, læuibus, relucētibus, minimè diuisis, margine tantū aliquantulum incis, pediculis ab ipsis radicibus palmaribus absque adnatis, in quorum singulis flos vnicus, luteo auri colore resplen-

dens, odoratus, maior & foliosior quàm aliorum, staminibus in medio concoloribus, inter quæ capitulum emicat: pro radicibus multa quasi granula veluti Ilyrico Ranunculo, quæ tamen pictura non ostendit. Nihil habet, inquit Lobellius, cum Ranunculis commune, præter semina racemosa & luteos flores. In Lusitaniæ &

RANUNCVLVS

Tuberosus.



RANUNCVLVS

Constantinopolitanus, Clus.



Lib. stirp.
Hispanic.

Beticæ Hispaniæ montibus viret, florétque hybernis mensibus, ac non rarò ipsa bruma. Ranunculum externum quartum numero, nò pictura, albo flore simplici posuit Dodonæus, què pro Aconito albo describemus libro de Venenatis. Quintus Ranunculus externus globosi floris, foliis, caulibus, radicibus satis secundum siluestrium refert, flos quoque eius aurei coloris, verùm maior, pluriùmque foliorum, qui nò totus panditur, sed in globuli odoris valde iucundi formam collectus, nascenti quodammodo similis viget. Proferunt hunc Heluetiorum montes, præsertim is quem fractū vocant. Gesnerus ait Trollium florem vulgò dici. Lobellij Ranunculus montanus Alpinus glomeratus, Ostensis vallis, Mindenensium, Aruerniæ, Germaniæ & Heluetiorum montium amans. Ranunculus tuberosus Apuleij Batrachium dicitur, quod Apuleius ab aliis separauit, & peculiariter Batrachium appellauit. Vulgò Rapum D. Antonij appellant. Variè dissectis, latis, ac virentibus est foliis: cauliculis palmū aut duos palmos altis, flosculis auri colore splendentibus, semine in capitulis aspero, hortēsem satis refert, sed radix instar rotūdi globuli, paruo exiguoq; rapo similis, ex qua tenues, gracilesq; dependent fibræ. Prouenit in incultis & aridis Germaniæ ac Belgij nonnullis locis. Nascitur in Anglia maior, vbi rapum in maiorem excrescit quantitatem. Non minùs autem huius acris, quàm aliorum vis & facultas. Vfus est præcipuè rapi, quòd pleriq; pestilenti bubone correptis cum sale contusum statim initio aut femori aut brachio infra videlicet affectum locum admovent, ita virus & morbi malignitatem ad partem ignobiliorem attrahentes. Exulcerat enim & vesicas mox excitat, cuiusq; corporis parti fuerit applicatū. Apuleius, si lunatico in ceruice, inquit, ligetur lino rubro luna decrescente, cū erit signum Tauri vel Scorpionis parte prima, mox sanabitur. Itē, herbam Batrachii tūsam cum sua radice mixto aceto impones his, qui habēt cicatrices nigras, exedit eas, & similem corpori reliquo reddit colorem. His adde Ranunculum Constantinopolitanū Clusij, qui pedalem habet caulem,

in duos

in duos aut plures ramos diuifum, quorum extremis infident: flores magni, multiplici; foliorum glomo constantes, vt in Ranunculo vulgari tuberoso: flore multiplici, sed pulcherrimo, cocci colore rubentes, folia circa radicem quina aut fena, diluto virore nitentia, media forma inter palustris & Echinati ranunculorū folia:

RANUNCVLVS Niueus,
Polyanthes, Lobell.



RANUNCVLVS Flammeus
Aquaticus, angustifolius, Lob.



quæ verò per caulem sparsa sunt, minora, nec adeò incisa, nec admodum frequentia: multæ illi radices simul congestæ, Lusitanici ranunculi & asphodeli radicibus persimiles, flauescentes. Huic Ranunculo Constantinopolitani cognomen dedit, quòd in quibusdam hortis Constantinopoli inueniri audierit. Sunt & alij apud Dodonæum & Lobellium Ranunculi. Ranunculus niueus Polyanthes, pulcherrima exoticæ elegantie planta, inquit Lobellius, quæ flores lètos, multiplici fœtu & prouentu in Belgij hortis Maio mense dat. Folia & ortus Ranunculi albi acniti facie. Flammeus Ranunculus aquaticus angustifolius, Flammula vulgi, Belgarū *Egelkoolen*, prorsus eadem videtur esse quæ Flammula aquatica infra picta & descripta, & à Dodonæo in Historia stirpium. Hoc docet eadem nomenclatura, eadem delineatio illic posita, & in Purgantium Historia: ea solùm varietate differunt, quòd postrema Dodonæi, folia non ferrata, prima ferrata habet, iisdem natalibus & riuulis. Ranunculus nemorosus, Ranunculus quartus Fuchsi lacteus & luteus hîc ex eodem Fuchsiõ appicti, à Dodonæo in Purgantiū Historia pro quinta & sexta specie anemones. Id quod etiam monuimus, in libro de iis quæ flore placent, ca. De Anemone. Frequens herba hæc est in montibus Diuæ Mariæ à Monteferrato, & circumvicinis partibus, ad montium radices, iuxta arbusta, & querceta. Herba itaque est cubitalis, vt plurimùm. Radix ei subest, rotunda, bulbacea, exigua, candida, pluribus inuolucris croco similibus, contexta, ex qua aliæ radiculæ albæ, crassæ aliquantulum, veluti capillamenta dependent. Folia ex radice prodeunt, longa, stricta, à longo pedunculo dependentia, læuia, fractu contumacia, neruata & in acutum tendentia, longitudine palmi vnus, latitudine verò transversus vnus digiti, palmæ folium in modo substantiæ, & contumacia fracturæ, imitantia. Caulem habet cubitalem ferè semper, tenacem, solidum, rotundum, in quo folia minora sunt. In summo caulis flores existunt ex quinque foliolis cõstructi, in medio muscosi, forma, figuraq; similes ranunculis. Floret Aprili, & Maio. Semen habet candidū, magnitudine milij. In radicibus sapor

*Ranunculus Phœniceus, Myconi.**Ranunculus Purpureus.*

cum multa humiditate acris est, sed in foliis maior, vt vix ranunculis cedat. Planta veteribus interdicta, inter Ranunculi tamen genera videtur collocanda, ex sapore, forma florum, & radicum. Quāquam folium diuersum esse ab aliis ranūculis appareat. Ego Ranunculū Phœniceum semper vocauī, ob similitudinem quam cum palmæ foliis obtinet, & ranunculi saporem. Vt vulgaribus vocetur nondum scio. Ad eadem præstare videtur, ad quæ ranunculus, minoris tamen est efficacia.

Temper.
& Vires.

RANUNCVLVS *Latifolius.*

Li. 2. ca. 171.



Li. 6. simpl.

Rara inuētu, hīc tamē frequētissima. Omnium Ranunculorū temperamentū calidū vehemēter, siccūq; est vsq; ad quartū gradū: præcipuē apiū risus omniū calidissimum. Folia, flores & cauliculi recētes, inquit Dioscorides, illitu exulcerāt, & crustas nō sine dolore gignūt: quare vngues scabros extricāt, scabiē eximūt, stigmata delent: fornicātes verrucas & pensiles, alopeciasq; paulisper illita tollūt. Tepente decocto perniones fouētur. Sicca radix tritaq; sternutamēta ciet naribus admota: dentium dolorē appensa leuat, ipsos tamē frāgit. Eadē Galenus tradit. Batrachia omnia vehemēter acré qualitātē possident, adeo vt cū dolore exulcerent: hac ratione si moderatē ac cōuenienter vtare, pforas & lepras excoriāt, & vngues diuellūt, leprosis stigmata digerūt, acrochordonas & myrmecias detrahūt. Quin & alopecias iuuāt paucō tēpore admota. Nā si diutiūs inhareāt, nō excoriatur solū ipsa cutis, sed & in

crustā vritur. Atq; hæc omnia caulis & foliorū sunt opera, si imponas virētia. Porro radix arefacta sternutationē prouocat, similiter aliis quæ valēter desiccāt. Sed & dentes dolētes iuuat, vt & frāgat eos valēti, scilicet exsiccatione: & vt semel dicam, calida

calida siccaq; valde est tū radix, tum vniuersa herba. Eadē Plinius quoq; de ranunculorū vsu & effectu tradidit. Omnibus vis caustica, si cruda folia imponantur, pustulasq; vt ignis, faciunt. Ideò ad lepras & pforas eis vtūtur, & ad tollēda stigmata, causticisq; omnibus miscēt. Alopeciis imponūt, celeriter remouētes. Radix in dolore cōmanducata diutius, rumpit dētes. Eadem sicca cōcisa, sternutamentū facit. Nostri herbarij Strumeam vocāt, quoniā medetur strumis & panis, parte in fumo suspensa, credūtque ea rursus fata rebellare, quę curauerint, vitia. Hęc Plinius.

LINGVA, Plinij.



LINGVA Maior, Dalech.



LINGVA PLINII. CAP. XXV.



D Ranunculorū genera accedere videtur plāta hīc depicta, quę Plinij Lingua siue Lingulaca (vtroq; enim modo apud eum legitur) videtur esse. Radice est nigra, crassa, arūdinis modo geniculata, densissimis fibris capillata: caulibus rotūdis, cubitalibus: foliis lōgis, angustis, acuminatis, figura Linguam exertā referentibus, venosis, per interualla caules ambientibus, saporis acris & amari: flore Ranunculi, aureo, quinque foliolis constante: fructu granuloso, asparagorum capiti simili. Circa fontes cum chrysanthemo aquatico prouenit. Radix eius combusta, inquit Plinius, & trita cum adipe suis (adiicitur vt nigra sit & sterilis) alopecias emendat vngentium in sole. Quę alio in loco repetit: Lingulaca circa fontes nascens cuius radix admista combusta teritur cum adipe suis nigræ. Id quoque excipitur, vt eius sit suis, quę nunquam peperit. Sol deinde plurimū confert illitæ. Planta alia Dalechambio. Lingua maior vocatur, quę propē amnium ripas nascitur, locis quidem sabulosis, sed in uecto limo veluti stercoratis & pinguibus, caule singulari, anguloso, intus cauo, sex aut septē pedes alto, crassitiæ pollicis, radice vnica, veluti geniculata, interdum crassitudine cubiti, obliqua, radiculis multis fibrata, cādidis, teneris, per interualla nascētibus, gustu subamaris, & aromaticū nō nihil, cū māduntur, spirantibus: foliis numerosis, salici vel nerio similibus, venosis, elata & media intercurrente costā diuisis, octo digitos longis, in ambitu crenatis, eleganter caulē torū ab imo ad summū thyrsi modo vestiētibus, sparsim hinc illinc nullo ordine, tāquā è tuberculis quibusdā, prodeūtib; saporis amari & subacris: flore in extremo caule copioso, luteo, senecioni, aut herbæ, quā Officinæ D. Iacobi vocāt, simili, inodoro. Plātæ sapor ostēdit facultatis esse abstergētis, & ad expediēdas obstructions efficacis. Particu-

Nomina

Li. 24. c. 19.

& li. 25. c. 11.

Forma.

Locus.

Li. 24. c. 19.

Vires.

Li. 25. ca. 11.

latim eius dotes & vires nullus herbariorum, q; sciam, adhuc memoriæ prodidit.

Nomina

Forma.



Nomina

Li. 8. simpl.

Forma.


appellatum fuisse testis est Galenus. Latine quoque Hydropiper & Piper aquaticum, Gallicè *Poyure aquatic*, & *Curage*, Italicè *Hidropepe*, & *Pepe aquatico*, Germanicè *Vuasserpfeffer*, & *Muckenkraut*, quasi herba muscarum. quod muscæ vehementer ab ea abhorreant: neque enim id quod succo eius aspersum est attingunt. Dioscorides scribit Hydropiper caulem edere geniculatum, solidum multis alis concavum, folia menthæ, maiora, teneriora, candidioraq; sapore acria, quemadmodum

HYDROPIPER, Matth.

Cord. in 2.
Dioscor.
Dod. lib. 5.
ca. 67. & li.
de florib.
Matthi. in
ca. 155. lib. 2.
Dioscor.

Locus.

Lib. 2. c. 101.



DESCRIBI etiam ranunculorum generibus potest planta hîc depicta, quæ à semine feruidissimi gustus natalibusque & foliorum figura Hydropiper Lanceolatum ab herbariis nuncupatur. Radicibus nititur multis, brevis, candidis, tenuibus, congestis: foliis multis plantagini aquaticæ similibus, aut terrestri quam Officinæ Lanceolatâ vocant, angustioribus, brevioribus: caule quadrato, virgato, pedali, infernè rubente, in ramulos aliquot diuiso: flore Ranunculi, aureo, capitulo paruo, veluti granulis tuberoso in quo semen acerrimi gustus. Hanc plantam Pena nomine pumili Ranunculi gramineis foliis, & geniculati videtur depinxisse.

HYDROPIPER. CAP. XXVII.

ΔΡΩΠΕΠΕΡΙ à locis in quibus nascitur, & Piperis sapore quem præ se fert, quasi dixeris Piper aquaticum,

Piper, non tamen aromatici odoris: fructum acrem in surculis parvis enascentem propè folia, coherentem & racemosum: radicem parvam, nullius in medicina vsus. Hanc descriptionem in nullam plantam veriùs competere autumant omnes ferè periti herbarij, quam in eam quæ Persicaria non maculosa & Persicaria vrens vulgò nominatur, vt ab ea distinguatur cuius folia nigris maculis aspersa sunt. Illa enim foliis est menthæ consimilibus, maioribus tantum, hoc est, longioribus, tenerioribus, candidioribus, quæ meram Piperis acrimoniam resipiunt, citra vllam odoris gratiam: caule est admodum geniculato, duro, alis concavo, è cuius adnatis rufum semen prodit racematim congestum, & quadam serie cohærens, acri admodum gustu, vt linguam vehementer vellicet. Accedunt natales: nam propè stagnantes aquas hæc planta virescit: his adde etiam facultates. Cordus Cratægogonum vocat. Ruellius probare nititur legitimum Hydropiper esse, quod Officinæ Eupatoriū falsò nominant. At Eupatoriū istud

istud foliis est cannabinis, duris, hirsutis, amaro gustu, non acri, id est, piperis, adeò odoratis, ut eam ob causam viribus maximis præstare existimetur, cum hydropiper Dioscoridis folia ferat menthæ maiora, molliora candidiora, gustu piperis, acri, sine vlla odoris gratia. Prætereà hydropiperis caulis est geniculatus, solidus, in foliorum & ramulorum exortu alis multis concavus: semine acri in ramusculis prope folia racematim cohærente, Pseudo eupatorio verò quod posthac suo loco nos indicabimus caulis est procerus, minimè geniculatus, in cuius ramulis nullum iuxta folia semen racematim cohæret, sed in cacumine flores fert subrubentes, qui diuisi, muscarij specie, siluestris origani modo per maturitatem in pappos euanescunt, è quibus semen amarum totius plantæ sapore, non acre, etiam si Ruellius id asseueret. Quod si eupatorium istud iuxta residues aquas, aut tardo fluxu repentes nasci conspexerit, non propterea hydropiper fuerit, cum aliæ omnes notæ reclamant. Sunt alij herbarij qui aliud hydropiper ostendunt, id nimirum quod Chrysanthemum aquaticum quidam vocant. Dodonæus Pseudoeupatorium fœminam. Sed id duplex, vnum quod folia in tria, quinque, sex diuisa fert digitorum modo, alterum quod simplicia & minimè diuisa habet, ut ex vtriusque pictura perspicere licet. Cetera in vtroq; paria sunt, quod ad radicem, caules, foliorum figuram, florem, semen attinet. Sunt etenim radice parua & breui, geniculata, fibrata, nigricante, inutili: *Forma.* caulibus multis, cubitalibus, geniculatis, subhirsutis, solidis, non cauis, quadratis,

*HYDROPIPER Alterum,
Dalechampij.*



*HYDROPIPER Pseudo-
eupatorium fœmina, Dodo.*



virgatis, in alas multas sese explicantibus: foliis menthæ, maioribus, tactu mollioribus, pallidiùs virentibus, aromaticum nihil olentibus, gustu piperis, acri, fructu quoque acri, corymbo simili, aut chamæmeli capitulo, luteo, surculis paruis euecto, qui ex alarum sinu prope folia eriguntur, foliolis insidente stellatim radiatis asteris modo: semen oblongum est, angulosum, quatuor præfixis pilis, villosum, asperis & tenacibus, contrectantium manui, & mandentium palato inhærescentibus, mordaci scabritie. Gignitur vtrumque prope aquas vel in aquis ipsis stagnan-

*HYDROPIPER Aliud,
Dalechampi.*



tibus, vel in riuis leniter fluentibus. Sed historix Dioscoridis quædam supradictorum repugnare videntur, quòd propè caulis folia fructus earum plantarum, quas hîc pinximus, non nascatur, quòd racemosus non sit, quòd piperis acrimonia linguam non vellicet. Sed sunt qui in Dioscoride legant, καρπὸν δὲ ἔχει ἐπὶ κλωναρίων μικρῶν ἐκφυομένων παρὰ τὰ φύλλα, non ἐκφυόμενον, vt hæc vox ad furculos siue ramulos fructum sustinentes non ad fructum ipsum referatur. Præterea an furculorum, an caulis folia hîc intelligantur, Dioscorides non expressit, fructus quidem iuxta sua siue furculorum folia orbiculatim ipsum ambientia prodit. Quantum ad racemosum fructum attinet, respōdent in Dioscoride βοτρυχώδην legendum, pro βοτρυώδην, facilèmq; fuisse hunc lapsum, in magna nominum similitudine, βοτρυχας autem siue βοτρυχας dixerunt veteres cincinnos, seu comptam cæsariem & capillos mulierum, quos representant pili illi exiles qui in seminum hydropiperis vertice eminent, cui notæ exprimendæ βοτρυχώδης vox maximè conueniat. Sed si

quis hanc emendationem non approbet, ne ea quidem se egere aiunt, cum vtriusque hydropiperis fructus maturus inæqualibus pilorum ordinibus in figuram racemi oblongam fastigietur, & desinat. Iam verò fructum hunc acrem esse, saporisq; piperi similis, nemo qui gustauerit inficiabitur. Sed nec parem piperis acrimoniâ in eo Dioscorides requirit, nec Galenus, qui nō tam calidum esse quàm piper aperte dicit. At si vtraque hæc planta postremò descripta eorum iudicio verum sit hydropiper, quænam fuerit veteribus persicaria illa non maculosa? Cratægonum illi esse arbitrantur. Qua de re non est hîc dicendi locus. Nunc de hydropiperis viribus tractandum. Folia cum fructu illita, auctore Dioscoride, tumores veteresque duritias discutiendi, & sugillata delendi vim habent. Siccata eadem & contusa pro pipere sali & obsoniis admiscuntur. Galenus eadem tradit. Hydropiper non vsque adeò calidum est quàm piper, attamen ipsa herba viridis cataplasmatibus modo imposita, sugillata & tumores induratos digerit. Persicaria non maculosa multorum hydropiper, recens & viridis, inquit Matthiolus, sternitur commodè in thalamis pulicibus necandis, & postero die eiicitur. Suillæ carnes falsæ circumducta herba præseruantur à vermibus. Ideoque succus eius ad vermiculosas aures maximè facit. Plinius hydropiperis herbæ non meminit: nam alia est apud ipsum herba piperitis siue filiquastrum, de qua suo loco diximus.

PERSICARIA.


CAP. XXVIII.

Nomina

Forma



RECENTIORIBVS herbariis persicaria dicitur à persicæ foliorum similitudine, Gallicè *Persicaire*, Germanicè *Persichkraut*. Caulibus, foliis, floribus, semine hydropiperi, id est, persicariæ non maculosæ simillima est. Caules enim habet rotundos, geniculatos, folia persicæ aut salicis, sed sæpè latiora & nigriora quàm hydropiperis, macula in medio nigra, qua nota apertissimè ab hydropipere dignoscitur: flores similiter racemosi, candidi, frequentius



frequentius purpurascens : semen nigrum, radix fibrata. Reperitur similibus, & sæpè iisdem quibus hydropiper locis, floretq; eodem tempore Sapore acris nō est, sed subacidum quippiam respicit, quare frigido siccoq; est temperamento. Ob id inflammationibus incipientibus, & recentibus vulneribus fertur prodesse imposita. Sunt qui velint hanc persicariam Plinij plumbaginem esse, propter eas quæ in foliis conspiciuntur plumbei coloris notas. Sed Plinius plumbaginem non à colore, sed ab effectu nomē habere vult, quòd videlicet plumbo oculorum affectui medeatur. Nascitur, inquit, vulgò molybdæna, idest, plumbago, etiam in aruo, folio lappathi, crassa radice, hispida. Hac commanducata si oculus subinde illinatur, plumbum, quod est genus vitij, ex oculo tollitur. Huc adducemus ex Lobellio Persicariā aliam pusillam repentem, quam ait Antuerpiani agri glareosis sabulosisq; vdis quadruplò minorem humi repere, flosculis aliàs candidis, aliàs purpurantibus, reliqua facie similem.

Locus.
Temper.
& Vires

Lib. 25. c. 13.

FLAMMULA AQUATICA.
CAP. XXIX.

A HERBARIIS flammula appellata est, quòd flammæ, siue ignis modo vrat, Gallicè *flammule aquatique*, vel, *Herbe de feu*, Germanicè *Egel kolen*, quòd oues eam depastæ, inflammatione & vlceratione hepatis vexantur, quam Germani *Egel* vocant. A' Lobellio Ranunculus aquaticus, angustifolius ferratus dicitur. Caules habet rubescētes, cauos, frequenter geniculatos, in quibus folia angusta, salicis foliis ferè similia, tamen longiora, & in ambitu parùm crenata, præsertim ea quæ in inferiore caulium parte sunt : flores luteos siue aureos, in medio subhirsutos, figura & colore ranunculi auricomi floribus prorsus similes : capitula item similia, radicem fibratam. In pratis locisque aliis

Nomina
Dodo. lib.
3. cap. 75.

Forma.

Locus.
aliis

FLAMMULA

Aquatica.

Vires.

aliis viginosis, & in aquis stagnantibus provenit. Maio mense floret, nec ita multò post semen profert, vrit & vlcera, temperièque calida & sicca est ad tertium vsque gradum, hominibus, cæterisque animantibus noxia. Describitur huic eadem aut valde affinis Cap. de Ranunculis, flammula vulgi Ranunculus flammeus aquatilis angustifolius.

PHV SILVESTRE.

CAP. XXX.

HV SILVESTRE à Dodonæo & cæteris herbariis dicitur, vt differat à Phu hortensi, de quo in Libro De Odoratis, Latinè valeriana siluestris. Cuius duo sunt genera. Valeriana siluestris maior, *Grande Valeriane sauvage*, Germanicè *Vuldbaldrian*. Phu paruum Matthioli. Valeriana siluestri sminor, Gallicè *petite Valeriane sauvage*. Phu minimum Matthioli. Illa Phu hortensi haud absimilis, caules habet rotundos, cauos, geniculatos: folia alis expansis similia constant foliolis multis aduerso situ oppositis, similibus Valeriane hortensis foliis, in caulis fastigio enascentibus,

maioribus & magis incisis flores hortensi Valeriane similes, purpurascens: radicem teneram quæ huc & illuc serpit. Valeriana siluestris minor Valerianam hortensem proximè refert, nisi quod omnibus suis partibus minor est, folia eius prima & infima plantaginis foliolis proxima sunt, quæ circa caulem nascuntur, altius sunt

VALERIANA Siluestris maior,
Dodon. Phu paruum, Matth.

incisa, Valeriane proximè dictæ similima: caules rotundi, geniculati, palmum alti: flores supradictæ similes, radices graciles, quæ per terram serpunt. Locis humidis & pratis aquosis

VALERIANA Siluestris minor,
Phu minimum, Dodon.



vtraque



utraque prouenit. Dodonæus & cæteri herbarij his addunt Phu Græcum, siue Valerianam Græcam vel peregrinam, quæ quid valerianæ habeat fortè nesciunt ij, qui nomen id ei indiderunt, præter quandam cum Valerianæ foliis similitudinem, eamque exiguam. Caules duos trësve profert, in quibus folia expanduntur Valerianæ siluestris ferè similia, longiora angustiora & magis incisa: foliis viciæ siluestris proxima, nisi maiora essent: flores in summo caulium fastigio conferti, ex candido purpurei, quinque foliolis discreti, è medio breuia staminula emittentes, punctis aureis aspersa: post quos semen æstate media nigrum, pusillum, in siliquula rotunda, oblonga: radix creberrimis filamentis donata. In hortis Gallia, Belgij, Angliæ colitur.

Ibid.

C O N Y Z A.

C A P. XXXI.

K O N Y Z A Græcè, Latine etiam Conyza nominatur, à Gaza pulicaria à pulicibus necandis. Dioscorides tria eius genera assignat. Conyzam maiorem, minorem, & mediam. Galenus totidem. Plinius in duo, maiorem scilicet & fœminam distinxit. Recetiores herbarij quartam adiciunt, nempe Conyzam minimam. Conyzæ, inquit Dioscorides, duo genera. Quæ parua vocatur, odore præstantior est: maior verò frutice altior, & foliis latioribus, graui odore. Vtriusq; folia oleæ similia, hirsuta, pingua. In maiore caulis attollitur binum cubitorum altitudine, in minore pedem æquat: flos fragilis, lutei coloris, qui in pappum euanescit: radices inutiles. Est & tertium Conyzæ genus, caule crassiore ac molliore: foliis mediæ inter maiorem & minorem amplitudinis, non pinguis, multò grauioris odoris & iucundioris, sed inefficacior. Plinius ita describit & distinguit. Et Conyzæ duo genera in coronamentis, mas & fœmina. Differentia in folio. Tenuius fœminæ & constrictius, angustiusq; imbricatum maris & ramosius. Flos quoque magis splendet eius. Serotinus utriusque post arcturum. Mas odore grauior, fœmina acrior. Et ideò contra bestiarum morsus aptior, folia fœminæ mellis odorem

Nomina

Lib. 3. c. 119.

Genera.

Lib. 7. sim.

Lib. 21. c. 10

Ibid.

Forma.

Lib. 21. c. 10



Lib.6. hist.
Cap.2.

odorem habent. Masculæ radix à quibusdam libanotis appellatur, de qua diximus. Qui locus ex Theophrasto transcriptus est, qui ita habet, κούζης τὸ μὲν ἄρρεν, τὸ δὲ θῆλυ. διαφορὰς ὃ ἔχει κατὰ πέρ τε ἄλλα τε οὕτω διαίρεμένα, τὸ μὲν γὰρ θῆλυ λεπτοφυλλότερον καὶ ξυνεπικὸς μᾶλλον, καὶ ὃ ὅλον ἔλαττον, τὸ δὲ ἄρρεν, μετίζον ὃ καὶ παχυκαυλότερον καὶ πολυκλωνότερον, καὶ τὸ φύλλον μετίζον ἔλιπαρώτερον ἔχον, ἐπὶ ὃ τὸ ἀνθος λαμπρότερον. καρπόρα δὲ ἄμφω, τὸ ὃ ὅλον ὀψιβλαστὲ καὶ ὀψιανθεὶ περὶ ἀρκιούρον, καὶ μετ' ἀρκιούρον βλαστάνει (non λαμβάνει, vt in vulgatis perperam legitur) βαρεῖα δὲ ἡ ὁσμὴ τῶ ἄρρενος, ἡ δὲ τῆς θηλείας λεμνυτέρα διὸ καὶ πρὸς τὰ θηρία χρησίμη. Id est, Gaza interprete. Pulicaria mascula & foemina constat. Distant quemadmodum cætera, quæ sic discerni desiderant, foemina enim tenuiore folio, & compressior est, atque in totum minor, mas amplior crassiorique caule, atq; ramosior, & folium amplius, pinguiusque habens, nec non flore splendidior est. Ambo fructiferæ sunt, in totum serotina germinæ floræque, quippe cùm circa arcturum & post arcturum germinent. Mari grauior odor, foeminæ acrior, ideóque contra bestiarum morsus utilis. Plinius alibi

Lib.20.c.16

tertium genus cunilæ, quæ à Græcis mascula, à nostris cunilago vocatur, odoris foedi, radicis lignosæ, folio aspero est, inquit. Et ibidem alteram thuris, quam libanotidem appellant, proponit, quarum vtræque medetur contra serpentes ex vino vel aceto. Pulices etiam contritæ cum aqua sparsæ necant. Quæ cùm in Conyzam competant, vt ipsemet indicat, locum hunc citans aliquantò post, Masculæ radix à quibusdam libanotis appellatur, de qua diximus, perspicuum est eum Conyzam cum

Lib.21.c.10

cunila confundere. Plantæ tres quæ hîc exhibentur, Conyzæ sunt Matthioli, nullis prorsus reclamantibus notis, inquit, quæ singulis earum à Dioscoride tribuuntur. Sed sunt qui maiorem præsertim Conyzam Matthioli, Conyzam Dioscoridis esse negent, omnibus ei aduersantibus notis. Spirat enim eius radix odorem nō tetrū, sed aromaticū, caryophyllorum, caule & foliis verbasci aut blattariæ, non olei, glutinis nihil penitus habentibus. Flores ex luteo purpurascunt. Cætera etiam planè dissimilia, multò magis viribus. Non esse igitur hanc Conyzam, sed Bac-

In cap.119.
lib.3.

CONYZA MEDIA, *Math.*

CONYZA ODORATA.



charim Monspeliensium aiunt, Pena & Lobellius odore & flore insignem. Matthioli verò Baccharim verbasci odorati speciẽ esse vt in Libro de Odoratis ostendimus. Item Dodonæus alias Conyzas descripsit & depinxit. Nec desunt qui Lib. I. c. 23. istis Conyzam odoratam adiungant, radice candida, breui, fibrata: caule cubi-

CONYZA Minima,
Lobellij.

tali, ad radicem rubente, furculoso: foliis circa radicem belidi ferè similibus, per humum sparsis, in caule longioribus & angustioribus, imparibus spatiis caulem vestientibus: flore Corymbaceo, ex capitulis herbaceis extante, foliolis purpureis radiato, in pappos citò euanescente, saporis acris, odoris validi, nec iniucundi. Dentellariam alij vocarunt ab effectu; quòd eius decocto, si os colluatur, dentium dolores mitigantur. Dodonæus pro tertio genere Senecionis pinxit. Conyza maior in agrorum marginibus, aruisque humidis crescit, reliquæ in locis lacustribus, & aliis vliginosis. Odorata in fabuletis Rhodani Lugduno propinquis. Pena quadruplicem Conyzæ differẽtiam ponit, quarũ media & minima vbiuis Galliæ, Germaniæ, Angliæ lacustribus locis & humentibus aruis multa. Minima in fossis, inquit, altero à Londino lapide fructicat inter chamæmelum Romanum & pulegium regale. Sesquipalmum caulibus superat multis alis donatis, hirsutis, pullis vel cinereis, rotundis, rigidiusculis, quos folia ambiunt ab imo crebra, incana, gnaphalij vul-


Lib. 5. c. 17.

Locus.

Vires.

garis paria, quod habitu & colore tota refert, sed maiora multò & obscuriore obsoletiorève lanugine : flores rotundi, bullis agerati vel tanaceti, sed minùs vegeto colore & compressi, quibus elapsis semen subest anthemidis, acerosum, minutum, radix lignosa, exigua. Minimè omnium hæc glutinosa, minúsq; quàm media foetida. Eam ex Lobellio hîc pinximus. Eodem Angliæ loco secus regiam viam, atque humentes scrobes media superiori prorsum similis, sed duplò maioribus foliis, crassis, densis, virentibus, asperis, rigidis, squallidis, caulem bicubitalem, & alas multas ambientibus, ima falcata, basi glâsti dentellariæve modo radiati flores, lutei, buphthalmi, semen haud dissimile : radix pusilla, halitum virosûm, & quidam Cimicum, aut foetidæ cotulæ efflat. Parum aut minùs multò quàm maior &

CONYZA Magna, Pena.



CONYZA Minor vera, Pena.




minor glutinosa. Ea est quam Matthiolus Mediæ nomine depinxit. Conyza maior vera lepidiore austrinòque cælo & aëre maritimo delectatur, cuiusmodi est Hetruriæ inter Florentiam, Aquaspendulas, & Romam : atque in Nitrobrigum maritimis & Venetis, & aruorum marginibus Lunellæ & Mompelij. Binûm trinûmve cubitorum frutex multis propagatur virgultis, rectis, rigidis, rotundis, foliis multis coherentibus, densis, ex viridi pallentibus, crassis, pinguibus, oleæ similibus. Extremi caules multis ornantur secundum longitudinem floribus luteis, rotundis, hieracij aut Senetionis, in pappos euolantibus : semen exiguum vt hieracij : radix lignosa, fibrata. Hæc multò cæteris præstantior, cum odore vehementer suavi ; tum viribus, nec minus cisto ledo glutinosa tangenti, cuius odorem, sed nonnihil cum media confusum imitatur. Huic præ cæteris assimiliatur natalibus, viribus, odore & facie, minor Dioscoridis hîc picta, quam veram Dioscoridis Pena asserit. Et prorsus eadem foret, nisi proceritate & caulium luxuria vinceretur. Sæpius vnico est caule gracili, cubitali & sesquicubitali, paucioribus, minoribúsq; foliis cisti ledi angustifolij : color, odor, modus, semen tum illis, tum floribus haud diuersa : radix exigua. De Conyzæ viribus nunc dicendum. Suffitu subtractúque frutex totus venenatas bestias fugat, culices abigit, & pulices necat, folia conuenienter

nienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis ac vulneribus. Flores & folia cum vino ad menses partúsque eiiciendos abutuntur: item contra vrinæ stillicidia, arquatum morbum & tormina: comitiales pota ex aceto adiuuant, decoctum in defefsionibus medetur vuluæ malis, impositus succus abortum facit, herba ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Galenus easdem vires sic declarat. Conyza maior & minor similis sunt tum temperaturæ, tum facultatis, gustui amaræ, & acres. Excalfaciunt admodum luculenter, siue quis folia læuigata cum teneris ramulis (est enim fruticosa planta) parti cuipiam illinat, siue vbi in oleo coxerit, eo vtatur, siquidem concussiones, siue rigores per circuitum redeuntes tale oleum sanare videtur, flores quoque earum similis sunt facultatis. Itaque quidam & ipsos cum foliis tritos in vino bibendos exhibent ad menses fortiter ducendos, ciendúmque fœtum. Est & tertium Conyza genus, in locis humidioribus proueniens, vtrisque illis tum graueolentius, tum imbecillius. Sed primæ memoratæ tertij sunt ordinis in excalfaciendo & exsiccando.

Li. 7. simpl.

OPHIOGLOSSVM. CAP. XXXII.




RAECIS ὀφιογλωσσον, Latine Lingua serpentis dicitur, quibusdam herbariis Lancea Christi, aliis Lucciola, aliis Argentina, Gallis *Langue de serpent*, Germanis *Natterzanglin*. Quidam Ceratiam Plinij esse volunt, vnico tantum folio assurgentem: alij sic Lunariam minorem potius nominandam censent. Sed neutri radix magna & nodosa. Sunt qui Lin-

Nomina

OPHIOGLOSSVM,

Matthioli.



guam Plinij siue Lingulacam esse putent, de qua iam diximus. Quidam inter dracunculi species recensent. Planta est admirandæ naturæ, folium profert digiti longitudine, pingue, plantagini aquaticæ haud absimile, ex cuius inferiore sinu petiolus siue cauliculus exit, lingulam sustinens longam & angustam, linguæ serpentis similem, vnde ophioglossi nomen inuenit. In pratis humidis & pinguibus prouenit. Aprili & Maio mensibus reperitur, Iunio ocysimè deperit. Exsiccatur tertio gradu citra insignem caliditatem. Præstat maximè ad recentia vulnera glutinanda, quare quidam ad enterocelas mirificè extollunt. Maceratur in oleo quo vtuntur Chirurghi ad prædicta fœlici, vt aiunt, successu. Datur potanda ex stillatitia aqua equiseti ad intestinorum & thoracis vulnera, & cæterarum internarum corporis partium. Quamobrem sanguinem reiicientibus prodest, bibitur aduersus alba fœminarum profluvia ex stillatitia aqua foliorum quercus. Vinum austerum in quo tota planta incocta fuerit, si eo abluantur oculi, lacrymas cohibet. Illinitur recens siccave ad

Forma.

Locus.

Matth. in
Cap. 161.
lib. 2.

Temper.

Vires

vulnorum inflammationes ex gallinaceo adipe. Omphacinum oleum in quo multa folia diu maduerint, insolatæque fuerint addita abiegna lacryma, aptissimum est medicamentum recentibus vulneribus glutinandis.


CHELIDONIVM MINVS.

CAP. XXXIII.

Nomina

KΕΛΙΔΩΝΙΟΝ μικρόν, Latine Chelidonium minus, & hirundinariam minor, Officinis Celidonia minor, eadem de causa qua Chelidonium maius nomen accepit. Gallicè *Petite Esclaire*, Germanicè *Feigunatrzen*, *Blanterkraut*, *Pfaffenboedlin*, & *Meienkraut*, Italicè *Celidonia minore*, & *fauoscello*, quod fabarum modo folia subpinguia habeat. Sunt qui Scrophulariam minorem appellent, à radicum similitudine, quæ multis quasi tritici granulis veluti strumis, quæ Græcorum imitatione scrophulæ vocantur, coaluisse videntur. Alij sic dictam putant, quod strumis siue scrophulis imposita medeatur. Plantam hîc depictam permulti docti herbarij pro chelidonio minore vsurpant. Quæ Vere duntaxat vliginoso solo & in fossarum scrobiumq; marginibus frequens gignitur, foliis hederæ, minoribus, rotundioribus, subpinguioribus, sine caule: flore luteo, tenui pediculo appenso, radicibus nititur multis, ex eodem callo prodeuntibus, pusillis, granorum tritici modo aceruatim congestis, quarum nonnullæ in longitudinem protenduntur. Quæ omnia Dioscoridis historiæ bellissimè congruunt, sic scribentis. Chelidonium minus, quod triticum siluestre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: foliis hederæ, multò rotundioribus, teneris & subpinguibus, radices habet ex eodem callo complures, pusillas in granorum tritici modum aceruatim congestas: quarum tres aut

CHELIDONIVM,
Minus.



Locus.

Forma.

Lib. 2. c. 177

Vires.

Ibidem.

Lib. 8. sim.

In lib. 2.

Dioscor.

Lib. 4.

Georg.

quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Hæc omnia adamussim conueniunt, solæ qualitates & temperatura repugnant. Vis enim ei acris, inquit Dioscorides, & anemones modo summam cutem exulcerat, pforas & scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput naribus infunditur, decoctum eius ex melle gargarizatum magnificè id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit. Galenus easdem planè vires ei assignat, & quarti ordinis excalfacientium incipientis esse ait, cum maius Chelidonium tertij tantum sit ordinis. At eius plantæ hîc proponitur, nec folia, nec radix vlla gustum acrimonia afficiunt. Non tamen ob ignauam acrimoniam istud minus Chelidonium reiiciendum, cum ceteræ omnes notæ apprimè descriptioni suffragentur, & multarum plantarum acrior aut mitior sapor, agri sequatur conditionem. Valerius Cordus Chelidonium minus, florem amellum à Vergilio diligenter descriptum esse putat.

CALTHA

CALTHA PALVSTRIS.

CAP. XXXIIII.

SVPERIORI perquam similis est, quæ Germanicè & Belgicè *Dotterbloemen* vocatur. Quidam chamæleucen Plinij faciunt. Chamæleucen, inquit, apud nos farranum siue farfugium vocant. Nascitur secundum fluuios folio populi, sed ampliore. Radix eius imponitur carbonibus cupressi, atque is nidor per infundibulum imbibitur in vetere tussi. Sed

CALTHA PALVSTRIS.

*Tussilago siue farfugium,
Matthioli.*



idem Plinius alio in loco Bechion eandem cum chamæleuce facit. Quidam, inquit, eandem esse bechion, & alio nomine chamæleucen putant. Huius aridæ cum radice fumus per arundinem haustus & deuoratus, veterem sanare tussim dicitur. Quæ de chameleuce Dioscoridis intelligi posse non videntur. Chamæleuce, inquit, lumborum doloribus propitia est, herba virens incuruis foliis, surculisque, flore rosaceo. Alij chamæpucen legunt non chamæleucen, quoniam apud Plinium habetur, chamæpeuce laricis folio similis, lumborum & spinæ doloribus propitia est, quem vsum Dioscorides Chamæleuce attribuit. Sunt etiam qui breuè apud Dioscoridem descriptionem in totum reiiciendam censent, & sola hæc verba legunt. Chamæleuce facit ad lumborum dolores in aqua trita pota. Galenus chamæleucen scribit calidæ esse facultatis tertio quodammodo ordine, & siccæ primo, vt diuersa à bechio censenda sit. Ex his conicere quis possit *Dotterblæmen* chamæleucen non esse. Alij ex Geoponicis Malacocissum maiorem faciunt, Matthiolus Tussilaginis speciem siue farfugium, vt capite De Tussilagine dicemus. Recentiores alij Gesnerus, Pena, Lobellius & alij Caltham palustrem appellant. Folia ei sunt bene viridia, rotunda, violæ martiæ aut populi similia, maiora, in ambitu parum crenata: caulis rotundus in ramulos sese diffundens, qui flores sustinent luteos, chelidonij minoris, aut ranunculi similes, sed grandiores & aspectu pulchriores, minimè papposos, sed qui diu durant, nascuntur deinde siliquulæ, in quibus exiguum semen, luteum, radix crassa, capillamentis fibrata, acris gustu, sed moderate, nondum tamen vsu exploratæ facultates. Locis lacustribus & vdis crescit mense Martio & Aprili floret.

Nomina

Lib. 24. c. 15

Chamæleuce.

Lib. 26. c. 6.

Lib. 8. sim.

Dodo. lib. 1. cap. 20.

Forma.

Locus.

VERONICA FŒMINA. CAP. XXXV.

Nomina
Forma.



ERBARI plantam istam Veronicam fœminam appellant, Galli *Veronique femelle*, Germani *Erenbreisz vuciblin*. Caule exit lanuginoso, foliis rotundioribus, minimè crenatis, subpinguibus, magis viridibus, minimè hirsutis: flores profert in luteo purpurascens: semen in vasculis rotundis conclusum: radicem tenuem & fibratam. Locis vliginosis & la-

Locus. sculis rotundis conclusum: radicem tenuem & fibratam. Locis vliginosis & la-

VERONICA Fœmina,
Dodonæi.



VERONICA Fœmina,
Matthioli.



Vires.

culstribus gaudet. Iunio & Iulio mensibus floret. Gustu adstringens & amara est. Vnde colligere licet eam esse tum excalfaciendi, tum siccandi vi præditam, eademque præstare quæ Veronica maior, sed inefficaciùs.

TVSSILAGO.

CAP. XXXVI.

Nomina



NOTISSIMA vtilitate, quam præstat orthopnoicis, & tussi vexatis, dicitur Βήχιον Græcis, sicut Tusilago Latinis, Officinis farfara & Vngula caballina, Gallis *Pas de cheval*, & *Pas d'asne*, Italis *farfara*, *farfarella*, & *ungbia di cauallo*, Germanis *Rosshuob*, & *Brantlattich*. Theophrastus, vt quidam censuerunt, Tiphium appellat, quæ ante foliorum & caulium ortum floret. Plinius duo tussilaginis genera facit. Vnam siluestrem, alteram quæ à quibusdam Salvia dicitur, similis verbasco. Dioscorides vnico genere contentus fuit, idq; esse quod hîc proponitur, tum vires & effectus longa experientia comprobati, tum ipsa descriptio perspicuè demonstrant. Eius enim folia, vt ille ait, maiuscula sunt quàm hederæ, sex aut septem à radice, supernis partibus alba, infernis viridia (sic enim Græcè legitur, ἐκ μὲν τῶν πρὸς τὰ ἄνω λευκά, ἐκ δὲ τῶν πρὸς τὰ κατωτέρω χλωρά) in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus, flos luteus Vere prodit, quo vnà cum caule confestim exuitur. Inde nonnulli his vacare existimarunt, radix tenuis est (perperam legitur in excusis ῥίζα λεπτή, ἄχρητος, radix tenuis, inutilis. Qui enim

inutilis,

Lib. 7. hist.
cap. 12.

Lib. 26. c. 6.

Genera.

Forma.

TVSSILAGO, Matth.



inutilis dici potest, cuius vsum mox præscribit. Quare vox *ἀχνητος* in contextum irrepsit, quæ nec in Oribasio, nec in Plinio legitur, vel pro *ἀχνητος* legendū *ὠχνητος*, idest, ad vsum com-
moda. Nascitur circa riuos & aquosa loca. Similiter quæ hîc pingitur, folia promit ab imo in pediculis sesquipalmum altis, rotunda, sed lateribus senis septenisve angulos acutos claudentia, venosa, equinum pedem referentia, altera parte candicantia, & quadamtenus cinerea: altera viridia, carnosâ: caulis albus, lanuginosus, in quo flores aurei, dentis leonis æmuli, celerrimè in pappos abeûtes: radix cãdida, longa humi sparâ. Plinius ita distinguit & describit. Tussim sedat bechiû, quæ & Tussilago dicitur. Duo eius genera. Siluestris vbi nascitur, subesse aquas credunt: & hoc habent signum aquileges. Folia sunt maiuscula quàm hederæ, quinque aut septem, subalbida à terra, supernè pallida: sine caule, sine flore, sine semine, radice tenui. In hoc bechio Plinius à Dioscoride dissentit: habet enim quinque aut septem folia;

Lib. 26. c. 6.

ille sex aut septem, & supernè alba, infernè virentia. Plinius contrà, subalbida à terra, supernè pallida. Præterea, Plinius ex eorū est numero, quos Dioscorides reprehendit tum hîc, tum in totius operis præfatione, quòd putarint bechium sine caule, sine flore, sine semine esse. Sed quantum ad foliorum colorem spectat, hîc dissimulandum non est, quamuis Dioscorides ea dicat esse, *ἐκ μὲν τῶν πρὸς τὰ ἀνω λόκα, ἐκ δὲ τῶν πρὸς τὰ κατώτερα χλωρά*, tamen omnes quos legere mihi contigit, tum eius auctoris interpretes, tum herbarios de Tussilagine scribentes, pingere folia aduersâ parte tomentosa, incana, aduersâ virentia, siue inferiùs alba, superiùs virentia. Initio Martij mensis & Aprilis caulem profert lanuginosum sine foliis, & in eo florem luteum: mox à radice prodeunt folia: tunc confestim caulis & flores depereunt, ita vt rarissimè flores & folia in hac planta simul reperiatis. Quòd flores sint fugacissimi, iisq; enatis breui vigor vitaq; duret, longissimaq; mora triduûm, aut quatriduûm, post quod tempus illicò flaccescentes in pappos euanescent, & caduci marcent, ita vt non nisi vere sese ferant obuiam, quod qui non animaduertunt sine caule & flore nasci eam existimarunt. Folia ex melle trita, inquit Dioscorides, igni sacro & omnibus inflammationibus illitu medentur. Arida suffitu, ita vt fumus per infundibulum hianti ore capiatur, hos sanat qui sicca tussi, atque orthopnœa infestantur: pectoris vomicas rumpunt. Eundem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite & pota mortuos partus eiicit. Et Galenus, Bechium, inquit, sic nuncupatum est quod *βήχας* hoc est tusses, & orthopnœas iuuare creditum sit, si quis videlicet folia arida sumēs, aut radicem in prunis accēdens, ascendentem inde fumum inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, vt sine molestia noxave omnes thoracis abscessus rumpere credita sit. Sanè folia virentia, partes cruda inflammatione obsessas, illitu extrinsecus adiuuant, propter aqueæ humiditatis admistionem, qua omnia viridia, teneraq; participant, alia plus, alia minùs. Nam sicca Bechij folia acriora sunt, quàm vt partibus inflammatione laborantibus conueniant. Nascitur in Tussilaginis radice, inquit Matthiolus, subalbida quædam lanugo, quæ à radicem particulis prius repurgata, deinde linteolis

Tempus.

Ibidem:
Vires.

Li. 6. simpl.

Ca. 109. li. 3.

Ibidem.

inuoluta, & in lixiuio parùm decocta, addito salis nitri aliquantulo, demũ sole siccata, omnium optimus est fomes ad ignem ex silice excussum excipiendum. Est enim adeò ignis rapax, vt statim primo chalybis concussu accendatur. Matthiolus Thussilagini veræ duas alias species addidit: vnam quæ vera est petasides, vt dicitur. Alteram Germanorum & Belgarum *Dotterbloemen*, nonnullorũ *Chamæleucẽ*, & *Malacocissum* maiorẽ, aliorum *Caltham palustrem*, de qua diximus. Hæc multò

*TVSSILAGO Alpina, siue
Montana, Dalechampij.*



*TVSSILAGO Altera
Alpina, Clusij.*



*TVSSILAGO Montana
Minima, Lobel.*



magis *Chelidonium* minus ipso toto vultu præfert, nisi quod vniuersa maior. Flores non papposi admodum & particulatim exeunt, aurei ranunculi modo, aut *chelidonii* minoris, folia nõ ortu, vt in *Tussilagine*, anteuertunt, & *Nymphææ* luteæ colore, aut *chelidonii* minoris nitore fulgent. Folia non subter incana, nõ angulosa, non caulis tomentosus, sed potius atro virore polito, vti *asarum* & *nymphæa*. Radix fibrata capillamentis, acris gustu, sed moderatè. Alij herbarij duo alia genera *Tussilaginis* faciunt, & à natalibus *Tussilagines* *Alpinas* vocant. Vnam radice longiuscula, nodosa, valde fibrata, nigricante: foliis è radice prodeuntibus, rotundis, tenui & longo pediculo appensis, venosis per ambitum infectis: caule pa' mũ alto, lanuginoso, foliola duo vel summum tria proferente: flore aureo, in vtraque planta singulari, *Tussi'agini* nostræ simili, non sic fugaci, verum in planta sua diu nitente ac perdurante, sed qui tandem in pappos abeat

abeat. Alterum radice crassiore, magis fibrata: foliis maioribus, in circuitu magis incisus, venosioribus, acuminatis hederæ modo: caule sesquipedali, striato: flore in eius cacumine copioso, senecioni simili, luteo, in pappos auolante. In Alpium riuus, fontium scaturiginibus, & ad torrentium margines prouenit. Habet præterea Lobellius Tussilaginem montanam minimam, quæ radicum & foliorum figura nihil, sed magnitudine tantum differt, estque illi facie proxima. Foliola habet in pediculis binum & ternum digitorum, Soldanellæ Alpinae paria, similibusque lateribus, & pariter auersa, incana, tormentosa, & carnosa.

PETASITES.

CAP. XXXVII.



RAECIS Πελασιτης, & Latine Petasites dicitur à Petafo, idest, Galero, quod folium eius tam grande sit, ut capiti impositum à solis æstu Galeri vice possit defendere, Gallicè *Herbe aux tigneux*, Germanicè *Pestilentz wurtz*, Italicè *Cappellazi*, Hispanicè *Sombrereta*. Hunc breuiter sic descripsit Dioscorides. Petasites pediculus est cubito maior, digiti magni crassitudine, in quo folium instar Galeri magnum, incumbens veluti fungus. Ex qua breui historia, insignem tamen notam continente, maior herbariorum pars à Matthiolo dissentiens, perspicue effici existimat Petasiten esse cuius hinc pictura datur.

Li. 4. c. 103.
Forma.

PETASITES Magnus. Perperam Tussilago Maior, Matth.



Hæc enim planta, inquit Pena, Vere crescit, & nondum foliis ortis caulem erigit tenerum, carnosum, concuum, sesquipalmum altum, floribus in summo densis pusillis, multis, mucosis, racemosis, oleæ, in purpureum conum compactis; spectatu amœnum, nullo semine prægnantem, sed flore marcescente & defluente spem etiam seminis perdentem. Folia pediculo cubitali, crasso, carnosio, quasi appensa medio sui centro, penduli instar Petasi inuersi videntur, maximam personatam superantia, sed rotunda, subter parum incana, singula singulis pediculis medio ferme totius puncto hærentia, vbi sinus desinit profundus usque ad folij centrum actus, quæ si prorsus clauseris, fungi penduli modo fulciri dixeris. Radix valde crassa, foris pulla, intus candida. Grauis est & prorsus ingrati odoris, gustanti perquam amara & ingrata: desiccatur item magnopere, quapropter morbis Epidemicis utilissima habetur, & comperta medicis Germanis, etiamque plebi, quæ eam ob dotem *Pestilentz wurtz*, idest, pestis radicem, appellat. Quæ facultas tanquam nota

certior, cum Thussilagini non insit (neque enim est odore graui, neque ingrato) Matthiolum à sententia deducere debuisset. Sunt alia eius rationes inualida, & leuiusculæ, quibus probare vult plantam hinc depictam Thussilaginem esse, nimirum quod proueniat in humectis & viginosis locis, præsertim propè riuos aquarum perinde ac Tussilago, quod caulē edat ante folia in ipso Veris initio, in cacumine flores spicatos, ex purpura albicantes, qui cum caule paulò post flaccescentes contrahescunt. Nam idem contingit trifolio hederaceo, croco siluestri, ephemero, & aliis. Petasites noster nascitur copiosissime in pratis humidis, & iuxta riuulos sitis. Initio mensis Martij floribus suis ornata hæc herba conspicitur, qui Aprili imminente

Locus.

nente

Vires.

Fuch. cap.
248.

nente statim citra fructum decidunt: tunc folia cum pediculis prodeunt. Contra phagedænas & vlcera maligna efficaciter illinitur, auctore Dioscoride. Galenus addit esse ex tertio ordine desiccantium quamobrem ad maligna & phagedænica vlcera adhibent. Experientia comprobatum est, vt diximus, eius radicem mirificè conferre pestilentibus febribus, quòd sudorem vehementer moueat, si in puluerem redacta cum vino sumatur. Radices complures cortice exutas & exenteratas aceto indunt, quoad viribus imbutum fuerit, & ex illo cum rutæ succo & theriaca propinant, præsidiumque nulli secundum affirmant. Magna efficacia bibitur, à mulieribus, quas tormina vteri & præfocationes vexant: valet etiam vnicè ad enecandos lumbricos. Succurrit quoque iis, qui spiritus difficultate laborant. Ducit vrinam & menses. Efficax est ad vulnera præhumida, & ad reliquas cutis fœditates. Est alter Petasites ab herbariis odoratus appellatus, in vmbrosis vallibus Alpium, ad torrentium ripas nascens, radice crassa, longa, nodosa, serpente, subrubra, acris & odorata, folio ampliore quàm tusilago, cætera propemodùm simili, cum teritur iucundū quippiam exhalante. Veris principio ante foliorum exortum thyrsus emicat digiti minimi crassitudine, ferè pedem altus, foliolis quibusdam myrto similibus, ex interuallis alarum modo ipsum amplexantibus: flore in vertice copioso, candido, & suauiter olente, ex longo vasculo prodeunte, in apices multos diuiso, tabescente & emoriente cùm folia subnascuntur. Caulis & florum ante foliorum ortum effigies hîc picta est.

PETASITAE Odorati, flos.

Locus.

Forma.



ca propinant, præsidiumque nulli secundum affirmant. Magna efficacia bibitur, à mulieribus, quas tormina vteri & præfocationes vexant: valet etiam vnicè ad enecandos lumbricos. Succurrit quoque iis, qui spiritus difficultate laborant. Ducit vrinam & menses. Efficax est ad vulnera præhumida, & ad reliquas cutis fœditates. Est alter Petasites ab herbariis odoratus appellatus, in vmbrosis vallibus Alpium, ad torrentium ripas nascens, radice crassa, longa, nodosa, serpente, subrubra, acris & odorata, folio ampliore quàm tusilago, cætera propemodùm simili, cum teritur iucundū quippiam exhalante. Veris principio ante foliorum exortum thyrsus emicat digiti minimi crassitudine, ferè pedem altus, foliolis quibusdam myrto similibus, ex interuallis alarum modo ipsum amplexantibus: flore in vertice copioso, candido, & suauiter olente, ex longo vasculo prodeunte, in apices multos diuiso, tabescente & emoriente cùm folia subnascuntur. Caulis & florum ante foliorum ortum effigies hîc picta est.

PERSONATA.

CAP. XXXVIII.

Nomina



PKEION Græcis, *προσωπιον* & *προσωπις* dicitur, Latinis Arcium, Personata, & Personatia, Apuleio Dardana, Officinis Bardana & Lappa maior, Germanis *Großkletten*, Italis *Lappola maggiore*, Gallis *Grand Gloutteron*, & *Gletteron*, *Grande Bardane*. Galenus non arcium, sed alterū

Li 6. simpl.
Pena in
Aduers.

arction vocat. Vtroque nomine dicta planta, propter similitudinem quam cum villosis hirtisq; vrforum capitibus conglomeratæ echinatæq; Lappæ habent. Personata autem, quòd hac quòdam ad personas utebantur, quoties in theatris aliisq; locis, qui cognosci à populo nollent egisse quidpiam volebant. Est enim foliorum eius tanta amplitudo, vt tota humana facies iis tegi possit. Matthiolus duo obseruauit Personatæ genera, echinatorum tantùm capitum facie differentia: quæ in altero maiora, duriora, rigidioribus asperioribusq; aculeis armata: in altero minora, molliora, mitioribus aculeis rigidiuscula, alba quadam lanugine obductis. Prius genus scribit Dioscorides folia habere cucurbitæ, maiora tamen, hirsuta, nigriora & crispiora: caulem albicantem: quamquam interdum sine caule reperiatur, radice intus candida, foris nigra. Plinius, Quidam arcion, inquit, Personatam vocant, cuius folio nullum est latius, grandes lappas ferentem. Ex quibus nemo non intelligit Personatam esse eam, quam Bardanam & lappam maiorem vulgus vocat, quæ folio constat maximo, cucurbitæ æmulo, altera parte albicante, altera in viridi nigricante:

In cap. 102.
lib. 4.

Genera.

Forma.

Li. 4. c. 102.

Lib. 25. c. 9.

*PERSONATA, Sive Lappa
maior, Matthioli.**PERSONATA, Seu Lappa
maior altera, Matth.*

nigricante: caule rotundo, cauo, in purpureo albicante, ex lateribus ramulos multos emittente, in quibus folia parua, grandibus lappis siue echinis prætereuntium vestes & canes mordaci hæsu corripientibus, tandem dehiscentibus, & florem purpureum edentibus, hirsutum: radice grandi, carnosa, foris nigra, intus candida, amara. Alteram Personatam Matthiolus eam esse credit, quam Plinius Persolatam vocat, his verbis. Persolata quam nemo ignorat, Græci Arction vocant, folia habet maiora etiam cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraq; & crassiora: radicem albam & grandem. Ex quibus colligit Matthiolus Plinium hinc secundum Personatæ genus descripsisse: quod, cum de priore Personata scripsisset eodem capite & libro (quem locum citauimus) cuius folio nullum est amplius, grandes Lappas ferente, aliquantò post de altera Personata scribat, quæ minores Lappas fert, & Persolatam vocat. Cornarius tamen censet posteriore Plinij loco vulgata exemplaria falsò Persolata habere pro Personata. Vt cumq; sit Plinius Persolatam, ut sæpè facit, cum Personata sua aut Dioscoridis, confudisse videtur, id quod descriptiones dilucidè ostendunt. Cæterum Persolata à magnitudine: & vsu foliorum, quemadmodum Personata & Petasites, nomen accepisse videtur, quia galeri vice solis æstum à capite arceret. Quare hæ plantæ inter sese similes serie coniungendæ fuerunt. Sed ad Personatam nostram reuertamur. Ea secus vias & pomeria, in marginibus agrorum incultorum & pratorum, & scrobibus exsiccatis prouenit. Iulio & Augusto Lappas & flores fert. Ponde e drachmæ vnus pota, inquit Dioscorides, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extusientibus auxiliatur. Folia trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitu sedant: vtiliter antiquis vlceribus illinuntur. Qua de re sic Galenus. Alterum arction quod prosopida vocant, cuiusq; folia cucurbitæ simillima sunt, nisi quod tum maiora, tum duriora, discutit simul, & desiccatur, sed & adstringit mediocriter: quamobrè folia eius veteribus vlceribus mederi possunt. Apuleius multò plura & maiora de eadem tradit. Personatæ herbæ succus cum vino vetere

potui datus, omnes morsus serpentium mirificè sanat: eiusdem foliis cinges febricitantem, & statim febrem mitigat, & calorem sanat. Vulnus etiam, si cancer erit, cum aqua decoctionis foliorum eius foueto: deinde ipsam cum nitro & axungia cum aceto tere, & in panno inducito, & imposito. Ad canum rabidorum morsus radix

cum

Ibidem.
Lib. 25. c. 2.Embl 91.
lib. 4.

Locus.

Vires.
Li. 4. c. 102.

Li. 6. simpl.

Lib. de virib. herb.

cum modico sale trita imponitur morsui, & statim æger liberabitur. Succus foliorum eius cum melle potui datus, vrinam prouocat, & vesicæ dolorem tollit: pulvis seminis eius cum vino optimo 40. dies potui datus, ischiadicis mirabiliter sanat. Folia trita cum albumine oui & imposita, ambusta mirificè curant. Columella. Venena viperæ depellit super scarificationem ferrosactam herba, quam vocant Personatam, trita & cum sale imposita. Plus etiam eiusdem radix contusa prodest. Radix conditur saccharo, & cum grata, tum vtilissima ad calculū & dysenteriam habetur: Venerè etiam excitat. Idem semen pollet, sed multò efficacius calculosis.

Lib. 6. c. 17.

Pet. Pen. in
Ad.

XANTHIVM.

CAP. XXXIX.

Nomina



ΑΝΘΙΟΝ vel φάσγανον vel φαργάνιον Græcè, Latine Xanthium, Officinis Lappa minor, Lappa inuersa, Bardana minor, quibusdam Strumaria: vnde Aetius Chæradolethron, idest, Struminecem nominari scribit, & Philanthron. Galli vocant *Petit Gloutteron*. Itali *Lappa minore*, Germani *Bettlersleusz*, idest, mendicorum pediculos, & *Spitzkletten*, Gallicè *Gloutteron aigu*. Xanthium autem à colore dicitur, quòd χανθὰς τέχας, idest,

XANTHIVM, Matth.

Lib. 4. c. 133.
Forma.

Locus.

Li. 4. ca 133.
Vires.

quòd flauos faciat capillos. Xanthium describit Dioscorides caule esse cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo alis multis: foliis Atriplicis, insectis, nasturtium odore imitantibus: fructu grandis oliuæ modo, rotundo, & vt platanus pilula spinoso, qui contactu vestibus adhaerescit. Ex qua quidem deliniatione facile est intelligere Lappam minorem omnibus ferè æquè notam quàm est Lappa maior, sed non tam frequentem, Xanthium esse. Folia habet atriplicis, crenata, quadatenus cinerea, nasturtium olentia: caulem sesquipedalem, angulosum, pinguem, nigris notis conspersum, crebras fundentem alas: fructum echinatū lapposumq; oliuæ aut corni modo oblongum, contactu vestes apprehendentem: radix non profunda, fibrata rubescit. Nascitur læto & pingui solo & lacubus exsiccatis. Fructus ante collectus quā perfectè siccescat, inquit Dioscorides, tunditur & fictili vase reconditur. Flauos facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro antè perfriktum, illinatur. Alij in

Li. 8. simpl.

Pet. Pen. in
Ad.

vino tundunt, & ita asseruant. Semen aptissimè tumoribus imponitur. Galenus breuiter dixit Xanthium phasgantium etiam vocari: fructum discutiendi vim habere. Aetius, decoctum corticis radices, inquit, potum lienes consumit: dentes mortos firmat eiusdem decoctum ex vino collutum. Radix & semen laudantur ad tumorum strumarumq; pertinaciam delendam frequenti admotu.

PLANTAGO AQUATICA.

CAP. XL.

Nomina

Dodo. lib.
plant. aqu.

OSTRAE ætatis herbarij plantam hanc plantaginem aquaticam nominarūt, Gallicè *Plantain d'eau*, Italicè *Piantagine aquatica*, Germanicè *Vuasser vuegrich*. Folia habet in prælongis, crassis pediculis longa, lata, in mucronem desinentia, Plantaginis maioris foliis longiora, & acuminatiora. Caules inter ea exeunt longi, triangulares, intus fungosi, in plures ramulos

PLANTAGO Aquatica.



ramulos diuisi, in quibus flores candidi parui, tribus constantes foliolis: fructus deinde parui, triangulares, virentes: radices subsunt fibratae. Nascitur in humilioribus & aquaticis locis, in fossis, in lacuum & riuulorum marginibus. Iulio & Augusto mensibus floret. Facultatis aiunt frigidae esse ac siccae. Sunt periti herbarij qui affirmant plantaginem istam aquaticam verum esse Dioscoridis Damasonium seu Alisma: eiq; Damasonij delineationem viresque prorsus conuenire. At cum Galenus qui legisset radices eius acres esse, eoq; oedemata discutere, non nihil Dioscoridi aduersetur, in ceteris autem assentiat, sic illi de radice verum esse experimento & ipsi asserunt.

Locus.
Vires.

Lib. 3. c. 351.

DAMASONIVM. CAP. XLI.



VM Matthiolus reiectis aliorum sententiis plantaginem aquaticam Dioscoridis Alisma aut Damasonium non esse sese probasse putasset, aliud substituit, sed id depinxit tantum, non

descripsit. Sunt qui aliam Damasonij speciem exhibent, quae radicularum fibris multis nititur candidis, breuibus: cauliculos multos edit dodrantaes, laues, nudos, nodosos: folia Damasonio seu plantagini aquatica similia, sed parua, longis pediculis appensa, fructum stellae figura, sex rigidis pungentibusq; cuspidibus radiatum,

Forma.

DAMASONIVM, Seu
Alisma, Matthioli.



speciosa elegantiq; structura. Vnde stellatum cognominat. Humidis & aquosis locis gaudet. Idem prorsus est Alisma pusillum angustifolium muricatum Lobellij, seu Plantago aquatica minor, minutis quinqueneruiae plantaginis angustioribus foliolis, deorsum versus reflexis: cauliculo gracili, sesquipalmari, e fibrosa radice sparsa speciosa coma, referta numerosis, muricatis, exilibus capitulis tribuli ritu. Item aliud Damasonium Alpinum Montanum herbarij vocant, quidam Clymenum, folio plantaginis minoris, folliculis iridi similibus, fructu oblongo, cirris polyporum non dissimili. Sed cur Damasonij nomen huic plantae indiderint, nescio. Quare liberum cuiq; fuerit aut id retinere, aut aliud verius sufficere. Ceterum radice est nigra, modice fibrata, altius descendente: foliis oblongis, angustis, nervosis, lanceolatae siue plantagini minori similibus, aliquanto longioribus: acuminatis: caulibus pedalibus: flore luteo: seminibus oblongis, angulosis, quaternis simul sic coniunctis, ut hiante medio spatio fenestrata quaedam meta appareat, apice nigro supereminente, eleganti sane figura, laternae quae nondum cornu

Locus



charthave obducta est clausaq; simili, & huic plantæ peculiari. In Alpium vmbrosis conuallibus gignitur.

LYSIMACHIA,

CAP. XLII.

Nomina
Li. 25. ca. 7.

Ibidem.

Lib. 4. ca. 3.

Forma.

Locus.

Dod. lib. 1.
cap. 50.

QUAE Græcè λυσιμάχιον & λυσιμάχιος dicitur, Latine etiam Lysimachia à Lysimacho rege inuentore, teste Plinio: vel à pugna dirimenda: id enim est λύειν τὴν μάχην, idest, certamen dirimere. Est enim ea plantæ vis, vt etiam belluarum animos feroces, & mutuos hostiles congressus placare possit: ita scribente, atque breuiter eam describente Plinio. Inuenit Lysimachus herbam Lysimachiam, quæ ab eo nomen retinet, celebrata Erasistrato. Folia habet salicis viridia, florem purpureum: fruticosa est ramulis erectis, odore graui: gignitur in aquosis. Vis eius tanta est, vt iumentis discordantibus iugo imposita asperitatem cohibeat. Dioscorides paulò fusiùs eam descripsit. Lysimachia, inquit, quam aliqui Lytron appellant, caules emittit cubitales, altioresve, fruticosos, tenues, circa quorum genicula enascuntur folia similia foliis salicis, gustu adstringentia: flos est fuluus aut auricolor. Nascitur in palustribus locis & circa aquas. Matthiolus veram esse Lysimachiam, quæ hîc picta est, asserit. Aliam quorundam Lysimachiam, quæ quadrato exit caule, foliis salicis, flore in purpura rubescente, etsi Lysimachiam Dioscoridis non referat, tamen Lysimachiam alteram appellat. Dodonæus Lysimachiam notissimam vsuq; frequentiore veram Lysimachiam esse putat, quæ vulgò Salicaria nominatur à salicis foliis, Gallicè *Corneolle*, *Soulsi d'eau*, *Percebosse*, *Pellebosse*, idest, Pestifuga, Germanicè *Geel-vueidrich*. Eadem est quæ Matthioli Lysimachia prima. Huic caulis est cubitalis, interdum bicubitalis, parû angulosus, geniculatus: folia longiuscula & angusta, frondis saligneæ aut persicariæ, pallentia, minimè crenata, terna quaternave sibi ex aduerso circa caulem sita: flores in ramulis elegantes, lutei, inodori, multi & conferti: semen rotundum coriandri: radix longa, gracilis, latiùs sparsa, quæ teneram edit sobolem purpurascenscentium



scientium initio turionum. Locis vdis & marginibus fossarum ripisq; riuulorum prouenit: facultate est frigida, sicca, adstringente. Officinæ multū ad gargarismata & parulides, exesq; oris inflammationes vsurpant. Herbariorum sedulitas alias Lysimachia species adinuenit. Lysimachiam purpuream priorem, suprà indica-

LYSIMACHIA

Purpurea, I. Dodon.



tam à Matthiolo, & secundo loco pictam specie à lutea diuersam à Plinio memoratam, quippe qui flore purpureo & odore graui eas discreuisse videntur. Caules edit geniculatos subpurpureos, quadratos, folia lutea similia, aut salicis angustifolia, ex interuallo bina, subpurpurea: flores spicatos, purpureos, palmum & sesquipalmum longos: semen in paruulis capitulis veluti coronis prouenit, vnde flores sunt dilapsi. Radix maior est quàm lutea, similiter turiones quotannis teneros edens, lignosa, nigricans, non tamen odore tetro. Quamquam non magnirefert, sit ne hæc Plinij an Dioscoridis Lysimachia. Tamē Plinius videri potest non aliam quàm Dioscoridis Lysimachia explicasse, sed ὠρόρρον, florē purpureū vertisse, aut ὠρόρρον legisse, & graui odore esse dixisse, quod quando adoletur verū esse Dioscorides asserit. Lysimachiū est purpureū alterum Dodonæi. Aliud est Lysimachium purpureum siliquatum, vulgatum, à siliquato fructu præcoci, qui auctu & incremento florum eruptioni anteuertit, quasi proles parente prior, filius ante patrem ideò vocitata. Caulibus & foliis lutea similis est, nisi quòd ea angustiora & leuiter crenata sunt. Flores promit quaternis foliolis constantes, purpureos,

Lib. 21. c. 7.

Dod. lib. 1. cap. 10.

Dod. lib. 1. Pet. l. 1. Ad.

LYSIMACHIA Siliquosa
alia, Lobellij.



Lib. 3. c. 49.


patulos, geranij columbini, aut vulgaris maluæ filuestris : sub quibus nascuntur, antequàm flos aperiatur, siliquulæ, siue cornicula rotunda, exilia, longiuscula, quæ semine valde minuto maturo in tres quatuorve particulas fissâ, vnâ cum papposis inuolucris perduntur. Radix est gracilis, fibrata. Non aliis hæc natalibus quàm alia prouenit. Huius varietas duplex obseruatur. Frequentior est omninò folio, siliqua, caule iisdem, sed magnitudine inferior, & tenera adeò, vt vix siliquam floremq; sustinere queat : flos propius caryophylleam Tunicam dictam, paulò minor. Altera varietas cernitur in floribus pallidioribus, quadripartitis, angustioribus foliolis decussatim sitis, in pari siliqua : cætera similia sunt. Hæc sic expressit Lobellius, & esse ait Chamænerion Gesneri, Delphinium buccinum Dioscoridis. Herbarij quidam, inquit Ruellius, putant Delphinium esse, quam filium ante patrem diximus appellari, quòd siliquam & intus semen ante floris exitum ostendat : rectius si partus ante conceptum ab eis appellaretur. Est & Lysimachia cærulea quibusdam

Veronica recta, aut maior, filio ante patrem non absimilis caule & folio, sed longiore, crassiore, & tota minor, ramulos habet in summo spicatos floribus cæruleis, lauandulæ longioribus, multos, exiguos & rotundos folliculos, in quibus minutum semen. Exigua & fibrata nititur radice. Rarior hæc est, & in hortis ab herbariis

LYSIMACHIA
Cærulea.



LYSIMACHIA
Galericulata, Lobellij.



colitur

colitur. Iunio & Iulio mensibus florent, Augusto semen maturefcit. Huic adiungit Lobellius *Lyfimachiam* aliã *Galericulatam*, quæ riuulorum & fluminum ripas, & depressos agrorum margines Londinensis & Antuerpiani agri sectatur. Multos emittit quadratos, sesquipedales & bicubitales geniculatos pediculos, in quibus folia *Lyfimachia* purpureæ similia, scordij æmulatione ex atro virentia, ex geniculis gemina, è quibus instar *Galericuli* flores ex cæruleo punicantes. Radice variè diuaticata repit, vt à nullo hætenus descripta aut picta, sic vsu neglecta aut incognita. Hæc Lobellius. Purpureæ & cæruleæ *Lyfimachia* vsus adhuc incognitus. Sed *Lyfimachia* Dioscoridis foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectionem supprimit: disentericis potui datur, aut infunditur: fluxû muliebrem sistit in pello: sanguinis profluuium subuenit, si herba nares obturentur. Vulneraria est, & sanguinem cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit, qua de causa serpentes fugat, & muscos interficit. Plinius diuersis locis eisdem *Lyfimachia* vsus tradidit. *Lyfimachia* odorem angues fugiunt. Et, Si ore sanguis reiiciatur, siue è naribus, siue aluo fluat, siue fœminarum vtero, *Lyfimachia* pota, vel illita, vel naribus indita. Rursus, *Lyfimachia* recentibus plagis medetur. Et rursus, Capillum *Lyfimachia* flauum facit. Galenus de eiusdem viribus ita differit. *Lyfimachios* superantem habet qualitatem adstrictoriam, per quam & vulnera glutinat, erumpentemque è naribus sanguinem, emplasti i modo illita cõpescit: quin & reliquas sanguinis eruptiones sistere potest cum ipsa, tum eius succus multò magis. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones ac muliebrem profluuium sanat.

Vires.

Lib. 25. c. 8.
Li. 26. c. 12.Ibid. ca. 14.
Lib. 25. c. 15.
Li 7. simpl.

STRATIOTES AQUATICVS,

CAP. XLIII.




IDEVR hæc potius quàm Matthioli planta esse *τραλιώτης ἔνυδρος*, siue *ὁ ἐπὶ τῶν ὑδάτων φυόμενος*, quem & *πολάμιον* nuncupant. Nam reperitur in stagnantium aquarum lacubus & fossis, vel pigrè fluentibus aquis, maxima foliorum parte vnà cum floribus aquas superante, reliquis ipsius stirpis partibus sub aquis conditis, vnde cognomentum inditum.

Nomina

Locus.

STRATIOTES Aquaticus.



Lobellio & Penæ *Stratiotes*, siue *Militaris Aizoides*, *Sedum* aquaticum de frum. dicitur. Folia habet *Aizoo* maiori similia, sed maiora multò, mucronata, angusta, per ambitum duris quibusdam & breuibus aculeis spinosa, lanceolata plantaginis, longioribus, siue aloës herba, sed breuioribus & minoribus. Ex quorum medio & ad latera pediculis non longis insident flores ternûm foliorum, candidi, quadamtenus ranunculi albi, medio lutei, & pilis hirsuti, ex vagina siue forcipula cancri marini trifida emergentes. Subest pro radice breuissimum, vt ita dicam, caput, foliorum sessilis & latior basis, infernè valde gracilis & tenera. Inde fibræ longæ, tenues, candidæ, lyrarum fidibus, siue longis lumbricis persimiles demittuntur, aquæ fundum petentes, quæ si radices non sunt, sine radice viuit. Has fibras scelerati agyrtae in aquæ plena phiala, quo maiores appareant, mulierculis ostentatas impudente mentiuntur vermes esse, quos medicamentis suis ex intestinis eduxerint, teste Dodon. Facultatem

Dodo. l. b.
l. c. 99 & in
plant. aqu.

Lib. u. c. 99

Vires. vulnerariam habet refrigerandi & siccandi. Quæ omnia Dioscoridis historiæ
 Lib.4.c.99. consentiunt. Stratiotes in aquis nascens, inquit, iisdem supernatat, vnde cognomen-
 tum traxit, & sine radice viuit. Herba semperiuo similis, ni maiora haberet
 folia, quæ refrigerant, sanguinem qui defluit à renibus pota sistunt, vulnera quæ
 inflammationem minantur intumescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus
 Li.24. c.18. illinuntur. Eadem Plinius tradit. Sed eam in Ægypto tantum nasci, quod non
 credendum, cum Dioscorides indefinitè dicat aquis innatare. Celebratur, inquit,
 & à Græcis Stratiotes, sed ea in Ægypto tantum, & inundatione Nili nascitur,
 Aizoo similis, ni maiora haberet folia. Refrigerat mirè, & vulnera sanat ex aceto
 illita. Item ignes sacros ac suppuraciones. Sanguinem quoque qui defluit à reni-
 bus, pota cum thure masculo mirificè sistit. Stratiotes aquaticus, inquit Galenus,
 Li.8. simpl. humida & frigida facultate est, terrestris verò nonnihil habet adstrictionis:
 proinde sanè & vulnera glutinare potest, & vlceribus esse utilis. Sunt qui eo & ad
 sanguinis eruptiones vtuntur, & ad fistulas.

NUMMULARIA. CAP. XLIIII.

Nomina



Vi c herbe, vt aliis multis, nomina ab herbariis imposita, quibus ho-
 die quoque vulgò appellantur, immutenda non censeo. Dicta est
 Nummularia, à foliorum circinnata rotunditate, nummi speciem re-
 ferente, Gallicè *Monnoyere*. Centimorbia, à mirifica vi & facultate,
Herbe à cent maladies. Hirudinaria, quod passim terræ hirudinis instar affixa sit.
 Serpentaria, quia compertum sit serpentes hac herba, si vulnerentur, sibi mederi.
 Germanicè *Egelkraut*, aut *Pfen nigkraut*. Quidā à Plinio, cap.28. lib.28. Nummulum vo-
 catam putant, falsoq; in nostris exemplaribus pro Nummulo legi Mimmulū. Cauli-

Forma.

NUMMULARIA.



Locus.

Fuchs. cap.

151.

Tempus.

Vires.

culis seu viticulis gracilibus, teneris per terram
 serpit, in quibus folia bina ex aduerso æquis,
 sed crebrioribus spatiis, rotunda, latiuscula,
 pingua: flos luteus, ferè ranunculi: radix tenera
 & gracilis. Prouenit locis humidis, præsertim
 circa fluentia. Mense Maio apparet, Iulio floret.
 Gustu admodum adstringit, vt hinc constet
 eam esse secundi aut tertij ordinis exsiccant-
 tium. Huius folia & flores adeò desiccant ad-
 stringuntque, vt vlcerum glutinare possint.
 Pota cum vino dysenterias, ventris imbecilli-
 tates, fluxusque ac humiditates sanant. Cata-
 plasmatibus modo illita vlcerum putredinosa iu-
 uant. Prosunt ad sanguinis reiectiones, pro-
 fluuia muliebria, & ad omnia interanea, & vl-
 cera potissimum pulmonis, quamuis rustici
 credant pecudum vlcerari pulmonem, quæ il-
 lius folia depascuntur, ac ideò nocentissimam
 vim eius esse. Externis etiam vlceribus summè
 confert, si vino in quo herba hæc decocta
 est lauentur, atque abstergantur. Planta ista
 quibusdam Ereuthedanum Theophrasti vide-

Lib.9. hist.
 cap.14.

tur esse. Το δὲ ἐρεϋθεδανον, inquit, καὶ φύλλον ὁμοιον κιστῶ πλὴν τροχιδότερον.
 φύεται δὲ ἐπὶ γῆς ὡς περ ἄγρωσις. φιλεῖ δὲ καὶ τὰ παλίσκια χωρία. Ereutheda-
 num folium habet hederæ simile, sed rotundius, repit humi graminis modo,
 vmbrosis

umbrosis locis gaudet. Sed vires haud conueniunt. ἑρπικὴ δὲ, διὸ καὶ χρῶνται
πρὸς τὰ τῆς ὀσφύος ἀλγήματα, καὶ πρὸς τὰ τῆς ἰχιάδος. Cit vrinam, qua de causa ad
lumborum & coxendicis dolores vtuntur.

EUPATORIVM VVLGARE,

CAP. XLV.



VNT permulti, imò omnes ferè pharmacopœi, qui agrimonix siue *Nomina*
vero Dioscoridis Eupatorio, hanc plátam substituunt, quod nonnul-
li non rei ignorance faciunt, sed maiorum virium obseruatione, &
experientia ducti, quas etiam ipsa aspectu insignis planta, foliorum
amaritudine & odoris præstantia, satis præ se fert. Igitur propter amicas hepati

EUPATORIVM,

Vulgarè.



vires, fortè & ob folia Eupatorium vocauerunt, *Li. 2. c. 244.*
verius pseudoeupatorium dicendum, alij Eu- *Dod. lib. 1.*
patorium aquaticum, alij canabinam aquati- *cap. 39.*
cam, alij Eupatorium Auicennæ. Ruellius, quod
suprà nos declarauimus, hydropiper esse, haud
rectè asseruit. Pseudoeupatorium rotundo, sub-
purpureo caule, intus medulla alba referto exit,
duos interdum tres cubitos æquante, aliquan-
tum hirsuto: foliis longis, nigricantibus, aspe-
ris, parùm hirsutis, crenatis, ad canabina ortu &
situ adeò accedentibus, vt permulti Eupato-
rium Auicennæ canabinis foliis præditum esse
credant, amaris. In summo flores emergunt
permulti, congesti, villosi, in purpura albican-
tes, qui flaccescentes orto semine, papposi in
auras abeunt, radix latè fibras spargit, amari gu-
stus, odoris non minùs suauis quàm betonica
vel agrimonia. Locis vliginosis, scrobium mar- *Locus.*
ginibus, & in riuulis tardiùs fluentibus proue-
nit. Pseudoeupatorium calido siccoque est tem- *Temper.*
peramento: calfacit, tenuat, abstergit, incidit, *Uires*
aperit. Ex recentibus foliis contusis succus ex-
primitur, & insolatus cogitur in pastillos, quo-

rum frequens in medicamentis vsus. Confert maximè eiusdem decoctum, aut
epotus succus iocinoris doloribus, & aliis eiusdem affectibus ab obstructione or-
tis. Quare vtiliter propinatur hydropicis, cachexia, ictero, vasorum infarctu, sple-
nis tumoribus, & obstructionibus vexatis. Datur quoque succus ad ventriculi
apostemata à frigiditate nata, quibus etiam prodest herba exterius illita. Folio-
rum decoctum auxiliatur diuturnis, præsertim pituitosis febribus ab obstructio-
ne prouenientibus. Idem vrinas & menses pellit: scabiem pruritumque sanat cum
fumaria decoctum ex caprino sero: sed succus validior est, qui potus elephantiasin
incipienti medetur. Flores illiti vulnera recentia & vlcera sanant. Fugantur ve-
nenata animalia herbæ siccæ suffitu. Aiunt à venatoribus obseruatum esse cer-
uos telis vulneratos hac planta proculdubio sanari. Datur eadem vtiliter pe-
coribus tussientibus, & anhelosis equis, quorum etiam dolores finit. Succus binum
obolorum pondere in catapotis deuoratus intestinorum vermes necat. Idem re-
cense expressus illinitur commodè ex aceto & sale aduersus scabiem.

POTENTILLA, CAP. XLVI.

Nomina



SEVDOEVPATORIO seu potius Agrimonix adeò hæc affinis est, vt vulgus siluestrem agrimoniam vocet. Potentillæ huic nomen ab eximiis viribus quibus pollet, argentinx verò à foliorum argenteo splendore. Galli *Argentine*, Germani *Genferich* vocant, id est, Anserinam quòd hac herba anseres delectentur in cibo. Quidam Stephano melidem

POTENTILLA.

Forma.

Dod. lib. 1.

cap. 58.

Pena in

Ad.

Matth. in

cap. 37. lib.

Diosco.

Locus.

Tempus.

& Vires.



Plinij esse coniectantur, cap. 13. lib. 26. vtilem ex aqua sanguini fluëti per nares, sic dictam quòd coronis melinus eius flos innectatur. Potentilla viticulorum reptatu ab agrimonia discernitur, fragariæ & pentaphyllo assimilatur: teneiora hæc sunt, graciliæque in quibus folia longa, incisa & crenata, agrimonix simillima, superne virentia, auersa parte argenteo nitore splendentia, vnde argentinx nomen. Flores in singulis pediculis pentaphylli similes, lutei: radix fibrata, exterius purpurascens, inferius candicans. Nascitur locis vliginosis & propè semitas, quarum vdarum nulla amantior, frequentiorque alumna. Iunio & Iulio mensibus floret. Adstrictoria & exsiccatoria vi pollet, quare mulierum profluvia, dysenterias, & cæteras alui fluxiones cohibet. Id quod præstare dicitur, si recens in calceis nudis pedibus subponatur. Datur vtiliter potui sanguinem reicientibus. Herbx decoctum ex vino ad intestinorum tormina, & dorsi dolores potu facit. Siccæ farina ex sua ipsius stillatitia aqua pota albas vteri fluxiones sistit, sed valentius addi-

to corallo & eboris ramentis. Sunt qui ad enterocelas præferunt tum in cibis, tum in potionibus. Etenim vulnera glutinat, & vlcera sanat, præsertim pudendorum, & quæ oris partes erodunt, firmat commotos dentes, & laxas gingiuas, si in aceto decoquatur, & os sæpè colluatur. Dentium dolores mulcet, prolapsam columellam restituit addito aluminis momento. Mirum quòd plantis pedum, manuúmque volis admota, febrium quarumcunque calores remittit, ad frangendum calculum efficax est, multumque sanguinem grumosum potu dissoluit.

MARRUBIVM AQUATICVM, CAP. XLVII.

Nomina



In cap. 29.

lib. 4.

Trag. lib. 1.

cap. 2.


Dod. lib. 2.

cap. 69.

MARRUBII potius species aut Verbenæ hæc planta fuerit, quàm seditis prima, vt existimat Matthiolus, cui huius natales, folia maiora, caules cubitales, nec asperi, multaque alia refragantur. Vulgo igitur Marrubium pallustre siue aquaticum vocarunt, Gallicè *Marrube d'eau*, Germanicè *Vuasserandorn*. Quidam Rhodoram Gallicam Plinij esse volunt, cap. 19. 24. iuxta Rumbotinum viduam vite nascentem, caule geniculato, virgæ ficulneæ modo, foliis vrticæ in medio exalbidis, quæ procedente tempore tota rubent, flore argenteo, præcipuam contra tumores, feruores, collectiones cum axungia veteri tusam, ita vt ferro non attingatur, & qui perunctus est despuat ad suam dexteram ter, efficaciori quoque, vt aiunt, remedio, si tres quoque trium nationum

MARRUBIVM

Aquaticum.



nationum homines perungant dextrorsus. Plāta hæc Marrubio nigro tam caulibus & folliculis asperis, quàm foliis & floribus satis similis est. Folia quidem ex fusco viridia sunt, sed maiora profundius incisa, non admodum hirsuta, propè complicata, instar foliorum betulæ recens erumpentium: flores albi & minores Marrubiorum floribus, caulē ambientes sicut in melissa. Iuxta scrobes & riuulos nascitur, locisque aliis vliginosis. Siccandi facultate sine manifesto calore præditum esse aiunt, nondum tamen in vsum medicum receptum.

Locus.

SCABIOSA. CAP. XLVIII.



ON SINE causa herbarij plantis multis similibus facie & viribus, scabiosæ nomen indiderunt. Sed nunc de ea agimus, cuius frequentior est vñus: eius enim Græcum nomen adhuc ignoratur quamquam non desint qui Aetij Pforam esse putent. Sed cū nusquam extet

Nomina

apud eum, aut alios auctores eius descriptio, sed nomen tantum, nihil certi hac de re statui potest. Quidam Maston Plinij esse coniectantur in facie tineas auferentem. Dicta autem est scabiosa à scabro herbæ habitu, vel quòd scabiei medeatur, vnde etiam pforæ nomen traxisse videri potest. Gallicè *Scabieuse*, Germanicè *Apostenky*, aut. Matthiolus duas habet species, maiorem, & minorem. Maior primùm folia profert longa, non laciniata: quæ verò his succedunt, plu minoris modo dissecta cernuntur, quæ verò in caule & ramis, minora & magis laciniata. Caules habet æstate sesquicubitales, teretes, striatos, incanos, circa cacumen in ramos diuisos in quorum fastigiis capitula oriuntur in acutum desinētia, compartiti squamarum ordine contexta cyani ritu, è quibus flores prodeunt ferè etiam similes, sed rufescentes: sequitur semen paruum, subnigrum, lychnidis coronariæ simile. Radix est pollicari crassitudine, brachiata, sapore subdulci. Nascitur inter fruges, & in agris incultis, argilloso præsertim solo. Annotat Pena non esse hanc vulgarem Scabiosam, sed laceam nigram, maiorem, laciniatam. Minor folia circa radicem fundit in ambitu laciniata, in terram repanda & recumbentia, subalbicantia, siue cinerea, subhirsuta, in caule frequentioribus, tenuioribusque incisuris crenata. Caulem mittit rectum, tenuem, subhirsutum, in quo ramuli. Flores habet foliosos, congestos, cyani purpuram imitantes, siue cærulei coloris, qui tandem deflorescentes capitulum relinquunt subuiride, rotundis ocellis refertum, colore pavonum caudas imitante, magno sanè naturæ artificio, & magna contemplantium admiratione: Radix est palmaris, fibrata, subcādicans. In pratis humidis potissimùm & herbidis locis degit. Iunio & Iulio mensibus floret. Vtraque excalfacit, siccatur, extenuat, abstergit. Quare ad expurgādos pulmones & pectus à crassis & pituitosis excrementis, multum præstāt, cū herba ipsa in puluere pota, tum succus cū melle delinctus, tum eius decoctū diebus aliquot haustum. Valet quoq; mirum in modum aduersus scabiē, non modò eius decocto quotidie potui dato, sed & herbæ ipsius succo per se, aut vnguentis addito ad scabiosa corpora illinenda. Prodest omnibus pectoris vitiis,

Forma.

Locus.

Vires.

SCABIOSA Matthioli,
Maior.SCABIOSA Matthioli,
Minor.

ris vitiis, & respirationi inferuentibus organis : quippe quæ & eorum purulentas inflammationes disiciat, & omnia pectoris vitia expurget. Anthracibus siue carbunculis pestiferis vtiliter illinitur, adeò vt illita has letales abscessus trium horarum spatio prorsus abolere existimetur. Datur vtiliter eiusdem succus quatuor vnciarum pondere cum theriacæ drachma, pestilentia affectis prima statim die, verùm sudorem in lecto prouocare oportet, & iterum atque iterum medicamentum repetere. Idem plurimùm confert ad serpentum morsus, quemadmodùm herba ipsa contusa recensque imposita. Illitus succus cum chrysocollæ puluere & caphuræ momento, lentigines, alphas, impetigines, varos, & cætera cutis vitia abstergit : oculorum albugines tollit. Peculiariter valent huius maioris scabiosæ radices ad lichenas, etiam si à Neapolitano morbo prouenerint. Earum enim decoctum quadraginta diebus potum præstantissimum expertissimùmque est ad id mali medicamentum. Idem præstat earundem radicum puluis quotidie drachmę ponere ex fero haustus.

SVCCISA.

CAP. XLIX.

Nomina



Vo nomine veteres aut posteriores Græci plantam hanc nuncuparint, & an eam cognouerint, nondum nobis compertum est. Latino & conueniente huic herbæ nomine, quidam Succisam vocant, quòd eius radices circumrosæ sint. Vulgus Morsum diaboli vocat. Galli

Forma.

Mors de diable, Germani *Teuffells abbisz*, nomine ex superstitione indito, quasi verò Cacodæmon quidam tantæ efficacæ radicem inuideat hominibus, atque ob id vbi succreuerit, statim eam dentibus succidat atque circumrodar. Ex scabiosis videtur esse, caulibus rotundis, cubitalibus, aliquando bicubitalibus : foliis scabiosæ vulgaris, sed rigidioribus, nigrioribus, hirsutioribus in imo caule, in summo autem aliquantum serratis, non altiùs incisis vt scabiosæ : floribus item scabiosæ, sed

purpura

Penain
Ad.
Matth.in
cap.174.
lib.2.
Dodo.lib.
cap.72.

MORSVS, Diaboli.



cicatrices ad colorem reducit. Verum hoc obstat, quod suæ Niginæ tantum folia tria Plinius tribuit.

purpura fusca, tristiore aspectu: semine in auras abeunte: radice nigra, dura, breui, spissa, multas crassas fibras spargente, quare præcisa apparet qua crassiores fibræ plures coeunt, quasi præmorsa foret à quopiam cacodæmone, vnde ei morsus diaboli nomen, quamquam alij malunt sic dictam herbam à caustica vi, qua mordicat bubones & carbunculos pestilentes, quibus magno leuamento admouetur ea viridis cruda, tritaque, aut vinum in quo decocta fuerit epotum. Radix per se estur, aut eius decocti vinum vtiliter bibitur non modo ad vteri dolores, sed etiam ad pestilentem auram arcendam. Gustu admodum amara est, ex quo perspicuum est calidæ esse siccæq; facultatis scabiosæ modo. Siccata puluerem præbent plerique ad alui tineas necandas, ac eadem sugillata illitu emendant. Locis incultis prouenit, saltibus, dumetis, ac etiam in pratis & viis quibuscumque. Augusto potissimum mense floret, tum notior, alias scabiosæ tam similis, ut plerumque pro eadem accipiat. Quidam Niginam Plinij esse putant, foliis longis, intybaceis, quæ illita

Vires.

Locus.

IACEA, CAP. L.



SCABIOSIS Iacæ adeò similes sunt, ut Matthiolus has ab illis non discreuerit, quare scabiosæ Iacæ sunt subiungendæ. Iaceas autem fortè aliquis recentiorum Græcorum *ἐπὶ τῆς* vocauit, quod ianthino sint florum colore, non quòd humi iaceant, ut quidam putant, tamen illi Barbaris practicis duntaxat notæ fuisse videntur. Iacea nigra Dodonæi scabiosis similis est, sesquipedem aut pedes duos alta, foliis longis, angustis, scabiosæ maioris, aut succisæ aliquando crenatis, & in ambitu insectis: caulibus rotundis in quorum summitatibus capitula sunt rotunda, squamosa, cyanorum capitulis similia, sed maiora: ex quorum medio capillacei flores purpurei exeunt, radix crassa, breuis, incurua, fibrata. Dicitur etiam à Pena & Lobellio Iacea nigra vulgaris, Hyosiris Plinij Anguillare, Medium Dioscor. Mutono, folio seridis siluestris, flore purpureo, rotundo, semine cnici minuto, radice dodrantali, crassitudine baculi, gustu acerbo. Aliis verò scabiosæ maior, siue capitata, siue echinata, diuersa à Iacea nigra vulgari Officinarum, vbivis, frequentissima, quam Hyosirin Plinij esse volunt. In vdis pratis & herbidis locis prouenit. In Iacea subdulcis est adstrictio, siccitas efficax admodum, calor propè nullus. Recentiores nihil præstātius ad hernias inuenisse Iacea nigra narrant. Eius decoctum, si eo sæpè os colluatur, recentes oris & gutturis abscessus repellit & absomit, inueteratas ad suppurationem perducit & rumpit. Alia dicitur ab herbariis Iacea rubra maior in pratis quoq; degens, radicibus multis, nigris, longis, huc illuc dissectis: caule cubitali, recto, adnatis multis surculoso, folio longo, obscurius virente, per ambitum profundissimè dissecto, tactu aspero, leniter pungentibus iis, quæ per ambitum eminent foliorum laciniis:

Nomina


Forma
L.b.1.c.71.

Locus.

Temper.
& Vires

flore

IACEA NIGRA,
Dodonæi.



IACEA Rubra maior,
Laciniosa.



flore è puniceo purpurascēte, aspectu pulchro, in oblongis capitulis albo nigroq; reticulatim & elegantissimè distinctis, gustu amaris. Iaceā aliam nigram quidam agnoscunt, in humidis ubiq; prodeuntem, & in Officinis passim eo nomine vocatam, radice breui, lignosa, furculosa, foliis paucis, hirsutis ac ideò subasperis, intybo similibus, minoribus, capitulis paruis, in quibus flos subruber emicat, gustus valde adstringentis, eamq; hyosiridem Plinij esse arbitrantur.


ODONTITIS LVTEA.

CAP. LI.

Lib. 1. c. 134
Dod. lib. 2.
Cap. 7.

Lib. 27. c. 12
Nomina

Forma.



VAM Tragus florē cuculi, Dodonæus Vetoniam siluestrem vocat, herbarij cōsentiunt eam esse, quæ à Plinio Odontitis purpurea nominatur, de qua diximus, lib. de iis quæ flore placēt. Quæ hîc proponitur propter magnam cum illa affinitatem, Odontitis lutea à nobis nominata est à florum colore. Radice est breui, fibris capillata: caulibus multis, angulosis, geniculatis: folio polygoni, longiore, ad singula genicula gemino: flore pusillo, luteo, è stellulis herbaceis emicante. Locis humidis gaudet. Eius decocto si quis os colluat, dentium cruciatus sedatur.

EQVI

EQUISETVM,

CAP. LII.



VAE Græcis ἵππευς dicitur, Latine Equisetum, Equiseta, Equiselis, Equinalis, Officinis Cauda equina ob foliorum similitudinem. Est enim, inquit Plinius, pilus terræ equinæ setæ similis. Et, fœnifecis inuisa & equiselis est, à similitudine equinæ setæ. Arabibus *Dherben alchari*, *Dembalchil*, siue *Danebalchil*. Italis *Coda di cauallo*, & *Asperella*, Hispanis *Coda*

Nomina
Lib. 26. c. 13.
Lib. 18. c. 28

EQUISETVM. I.



EQUISETI. I.
Asparagus, Dod.



dependere comis iunceis, multis, nigris, vt est equorum cauda, geniculatis ramulis, folia habere pauca, tenuia, exigua. Semen rotundum, simile coriandro, radice lignosa. Et paulò post, faciunt & aliam hippurim breuioribus & mollioribus comis, candidioribusque. Rursus, Caucon, quæ, & ephydron, ab aliis anabasis vocata, nascitur ventoso ferè tractu, scandens arbo-rem, & ex ramis dependens, folio multo, cirris numerosa, qui sunt iunci geniculati: radice pallida. Matthiolus quatuor obseruauit genera, primum illud notius tum Dioscoridis, tum cæterorum, quod hîc pictum est. Cum primum è terra erumpit, profert culmos arundineos, iunceos, cauos, nudos, geniculatos asperos: ob id detergendæ suppellectili à mulierculis, & opificibus pectinum, fistularum, atque aliarum huiusmodi rerum ad materiam læuigandam expetitos, clauis seu capitibus in summo racemosos, recenti asparago, aut iuglandium iulo similibus, vt pictura hîc exprimit, tempore caules isti nigricant aut rubescunt, ex quorum geniculis quasi articulorum commissuris prodeunt multiplices exilium, tenerorum, geniculatorum foliorum quasi setæ asperiusculæ, prolixiores. Altiùs accrescens dependētibus comis caudam equinam satis ementitur. Radix est candida, geniculata caulium modo. Equisetum minus, Hippuris fontalis, Equisetum alterum Matthioli,

Ibid.


Genera.
Lib. 4. c. 42

Forma.**Locus.**

Lib. 26. c. 13.

Lib. 26. c. 7.

In cap. 22.
lib. 4.
Dod. lib. 1.
cap. 66.
Pena in
Ad.

*EQUISETVM Alterum
sive minus, Matthioli.**EQUISETI Minoris
flores.*

superiori haud absimile, initio caules veluti asparagos teneros edit, nudos, rotundos, cauos, geniculatos, in summo non clauatos, sed spicatos, floribus albis refertos, qui statim pereunt. Deinde ex eadem radice succrescunt ramuli aliis articulis, siue geniculis crebris intercepti, circa quæ iunceæ folia geniculata, rotunda, vt in maiore Equiseto, sed neque tam prolixa, neque tam aspera: quare & ad poliendum inepta. Radix tenera est, gracilis, nigra. Locis decliuibus, vmbrosis, humidis prouenit. Est & Hippuris minor alia, congener cum maiore Equiseto, tertium Matthioli, Equisetum iunceum vocat Tragus, quod nudo calamo, omnique folio carente instar iunci prosilit. Sub initia mensis Maij nigros fert asparagos, in quibus flos plantæ, radix nigra, lignosa, planè insipida. Quartum Equiseti genus addidit Matthiolus. Hoc videtur esse vua marina vulgaris Clusij. Ad hominis proceritatem usque fruticat spartij modo, stipite brachialis crassitudinis, oblongis ramis, nigricantibus, qui deinde multas virgulas pedales ferunt, tenues, multis geniculis distinctas Equiseti ferè modo propendentes, sine foliis, gustu admodum adstringente: florem circum internodia confertum, minutum & muscosum, flori cornus non absimilem, pallidum: deinde fructum exiguis moris similem, rubentem, succulentum, acidum, in quo vnum aut alterum granum milio ferè simile inest; foris nigrum, intus album: radix dura, lignosa. Clusio videtur Polygono quarto Plinij quadrare. Est & quintum genus, minimum, aquis cœnosis innatans, vel sub iis occultum semper, breuissimis & asperis foliis, ac caulibus, lutosum virus olentibus. Lugdunenses vocant *chara* quasi Cheredranon, quo nomine Equisetum vocari in supposititiis nomenclaturis Dioscoridis legimus, ea quæ lances escarias, & reliquam eiusmodi supellectilem abstergunt, vt & primo genere, quod vocant *Prelle*, quasi *φουδράν*. Nam & sic appellari loco proximè citato traditur. Equiseto vis spissare, inquit Dioscorides, quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in vino potum, vrinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur tritis foliis & illitis. Radix cum sua herba tussim, orthopnœam ruptaq; adiuuat,

Lib. 2. c. 46.


Lib. 4. c. 42.

Vires.

adiuuat. Foliis in aqua potis, dissectiones vesicæ & intestinorum, enterocelæq; in vnum coalescere cogique feruntur. Equisetum alterum cum aceto tritum vulneribus remedio est, & eandem vim habet. Eadem Galenus tradit. Hippuris adstringentem cum amaritudine facultatem habet, ac proinde valenter citra mordacita-

Lib. 6. sim.

EQUISETVM luncum,
Tragi.



EQUISETVM Tertium,
Matthioli.



EQUISETVM Quartum,
Matthioli.



tem exiccantem. Itaque vulnera maxima cataplasmate imposita glutinat, etiam si præfectos esse nervos contingat, præterea enterocelas glutinat. Cæterum ad sanguinis reiectionem, ad profluuium muliebrem, potissimum rubrum, ad dysenterias, & alios ventris fluxus generosum est remedium herba ipsa aut ex aqua aut ex vino pota. Sunt qui scripserunt nonnunquam etiam vel vesicæ ac tenuium intestinorum vulnera succo ipso sanata fuisse. Prodest etiam profluuium sanguinis è naribus, tum fluxui obnoxiiis in ventre affectibus ex austero vino potus, ac si febris sit, ex aqua. Plinius eadem planè quæ Dioscorides habet, sed & alia quædam. Equisetum, inquit, hippuris à Græcis dicta, lienem cursorum extinguit decocta fictili nouo ad tertias, quantum vas capiat, & per triduum heminis pota. Vis eius spissare corpora. Succus sanguinem è naribus fluentem inclusus sistit, item aluum. Medetur dysentericis in vino dulci potus cyathis tribus vrinam ciet: tussim orthopnoeam sanat: item rupta & quæ serpunt. Inte-

Lib. 26. c. 13

Ia cap. 24.
Lib. 4.

stinis & vesicæ folia bibuntur. Enterocelen cohibet, faciunt & aliam hippurim breuioribus & mollioribus comis, candidioribusque perquam vtilem ischiadicis, & vulneribus ex aceto impositam, propter sanguinem sistendum. Equiseti recentem asparagum, inquit Matthiolus, Hetrusci *Patrusalo* vocant, eduntque: prius enim elixant, farinæque conspersum oleo in sartagine frigunt, quo cibo alius adeo sistitur, ut inde colici cruciatus facile excitetur. Sunt qui eundem asparagum siccum annum asseruant, quo æstate vtuntur ad dysenterias: nam aqua calida nocte maceratum coquunt, quo modo dictum est, & in cibum magno successu exhibent.

POLYGONUM FŒMINA,

CAP. LIII.

Nomina

POLYGONUM multa sint Polygoni genera, de fœmina tantum hîc agimus, quæ Græcis *πολύγονον θήλυ*, Latine Polygonum, Sanguinaria & Sanguinalis fœmina, Gallicè *Renouee femelle*. Ac cum dictum sit Polygonum propter multas geniculorum commissuras, quasi dicas multinodiam, tamen species hæc natalibus & tota facie equisetis similior est quam Polygono

Forma.

POLYGONUM Fœmina,
Matthioli.

Locus.

Lib. 4. c. 4.

Lib. 27. c. 12

Ibidem.
Vires.



mari. Habet enim caules ternos aut quaternos, sed læuiore, glabros, neque striis asperos, rotundos, rectos, crebrius geniculatos: folia numerosa, parua, angusta, ex articulorum pyxidatis insertionibus radiatim exorientia: radicem albam, teneram, latius sparsam, de se nonnulla germina asparagosisve emittentem. Locis vdis & riuulorum ripis gaudet. Quæ prorsus sanguinariam fœminam Dioscoridis referunt, nisi quod *μονόκλωνον* esse dixit, id est, vnicaulem. Sanguinaria fœmina, inquit, frutex est paruus, vnicaulis, tener, arundini similis, densis geniculis, in sese tubarum modo fæctis: articulos in orbem cingunt apices foliolis pini similes: radicis nullus usus. Nascitur in riguis. Hoc secundum Dioscoridi genus Plinio tertium est: sic enim scribit. Tertium genus Oreon vocatur in montibus nascens, arundini teneræ simile, vno caule, densis geniculis, & in se fæctis, foliis autem piceæ, radicis superuacua, inefficacius quam superior. Quæ planè Dioscoridis sunt, nisi quod in montibus nasci ait, & oreon vocari, cum Dioscoridi in aquosis nascatur. Doctiores

apud Plinium legendum censent vreum (*ὄυραιον*) à caudæ figura, quam suo caule minutis foliis vestito perinde refert, ut & Hippuris. Polygonum fœmina, inquit Dioscorides, vim habet adstringentem, refrigerantem, quæ ad eadem valet ad quæ Polygonum mas, sed minore efficacia.



NIDUM quidam Nidum avis plantam hanc vocitant, quod eius radiculæ ita inter sese implicatae sint, ut Nidum avis constituere videantur. Caulem producit nudum, & sine vllis foliis: florem in summo spicatum. Caulis cum flore colore est fusco, orobanche haud absimilis, tenerior tamen, & tenuior, radices nihil aliud sunt quam fibræ mutuo implexæ, ut diximus. Locis vdis & siluosis profilit. Quibusdam Coagulum terræ Plinij, cap. 8. lib. 27. videtur. Tragus nonum satyrij genus facit in vliginosis & vmbrosis siluis nascens Maio mense, flore & folio viduum. Est enim nihil aliud quam pinguis & rectus asparagus, forma vulgare satyrium, colore lignum, vel fungos siluis familiares referens. Radicem habet multo capillitio contortam & implicatam: estque hoc satyrij genus vitium potius quoddam ex putrilagine enatum, quam planta censendum.

Nomina
Dodo. lib. 2. cap. 47.

Forma

Lib. 2. c. 32.

CRISTA GALLINACEA, CAP. LV.

PLINIUS alectorolophon scribit, quæ apud Romanos Crista dicitur, folia habere similia Gallinacei Cristæ, plura, caulem tenuem, semen nigrum in siliquis, quibus verbis moti herbarij nostri plantam istam ob florum congeriem multiplicis & densæ Gallinacei Cristæ modo fastigiatam, ob folia multo magis ad simplicis Cristæ figuram accedentia, alectorolophon, siue Cristam Gallinaceam, siue Galli appellarunt: Belgæ *Geel ratelen*, Germani *Geel rodel*. Caule est tenui, recto, pedali, interdum sesquipedali, in quo folia bina ex aduerso per ambitum diuisuris prorsum cristatis, sensim à medio latiore in angustius desinentia cristæ ritu: floribus in summo luteis aut candidis: semine in folliculis foliaceis, vel siliquosis teneriusculis fusco, compresso, rotundo: radice tenui, parua. Nascitur in pratis & aruis, utrobique vitiosa & inutilis. Plinius vtilem scribit esse alectorolophon tussientibus coctum cum faba fresa, melle addito, & caligini oculorum. Solidum semen coniici in oculum, nec turbare, sed in se caliginem contrahere, quod de crista galli nulli adhuc experimento compertum est. Frigidam siccamque esse Dodonæus tradit. Videtur aliis esse Mimulus herba, de qua supra. Plinius in pratis pessimam esse ut & siliquam diram fœnifecis tradit, & inuisam equisetum. Alteram Cristam Galli siue Alectorolophon fecerunt recetiores herbarij,

Lib. 27. c. 5.

Nomina
Pena in Ad.
Dod. lib. 4. cap. 57.

Forma

Locus

Vires

Lib. 4. c. 57.

Lib. 18. c. 18

CRISTA Gallinacea,
Dodonæi.



*CRISTA Galli altera, seu
phthirion.*

Trag. lib. 1.
cap. 8.
Dod. in hi
flor. aqua.

Forma.



Locus.

Temper.

& Vires

quæ & fistularia dicitur, q̄ ad fistulas & sinuo-
sa vlcera sit utilis, & Phthirion seu Pedicularis,
seu Pedicularia, ab effectu, quod pecori ac iumē-
tis, quæ in pratis vbi hæc prouenit pascuntur, pe-
diculorū copiā gignit. Gerniani *Braunrodel*, folia
parua habet crebris incisuris crispa: caules breues
tenuis, alios per terrā sparfos, alios erectos, circa
quos flores vt *Cristæ Gallinacæ*, sed minores &
rubentes: siliquæ deinde haud absimiles, parua,
in quibus semen latum & nigricans: radix tenuis
& fibrata. Nascitur in vliginosis pratis, ipsis infe-
sta. Maio ac Iunio mensibus cum flore ac valu-
lis reperitur, frigida siccaque & adstringens est
veluti superior. Creditur, inquit Dodon. fistu-
lis & sinuosis vlceribus valde prodesse, nec non
mensēs & aliundè profluentem sanguinem in
vino austero decocta potaque sistere.

*SYMPHYTVM MAGNVM,**CAP. LVI.*

Nomina



ΥΜΦΥΤΟΝ vel σύμφυτον μέγα, Latinè *Symphytum magnum*, Alum seu
Alus, *Solidago*, Officinis *Consolida maior*, Gallicè *Consyre*, *Grande Conso-*
lide, *Oreille d'asne*, Italicè *Cōsolida maggiore*, Germanicè *Vualuurtz*, *Schmeruurtz*,

Forma.

Nomen illi apud Græcos Latinósque efficax constringendi conglutinandique vis
fecit. Caules edit hirsutos, cauos, angulosos, folia aspera, borragiñis, sed maiora, lon-
giora, nigriora: flores rotundos, cauos, candidos, interdum purpureos. Quæ appo-

SYMPHYTVM Magnum,
Matthioli.

SYMPHYTVM Tuberosum,
Lobellij.



sitissimè

sitissimè Dioscoridis symphyto conueniunt: quod, inquit, caulem emittit bicubitalem aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, vt sonchi inanem, circa quem breui interuacante spatio folia exeunt angusta, buglossò proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: foliis tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. Tam caulis quàm folia aspera lanugine horrent, tactuque pruritus concitant. Radices demittuntur foris nigræ, intus candidæ, viscosæ, quarum est usus. Quæ omnes notæ nostræ maiori Consolidæ adamussim cõpetunt, dempto florum colore, qui in nostra purpurei, interdum albi conspiciuntur: sed, vt diximus, etiam quæ floribus luteis sit reperitur. Sunt & qui consolidam purpureis floribus marem appellent, eamq; efficaciorē, quæ verò albidis floribus, foeminam. A superiore non ita diuersum ortu & facie, sed speciosius, quod ex Italia delatum in Belgij hortis colitur sola tuberosa radice dissidens, floribus ex luteo pallentibus, caule item & foliis nō disparibus, vulgare Symphytum æmulantibus. Locis riguis & circa scrobes reperitur. Temperatura est secundo gradu calida siccaq; Tota folio & radice vulneraria est, buglossi gustu & mucagine, sed maiore & efficaciore ad glutinanda vulnera: vnde Cōsolida maior vocatur. Radices tritæ, inquit Dioscorides, & potæ cruentis excreationibus ruptisq; proficiunt: recentia vulnera illitu conglutinant, carnes quoque si concoquantur cogunt additæ: inflammationibus præsertim sedis cum senecionis foliis vtiliter illinuntur.

Lib. 4. ca. 9.

Locus.

Temper.

Vires.

Ibidem.

B V G L A,

CAP. LVII.



ONSOLIDAM mediam siue Symphytum & solidaginem mediam plantam hanc vocarunt medici & Chirurgi, quò ab aliis Symphytis discernatur. Vulgo Bugla & Bugula dicitur, Gallicè Bugle, quibusdam Prunella, propter effigiem & vires haud dissimiles. Est tamen

Nomina

Dod. lib. 1. cap. 88.

Pena in Aduers.

B V G L A, Siue Consolidam
media, Matthioli,



alia Consolida, Prunella dicta, cauliculis constat gracilibus, teneris, per terram reptantibus, & alicubi depactis, vnde oriuntur alij surculi quadrati, recti, hirsuti, palmum & sesquipalmum alti, quibus folia oblonga, rotunda, crassa, mollia, leuiter ferrata, auersa parte purpurea. Flores inter foliola caulem à medio ferè ad summum vsque quasi verticillatim ambiunt elegantes, & sæpius carulei, interdum niueo candore: radix fibrata, tenera. Vdis pratis & siluis prouenit. Colitur etiam in hortis: Aprili mense floret. Quidam Anonymon Plinij, cap. 4. 22. esse volun, laudatam Aristogitonij, in vulneribus præclaram, ex aqua tusam, & impositam: potam verò mammis, & præcordiis percussis: item sanguinem excreantibus, putauerunt & bibendam vulneratis. Bugla facultate sicca est, modiceq; calida. Potu sanguinis grumos in ventriculo vel alia parte concretos dissicit. Folia vel eorum succus vlceribus omnibus in ore manantibus exedentibusq;, ac etiam testium pudendorumq; viriliū & muliebrium efficacissimè illinuntur. Eius mira vis est cum fânica potionibus vulnerariis.

Locus.

Temper.

Vires.




DIOSCORIDES trium Lotorum, excepta tamen Loto arbore, mentionem facit: Satiuæ videlicet, siluestris, & Ægyptiæ: has tres Aui-cenna vno capite, videlicet 341. sub Handoco-chæ nomine complexus est. Siluestre Lotum Dioscorides caule esse ait bicubitali, & maiore, multas alas habente: folia similia Trifolij pratensis: semen veluti Fœnogræci, minus paulò, gustu medicato. Plurimum hanc in Libya nasci, idem auctor est, & Trifolium minus appellari. Huiusmodi autem siluestris Lotus hæcenus incognita latet: In vetusto autem Bibliothecæ Casareæ Codice, Loti siluestris huius imago reperitur. Depingitur autē caule recto, foliis Trifolij, & è sinu horum, pediculis flores, deinde siliquas, proferentibus, quæ tenues sunt, & quàm Fœnogræci minores, vt imago ostendit. Vim autem calfacientem & leuiter adstringentem habet: vitia cutis in facie, & ephelidas cum melle peruncta expurgat: bibitur & vtiliter per se trita, aut cum Maluæ semine, cum vino passo, aduersus vesicæ dolores.

LOTVS ÆGYPTIA Ex Cod. Casareo. CAP. LIX.

LOTVS quæ in campis Ægypti aqua inundatis prouenit, caulis est, vt Dioscorides refert, Ægyptiæ fabæ assimilis: florem habet paruum, candidum, Liliis similem: quem ferunt oriente Sole explicari, occidente verò occludi: totoq; capite sub aquis condi, & rursus oriente

LOTVS Ægyptia, Dodon.



Sole emergere, simile caput eius est Papaueris maximo calyci, in quo semen milij quantitate, quod resiccatur Ægyptij in panificium recipiunt: radicem cotoneo malo similem habet. Eadem de hac Loto Theophrastus refert paulò tamen latius hanc describēs: Florem siquidem ait candidū, Liliis angustia foliorū proximū, multos verò ac densos promiscuè exire, Sole occidente sese contrahere caputq; integere, ad ortum verò aperiri, & supra aquam assurgere: idq; facere dum caput perficiatur, florésque defluant: capitis autem magnitudinem quantum Papaueris maximi: radicem rotundā mali cotonei amplitudine, cortice nigro, quali Nux castanea tegitur, corpus verò internum candidum esse. Extat in antiquo illo Bibliothecæ Casareæ Codice, Ægyptiæ Loti icon, sed quæ non nisi folia & radicem exprimat. Folia autē depinguntur tria, lata, singula longis ac crassis pediculis insidētia, ac è radicibus exeūtia: radix verò rotunda, mali instar. Ægyptia Lotus dicitur, quod in Ægypto gignatur. Radicē huius

Corfium

Corfium appellari Theophrastus ait: Strabo autem Geographiæ, lib. 17. Corfium fructum esse tradit piperi similem. Radicem crudam & coctam edi, Dioscorides scribit: Theophrastus elixam assamq; in speciem albuminis verti memoriæ prodidit, & cibis gratam: mandi etiam crudam, sed gratiorem decoctam, seu aqua, seu pruna. Qui huius radicibus victitant Lotophagos dici, Strabo auctor est. Theophrastus autem ex Loti arboris fructu, qui dulcis ac suavis est, viuentes, Lotophagos appellat.

LOTOS AEGYPTIA Theophrasti,

CAP. LX.

ΕΤ etiam in palustrium siue aquatiliū genere herba, quæ Λωὶδὸς αἰγύπτιος Græcis dicitur, Latine Lotus Ægyptia, potest & Lotus Nilotica, & Euphratica dici, Arabicè *Handachoca*, quam Theophrastus fusiùs fortassè quàm veriùs descripsisse videtur, ea tradens quæ ab aliis audiuiſſet, non quæ vidisset. ὁ δὲ λωὶδὸς (inquit) χαλκιδίος φύεῖ) μὲν ὁ παλαιοὶ ἐν τοῖς πεδίοις, ὅταν ἡ χώρα χαλκιδυσθῇ. τέττα δὲ ἡ μὲν τέσσαρα φύσεις ὁμοία τῇ τέττα κυάμω, καὶ οἱ παλαιοὶ δεῶσάμινω παλὴν ἐλάττης καὶ λεπτότεροι. ἐπιφύεῖ) δὲ ὁμοίως ὁ λωὶδὸς τῷ τέττα κυάμω. τὸ ἀνθος αἰὶδὸς λευκόν, ἐμφερὲς τῇ στενότητι τῶν φύλλων τοῖς τῶν κέρων, πολλὰ δὲ καὶ πυκνὰ ἐπαλλήλως (sic enim legendum ex Plinio, non ἐπαλλήλως, ut vulgati codices habēt) φύεῖ). ταῦτα δὲ ὅταν μὲν ὁ ἥλιος διυλεῖται (vox διυλεῖται hic reponenda ex Plinio, quæ deest in vulgatis) συμμιύει συγκαλύπτει τὴν κωδίαν. ἅμα δὲ τῇ ἀνατολῇ διοίγει, καὶ ὑπὲρ τέττα ὕδατος γίνεῖ). τέττα ὅ ποιεῖ μέγας ἂν ἡ κωδία ἐκτελεθῇ, καὶ τὰ ἀνθη περὶ ῥυτὴν. τῆς δὲ κωδίας τὸ μέγεθος ἡλικὸν μήκωνος τῆς μεγίστης, καὶ διέξω τὰς χαλκομαῖς, τὸν αἰὶδὸν τρόπον τῇ μήκωνι: παλὴν πυκνότερος ἐν ταύταις ὁ καρπὸς. ἐστὶ ὁ παρόμοιος τῇ κέγχρω. ἐν δὲ τῷ εὐφράτῃ, τὴν κωδίαν φασὶ καὶ τὰ ἀνθη διυλεῖν καὶ ὑποκαταβαίνειν τῆς ὥρας διελκνῆς (postremam vocem addit Plinius) μέγας μέσων νυκτῶν, καὶ τῷ βάθῃ πόρρω: ὅδε καὶ χαθιέντα τὴν χεῖρα λαβεῖν εἶναι. μετὰ δὲ ταῦτα ὅταν ὄρθος ᾖ, πάλιν ἐπανιέναι, καὶ πρὸς ἡμέραν ἔτι μᾶλλον ἅμα τῷ ἡλίῳ φανερὰν ὑπὲρ τέττα ὕδατος, καὶ ἀνοίγειν τὸ ἀνθος. ἀνοιχθέντος δὲ ἔτι ἀναβαίνειν. συχρὸν ὅ δὲ ὑπεραῖρον εἶναι τὸ ὕδωρ. τὰς δὲ κωδίας ταύτας οἱ αἰγύπτιοι σωθέντες εἰς τὸ αἰὶδὸν, σύπασιν. ἐπὶ ὅ σαπὴν κέλυφος, ἐν τῷ ποταμῷ κλύζοντες, ἐξάρασι τὸν καρπὸν. ξηράναντες δὲ καὶ ὀπλήσαντες ἄριστος ποιεῖσι. καὶ τέττω χρεῶν) σιίῳ. ἡ δὲ ῥίζα τέττω λωὶδὸς χαλκιδί) μὲν κόρσιον. ἐστὶ ὁ σροχύλη, ὁ μέγεθος ἡλικὸν μήκωνος κυδωνιον. φλοιὸς δὲ περὶ φύεῖ) περὶ αἰὶδὸν μέγας, ἐμφερὲς τῷ χαρσανικῷ καρπῷ. τὸ δὲ εἶδος λευκόν. ἐφόρμον δὲ καὶ ὀπλόμνον γίνεῖ) λεκιθῶδες. ἡ δὲ δὲ ἐν τῇ ποροσφορᾷ ἐσθιέ) δὲ καὶ ὠμὸν. ἀρήτη δὲ ἐν τοῖς ὕδασι ἐφθῇ, καὶ ὀπλὴν ἐπ' ἀνθρακία. Nam sic legendum ex Plinio, non ut corruptè legitur in excusis, ἀρήτη δὲ ἐν τοῖς ὕδασι αἰὶδὸν ὠμὸν. Totum hunc locum sic transtulit Plinius. Est autem eodem nomine herba, & in Ægypto caulis in palustriū genere. Recedētib; enim aquis Nili riguis provenit: similis fabæ (Ægyptiæ suba.) caule, foliisq; densa congerie stipatis, brevioribus tamen gracilioribusq;: cui fructus in capite Papaveri similis, incisuris omniq; alio modo, intus grana ceu milium. Incolæ capita in acerbis putrefaciunt, mox separant lauando, & siccata tundunt, eoque panē vtuntur. Mirum est quod præter hæc traditur: Sole occidente papauera ea comprimī, & integri foliis, ad ortum autem aperiri donec matureſcāt, flōsque qui est candidus decidat. Hoc amplius in Euphrate tradunt, & scapum ipsum & florem vespera mergi vsque in medias noctes, totūque abire in altum, ut ne demissa quidem manu possint inueniri. Verti deinde paulatimq; subrigi, & ad exortum solis emergere, ut planè ab aqua absit altè. Radicem Lotos hæc habet mali cotonei magnitudine, opertā nigro cortice, qualis & castaneas tegit. Interius candidum corpus, gratum cibis, sed crudo gratius decoctum siue aqua, siue pruna. Plinius rursus de eadem Loto, sed satiua locutus fuisse videtur, Lotometram vocās, si tamen vox hæc rectè legatur, Nam Loton hemeron, siue Loton hemeram legendum esse suspicatur Cornarius, idest, satiavam Loton. Est & Lotometra quæ fit ex Loto

Nomina

Lib. 4. hist. cap. 10.

Forma.

Lib. 13. c. 17.

Li. 22. ca. 22.

Embl. 97. lib. 4.

ex Loto sata, ex cuius semine simili milio fiunt panes in Ægypto à pastoribus, maximè aqua vel lacte subacto. Quidam tamen apud Plinium sic legunt. Est & Lotus siluestris foliis satiuæ, & Ægyptia, ex cuius semine, &c. Ex eodem Theophrasto Dioscorides quoque sua exscripsit. Est & in Ægypto Lotus quæ in campis flumine inundatis prouenit, caule fabæ: flore paruo, candido, lilio simili, quem tradunt occidēte sole comprimi occludiq; ad ortum autem aperiri: adduntq; caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana ceu milij, quæ Ægyptij exsiccant, & in panes cogunt. Radicem Lotos hæc habet mali cotonei similitudine, quæ cruda cocta q; manditur: decoctaque lutei oui qualitatem exhibet. Loton hanc & alias à Dioscoride traditas Loti species Serapio sua lingua Haudachocham sine discrimine nuncupat, ex cuius semine oleum exprimitur Mauritanis ad articulorum dolores expetitur. Neque fit haudachochæ oleum ex trifolij vulgaris semine, vt quidam non sine errore existimant, sed ex omnium Lotorum semine, & ex trifolio asphaltite tantum. Galenus nihil aliud de Loto dixit, quam quod ex semine ipsius panes fiunt.

BARBA HIRCI,


CAP. LXI.

Nomina



ΠΑΓΟΠΩΓΩΝ & κόμη, Latinè Hirci barba & Come, Italicè *Barba di becco*, Gallicè *Barbe de bouc*, Germanicè *Bocksbart*, & *Gamhbbrott*. Herba est, inquit Dioscorides, breui caule, foliis croci, radice longa, dulci, magno super caulem calice, è cuius summo semen nigrum dependet, vnde nomen inditum est. Herba esui apta est. Theophrastus de oleribus scribens eadem tradit. ἐν οἷς ἡ τραγοπώγωνα χαλῶσιν, ὃ τὴν ῥίζαν ἔχει μακρὰν καὶ γλυκείαν, τὰ δὲ φύλλα τῷ κρόκῳ ὅμοια, πλὴν μακρότερα, τὸν καυλὸν δὲ βραχύνει ὅτι τὴν κάλυχα μεγάλην. Ἐξ ἀκρᾶς μέγαν τὸν παγίον ὠόλιον, ἀφ' ἧς χαλῶται τραγοπώγων. Idest, in quibus est quam Hirci barbam vocant, cui radix longa & dulcis, folia croco similia, nisi quod longiora, caulis breuis, super quem calyx amplus, de cuius summo vertice Barba proluxa incana dependet, vnde nomen accepit. Similiter à Plinio inter vulgarium in cibis herbarum nomina recensetur. Idem ex Theophrasto transcripsit hæc. Est & Tragopogon, quem alij Comen vocant, caule paruo, foliis croci, radice longa, dulci, super caulem calice lato, nigro. Hic depicta planta, caule est rotundo, recto, geniculato, foliis vestita longis, angustis, allio haud absimilibus, flore aureo, rostro porcino simili, sed maiore, qui calice continetur. Is fere no cælo fatiscit, nubilofo verò contrahitur, occluditurque calice echini chamæleonis more. Dilapso flore in ipso calice semen prouenit longum, in summo villosum, quo maturo aperitur, & in globum villosum vertitur, veluti in rostro porcino, qui in auras euanescit. Radix est dulcis, digitū longa. Alterū Tragopogoni genus habet Matthiolus, quod à foliorū colore purpureū vocat. Foliis est alteri similibus, sed à radice numerosioribus, viridioribus, latioribus, firmioribusque: caule quoque simili, geniculato,

BARBA Hirci, Tragopogon, Matthioli.



Li.2. c.137.

Forma.

Lib.7. hist.

cap.7.

Lib.21. c.15.

Li.27. ca.13.


Dod. lib.2.

ca.17.

Matth. in

ca.137. li.2.

TRAGOPOGON *Alterum,*
Matth. siue Barba Hirci.



culato, conspicuis propè genicula alis, è quibus ramuli prodeunt. Flores edit in cacumine purpureos, sed minores, radiantibus circūquaque calicis apicibus, stellæ ferè modo: radice est longiore, grandiore, duriore, & lacteo succo repleta, non dulci ut in altera, sed adstringente & amariuscule. Prius genus in pratis humidis calidarum & frigidarum regionum reperitur, feritur etiam in hortis. Maio & Iunio mensibus floret. Humiditate caliditateque temperata est. Glutinat recentia vulnera si foliorum succus, vel stillatitia eius aqua splenis aut attritis linteolis superponatur. Tragopogoni similis est Italorum Salsifica, quam peculiari nomine quidam Gerontopogona vocant, quasi Barbam senis, ut à Tragopogone distinguat. Radix, foliū, caulis Tragopogona referūt, flos dissidet, non colore tantum, qui ex cœruleo subnigricat, ac minimè aureo colore fulget, ut in Tragopogone, sed etiam quod breuior est, ac in se magis contractus, nec arescens tam prolixos villos explicat. Radix gustu dulcis & iucunda frequenter hyeme estur in acetariis. Caterum in hortis altis crescit pastinato solo, altiùsque subacto, radice longa, crassitie digiti, in profundum subeunte: foliis croci, latiusculis, glabris & læuigatis, virentibus, intercurrente media costa, niuei candoris, caule recto, tereti, nodoso, calice grandi, flore purpureo, apicibus multis luteo colore micantibus, barbulis pensilibus & canis, in

GERONTOPOGON
siue Salsifica Italorum.



TRAGOPOGON
Spicatus.



auras euanescentibus: semine oblongo, summa parte villoso. Herba tota cum capitur lacte manat. Ad hoc genus pertinet herba quam hic ostendimus, & nomine Herbariis familiari Tragopogona non spicatum vocamus: radice, foliis, caule geniculato, similis est reliquis generibus, nisi quod gracilior caulis est, radix tenuior, folium angustius, flos autem luteus figura maximè discrepat, ut qui spicatum coaceruatus sit, cum in alio genere flos aureus ac multiplex Helenij modo explicetur ac distendatur.

BARBA CAPRÆ,

CAP. LXII.

Dod. lib. 1.
cap. 29.
Pen. in Ad.
Nomina

Forma.

Locus.



PIGAMVM, Dodon.

Nomina
Dod. lib. 1.
cap. 29.

Forma.

Locus.

Vires.



VM vetustum huius herbae nomen hactenus ignotum sit, recentiores herbarij interim Barbam caprinam, & Reginam prae nuncuparunt, propter ramulos florum densa cogerie vestitos, in praelongas barbulas effigatos, aruncos caprarum imitantes. Gallis *Barbe de Chieure*, Germanis *Roynette* dicitur. Caulis est angulosus, cauus, rubescens, cubitalis, aliquando multò maior, ita ut ad hominis proceritatem attingat: folia castaneæ, aut corallo similia, serrata, dura, aspera, & superficie rugata: flores in summo caule candidi, racemosi, longi, visu & odoratu periucundi, instar Barbae canae dependentes, deinde parua semina tortuosa, terna, quaternave simul, instar verruculae: radix longa, foris nigra, intus purpurascens, acri odore, gustu adstringente glandium modo. In pratis vdis, umbrosis, & inter sepes nascitur. Siccatur admodum & constringit. Quidam Melandrium esse Plinij suspicantur.

PIGAMVM, CAP. LXIII.



FFICINAE Pigamum herbam hanc vocant, nonnulli (inquit Dodonæus) Rhabarbarum spurium ob ruborem. Idem in Purg. Historia Thaliætrū magnū. Folia ei sunt multū incisa, & in alia foliola diuisa, antèrius duabus incisuris denticulata: caulis quadratus, rubescens, cubitalis, & sesquicubitalis, in quo flosculi villosi, coaceruati, Barbam canam referentes: deinde folliculi parui, veluti siliquæ paruae, quaternæ quinquæve, in quibus semen teres: radix lutea, multum fibrata, latèque serpens. In pratis vdis & riguis oritur. Pigamum siccatur, sed non tam adstringit quàm Barba capræ. Docti quidam scribunt Pigami odorem epilepticis perutilem esse, & si in nares immissum aliquandiu retineant, statim à paroxysmo liberari.

HYPE



NON natales, sed foliorum similitudo pigamo plantam hanc coniunxerunt, quam Dodonæus fortè Hypecomum Dioscoridis esse scribit, in Purgant. Historia Thaliétrū paruum facit, Cordus Thaliétrum tenuifolium. Odore est ingrato & viroso, colore & foliis quadamtenus rutæ similis: tres quatuorve cauliculos tenues & graciles edit, palmum altos, in quibus folia pigamo similia, sed minora. Flores in caulium vertice nihil aliud sunt quàm villi seu pili congesti, tenues & visciidi, Barbulæ instar dependentes, deinde siliquulæ in quibus semen: radix longa hac illac furculos diffundens. In aruis nascitur. Hypecomum Dioscoridis ex tertio ordine est refrigerantium teste Galeno: nam natura ei eadem quæ papaveri.

Lib. 1. c. 29.
Forma.

Gale. lib. 8.
simpl.
Vires.
Diosc. li. 4.
cap. 63.

VLMARIA,

CAP. LXV.



HÆC quoque reecntiorū est herba, à foliis Vlmo similibus dicta, potentillam maiorem vocat Anguillara: radice crassa, nigricante fibris multis capillata: caule virgato, subrubente, cubito altiore: foliis Vlmi, supernè virentibus, infernè canis, septenis in singulis pediculis, cucumerem aut Pimpinellam redolentibus, gustu lento & subastringente: flore candido racemoso: semine copioso, exiguo, spiris intorto conuolutis, vermiculis simili. Pratis locisq; vdis & riguis gaudet. Ex sapore perspicuum est hanc refrigerare, siccare, adstringēdo repellere. Quare ad sanguinis eruptiones, alui profluvia, menses albos fœminarum non abs re commēdant.

Nomina

Forma.

Locus.
Vires.

BRITANICA, CAP. LXVI.



LIVS quæ Græcis *Βρῆλαν*, Latinis etiā Britanica nominatur, brevis est apud Dioscoridem historia. Folia habet, in-

Nomina

Lib. 4. c. 2.
Forma.

Lib. 25. c. 3.

quit, silvestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu adstringentia: radicem tenuem & breuem: caulem paruum emittit. De eadem hæc Plinius. In Germania trans Rhenum castris à Germanico Cæsare promotis, maritimo tractu, fons erat aquæ dulcis solus, quæ pota intra biennium dentes deciderent, compagésque in genibus soluerentur. Stomacacen medici vocabant, & Sceletyrben ea mala. Reperta auxilio est herba, quæ vocatur Britanica, non neruis modo & oris malis salutaris, sed contra anginas quoque & serpentes. Folia habet oblonga, nigra, radicem nigram. Succus eius exprimitur & ex radice. Florem Vibones

Ca. 2. lib. 4.

vocant, qui collectus priusquam tonitrua audiantur, & deuoratus securos in totum reddit. Frisij, quâ castra erant nostris demonstrauere illam, mirorq; nominis causam, nisi fortè confines Oceano Britannia velut propinqua dicauere. Non enim inde appellatam eam, quoniam ibi plurima nasceretur, certum est, etiamnum Britannia libera. Britanica Officinis & herbariis multis ignota est: quamquam non desint qui eam esse putant, quam vulgus Bistortam appellat, quos facile refellit Matthiolus, quod bistortæ folia nigra non sunt, neque pilosa, imò leuia, superne rufescentia, & à terra quadamtenus cæsia: item quod Britanica radix tenuis sit & brevis, bistortæ verò crassa, serpentis iacentis modo contracta & intorta. A Dalechampio verò Britanica vera censetur ea esse, quæ hîc picta est, radice gracili, fibrata, prætenuibus villis in vicina reptante, nigrescente: caulibus pedalibus, multis, nodosis: foliis oblongis, angustis, hirsutis, præsertim infernè quâ terram spectant, minimè crenatis, lapathum siluestri in aquosis & cœnosis gigni solito valde similibus, nigrioribus, quod inuenta Britanica iudicatu facile est: nam in propinquo ferè semper lapathum siluestre occurrit, cum quo illius folia compares. Flos in summis caulibus aureus, calendulae similis, in pappos abit. In humidis & riguis nascitur, solo tamen non admodum pingui. Sapor austerus huic & subamarus. Austera qualitate adstringit, & fluxiones sistit, amariuscule tergit vlceres, & ad cicatricem perducit, maximè quæ in humidis sunt corporis partibus, vt tonsillis & faucibus. Nam vtraque desiccatur. Hæc sane consentiunt viribus quæ illi à Dioscoride & Galeno sunt tributæ. Vim habet adstringentem, inquit ille, priuatim depascentibus oris & tonsillarum vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua ad quæ adstrictione opus est. Hîc verò, Britanica folia adstringentia sunt, & vulnerum glutinatoria, similia foliis siluestrium lapathorum, nisi quod atriora sunt, magisque hirta. Sed

BRITANICA Vera,
Dalechamp.



Locus.
Vires.

Lib. 4. ca. 2.
Li. 6. simpl.

& expressus ex illis succus perinde adstringere potest. Itaque coctum quidam reponunt tanquam inter stomatica medicamenta efficacissimum. Videtur enim sanare iam etiam putrescentia. Dalechampus hanc Britanicam veram esse ex notis & viribus consentientibus, ac magis inde iudicauit, quod in vetustissimo Dioscoridis fragmento in membranis manuscripto hanc Britannicæ figuram pictam reperit, licet rudiùs, quæ floris specie, colore luteo, & foliorum figura, hanc nostram designaret. Dodonæus suam Cocleariam Britanicam esse vult, ac vtilem esse inquit, putridis ac sordidis, oris vlceribus, quæ Plinius stomacen, Marcellus oscedinem, Holandi & Phrisij Souerbuyck vocant.

TRIBULVS AQUATICVS,

CAP. LXVII.

Nomina



ΤΡΙΒΟΛΟΣ ἑνυδρος Græcè, Latinè Tribulus aquaticus, siue aquaticus, & Tribulus lacustris, Officinis Tribulus marinus. Gallicè Chardon aquatic, Macres, Chastaigne d'eau, & Treffle d'eau, Hispanicè Abroyos, & Abrollhos, Germanicè Vuassernusz. Tribuli genus aquis familiare, inquit Dioscorides, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos cõdens: foliis latis,

TRIBVLVS Aquaticus.



latis, & pediculo longo, caule parte summa *Forma.*
quàm ima crassiori: adfunt ei & capillamenta
quædam spicacea: semen durum ab altero Tri- *Li. 21. c. 16.*
bulo non abhorrens, Plinius, Tribulus non
nisi in palustribus nascitur, dira res alicubi, iuxta
Nilum & Strymonem amnes excipitur in ci-
bis, inclinatus in vadum, folio ad effigiem vl-
mi, pediculo longo. Hunc herbarij omnes sic
depingunt. Caules habet longos, inferiore &
ea quæ sub aquis est parte graciliores adhæ-
rentibus quibusdam locis tenuibus fibris, ve-
luti capillamentis, præsertim infimæ parti,
quibus in fundo figitur, iuxta aquæ superfi-
ciem crassiores & foliosos. Folia pediculis lon-
gis crassis insident, lata, populneis aut vlmeis
similia, semirotunda, crassa, aduersa parte ma-
culosa neruosaq; , serrata, inter quæ flosculi
exeunt, deinde fructus nigricantes, castaneæ
magnitudine triquetri, ternis aut quaternis
mucronibus armati, vnde illi nomen: cortice
membranoso, nucleis intus candidis, castaneæ
sapore, quibus recentibus plebecula lubens ve-

scitur, castaneasq; aquaticas vocat, & arefactos, molaq; attritos in panes cogit. Sunt
etiam qui eisdem fructus sub cineribus assatos pro bellariis edant. In Plinii codice
ex vetustorum exemplarium fide quidam legunt: Tribulus non nisi in palustribus
nascitur: dira res alicubi. Iuxta Nilum & Strymonem amnes recipitur in cibos.
Inclinatur in vadum, &c. Adnotandum & insuper, Dioscoridem scripsisse hanc
plantam esse lato folio, non vlmi, vt Plinius *ωλεάς* legisse videatur, pro *ωλεέτας*. *Locus.*
In fossis, & pigris fluentis, & lutosi lacubus reperitur, aliquando in stagnantibus, *Vires.*
puris & fontanis aquis, & plerisq; Italiæ fluminibus, atque etiam in mari. Vis ei re-
frigerans & inspissans.

LICHEN,

CAP. LXVIII.



LEPATICAM hodie vocant quæ Græcis λήχην & βρύον dicitur, Latine
Lichen, Arabicè Azez, *Alsachel*, Gallis *Hepatique*, Germanis *Brunnen-*
lechekraut. Lichen quidem ea dicitur, q̃ Lichenas serpentis morbi ge-
nus imposita sistat & sanet, Bryon quòd petris adhæreat, vt muscus.

Paucis his verbis hanc plantam perstrinxit Dioscorides. Lichen qui saxi est fami- *Li. b. 4. c. 48.*
liaris, aliquibus Bryon appellatur Asperginosis petris adhæret vt muscus. Plinius *Forma.*
duo Lichenis prodidit genera: sed de Dioscoridis Lichene tantum hîc agimus. Est *Li. 26. ca. 4.*
aliud genus Lichenis, inquit, petris tantum adhærens vt muscus, qui & ipse illini-
tur. Lichen seu hepatica nostra vel per humum spargitur, vel parietibus aquarum
aspergine madidis insternitur. Folia habet alia aliis incumbentia, supernè viridia,
infernè fusca, subpinguia, propè radicem angusta, in latum se pandentia, triplici
vel quadruplici lacinia interfecta. E radice inter folia prodeunt pediculi, siue cau-
liculi tenues, quorum verticibus insunt capitula stellarum effigie. Radices nihil
aliud sunt quàm fibræ & capillamenta sub foliis quibus in terram, & in saxa defi-
gitur, quibus succum felicit fugitq; . Rorulentis & vmbrosis prouenit locis, nudis *Locus.*
petris adhærens musci modo. Iunio & Iulio mensibus stellulas suas edit. Duas alias *Tempus.*



Li. 4. ca. 49
Vires.

Hepaticas, siue Lichenas minores ex Lobellio hîc proponimus. Lichen illitus sanguinis profluuia sistit, auctore Dioscoride : inflammationes arcet, Lichenibus siue impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos cum melle illitus : oris & linguæ defluxiones inhibet. Sic enim Græca conuertenda. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὰς ἐκτερεκὰς μετὰ μέλιτος διαχειρόμενον : τὸμαλος δὲ καὶ τῆς γλώττης ῥευματισμὸς παρασείται. Quæ Cornario suspecta videntur, imo potius corrupta. Cùm enim Plinius videatur Dioscoridis verba transtulisse. Hic & sanguinem sistit vulneribus instillatus, & collectiones illitus. Morbum quoque regium cum melle sanatore illito & lingua, videtur legisse in Dioscoride, ὠφελεῖ καὶ τὰς ἐκτερεκὰς μετὰ μέλιτος, διαχειρομένης τῆς τὸμαλος, καὶ τῆς γλώττης. Id est, Prodest & regio morbo correptis, si cum melle oblinantur ex ipso os & lingua, vt vox ῥευματισμὸς ascititia sit, & παρασείται ex

Li. 7. simpl.

præcedente versu repetita. Sed de eiusdem viribus paulò aliter Galenus. Lichen qui in petris nascitur, est veluti muscus quidam, sed rectè ex plantarum genere censerî potest. Sic autem nominatus videtur, quòd Lichenas seu impetigines curet. Extergentem ac modicè refrigerantem facultatem habet, vtramque verò, abstergentem quidem atque resiccantem à petra obtinet, refrigerantem verò ab humore aqueo : nascitur enim in humidis & grauiter olentibus faxis. Porro quòd ex talibus substantiis componitur, aduersum esse inflammationi, nihil mirum est. Cæterùm an sanguinis profluuia sistat, vt refert Dioscorides, id neuticam dicere queo.

GRAT.



ECENTIORVM Gratiola, quo nomine apud veteres appellaretur, adhuc incertum est. Vocatur etiam nunc Gratia Dei, Gallicè *Grace de Dieu*, Italicè *Stanca cauallo*, quod equi eius pabulo mirè defatigentur, Papauer spumeum Dioscoridis Anguillaræ. Herba est humilis dodrantalem altitudinem vix excedens: caulibus quadrangularibus, foliis hyssopi, latioribus & longioribus. Florem fert in purpura albicantem, inter folia erumpentem quæ caulem ambiunt: radix summo spargitur cespitate. Tota herba amari & ingratisimi gustus, quadamtenus adstringens. Tam recens quàm sicca sumpta vim habet vehementer purgandi, tam supernè, quàm infernè, bilem pituitamque trahit. Vulneribus celeriter medetur trita & imposita. Nascitur in locis humidis, præcipuè in pratis vliginosis.

Nomina
Dod. lib. 2.
cap. 42.
Matth. in
ca. 26. lib. 3.

Forma.

Vires.

Locus.

SCROPHULARIA Maior, Matth.

CAP. LXX.



RADICE strumosa & effectu Scrophularia maior dicitur, & Millemorbia, Castrangula, ferraria, ficaria, Gallis *Grande Scrofulaire*, Germanis *Braunwurtz*. Galeopsis fuchsi, Cordi & Dodonæi. Caulem emittit quadratum, nigricantem, cauum: folia longiuscula, lata, in ambitu crenata, betonicae similia: flores in caulium verticibus tenues, purpurascens, cauos: semen minutum in globulis: radicem magnam, albam, solidam, tuberculis seu strumis asperam. In scrobium marginibus, in riguis & vliginosis locis nascitur, aliquando in siluis & nemoribus vdis, vmbrosis, montosis. Vlceribus strumosis, cauernosis, carcinomatis atque depascentibus summo perè utilis. Præterea tuberculis ab humore frigido concretis, aut scirris carcinomata minantibus opitulatur. Strumas & hæmorrhoidas sanat. Radix Autumno effoditur, purgata tunditur cum recenti butyro, operculatoq; fictili in vliginoso loco reponitur, relinquiturq; quindecim dies. Deinde lento igne butyrum id liquefit, & percolatum asseruatur, quo supradicti morbi utilissimè illinuntur. Quidam herbam Chrysippeam Plinij esse putant quæ cum ficis strumis medetur. Scrophularia minor supra descripta est, cap. 33.

Nomina

Forma.

Locus.

Pena in
Aduers.
Vires.

Nomina



VAE Græcè dicitur *ἐρινός*, Latinè etiam Erinus, Plinio Erineos, sic dicta ob lacteum succum quo plurimo turget. Est enim Erinus siue Erineos Latinè Caprificus, ficus precox lacte turgens primo aut exacto iam vere, quam secutus gentilitatem Plinius proximè caprificum de ea subiunxit, quæ mox dicemus. Sunt qui Ocimum aquaticum vocant, Gallicè *Basilic d'eau*. Galenus non Erinum, sed Echinum vocat, & ita de ea scribit, vt non de alia quàm de Erino Dioscoridis egisse videatur. Erinus, inquit Dioscorides, nascitur apud fontes & fluuios, foliis ocimi, sed minoribus, parte summa diuisis, surculis quinis, senisve dodratalibus: flore candido, semine nigro & acerbo: folia & caules lacteo succo turgent. Quæ tamen postrema aliter in vulgatis codicibus Græcis leguntur. *ὅπερ ὁ μετὰ τὸ ἐστὶ ὁ κρυλὸς, ἔ τὰ πᾶσι λα*, idest, caulis & folia succo referta sunt. Sed priorem lectionem magis probandam esse declarant, tum nominis etymum à nobis iam redditum, tum Plinius, qui de Erino partim ex Diocle, partim ex Nicandro, partim ex Dioscoride hæc transcripsit. Herba quam Græci Erineon vocant, reddenda est in hoc loco propter gentilitatem. Palmum alta est, cauliculis quinis ferè, ocimi similitudine: flos candidus, semen nigrum, paruum. Tritum cum melle Attico oculorū epiphoris medetur: manat lacte multo & dulci, quæ postrema verba minimè apud Dioscoridem leguntur. Herba utilis aurium dolori nitri exiguo addito: folia resistunt venenis. Quæ vulgarium Plinij codicum lectio est, veteris autem melior, & magis cum Dioscoride consentiens. Tritum cum melle Attico oculorum epiphoris medetur, duabus drachmis cum cyathis mellis Attici quatuor. Cumulatum decerpta manat lacte multo & dulci: herba perquam utilis aurium dolore, &c. Pro Erino plantam cuius effigies hic expressa est representauit Matthiolus. Dalechampius aliam exhibet, quam prope Lugdunum collegit in riuo subterfluente extremos suburbium versus pontis fornices, quo Rhodanus

Li. 6. simpl.

Locus.

Lib. 4. c. 27.

Forma.

Lib. 23. c. 7.

Ca. 27. li. 4.

Dioscor. 4. edit.

ERINVS, Matthioli.



ERINVS, Dalechampij.



iungitur

iungitur, radice in multas fibras diuisa, caulibus multis, palmum altis, angulosis, furculosis, cum franguntur lacte manantibus, gustu valde acerbis, cana lanugine prope verticem obductis: foliis ocimi, minoribus tamen quam in primo genere, quod ocimum citratum Serapio vocat, in ambitu minimè incisis, nec crenatis, iuxta caulium fastigia *ἐκ τῶν ἀνωθεν μερῶν ἐπεχειομένη*, inquit Dioscorides, in longum & angustum veluti fissis penè instar pinastri. Semen Erini, auctore Dioscoride, drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat. Similiter Galenus echini herbæ semen acerbum esse ait, ac proinde repellentis ac exsiccatoriæ facultatis esse: eoque vtendum ad oculorum & aurium fluxiones.

Lib. 4. c. 27.
Vires.

Li. 6. simpl.

PIMPINELLA, CAP. LXXII.



ETERIBVS indictæ existimantur Pimpinellæ nominatæ à recentioribus, & Bipinellæ, à foliorum binis ordinibus pennatim siue plumatim digestis: Vocantur etiam Bipenulæ & Pampinellæ. Duo notantur eius genera: maior, quæ & Sanguisorba maior, siue siluestris, Gallicè *Pimpinelle sauvage*: minor, quæ & Sanguisorba minor, Solbastrella, & hortensis, *Pimpinelle cultiuee*. Alij contra hortensem maiorem cultu fieri arbitrantur. Illa caulibus est longis, rotundis, duos trèsve pedes altis, in quibus folia longiuscula, crenata, in pediculis longis ex aduerso sita, alarum modo expansa: in summis caulibus capitula sunt rotunda, ex quibus flosculi ex fusco rubescentes, deinde semen triangulare: radix longa, crassa. Herbidis & montosis lubens oritur, pratis etiā & pascuis. Pimpinella minor, siue hortensis superiori prorsus similis est, nisi quòd omnibus suis partibus minor, & gratiore tum sapore, tum odore. Cauliculi eius sunt teneri & molles, pedem alti, aut paulò altiores, rubelli, teneriuscula lanugine villosi: folia superiori similia, multò minora, auersa parte quadamtenus cærulea,

Nomina

Genera.

Forma.

Dod. lib. 1.
cap. 24.

Locus.

Forma.

PIMPINELLA, Siue Sanguisorba maior, Matth.



PIMPINELLA Minor, Matthioli.



PIMPINELLA, Sive
Sanguisorba maior, *Fuchsj.*

Locus.
Vires &
Temper.



adversa viridia: flores non fusci sed purpurei, luteis capillamentis ex medio dependentibus: radix item similis, sed multò minor. In hortis provenit. Pimpinella tertio gradu siccatur, secundo refrigeratur, adstringiturque. Eius decoctum dysenteriam sanat, muliebri profluviū & quolibet sanguinis & alui fluxus cohibet, biliosas vomitiones reprimat. Idem præstat herbarum & seminum pulvis in aqua chalybata potus. Herba ipsa vulneribus & ulceribus medetur, misceturque unguentis quæ tum ad capitis vulnera, tum carcinomata parantur. Sunt qui contagiosis pestilentibusque febribus maxime commendent, ut cuius succo abigantur huiusmodi febres. Vino mersa gratiam conciliat sapore & odore aromatico & vinoso, quodammodo melonis, nec minus in acetariis expetita, utilissima visceribus, hepati, cordi, & præsertim spiritibus. E Pimpinellæ radicibus grana quædam colligi notum est, tingendis rubro colore sericeis vestibus exquisitissima.

GALIVM,

CAP. LXXIII.

Nomina
Lib. 4. c. 91.
Ibidem.
Forma.



RAECI γάλιον, Latini similiter Galium vocant, Galli *Petit muguet*, Germani *Vualstao*. Dicitur autem teste Dioscoride γάλιον, ἀπὸ τῆς γάλας πηγνύειν ἀντὶ πύλας αἵματος, idest, quod in coagulando lacte coaguli vicem impleat. Ramulum foliumque habet, eodem auctore, Aparine simil-

GALIVM Luteum, *Matth.*

Mollugo, *Galium album* quorundam.



limum

limum, rectum, florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Nascitur in palustribus. Quæ omnia huic nostræ plantæ conueniunt, cauliculos enim profert tenues, rotundos, læues, circa quos folia angusta, stellatim disposita. Denique aparine simile est, minus tamen & teneriusculum, nec vlllo modo asperum, at vbique læue, & odore suaui: flores in summis caulibus racemosi: radix tenera & fibrata. Huius altera reperitur differentia, floribus candidis, ob id Galium album nuncupata, quibusdam Mollugo vulgatio Herbariorum, caulibus multis, angulosis, geniculatis, viticulosis, cubitum & sesquicubitum longis, humi sparsis, in quibus folia læuia, & Maio mense flosculi candidi, copiosi, Aparines minores: radix lignosior, fibrata cinerea. Huic Galio albo tota sui parte similis est altera

Locus.

Pet. Penā
in Ad.

*MOLLUGO vulgatio
herbariorum.*



*MOLLUGO Altera montana,
Dodonæi.*



Mollugo montana Dodonæi, præterquàm complurium florum exilium speciosa fœtura, in caule cubitali & bicubitali surrecto, folia molliora. Radix nigricat. In collibus incultis, asperis & montosis nascuntur. Flos, inquit Dioscorides, igni ambustis illinitur, & sanguinis profluvia sistit. Cerato rosaceo galium admiscetur, insolatum vsque dum albescat, & sic lassitudines reficit, radix venerem concitat. Galenus, Galium nomen inde sortitum est, quòd lac coagulet. Simile autem est aparine, facultatem obtinens exsiccatoriam & subacrem: flos eius sanguinis profluuiis competere videtur, & combustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

Lib. 4. c. 92.
Vires.

Lib. 6. sim.

Nomina

Dod. c. 36.

lib. 5.

Forma.

Locus.

Vires.

Lib. 5. c. 22,
cap. 276.

Forma.

Vires.



RAPHANVS siue radícula palustris, Gallicè *Reifort d'eau*, hortensi Raphano foliis similis est, minoribus tamen, & magis incisis, caulis est pedem altus, nonnumquam altior, in quo flores copiosi lutei, deinde siliquulae in quibus semen minutum: radix digiti crassitudine, gustu recentis Raphani acriore. Circa scrobes & in pigris aquis, ac fluentis prouenit. Acrior est hortensi, & iisdem viribus, sed vehementioribus, maximè ad ciendas vrinas.

ANAGALLIS AQUATICA,
CAP. LXXV.



ECENTIORES herbarij Anagallidè aquaticam hanc vocant, vt cuius folia & vires non parùm imitetur, nec non natales eodem sectetur, siue *Berabungam* nomine Germanico, quo *Bachpunghe* appellatur. Dodonæus non rectè Cepæam, Fuchsius Sium. Quidam Samolum Plinij esse volunt, herbam in aquosis nascentem, multum à

Druidibus celebratam. Tragus Sium non odoratum vocat: fruticosus est ramulis, teneris, carnosus, rotundis, foliis leuiter in ambitu crenatis, carnosus, nigricantibus: summis caulibus & ramulis copiosa florum cæruleorum anagallidis similium congerie stipatis: radix albicat, multis diffusa fibris. Tota herba gustu est acriore nasturtij, inquit Pena, odore non ingrato. Quare calida est, & ad calculum & vrinæ diffi-

ANAGALLIS Aquatica,
Dodonai.

ANAGALLIS Aquatica
altera, Lobellij.



cultatem

cultatem perutilis. Experimento cognitum illam tritam & brachiorum carpis ad-
motam, oculorum inflammationes sedare, ac epiphoras mirificè sistere. *Locus.* Locis vdis
vt scrobium & stagnorum marginibus gaudet. Aliquando in ipsa riuulorum aqua
reperitur. Ad Germaniæ maritimæ indigenam morbum, quem Scorbutum appel-
lant, utilis est, eodem quo nasturtium aquaticum sumpta modo. Scribit Tragus
cum aceto & butyro tostam, & calidam impositam, ac subinde renouatam tumo-
ribus quibusvis & sacris ignibus prodesse: apud veterinarios magno esse in vsu in
discutiendis tumoribus & sananda equorum scabie, aliisque id genus affectibus:
acetariis commanducatam calculos rumpere, vrinas ciere, foetus mortuos & men-
ses pellere. Lobellius Anagallidem aquaticam alteram pinxit, fortassè Sium non
odoratum alterum Tragi, folio pulegij regalis. Vdorum, fontium, fluentorumque
amantior hæc, sed rarior: cuius folia Valerianæ minimæ æmula sunt, & eiusdem
coloris: cauliculus dodrantalis, summo diuisus, è pusilla filamentis compacta radi-
ce, flosculi albi & pericarpia Anagallidis, sed exiliora multò, per maturitatem fer-
ruginea. Secus ripas & margines riuulorum Austruyel paguli, altero ab vrbe An-
tuerpiana lapide, occurrit. Hæc Lobellius.

COTYLEDON AQUATICA, CAP. LXXVI.



QUAM quæ huic est cum Cotyledone siue vero vmbilico veneris si- *Nomina*
militudinem, & ob natales, herbarij Cotyledonem aquaticam nomi- *Dod. lib. 1.*
narunt. Officinæ Vmbilicum veneris & Scatum cœli, quamquam vmb- *cap. 25.*
ilicus veneris non sit, nec eius loco vtendum, fibras exiguas, multas, *Pet. Pe. in*
cauliculósque teneros, reptantes, & per humum sparso habet: folia circinato am- *Ad.*

COTYLEDON, Aquatica.



bitu leuiter inciso, obtusa incisura, stellato *Lib. 25. c. 11.*
medio cœtro, parum depressio, pediculis sub-
tus ei adfixis, vmbelicum verum imitantia,
sed minora, teneriora, magis nigricantia: flo-
sculi candidi, penduli subter folia. Julio flo-
ret. Gustus acris & linguam vellicans cali-
dam esse demonstrat. Quare non sine magno
errore pharmacopœi quidam Cotyledonis
penuria vngueto populeo indunt. Sunt qui-
bus hæc Callitriche Plinij videtur esse, sit &
ex Callitriche sternutamentum, inquit, folia
sunt lenticulæ similia, caules iuncis tenuissi-
mis, radice minima. Nascitur in opacis & hu- *Locus.*
midis, gustatu feruens. Alij Callitrichē potius esse volunt herbam descriptam cap.
17. de qua suprà tractauimus. In regionibus septentrionalibus frequens admodum
riguis depressisq; pratorum cōuallibus & scrobibus, vbi torpuerunt per hyemem
resides aquæ. Gustu acris est.

SIVM,

CAP. LXXVII.



QUOD Græcis σίον, Latinis Siū & Lauer dicitur, Mauritanis *Nomina*
Rorcathal-
mi, & Inhamelhauella, seu *Hamehauella,* Italis *Gorgolestro,* Germanis *Vusser*
eppfich, id est, Apium palustre, Hispanis *Rabacas,* Gallis *Berle.* Sium autē
nomen sibi adsciuit ἀπὸ τοῦ σελίνου, id est, à concutiendo, quia quatitur,
vacillandoque perpetuo succutitur præterlabentibus vndis, atque semper alluenti-
bus. Vnde etiam Laueris nomen Latinis, nisi quis malit ab vrinis calculisq; ciendis *Lib. 2. c. 120.*
& excutiendis dictum. Sium, vt tradit Diosco. in aquis inuenitur, frutice pingui, *Forma.*
recto,

recto, foliis latis, olusatro similibus, sed minoribus & odoratis. Sium verò Crateuæ, vt idem Diosco. refert, herba est fruticosa, exigua, multa folia habens, rotunda, maiora quàm menthæ, nigra, & ad erucam accedentia. Matthiolus id verum Sium esse arbitratur quod hîc exhibemus, quòd nullis prorsus notis à Dioscoridis Sio dissideat. Prouenit, inquit Lobellius, in riguis & riuulis vbi cardamine, foliis ad nasturtium hortense & cardaminen accedentibus. Cauliculi pedales & interdum cubitales: flores albi & cornicula Sij Crateuæ, gustanti acria, frequens hæc Taurinis Pedemōtanis in collium & montium riuulis. Dioscoridis sium esse Gallorum *Berle*, quam herbarij pastinacam aquaticam vocant ab odore & foliorum effigie, perspicuum est ex descriptione, eique sententiæ plerique omnes adstipulantur. At tamen Fuchsius hanc nomine eleoselini seu apij palustris depinxit. Dodonæus in stirpium historia Sium Crateuæ maius facit plantam hîc pictâ: sed perperâ, cum non Crateuæ, sed Dioscoridis sit verum Sium. Id quod & agnouit in Historia Aquatil. vbi multò accuratius depinxit & descripsit hoc modo. Sium longis, tricubitalibus aut amplioribus, crassis, striatis & inanibus assurgit caulibus, qui superiùs attenuati in alas diuiduntur: folia in eis oblonga, ex pluribus aliis composita, quorum singula, pingua, glabra & per ambitum serræ modo incisa, particularibus hipposelini foliis minora:

SIVM VERVVM,
Matthioli.



SIVM Vulgare,
Matthioli.



SIVM Crateua, maius
Dodonæi.




flores

flores in umbellis candidi. Radices tenues, nigrae & capillatae veluti fibrae sunt, quae non modò subsunt, sed & caulium geniculis adnascuntur, iis quibus aquis conduuntur, aut limo infiguntur partibus. Apio aut etiam Hippofelino tota herba odoratior est, petrolei vulgò dicti ferè odore. Nascitur in perennibus riuulis, rariùs in sedibus aquis. Iulio & Augusto floret. Idem Dodonaeus in Historia stirpium Sium siue Lauer minus pinxit, sed in Histo. Aquatilius multò feliciùs. Sio, inquit, siue Laueri odore & facultate proximum est, alterum quoddam veluti Sij genus, multò tamen & minus & tenuius. Cauliculi sunt tenues, rotundi, laeves, obscure geniculati, inanes, iuncis quodammodo similes, ex quibus tenues oriuntur, & inanes quoque pediculi siue costae, in quibus parua aliquot & angusta foliola, flores in exiguis umbellis, scabiosae angustioribus & minoribus, candidi, simul compressi exeunt: semen aniso maius, subcandidum, superiori parte latius. Radices tenuissimae & nigrae fibrae sunt, caulibus inferiùs adhærentes: emittit verò & ex imo caulis, fibras oblique serpentes, quae alicubi terrae aut limo hærentes, radices faciunt, & cauliculos promunt, seipsam hoc modo multiplicante stirpe, quae tamè & semine feri potest. Lobellius Oenanthen aquaticam vocat. Reperitur in perennibus riuulis, aut aliis aquis frequentius, ac sæpissimè ubi Sium gignitur: non rarò etiam in palustribus & riguis, iuxta riuulos & fossas: crescit etiam in hortis aut alibi, loco non perinde humido satum, quod tamen minus attollitur & breuius est, foliaque habet terrae proxima, carefolio similia, sed tenuiora: reliqua verò, uti eius quod in aquis exit: radices autem crassas, paruis siluestribus napis similes, verum minores ac breuiiores, à quibus & transuersae quaedam serpentes exeunt fibrae, quibus seipsum multiplicat. Ita non rarò in alium locum translatae, stirpes, formam effigiemque, aliqua parte commutant, floret æstiuis temporibus: Augusto semen in hortis quidem ad maturitatem peruenit. Matthiolus huius generis illud, quod in hortis aut alibi loco non palustri natum, formam commutauit, inter œnanthes à se depictas quartam fecit, ab œnanthæ tamen multum differentem Dodonæi sententia. Quidam minus illud

Cap. 43.

PHELLANDRIVM,

Plinij.



Sium Dodonæi Silaum esse putant à Plinio memoratum, cap. 8. lib. 26. nascetem in glareosis & perennibus riuis, cubitalem, apij similitudine, qui ut olusatrum magna vtilitate vesicæ coquitur. Est & tertium Sio odore & facultate cognatum genus ab eodem Dodonæo positum, Cicutaria palustris Lobellio. Caulem habet crassum, inane, geniculatum, supra aquas bicubitalem aut longiorem, in multas alas diuisum, primum viridem, deinde cum semen maturum esse cœperit, in luteum languescentem, folia hortensis apij, tenuiora: flores in umbellis non magnis parui sunt & candidi: semen odoratum, subnigricans, aniso maius: radices fibratae sunt, veluti sij nigrae, ad inferiorem caulis partem geniculis ipsis adhærentes. Exit iisdem ac similibus quibus sium locis, & simul cum eo sæpè reperitur. Aestate floret, Augusto semen maturum est. Plinij Phellandrium videtur esse, quod scribit nasci in palustribus, folio apij, cuius semen bibitur propter calculos & vesicæ incommoda. Alij apium silvestre Dodonæi Phellandrium esse putauerunt, alij Angelicam minorem.

Lib. 26. c. 11

Lib. 5. c. 46.

Sium

SIUM Alterum Erucæ folio.



Sium Cratæ erucæ folio quidam non abs re Barbaram vulgò dictam esse existimant, fruticosam, paucis foliis, rotundis, nigris, maioribus quàm menthæ, erucæ penè similibus, de qua diximus in Horto, cap. De Eruca. Pena & Lobellius id Sium Erucæ folium arbitratur esse Sisymbrium aquaticum Matthioli, Nasturtium aquaticum Tragi & herbariorum, Gallorum *Cresson d'eau*. De quo in horto diximus. Huc referenda alia non absimilis planta, à Lobellio picta, & descripta his ferè verbis. In stagnantibus & vdis scrobibus & lacustribus ponè novam urbem Antuerpianam oritur, iuxta Scaldæ amœnissima fluenta. Radix innumeris implexa gracilibus & tortilibus fibris pullis glebæ limosæ inseritur, è qua cubitales & ternum cubitorum caules cicutæ assurgunt, folia laueris Dioscoridis, ambitu ferrata, speciosa, flos in umbellis è luteo viridi pallescens, semen apio hortensi ferè par, quod gustu ad cuminum, daucum creticum, & citrei mali corticem accedere, & plusculum caloris habere videtur. Sij verò fa-

Lib. 2. c. 120

Lib. 8. sim.

cultates hæc tradit Dioscorides. Eius folia cruda coctaque si edantur, calculos confringunt & expellunt. Vrinæ item mouent, foetus & menses ducunt. Et Galenus, Sium, inquit, quantum gustu odoratum est, tantum etiam calfacientis facultatis est particeps. Sed & digerit, & urinas mouet, & calculos renū frangit, & menses euocat.

ERISITHALES,

CAP. LXXVIII.

Lib. 26. c. 13.



ERISITHALES, vt scribit Plinius, est flore luteo, foliis acanthi, bibitur ex vino. Huic breui historiæ non in scitè aptari potest planta hîc depicta, radice longa, crassa, contorta, furculosa, foliis ex ea multis, pedem ferè altis acantho similibus, sed non nihil per latera pungentibus: caule sesquicubitali, striato, foliis paucis, minoribus & breuioribus comante: flore aureo in capitulis oblongis, qui in pappos tandem dilabitur. In aquis semper, maximè pratis riguis reperitur.

EPIMEDIUM, CAP. LXXIX.

EΠΙΜΗΔΙΟΝ Græcis, & Latinis Epimedium dicitur. Caulis est non magnus, inquit Dioscorides, hederæ foliis denis aut duodenis, neque florem, neque fructum ferens, radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo Nascitur in humidis. Plinius hæc ex Dioscoride descripsisse videtur Epimediū, inquit, caulis est nō magnus, sed hederæ foliis denis aut

Nomen.

Forma.

Lib. 4. c. 19.

Lib. 27. c. 9.

EPIMEDIVM, Dodonæi.



aut duodenis, nunquam florens, radice tenui, nigra, graui odore. Nascitur in humidis. Quænam hæc sit planta difficilè est admodum statuere. Matthiolus ignotam sibi fatetur, eumque reprehendit, qui Epimedium eam plantam esse censet, quæ à triquetra foliorum figura à recentioribus Herba trinitatis appellatur. Pena raram quandam & nuspiam à se præterquam in Italia visam plantam pro Epimedio pinxit & descripsit, suffragante etiam Itolorum Herbariorum iudicio, Lobellius Epimedium Anguillæræ vocat. Dodonæus integram plantam representauit, atque his ferè verbis delineauit, folia eius ampla, numerosa, & creberrimè ter trina, rarò plura, ab vno terete tenuique dependent pediculo, sunt autem ea hederæ foliorum figura, lata, acuminata, duriuscula, & per ambitum veluti serrata. Assurgit inter hæc tenellus & teres dodrantalis cauliculus, valde elegantes ferens flosculos, forma quadrangulares: quorum margines rubent, interiora lutea, medijs verò virent apices: rubet & exteriore ac auersa parte

flosculus, sed discurrentibus rectis candidisque striis variegatus. Radix multas in obliquum propagines emittit, inferiùs fibrosa. Legitimum esse Dioscoridis Epimedium non est facilè affirmare, id enim scribit neque florem neque fructum ferre: nisi dicamus huic idem vsuuenire quod Bechio, Dictamno, Onosmati, fortassè & Cynoglossò, quibus florem, caulem, fructum demunt, cum tamen iis ornentur. Hodie in Belgicis hortis viret. Scribit Diosco. Epimedij folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, non sinere mammas increescere: radicem conceptum adimere, folia trita quinis drachmis, post menstruas purgationes, quinque diebus in vino potu, præstare mulieribus ne concipiant. Eadem ferè Plinius, Huic, inquit,

spissandi refrigerandique natura, sceminis cauenda, folia in vino trita virginum mammas cohibent. Quibus assentitur Galenus, Epi-

medij vis, inquit, est moderatè refrigeratoria cum aquea

humiditate: quare nullam habet insignem qualita-

tem, mammas cataplasmate impositum re-


ctas seruare potest. Aiunt epotum

concupiendi spem

adimere.

§

Lib. 6. sm.



FINIS PRIMÆ PARTIS.



420 ⁴ —

